

50461/D/2

A xxx Syd



THOMAS SYDENHAM

MED. DOCT.

Londinensis Celeberrimus.

T H O M Æ
SYDENHAM
 MEDICI DOCTORIS,
 Ac Practici Londinensis celeberrimi,
OPERA MEDICA;

IN HAC NOVISSIMA EDITIONE

VARIIS VARIORUM PRÆSTANTISSIMORUM MEDICORUM OBSERVATIONIBUS,
 ET PLURIUM CONSTITUTIONUM EPIDEMICARUM RECENTIORUM
 DESCRIPTIONE QUAM MAXIME ILLUSTRATA:

Imo & Mechanica tum Morborum, tum Medicamentorum a IOANNE-BAPTISTA
 MAZINO; necnon COELESTINI COCCHII, & BARTHOLOMÆI
 BOSCHETTI Tractatibus Medicis rursus aucta,

UNA CUM ELENCHIS RERUM,

*Atque alphabetico rerum, & verborum totius Operis Indice copiosissimo
 nunc recens confecto,*

A D C E D I T I N F I N E

LOCUPLETISSIMUM SUPPLEMENTUM PLURES NUNQUAM ANTEA EDITOS DOCTISSIMORUM
 MEDICORUM TRACTATUS COMPLECTENS.



V E N E T I I S,

M D C C L X I I.

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

S U P E R I O R U M P E R M I S S U.

B E N E V O L O L E C T O R I .



Ræclarissimi Viri Thomæ Sydenham, Medicinæ Doctoris, & Practici quondam Londinensis longe Celeberrimi, Opuscula quotquot hætenus seorsum prodire omnia, unico Volumine comprehensa, Tibi, Lector Humanissime, sub majore quam antea forma, præteritis Editionibus multo correctiora, atque Indicibus locupletissimis condecorata exhibemus. Hic proin habes & Observationes Medicas in Constitutionibus Epidemicis Londinensibus annorum 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674 & 1675. occurrentes; quales illæ evulgatæ fuere in Nobilissimi Auctoris Nostri Operum Londinensi Editione, anni 1676. Et alias præterea quæ in Constitutionibus annorum 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. imo etiam ex parte ad annum usque 1684. se obtulerunt: Item Dissertationes Epistolares super Lue Venerea, Affectione Hysterica, Podagra & Hydrope. Quales itidem in ejusdem Doctissimi Auctoris Nostri Editione Londinensi quarta, anno 1685. superadditæ sunt. Imo Schedulam Monitoriam de Novæ Febris ingressu, & Febre Putrida Variolis Confluentibus superveniente, cum Dissertatiuncula de mictu Sanguineo a Calculo renibus impacto, & Processibus integris in Morbis fere omnibus Curandis, a Felicissimo hoc Practico, ut credunt, adhibitis, annexo etiam de Phthisi Tractatulo; qualia in Genevensi Editione anni 1696. adjecta sunt. Utinam Accuratissimus Auctor quicquid ad Medicam Praxim ulterius perficiendam, pari quam quæ ab ipso perscripta sunt, diligentia adnotatum, typis mandasset! Sic abunde sane instruerentur Medicorum Filii iis auxiliis, quibus securius, magno Ægrorum suorum emolumento, in morbis curandis progredierentur. Verum cum tot tantaque ab unius Viri, etiam laboriosissimi, ævo quantumvis longius protracto, sperare minime liceat: a Doctore Medico, nobis amicissimo, quique ea quæ jam proposuimus significavit, impulsus sumus ut in eorum quæ deficiebant aliquale supplementum, selectiora plura, undequaque ex Accuratiores Practicis conquirentia, ac ea præprimis quæ Methodo Sydenhamianæ maxime affinia forent, huic ipsi nostræ Editioni infereremus; quo scilicet, si non integram prorsus Medicam Praxim, illam saltem minus mancā, Tibi jam sisteremus. Cui Clarissimo Viro, tanquam in hisce materiis, ut ex ipsius multiplicibus Operibus con-

stat, versatissimo, lubentes admodum annuentes, illud omne quod magis ad rem faciens præ manibus habebat, donec plura in sequentibus per otium exquirere, aut etiam ex proprio, ut pollicetur, penu promere aliquando liceat, ab illo acceptum Tibi tradimus. Inter quæ non minima sane commendatione digna videntur, quæ jam exhibentur super Constitutionibus Epidemicis, in variis Europæ nostræ Urbibus & Regionibus, variis annis ac temporibus grassantibus; & ad normam quam olim Magnus Hippocrates suo suaferat exemplo, quamque Sibi Excellentissimus Noster Sydenham prudentissime in plenioris Artis Medicæ perfectionem, a Systematicis Auctoribus forsitan non parum retardatam, præstiterat, ventilatis atque examinatis. Aditamenta autem quod spectat, quibus in ipso Operis decursu Argumenta pro connexionem quam cum ipso Auctoris Textu habent indicanda præfiguntur; eorum specialis Nota in subsequenti pagina reperitur. Circa quod rursus observandum venit, quod Capita quædam Constitutiones Epidemicas particulares variarum Sacri Imperii Urbium ac Regionum spectantia eo ipso ordine quo in prædicta indicantur Nota non exhibentur; quodque pars eorum ad hujus Operis Sydenhamiani calcem refertur propter rationes in Admonitione ibidem adjecta significatas.

Atque hæc cum aliis, quæ huc usque præcesserunt, communia habet editio hæc nostra. Verum quum nihil nobis potiori curæ sit, quam litterariam suppellectilem augere quotidie magis; optime consultum studiis Medicinæ adolescentibus putavimus, si, quod fecimus, morborum & medicamentorum utramque Mechanicam Joannis Baptistæ Mazini, tum Antonii Cœlestini Cocchii Epistolas Medicas, tum Bartholomæi Boschetti de Mercuriali salivatione Dissertationem ad calcem voluminis adderemus. Ea enim sunt opuscula singula, ut cum celeberrimis Sydenham scriptis tum rerum utilitate, tum dicendi gravitate, & nitore certare possint.

Præterea cum noverimus in nupera Genevensi Editione plures Doctissimorum Medicorum Tractatus numquam antea editos Clariss. Auctoris nostri Operibus esse subnexos, ut editio isthæc nostra magis locupletaretur, & Doctorum virorum votis fieret satis, hos quoque Tractatus omnes ad calcem Operis Supplementi loco apponendos curavimus. Indicem denique rerum & verborum locupletissimum summo studio nuper confectum Observationum Elencho nunc primum adjecimus. Vale.

CATALOGUS TRACTATUUM ET DISSERTATIONUM

Huic THOMÆ SYDENHAM Operum Editioni adjectorum.

- B**ernardini Ramazzini, in Mutinensi Ly-
cæo Medicinæ Professoris, *Dissertationes*
tres, de Constitutionibus annorum 1690. 1691.
1692. 1693. 1694. in *Mutinensi Civitate &*
illius Ditione.
- Lucæ Schroeckii, Academ. Cæsar. Leopold.
Natur. Curiosor. Præsidis, *Historia Consti-*
tutionis Epidemicæ Augustanæ, anni 1695.
- Michaelis Bernardi Valentini, *Constitutio E-*
pidemica Hassiaca, anni 1693. & 1694.
- Joannis Jacobi Harderi, *Constitutio Epidemica*
Basileensis, anni 1695.
- Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitutio Epi-*
demica Berolinensis, anni 1695.
- Michaelis Bernardini Valentini, *Constitutio*
Epidemica Hassiaca, anni 1695.
- Lucæ Schroeckii, *Constitutio Epidemica Au-*
gustana, anni 1696.
- Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitutio Epi-*
demica Berolinensis, anni 1696.
- Conradi Bertholdi Behrens, *Constitutio Epi-*
demica Hildesienfis, anni 1695. & 1696.
- Lucæ Schroeckii, *Constitutio Epidemica Augu-*
stana, annorum 1697. & 1698.
- Joh. Jac. Harderi, *Constitutio Epidemica Ba-*
sileensis, anni 1698.
- Gustavi Casimiri Garhliep, *Constit. Epidem.*
Berolinensis, anni 1697. & 1698.
- Sylvestri Samuelis Anhornii, *Constit. Epidem.*
Sangallensis, anni 1697.
- Caroli Raygeri, *Constitut. Epidem. Posoniensis*,
annorum 1695. 1696. & 1697.
- Lucæ Schroeckii, *Constitut. Epidem. Augusta-*
na, anni 1699. & 1700.
- Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitut. Epidem.*
Berolinensis, anni 1699.
- Joh. Jacobi Harderi, *Constitut. Epidem. Basi-*
leensis, anni 1699.
- Rudolphi Jacobi Camerarii, *Constitut. Epi-*
dem. Tubingensis, &c. anni 1699. & 1700.
- Ambrosii Stegmanni, *Constitut. Epidem. Mans-*
feldiaca, anni 1697. & 1698.
- Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitut. Epidem.*
Berolinensis, anni 1700.
- Constit. Epidemica Uratislaviensis*, annorum 1699.
1700. 1701.
- Constit. Epidem. Berolinensis*, anni 1702.
- Lucæ Schroeckii, *Constit. Epidem. Augustana*,
annorum 1701. 1702. 1703. 1704. & 1705.
- Ejusdem, *Constitutio Augustana*, annorum 1706.
1707. 1708. 1709. & 1710.
- Joh. Jacobi Harderi, *Constitut. Epidem. Basi-*
leensis, anni 1700. & 1701.
- Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitut. Epidem.*
Berolinensis, anni 1701. 1703. & 1704.
- Marci Gerbesii, *Constit. Epidem. Labacensis*,
anni 1709. & 1710.
- Joh. Georgii Hoyer, *Constit. Epidem. Mul-*
busina, anni 1700.
- Rudolphi Jacobi Camerarii, *Constitut. Epi-*
dem. Tubingensis, anni 1701. & 1702.
- Joh. Guilhelmus Bayerus, & Bernardinus
Ramazzinus, *de Frigore Hyemali* anni 1709.
- Joh. Adami Genselii, *Constit. Epid. Inferioris*
Hungariæ, ann. 1711. 1712. & 1713.
- Sydenham Opera Medica.
- Lucæ Schroeckii, *Constit. Epidem. Augustana*,
anni 1711. 1712. 1713. 1715. 1716. & 1717.
- Marci Gerbesii, *Constitut. Epidem. Labacensis*,
anni 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. & 1717.
- Josephi Lanzoni, *Constitut. Epidem. Ferrarien-*
sis, anni 1715. 1716. & 1717.
- Gualteri Harris, M. D. ac Celeberrimi Medi-
corum Londinensium Collegii Socii, *de Lue*
Venerea, ejusque origine, natura & curatio-
ne, Dissertatio.
- De Contagiosa Epidemia quæ in Patavino Agro,*
& tota fere Veneta Ditione in Boves irrepsit,
Dissertatio, habita a Bernardino Ramazzini,
in Patavino Lycæo Practicæ Medicinæ
Professore Primario.
- Davidis Hamilton, Equitis Aurati, Regalis
Societatis Londinensis utriusque Socii, nec-
non Magnæ Britanniæ Reginæ Medici Or-
dinarii, *Tractatus de Febre Miliari, seu Ve-*
sculari: adjecto super eadem febris historiarum
fasciculo.
- Caroli Drelincurtii, Lugduni in Batavis Pro-
fessoris Medici Senioris, *de Calculo Renum*
& Vesicæ, Dissertatio.
- Martini Lister, M. D. e Societate Regia Lon-
dini, *Dissertatio Medicinalis de Calculo Hu-*
mano.
- Caroli Leigh, Medic. Doct. *Phthisiologia Lan-*
castriensis.
- Guilhelmi Musgrave, M. D. Incltyti Medi-
corum Londinensium Collegii, & Socie-
tatis Regiæ Socii, *de Arthritide Symptoma-*
tica, Dissertatio.
- Ejusdem, *de Arthritide Anomala, sive Interna,*
Dissertatio.
- Joannis Baptistæ Mazini *Mechanica Morbo-*
rum, & Medicamentorum.
- Antonii Cælestini Cocchii, *Epistolæ Physico-*
Medicæ.
- Bartholomæi Boschetti *de Salivatione Mercu-*
riali, Dissertatio Physico-Medico-Mechanica.
- Supplementum nunquam antea editum, con-
tinens tractatus sequentes
- Dn. D. Caroli Friderici Loevv *de Febre Pe-*
techiali an. 1683. Posonii grassata, & cujus
descriptionem in adversariis paternis repe-
retat, Epistola ad clar. Dn. Francisc. Frider.
Possinger, Archiatrum Cæsareum.
- Dn. D. Andreæ Loevv. *Historia Epidemica*
Hungariæ Annorum 1688. 1697. 1699. 1700.
1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707.
1708. 1709. ab ejusdem filio Dn. D. Caro-
lo Frider. Loevv perillustri Lucæ Schroe-
ckio, Academ. Natur. Curios. Præsidis, &c.
Anno 1726. communicata.
- Dn. D. Josephi Lanzoni *Constitutio Epidemica*
Ferrariensis, ann. 1729.
- Dn. D. Caroli Frider. Loevv; *Historia Fe-*
bris catarrhalis, quæ ann. 1729. mense No-
vembri, & Decembri per Europam epidemicè
grassata est; cui accedit Constitutio Epidemica
an. 1730.
- Dn. D. Caroli Richa *Constitutio Epidemica*
Taurinensis annorum 1720. 1721. 1722.

A M I C I S S I M O V I R O
D O M I N O
JOHANNI MAPLETOFT,
MEDICO DOCTORI,
IN COLLEGIO GRESHAMENSI
A P U D
L O N D I N E N S E S P R O F E S S O R I,

Necnon Societatis Regiæ ibidem Socio.



Uo omnino sunt (Humanissime Vir) de quibus hic mihi tecum agendum est: primum ut causas exponam, quibus impulsus Tractatum hunc meum in publicum edo; alterum, quamobrem eundem Tuo potissimum nomini dicandum censeo. Primum quod attinet, tricesimus jam agitur annus, a quo *Londinum* petens, ut inde *Oxonium* denuo proficiscerer (a quo primi belli calamitas me ad annos aliquot distinuerat) in virum doctissimum & maxime ingenuum Dominum *D. Thomam Coxe*, (qui per eos etiam annos, atque ad hunc usque diem Medicinam magna cum celebritate factitavit) Fratri meo tunc ægrotanti consulentem, auspicato incideram; qui quidem Vir, pro nota sua humanitate suavitateque morum me percontatus est, cui me demum Arti, intercisa jam repetens studia, sumptaque toga virili, pararem addicere. Ego vero incertus adhuc animi, & de medica Arte ne vel somnians quidem, tanti viri hortatu atque autoritate permotus, nescio quo fato meo, me ad eam serio accinxi. Et sane si quando hæc nostra conamina vel minimum in publica commoda cesserint, illi grato animo accepta referenda erunt, quo Promotore atque Auspice ea studia primum sum aggressus. Post annos aliquot in Palæstra Academica insumptos *Londinum* reversus, ad Praxim Medicam accessi, quam cum intento admodum oculo omnique adhibita diligentia curiose observarem, mox in eam veni sententiam, quæ mecum ad hodiernum usque diem crevit; hanc scilicet Artem haud rectius perdiscendam esse, quam ab ipsius Artis exercitio atque usu; veroque admodum esse simile, quod qui ad naturalia morborum Phænomena oculos animumque accuratissime maximeque diligenter adverterit, in eliciendis Curativis Indicationibus veris ac genuinis maxime pollere debeat. Huic itaque me Methodo totum tradidi, satis securus, quod Naturam si sequerer Ducem, etiam *Avia terrarum peragrans loca; nullius ante Trita solo*, nusquam vel latum unguem a recto tramite discederem. Hoc me filo regens, primo ad pressiores *Februm* observationem animum appuli, & post devoratum haud mediocre tædium, & molestissimas mentis agitationes, quibus me ad annos aliquot fatigandum permisi, tandem in methodum incidi, qua istæ possent sanari: quam etiam amicis flagitantibus, in lucem promendam jamdudum concessi. Cum vero ab illo tempore *novas Februm species*, mihi hæctenus incognitas, sibi invicem jugiter succedentes animadverterim, statui apud me quæ ad eas pertinebant singula, vel ab eisdem pendebant, summa qua possem diligentia in unum congerere: quo tandem aliquando prioris cæpti mei tenuitatem atque angustias paulo accuratiori ac magis absoluta horum morborum Historia pensare valerem. Sed dum hæc animo versarem, atque indagarem sedulo, & proinde jam in eo totus essem, ut pro multifariis Naturæ mutationibus & versatili ingenio medendi, Methodum, ceu gladium Delphicum, procuderem omnibus parem, statim didici me ideo tantum aperuisse oculos, ut pulvere, haud quaquam vero Olympico, iidem complerentur, atque *his* quidem, proprii cerebri phantasmata, *illis*, nullum me prorsus habere ducem plane viderer. Quamvis optassem Lucubrationes hæc meas non nisi annorum porro aliquot experientia auctas & confirmatas typis evulgasse, contumeliis tamen ac sannis procacissimi cujusque ardelionis tandem plus satis delassatus, amicis eo usque morem gessi (inter quos cum honore mihi semper nominandus est sagacissimus Vir Doctor Dominus *Gualterus Needham*, tam Medicæ Artis, quam rei Litterariæ decus, & laus) ut mihi tandem consulerem, ac justam pararem Defensionem; ea nempe facta prodens scriptis publicis quæ ingenuos, quod spero, omnes mihi Patronos conciliabunt. Cæteros quod attinet; expectabo scilicet, quemadmodum acute Romanus Philosophus, *ut quicquam Calumniæ sit sacrum, cui nec Rutilius sacer fuit, nec Cato?* Si qui itaque reperiantur, quos præ immanitate quadam ac asperitate naturæ convitiandi libido adhuc inceserit, rectene an secus scripserim haud æstimantes æqua lance, qui vitio statim

statim vertunt, si quis novi aliquid, ab illis non prius dictum, vel etiam inauditum, in medium proferat, huiusmodi ego homines æquo me animo laturum spero; certe conviti-
orum ferram neutiquam recipiabo. Illud tantum opponam, Viro Christiano sane per-
dignum, quod olim *Titus Tacitus*, obtrectanti *Metello* regeffit: *Facile est in me dicere, cum
non sim responsurus: Tu didicisti maledicere: Ego conscientia teste didici maledicta contemnere. Si
tu linguæ tuæ dominus es, ut quidquid lubet effutias? ego Aurium mearum sum dominus, ut quic-
quid obvenit andiant inoffensæ.* Atque hæc sunt, quorum victus pondere Librum hunc
luce donandum esse sentiebam.

Tibi vero (Charissime Vir) eundem dedicatum volui, tum ob mutuam qua nos in-
vicem complectimur Amicitiam Benevolentiamque; tum etiam quia nemo te melius ju-
dicare valeat, si quo in loco aut pretio habendæ sint quas hic trado *observationes*, cum
per septennium, quod jam ultimo excurrit, plura e præcipuis atque insignioribus, quæ
sequentes exhibent pagellæ, Tute etiam oculis usurpaveris. Uti vero ea tu es morum
integritate probitateque notissima, ut religio tibi sit fictis insinuationibus alios in erro-
rem pellicere, (maxime ubi de corio humano agitur) ita ea etiam polles sapientia at-
que eruditione, quæ tibi a me imponi, si id serio agerem, nullatenus paterentur, mul-
to minus tu tibi imposueris istis experimentis, quibus in tuis etiam ægris nonnullorum,
quæ vel hic descripsi, vel tibi alias affirmavi, veritatem comprobasti. Nosti præterea,
quam huic meæ Methodo suffragantem habeam, qui eam intimius per omnia perspexe-
rat, utrique nostrum conjunctissimum Dominum *Johannem Lock*, quo quidem viro, sive
ingenio Judicioque acri & subactò, sive etiam antiquis, hoc est, optimis moribus, vix
superiorem quenquam inter eos qui nunc sunt homines, repertum iri confido: paucissi-
mos certe pares. Verum non opus est, ut ulterius tuam fidem sollicitem, de qua jam-
diu persuasissimus sum. Cæteros quod attinet, jacienda alea est, quæ utcunque cecide-
rit, sortem haud gravate feram. Cum enim jam senex sim, &, summi Numinis favore,
tantum mihi sit viatici, quantum restat viæ, de reliquo dabo operam, ut nec ipsi mi-
hi, neque aliis molestus eum assequar felicitatis modum, quem ita eleganter depinxit
Vir magnus:

*Felix ille animi, Divisque simillimus ipsis,
Quem non mendaci resplendens Gloria fuco
Solicitat, non fastosi mala gaudia luxus,
Sed tacitos finit ire dies, & paupere cultu
Exigit innocuæ tranquilla silentia vitæ.*

Quod restat, exorandus mihi es, ut hoc propensi in te animi, & quo te prosequor,
honoris pignus æqui bonique consulas; præsertim cum nullo jure tibi imputari possint
quotquot in hoc Opere nævi ac σφάλματα comparuerint, quorum omnium in me solum cu-
denda est faba: nec tu plectendus, siqua ego forte deliravero. Quamlibet neque ejus,
quem exantlavi, laboris omnis mihi fructus perierit, cum vel ex erroribus & hallucinatio-
nibus meis ansam nactus fuero, qua omnibus palam faciam, quanta te colam amicitia, &
quod ex animo sim.

Tibi semper addictissimus

THOMAS SYDENHAM.

P R Æ F A T I O.



Uemadmodum a natura ita comparata est humani corporis fabrica, ut nec præ jugi particularum fluxu sibi semper constet, nec præ externarum rerum vi sui juris ubique permaneat, unde multiplex ægritudinum cohors terris ab omni ævo incubuit; sic procul omni dubio multis jam sæculis ante natum non *Græcum* modo, sed (qui mille annis hunc antecessit,) *Ægyptium Æsculapium*, hominum ingenia investigandæ medelæ necessitas exercuit. Et profecto, ut quis primus ædificiorum, aut vestimentorum usum ad depellendam cæli inclementiam instituit, nemo facile dixerit, ita & *Artis Medicæ* natales, ut *Nili* fontem, indigitare nequimus; cum ars medica perinde ac cæteræ artes, in usu nunquam non extiterit, licet nunc diligentius, nunc frigidus exulta, pro vario temporum ac regionum habitu. Quantum *Veteres*, ac inter primos *Hippocrates*, præstiterunt, abunde notum est; quibus scilicet, ac eorum scripta compilantibus maximam *Therapeuticæ* solertiæ partem acceptam ferimus. Quin & succedentibus deinde sæculis emicuit nonnullorum industria, qui aut *Anatomia*, aut *pharmacia*, aut *Methodo iatrikḗ* operam navando, Medicinæ pomœria ampliare pro virili sategerunt: ut taceam nec in hac nostra *Britannia*, ipsoque hoc sæculo defuisse, qui in omni scientiarum genere, quo res Medica adaugeri possit, optime meruerunt; quorum quidem laudes impari calamo non attingo. Cæterum quantacumque fuerint aliorum conanima, semper existimavi mihi vitalis auræ usum frustra datum fore, nisi & ipse in hoc stadio versatus, symbolum aliquod, utcumque exiguum, in commune *Medicinæ* ærarium contribuerem. Quocirca post diuturnam meditationem, ac diligentem fidamque annorum alioquin multorum observationem, tandem aliquando decrevi; Primo sententiam meam in medium proferre, qua demum ratione Medendi scientia ulterius promoveri possit: Deinde meorum in hoc negotio conatum specimen aliquale in lucem dare.

Sentio autem nostræ Artis incrementum in his consistere, ut habeatur (1) *Historia*, five *morborum* omnium descriptio, quoad fieri potest, graphica & *naturalis*; (2) *Praxis* seu *Methodus* circa eosdem *stabilis* ac *consummata*. Sane morbos crasse depingere satis obvium est: atqui *Historiam* eorum ita conscribere, ut evitetur *Censura*, quam *Clariss. Verulamius* in nonnullos ejusmodi Promissores vibravit, longe majoris est negotii: *Satis scimus* (inquit *Vir Nobiliss.*) *haberi Historiam Naturalem, mole amplam, varietate gratam, diligentia sæpius curiosam: Attamen si quis ex ea fabulas, & authorum citationes, & inanes controversias, Philologiam denique & ornamenta eximat (quæ ad convivales sermones, hominumque doctorum Noctes potius, quam ad instituendam Philosophiam sint accommodata) ad nil magni res recidet. Longe profecto abest ab ea Historia, quam animo metimur.* Similiter etiam & morborum curationes pro more facillime proponuntur; Atqui hoc ita præstare, ut verba in facta transeant, atque eventus promissis respondeant, magis ardui moliminis illi judicabunt, qui vident haberi apud Scriptores Practicos morbos complures, quos nec illi Scriptores, nec quippiam hæcenus Medicorum sanare valuerunt.

Quod autem spectat ad *Historiam Morborum*, si quis rem attentius perdendat, facile videbit scribentem ad multo plura animum debere advertere, quam vulgo existimatur. Quorum pauca hæc impræsentiarum attingere suffecerit.

Primo expedit ut morbi omnes ad definitas ac certas *species* revocentur, eadem prorsus diligentia ac ἀκριβείᾳ qua id factum videmus a *Botanicis* scriptoribus in suis *Phytologiis*. Quippe reperiuntur morbi, qui sub eodem genere ac nomenclatura redacti, ac quoad nonnulla symptomata sibi invicem consimiles, tamen & natura inter se discreti diversum etiam medicandi modum postulant. *Cardui* quidem nomen ad plures herbarum species extendi nemo nescit: at vero parum accurate faciet rei herbariæ scriptor, qui generalem hujus plantæ descriptionem, qua scilicet a cæteris stirpibus discrepat, proponere contentus, propria interim & peculiaria cujusque speciei signa & characteres, quibus ab invicem discriminantur, contempserit. Eodem plane modo nec satis est scriptori communes dumtaxat morbi alicujus πολυειδῆς apparentias annotasse. Esto sane non omnibus morbis eandem contingere varietatem; tamen complures esse, qui licet ab authoribus sub eodem titulo citra ullam speciei distinctionem tractentur, dissimillima sint indole, in sequentibus pagellis, uti spero, palam fiet. Imo etiam ubi distributio in species reperitur, id fit plerumque, ut *Hypothesi* alicui, quæ veris Phænomenis substruitur, suus reservetur honos; ac proinde ejusmodi discriminatio non tam ad morbi, quam ad Authoris ingenium, Philosophandique theoriam accommodata est. Quantum Medicinæ obfuerit ἀκριβείας hac in parte defectus, ostendunt multorum morborum exempla; quorum nempe curationes hodie non desideraremus, si scriptores, dum Experimenta & Observationes Medicas benevolo saltem animo communicarint, unius scilicet speciei morbus pro alio speciei diversæ substitutus non fefellisset. Atque hinc etiam arbitror profectum esse, quod materia Medica in sylvam tam immensam, sed fructu perexiguo, excreverit.

Porro autem in scribenda morborum Historia, seponatur tantisper oportet quæcumque *Hypothesis Philosophica*, quæ scriptoris iudicium præoccupaverit; quo facto tum demum morborum *Phænomena* clara ac *naturalia*, quantumvis minuta, per se accuratissime adnotentur; exquisitam *Pictorum* industriam imitando, qui vel nævos & levissimas maculas in imagine exprimunt. Enim vero dici vix potest, quot erroribus ansam præbuerint *Hypotheses* istæ *Physiologica*, dum scriptores, quorum animos falso colore illæ imbuerint, istiusmodi Phænomena morbis affigant, qualia, nisi in ipsorum cerebro, locum nunquam habuerunt, debebant autem in conspectum venire, si Hypothesis, quam ipsi pro concessa ac rata habent, constaret veritas. Adde quod si quando symptoma aliquod, quod cum dicta Hypothesi apposite quadret, revera morbo competat, cuius typum delineaturi sunt, tum illud supra modum evehunt, ac plane reddunt *ἐκ μὲν ἐλπίδων*, quasi in hoc scilicet totus negotii cardo verteretur: sin Hypothesi minus congruat, aut prorsus silentio, aut levi saltem pede transmittere consueverunt, nisi forte beneficio subtilitatis alicujus Philosophicæ in ordinem cogi, ac quoquo modo accommodari possit.

Expedit autem tertio, ut in describendo aliquo morbo peculiaria & *perpetua Phænomena* seorsim ab *accidentalibus* & adventitiis (qualia sunt, quæ non tantum ob ægrotantium temperiem & ætatem, sed etiam ob rationem medendi diversam varie se habent) enarrentur. Nam sæpe accidit, ut facies morbi variet pro vario medicandi Processu, ac nonnulla symptomata non tam morbo quam Medico debentur; adeo ut eodem morbo laborantes, sed varia methodo tractatos, varia etiam Symptomata exerçant. Unde nisi cautela adhibeatur, necesse est, ut admodum vagum & incertum sit circa morborum symptomata iudicium. Prætereo, quod *Casus oppido rari* ad morborum Historiam proprie non pertineant; quemadmodum & in descriptione *Salviæ*, v. gr. Erucarum morsus inter signa discriminantia istius plantæ nequam recensentur.

Denique, *Anni tempestates*, quæ scilicet cuivis morborum generi potissimum faveant, diligenter observandæ sunt. Non inficior nonnullos esse omnium horarum; alii tamen, nec pauciores, occulto quodam Naturæ instinctu, annorum tempora, non secus quam quædam aves aut plantæ, sequuntur. Sæpe quidem subiit mirari hoc morborum quorundam ingenium, satis obvium, a paucis tamen fuisse hætenus observatum, cum quo sydere stirpes, aut pecudes solemniter procreentur plurimi curidius adnotarent. Sed quæcumque sit hujus oscitationis causa, pro certo statuo, tempestatum, in quibus ægritudines ingruere consueverunt, notitiam multum Medico prodesse, tam ad speciem morbi dignoscendam, quam ad ipsum morbum extirpandum, atque horum utrumque minus feliciter evenire, ubi istiusmodi observatio negligitur.

Hæc quidem etsi non sola, saltem insigniora sunt, quæ in scribenda morborum Historia observari convenit. Cujus *Historiæ* utilitas ad Praxim, omnem æstimationem excedit: ac præ qua subtiles Disquisitiones, ac argutiolæ, quibus Neotericorum libri ad nauseam fere infarciuntur, nullo in numero sunt habendæ. Qua enim aut compendiosiore aut etiam alia via, vel causæ morbificæ, quibus obviam eundum est, deprehendi, vel indicationes curativæ elici possunt, quam certa ac distincta peculiarium symptomatum perceptione? Neque enim ulla est circumstantia tam levis aut exigua, quæ suos usus ad utrumque non habeat. Nam ut demus aliquid varietati a temperamento individuorum, & tractandi ratione proficisci, nihilominus adeo æquabilis ac si ubique similis est naturæ ordo in producendis morbis; ut in diversis corporibus eadem plerumque reperiantur ejusdem morbi symptomata; ac illa ipsa, quæ in *Socrate* ægrotante observata fuerint, etiam generaliter ad *Hominem* quemcunque eodem morbo laborantem transferri possint; non secus ac universales plantarum Notæ ad omnia cuiusque speciei individua rite se diffundunt. Qui v. gr. *Violam* accurate descripserit quoad colorem, saporem, odorem, ac figuram, cæteraque id genus; omnibus ubique terrarum *Violis*, quæ sub ea specie continentur, Historiam illam in plerisque fere omnibus convenire facile animadvertet.

Et quidem existimo, nos ob eam potissimum causam accuratiori morborum Historia ad hunc usque diem destitui, quia scilicet plerique eos pro confusis inconditisque Naturæ, male se tuentis & de statu suo dejectæ, effectis tantum habuere, ac proinde laterem lavare crederetur is, qui justam eorundem enarrationem moliretur.

Sed ut ad rem revertamur. Non minus certo etiam a minutissimis morbi circumstantiis Indicationes curativas possit Medicus desumere, quam ab iisdem sumpsit Diagnostica. Atque adeo non semel mihi in mentem subiit, quod si morbi cujuslibet Historiam diligenter perspectam haberem, par malo remedium nunquam non scirem adferre, variis ejusdem Phænomenis viam, qua mihi incedendum foret, haud dubiam præmonstrantibus; Quæ quidem Phænomena, si inter se sedulo conferantur, manu quasi ducerent ad Indicationes illas maxime obvias, quæ ex intimo naturæ sensu, non vero l'hantasiæ erroribus depromuntur.

Atque his sane gradibus, & ut ita dicam, his adminiculis ad cælum ascendit, ad medicinæ nempe fastigium, Medicorum ille *Romulus*, nunquam satis laudatus *Hippocrates*, qui hanc Arti Medicæ insuper struendæ solidam ac inconcussam subternens

basin, *viz.* νόσων φύσεως ἱστορίαι, i. e. *Naturæ morborum medicatrices*, id egit, ut morbi cujuslibet Phænomena aperte traderet, nulla Hypothesi adscita, & in partes per vim adacta: ut in ejus libris *de Morbis, de Affectionibus, &c.* videre est. Regulas etiam quasdam tradidit ex observatione methodi istius, qua utitur natura tum in morbo provehendo, quam in eodem amoliendo, natas; cujusmodi sunt *Coacæ Prænotiones, Aphorismi*, & reliqua id genus. Atque in his fere stetit magna illa Divini senis *σοφία*, non ab irriti lascivientis Phantasiæ conamine desumpta, ceu vana ægrorum insomnia, sed legitimam exhibens Historiam earum Naturæ operationum, quas in hominum morbis edit. Cum vero dicta *σοφία* nihil esset aliud, quam exquisita naturæ descriptio, par erat omnino, ut in praxi eo tantum collimaret, ut eidem laboranti, quibus posset modis subvenire contenderet; unde etiam non aliam Arti demandat provinciam, quam ut deficienti naturæ succurrat, effrænem coerceat & in ordinem redigat; utrumque vero hoc, tum passu illo, tum etiam methodo, quibus natura morborum expellere satagit atque amovere: Animadverterat nempe sagacissimus Vir, quod sola Natura τὰς νόσους κείναι, ἣ ἐξαρτᾷ τὰ πάντα πᾶσι. Atque hæc omnia peragit Natura paucissimis simplicissimisque adjuta remediorum formulis, alicubi etiam prorsus nullis.

Alterā ab hac Methodus, qua Ars medendi, si quid ego judico, possit ulterius provehi, in eo potissimum cardine vertitur; ut certa aliqua, & consummata undique ac fixa *Methodus medendi* in publica commoda tradatur; eam intelligo, quæ satis magno Experimentorum numero corroborata suffultaque, huic vel illi morbo devincendo suppar invenitur. Neque enim satis esse arbitror, ut successus particulares, sive Methodi cujuslibet, sive etiam Remedii, scriptis prodantur, si neque illa universaliter atque in omnibus scopum attingere deprehendatur, (positis saltem his vel illis circumstantiis.) Contendo vero ego nos æque certo scire debere, hunc illumve morbum expugnatum iri, si huic aut alteri intentioni satisfecerimus, ac certo jam scimus, nos hoc aliove remedii genere huic aut alteri intentioni satisfacere posse: quod quidem licet non semper & ubique, frequentissime tamen, ἣ ὡς ἐστὶ τὸ πολὺ votis respondet exhibentium, ita *sennæ foliis* v. gr. alvum subducimus, *Papavere* invitamus somnum. Non is sum, qui negem, debere Medicum animum diligenter advertere ad particularia, tum Methodi, tum Remedii eventa, quibus est usus in morborum curatione, & in usus suos reponere, tam ad sublevandam memoriam, quam ut anfas inde arripiat, quibus paulatim peritior evadat Medicus, tandemque post diutina, & repetita sæpius experimenta, Methodum sibi figat firmetque, a qua in hujus aut illius morbi curatione ne hilum sibi recedendum putet. Observationes autem particulares in lucem dare, non ita magnam, me judice, adfert utilitatem. Nam si id tantum agit *Observator*, ut nos doceat hunc morbum semel, vel etiam sæpius huic remedio cefisse, quid mihi, obsecro, profuerit, si infinitæ fere medicamentorum decantatissimorum copiæ, qua jamdiu obruimur, adhuc aliud mihi hæcenus inauditum accrescat? Quod si repudiatis cæteris omnibus remediorum formulis, huic me unice addixero, annon innumeris fere experimentis probanda mihi venit ejus vis, innumeræ etiam circumstantiæ trutinandæ, tum ipsam Methodum spectantes, antequam ex observatione solitaria fructum aliquem queam decerpere? Si observatori nunquam non responderit Medicamentum, quare in particularibus versatur, nisi aut sibi diffidat ipse, aut minutatim potius quam in solidum imposuisse orbi videri præoptet? Quam vero in proclivi sit densissima hujus generis volumina conscribere, nemo vel mediocriter in praxi versatus ignorat; uti nec e contra quam sit illud difficile, perfectam & confirmatam undique Medendi Methodum in quovis morbo condere ac stabilire. Si vel unus tantum per singula mundi sæcula hoc modo unicum tractaverit morbum, Medendi Ars (quæ Medicorum est provincia) a multis retro annis ad ἀνυλὴν pervenisset, omnibus absoluta numeris, saltem in quantum fert mortalium fors. Quæ vero fundi nostri est calamitas, jamdiu ab antiquissimo & peritissimo duce *Hippocrate*, & prisca Medendi Methodo, causarum conjunctarum (utpote quæ certo se prodant) cognitione superstructa, descivimus; unde est, ut quæ hodie exercetur, a *Logodædalis* conficta, confabulandi magis sit Ars, quam Medendi. Sed ne hanc ego dicam temere imegisse videar, fas mihi sit e via parumper deflectere, quo scilicet evincam Causas illas remotiores, in quibus assignandis & in lucem extrahendis hominum Curioforum & ἀπειρώων vanæ speculationes unice defudant triumphantque, prorsus esse ἀκαταλήπτους ac inscrutabiles; solas vero proximas & conjunctas a nobis posse cognosci, atque ab his solis indicationes curativas esse mutuandas.

Observandum est itaque, quod si Humores vel diutius, quam par est, in corpore fuerint retenti, (quia scil. Natura eosdem concoquere nequeat, ac deinceps expellere) vel ab hac aut illa aeris constitutione labem morbificam contraxerint; vel denique contagio aliquo venenato infecti in ejusdem castra transierint; his inquam modis & his similibus, & dicti Humores in formam substantialem, seu *speciem* exaltantur, quæ his aliisve Affectibus cum propria Essentia convenientibus se prodit; quæ quidem symptomata, licet minus cautis videantur oriri, vel a natura partis, quam humor obsedit, vel a natura humoris ipsius, antequam hanc induerat speciem, nihilominus revera Affectus sunt ab essentia dictæ speciei in hunc gradum recens evectæ, pendentes. Adeo ut quilibet *morbus specificus* Affectio sit ab hac vel illa specifica Exaltatione, vel specificatione succi cujusdam in corpore animato ortum duceus. Sub hoc genere potest comprehendendi maxima pars morborum, qui certum aliquem typum ac formam agnoscunt.

Et profecto haud minus se natura methodo astringit in his tum producendis, tum maturandis, quam in *Plantis*, sive etiam *Animalibus*. Quinimo ut cuilibet sive Plantæ, sive Animali proprii quidam ac peculiare Affectus competunt, ita se res habet in qualibet succi cujuscunque exaltatione, ubi semel in *speciem* proruperit. Exemplum hujus rei satis luculentum quotidie nobis ingerunt, & ob oculos ponunt variæ istæ Excrementiarum species, quas Arbores, Fruticesque emittunt, vel ob succi Nutritii perversionem & depravationem, vel alias ob causas, in forma scilicet *Musci*, *Visci*, *Fungorum*, aliorumque id genus: quæ omnia *Essentiæ* sunt sive *Species*, a parente seu Frutice, diversæ plane atque distinctæ. Et sane qui serio atque ad amussim pensitaverit *φαινόμενα* illa, quæ Febrem v. g. *Quartanam* comitantur; Quod *viz.* fere semper sub Autumno ingreditur; quod certum ordinem ac typum ubique servat, revolutiones periodicas quarto quoque die non minus certo repetens, quam suas repetit Horologium, sive aliud quoddam ejusmodi *αὐτόματον*, (nisi ab accedente aliquo extrinsecus adveniente hic ordo perturbetur) quod cum rigore ac notabili frigoris sensu aggreditur, quem excipit caloris perceptio non minus sensibilis, quæ tandem in sudore effusissimo terminatur; quod denique morbus hic, quemcunque demum invaserit, vix ante *Vernum Æquinoctium* abigi poterit & fugari; qui hæc, inquam, omnia pensiculatius trutinaverit, haud minus firmis rationibus inducetur, ut credat, morbum hunc *speciem* esse, quam sunt illæ, ob quas credit Plantam esse speciem, quæ parem semper ad normam e terra nascitur, floret, interitque, atque in reliquis afficitur pro ratione *Essentiæ* suæ, neque facile comprehendere potest, qui fiat ut hic *morbis* oriatur a combinatione sive principiorum, sive qualitatum evidentium, cum *plantæ* substantia ac species distincta in rerum natura ubique agnoscatur. Illud interim non diffitemur, quod cum species sive Animalium, sive Plantarum singulæ (demptis perpauca) per se subsistant, istæ Morborum Species ab iis dependent humoribus, a quibus generantur.

Tametsi vero ex jam dictis constare videatur morborum plerorumque causas inscrutabiles prorsus esse, ac *ἀνεξιχνίαστα*, non tamen insolubilis erit illa quæstio: *Quo pacto sanari possint?* cum de causis remotioribus hoc asseramus. Nemo autem est qui non videat curiosos istos speculatores in causis primo primis fere ac remotissimis indagandis, ac in lucem (ut ut invita Minerva ac reclamante naturæ sensu) protrahendis operam perdere; immediatas vero & conjunctas, seu ante pedes jacentes, contemnere, quæ tamen necessario debent cognosci, & possunt etiam, sine ficulneis hujusmodi adminiculis, cum Intellectui se aperte sistant, vel proprii sensus testimonio, vel Anatomicis Observationibus ab aliis jampridem factis, resectæ. Atque ut impossibile plane est, ut Medicus eas morbi causas ediscat, quæ nullum prorsus cum sensibus habent commercium, ita neque est necesse; abunde enim sufficit, ut sciat, unde immediate oritur malum, talesque ejus effectus atque symptomata, ut inter hunc aliumque morbum hujus non dissimilem, valeat accurate distinguere. In *Pleuritide* v. gr. diu atque incassum se fatigabit aliquis, nec tamen mente assequetur parvam illam Crasin & male coherentem sanguinis texturam, quæ prima est hujusce mali origo; qui vero causam a qua immediate producitur recte cognoverit, & ab aliis morbis quibuscunque rite valeat distinguere, non minus certo curandi scopum attinget, etiam neglecta otiosa ista atque inutili remotissimarum causarum indagine. Sed hæc *ὡς ἐν παραδείῳ*.

Jam vero si quærat aliquis, an ad prædicta in Arte Medica desiderata duo (Veram scilicet & Genuinam morborum *Historiam*, & certam confirmatamque medendi *Methodum*) non etiam accedat tertium illud, Remediorum nempe *Specificorum Inventio*? assentientem me habet & in vota festinantem. Etsi enim *Methodus* sanandis morbis *Acutis* maxime accommoda mihi videatur, quibus exigendis cum natura ipsa certum aliquem Evacuationis modum statuerit, quæcunque Methodus eidem fert opem in promovenda dicta evacuatione, ad morbi sanationem necessario conferet; optandum est tamen, ut beneficio *specificorum*, si quæ talia inveniri possint, æger rectiori semita ad sanitatem proficeret; & (quod majoris etiam momenti est) extra aleam malorum, quæ sequuntur aberrationes istas, in quas sæpe invita dilabatur Natura in morbi causa expellenda, (ut ut potenter & docte ei ab assistente Medico subveniatur) possit collocari.

Verum quod ad morbos *Chronicos* sanandos attinet, licet nihil dubitem ultiores in medendo profectus vel a sola *Methodo* posse sperari, quam qui in primam statim cogitationem incurrant, attamen plus satis constat deficere illam in curatione *Chronicorum* aliquot vel maxime spectabilium inter eos, quibus homines urgentur; quod ob hanc præcipue causam usu venit, quia scil. Natura in hujusmodi morbis non habet Methodum tam efficacem, qua materiam morificam foras ejiciat, (perinde atque in *Acutis*) quo nos cum eadem manus jungentes & ad debitum dirigentes scopum, morbum debellare valeamus. In vincendo itaque morbo Chronico is demum jure meritoque Medici nomen sibi vendicat, penes quem est ejusmodi medicamentum, quo morbi *Species* possit destrui: non qui id tantum agit, ut e primis secundisque qualitatibus nova aliqua introducatur, & prioris subeat vicem; quod fieri quidem potest non extincta specie; v. gr. calefieri potest, aut refrigerari; qui *Podagra* laborat, vigente adhuc *podagra*, necdum devicta. Methodo hac, qua diversæ tantum qualitates introducuntur, morbi *Specifici* non magis immediate perdomantur, quam ignis gladio extinguitur. Quid enim, obsecro, Calor, Frigus, Humidum, Siccumve, aut e secundis qualitatibus, quæ ab his pendent, alia aliqua ad morbi curationem faciet, cujus essentia in harum nulla consistit? Si quis hic objecerit, satis magnam

gnum Remediorum Specificorum numerum jamdiu nobis innotescere, hunc ipsum, si examen paulo diligentius instituerit, in oppositas partes facile transiturum confido, cum unicus *Cortex Peruvianus* a suis militet. Toto enim cælo distant, quæ huic aliive *indicationi Curativæ* specificè respondent Medicamenta, cui si faciamus satis, morbus abigitur; & quæ hunc aliumve *Morbum* specificè atque immediate persanant, nullo habito respectu ad hanc aut illam Intentionem sive Indicationem Curativam: v. gr. *Mercurius* & *Sarsæ radices* in *Lue Venerea Specifica* vulgo audiunt, quæ tamen pro specificis propriis atque immediatis non debent haberi, nisi argumentis satis validis atque irrefragabilibus possit confici, *Mercurium* nulla excitata *Salivatione*, *Sarsæ* vero radices sine motis *sudoribus* tam egregiam operam præstitisse. Ad hanc pariter normam alii etiam morbi aliis Evacuationibus curantur, cum tamen quæ adhibentur Remedia, non magis proprie competant immediatæ curationi istorum morborum, qui eis sanantur Evacuationibus, quibus faciendis ejusmodi remedia maxime proprie designantur; quam *Scalpellum Phlebotomum Pleuritidi*; quod tamen nemo opinor *Specificum* hujus morbi facile appellaverit.

Specificæ proinde medicamenta, si ad hanc mentem nostram restringantur, non cuivis homini contingunt, neque oscitantibus temere se ingerunt; nullus tamen dubito, quin in exundanti illa plenitudine, quæ turget Natura diffluitque, ita jubente *Optimo Maximo* rerum omnium *Conditore*, in singulorum præservationem prospectum pariter sit de curatione malorum magis insignium, quæ homines vexant; idque pro foribus, & in patrio cujuslibet solo. Et sane dolendum est, *Plantarum* naturam nondum magis explorato nobis innotescere; quæ mihi videntur reliquæ omni, qua patet, *Materiæ Medicæ* palmam præripere, & quæ inveniendorum, de quibus jam diximus, Remediorum uberimam nobis spem faciunt: Cum *Animalium* partes cum humano corpore nimium convenire videantur, nimium dissidere *Mineralia*; unde est quod Mineralia Indicationibus potentius respondere, quam vel plantas, vel ex animalibus desumpta, lubens fateor; at non specificè tamen mederi, eo quo diximus sensu ac modo. Me quod spectat, non hic aliud mihi sumo præter laborem ac tædium hæc atque hujusmodi diu multumque jam per aliquot annos animo versandi; necdum mihi tam feliciter cessit, ut cum prudenti fiducia, quæ de iis cogitaverim, in publicum dare ausim.

Quantumlibet vero mihi præ cæteris arrideant *Plantæ*, non tamen is sum, qui eximia illa Medicamenta ex alia tribu desumpta, quæ vel hoc, vel alio aliquo sæculo hominum industria atque labore Intentionibus apte respondentia reperta fuere, contemnam. Inter quæ primum sibi locum vendicant quæ nomine *Guttarum Doctoris Gooddard* insigniuntur, & a Viro *Doctissimo* & *solertissimo* tam Methodi quam Remediorum indagatore, *Domino Doctore Goodall* præparantur; quarum vim ac efficaciam in attingendo, ad quem vulgo diriguntur, scopo, cæteris quibusque *Spiritibus Volatilibus* jure præfero.

Coronidis loco, cum in hac introductione fuerim pollicitus, me daturum specimen eorum, quæ in hujus Artis Augmentum utcunque conatus sum; fidem liberare jam tentabo in tradendis *Historia*, *Curationeque Acutorum Morborum*. Qua in re licet satis advertam, me supinis atque ignorantibus fructum omnem eorum, quos per meliores vitæ annos corpore animoque exantlavi laborum, expositurum, malum tamen pessimi hujus sæculi genium satis habeo perspectum, ut non aliam ex hac semine, quam convitiarum atque contumeliarum messem expectem: Meque famæ meæ longe melius consuluisse, si inanem aliquam atque inutilem speculationem commentatus fuissém. Hoc vero mihi perinde est: Mercedem aliunde præstolor. Si quis hic objiciat alios æque in hac arte versatos non idem mecum de his rebus sentire; meum non est quid sentiant alii, disquirere, sed meis observationibus adstruere fidem, quod ut faciam, Lectoris patientiam desidero tantum, non favorem. Res ipsa etenim brevi loquetur, an fideliter & sincero animo hic egerim, an e contra ad instar sceleratissimi hominis morumque profligatissimorum, homicidam me præstiterim vel in terra defossus. Illam tantum mihi veniam peto, quod minus accurate quam proposueram morborum *Historiam* ac *Curationem* descripsero; cum non tam metam figam, quam animos iis addam, qui feliciore ingenio præditi ad hoc opus posthac se accingent, quod jam ego imperfecte molior.

Unum adhuc restat, de quo monendus est Lector, mihi in animo non esse, sequentes paginas infinito particularium observationum numero distendere, quibus Methodo ibidem traditæ fidem adstruam: frustra enim & cum tædio Lectoris repeterentur ista singulatim, quæ in summas contraxi. Satis autem ad calcem Observationis cujuslibet Generalis (saltem quæ ad annos nuperos spectat) Particularem hic illic adnectere, qua Methodi præcedentis medulla continetur. Hoc interim spondeo, nullam a me Methodum Generalem fuisse evulgatam, quæ experientia reiterata non est stabilita, atque confirmata.

Sed & spe frustrabitur, qui ingentem Remediorum, seu formularum sylvam hic expectaverit, cum Medici judicio permittatur, ut pro re nata iis utatur; mihi sufficit innuisse, quibus Indicationibus satisfaciendum est, quo etiam ordine & tempore; Etenim in eo præcipue stat *Medicina Practica*; ut genuinas Indicationes quod exspicari valeamus, non ut remedia excogitemus, quibus illis satisfieri possit; quod qui minus observabant, *Empiricos* armis instruxere, quibus Medicorum opera imitari queant.

Quod

Quod si quis objecerit, me in aliquibus non tantum medicamentorum pompæ renunciasse, sed ea insuper remedia proposuisse, quæ ad materiam medicam vix possint referri, adeo sunt simplicia atque inartificiofa; vulgaribus tantum opinor ac plebeiis animis hac in re displicebo. Norunt enim Sapientes, Bona ea esse omnia quæ sunt utilia, atque Hippocratem, dum Folium usum in *Ileo* sanando proponit, & in *Cancro* nihil prorsus agendum præcipit, atque ejusmodi alia quæ in singulis fere pagellis scripta leguntur, non minus bene de re medica meruisse, quam si pomposis remediorum formulis omnia implevisset.

In animo erat & *Chronicorum* morborum *Historiam* tradere, eorum saltem, quos frequentissime tractaveram, sed cum operosius id sit, cumque harum, quas jam edo, Lucubrationum fortunam experiri primum libuerit, impræsentiarum supersedendum mihi esse duxi.

A U C T O R I

I N T R A C T A T U M E I U S

D E

F E B R I B U S.

Febriles æstus, victumque ardoribus orbem
Flevit, non tantis per Medicina malis.
Nam post mille artes, Medicæ tentamina curæ,
Ardet adhuc Febris, nec velit arte regi.
Præda sumus flammis; solum speramus ab igne,
Ut restet paucus, quem capit urna, cinis.
Dum quærit Medicus Febris causamque modumque,
Flammarum & tenebras, & sine luce faces;
Quas tractat patitur flammæ, & Febre calescens,
Corruit ipse suis victima rapta focus.
Qui tardos potuit morbos, artusque tremantes
Sistere, Febrili se videt igne rapi.
Sic faber exesos fulsit tibicine muros,
Dum trahit antiquas lenta ruina domos.
Sed si flamma vorax miseras incenderit ades,
Unica flagrantés tunc sepelire salus.
Fit fuga, tectonicas nemo tunc invocât artes,
Cum perit artificis non minus usta domus.
Se tandem Sydenham Febrisque Scholæque furori
Opponens, Morbi quærit, & Artis opem.
Non temere incusat tectæ putredinis ignes;
Nec fictus, Febres qui fovet, humor erit.
Non bilem ille movet, nulla hic pituita: Salutis
Quæ spes, si fallax ardeat intus aqua?
Nec doctas magno rixas ostentat hiatus,
Queis ipsis major Febris ardor inest.
Innocuas placide corpus jubet urere flammæ,
Et justo rapidos temperat igne focos.

Quid Febrim extinguat, varius quid postulat usus,
Solari egrotos qua potes arte, docet.
Hactenus ipsa suum timuit Natura calorem,
Dum sæpe incerto, quo calet, igne perit:
Dum reparat tacitos male provida sanguinis ignes,
Prælusit busto, fit calor iste rogus.
Jam secura suas foveant præcordia flammæ,
Quem natura negat, dat Medicina modum.
Nec solum faciles compefcit sanguinis æstus,
Dum dubia est inter spemque metumque salus;
Sed fatale malum domuit, quodque astra malignum
Credimus, iratam vel genuisse Stygem.
Extorsit Lachesi cultros, Pestique venenum
Abstulit, & tantos non sinit esse metus.
Quis tandem arte nova domitam mitescere Pestem
Credat, & antiquas ponere posse minas?
Post tot mille neces, cumulataque funera busto,
Victa iacet parvo vulnere dira Lues.
Ætheriæ quanquam spargunt contagia flammæ,
Quicquid inest istis ignibus, ignis erit.
Delapsæ cælo flammæ licet acrius urant,
Has gelida extinguere non nisi morte putas?
Tu meliora paras victrix Medicina, tuusque,
Pestis quæ superat cuncta, triumphus erit.
Vive liber, victis Febrilibus ignibus; unus
Te simul & mundum qui manet, ignis erit.

J. LOCK. A. M. EX AEDÆ
Christi Oxon.

N O I
R I F O R M A T O R I
dello Studio di Padova

C Oncediamo Licenza a *Giambattista Remondini* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato *Thomæ Sydenham Opera Medica* : osservando gli ordini soliti in materia di Stampe , e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia , e di Padova .

Dat. li 27. Novembre 1761.

ξ *Marco Foscarini Cav. Proc. Rif.*

ξ *Polo Renier Rif.*

ξ

Registrato in Libro a Carte 106. al Num. 410.

Giacomo Zuccato Segretario .

SERIES TRACULUM ET CAPITULUM.

OBSERVATIONES Medicæ circa Morborum
Acutorum Historiam & Curationem. Pag. 1.

SECTIO PRIMA.

- CAPUT I. **D**E Morbis acutis in genere. P. 1.
II. De Morbis Epidemicis. ib.
III. Constitutio Epidemica annorum 1661. 62.
63. 64. Londini. 3
IV. Febris continua hujus Constitutionis. ib.
V. Febres intermittentes. 7

SECTIO SECUNDA.

- Cap. I. Constitutio Epidemica annorum 1665.
& 1666. Londini. 11
II. Febris pestilentialis & pestis. ibid.

SECTIO TERTIA.

- CAP. I. Constitutio Epidemica annorum 1667.
68. partim etiam 69. Londini. 15
II. Variolæ regulares. ib.
III. Febris continua hujus Constitutionis. 19

SECTIO QUARTA.

- CAP. I. Constitutio Epidemica partis anni 1669.
atque integrorum 70. 71. 72. Londini. 21
II. Cholera Morbus. ibid.
III. Dysenteria. 22
IV. Febris continua hujus Constit. 23
V. Morbilli. 24
VI. Variolæ anomalæ hujus Constitut. 25
VII. Colica biliosa. 26

SECTIO QUINTA.

- CAP. I. Constitut. Epidem. partis anni 1673.
atque integrorum 1674. & 75. 28
II. Febris continua hujus Constitut. ibid.
III. Morbilli. 30
IV. Variolæ Anomalæ hujus Constitut. ibid.
V. Tusses Epidemicæ cum pleuritide & pe-
ripneumonia supervenientibus. 31
VI. Anacephalæosis. 33

SECTIO SEXTA.

- CAP. I. Febres intercurrentes. 33
II. Febris Scarlatina. 34
III. Pleuritis. ibid.
IV. Peripneumonia notha. 35
V. Rheumatismus. 36
VI. Febris Erysipelatosa. 37
VII. Angina. ib.
THOMÆ SYDENHAM Epistola Responso-
ria de Morbis Epidemicis ab anno 1675.
ad annum 1680. ad Robertum Brady
M. D. 39
Bernardini Ramazzini, Dissertationes tres de
Constitutionibus annor. 1690. 1691. 1692. 1693.
1694. in Mutinensi Civitate & illius Ditione.
44. 49. 54

- Lucæ Schroeckii, *Historia Constitutionis Epide-
micæ Augustanæ*, anni 1695. 59
Michaelis Bernardi Valentini, *Constitutio E-
pidemica Hassiaca*, anni 1693. & 1694. 60
Joannis Jacobi Harderi, *Constitutio Epide-
mica Basileensis*, anni 1695. ibid.
Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitutio Epide-
mica Berolinensis*, anni 1695. ibid.
Michaelis Bernardi Valentini, *Constitutio E-
pidemica Hassiaca*, anni 1695. 62
Lucæ Schroeckii, *Constitutio Epidemica Au-
gustana*, anni 1696. ibid.
Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitutio Epide-
mica Berolinensis*, anni 1696. 63
Conradi Bertholdi Behrens, *Constitutio Epi-
demica Hildesienfis*, anni 1695. & 1696. ib.
Lucæ Schroeckii, *Constitut. Epidemica Augu-
stana*, anni 1699. & 1700. 65
Gustavi Casimiri Garhliep, *Constitut. Epidem.
Berolinensis*, anni 1699. 66
Joh. Jac. Harderi, *Constitutio Epidemica Ba-
sileensis*, anni 1699. 67
Rudolphi Jacobi Camerarii, *Constit. Epid.
Tubingensis*, anni 1699. & 1700. ib.
Ambrosii Stegmanni, *Constit. Epid. Mansfel-
diaca*, anni 1697. & 1698. 68
Gustavi Casimiri Garhliep, *Constit. Epid. Be-
rolinensis*, anni 1700. ibid.
Constit. Epidemica Uratislavienfis, annorum
1699. 1700. & 1701. 70. 72. 73
Constit. Epidem. Berolinensis, anni 1702. 75
Lucæ Schroeckii, *Constit. Epidem. Augustana*,
annorum 1701. 1702. 1703. 1704. & 1705.
ibid.
THOMÆ SYDENHAM, *Epistola Respon-
soria de Luis Venereæ Historia & Curatione
ad Henricum Paman M. D.* 77
Gualteri Harris, *de Lue Venerea, ejusque o-
rigine, natura & curatione, Dissertatio.* 81
THOMÆ SYDENHAM, *Dissertatio Epi-
stolaris ad Guilielmum Cole M. D. De
Observationibus nuperis circa Curationem Va-
riolarum Confluentium; necnon de affectione
Hysterica.* 83
Bernardini Ramazzini, *de Contagiosa Epide-
mia, quæ in Patavino Agro, & tota fere
Veneta Ditione in Bovæ irrepfit, Disserta-
tio.* 95
THOMÆ SYDENHAM *Tractatus de Po-
dagra & Hydrope.* 99
THOMÆ SYDENHAM *Schedula Monito-
ria de Novæ febris Ingressu.* 111. 112
Davidis Hamilton, *Tractatus de Febre Mi-
liari, seu Vesiculari: accessit Febris miliaris
Historiarum fasciculus.* 116
THOMÆ SYDENHAM, *De Febre Putrida
Variolis Confluentibus superveniente.* 130
Ejusdem, *de mictu sanguineo a Calculo Reni-
bus impacto.* 131
Caroli Drelincurtii, *de Calculo Renum & Ve-
sicæ, Dissertatio.* 132
Martini Lister, *Dissertatio Medicinalis de Cal-
culo Humano.* 135
THOMÆ SYDENHAM, *Processus integri in
Mor-*

Morbi phica tulo de Phthi	re om ptoma tulo de Phthi	n gra fracta o . 141.	Ejusdem, Schediasma ad Historiam Epidemi- cam, anni 1702. 174
151			Joh. Guilielmus Bayerus, De Frigore Hyemali, anni 1709. 175
Caroli Leigh, Phthysiologia Lancastriensis. 153			Bernardini Ramazzini, De Frigore Hyemali, anni 1709. 176
THOMÆ SYDENHAM, de Podagra. 157			Joh. Adami Genselii, Constit. Epid. Inferioris Hungariae, ann. 1711. 1712. & 1713. 177, 178
Lucæ Schroeckii, Constit. Epidem. Augustana, anni 1697. 162			Lucæ Schroeckii, Constit. Epidem. Augustana, anni 1711. 1712. 1713. 1715. 1716. & 1717. 180. 264. 265
Ejusdem, Constitutio Epidemica Augustana, anni 1698. 159			Marci Gerbezii, Constit. Epidemica Labacensis, anni 1712. ibid.
Joh. Jac. Harderi, Constitutio Epidemica Basileensis, anni 1698. 161			Ejusdem Const. Epidem. Labacensis, anni 1713. 183
Gustavi Casimiri Garhliep, Constitutio Epidemica Berolinensis, anni 1697. ib.			Ejusdem Constitutio Epidemica Labacensis, anni 1714. 184
Ejusdem, Constitutio Epidemica Berolinensis anni 1698. ib.			Ejusdem Constitutio Epidemica Labacensis, anni 1715. ib.
Sylvestri Samuelis Anhornii, Con. Epidemica Sangallensis, anni 1697. ib.			Ejusdem Constitutio Epidemica Labacensis, anni 1716. 185
Caroli Raygeri, Constit. Epidem. Posoniensis, annorum 1695. 1696. & 1697. ib.			Ejusdem Constitutio Epidemica Labacensis, anni 1717. ib.
Lucæ Schroeckii, Constit. Epidem. Augustana, anni 1701. & sequentium. 164			Josephi Lanzoni, Constit. Epidem. Ferrariensis, anni 1715. 186
Joannis Jacobi Harderi, Constitutio Epidemica Basileensis, anni 1700. & 1701. 166			Ejusdem Constitutio Epidemica Ferrariensis anni 1716. & 1717. ibid.
Gustavi Casimiri Garhliep, Constit. Epid. Berolinensis, anni 1701. ibid.			Guilielmi Musgrave, De Arthritide Symptomata, Dissertatio 227
Ejusdem, Const. Epidemica Berolinensis, anni 1703. 167			Ejusdem, De Arthritide Anomala, sive interna, Dissertatio. 246
Ejusdem, Constit. Epidemica Berolinensis, anni 1704. 168			Joan. Baptistæ Mazini Mechanica Morborum. 296
Guntheri Christophori Schelhameri, Constit. Epidem. Holsatica, anni 1706. 169			Ejusdem, Mechanica Medicamentorum, 334
Marci Gerbezii, Constit. Epidem. Labacensis, anni 1709. 170			Antonii Cælestini Cocchii Epistolæ Physico-Medicæ. 351
Ejusdem, Constitutio Epidemica Labacensis, anni 1710. 171			Bartholomæi Boschetti, De Salivatione Mercuriali, Dissertatio. 352
Joh. Georgii Hoyer, Constit. Epidem. Mulhusina, anni 1700. ib.			Novum Supplementum plures Clarissimorum virorum Tractatus ex nupera Genevensi Editione excerptos complectens. pag. 389
Rodulphi Jacobi Camerarii, Constit. Epidem. Tubingensis, anni 1701. 173			





T H O M Æ
S Y D E N H A M
O B S E R V A T I O N E S M E D I C Æ
C I R C A
M O R B O R U M A C U T O R U M
Historiam & Curationem.

S E C T I O P R I M A.

C A P U T I.

De Morbis Acutis in genere.



DICTAT ratio, si quid ego hic judico, Morbum, quantumlibet ejus causæ humano corpori adversentur; nihil esse aliud quam naturæ conamen, materiæ morbificæ exterminationem, in ægri salutem omni ope molientis. Cum enim hominum genus, ita volente supremo rerum omnium arbitro ac moderatore Deo, variis impressionibus, forinsecus advenientibus, excipiendis aptum natum sit, fieri non potest, quin idem variis etiam malis fuerit obnoxium: quæ quidem partim ab istis aeris particulis nascuntur, quæ cum corporis humoribus male convenientes in idem se insinuaverint; rudo sanguini permixtæ, corpus omne morbifico afflant contagio; partim a variis fermentationum generibus, vel etiam putrefactionibus humorum, qui in corpore ultra justum tempus ideo sunt commorati, quia scilicet iisdem digerendis primum, dein excernendis, vel ob nimiam eorundem molem vel qualitatem incongruam, suppar idem non fuit. Hisce rerum circumstantiis ita intime essentiali humanæ intertextis complicatisque, ut nemo quisquam se ab aliis insolidum queat liberare, Natura de ejusmodi methodo, ac symptomatum concatenatione sibi prospexit, quibus materiam peccantem atque alienam, quæ totius fabricæ compagem aliter solveret, e suis finibus possit excludere. Quamlibet autem frequentius longe quam fieri cernimus, illum, ad quem remediis hisce ingratis collimat, sanitatis scopum attingeret, nisi ab ignavis a recto, quem tenet, cursu detorqueretur; veruntamen cum sibi relicta vel nimio opere satagendo, vel etiam sibi deficiendo hominem letho dat, ferreæ illi atque insolubili mortalitatis legi obsequitur, cui debemus nos nostraque. Recte enim Boetius, atque ex rerum sensu

Constat æterna positumque lege est,

Constet ut genitum nihil.

Sed ut instantia una alterave jam dictorum veritatem asseramus; Ipsa Pestis, quid obsecro, aliud est, quam symptomatum complicatio, quibus utitur natura ad inspiratas una cum aere particulas *μαρμώδεις*, per emunctoria, apostematum specie, vel aliarum eruptionum opera, excutiendas? Quid Arthritis, nisi naturæ providentia ad depurandum senum sanguinem, atque expurgandum corporis profundum, ut cum Hippocrate loquamur? Potest & idem affirmari de plerisque aliis morbis perfecte formati.

Jam vero nunc hoc munere celerius fungitur natura, nunc vero tardius, pro varia methodo, qua causam morbificam deturbare nititur. Nam cum Febris opem deposcit, qua adjutrice particulas inquinatas a sanguine divellat, divulsasque progressu adhuc ulteriori per sudores, Diarrhœam, eruptiones, aut aliam istiusmodi evacuationem expellat; cumque in sanguinis massa corpore pertenui ac fluido res omnis peragatur, idque motu partium violentiore: necesse omnino est, non solum ut subito vel in salutem ægri vel in mortem determinetur (prout sc. natura vel materiam morbificam critice norit solvere, vel ab eadem oppressa fatiscat) sed etiam ut pejora vehementioraque symptomata se ubique comites adjungant. Atque hujusmodi plane sunt morbi isti, quos Acutos appellamus, qui velociter sc. atque cum impetu & periculo ad statum moventur. Quamvis, si minus accurate, haud tamen minus vere loquamur, isti etiam morbi pro Acutis sint habendi, qui, licet respectu paroxysmorum, si omnes simul sumantur, tardius moveant,

Sydenham Opera Medica.

respectu tamen paroxysmi cujuslibet particularis, cito atque etiam critice ad finem perveniunt; quales sunt febres intermittentes omnes.

Ubi vero continens morbi materia ejus est indolis, ut febrem in partes suas petrahare non valeat ad dictæ materiæ separationem universalem; aut cum hujusmodi materia parti alicui affigitur, quæ eidem explodendæ prorsus est impar, sive ob propriam conformationem (uti se res habet in materia morbifica *Paralyticorum* nervis impacta; in materia item suppurata in cavitate Thoracis *Empyricorum*) vel ob defectum caloris naturalis, & spirituum, (ut cum pituita in pulmone decidit vel senio vel tussi diuturniore labefactatos) vel denique ob continuum materiæ novæ adfluxum, qua sanguis vitiatum & ad ejusdem eliminationem unice dispositus, partem obruit gravatque: In his, inquam, casibus, vel tarde admodum ad coctionem pervenit materia, vel non omnino; ideoque morbi ab hujusmodi materia inconcoctibili provenientes *Chronici*, & nuncupantur & sunt: A duobus his itaque principiis sibi invicem contrariis, de quibus modo egimus, morbi alii *Acuti*, alii vero *Chronici* exurgunt.

Acutos quod spectat, quos impræsentiarum tractare mihi est animus, eorum alii a secreta atque inexplicabili aeris alteratione, hominum corpora inficientis, gignuntur, neque a peculiari sanguinis, & humorum crasi omnino dependent, nisi quatenus occulta aeris influentia dictis corporibus eandem imprefferit. Hi, durante arcana illa aeris constitutione, nec ultra pergunt laceffere, neque alio ullo tempore invadunt. *Epidemici* hi dicti sunt.

Acutorum alii, ab hac vel illa particulari corporum particularium *αισμαλῖα* oriuntur, qui cum a causâ magis generali non producantur, ideo neque plures simul corripunt. Hi insuper acuti quibuslibet annis, & quolibet anni tempore indifferenter invadunt; exceptis tamen iis quæ dicemus, ubi de genere hoc peculiariter agitur. Hos ego acutos *Intercurrentes* five *Sporadicos* appello, quia nullo non tempore contingunt, quo epidemici grassantur. Ab *Epidemicis* primum exordium mihi sumam, generalem eorundem historiam ante omnia proponens.

C A P U T II.

De Morbis Epidemicis.

Nihil quicquam, opinor, animum universæ qua patet Medicinæ pomœria perlustrantem tanta admiratione percelleret, quam discolor illa, & sui plane dissimilis morborum epidemicorum facies, non tam qua varias ejusdem anni tempestates, quam quâ discrepantes diversorum ab invicem annorum *Constitutiones* referunt, ab iisque dependent. Quæ tam aperta prædictorum morborum diversitas tum propriis, ac sibi peculiaribus symptomatibus, tum etiam medendi ratione quam hi ab illis disparem prorsus sibi vindicant, satis illucescit. Ex quibus constat, morbos hosce, ut ut externa quadantenus specie, & symptomatibus aliquot utrisque pariter supervenientibus convenire paulo incautioribus videantur, re tamen ipsa, si bene adverteris animum, alienæ admodum esse indolis, & distare ut *Æra Lupinis*. Haud equidem satis scio, an diligentius examen (quali rite instituendo vix unius hominis brevis ætas par esse videatur) nos edoceret, epidemicorum alios continua quadam serie, seu facto circulo, alios semper excipere; an vero omnes indiscriminatim nulloque servato ordine, pro occulta aeris diathesi, & inexplicabili temporum ratione, mortales incescere. Hoc saltem pro comperto habeo ex multiplici accuratissimarum observationum fide, prædictas morborum species, præsertim febres continuas ita toto, quod ajunt, celo dif-

genuinam
ubi vindicat
vente, ut
respectu ac
habito, d
extin

rursum hæreo, qua mi
proinde nisi ingenti adhibita autem
vis, vix ac ne vix quidem possum efficere ne unus aut alter eorum,
qui se primi meæ curæ commiserint, vita periclitetur, donec in-
vestigato jugiter tandemque perspecto morbi genio, ad eundem per-
dandum recto pede, & intrepidus denuo procedant.

Quamvis autem diversas diversorum annorum habitudines, quoad
manifestas aeris qualitates, maxima qua potui diligentia notaverim,
ut vel exinde causas tantæ epidemicorum vicissitudinis expiscarer,
me tamen ne hilum quidem hæcenus promoveri sentio; quippe qui ani-
madverto annos quoad manifestam aeris temperiem sibi plane con-
sentientes, dispari admodum morborum agmine infestari, & vice
versa. Ita enim se res habet. Variæ sunt nempe annorum *Constitu-
tiones*, quæ neque calori, neque frigori, non sicco humidoque ortum suum
debent, sed ab occulta potius, & inexplicabili quadam alteratione
in ipsis terræ visceribus pendent, unde aer ejusmodi effluviis contamina-
tur, quæ humana corpora huic aut illi morbo addicunt determinant-
que, stante scilicet præfaræ constitutionis prædominio, quæ exacto
demum aliquot annorum curriculo faceffit, atque alteri locum ce-
dit. Unaquæque harum constitutionum generalium propria, ac pe-
culiari sibi febris specie funestatur, quæ extra illam nusquam com-
paret, cujusmodi febres idcirco *Stationariæ* nobis audiunt.

Ad hæc sunt, & particulares quædam ejusdem anni, ut ita dicam,
crases, in quibus licet secundum manifestas aeris qualitates, ejus-
modi febres quæ generalioris anni constitutionem sequuntur magis
minusve epidemicæ grassentur, vel serius ocysive ingruant; præcæ-
teris tamen ejusmodi febres, quæ omnibus in universum annis compe-
tunt (quas ideo *Intercurrentes* voco) ab hoc, illove manifesto aeris
temperamento ortum ducunt; verbi gratia, *Pleuritis*, *Angina*, &
reliquæ ejusdem farinæ, quæ a subito calore, intensius ac diuturnum
frigus statim excipiente, plerumque invadunt. Potest itaque fieri,
ut sensibiles aeris qualitates ad illas quidem febres producendas fa-
ciant, quæ in qualibet constitutione se exerunt; non vero ad istas
alias quæ certæ alicui constitutioni quasi propriæ, ac peculiare exi-
stunt: Fatendum tamen est, prædictas aeris qualitates corpora no-
stra ad hujus illiusve morbi epidemici generationem magis minusve
disponere; quod, & de quocunque errore circa *sex res non naturales*
dictum volo.

Animadvertendum autem est, epidemicorum alios in hoc aut il-
lo anno regulariter, & eodem semper modo se habere, iisdem pla-
ne phænomenis, & conformi symptomatum agmine in plerisque fe-
bre omnibus quos adoriuntur, stipatos, atque eadem prorsus via sibi
fugam, & exitum parantes. Ex his itaque tanquam in suo genere
perfectissimis, vera, & certa morborum epidemicorum historia ediscen-
da est atque tradenda.

Sunt vero alii aliorum annorum morbi, qui licet epidemicorum
insigniantur nomine, enormes tamen sunt, & perquam *anomali*,
utpote qui nulli se typo patiuntur astringi; & revera mali sunt mor-
bis, tum quoad incertam symptomatum varietatem certissimamque
dissimilitudinem; tum quoad methodum, qua se ipsi expediunt, &
amoliuntur. Hæc tanta illorum disparitas exinde oritur, quod sci-
licet quælibet constitutio morbos parit, a morbis ejusdem generis,
qui alio tempore grassabantur, multum abudentes, quod non tan-
tum in febribus locum habet, sed in plerisque aliis epidemicis.

Neque hic finitur *Orestes*: restat enim & aliud paulo subtilioris
Scæviæ, luxuriantis, si fas est dicere, naturæ lusus; quod nempe
idem morbus in ipsissima anni constitutione varia sæpe, & dissimili
se facie ostendat, quod ad tempora attinet principii, status, & de-
clinationis; quod quidem tanti potest esse momenti, ut pro ejus
arbitrio curativæ indicationes ponendæ, sumendæve fuerint.

Porro observandum est, epidemicos quosunque in duo omnino
ordines dispesci: *Vernos* dico, & *Autumnales*: & quamvis fieri po-
test, ut alia qualibet anni tempestate subnascantur, ad illam tamen
sunt relegandi, Ver Autumnusve fuerit, quam proxime contingunt:
Accidit enim nonnunquam, aeris temperiem cum epidemicorum a-
liquo in tantum conspirare, ut, eo fautore, ante tempus sibi de-
bitum miseros invadat, & e contra est, ubi tam parum illis in-
ter se convenit, ut corpus prædispositum non nisi aliquandiu post
aggrediatur. Cum itaque *Ver* dico, val *Autumnus*, non de ipso
statim *Æquinoctio*, sive *Verno* sive *Autumnali*, ad amissum lo-
quor.

Epidemicorum, qui *Verno* tempore grassantur, alii mature ad-
modum se ingerunt, mense scilicet *Januario*, & exinde pedetentim
increbrescentes circa *Æquinoctium Vernale* ad statum perveniunt, a
quo sensim imminuti circa *Solstitium Æstivum* evanescent, nisi quod
paucissimi postea forsitan hunc illumve petant. In horum numero
sunt *Morbilli*, ut & *Febres Tertianæ Vernales*, quæ, licet serius ali-
quanto emergant, *Februario* nempe, tamen appetente *Æstivo Sol-
stitio* pariter se subducunt. At vero alii *Vere* orti, & de die in diem
invalescentes non nisi sub *Æquinoctium Autumnale* statum indipi-
scuntur, quo præterlapso paulatim cedentes, tandem adventante bru-
mali frigore vertuntur in fugam, hujusmodi sunt *Pestis* ipsa, &
Variola, istis annis, quibus eorum utervis aliorum morborum præ-
dominio fuerit potitus.

Cholera Morbus ex epidemicorum autumnalium familia mense *Au-
gusto* exorsus intra angustos unius mensis cancellos conclusus percur-
rit sua tempora. Sunt tamen alii qui eadem tempestate prognati
usque ad hyemem excurrunt, v.g. *Dysenteria*, *Febres Quartanæ*, &
Tertianæ Autumnales. Hi omnes, ut et eorum aliquos quos semel in-
vaserint longiori, vel breviori tempore affligant, plerumque tamen
intra duorum mensium spatium, & nomen, & epidemicorum na-
turam prorsus amittunt.

Febres autem speciatim quod attinet, observandum est, maxi-
mam earum partem, quæ *Continuæ* sunt, nulla hucusque nomina,
in quantum a constitutionis generalis influenza pendent, obtinuisse,
appellationes autem quibus dignoscuntur ab insigni aliqua alteratione
sanguini impressa, vel evidentiori symptomate mutuari. Hac ratione

dem
emel
pecies
s (fa-
ngam,
quaue
anceps
m, ac

Putridæ dicuntur, *Malignæ*, *Petechiales*, &c. Quandoquidem vero
singula ferme constitutio præter has quas parturit febres, ad alium
morbum aliquem magis Epidemicum eodem tempore propagandum
proclivis est celebrioris nominis, cujusmodi sunt *Pestis*, *Variola*, *Dy-
senteria*, &c. non satis video, cur istiusmodi febres non potius fortiren-
tur nomina a constitutione, quatenus horum morborum alterutri pro-
ducendo favet, eodem illo tempore quo comparebant, quam a quali-
bet sanguinis alteratione, vel symptomate particulari, quæ diversæ
speciei febribus pari jure possunt competere. *Intermittentes* vero no-
mina sibi desumunt ab intervallo Paroxysmi interjecto, atque hoc qui-
dem caractere satis discriminantur, si variarum etiam anni tempesta-
tum quibus contingunt, Veris sc. & Autumni, habeatur ratio. Licet
nonnunquam earum aliqua de intermittentium natura revera partici-
pent, nullo caractere admodum visibili easdem prodeunte. Ut cum
præmaturæ, *Julio* mense, v. g. intermittentes Autumnales ingrediun-
tur atque increbrescent, non statim genuinum typum induunt, (quod
intermittentibus Vernis quidem solemne est) sed continuas febres ita
per omnia imitantur, ut nisi castigatissimo utrasque examine tru-
tinaveris, ab invicem discriminari non possint, ac retuso paulatim
constitutionis impetu, & frænata vi, jam in typum regularem mi-
grant, atque exeunte Autumnno, larva abjecta, intermittentes se ef-
fe, quales ab initio reapse fuerunt, palam fatentur, sive Quartanæ
illæ fuerint, sive Tertianæ, quod si non diligenter animadverteri-
mus, cum magno ægrorum nostrorum malo medicantes hallucinabi-
mus, dum hujusmodi febres, quæ ex intermittentium numero sunt,
pro continuis veris & genuinis habeantur.

Porro, quod sedulo advertendum, cum plures aliquot horum mor-
borum eundem fatigent annum, unus eorum aliquis reliquorum prædo-
minio potitur, cæteris in ejus quasi ditionem redactis, & parcius id
temporis sævientibus, ita ut illo augefcente imminuantur hi, eodem-
que rursus imminuto, mox recrudescant. Atque ita vicissim morta-
les laceffunt, prout anni genius & sensibilis aeris temperies huic aut
illi magis suffragantur. Qui vero morbus circa *Æquinoctium Autu-
mnale* maximopere furit & cumulatissimam edit stragem, totius
anni constitutioni nomen impertit suum; quicquid enim fuerit mor-
borum, qui ea tempestate pro cæteris invaluerint, principatum omnium
qui isto anno invadunt, obtinuisse facile deprehendetur, cujus ingenio
Epidemici, quotquot sunt, *σύννοτοι* se accommodant, in quantum
eorum fert natura; v. g. cum *Variola* eo tempore latissime depopulan-
tur, febris toto anno sparsim oberrans ejusdem plane inflammationis est
particeps, quæ *Variolas* parit. Uterque nempe morbus ad eandem fe-
re normam adoritur, maximeque inter maxima propria utriusque
symptomata intercedit cognatio, (excepta Variolarum eruptione,
& reliquis, quæ ab illa pendent) ut ex ingenti illo tum ad spon-
taneos sudores, tum ad salivam excernendam propensione, in qua
utriusque convenit, abunde constat. Pariter, cum *Dysenteria* dicto
tempore præcipue fuerint grassatæ, febris, quæ eo anno infestat, ea-
rundem indolem non leviter æmulatur, nisi quod illæ causam morbifi-
cam per sedes eliminant, & pauca alia exinde nascantur symptomata,
quod tum a consimili utriusque morbi insultu, tum etiam quod utro-
que malo correpti Aphthis similibusque invicem symptomatibus admo-
dum sint obnoxii, satis evincitur. Et sane *Dysenteria*, de qua agi-
tur, ipsissima illa febris est; hoc tantum discrimine, quod introver-
tatur & in intestina se exonerans per eandem viam sibi faciat. Notan-
dum autem est, Epidemicorum illum principem, qui sub *Æquinoctio*
Autumnali, ceu rupto aggere torrens, omnia straverat, ingruente
hyemis frigore intra suum se alveum condere: cum ex adverso Epidemi-
ci inferioris ordinis, qui sub eo merentur, tunc temporis præsertim
ingravescant & rerum potiantur, donec dictus anni princeps eorum
vires denuo frangat & deleat nomen.

Postremo observandum est, quoties constitutio aliqua varias Epi-
demicorum species parit, singulas has species genere ab illis differ-
re, quæ cum idem plane nomen sortiantur, alia tamen constitutione
generentur; quotcumque sint autem species illæ peculiare, quæ in
una eademque constitutione invadunt, in communi una atque ge-
nerali causa singularum productrice, omnes conveniunt, hac scilicet
aut alia aeris diathesi peculiari; & ex consequenti, quantocumque
ab invicem, quoad typum & formam specificam, intervallo distent.
Constitutio tamen omnibus communis subjectam singularum materiam
ad ejusmodi conditionem atque statum edingit formatque, ut præ-
cipua symptomata, quæ ad particularem evacuationis modum nihil
attinet, omnibus paria sint; singulis etiam in hoc conspirantibus,
ut eodem pariter omnes tempore & intendant sævitiam & remit-
tant. Notandum est insuper, quibus annis variæ illarum species gras-
santur uno eodemque tempore, eas omnes modo quo primum ag-
grediuntur, atque invasionis symptomatis consentire.

Hinc itaque cernere est, variam admodum & accuratam naturæ
methodum, quam ad morborum generationem adhibet, quam nemo
hominum, arbitror, hæcenus pro rei dignitate satis observando est
assecutus. A qui ex pauculis hisce omnino conficitur (cum speci-
ficæ popularium morborum differentia, nominatim febrium, arcanæ
annorum constitutioni innitantur) incassum defudare illos, quotquot
diversarum febrium rationes a causa morbifica in humano corpore
aggesta deducunt; nam liquido patet, quemlibet, pancreatice licet
valentem, si certa quædam hujus nostræ regionis loca adeat, febre
ibidem grassante intra dies aliquot laboraturum: vix autem credi-
bile sit, manifestam aliquam *mutationem* ab aere præfati viri humo-
ribus tam brevi impressum iri. Neque minus difficile est, generales
regulas febribus his debellandis accommodare, & certos aliquos li-
mites figere, quos ultra citraque progredi, aut in iisdem consistere,
non liceat. In hac itaque tam spissa rerum caligine, nihil mihi
prius est, quam quando novæ febres grassari incipiunt, cunctari pau-
lisper, & ad magna præsertim remedia non nisi suspensum pede ac tardius
procedere; diligenter interim illarum ingenium atque morem observa-
re; quibus itidem præsidiorum generibus ægri juventur vel lædantur,
ut quamprimum his repudiatis, illis utamur.

Verbo dicam, Epidemicorum species omnes juxta Phænomenon
suorum varietatem in classes redigere, ac characteres cujusque idio-
pathicos enucleare, nec non propriam medendi rationem unicuique
sigillatim accommodare, ut res est multi otii ac summe ardua, ita
etiam cum nullo certo (aut saltem nondum explorato) annorum
ordine emergant, ad justum de iisdem observationum apparatus
congerendum fortasse unius Medici ætas non suffecerit. At vero hic
labor, utut sit improbus, prius est exantlandus, quam nos aliquid
memo-

memoratu dignum in extricanda tam multifaria horum m-
serie præstitisse jure possumus gloriari.

At vero quibus demum modis, rationem reddemus dis-
specierum *Epidemicorum*, qui non tantum, quatenus salte-
quet, fortuito incurrant, sed etiam qui uno anno aut certa aliqua
annorum serie ejusdem sunt generis; anno alio specie ab aliis aliis di-
stinguuntur? Nulla hic mihi unquam methodus æque commoda est
visa atque illa, quæ per sufficientem annorum numerum protensa,
eodem illos ordine describeret, quo se invicem excipiebant & inse-
quebantur. Quod ut jam pro meo modulo efficiam, historiam &
curationes *Epidemicorum*, qui ab anno 1661. ad annum usque 1676.
(per 15. videlicet annorum spatium) depopulabantur, ex accuratis-
simarum, quas mihi facere licuit, observationum fide orbi erudito
tradam. Cum mihi impossibile plane videatur, effectum id dare,
vel causas eorundem exortus assignando a manifestis aeris qualitati-
bus desumptas, vel multo etiam minus a particulari aliqua dyscra-
sia in sanguine atque humoribus, nisi in quantum secretæ aeris in-
fluente illa deberetur. Quin & magis adhuc, si fas est dicere, im-
possibile fuerit variorum epidemicorum species tradere, qui a speci-
ficis aeris alterationibus oriuntur, quantumvis in proclivi illud esse
videatur, istis videlicet qui febrium nomina attexere norint notio-
nibus, in speculatione istarum alterationum, quæ in sanguine huma-
no, atque ejus humoribus per hanc illamve principiorum degenera-
tionem fieri possunt, male fundatis. Quo quidem pacto, cum non
naturam sequamur, optimam ducenti, sed conjectandi libidini indul-
geamus, tot nobis erunt morborum species, quot comminisci pla-
cuerit: Eam nobis interim arrogamus licentiam, quam nemo facile
Botanico concesserit, a quo in describenda plantarum historia sen-
suum requiramus testimonium, ac fidem, non rationis commenta-
tionem, quantumlibet ista polleat, atque aliis longe antecellat.

Haud equidem tantum mihi sumo, ut me in his, quæ jam tra-
do, omnem absolvisse numerum existimem, forte ne in recensenda
quidem universa epidemicorum familia; multo minus in me recipio, ut
qui morbi elapsis, de quibus nobis sermo est, annis, ordine infra di-
cendo se mutuo exceperunt, venturis sæculis eandem perpetuo ser-
vaverint. Unum hoc molior, ut quæ pacto hæc se res habuit nup-
per, astipulante paucorum aliquot eorum observatione, enarrem,
quod ad has scilicet regiones spectat, & hanc in qua degimus ur-
bem, ut meum, quale quale sit, symbolum conferam ad opus in-
choandum, quod, si quid ego judicando valeo, in maximum huma-
ni generis emolumentum cedet, ubi tandem a posteris, quibus inte-
grum epidemicorum curriculum venientibus annis sibi invicem suc-
cedentibus intueri dabitur, ad umbilicum perducetur.

C A P U T III.

Constitutio Epidemica Annorum 1661. 62. 63. 64. Londini.

Anno 1661. febres Autumnales intermittentes, quæ jam ab ali-
quot retro annis obtinuerunt, de novo vires redintegrabant
(*Tertianæ* præsertim *mali moris*) sub initio Julii, & quotidie incre-
brescentes, mense Augusto quam immanissime debacchabantur, in-
que multis locis, correptis fere integris familiis, maximam homi-
num stragem edebant; dein vero sensim decrebrescentes, superveniente
hyemis frigore extinctæ sunt, per paucos Octobris mense aggressæ.
Quæ dictæ *Tertianæ* famulabantur symptomata, illa ab intermit-
tentium *Tertianarum* aliorum annorum symptomatibus, his præsertim
discriminabantur. *Ægri* paroxysmus atrocior, lingua magis nigra
siccaque, extra paroxysmum *apoplexia* obscurior virium, & appetitus
prostratio major, major item ad paroxysmum ingeminandum pro-
clivitas, omnia summatim accidentia immaniora, ipseque morbus
quam pro more febrium intermittentium funestior. Si quando æta-
te provectiores, aut etiam Cachecticos invasisset, quibus pariter ve-
na secta, aut aliæ quavis evacuationes minuisset vires, nunc ad
duos, nunc ad tres menses perdurabat. *Quartanæ*, rariores licet, fe-
bres jam descriptas comitabantur, utrisque vero primum brumæ im-
petum non sustinentibus (neminem enim, ante intactum, ferie-
bant) subsecuta est *Febris continua*, ab intermittentium Autumnalium
genio in hoc tantum abhorrens, quod hæc stasis solum tempori-
bus, illa continenter urgebat. Etenim eodem ferme modo ægrotos
adoriebantur; qui utrisque pariter vehementer laborabant, vomitu-
riebant, cum partium externarum siccitate, siti, inæque nigredine;
& sudoribus sub morbi fine *Stomatia* morbosica in utrisque prom-
ptissime exterminabatur. Quæ si vel hinc liquebat, febrem hanc
ad Autumnalium intermittentium classem attinere, quod raro admo-
dum surgente anno compareret. Dicta itaque febris continua inter-
mittentium quasi compendium quoddam, & e contra singulæ earum
paroxysmi compendium hujusce mihi videbantur; atque adeo disci-
men in hoc maxime versari, quod *Continuæ* conceptam semel ef-
fervescentiam *σωεχῶς* eodemque semper tenore perficerent; *Inter-
mittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defun-
gerentur. Quanto autem jam tempore prædicta febris continua in-
valuerit dicendo non sum, cum mihi hætenus satis fuerit ad ge-
neralia febrium symptomata attendere; utpote qui nondum, vel jux-
ta varias annorum crases, aut ejusdem anni varia tempora easdem
distingui posse animadverteram. Hoc saltem scio, quod unicam fuisse
Continuæ febri speciem usque ad annum 1665. ac *Intermittentes Au-
tumnales*, quæ ad illum usque annum frequentes incurfabant, jam
deinceps rarissimas occurrisse.

Sed ut ad rem redeamus: *Febris* illa *Tertianæ*, quæ dicto anno
omnia longe lateque fuerat prædata, eodem elapso intra angustiores
limites se continuit: insequentibus vero Autumnis *Quartanæ* *Epi-
demicis* reliquis prædominabantur, stante hac aeris constitutione.
Quartanis semper post Autumnum vela contrahentibus, *Febris con-
tinua* (quæ per hoc omne tempus, parcius licet se immiscuerat) jam
inclementius debacchabatur ad usque Ver, quo tempore *Febres*
intermittentes Vernales succedebant, quibus ad calendas Maji pariter
fatiscantibus, *Variolæ* hinc & inde sparsim se ostendebant, quæ de-
nuo ad conspectum *Epidemicorum Autumnalium* (febrem continuam
volo, & quartanas) terga dabant victoribus. Hoc ordine morbi e-
pidemici integram hanc aeris constitutionem pervadebant, & se mu-
tuo insequiebantur. De his nunc sermo erit in specie, & nominatim
tum de febre hac, tum etiam de intermittentibus, sive Ver, sive
Autumnum attinerent, quibus hæc constitutio pro cæteris infamabatur.

Telam ordiar ab hac *Febre Continua*, quæ aliarum, quotquot sunt,
omnium præcipua, & coryphæa mihi videtur, eo quod natura, in
Sydenham Opera Medica.

intermitte-
mu. s. sæpius recurrant,
quæ a cæteris epidemicos faciunt, necessario sequitur,
ut quæ illas comitatur febris continua frequentius accurreret.

At præter symptomata, quæ cæteras stipabant, dicta febris se-
quentibus insuper urgebatur: *Æger* plerumque animam tantum non
agebat, vomituriebat, lingua sicca, & nigra, ingens ac subitanea
virium consternatio, & partium externarum siccitas, Urina ubique,
vel crassa, vel tenuis, utraque ex æquo cruditatis indicium. In
morbi declinatione, diarrhœa, nisi forte Medicus principio obsti-
tisset, superjungebat, unde morbus pervicacior redditus diutius af-
fligebat. Sed suoapte ingenio ac propria indole vix ultra diem 14.
vel 21. perdurabat, quo primum tempore, oborto sudore, vel potius
leni madore, morbus solvebatur. Neque prius urinæ coctionis signa
prodebant, quod jam ut plurimum evenibate. Quin, & alia supervenie-
bant symptomata, quoties hic morbus minus perite tractabatur. At ve-
ro tum hæc, etiam tum omnis morbi genius clarius elucescens, ex peculiari
methodo, quam olim huic febri accommodaveram, quam itaque
huc transferam, (saltem quod ad rem nostram apprime faciat) prout
jamdudum typis evulgaveram. Quo quidem tempore nondum mihi
innotuerat, aliam aliquam febri speciem in rerum natura inveniri.

C A P U T IV.

Febris Continua Annorum 1661. 62. 63. 64.

I. Primo quidem adverte inordinatam illam massæ sanguineæ com-
motionem febri hujus seu causam, seu comitem, a natura
concitari, vel ut heterogenea quædam materia in eadem conclusa,
ac ipsi inimica secernatur: vel ut sanguis in novam aliquam dia-
thesin immutetur.

Atque in hoc negotio magis aridet latius, & generalius *Com-
motionis* vocabulum, quam vel *Fermentationis*, vel *Ebullitionis*; quip-
pe quod inanis *λογισμαχίας* occasionem præscindat, quam fortassis
istiusmodi voces (quæ etiam si explicationem non incommodam ad-
mittant, tamen minus propriæ, ac non nihil duriores nonnullis vi-
dentur) haud satis caverent. Quamvis enim cruoris in febribus *com-
motio*, liquorum vegetabilium alias *fermentationem*, alias etiam *e-
bullitionem* æmuletur, non desunt nihilominus, qui eandem non uno
modo ab utraque plurimum differre arbitrantur. De *Fermentatione*
unum alterumve ab illis sumatur exemplum. Primo, licet fermenta-
tescentia liquida vinosam quandam indolem ita nancisci soleant, ut
spiritum ardentem ex eisdem distillatio eliciat, atque in acetum fa-
cile desciscant, quod ipsum insigni acore pollet, & spiritum acidum
distillando exhibet: neutram tamen ejusmodi mutationem in san-
guine hætenus observatam fuisse contendunt.

Deinde adverti voluit, quod cum in liquoribus vinosis *fermenta-
tio* & *depuratio* eodem tempore peragantur, & quasi paribus passibus
procedant, *depuratio* tamen sanguinis in febribus ejusdem *æstuat-
ionem* non comitetur, sed consequatur, id quod in paroxysmo febrili
per sudores soluto, vel oculorum testimonio, patere existimant.

Quod autem ad *Ebullitionem* attinet, difficilior illis hæc videtur
analogia, quæque experientiam habet summo opere refragantem, in
multis nimirum casibus, quoties non adeo effrænis est cruentis orga-
mus, ut *ebullitionis* appellationem mereri possit. Verum ut sit (ne-
que enim hisce controversiis me ullatenus immisceri patiar) quan-
doquidem *fermentationis*, & *ebullitionis* vocabula apud recentiores Me-
dicos plurimum invaluerunt, ego quoque eadem subinde usurpare
non dubitaverim, dummodo ex jam dictis satis constet voces istas
in hoc Tractatu clariori solummodo dicendorum explicationi inservire.

Porro febrilem hanc sanguinis commotionem ob materiæ cujusdam
heterogeneæ, ipsique naturæ adversantis, secretionem ab eadem concitari,
omne genus febrium, quæ eruptionibus stipantur, testatum
facit, utpote in quibus istius ebullitionis sanguinis beneficio, fit ex-
cretio ad cutim excrementi in eodem latitantis, & prava qualitate affecti.

Quinimo nec, mea quidem sententia, minus liquet, febrilem san-
guinis commotionem sæpe (ne dicam sæpius) non alio collineare,
quam ut ipse sese in novum quandam statum, & diathesin immutet,
hominemque etiam, cui sanguis purus & intaminatus perstat, febri
corripit posse; sicuti in corporibus sanis evenire, frequenti observa-
tione compertum est, in quibus nullus apparatus morbosus vel
quoad plethoram, vel quoad caco-chymiam fuerit, nulla insalubris
aeris anomalia, quæ febri occasione subministraret. Nihilominus
etiam hujusmodi homines, præcedente insigni aliqua aeris, victus,
cæterarumque rerum non naturalium (ut vocant) mutatione, iden-
tidem febre corripuntur, propterea quod eorum sanguis novum sta-
tum, & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aer aut vi-
ctus postulaverint; minime vero quod particularum vitiosarum in
sanguine stabulantium irritatio, febrem procreet. Etsi nequaquam
dubitem materiam in sanguinis despumatione post febrilem commo-
tionem, solemniter excretam, vitiosam esse, quamvis sanguis lau-
dabilem antea diathesin obtinuerat (id quod vix magis mirandum
est, quam quod esculentorum portiones aliquot corruptæ & foetidæ
evadant, postquam insignem in corpore alterationem subierint, ac
jam a reliquis segregatæ fuerint.)

II. Secundo ita mecum reputo, Indicationes veras, ac genuinas,
quæ in hoc morbo confurgunt, in eo versari, ut sanguinis commo-
tio intra modum naturæ proposito congruentem, sistatur; ea nimi-
rum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat, unde periculosa sym-
ptomata insequi solent, nec illinc nimium torpeat, quo pacto, vel
materiæ morbosicæ protrusio impediretur, vel sanguinis novum sta-
tum affectantis labefactarentur conatus. Adeo ut sive materiæ he-
terogeneæ irritanti, sive cruori res novas molientis febri ortus de-
beat, Indicatio utrobique eadem existat. Hisce positis fundamen-
tis Therapiæ methodum hoc ritu instituo.

Quoties mihi cum ægris res est, quorum sanguis vel per se im-
becillior existit, (uti fere in pueris) vel iusta spirituum copia de-
stituitur (ut in decliviori ætate, atque etiam in juvenibus diutur-
no aliquo morbo confectis) a venæ sectione manum tempero. E-
nimvero si Phlebotomiam his imperarem, sanguis etiamnum citra
ejusmodi imminutionem plus satis debilis, despumationi suæ obeun-
dæ prorsus impar redderetur; unde totius massæ perversio, ac proin-
de forsân ipsius æpri interitus sequeretur (quemadmodum si cere-
visiæ aut alius cujusvis musti fermentatio intempestive sistatur li-

detestabilem inficere hanc, et non potest. Quamquam haud minus in Cardiacorum usu aliquammissione mulctatos, convenientem Cardiacorum usu aliquamvari, sanguinemque ad tenorem defecationi suae peragenda idoneum restitui posse. Sed praestiterat plagam non infligi, quam sanari.

Attamen ubi in contraria indolis sanguinem incido, qualis in juvenibus athletico habitu & temperamento sanguineo praeditis reperiri consuevit, primum in curatione locum Phlebotomiae attribuo; quae (praeterquam in casibus inferius memorandis) sine salutis periculo hic omitti nequit. Nam alias non solum praeter nimia sanguinis ebullitione, Phrenitidum, Pleuritidum, aliarumque genus inflammationum periculum immineret, sed praeter copia etiam, impedimento omnimoda Circulationis, & totius massae quasi strangulatus consequeretur.

Mensuram quod attinet, mihi solemne est eam dumtaxat sanguinis quantitatem detrahere, quantum conjicere liceat, quae aegrum ab incommodis, quibus immodicam ejusdem commotionem obnoxiam esse diximus, incolumem praestet. Aestuationem vero illam deinceps rego ac moderor, Phlebotomiam vel repetendo, vel omitendo, Cardiacis calidis vel insistendo, ac denique alvum vel laxando, vel comescendo, prout motum illum vel efferrari, vel languere animadverto.

Post Venae sectionem (siquidem ipsa juxta casus praememoratos necessaria fuerit) sollicitus sedulusque inquiri, nunquid egrum vel vomitus, vel inanis aliqua vomendi propensio sub Febris initium inturbaverit. Id si contigerit, omnino medicamen Emeticum praescribo, nisi vel etas tenella, vel insignis aliqua debilitas egri ab eo temperandum suaserit. Sane Vomitorium propinare, ubi istiusmodi progressa est vomendi proclivitas, adeo est necessarium, ut nisi humor ille expellatur, in sentinam complurium malorum difficultum sit abiturus, quae crucem figent Medico toto durante medicationis tempore, egrumque in haud leve periculum conjiciant. Ex horum praecipuis, & maxime solitis est Diarrhoea; quae ut plurimum in defervescencia Febris consequitur, quotiescumque Emetica, quando ea suadebat indicatio omissa fuere. In febris quippe progressu, ubi malignum in ventriculo humorem nonnihil subegerit Natura, & antea amandaverit, illa ab acri humore ex hoc in stomacho, ante perpetim scaruriens usque adeo corroditur, ut non possit insequi Diarrhoea. Observavi nihilominus in Febribus inflammationis, quae malignae vulgo habentur omissionem Vomitorii, tamen si talis vomendi propensio praecesserit, Diarrhoeam, quemadmodum in hac Febre, necessario non inferre; sed de ista re plura in sequentibus.

Jam autem in eo versatur istiusmodi Diarrhoeae periculum, quod aeger satis jam morbo debilitatus, enervatur ulterius, & praeterea (id quod majoris est in ipsius noxam momenti) in febris declinatione, quo tempore contrahere se sanguis, ac viam suam exere debeat ad despumationis officium peragendum, penitus praepeditur hac emissionem.

Jam vero ne quid dubites humorem hunc in ventriculo nidulantem nisi forte vomitu eliminetur, hanc Tragœdiam (Diarrhoeam dico) quasi ex insidiis aliquanto post daturum, inquisitione instituta nunquam fere non comperies, si quando Febrim hanc Diarrhoea comitetur, aegrum in morbi principio in vomitum proclivem fuisse, nec tamen Emeticum fuisse propinatum. Porro etiam compertum habebis, etiam si proclivitas illa ad vomendum jam pridem praeterierit; Diarrhoeam tamen quamprimum Vomitorium exhibueris plerumque cessaturam; dummodo Emetico ferendo pares fuerint aegri vires. Saepius autem observavi, Diarrhoea semel oborta, medicamenta adstringentia vel nihil omnino, vel parum admodum ad eandem sistendam conferre, sive intro sumpta, sive exterius applicata.

Emeticum, quale passim a me propinatur, hujusmodi fere est: 24. Infus. Cr. Metall. 3vj. Oxymel. Scillit. & Syr. Scabios. comp. aa. 3ss. M. F. Emet. Quod hauriri jubeo tempore pomeridiano, duabus horis post leve prandium. Vetum quo tutius, ac felicius vomitio subsequatur succedat, illud etiam in mandatis habetur, ut Zythogala 15vj. vel viij. sint in promptu, quippe quod periculosa sint ista medicamenta, nisi copiose diluantur: Ideoque quoties vomuerit aeger, aut alvum exoneraverit, e vestigio sumendus erit haustus: quo facto, & inania illa tormina praecaventur, & vomendi conatus auspiciato procedunt.

Sape miratus sum dum forte materiam vomitu rejectam aliquando curiose contemplabar, eamque neque mole valde spectabilem, nec pravis qualitatibus insignem, qui factum fuerit, ut aegri tantum levaminis exinde senserint; Nempe vomitu peracto, saeva illa symptomata (nausea, v.g. anxietas, jactationes, suspiria luctuosa, linguae nigredo, &c.) quae & ipsos excruciant, & adstantes perterrefecerant, mitigari solent ac solvi, quodque morbi reliquum est, vix tolerari.

Illud hic loci non omittendum erit, si aegri conditio utrunque auxilium postulaverit (Venae sectionem intelligo, & Vomitorium) tutum omnino esse, ut Venae sectio Emetici exhibitionem praecedat; alias enim dum vasa sanguine distenta sunt, periculum imminet, ne ex violentis illis vomendi conatibus, vel rumpantur vasa pulmonum, vel Cerebrum laedatur, affuso cum impetu sanguine atque effuso, adeoque aeger Apoplexia correptus pereat. Cujus rei quamvis historias aliquot commemorare possim, illis tamen hic super sedere visum est, monuisse contentus maxima hac in re cautela utendum esse.

Si quis autem quaerit, quo tempore Febris Vomitorium exhiberi velim, dico, In ipso plane Febris initio, siquidem optio daretur, Emeticum propinare: ita enim fiet, ut ab horrendis illis symptomatibus, ex hominum in ventriculo, locisque vicinis delitescens illuvie ortum ducentibus, aegrum praemuniamus; imo vero & fortasse in ipsis quasi incunabulis opprimamus morbum, qui alias cum aegroti periculo grandescet, ac longævus evadet, nutritus nimirum dictis illis humoribus, qui vel substantia sua in penitiores corporis partes transmissi cum sanguinis massa commiscuntur, vel ex ipsa mora pejores facti, atque venenata pravitate inquinati, ex

suo jugiter perttansenti sanguini malignam auram afflabunt. rei (ne longius abeamus) Cholera morbus exemplum nobis; fit enim aliquando ut intempestiva opera vomitum in illo cohibere saragentes (sive illud Laudano fiat, sive adstringentibus medicamentis) eo cohibito non minus periculosam malorum catervam invehant. Humores enim acres corruptique, quorum exclusionem tantisper permittere oportuerat ut satis evacuantur, hoc pacto repulsi vires suas, ac savitiam in sanguine exerceant, febreque accendunt, quae ut mali moris, & gravibus symptomatis stipata esse solet, ita nisi propinato Emetico, tolli vix poterit, etiam aegro jam nequidem vomituri.

Quod si nobis (ut saepe fit) sero accersitis non licuerit Emeticum propinando, aegrotum saluti sub febris initium consulere, certe tamen convenire exstimaverim, ut quovis morbi tempore illud fiat, modo vires eo usque morbus non attriverit, ut Emetici vim ferre jam amplius nequeant. Equidem ego die febris duodecimo vomitum imperare non dubitavi, etiam cum aegre vomituri defuisset, neque sine fructu; Eo namque Diarrhoeam sustuli, quae sanguinem in peragenda despumatione impedivit; quin & serius idem facere minime dubitarem, nisi virium attritarum ratio prohiberet.

Vespero, celebrata jam vomitione, semper illud ago, ut tumultum ab Emetico in humoribus excitatum consopiam, & quietem conciliem; ideoque sub noctem, vel hora somni Paregoricum quempiam haustum exhibere jubeo. Ex. g. 24. Aqu. papav. rhœad. 3ij. aq. Mirab. 3ij. syr. de mecon. & syr. papav. errat. an. 3ss. M. F. Haustus.

At si vel ob copiosam sanguinis jacturam, quam curationis decursu passus est aeger, vel ex vomendi frequentia, defectionibusque in Emetici hujus usu facti, vel ex praesenti ejusdem aperiens, vel ex debilitate ejus, vel ex Febris jam declinantis vetustate, nullum jam superfit in posterum concitandae nimiae Ebullitionis periculum; tum metu procul habito, vice haustus praescripti, Diascordii satis largam dosin, vel impermixti, vel aquae alicui Cardiacae sociati exhibere jubeo. Praclarum sane Medicamentum, modo ea quantitate exhibueris, quae remedii potius quam tituli mensuram impleat.

Hic autem loci, priusquam de Emeticis dicendi finem faciam, praetereundum non est, omnino tutum non esse (saltem in hac Febre) Vomitoria ex infus. Croc. Metall. parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis vel minima quantitate exhibere. Optarem equidem, ut illius loco alia nobis tutiora, sed satis interim efficacia suppeterent, quae humorem hunc in febris declinatione fere semper Diarrhoeam minitanti radicitus extirpare possent, vel saltem ut medicamento aliquo idoneo acrem istam materiam, ejusque vim corrosivam ita mutare liceret, ac retexere, ut commovere Diarrhoeam nequirit. Saepius profecto mihi molestum illud accidit, quod ad infantes, puerosque febre correptos accersitus, indicationem conspexi, quae quidem medicamento usum suavit, cujus ope extra periculum collocari potuissent, quod tamen exhibere, veritus infelicem exitum, non sum ausus. Verum in adultis nullam inde noxam hactenus observavi, modo cum cautionibus praedictis Emeticum propinetur.

Vomitum exantlato negotio, illud necum ulterius disquirere soleo, utrum evacuationibus praegressis non obstantibus, sanguis etiamnum adeo exstiteret, ut illius effervescenciae limites adhuc ponendi sint, ac sufflumen addendum; an vero eo usque elanguerit ut indigeat incitamento; vel denique, an Fermentatio ad gradum idoneum, ac debitum reducta permitti sibi abque aegri periculo possit. De horum singulis nonnulla mihi dicenda sunt.

1. Itaque si sanguis eo usque exstiteret, ut merito adhuc suspicari liceat, aegrum vel Phrenitidi, vel alii alicui molesto symptomati, ex nimia sanguinis ebullitione prognato, obnoxium esse, postridie Emetici exhiberi Enema praescribo. Ut 24. decocti communis pro Clystere 15j. Syr. Violarum & Sacchari culinaris aa. 3ij. M. F. Enema. Idemque repeti, pro re nata jubeo, quo saepe fit ut sanguine nonnihil ventilato refrigeratoque, illius effervescencia satis compescatur. Interdum tamen usu venit, ut Venae sectionem etiam semel adhuc atque iterum repetere necesse sit, nempe in temperamenti admodum sanguineis, & aetate florentibus, aut in iis, qui nimio vini usu inflammatoriam quandam diathesin sanguini suo impresserunt. Verum plerumque tanto, tamque insigni remedio (quale quidem est repetita Venae sectio) non opus est; ac proinde, si praedictos casus exceperis, effervescenciam illam Enematum adminiculo satis reprimemus. Quare si sanguis nimium aestuet, atque effervescat, singulis, vel alternis diebus, prout res postulaverit, Clysterem injici jubeo, idque ita fieri ad decimum usque morbi diem vel circiter. Verum tamen si magna vis sanguinis amissa fuerit, vel aeger sit aetate proventa, tunc temporis Enemata nulla impetro, etiam si sanguis multum efferverit. In his etenim casibus, uti metuendum non est, ne omissis Clysteribus, ebullitio concepta eo usque procedat, ut insignis alicujus, & infesti symptomatis periculum imminet; ita certissimum est, eorundem usu sanguinis robur, ac vim, atque (ut ita dicam, etsi minus proprie) tonum relaxari, eatenus quidem, ut in senibus praecipue (neque enim illis Enemata tam prospere, ac juvenibus cedere solent) Naturae opus inturbetur, atque impediatur. Quod si vena secta quidem fuerit, sed non multum sanguinis emissum, tunc, uti dixi, Clysteres ad usque decimum, plus minus diem impetro; nonnunquam etiam ad usque duodecimum; quod in illis praesertim obtinet, quibus sanguinem demere non audeo. Sunt enim, qui post intermittentes Autumnales (sive Tertianae fuerint illae, sive Quarranae) febribus continuis, ex purgationis, in praecedentis morbi sine, defectu, corripuntur; His si sanguinem miseris, periculum est, ne sedimentum illud, quod praegressa fermentatio deposuerat, in massam sanguineam resorbeatur, novaeque turbas excitet. Venae sectionis itaque loco, rebus ita se habentibus, Clysteribus utor, & quidem ad diem usque duodecimum, modo aeger sit juvenis, atque fermentatio nimis exaltata.

2. Verum e contrario, sive Venae sectionem adhibueris, sive omiseris, si sanguinis effervescencia nimis elanguescat, adeoque stimulo egeat, ne Naturae juvanda impar fuerit, tunc equidem sic Clysteribus etiam ante diem decimum, multoque magis eo praeterlapso, prorsus abstinendum arbitror. Quorum enim jacentem jam, & nimis elanguidam fermentationem ulterius compescere atque reprimere conaremur? Quod si vero post tempus illud, in morbi nempe declinatione, Clysteribus

bus utaris, profecto non minus absonum id fuerit, atque ab omni ratione alienum, quam si quis effervescenti cerevisiæ nimis amplum spiraculum aperuerit: Etenim aperto illo spiraculo præpeditur natura, quo minus ad morbificæ materiæ separationem unitis viribus incumbat. Postquam igitur vel mediantibus evacuationibus idoneis, atque opportunis, æger ἔξω βελών positus fuerit, quantum ad illa symptomata attinet, quæ ex nimia ebullitione nascuntur, vel morbus jam declinaverit, quanto magis astrictam illi alvum præstitero, tanto magis eum extra periculi aleam colloco; nempe febrili materia ad sui concoctionem suaviter, ac blande propendentem. Quocirca si præcedentes evacuationes, sanguineæ massæ quasi laxitate quantam induxerint, vel inducere minentur, vel æger ante debitum tempus febre levatus fuerit, vel etiam febris ad ultimam suam periodum pervenerit, non solum Enemata procul haberi volo; sed & Cardiacorum opem atque auxilium suggerendum arbitror, atque mox ad alvum adstringendam mentem accingo.

Cardiaca vero quod spectat, quoniam usu mihi compertum est, eadem propere nimis exhibita non contemnendam noxam inferre (vena scilicet nondum secta metuendum est, ne materia cruda achuc exiens in cerebri membranas, &c. aut plenam decumbat) ideo curæ mihi semper est, ne Cardiacæ exhibeantur, dummodo vel nihil omnino, vel parum sanguinis emissum, nullaque alia insignior evacuatio facta fuerit: aut æger ætatis vigorem nondum exegerit, neque enim video, quorū sanguis ejus per se satis locuples, ulterius in ipsius perniciem direxerit: Locuples autem atque opulentus satis est, neque succendiculis eget, quandiu evacuationes insignes calorem ejus insitum non protraverint. Hujusmodi ægris domi nascuntur Cardiacæ, & quæ foris adduntur, aut frustranea sunt, aut etiam damnosa: quapropter ego vel nulla omnino, vel saltem levissima permiserim. Interim vero si æger ex profusis evacuationibus lassus & languidus, vel ætate fuerit provectus, solemne mihi est, Cardiacæ vel in ipso febris initio propinare, morbi autem die duodecimo, negotio tunc temporis ad secretionem vergente, medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo, imo paulo maturius idem fieri potest, modo non metuendum sit, ne febrilis materia in partes principes præceps agatur; Namque hoc tempore quo magis calefecerim, eo magis concoctionem acceleravero. Neque revera cogitando assequi possum, quid sibi velint Medici, cum sua præcepta toties ingeminant, de remediis ad promovendam febrilis materiæ concoctionem administrandis, id quod in morbi initio accersiti sæpe faciunt; nihilominus tamen eodem ipso tempore medicamenta ejusmodi imperare non dubitant, quæ febrim scilicet attemperare possint. Profecto enim est febris ipsa naturæ instrumentum, quo partes impuras a puris secernat: hoc illa modo plane imperceptibili præstat ab initio, atque etiam in ἀκμῇ morbi, verum in ejusdem declinatione apertius, atque manifestius idem opus aggreditur, id quod ex urina cernere licet. Materiæ febrilis concoctio nihil aliud revera significat, quam peccantis materiæ a sana separationem. Hanc igitur ut acceleres, non satagendum nescio quibus attemperantibus, sed febris effervescentia tandiu permittenda est, quandiu salus ægrorum passa fuerit, cum autem finem spectet, atque declinationem, secretionem jam conspicua, tunc quidem calidioribus medicamentis illam a tergo insequemur, ad rem eo celerius ac certius perficiendam. Atque hoc re ipsa est, febrilis materiæ concoctionem promovere; cum evacuationes & refrigerantia moras nesciant, & curationem impendant, ipsamque sanitatem jam appropinquantem abigant, uti sæpius a me fuit observatum.

Si fermentatio satis progrediatur, despumatio circa diem decimum quartum peragetur. Verum si refrigerantia quolibet serius adhibueris, atque ita eorum ope effervescentia sufflaminetur, mirum non est, si febris ad diem vicesimum primum, quin & in effectis corporibus male tractatis multo longius excurrat.

Illud porro observatu dignum est, quandoque accidere, ut æger clysterum aliorumve catharticonum usu circa declinationem morbi intempestive præscriptorum, parum alleviari videatur, imo nonnquam apyrexia omnimoda frui, post diem autem unum alterumve senties, non tam pristinam febrim vires suas redintegrasse, quam novam accendi; rigor nimirum, atque horror subito invadit, quem mox excipiet calor atque febris, idem stadium (nisi forsitan in intermittedium classē se reponat) decursura, quod in præcedentibus monstratum fuit. Cum ita se res habeat, non aliter tractandus est æger, quam si antea febris non detentus fuisset, verum quoad res agendas calcata jam vestigia repetenda; despumatio enim, quæ coæptæ jam ebullitioni debetur, non nisi prædicti temporis, scilicet 14. dierum spatio peragetur, utcumque molestum fuerit ægro, a prægresso morbo satis jam debilitato, eoque sanitatem expectare.

Cardiacæ, quæ adhibeo, passim sunt ejusmodi, quæ statim subindicabo, quorum moderatioribus utor in morbi principio, æstuatione maxime fervente; gradatim ad usum calidiorum, juxta morbi progressum, vel ebullitionis gradus pergens; semper memor licere, siquidem multum sanguinis missum, vel æger senex fuerit, ut Cardiacæ fortiora administrantur, quam cum vel nullā præcesserit venæ sectio, vel æger ætate floruerit.

Moderata autem illa quæ dixi, Cardiacæ sunt ex aquis stillatitiis (verb. gr.) Borag. Citr. Scord. compos. fragor. Theriacal. cum admixtis Syrup. Melissophyl. Fernel. Caryophyl. & de succo Citr. &c. fortiora vero ex pulver. e Chel. Cancror. Comp. Bezoar. Confect. de Hyacinth. Theriac. Oriental. aliisve ejusdem indolis. Quæ sequuntur in frequenti usu sunt.

24. Aq. borag. citri, Scordii compos. & cerasor. nigr. an. ʒij. aq. cinamomi hordeati ʒj. margarit. præparat. ʒij. sacchari crystallini q. s. Misce, sumat, solcl. iij. sæpius in die, præcipue in languoribus.

24. Aq. rotius citri, & fragor. an. ʒiiij. aq. cord. frig. Saxon. ʒj. ac. theriac. stillat. syr. melissophyl. Fernel. Caryophyl. & de succo citri, an. ʒʒ. Misce f. Julapum, de quo capiat sæpius.

24. Pulv. e chelis cancrorum compos. lap. bezoardici Oriental. & Occidental. contrayervæ, an. ʒi. fol. auri n. ʒ. Misce, f. pulvis subtilissimus: Capiat ad quant. gr. xii. quoties opus fuerit, ex syr. e succo citri, & Caryophyll. an. ʒij. superbibendo choel. aliquot Julap. præscript.

24. Aq. theriac. stillat. ʒiiij. semin. citri ʒij. contundantur simul & f. Emulsio Colatura adde sacchari perlati q. s. ad gratum saporem, sumat cochl. 2. ter in die.

Plures vero formulas recensere supervacaneum arbitror, quoniam & innumeræ sunt, aut esse saltem possunt, & in morbi decursu juxta varia ejus tempora, ac diversa symptomata variandæ sunt.

3. At si fermentatio neque nimium æstuet, neque langueat, eam Sydenham Opera Medica.

ator, nisi ægrorum, vel a me aliquid extorqueat, eandem placeat.

Atque hoc loco non ateri, ne sapius ad tenuis conditionis homines, quorum crumena pro apparatus Medico ferendo non erat, accersitum, nil fecisse aliud post venæ sectionem, & vomitionem peractam (siquidem eas postulasset indicatio) nisi quod ipsis præscriberem, ut toto morbi tempore lecto defixi, non nisi juscula avenacea, & hordeacea vel similia haurirent, tenuem cerevisiam (dempto frigore) moderate biberent ad sitim sedandam; Enema ex lacte saccharato singulis, vel alternis diebus usque ad diem decimum, vel undecimum injici curarent; & versus febris finem, coæpta jam separatione, siquidem segnior esset, ad eam juvandam fortiolem subinde potum Cardiacorum loco, bibere ipsis permisi: Atque ita sine ulteriore aliquo apparatu, nisi quod leve Catharticum in fine morbi addere soleam, eos salvos, & incolumes dimisi.

Sed ut ad institutum meum revertar, si prædicta methodus sollicite observata fuerit, usitato circa 15. diem, tum ex laudabilis in urina separationis signis, tum etiam ex manifesta omnium symptomatum remissione, percipio tempestivum tunc esse potionem purgantem exhibere, quæ sedimentum e prægressa fermentatione hic illic depositum subducatur, quod nisi tempestive factum fuerit, periculum est ne in sanguinis massam remigret, ejusdemque febris recidivam conciliet, vel etiam sua in partibus naturalibus, ad quas amandatum fuit, mora, in mineram tenaciam deinceps in corpore malorum feracem abeat. Nimirum separatione jam facta, humores crassi ac impuri ex arteriis sanguini in venis refluxo immixti, regressum ejus facile impediunt, ex quo varia obstructionum, ac tandem fermentorum genera nascuntur.

Ubi tamen animadvertendum, non adeo plane necessarium esse post febres Vernales, atque post Autumnales purgationem celebrare; idque propterea, quod sedimentum a Vernalibus depositum cum copia, tum qualitate terrea, indignaque ab autumnali superetur. Quod ipsum etiam in Variolis obtinet, multisque morbis aliis Verno tempore grassantibus, in quibus purgantium omissio non tam grave periculum (quod ego quidem observaverim) quam in casibus prius memoratis inferre solet.

Et sane non multum is a veritatis scopo aberraverit, qui affirmaret ab hoc capite (purgandi scil. post morbos Autumnales omissione) plurium morborum colluviem, quam ab ullo alio, quo demum cunque causarum fonte, dependere.

Si valde debilis sit æger, vel alioquin perfecta adeo depuratio facta non fuerit, ut audacter possim purgans exhibere die decimo quinto, rem differo ad decimam septimam, quo tempore sequentem, vel similem, pro ratione ægri virium, potionem propino. 24. Tamarind. fol. sennæ ʒij. rhubarb. ʒij. Coq. f. q. aq. Colatura ʒiiij. dissolve manne, & syr. rosac. an. ʒj. Misce, f. potio cap. mane.

Purgatione peracta, ægrum, hætenus lecto, ex præscripto meo defixum, surgere, & paulatim ad pristinam victus rationem reverti jubeo. Ea quippe, quam ad hoc usque præscripsi, eadem propomodum est cum illa, quam modo commemorabam; Uti juscula avenacea, & hordeacea, panatellæ ex pane & vitello ovi, in aqua cum saccharo confectæ; juscula tenuia ex decocto pulli, cerevisia tenuis lupulata, cui quandoque æstuante ardore febrili, immisceri potest succus Aurantiorum recens expressus, & super ignem ad crudioris tantummodo sublationem coctus, & his similia, quamvis juscula avenacea sint instar omnium. Negare vero cerevisiam tenuem, quæ subinde in mediocri quantitate sumatur, severitas est minime necessaria, imo sæpenumero etiam detrimentosa.

Accidit interdum (maxime in senibus) ægrum febris jam curata, & corpore satis jam superque purgato, nihilominus valde debilem esse; & quandoque tussis, interdum etiam sreatu, magnam glutinosam, viscosamque phlegmatis copiam expectorare: quod symptoma non tantum ægro terrorem injectit, sed & ipsi Medico, præsertim minus cauto, imposuit, eumque in opinionem induxit, quasi affectus Phthisis viam sterneret; licet observaverim ego, rem adeo periculosam non esse. Hoc in casu ægrum jubeo Vinum Malaganum, annosum, vel Falernum, sive Muscatum, cum pane tostato ei immisso bibere, quod crasin sanguinis multum prægressa æstuatione debilitati (prindeque nuper ingestorum succis assimilandis impari) corroborans, symptoma illud paucorum admodum dierum spatio abigit, ut crebra experientia mihi constat.

Hac ipsa, quam proposuimus ratione, ægrum a multis affectibus, symptomatibusque, quæ malignitati tribui solet, tutum præstabimus; cum nihil magis solitum sit Medicis in arte sua minus exercitatis, quam quando medicamentis nimis refrigerantibus, vel usu Enematum intempestivo, crasin sanguinis ita relaxarint, Naturamque in perficienda sanguinis depuratione adeoque debilitarint, ut animi deliquia, aliaque symptomata (quæ genuina sunt ejusmodi impedimento rum arte postorum effecta) contingant, malignitati culpam transcribere: at si diuturnitas, in quam abierit morbus, eum ab hoc vitio vindicet, tum quicquid eos in medela deinceps fatigat, id Scorbutum acceptum referunt: quamvis re ipsa neque symptomata, quæ accidebant, quandiu vigeat morbus, malignitatis erant effecta, neque ea, quæ contigerunt in declinatione ejus Scorbuti, sed utcumque rei male gestæ debetur, quemadmodum crebro id a me observatum est.

Non quod ego, aut quisquam alius, qui morborum historiam vel delibaverit, nescius esse possit, febres esse, quæ non intemperie sola, aut putrido tantum calore, sed etiam maligna qualitate (cujus signa evidentissima in ægris non possunt non apparere) consent: vel etiam quod inficias eam, complicari aliquando cum febre Scorbutum, & complures alios morbos posse: hoc tantum dico, has affectiones immerito sæpe in litem vocari.

Si fermentatio sanguinis rite processerit, fiet omnino materiæ morbificæ despumatio intra tempus modo dictum. At si remedia refrigerantia, vel Enemata serius exhibita fuerint, multo longius excurrat febris, præcipue in hominibus grandævus, male a Medico curatis, ad quos quandoque accersitus, postquam febris per quadraginta dies & amplius laboraverant, nihil non expertus fui, quo despumationem sanguini inducerem: sed nempe usque adeo debilitatus erat sanguis, partim senio, partim Enematibus, & medicamentis refrigerantibus, ut neque Cardiacis, neque ullis aliis corroborantibus remediis scopum meum assequi possem; sed vel illorum febris virium suarum tenax permanebat, vel alioqui, si adesse videretur ἀτυψία, vires

ægrorum admodum prostrata.

Aliorum autem remediis tere sæpe coactus fui, cum in hanc viam applicando. Nec est quod lorum vivum vegetumque calidum, licet inusitata, ægrum tantopere corroborari, naturamque debilitatam juvari, ut semet a materia fecernendæ, eliminandæque reliquiis exoneret; cum proclive sit intelligere, insignem effluviis vegetorum copiam a sano, & athletico corpore in corpus ægri exhaustum transfundi. Neque unquam comperi iteratam calentium linteorum applicationem ullatenus id præstare valuisse, quod modo præscripta methodus præstitit, ubi calor applicatus tum magis est humano corpori congener, tum simul blandus, humidus, æqualis, perennisque. Atque hæc ratio, spiritus, & halitus, forsitan Balsamicos, in ægri corpus immittendi, ex eo quo ipse illam adhibui tempore, licet aliena primum videretur, ab aliis cum successu felici fuit adhibita: neque profecto me pudet huius remedii meminisse, tametsi petulci quidam homines, atque arrogantes, omniaque vulgaria ingenti supercilio contemnentes, me forsitan hoc ipso nomine aspernabuntur. Ego enim proximi mei commodum, ac salutem vanis illorum opinionibus longe anteferebam censeo.

Methodus hæcenus enarrata, si quis illam prudenter, & cum destinato animi consilio observaverit, ægros, si non ab omnibus, saltem a plerisque molestis illis symptomatibus immunes præstabit, quæ hanc febrem vel comitari, vel eidem supervenire solent, quæque Medicum animi ancipitem, atque sæpe in curationis decursu consilii pene expertem reddunt; imo & illius curæ commissos non raro e medio auferunt, etiamsi morbi natura mortem non interminari visa sit. Sed quandoquidem vel ægrorum culpa Medicum non satis opportune accersentium, vel ipsius Medici minori sive peritia, sive cautela, ejusmodi accidentia sæpissime oborta cernuntur, non gravabimur peculiarem eorumdem curam summam hic attingere; verum ad ea tantum symptomata me restringam, quæ, tametsi sæpenumero præverti potuerint, modo via atque ordine prædicto quis usus fuisset; cum tamen semel acciderint, diversam quandam, sibi que propriam curam postulant.

Atque (ut hinc ordiar) si æger, vel calidiora medicamenta minus propere atque intempestive fumendo, vel calido nimis temperamento sua natura fretus, in * *Phrenitidem* prolapsus fuerit; vel (quod proxime illuc accedit) si non omnino dormiat, sæpe exclamet, aut inconditis vocibus utatur, si vultu ac loquela ferociat, si medicamenta, potumve communem avidè & quasi raptim bibat, vel denique urinam habeat suppressam; in hoc, inquam, casu, liberaliori manu, quam supra indulsimus, ad venæ sectionem, Clysteres, ac medicamenta refrigerantia me accingo, verno tempore præsertim, (quo etiam alias symptomate hoc non apparente, juvenes atque vegeto calore præditi, ejusmodi auxilia sine multo discrimine admittunt) atque talibus remediis utens, ægrum eousque sustinere conor, donec in diuturnitatem aliquam affectus excurrat, quo tempore non admodum difficile erit eum, & a morbo, & a symptomate una eademque opera liberare: id quod fiet *Narcoticum* aliquod medicamentum in largiori paulo dosi exhibendo. Quamvis enim febre vigente, quæ *ὑπὸ κατὰ φύσιν* vi prædita sunt non omnino proficiunt, neque destinationi a Medico scopum feriant; tamen opportune, & in declinatione morbi adhibita, præclaros effectus edunt: antea vero prodesse non possunt, partim quia fermentationem vi atque impetu procurrentem sistere nequeunt; etiam in maxima dosi exhibitæ; partim vero (quod quidem majoris adhuc momenti est) materiæ peccanti tunc temporis massæ sanguineæ æquabiliter admixtæ, neque versus separationem adhuc vergenti ab exhibitio hujusmodi medicamento manus injicitur, adeoque depuratio illa tantopere expetenda impeditur. Verum si hæc ratio sit hujusce phænomeni, sive alia aliqua magis abstrusa, judicent illi quibus animus atque otium est talia speculari. Interim ex fideli atque idoneo observationum plurimarum complexu rem ipsam certissimam esse pronuncio, *Laudanum*, vel alia quævis Narcotica in principio, augmento, vel statu hujus febris ad symptoma hoc levandum, vel non prodesse omnino, vel, quod sæpe accidit, etiam obesse; verum in ejusdem morbi declinatione eadem medicorum dosi adhibita non sine successu usurpari. Semel equidem Narcotico die morbi duodecimo usus sum, nec frustra; citius autem nunquam prospere exhibitum novi. Quod si autem illius usum ad decimum quartum usque diem distuleris, tanto magis proficuum evadet, separatione nempe perfectiori tum facta. Neque vero hæc mora, tametsi forte astantes magnopere perterrefaciat horrendum hoc symptoma, mortem statim subinfert; cum sæpe observaverim, hanc rem plerunque inducias ferre posse, ac solere, donec ad Narcotica descendere fuerit opportunum; saltem si caveatur, ne *Cardiacis*, calidisque medicamentis adhibitis, intemperies cœpta accendatur vehementius, quo casu ægri subito pereunt. Narcotica, quibus ego uti soleo, sunt vel *Laudanum Lond.* ad gr. i. ℥. vel sequens. *Rec. fl. Paralyt. M. i. Coq. f. q. aq. cerasor. nigr. Colatura ℥iij. Dissolve syr. de meconio ℥ss. Succo limonum Cocbl. ℥. Misc. vel Rec. aq. cerasor. nigr. ℥iij. aq. Epidemice ℥ij. Laudani liquidi gutt. xvj. Syr. Caryophyll. ℥ij. misce.*

Illud unicum hic addere placet, quod ad hanc rem observasse non inconsultum arbitror; nempe si symptoma hoc eousque inducias ferat, & febris adeo ut in diuturnitatem abeat, ut æger ante assumptum Narcoticum commode purgari possit, medicamentum illud tanto felicius effectum suum editurum. Quocirca ego imperare soleo *Pil. coch. ma. ℥ij. in aq. Betonicæ dissolut. atque hoc 10. vel 12. horis ante Narcotici exhibitionem.* Neque metuendum est a tumultu illo, quem calidior illa massa pil. alias excitare solet: subsequentis enim Narcotici vis pensabit illas turbas, & quietem suavissimam, blandissimamque inducet.

Quod si vigilæ ultra febrem excurrant, cessantibus aliis symptomatibus, observavi, linteum in aqua rosar. immersum, & frigideincipiti, ac temporibus applicatum, plus quam Narcotica quævis prodesse. Sæpe accidit ægrum per totum morbi decursum * *tussi* molesta divexari; nimirum commota vehementer ac tumultuante sanguinea mole, omnibus jam ad seditionem, & partium studia spectantibus, fit, ut humores quidam soluti diffucentesque e massa sanguinis per vasculum pulmonaria, vel etiam per diapedesin in tracheæ membranam interiore, teneriore scilicet atque exquisito sensu præditam,

transferantur: hinc *tussis* oboritur, quæ primo sicca est, quoniam tenuis adhuc materia vini expultricem eludit; mox crassescit, atque expectoratu difficilis evadit, eo quod sensim febrili calore torreatur, atque affetur: hinc fit, ut suffocationis metu percellatur æger, utpote cui vires defunt ad lentam hanc viscidamque materiam tussi eliminandam. Ego in hoc affectu raro alio aliquo medicamento utor, præter *oleum amygdalarum dulcium* recenter expressum, nisi forsitan acciderit, (accidit autem aliquoties) ut ægrotus oleum profusus aversetur; tunc enim vulgaribus illis pectoralibus, ut licet, opem ferre conamur. Interim oleum illud amygdalarum, si quidem illo per ægrum uti licuerit, Bechicis aliis anteposendum censeo, ob eam causam præcipue, quod cum necesse sit hæc liberalius, & majori quantitate exhibere, modo prodesse velimus, hoc pacto ventriculum jam satis superque debilem, & ad nauseam proclivem oneramus: nonnunquam etiam eadem opera præpedimur, ne reliqua, eodem ipso tempore transigenda, procuremus. Neque vero satis aut intellectu assequor, aut experientia eo ductus sum, cur ab hujus olei, quod jam diximus, usu in febribus abhorreamus, eo quod scilicet inflammabile sit, adeoque metuendum, ne febrem augeat. Fac enim illud sua natura calidum esse, certe tamen calor ille tantus non est, ut aliunde non abunde pensetur: præ cæteris enim manifesta vi pectori conducit, aperitque vias, ac lenit, adeoque expectorationem promovet, qua (præsertim si copiosior acciderit) tum exoneratur sanguis a molesto humore, commode jam excreto, tum eadem opera nonnihil refrigeratur, adeoque me non admodum male habet, si quando viderim symptoma hoc intercurrere, cujus beneficio non parum etiam ægro beneficii accedit. Illud unicum nunc moneo, una eademque vice tutum non esse, totis cochlearibus hoc oleum exhibere; periculum enim est, ne & ventriculum nauseam, & alvo fluxum inducamus; parce itaque sed frequenter interdiu noctuque propinandum erit, quo non solum expectoratione facta tussim leniemus, verum etiam, quod alicujus momenti est, attritas ægri vires blando nutrimento nonnihil solabimur.

Fit nonnunquam, ut * *hæmorrhagia narium* superveniat; sive quod medicamenta nimis calida in morbi initio fuerint exhibita, sive quod ebullitio non satis coercita fuerit, ægro nempe, vel in florenti ætate constituto, vel anni tempestate coadjuvante. Hoc si fiat, non admodum juvabunt ea quæ ad sistendum sanguinis motum vulgo fieri consueverunt, qualia sunt venæ sectiones, ligaturæ, medicamenta adstringentia, atque agglutinantia, vel etiam sanguinis acrimoniam contemperantia, &c. quamvis enim pro Medicorum consilio, ac prudentia, his atque hujusmodi aliis uti liceat; in eo tamen cardo rei vertitur, ut idoneo aliquo medicamento sanguinis ebullitioni frænium imponatur, quod sistat, figatque illius impetum in præcipitia quæque ruentem. Verum quidem est, si symptoma seorsum spectetur, ea quæ supra enumeravimus (ac venæ sectionem potissimum) accommodata satis esse, nec ego ipse dubitarem iisdem uti; sed nempe symptomatis hujus causam (saltem si phlebotomia exceperis) non satis attingunt, quam profecto non majori ratione per prædicta tollere, quam si gladio ignem extinguere satageres. Ego itaque in hoc casu, frustra aliis tentatis, tale quippiam adhibere soleo, quale nunc subnectam. *Rec. aq. portulacæ, & papaveris erratici aa. ℥iij. syr. de meconio ℥vj. syr. paralyseos ℥ss. M. f. haustus.* Nolim autem hæc ita intelligi, quasi hæmorrhagiam quamlibet ita statim curari velim, quin potius illa sæpe permittenda est, atque ægro plurimum prodesse potest, partim nimiam ebullitionem reprimendo, partim etiam critice aliquando morbum solvendo. Atque revera parum proderit huic symptomati frænium prædictum aptare, priusquam illud aliquantisper excurrerit, vel etiam priusquam vena in brachio secta fuerit. Illud diligenter advertendum est, hanc ipsam, atque alias omnes immodicas hæmorrhagias peculiare illud obtinere, quod quamprimum illæ quomodocunque sedatæ fuerint; nisi leniens aliqua purgatio celebretur, metus est ne recidivam æger patiatur; proindeque purgandum erit, quamvis (si febris tempora spectentur) serius aliquanto id fieri soleat, atque debeat, nisi symptoma hoc accesserit.

Hoc symptoma plerunque senibus accidit post copiosas evacuationes, vel per secessum ex diarrhœa, vel maxime per vomitiones, atque sæpenumero mortem præ foribus adesse denunciat. Ingenue fateor, me mihimet ipsi de * *Singultus* causa disquirenti satisfacere non posse: nihilominus observavi sæpe illum ex turbis, ac tumultu ab asperioribus medicamentis in ventriculo locisque vicinis excitato, ortum ducere, quibus sedandis atque in pristinam pacem reducendis cum naturæ vires non suffecerint, fit ut ingens periculum imminet: proindeque consentaneum existimavi curam eo dirigere, ut quod natura per se nequibat, artis adminiculo sussulta perficeret. *Diascordium* igitur larga dosi exhibitum, nempe ad ℥ij. a scopo meo non aberravit, cum *semine anethi*, aliisque, quæ tanquam specifica decantantur, usus nihil profecissem.

Si in morbi hujus decursu * *Diarrhœam* abortam conspexeris, quæ (uti jam alicubi supra notavimus) accidere tum solet, cum in morbi initio vomitorii propinandi indicatio se obtulit, neque tamen illud propinatum fuit; dico in hoc casu convenire, ut quovis morbi tempore (nisi vires contra indicaverint) *emeticum* exhibeatur, etiamsi jampridem illa ad vomendum propensio præterierit. Quoniam autem hac de re satis opinor in superioribus pagellis a nobis dictum est, illud hoc in loco duntaxat annexam, quid facto sit opus si exhibitio licet Emetico nihilominus *Diarrhœa* supervenerit. Quod tamen oppido rarum est, nisi in febre inflammatoria, ubi vomitorium, hoc symptoma non solum non impedit, sed quandoque creat, quod notatu dignum est. Iraque cum sic se res habuerit, præ quibusvis astringentibus hujusmodi clysterem profuisse comperi. *Rec. Cort. granator. ℥ss. ros. rubr. p. ij. Coq. in lactis vaccini f. q. Collaturæ ℥ss. dissolve Diascordii ℥ss. M. F. Enema.* Non suaserim, ut majori quantitate clysterem injicias, quamvis enim propria vi adstrictionem polliceatur, metuendum tamen est, ne sua mole lacestat intestina, adeoque fluxum alvi, quem consopire animus erat, uberius provocet.

Sed forsitan objiciet his aliquis, magis e re videri, ut præsertim declinante morbo, diarrhœam, si quidem acciderit, permittras potius quam sistas, quandoquidem fluxus ille alvi nonnunquam criticus est,

mor-

* *Phrenitis.*
* *tussis.*

* *Narium hæmorrhagia.* * *Singultus.*
* *Diarrhœa.*

morbūque solvit. Respondeo, me non inficias iturum, fieri aliquando, ut febris per hanc portam sibi viam faciat, atque effugiat; verum illud rarius accidit, quam ut illius spe quicquam moliamur: quin & ratio illa, qua de medela febrium universim locuti fluxus hujusce sistendi necessitatem ostendere conati sumus, etiam hic omnino locum obtinet. Nunc autem illud addendum est, mea quidem sententia animadversione non indignum, nempe ad genuinam sanguinis depurationem non tantum necessariam esse illam quarundam partium secretionem, quæ per *feces* fit, sed requiritur etiam ut discernantur aliæ, tanquam *flores*, id quod in aliis etiam liquoribus opulentis atque heterogeneis quotidie cernimus. Itaque si diarrhœæ munus indulseris, mediam solummodo depurationem, tantopere expetitam, procurabis, atque etiam forsitan, quod postremo in loco rejiciendum erat, primo excernetur. Fateor equidem separatione illa per flores jam facta (quæ, ut obiter id attingam, sensim, & sine sensu peragi solet, atque plerumque paulo pleniori *diarrhœa* potius, quam sudore manifesto) diarrhœam, si forte acciderit, periculi non multum interminari: Sciendum tamen est, illam tum non aliunde accidere, quam quod purgatio subducendis fecibus dicata, non opportune exhibita fuerit, quæ quidem feces mora sua fermenti alicujus maligni indolem adeptæ, intestina jam ad excretionem irritant, stimulantque; ut omittam dicere, liquidissimam illam excrementorum consistentiam (tali enim forma plerumque visuntur) satis indicare ea pro critica morbi solutione habenda non esse.

Forsitan etiam inter symptomata febribus supervenientia recenseri potest * *Iliaca passio*, eo quod vomitus enormes qui initio febrium accidere solent, huic occasionem quandoque subministrant.

Horrenda hæc affectio est, & huc usque omnium fere judicio funesta, ex intestinorum motu inverso, ac præpostero originem ducens. Nimirum intestinorum fibræ, quæ a superioribus versus inferi a contrahi debent, contrahuntur ad superiora, & quæcunque in intestinis continentur non versus alvum, sed ventriculum protruduntur, & impetu facto ad os regurgitant; adeo ut Enemata, quantumcunque acria, Emetica evadant, ubi etiam Cathartica per os assumpta per vomitum subito excernuntur. Et, mea quidem sententia, exquisitus ille, ac intolerandus dolor huic morbo superveniens, non aliunde oritur, quam ex præpostero intestinorum motu modo dicto. Cum enim sinus illi, quos multiplices intestinorum circumvolutiones constituunt, ita a natura formati sint, ut ad descensum fecum quam aptissime conducerent, cum ii, inquam, motui suis fibris contraria cedere cogantur, exoritur inde prædictus dolor; qui quidem uni parti instar terebelli infigitur, cum aut valvula quæ ad initium coli appositæ excrementorum ad ileon regressum impedit, alia quævis membrana ad sinum pertinet, vim hujus præposteri impulsus sola sustinet.

Hujus vero inversionis, unde dolor ille exoritur, duplicem causam assignare licet. Obstructionem nempe, vel irritationem.

Primo igitur quæcunque intestina vehementer obstruunt, ut nihil per inferiora descendere valeat, hunc contrarium in intestinis motum ut producant necesse est, & nemini non notum. In horum censum ab Authoribus referri solent feces induratae, flatus crassi magna copia collecti, ac intestina velut in nodum convolventes, constrictio intestinorum in hernia, inflammatio denique, alique tumores magni, qui cavitatem internam intestini occludunt. Interim vero haud negandum, quod motus contrarius hisce causis originem debens, potius ingestorum, quam intestinorum motus habendus, neque hæc totius intestinorum ductus inversio est, sed illorum tantum, quæ supra sedem istius obstructionis sita sunt. Quam ob causam *affectio iliaca* hinc profecta a me *notha* appellatur.

Secundo vero opinor, quod in affectu iliaco causa inversionis peristaltici intestinorum motus ut plurimum ita se habet. Nimirum ex tumultuante sanguine in febris nuper concepta, in ventriculum, & proxima intestina deponuntur humores acres & maligni, ex quibus ventriculus primo motum suum invertit, ac violento impetu materiam molestantem in eo contentam per os rejicere cogitur: Ventriculi tandem motui validiori intestina *tenuia* ipsi continua jam debilitata cedunt, & cum his demum *majora* in consensum trahuntur, vomituri ventriculo quasi choream ducente. Hunc affectum *verum ileum* voco, & ille hujus loci est. Methodus eum curandi hætenus fere incognita fuit, quidquid nonnulli jactent de usu *argenti vivi*, & *globulorum*, quæ præterquam quod parum conducunt, noxam sæpe haud contemnendam inferunt. Ego cum felici successu hac methodo utor.

Quando liquet ex clysteribus per os rejectis, & aliis signis verum esse ileum, tunc in hæc tria enitor. 1. Ut contrarius iste ventriculi motus, qui similem motum in intestinis efficit, impediatur. 2. Ut intestina acri humore debilitata corroborentur. 3. Ut ventriculus ac intestina ab istis humoribus liberentur. Quibus indicationibus ut satisfaciam, curationem hoc ritu instituo. Primo *salis absinthii* ℞. ex cochleari uno *succi limonum* mane, & sero sumendo præscribo, intermediis vero temporibus *aquæ menthae stillatitiæ* sine saccharo, aliove quovis additamento cochlearia aliquot bis quaque hora propino, cujus vel solius repetito usu, & vomitus, & dolor ex eo natus subito evanescent. Dum hæc sunt *catulum viventem* nudo ventri indefinenter accumbere jubeo. Postquam vero dolor cum vomitu per spatium bidui tridui omnino cessaverit, tum *pil. cochl. maj.* ℞. in *aqua menthae* dissolutam exhibeo, quam etiam aquam (quo certius vomitus recursum prævertam) toto catharseos tempore sæpius sumendam injungo. Neque catulus removendus, antequam usum pilularum æger aggrediatur.

Observavi frustra pilulas istas, vel quodvis aliud catharticum, utcumque forte propinari, donec ventriculo corroborato, atque adeo ad motum naturalem reducto intestina etiam ad proprium motum æque reducta fuerint. Alias enim cathartica omnia intus assumpta emetica evadent, & plus damni quam commodi inferent. Inde est, quod remediis purgantibus viam facere non aggredior, donec per spatium quoddam medicamentis istis ventriculum respicientibus usus fuerim.

Victum valde tenue ægro præscribo, ita ut nonnisi cochlearia aliquot jusculi ex pullo Gallinaceo parati sorbenda bis vel in die permittam. Interim vero ut per totam ægrotationem in lecto decumbat jubeo, donec perfectæ sanationis signa appareant, ac etiam

Sydenham Opera Medica.

* *Iliaca passio.*

pol. im tempus in aqua usu persistere, & la. in a frigore bene mendere impero, quo minus rec. hic affectus præ omnibus aliis est obnoxius.

Pauca. Universam meam in curando hoc affectu methodum exhauriunt, quam a nemine consulto ob simplicitatem suam, & splendidioris sive verborum, sive pharmacorum apparatus defectum, aspernatum iri confido.

Atque hæc sunt illa symptomata, quæ in febre hac occurrere solent. Sunt autem & alia quædam, quibus membrandis nunc superfedebimus, partim quidem, quoniam ea minoris momenti sunt; partim vero, quod peculiarem nullam curationem postulent, febres enim rite tractatæ sponte sua cessant.

De Febre continua hujus constitutionis, ac de symptomatibus ejus hætenus.

C A P U T V.

Febres Intermittentes Annorum 1661. 62. 63. 64.

Quandoquidem, ut jam sumus præfati, quæ prædictos annos omnes constitutio pervasit, producendis omnium generum *Intermittentibus* tam egregie favit, quas tum de illis feci observationes haud indiligentes, hic impertiam. Addam insuper, & quæ de paucis illis intermittentibus observavi, quæ ab illo deinceps tempore sporadice contigerunt, quo minus orationis filum insequentium deinceps annorum historiam complectentibus, cogar interciderè.

Primo loco quo naturam illarum atque genium conjectura saltem assequamur, advertendum est, quod in paroxysmis febrium intermittantium hæc tria tempora spectanda sunt. 1. Tempus *Exhorrescentiæ*. 2. Tempus *Ebullitionis*. 3. Tempus *Dispumationis*. Et quidem ad *exhorrescentiam*, quod attinet (ut de his rebus summam loquar) ego illam exinde oriundam arbitror, quod materia febrilis, quæ nondum turgescens a massa sanguinea utcumque assimilata fuerat, jam tandem non solum inutilis; verum & inimica naturæ facta, illam exagitat quodammodo atque lacerat; ex quo fit, ut naturali quodam sensu irritata, & quasi fugam molita, *rigorem* in corpore excitet atque *horrorem*, aversionis suæ testem & indicem. Eodem plane modo, quo potiones purgantes a delicatulis assumptæ, aut etiam toxica incaute deglutita, horrores statim inferre solent, aliaque id genus symptomata. Natura itaque hoc pacto irritata (ut ad tempus *ebullitionis* jam transeamus) quo facilius hunc hostem a suis cervicibus depellat, *fermentationem* aggreditur, solemnem nempe machinam, qua in febribus, & quibusdam aliis acutis morbis uti consuevit, cum sanguinis molem ab intestinis inimicis liberare conetur: hujus enim effervescentiæ beneficio disjunctæ peccantis illius materiæ partes, quæ sanguini æqualiter admixtæ fuerant, aggregati quodammodo incipiunt, atque adeo leviori opera subigi possunt, ut ad *dispumationem* opportune evadant. Et quidem ut hoc fiat vel ex eo plurimum referre constat, quod qui ex febribus intermittentibus moriuntur; siquidem in paroxysmo pereant, in primo illo tempore (*exhorrescentiæ* scilicet) fato fungantur; nam si ad tempus effervescentiæ pertigerint, saltem pro illa vice non moriuntur. Atque per hæc duo tempora res ægrorum in angusto versantur; quibus elapsis, tertium tempus, quod *dispumationi* dicatum est, insequitur, quo succedente symptomata omnia primo leviora fiunt, atque tandem plane evanescent. *Dispumationis* autem nomine nihil aliud significatum volo, quam materiæ febrilis jam subactæ, & quasi devictæ, expulsionem, seu separationem; atque illud quod separatur, partim (ut in aliis liquoribus cernere licet) *florum*, partim *fecum* rationem, & sortem obtinet.

His ita positis, videamus quomodo fiat, ut redeat paroxysmus, quandoquidem ægrorum fors in vado jam constituta videtur. Nimirum febrilis materia nondum tota emigravit, sed quemadmodum apum Embrya statim temporibus sensim succrescunt, ita latens hæc materia pro typorum ratione denuo caput effert. novum negotium naturæ faceffit, idem stadium decurrens, quod in præcedentibus modo ostendimus. Nunc autem si quis a me causam quæsierit, cur fomes ille delitescens effervescentia præcedenti non satis subactus, ac proinde cum reliqua materia peccante non expulsus, proindeque novas tragædias daturus, non eodem modo in omni febre intermittenti progrediatur (nam nunc unum, nunc duos, nunc tres dies exigit, priusquam ad maturitatem perveniat, novumque paroxysmum excitet) de hac re, inquam, si quis mihi negotium exhibeat, ego plane me nescire fateor. Neque vero quisquam alius, quod sciam, in hac causa tam præclare se gessit; ut arcanum hoc opus naturæ fatis enarrasse videatur. Ego Philosophi nomen non ambio, & qui titulum illum se mereri existimant, atque me fortassis hoc nomine culpandum putabunt, quod in hæc penetralia non irrumpere conatus sim, moneo illos, ut in aliis naturæ operibus, quæ ubique nobis observantur, vires suas experiri velint, antequam aliis dicam scribant. Libenter enim quæsierim, cur *equus* ad *ακμήν* suam pertingat septem annorum spatio, *homo* 21. cur in *plantarum* regno, hæc mens *Majo*, illa *Junio*, ista alio florere soleat, ut innumera alia nunc sileam. Quod si doctissimos quosque viros non pudeat suam ignorantiam in his rebus palam fateri, non video, cur mihi vitio verti debeat, si in re non minus difficili, atque forsitan prorsus inexplicabili, manus ab *επιστολή* ablineam; quippe cum persuasissimus sim, naturam non minus his loci quam in aliis quibuscumque, methodo quadam certa atque ordine progredi: *quartanosa* enim (ut sic dicam) ac *tertianosa* materia non minus naturæ legibus subjacet, iisque regitur, quam alia corpora qualiacumque.

Cum rigore atque horrore in universum *Intermittentes* omnes incipiunt, cui mox calor succedit, atque huic deinceps sudor; Per utrumque paroxysmum, tum illum quo riget æger, tum quo plus satis incalescit, vomitur ut plurimum, vehementer ægrotat, cum siti, & lingua arida, &c. Quæ quidem symptomata, iisdem omnino gradibus recedunt, quibus provehitur sudor, quo, uberius prorumpente paroxysmus solvi videtur. Satis recte valet qui modo ægrotabat, donec paroxysmus periodo sibi consueta denuo recrudescat; in *Quotidianæ* scilicet quolibet *νύκτι*, in *Tertianæ* alternis diebus, in *Quartanæ* tertio quoque die, calculatione videlicet facta ab unius paroxysmi initio, ad initium subsequens. Licet haud raro ingeminentur posteriores duo, ita *Tertiana* quolibet die invadat, *Quartana* per duos dies continuos, tertio quidem ab insultu libero manente, quandoque etiam ter tribus diebus continuis infestet, cum *Triplex Quartana* est, morbo ab isto, quem primum assumpsit, Typo nomen sortiente.

Quæ sane paroxysmi reduplicatio, & ita
brilis excessu activitatis, & nimia productio
adventitius primarium antevertit; non
prostratione, cum in agro nempe nimium illæ
paroxysmi vigor retusus, sive refrigeratione in ensiore, sive etiam
evacuationibus præter modum effusus: in hoc vero casu cum paroxys-
mus adventitius primarium insequitur, mitius insuper, neque ita pro-
fus diu atque alter ægrum affligit. In priorē infantia, materiæ tur-
gescentia sive *ὀργασμός* tardius revertentem, & sibi debitam periodum
nequaquam præstolatur, ac proinde aliquanto præmaturius desuma-
tione sua defungitur: in posteriore autem cum sanguis non jam ea vi
polleat, quæ materiæ febrili uno impetu excutiendæ sufficiat, mox al-
lium de novo paroxysmum substituit, quo ejus reliquias e sinu suo ex-
turbet. Quinimo e duabus hisce causis sibi invicem adversantibus for-
te etiam pendet tam paroxysmorum anticipatio in febre intermit-
tentē ordinaria atque regulari, quam eorumdem tardior accessio; qua-
rum utraque in his febribus frequenter occurrit, quæ *πυρεσμοί* om-
ne percurrunt, vel solitum paroxysmi tempus anticipantes, vel
eo serius accedentes.

Februm autem intermittentium quædam *Veris* sunt, quædam *Autum-
ni*: quanvis enim in tempestatibus intermediis nonnullæ oborian-
tur, quoniam tamen illæ, & minus frequentes sunt, & ad prædictas
reduci possunt (illas nempe quibus magis appropinquant,) idcirco
omnes sub duobus hisce generibus, *Vernalibus* nempe, atque *Autum-
nalibus*, complectar. Tempora ad quæ particulariter *ὡς ἐν τῷ
πολῷ* referuntur, menses sunt *Februarii*, atque *Augusti*; licet quan-
doque maturius invadant, tardius etiam nonnunquam; prout scilicet
superior pariorve in aere apparatus, vel ad easdem producendas fa-
cit, vel officit, & ex consequenti magis etiam minusve epidemice
deprædantur. Cujus rei exemplum habemus satis obvium in febribus
intermittentibus Autumnalibus anni 1661. quo anno memini fœminam
quandam ædibus meis vicinam primo Quartanæ suæ paroxysmo, ipso
scilicet *Joannis festo* correptam fuisse. Et complures alii circa idem tempus
præmaturum febribus illis correpti fuere, quæ postmodum adeo epidemi-
cæ evaserunt; quod argumento est magnum tum fuisse in ista quæ
tunc obtinebat aeris temperie, ad istos morbos apparatus, quide-
inceps procedente anno stipatiores grassabantur.

Et quidem usque adeo necessaria est hæc febrium distinctio, ut
nisi eadem in praxi sedulo contemplerur, neque de earum dura-
tione prognostico aliquo rite factō quicquam pronunciare, neque quo-
modo regimine ægrorum corpora curare poterimus, habita tum tem-
pestatum, tum naturæ febrium diversæ ratione. Verum quidem est fe-
bres utriusque tempestatis ingenium non plane dissimile nancisci,
sive modum spectes primi insultus, qui cum horrore primum incipit,
mox in calorem erumpit, ac tandem per sudorem solvitur; sive typo-
rum discrimina, quorum respectu quædam *Tertianæ* sunt, tum *Ve-
re*, tum etiam *Autumno*. Interim tamen non dubito, quin febres
istæ tota sua natura sive essentialiter distinguantur.

Atque ut de *Vernalibus* primo dicam, illæ fere omnes vel *Quo-
tidianæ* sunt, vel *Tertianæ*, & vel serius, vel ocys ingruunt pro va-
rio tempestatis apparatu. Nam per brumale frigus spiritus concen-
trati vires in suo recessu sibi acquirunt, quos appropinquantis post-
ea solis calor jam vegetos evocat, qui cum viscidis humoribus (mi-
nus tamen viscidis sunt hi, quam quos in Autumno prægressi fervores
excoxerunt ac torrefecerunt) commissi, quos durante hyeme natura
in sanguinis massa congesterat, dum avolare nituntur, implexi deti-
nentur, & quasi irreviti, adeoque vernam hanc ebullitionem concit-
ant. Eodem plane modo, quo vasa cerevisia repleta, atque in arena
vel cella frigida diutius reposita, si igni admoveantur, tumultum
statim concipiunt, & liquor ad volatum pronus est. Sanguis hoc mo-
do affectus purgationem sui molitur, atque spirituum volatiliū ope
negotium hoc sat cito peragit, nisi forte nimia viscidorum succorum
vi instructus fuerit, qui fermentationem ceptam remorentur; & li-
cet hoc ipsum accidat, effervescencia tamen verna raro continua,
suique similis manet, verum dissilire atque in diversos Paroxysmos
quasi findi solet. Sanguine enim opulenti hisce spiritibus jam turgi-
do, natura negotium suum quasi præcepit aggreditur, & quarundam
partium secretionem ad modum perfectæ solutionis per Paroxysmos
particulares peragit, priusquam universali separatione defungatur. At-
que hæc mihi quidem ratio non idonea videtur, quod verna tempe-
state, præsertim illa, quæ æstatem propius attingit, paucæ febres
continuæ occurrant, nisi forte constitutio fuerit Epidemica. Fermen-
tationes enim tunc temporis obortæ vel subito consopiantur, vel ad
intermissionem properant, vel denique partes humorum ad separa-
tionem proniores, præmature & cum vi quadam alio transferuntur, ex
quo mox *Angina*, *Peripneumonia*, *Pleuritides*, alixque id genus pe-
stiles succrescunt, quæ desinente potissimum Vere caput suum exerunt.

Animadverti, *Febres Intermittentes Vernales* rarissime fuisse diutur-
nas, semper vero salutare; ita ut vel maxime senex, vel debilis
quispiam, officiosissima damnosissimaque imperitissimi cujuslibet *τε-
ραργία* modo is probus fuerit, e medio vix queat tolli. Contigit
mihi tamen videre *Tertianas Vernales*, quæ ob Phlebotomiam, &
Catharsin indebite celebratas, & regimen insuper cum morbo male
quadrans, moras traxere etiam usque ad tempus illud, quo Autum-
nales solent invadere; quæ tempestas cum hujus morbi genio sit ad-
modum contraria, eundem continenter extinguit; Ægro interim fre-
quenti Paroxysmorum reduplicatione, & duratione longiore ita pene
confecto, ut in extremis versari videatur: quæ nihilominus (quatenus
mihi hætenus observare licuit) semper est elinctus. Neque in
convalescentibus ab hoc morbo mihi adhuc subiit videre gravissima
illa symptomata, quæ, ut infra dicetur, intermittentes Autumnales
diuturniores sequuntur; *Lethalem* intelligo *tonfillarum inflammationem*,
ventrem induratum, *tumores Hydropicos*, &c. Plus semel tamen
adverti ægros a morbi diuturnitate, & Paroxysmorum ingeminatio-
ne (accedentibus ad malorum cumulum evacuationibus repetitis) ad
summam debilitatem redactos, ut primum cœperint convalescere,
in *Maniam* incidisse, quæ pari cœpi illo passu recessit, quo eorun-
dem vires de novo redintegrabantur.

Intermittentes vero Autumnales longe aliter se habent. Primo
enim *Tertianæ*, licet quibus annis Epidemica non est, & sanos in-
vadit, cito nonnunquam se proripit, neque pluribus stipatur sym-
ptomatis, quam quæ Verno tempore contingere solent *Tertianæ*; ubi

* *Intermittentes Vernales*.

tamen epidemice grassatur, & ætate provectiores, aut pravo corporis
habitu præditos ferit, haud vacat periculo; quin etiam ad mentes
duos, vel tres, forte etiam in secuturum usque Ver tyrannidem ex-
ercet. Deinde *Quartanæ* & periculosiores sunt, & obstinatiores longe
quam sunt illæ, de quibus ultimo diximus: Ubi enim natu grandio-
res impetunt, eosdem paucis adhuc Paroxysmis multatos quando-
que jugulant; quo in casu æger tempore *exhorrescentiæ*, ineunteque
adeo Paroxysmo ut plurimum moritur, quod jam dictum. Quod si
æger in senectutis tantum fuerit confinio, nec dum ejus limen præ-
tergressus, licet non in eodem versetur discrimine, ne inter Paroxys-
mos primo lacescentes luce privetur, haud tamen facile a febre hac
elabatur, nisi vertente anno, appetenteque illo tempore, quo primo
corripiebatur. Nonnunquam etiam *heret lateri letalis arundo*, nec
nisi a morte, languescit decutitur. Quartana interim Typum sub-
inde variat, plurima etiam parit symptomata, *Scorbutum* v. gr. *Ven-
trem induratum*, *Hydropem*, &c. Juniores vero ferendo huic morbo
pares sunt, a quo nonnunquam circa *Solstitium Brumale* liberantur,
frequentius tamen non nisi adveniente *Verno Æquinoctio*, vel etiam
Autumno insequenti, ubi sc. venæ sectionem aut Catharsin admise-
rint. Sæpe non sine stupore sum intuitus infantes tenellos cum hoc
morbo per totos menses sex commissos, nec oppressos tamen, sed de
eodem, *Herculis* instar pueri, in cunis triumphantes.

Hic notaandum, quod cujusunque demum ætatis aut temperamen-
ti fuerit is, qui Quartana corripitur, si quolibet alio vitæ tempore
(vel etiam ab hoc remotissimo) eadem semel laboraverit, non diu ad-
modum enim secunda hac vice fatigabit morbus, sed post paucos ali-
quot Paroxysmos sponte sua solvetur, quod scitu dignum erat.

* *Intermittentium* autem *Vernalium* curationem quod spectat, li-
cet illas suo semper arbitrio permittendas existimaverim, & nihil
prorsus movendum, cum nemo quisquam, quod sciam, earum unquam
opera fatis concesserit, atque ex adverso, qui illas abigere sategerunt,
remediis præsertim evacuantibus, id tantum egerint, ut morbus in-
de confirmatio pertinacius obstitet; si tamen importuna ægri im-
patientia Medici opem obnixè afflagitet, Intermittentes Vernales
variis modis, & quidem cum optato exitu aggredi licet, uti mihi
non infrequenti observatione abunde constitit.

Nonnunquam *Emeticum* tempestive propinatum, ut nempe ante
Paroxysmum negotio suo defungi possit, felicissime successit: præ-
sertim si quantitatem mediocrem *Syr. de Meconio*, vel cujusvis Nar-
cotici post finitam Emetici operationem, exhibueris immediate an-
te Paroxysmi insultum.

Est ubi sanitatem videas restitutam per *diaphoretica*, quæ sudorem
in Paroxysmi solutione obortum promoveant, ægro interim optime
stragulis cooperto, id quod tantopere, ac tandiu faciendum est, quan-
diu vires ægri patiantur. Atque hoc in Veris intermittentibus, præci-
pue Quotidianis, sæpe obtinuit: humoribus enim in hac tempestate
non admodum crassis existentibus, solutio alias imperfecta futura, in
perfectam adolescit, quod quidem in Autumno nunquam accidit.

Quid quod clysteris in diebus intermittentibus per triduum, vel
quatrimum adhibiti beneficio, *Tertianas* aliquando curaverim.

Interim si ob Phlebotomiam liberiori manu celebratam (quo
tempestas ipsa parum cautos facile inclinat,) vel ob ægri debilita-
tem antecedentem spiritus illi qui subito ad desumationem se ac-
cingerent, pauperiores facti minus valeant, accidere potest, ut hu-
jusmodi febres Vernales auxiliis quibuscunque frustra tentatis, Au-
tumnalium diuturnitatem amulentur. Sane non solent illæ eousque
durare, quippe quæ vel sponte sua desinant, vel leviori remedio-
rum ope facile in fugam vertantur.

* *Intermittentes* autem *Autumnales* non tam levi opera se amo-
veri patiuntur. De illis igitur nonnulla mihi dicenda sunt. Si au-
tumnalis constitutio fuerit Epidemica, circa *Junium* adultum solent
invadere. Sin minus, *Augustum* præstolantur, & *Septembris initium*:
in subsequenteribus vero mensibus rarius occurrunt.

Cum earum ingens aliquod agmen simul invaserit, observare lice-
bit earum paroxysmos plerumque una eademque diei hora contingere,
accessionibus nunc prævertentibus, nunc postponentibus, simili pla-
ne modo, atque eodem tenore, nisi quod accidere queat, ut ordo
ille medicamentis adhibitis, quæ retardandi vel præcipitandi vi pol-
lent, in quibusdam corporibus immutetur vel pervertatur.

Observandum est etiam quod in principio febrium intermitten-
tium (Epidemicarum præcipue quæ Autumno contingunt) haud ita
in proclivi est typum sub primis invasionis diebus rite distinguere,
quandoquidem febre continua adscita primum adoriuntur, neque fa-
cile est aliquandiu, nisi diligenter adverteris animum, quicquam
aliud præter aliqualem morbi remissionem deprehendere, quæ ta-
men paulatim in perfectam definit intermissionem, & typum anni
tempestati apte respondentem.

Typorum ratione vel *Tertianæ* sunt, vel *Quartanæ*. Atque de quar-
tanis quidem illud merito affirmari potest, eas genuinam esse Au-
tumni sobolem. Utræque profecto ea affinitate inter se connexæ
sunt, ut sæpe numero vices permutare, saltem ad tempus, deprehen-
dantur, mox fortassis ad pristinum genium reditura. Sed *Tertianæ*
vernales quartanarum typos nunquam induunt, cum toto (ut ita
dicam) cælo a se invicem distinguantur. Neque porro observavi
unquam hac tempestate quotidianam contigisse, nisi quis *Tertianam*
duplicem, vel triplicem Quartanam hoc nomine censuerit *ἀνυπόλογος*
appellandam.

Has autem febres intermittentes eo fere modo suam originem nan-
cisci arbitror, quem nunc summam attingemus. Nempe anno sur-
gente atque progressu, sanguis etiam pro rata proportionem exaltatur
(haud secus ac vegetabilia quævis augmentis atque declinationibus suis
anni cursum referuntur) donec ad *ἀκμὴν* suam, ultimumque vi-
gorem pervenerit; hinc parallelis motibus cum tempestatibus anni per-
gens, eo declinante relaxari tandem, & ipse incipit; ac tum præcipue
cum ab accidentali aliqua causa promotus fuerit, puta sanguinis
immodica jactura, frigore admissio, cibis crudis atque excrementis,
balneorum usu intempestivo aliisque non paucis. Jam vero sanguis
in hoc decadentiæ statu constitutus impressioni morbificæ cuicum-
que obnoxius est, quam in illum faciet quilibet aeris constitutio,
quæ hoc tempore dictis intermittentibus est Epidemica. Atque huc
spectat ebullitio mox inducenda, qua liquorem sanguineum quandoque
valde degenerem corripiente, febris inde oriunda mali moris esse so-
let,

* *Intermittentium Vernalium* curatio.

* *Intermittentes Autumnales*.

ter, & malignis, atque horrendis symptomatibus plenissima. Illud utcumque accidit, ut sanguis spiritibus suis magnam partem exutus, & ab æstate præcedenti plurimum adustus, ebullitione sua non nisi tardissimis motibus defungatur, suæque despumationi longissimam periodum possulet.

Jam vero ut manifestum evadat, quam difficulter hæc febres (Autumnales puta) curationem admittant, hoc loco perpendendum est: Continuum hujus tempestatis atque intermittentium discrimen in eo maxime versari, quod *Continua* conceptam semel effervescentiam *συνεχῶς* unoque tenore perficiant; *Intermittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defungantur. Interim in utrisque fermentatione naturæ ductu peragitur horarum 336. aut circiter, neque enim citius aut tardius massa sanguinea in humano corpore ordinario repurgatur, si negotium naturæ permiseris: haud secus ac pomarium suam, vinum atque cerevisia suam, ac peculiarem habet periodum, qua depurentur. Quamvis autem in febribus intermittendis sanguis nonnunquam (ut in Quartana contingit) sex mensium spatio despumationem suam molietur, ac tandem perficiat; non tamen (si rite calculum ponas) plus temporis in eadem absolvenda impenditur, quam quod in continuis impendi naturaliter solet; quatuordecim enim *ῥοζήμια*, sive dies naturales efficiunt horas 336. tribuendo nempe horas quinque cum dimidia cuilibet paroxysmo Quartanarum, habebis in Quartana valorem 14. dierum, h. est horas 436. Jam si quis dixerit Quartanam, verbi causa, (eadem enim reliquarum intermittentium ratio subintelligenda est) ultra sex mensium spatium aliquando excurrere, antequam periodum suam absolvat, respondeo, idem etiam non raro in continuis febribus hujus constitutionis spectari, quæ sæpe ultra dies quatuordecim protrahuntur: in utroque nimirum casu si effervescentiam (præsertim circa febrium finem) rite atque ordine decurrere, ac sustineri vegetam curaveris, despumatio intra prædicti temporis spatium, hoc est, quatuordecim dierum, vel 336. horarum peragitur: quod si vero effervescentiam illam seu fermentationem refrigerantium medicamentorum, aut clysterum usu tunc temporis (scilicet versus febrium declinationem) importune inhibueris, & quasi frænum illi injeceris, mirum non est, si in longum evagentur, ordine quippe naturæ perturbato. Namque hoc modo laxatur quodam modo sanguinis humani tonus, unde se ad despumationem accingere cum effectu nequit. Imo vero in corporibus debilibus, & effæctis aliquando, vel sponte accidit, nisi Cardiacorum ope naturam in illis languentem adjuveris, quo sanguini despumando par sit.

Verum illud hic jam porro notandum arbitror, ea quæ de fermentationis spatio atque continuatione supra tradidimus, de illis solummodo febribus intelligenda esse, quæ statam quandam naturam atque habitum nascuntur. Sciendum enim est (neque me præterit) febres quasdam esse, tum continuas, tum intermittentes, quæ transeuntis, & incerti generis sunt, neque in suis effervescentiis ad destinatam periodum pertingunt. Hujus generis sunt quæ a levi aliqua offensa ex se rerum non naturalium, quas appellant, ut cibi, potus, aeris, & his similibus, abusu, nonnunquam ortum ducunt, his enim morbis correpti subito sæpe convalescunt. Idem etiam in adolescentulis, sanguine puro, ac multis spiritibus referto præditis, aliquando accidit: nimirum febres illorum spirituosa quadam ac nimis tenui, volucrique materia, fermentationes suas citius perficiunt, ac celeri gradu spatia sua emensæ evanescent. Ad fermentationem enim illud primo requiritur, ut materia fermentescibilis, sive illa sanguis sit, sive vinum, aut alius aliquis liquor quilibet, ea tenacitate, & viscositate polleat, ut spiritus implexos, atque irretitos eatenus detinere valeat, ut in liquoris massa moveri atque agitari possint, eodem fere modo, quo aves visco captae, aut muscæ atque apiculæ melle detentæ, motitare quidem, & murmura sua peragere possunt, avolare interim non valentes. Neque tamen, (ut obiter illud dicam) eam tenacitatem obtinere debent liquores memorati, ut spiritus prorsus obruant opprimantque, adeo ut non omnino moveantur.

His jactis fundamentis (quæ quidem nescio an aliis, mihi certe ratione non contemnenda niti videntur) mirum non erit, si illis non aliam medendi methodum superstruam, quam quæ in febribus continuis ad despumationis debitum opus rite perficiendum, adhibenda videatur: cum nimirum illæ a continuis nullo discrimine sejungantur, si ordinem species, quo natura earundem materiam expellere solet, scilicet per effervescentiam certa periodo comprehensam. Et si quod ad earum speciem, atque naturæ proprietatem attinet, illas & a continuis, & a se invicem plurimum differre non diffitear. Itaque vel methodum, quæ se natura liberare ab hoc morbo solet, caute sollicitèque observando indicium sumere oportet, quo fermentationem obortam acceleremus, atque ita ad sanitatem ægros perducamus, vel in ipsam causam specificam penetrando, danda erit opera, ut remediis efficacibus ac specificis morbo obviam eatur. Ab horum alterutro indicationes sumendæ sunt. Ego utramque viam ingressus aliquando fui, atque illæsa (uti opinor) verecundia profiteri possum, non sine summa cura atque attentione animi indefessa, sed nondum eam felicitatem adeptus sum, ut Autumnæ febres intermittentes certa aliqua praxi atque medicandi ratione tollere possim, antequam statas illas fermentationes (de quibus supra locuti sumus) peregerint, utcumque molestum hoc febricitantibus videatur; qui eoque sanitatem suam expectare inviti coguntur. Revera autem si quis inter mortales reperiat, qui sive methodo aliqua certa, sive remedio specifico adhibito, febrium harum intermittentium cursum non solum inhibere, sed etiam omnino abrumperet novit, existimo eum omni jure teneri, ut humano generi rem illam summo opere expetendam patefaciat: quod si non fecerit, ego illum, nec boni civis, nec prudentis viri nomen mereri pronunciare ausim; neque enim civis boni est, illud in rem suam vertere, quod toti generi humano tam ingens beneficium apportet; nec viri prudentis, divina benedictione semetipsum privare, quam a summa bonitate liceret expectare, si ad publicum bonum promovendum se accingeret. Honoris autem ac divitiarum longe minor apud probos ratio habetur, quam virtutis, & sapientiæ.

Quantumlibet a rem fuerit difficile, intermittentes has Autumnales certo fugare, tradam tamen quicquid ad earundem curationem præ reliquis facere mihi visum est.

* Intermittentium Autumnalium curationem non sine iugenti discrimine per Catharsin tentari (nisi eo, quem mox dicemus, modo instituat) præsertim vero per phlebotomiam, frequenti ni-

mis obse-

constitui-

Chirurgi g.

breni confon-

ter, & malignis, atque horrendis symptomatibus plenissima. Illud utcumque accidit, ut sanguis spiritibus suis magnam partem exutus, & ab æstate præcedenti plurimum adustus, ebullitione sua non nisi tardissimis motibus defungatur, suæque despumationi longissimam periodum possulet. Jam vero ut manifestum evadat, quam difficulter hæc febres (Autumnales puta) curationem admittant, hoc loco perpendendum est: Continuum hujus tempestatis atque intermittentium discrimen in eo maxime versari, quod *Continua* conceptam semel effervescentiam *συνεχῶς* unoque tenore perficiant; *Intermittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defungantur. Interim in utrisque fermentatione naturæ ductu peragitur horarum 336. aut circiter, neque enim citius aut tardius massa sanguinea in humano corpore ordinario repurgatur, si negotium naturæ permiseris: haud secus ac pomarium suam, vinum atque cerevisia suam, ac peculiarem habet periodum, qua depurentur. Quamvis autem in febribus intermittendis sanguis nonnunquam (ut in Quartana contingit) sex mensium spatio despumationem suam molietur, ac tandem perficiat; non tamen (si rite calculum ponas) plus temporis in eadem absolvenda impenditur, quam quod in continuis impendi naturaliter solet; quatuordecim enim *ῥοζήμια*, sive dies naturales efficiunt horas 336. tribuendo nempe horas quinque cum dimidia cuilibet paroxysmo Quartanarum, habebis in Quartana valorem 14. dierum, h. est horas 436. Jam si quis dixerit Quartanam, verbi causa, (eadem enim reliquarum intermittentium ratio subintelligenda est) ultra sex mensium spatium aliquando excurrere, antequam periodum suam absolvat, respondeo, idem etiam non raro in continuis febribus hujus constitutionis spectari, quæ sæpe ultra dies quatuordecim protrahuntur: in utroque nimirum casu si effervescentiam (præsertim circa febrium finem) rite atque ordine decurrere, ac sustineri vegetam curaveris, despumatio intra prædicti temporis spatium, hoc est, quatuordecim dierum, vel 336. horarum peragitur: quod si vero effervescentiam illam seu fermentationem refrigerantium medicamentorum, aut clysterum usu tunc temporis (scilicet versus febrium declinationem) importune inhibueris, & quasi frænum illi injeceris, mirum non est, si in longum evagentur, ordine quippe naturæ perturbato. Namque hoc modo laxatur quodam modo sanguinis humani tonus, unde se ad despumationem accingere cum effectu nequit. Imo vero in corporibus debilibus, & effæctis aliquando, vel sponte accidit, nisi Cardiacorum ope naturam in illis languentem adjuveris, quo sanguini despumando par sit.

Verum illud hic jam porro notandum arbitror, ea quæ de fermentationis spatio atque continuatione supra tradidimus, de illis solummodo febribus intelligenda esse, quæ statam quandam naturam atque habitum nascuntur. Sciendum enim est (neque me præterit) febres quasdam esse, tum continuas, tum intermittentes, quæ transeuntis, & incerti generis sunt, neque in suis effervescentiis ad destinatam periodum pertingunt. Hujus generis sunt quæ a levi aliqua offensa ex se rerum non naturalium, quas appellant, ut cibi, potus, aeris, & his similibus, abusu, nonnunquam ortum ducunt, his enim morbis correpti subito sæpe convalescunt. Idem etiam in adolescentulis, sanguine puro, ac multis spiritibus referto præditis, aliquando accidit: nimirum febres illorum spirituosa quadam ac nimis tenui, volucrique materia, fermentationes suas citius perficiunt, ac celeri gradu spatia sua emensæ evanescent. Ad fermentationem enim illud primo requiritur, ut materia fermentescibilis, sive illa sanguis sit, sive vinum, aut alius aliquis liquor quilibet, ea tenacitate, & viscositate polleat, ut spiritus implexos, atque irretitos eatenus detinere valeat, ut in liquoris massa moveri atque agitari possint, eodem fere modo, quo aves visco captae, aut muscæ atque apiculæ melle detentæ, motitare quidem, & murmura sua peragere possunt, avolare interim non valentes. Neque tamen, (ut obiter illud dicam) eam tenacitatem obtinere debent liquores memorati, ut spiritus prorsus obruant opprimantque, adeo ut non omnino moveantur.

His jactis fundamentis (quæ quidem nescio an aliis, mihi certe ratione non contemnenda niti videntur) mirum non erit, si illis non aliam medendi methodum superstruam, quam quæ in febribus continuis ad despumationis debitum opus rite perficiendum, adhibenda videatur: cum nimirum illæ a continuis nullo discrimine sejungantur, si ordinem species, quo natura earundem materiam expellere solet, scilicet per effervescentiam certa periodo comprehensam. Et si quod ad earum speciem, atque naturæ proprietatem attinet, illas & a continuis, & a se invicem plurimum differre non diffitear. Itaque vel methodum, quæ se natura liberare ab hoc morbo solet, caute sollicitèque observando indicium sumere oportet, quo fermentationem obortam acceleremus, atque ita ad sanitatem ægros perducamus, vel in ipsam causam specificam penetrando, danda erit opera, ut remediis efficacibus ac specificis morbo obviam eatur. Ab horum alterutro indicationes sumendæ sunt. Ego utramque viam ingressus aliquando fui, atque illæsa (uti opinor) verecundia profiteri possum, non sine summa cura atque attentione animi indefessa, sed nondum eam felicitatem adeptus sum, ut Autumnæ febres intermittentes certa aliqua praxi atque medicandi ratione tollere possim, antequam statas illas fermentationes (de quibus supra locuti sumus) peregerint, utcumque molestum hoc febricitantibus videatur; qui eoque sanitatem suam expectare inviti coguntur. Revera autem si quis inter mortales reperiat, qui sive methodo aliqua certa, sive remedio specifico adhibito, febrium harum intermittentium cursum non solum inhibere, sed etiam omnino abrumperet novit, existimo eum omni jure teneri, ut humano generi rem illam summo opere expetendam patefaciat: quod si non fecerit, ego illum, nec boni civis, nec prudentis viri nomen mereri pronunciare ausim; neque enim civis boni est, illud in rem suam vertere, quod toti generi humano tam ingens beneficium apportet; nec viri prudentis, divina benedictione semetipsum privare, quam a summa bonitate liceret expectare, si ad publicum bonum promovendum se accingeret. Honoris autem ac divitiarum longe minor apud probos ratio habetur, quam virtutis, & sapientiæ.

Quantumlibet a rem fuerit difficile, intermittentes has Autumnales certo fugare, tradam tamen quicquid ad earundem curationem præ reliquis facere mihi visum est.

* Intermittentium Autumnalium curationem non sine iugenti discrimine per Catharsin tentari (nisi eo, quem mox dicemus, modo instituat) præsertim vero per phlebotomiam, frequenti ni-

mis obse-
constitui-
Chirurgi g.
breni confon-
ter, & malignis, atque horrendis symptomatibus plenissima. Illud utcumque accidit, ut sanguis spiritibus suis magnam partem exutus, & ab æstate præcedenti plurimum adustus, ebullitione sua non nisi tardissimis motibus defungatur, suæque despumationi longissimam periodum possulet. Jam vero ut manifestum evadat, quam difficulter hæc febres (Autumnales puta) curationem admittant, hoc loco perpendendum est: Continuum hujus tempestatis atque intermittentium discrimen in eo maxime versari, quod *Continua* conceptam semel effervescentiam *συνεχῶς* unoque tenore perficiant; *Intermittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defungantur. Interim in utrisque fermentatione naturæ ductu peragitur horarum 336. aut circiter, neque enim citius aut tardius massa sanguinea in humano corpore ordinario repurgatur, si negotium naturæ permiseris: haud secus ac pomarium suam, vinum atque cerevisia suam, ac peculiarem habet periodum, qua depurentur. Quamvis autem in febribus intermittendis sanguis nonnunquam (ut in Quartana contingit) sex mensium spatio despumationem suam molietur, ac tandem perficiat; non tamen (si rite calculum ponas) plus temporis in eadem absolvenda impenditur, quam quod in continuis impendi naturaliter solet; quatuordecim enim *ῥοζήμια*, sive dies naturales efficiunt horas 336. tribuendo nempe horas quinque cum dimidia cuilibet paroxysmo Quartanarum, habebis in Quartana valorem 14. dierum, h. est horas 436. Jam si quis dixerit Quartanam, verbi causa, (eadem enim reliquarum intermittentium ratio subintelligenda est) ultra sex mensium spatium aliquando excurrere, antequam periodum suam absolvat, respondeo, idem etiam non raro in continuis febribus hujus constitutionis spectari, quæ sæpe ultra dies quatuordecim protrahuntur: in utroque nimirum casu si effervescentiam (præsertim circa febrium finem) rite atque ordine decurrere, ac sustineri vegetam curaveris, despumatio intra prædicti temporis spatium, hoc est, quatuordecim dierum, vel 336. horarum peragitur: quod si vero effervescentiam illam seu fermentationem refrigerantium medicamentorum, aut clysterum usu tunc temporis (scilicet versus febrium declinationem) importune inhibueris, & quasi frænum illi injeceris, mirum non est, si in longum evagentur, ordine quippe naturæ perturbato. Namque hoc modo laxatur quodam modo sanguinis humani tonus, unde se ad despumationem accingere cum effectu nequit. Imo vero in corporibus debilibus, & effæctis aliquando, vel sponte accidit, nisi Cardiacorum ope naturam in illis languentem adjuveris, quo sanguini despumando par sit.

defun-

defuncto, febre sua evan-
trario, vel strictiori aliquo regimine u-
gantia subinde adhibeas, (adhiberi scilicet
obstructiones expediantur, atque humores
exturbentur) vel si, quod præcipuum est, in constitutione epide-
mica venæ sectio celebretur, fiet ut morbus in longissimum tempus
procurrat, atque interim ut ægri nulle symptomatibus, iisque peri-
culosissimis exponantur.

Si vero febricitantes provectioris ætatis sint, ex utroque morbo
(Tertianas dico Autumnales, ac Quartanas) non solum diuturni-
tatis, verum etiam ipsius mortis grave periculum imminet. Hic
itaque Medicum illud agere oportet, si neque cortice *Peruviano*,
nec alia quavis methodo morbum submovere valuerit, ut naturæ sal-
tem suppetias ferat, eamque illis adminiculis sublevet, quibus ad
negotium suum peragendum opus habuerit. Certe enim in effæctis
corporibus, nisi fermentatio Cardiacorum, & corroborantis diætæ,
ut vini *absinthitis*, ac id genus similibus, beneficio sustineatur, il-
lud accidit, ut ægri incertis atque frustraneis paroxysmis divexati de-
bilitentur, atque morbus eousque duret, donec languida prius natura
paroxysmo aliquo graviore correpta, ad ebullitionis tempus pertinge-
re non possit, adeoque in ipso exhorrescentiæ tempore diem suam ob-
eant ægroti. Atque hoc in senibus non raro usu venit, qui longa
Catharticorum serie debilitati fuerunt, imo, ut aliquando visum est,
in ipso vel primorum paroxysmorum rigore penitus defecerunt cum ex-
hibito Cordiaco satis forti saltem ad tempus aliquod sustineri potuissent.

Cum sanguis tempus illud exegerit, quod ad despumationem suam
perficiendam requiritur, necessarium est, ut provectioris ætatis ægri
eodem ipso tempore, vel paulo antea insignem aliquam aeris muta-
tionem subeant, sive (quod potius optandum esset, in calidiorem
aliquam regionem commigrando, sive mutando saltem locum, in
quo primum hoc modo correpti sunt. Mirum sane est, quantum va-
leat hæc aeris mutatio ad morbum hunc prorsus abigendum. Interim
ut ante hunc temporis articulum aer mutetur, non tantum non ne-
cessarium est ad sanitatem ex hoc morbo restituendam: sed & minus
convenit. Etiam si enim quis in regionem quantumcunque Australem
& calidam migraverit, sanguis tamen ejus in morbo hoc motu se-
mel constitutus, depurationem suam ut pergat necesse est; quod
quidem beneficii frustra expectabitur ab inusitato novoque aere,
priusquam procedente atque adulto jam sanguinis motu, sanitatis
recuperandæ capax fuerit. Insignis ergo illa aeris mutatio tum demum
adeunda est, cum primum æger a paroxysmo liberari potest. Exem-
pli causa: In Quartana, quæ primum in Autumno invasit, non citi-
us aer mutandus est, quam circa Februarii initium. Interim si æ-
ger mutare locum vel nolit, vel commode nequeat, oportebit ut hoc
ipsius temporis articulo, forti aliquo medicamento utatur, cujus eæ
sint vires, ut uno quasi ictu languescentem illam depurationem po-
tenter promoveat, & si fieri poterit, perficiat. Ad hanc rem consu-
lerem ego, ut *Electuarii de Ovo vel Theriacæ Andromachi sesqui dra-
chma in aque Cælestis, vel aque Vitæ communis uncis duabus dissolu-
ta exhibeatur*, duabus scilicet horis ante paroxysmum. Id quod a me,
cum successu non infelici, in morborum hujusmodi declinatione fa-
ctum est. Licet agnoscam calidiora hæc citius exhibita vel morbum
duplicare, vel in febrem continuam permutare, quod a *Galeo* jam-
dudum observatum est. Idem in juvenibus hoc morbo detentis fie-
ri potest, cautela adhibita. Ut autem in puerili ætate idem fiat,
non tantum non convenit, verum etiam periculo non vacare du-
dum observavi.

Priusquam huic argumento clausulam addamus, illud monendum
venit. Ea quæ de febrium Autumnalium intermittendum duratio-
ne, atque de tempore ad sanguinis despumationem requisito jam di-
cta sunt, ita intelligenda esse, ut nos solum illud nunc spectemus,
quod natura vulgaribus atque usitatis tantum medicamentis suffulta,
præstare soleat. Nequaquam enim eo consilio de his rebus ita locuti su-
mus, ac si doctos ac solertes Medicos despondere animum velimus, at-
que vel de melioribus medendi rationibus excogitandis, vel nobilio-
ribus remediis inveniendis spem totam abjicere, quorum ope hujus-
modi morborum sanationem accelerent; tantum enim ego profecto
ab hoc proposito absum, ut non desperem, vel a me ipso tale quip-
piam sive methodi, sive remedii aliquando repertum iri.

Sublato morbo, æger sedulo purgandus est; incredibile enim di-
ctu, quanta morborum vis ex purgationis defectu post febres Au-
tumnales subnascentur. Miror autem hoc a Medicis minus caveri,
minus etiam admoneri. Quandocunque enim horum morborum al-
terutrum paulo provectioris ætatis hominibus accidisse vidi, atque
purgationem etiam omissam, certo prædicere potui periculosum ali-
quem morbum eisdem postea adorturum, de quo tamen illi non-
dum somniaverant quasi perfecte jam sanati.

Omnino interim cavendum est, ne purgetur æger, nisi morbo
penitus depulso. Quamvis enim partes naturales illuvie illa, quam in
illas congeffit febris, hoc pacto quadantenus sublevari videantur: no-
va tamen materia derepente succresceret, febre scilicet Cathartici im-
petu, atque humorum agitatione jam revocata, eandem suppeditan-
te; ac proinde id tantum a purgatione lucrifecerimus, ut morbus con-
tumacior evadat. Quotidiana id nos docent eorum exempla, qui in
morbi *παράκμῳ*, ut *Theoria* isti morem gerant, quæ in tollendis ob-
structionibus, & evacuando humore melancholico, qui mali fons &
origo vulgo habetur, curationis spem omnem ponit, repetitis pur-
gationibus misere plectuntur; quibus sane, quicquid id demum est
humorum, quod a corpore divellitur atque eliminatur, compertissi-
mum est nobis febrem altiores exinde radices agere, & pertinacius sta-
tionem suam tueri, quam si non fuerit proritata. Quapropter reli-
gio mihi est Catharticum propinare ante tempus illud, quo non tan-
tum paroxysmi perceptibiles, sed etiam alteratio ista, qualis qualis
ea fuerit, quæ diebus illis, in quos paroxysmus incidere debuerat,
persentiscitur, omnino evanuerint, atque unus insuper mensis fuerit
elapsus, quo quidem effluxo potionem aliquam ex lenitivis vulga-
ribus præscribo, atque eandem semel in septima ad menses duos
tresve subsequentes repetendam impero, addito etiam singulis
vicibus hausto aliquo Paregorico hora somni assumendo, finita jam
medicamenti operatione; ut nempe paroxysmo se de novo ingerendi
ansam præscindamus, quam aliter forte arripere ex occasione tumul-
tus atque orgasmi, quos vel mitissima excitant Cathartica.

Purgationibus instituendis idcirco spatia ista ampla interpono,
ut sc. æger a recidivæ metu liberetur, quæ quidem a nimis crebra

& confertim repetita sanguinis atque humorum exagitatione, de fa-
cili poterat induci. At cum jam ista res vacet periculo, Apozema
sequens frequenter usurpari poterit. 2℥. Rad. Rabarb. Monachor-
3ij. Rad. Asparag. Brusci, Petrosel. & Polipod. quer. an. 3j. Cortic.
Median. fraxini, & Tamarisci an. 3℥. fol. Agrimon. Ceterach. & ca-
pill. Ven. an. M. j. Sennæ mund. 3j℥. vini albi Epibimi 3℥. agari-
ci troch. 3ij. Sem. fenicul. 3iij. Coq. in aqua ad 1℔℥. sub finem ad-
de succi aurantiorum 3iij. In colatura dissolve Syr. Cichor. cum Rheo,
& Magistral. ad melancholiam an. 3j℥. F. Apozema, de quo capiat
1℔℥. singulis matutinis per triduum, & repetatur quoties opus fuerit.

Ut tandem *Symptomata* illa memoramus, quæ febres intermitten-
tes in declinationis statu comitantur, observandum est, Vernarum
paucissima esse, si ad illa comparentur, quæ Autumnalibus accidunt,
tum quia non ita diu hærent istæ, tum etiam, quia in humoribus
non usque adeo terrenis, & minus etiam malignis fundantur.

Primum hic sibi locum vendicat, subinde occurrens * *Hydrops*;
unde primo quidem crura intumescunt, deinde etiam venter; qui
exinde nascitur, quod scilicet sanguis crebris illis fermentationibus,
quas peperit morbi diuturnitas (præcipue in natu grandioribus) plures
spirituum manipulos prodegit, unde summa eorundem inopia jam
jam laborans, succos cum alimentis ingestos non amplius valet assi-
milare, quorum cruda adhuc indigestæque moles in crura tandem
deponitur, atque his jam distentis, neque ulterius quicquam admit-
tentibus, in ventrem etiam, unde verus *Hydrops* formatur. Raro
autem juvenes obsidet hæc malorum Ilias, nisi Cathartici per fe-
bris decursum sæpenumero iteratis eandem inconsulto nimis accer-
siverint.

Verum *Hydrops* ex causa memorata superveniens aperientium &
catharticorum usu facile sanatur, si modo recens fuerit. Neque mi-
hi molestum est, quoties hunc natum morbum audio atque intel-
ligo, nempe de rei exitu omnia bona tunc temporis animo conci-
piens: Nonnullos enim usu Apozematis jam appropriati perfunavi.

Veruntamen observavi, frustra esse, si quis *Hydropem* ex febre
intermittenti natum, medicamentis purgantibus tollere conetur, fe-
bre illa adhuc durante: Febris enim hoc pacto radices profundius
agere deprehendetur, non autem amovebitur *Hydrops*; expectan-
dum itaque, donec febris exulet, ac tum demum negotium pro-
spere suscipiendum.

Verum enim vero si tam importune atque acriter instet sympto-
ma hoc, ut ejus curatio non eo usque videatur differenda, donec
febris recessus Catharticorum usum permittat, aggredienda omnino
illa est infusionibus rad. *Raphani rusticani*; *summitat. Absinthii*, &
centaurii min. baccarum Juniperi, *Cineyrum Geniste*, &c. in vino fa-
cis; quæ non solum huic symptomati obsistunt, efficitas sanguinis
vires de novo instaurando, sed naturæ etiam de morbo jam trium-
phaturæ tempori subveniunt.

* Infantes autem post febres autumnales cum continuas, tum in-
termittentes, Hæctici aliquando fiunt. Ventres eorum inflati, tu-
mentes, ac duri evadunt; sæpe etiam tussis, aliaque tabidorum
symptomata subnascentur, quæ *Rachitidem* plane inveniuntur. Hos
ego sequenti modo tractando consulos. Paretur portio Cathartica,
quam in febrium continuarum sine, assumendam præscripsi. Hujus
capiat infantulus Cochli. j. vel ij. plus minus pro ætate, mane per
9. dies, uno atque altero die, si opus fuerit, intermisso. Interim
vero purgatio ita moderari debet ac regi, dosin vel augendo vel mi-
nuendo, ut ultra 5. vel 6. sedes singulis diebus non procedat. Post
finitam cathartici totus venter inungatur linimento aliquo aperitivo
per aliquot dies. Sequenti uti soleo. 2℥. Ol. lilior. & tamarisci an.
3ij. Succ. rad. brionie & apii an. 3j. bulliant ad succorum consum-
tionem, addendo unguenti de albæ & butyri insulsi an. 3j. gummi
ammoniaci in aceto soluti 3℥. cere q. s. f. linimentum. Sane quam-
plurimi infantes, etiam vera *Rachitide* laborantes, hac methodo a
me liberati fuerunt.

Veruntamen (ut ante monuimus) cavendum sedulo ne purga-
tionem aggrediamur, nisi febre jam perfecte fugata; licet enim hoc
pacto humoris in partes naturales amandati portio quadam evacua-
ri non sine causa videri possit, nihilominus ab ipsa febre nova su-
binde pravæ materiæ copia suggeretur, quæ non solum purgatio-
nem reddet frustraneam, verum & ipsum morbum diuturniorem
præstabit, ob rationes antea memoratas.

Observatu non indignum est, quod cum febres Autumnales te-
neram ætatem diu cruciarint, nulla spes sit easdem abigendi, do-
nec abdominis regio, circa lineam præcipue, indurari atque tume-
fieri occæperit; iisdem enim gradibus quibus hoc symptoma super-
venerit, febris etiam fugam meditatur. Neque forte ex meliori a-
liquo prognostico morbum hunc brevi abiturum dixeris, quam si se-
dula animadversione suboriri hoc symptoma perspexeris. Idem por-
ro in crurum tumoribus obrinet, qui in adultis aliquando spectantur.

Ventris tumor qui infantibus accidit post has febres, quibus annis
aeris constitutio intermittens Autumnalibus progignendis epide-
mice determinatur, tangentis digitum haud aliter ferit, ac si ma-
teriam aliquam continerent viscera in Scirrhum induratum; cum
qui aliis annis, simili licet *προγεσσι*, contingit, talem ita afficit,
cui tensio tantum foret hypochondriorum a subjectis flatibus. Hinc
nisi annis quibus intermittentes Autumnales prædominium habent,
veræ *Rachitides* rarius occurrunt, quod observatu dignum.

Consillarum dolor & inflammatio post febres five continuas, five
intermittentes, cum deglutendi primum difficultate & molestia,
supervenientibus, deinceps raucedine, oculis cavis, & *Hypocrati-*
tica facie, mortem certo imminuentem præmonstrant, intercisa pla-
ne omni redintegrandæ sanitatis spe. Funesto huic symptomati pro-
ducendo evacuationes iusto copiosiores in agris vi morbi jam fere
attritis, ut & longiorem febris moram sociam operam ut plurimum
commodasse observavi.

* Multa alia sunt accidentia quæ morbos hosce consequi solent
ob purgationem vel non omnino, vel non rite celebratam, quibus
impræsentiarum enumerandis superfedebimus, cum curationis eadem
fere ratio sit utrobique, nempe sedimenti ab effervescentia præcedæ-
nea depositi repurgatio, quod sua mora malis hujusmodi materiam
præbuerit. Quanquam licet hic loci non contemendum sympto-
matis genus referre, quod non tantum purgationibus & evacuatio-
nibus aliis quibuscumque, venæ sectioni præsertim, cedere dedi-
gnatur, verum & ab illis vires sibi acquirit. Illud autem peculia-
ris

* *Hydrops*. * *Rachitis*. * *Mania species quædam*.

ris quædam est ac sui generis *Mania* intermittentes diuturniores (Quartanas præcipue) nonnunquam excipiens, quæ communem medicandi rationem aspernatur, & post evacuationes fortiores adhibitas in miseram quandam stultitiam degenerans, non nisi cum ipsa ægrorum vita terminatur. Miraturque sæpenumero sum, nullam hujus rei mentionem ab Authoribus factam fuisse, cum non raro accidisse viderim. Cum reliquæ amentiar species copiosis evacuationibus, & venæ sectione, & Catharsi ut plurimum perferantur, hæc neutram potest ferre. Sed cum jam æger in sanitatis limine est, si vel Enema ex lacte saccharato semel injeceris, statim de novo recrudescet malum. Et si reiteratis purgationibus, venæ sectioneque contra nitamur, ejusmodi evacuationes morbi quidem ferociam possint domare, ægrum vero certissime non tantum fatuum, sed & incurabilem omnino reddent. Quod quidem nemo mirabitur, qui secum reputaverit, alteram amentiar speciem a nimis exaltata & vivida sanguinis crasi produci, hanc vero ab ejusdem debilitate, & ut ita dicam, vapiditye a diuturna fermentatione quam invenit febris, qua mediante spiritus functionibus animalibus obeundis impares plane sunt.

Huic malo ad hunc modum mederi soleo. Ægro ter in die Cardiacum aliquod e generosioribus exhibeo dosi paulo liberaliori, e. g. *Theriaca Andromachi*, *Elect. de ovo*, *pulverem Comitissæ*, *pul. Gualtieri Raleigh*, vel similem in *Epidemica*, *Theriaca*, vel alia. Possunt etiam in alia quavis forma exhiberi Cardiacæ medicamentæ: æger interim victu quidem moderato, Analeptico tamen, & potu generosiore reficiendus est; foras ne exeat, in lecto se diu multumque contineat. Alvus sub hoc regimine justo erit astrictior, unde ut etiam a calidiorum medicamentorum usu a febre quis sibi metuat, sed vano prorsus timore, cum spiritus antecedente morbo pene exhausti novum deinceps non valeant accendere. Post aliquot septimanas paulatim in melius proficiet, quo tempore omitti possunt Cardiacæ ad dies pauculos. Diætæ vero Analeptica jugiter instituenda, & post brevem intermissionem repetendus est denuo Cardiacorum usus, atque in eo persistendum donec integra sanitate fruatur.

Diætæ methodus *Maniam* etiam quæ has febres minime exceperit, quandoque sanavit, frigidiori sc. atque infirmiori temperamento præditis. Anno nuper elapso *Sarisburiam* accerserat, ut cum Medico erudito & sagaci, inihique conjunctissimo, Domino Doctore *Thoma* fœminæ nobili consulere, cui imaginatio haud parum fuit læsa. Verum adhibitis, etiam cum jam prægnans esset, remediis modo dictis, ad sanam omnino mentem rediit.

Attamen *Mania communis*, quæ vegetis hominibus atque etiam nulla febre prægressa, accidere solet, alius sane prosapiæ est, ac proinde longe diversa, quoad evacuationes, methodo tractanda, tametsi vel in hac specie, ea quæ cerebrum atque spiritus animales corroborant, haud omitti debent. Curationem autem ejus, etsi non sit hujus loci, obiter tamen prædictæ speciei subnectere non gravabor, ne quis forte præ similitudine morborum in errorem illabatur.

In Junioribus ac sanguineo habitu præditis, mittatur sanguis ex brachio ad uncias octo vel novem bis vel ter, diebus tribus inter singulas venæ sectiones interpositis: Deinde semel extrahatur sanguis ex venis jugularibus. Ultra hunc modum repetitæ venæ sectiones ægrum potius in stultitiam ducunt, quam curationem absolvent. Postea aggrediatur usum *Pil. ex duobus*, quarum drachmam senis, vel scrupulos duos (pro ratione operationis) capiat semel singulis septimanis stato die, ita ut si, verbi gratia, die lunæ primo pilulas assumpserit, præcisè eodem ipso die, nec frequentius, sequentibus septimanis eadem repetantur per longum tempus, usque dum perfecte convalescit. Hac methodo humores qui in hoc morbo mentis arcem impetere solent, sensim in inferiores sedes dilabentur, alia quasi potius eis inducunt.

Diebus a purgatione liberis per totum decursum Electuario sequenti, vel alio medicamento eadem virtute prædito utatur.

24. Conf. Absinth. Rom. Anthos, & Theriac. Androm. an. 3j. conf. Flavæd. Aurant. Angelic. condit. nuc. mosch. condit. an. 3℞. cum s. q. syrup. Caryophyl. f. Electuarium, capiat ad magnitudinem nucis moschatæ bis in die, superbibendo haustulum vini Canarini, cui fuerint frigide infusi flores *Paralyseos*.

Febris Continua atque *Intermittentes* quas supra descripsimus, soli ferme erant morbi *Epidemici*, qui dum illa constitutione quæ per annos 61. 62. 63. 64. regnabat, emicuerunt: quot retro annis eum obtinuerint principarum, non habeo dicere; id certo scio, quod ab anno 64. ad annum usque 77. rarissimæ omnino Londini comparuerunt.

Dicendum mihi etiam erat de *Variolis*, quales nam scilicet erant istæ quæ tum contingebant, respectu habito ad constitutionem illam; quandoquidem (ut jam subindicavi) vario admodum se habent modo pro varia constitutione quæ incessunt: sed cum non satis attente per id temporis animum ad eas adjecerim, missas jam facio: id tantum tradam illis peculiare, quod sc. iis annis habentibus, sub initio Maji confertissime invadebant, supervenienti vero *Epidemici* Autumnalium cohorti (febrem volo continuam, atque intermittentes) locum dare solebant. In pustularum summitate foveolæ quædam ad instar capitum acicularum minorum plerumque subsidebant; atque in discreto genere æger octavo maxime die periclitabatur, quo tempore, abrupto derepente qui hucusque dimanaverat sive sudore, sive madore, externa exarescebant, nec revocari poterat sudor Cardiacis quibuscunque, æger phrenitide, atque anxietate insigni corripiebatur, cum magno dolore & ægritudine, utinam frequenter, at in parva quantitate, reddebat, ac intra paucas horas de magna spe decedens, ad plures migrabat.

SECTIO SECUNDA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica Annor. 1665. & 1666. Londini.

Prægressa Hyeme frigidissima, & sicco gelu in Veris usque tempora indefinenter perdurante, cum ex improvviso solveretur, sine se. Martii, ineunteque, ex Anglorum computo, Anno 1665. *Peripneumonia*, *Pleuritides*, *Angine*, alique id genus morbi inflammatorii magnam derepente stragem edebant: quo ipso tempore caput etiam

extulit *Febris* quædam *Continua Epidemica*, a febrium continuarum genio, quæ præcedenti constitutione vigeabant, longe diversa; quarum vix ullæ ea anni tempestate solebant invadere. Dolor capitis quam in priore illa intensior, & vomitiones adhuc magis immunes ad hanc febrem accedebant; in plerisque *Diarrhæa*, quam prius diximus assumpto Emetico præcaveri potuisse, jam ab eodem provocabatur, nec tamen cessabat vomitatio. Externa hic pariter ac in febribus constitutionis præcedentis sicca reperiabantur; attamen, præmissa maxime venæ sectione, æger in sudorem solvi poterat, quo provocato leviora mox symptomata; atque hoc nullo non morbi tempore fieri potuit, cum in febre prægressa nec tuto ante diem 12. vel 14. id tentaveris, nec facile voti fueris compos, sanguis sæpe *Pleuriticorum*, & *Rheumatismo* laborantium sanguinem colore referebat, non vero usque adeo Gelatina illa albescente, quæ illorum sanguis pertexitur. Hæc primo erant Phenomena hujus morbi *Διαγνωστικά*. Anno vero surgente ipsa *Pestis* irruit magno symptomatum Pathognomicorum numero stipata, *Carbunculis*, viz. *Bubonibus*, &c. Hæc indies magis ac magis invalescens, circiter Equinoctium Autumnale *ἀκμὴν* attigit, quo jam instante unius septimanæ decursu octo plus minus hominum millia delevit; tamen duo ad minimum Civium trientes ob metum contagii se in rus subduxerant; a quo tempore receptui canere cœpit, & urgente brumali frigore tantum non evanuit, nisi quod sparsim unum atque alterum hinc inde feriret per omnem Hyemem, & in sequentis Veris exordium, quo apparente & ipsa omnino est deleta, mansit tamen *Febris*, quamvis non ita *Epidemica*, excurrente integro anno sequente, imo ad Ver usque ortum Anni 1667. De his nonnulla hic subnectam.

CAPUT II.

Febris Pestilentialis & Pestis Annorum 1665. 66.

In superioribus obiter admonui e febribus nonnullas in malignarum classe vulgo reponi, cum indomita symptomatum sævitia, quæ huic opinioni patrocinari videntur, non a venenosa morbi indole, sed a therapeja perperam administrata proficiscatur. Nam cum ad morbi solutionem a natura destinata haud satis attenditur, sed alia medendi ratio temere instituitur, hinc perturbata totius corporis œconomia, ac omnibus susque deque conversis, non modo tristissima rerum facies ultra consuetum morbi morem inducitur, verum morbus jam a seipso alius etiam anomalis accidentibus velut alienigenarum satellitio stipatur. Atqui *Febris vere maligna* non est omnium dierum morbus, utpote quæ ab aliis febrium speciebus ob symptomatum anomaliam ea nomenclatura utcunque insignitis, tota sua idea ac ingenio dissidet. Revera enim cum ipsissima peste specie convenit, nec ab ea, nisi ob gradum remissionem, discriminetur. Quocirca utriusque affectus ortum ac curationem in eodem capite complectar.

Aeris massæ occultam ejusmodi sive crasin sive texturam obtinere, quæ diversarum diversis temporibus ægritudinum ansa atque pararia existat, nemini obscurum est, qui modo animadvertit unum eundemque morbum certa aliqua tempestate infinitam mortalium vim corripere, ac Epidemicum fieri, alias tamen unum alterumve hominem afflixisse contentum, ulterius non grassari. De Variolis, ac in primis de peste, hujusce capitis argumento, res est sat superque manifesta.

At vero quæ qualisque sit illa aeris dispositio, a qua morbificus hic apparatus promanat, nos pariter ac complura alia, circa quæ veteris ac arrogans Philosophantium turba nugatur, plane ignoramus; quicquid sit, hoc saltem nomine Dei Opt. Max. clementiam ac bonitatem meritissimo jure veneramus, quod aeris constitutiones, *λοιμώδεις*, id est, pestem malorum omnium inmanissimam, ac humano generi maxime internecinum inferentes, rarius evenire voluerit, quam quæ cæteris affectibus minus exitalibus suscitandis inserviant. Unde fit quod hunc orbem nostrum *Britannicum* pestis vix frequentius quam post annorum circiter triginta vel quadraginta intervalla (summo sc. perniciæ vigore, ac tota furiant acie) adoriatur. Quæ per annos aliquot pestem insigniorem subsequentes, sparsim occurrunt pestiferorum funera, paulatim imminui ac evanescere solita, pestilenti aeris diathesi etiamnum ex parte perseverandi, nec dum in aliam salubriorem penitus immutata attribuenta sunt, quippe quæ antegressæ messis duntaxat spicilegia reputari debeant. A quibus etiam nuperæ luis reliquiis fit, ut febres quæ anno post graviorem pestem uno aut altero passim grassantur, pestilentes esse soleant, & licet aliquibus veræ pestis notis destitutæ, tamen ejusdem naturam ac indolem quamplurimum referant, nec non consimilem medendi rationem sibi vindicent, quemadmodum inferius ostendemus.

Verum præter istam aeris constitutionem, seu causam communiorum, accedant oportet & alia procatartica, nimirum *μίσματος* sive seminii a pestifero aliquo corpore, vel immediate ac proprie consortio, vel mediate, ac per fomitem aliunde transmissi, susceptio. Hoc enim si instante qualem diximus aeris diathesi fieri contingat, ab exigua primum scintilla mox horribile erumpit incendium, ac densatis undique funeribus, universo aeri per istum terræ tractum a peste, tum laborantium halitibus, tum mortuorum cadaveribus, labes & contagium inducitur; adeo ut ad tristissimæ ægritudinis propagationem jam non amplius vel fomite, vel personali consortio opus sit, verum quemcunque hominem, vel summa cura a peste correptis semotum, ipse aer cum spiritu intro subiens per se ac suo inarte iussu valeat, modo ille corpus habeat humotibus, ad afflatum excipiendum paratis, refertum.

Quamquam autem hic morbus, cum duntaxat sporadicus existit, nullo tempestatis discrimine paucos aliquot, tradito quasi per manus contagio, affligat, tamen ubi adest etiam *Epidemica* aeris constitutio, exoritur circa eam anni partem quæ inter Ver ac Æstatem ambigit, utpote quæ ad producendam ægritudinem, cujus essentia in humorum *φλογώση* sive inflammatione, ut postea ostendemus, in primis consistit, maxime idonea atque incommodata sit. Porro & sua habet incrementi ac declinationis tempora, non secus ac cætera rerum naturalium species. Nascitur eo quo diximus tempore, crescente anno adolefcit, eodemque vergente collabescit, donec tandem aeternam in diathesin huic morbo adversantem, glacialis bruma transmutet.

Quod si tempestatum anni vicissitudines in hunc affectum nihil imperii

imperii exercebant, verum senium pestilentiale, nulla aeris mutatione domabile de alio in alium perpetua propagationis serie transmitteretur, fieri non posset, quin ubi in frequentiore aliquam Urbem semel pedem intulisset, continuata strage funera usque & usque densaret, donec tandem nemo superesset, in quem pestilentis miasmatis labes impingat. Atqui contrarium saepe evenisse animadvertum est numero extinctorum, quos unica mensis *Sextilis* septimana ad aliquot millia extulerat, sub *Novembris* exitum valde imminuto ac propemodum nullo. Nec tamen distitit fieri posse, quod & nonnulli auctores factum prodiderunt, ut pestis aliis etiam anni tempestatibus caput primum exeret; hoc autem rarius accidit, nec ejusmodi lues in populum admodum drabacchatur. Interea, aeris dispositionem quantumvis *καυώδη* pesti suscitandae per se imparem esse vehementer suspicor, quin pestilentia morbum alicubi semper superstitem aut per fomitem, aut per pestiferi alicujus appulsum, e locis infectis in alios deferri; ibidemque non nisi accedente similitudine aeris diathesi popularem fieri. Alias enim non assequor, qui fiat, ut in eodem celi tractu dum unum aliquod oppidum peste gravissime affligitur, aliud non longe distitum, omnem commercii necessitudinem cum loco contagioso caute inhibendo, prorsus immune se praestiterit; quemadmodum non ante multos annos pesti per universam fere *Italiam* immaniter grassanti, *Magni Ducis* cura atque prudentia aditum in *Hetruriae* fines penitus interclusit.

Primus insulsus rigorem ac horrorem, quemadmodum & febrium intermittentium accessiones, fere perpetuum habet comitem. Mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem, ac si torculari premeretur, febris ardens usitata symptomatum *συνδρομή* stipata, inde sinentur agros divexant, donec aut mors ipsa, aut benigna *Bubonis*, vel *Parotidis* eruptio, quae materiam morificam foras ablegat, eos ab letuolissimo discrimine liberet. Rarius quidem accidit, ut citra ullam febris praesensionem ingruat, ac homines de improvviso e medio tollat, *maculis purpureis*, praesentanei interitus nunciis, etiam dum in foro versantur, erumpentibus. Quae repentina exanimatio (quod animadversione dignum) nisi in pestis admodum furens exordium vix contingit, remittente ac refracta jam lue, aut in annis, in quibus non existit popularis, nunquam observata est. Fit etiam nonnunquam, ut tumores prorumpant, nec febre, nec graviore aliquo symptomate praegresso, quanquam suspicor rigorem, & horrorem, leviusculum, ac minus perceptibilem semper praecessisse. Quibus autem hoc obtingit, iis integrum est per publicas plateas pro lubitu obambulare, ac communia vitae munia, sanorum more, sprete omni regiminis cura, obire.

Ceterum quod ad morbi essentiam spectat; eam enucleate definire in me non suscipio. Nec fortasse hominibus cordatioribus rem minus importunam ille facere videbitur, qui a me postulat, quid hanc aut illam aegritudinis speciem constituat, quam ego etiam facerem, si ab illo idem de *Equo* v.c. inter animalia, vel de *Betonica* inter stirpes vicissim sciscitarer. Nimirum certissimis ubique legibus, ac artificio sibi soli intellecto rerum omnium generationes natura parens exequitur, quaque uspiam e causarum gremio in actum ac quasi in lucem educit, eorum essentias, quidditates, ac differentias constitutivas, altissimis tenebris obvelat. Hinc unaquaque morborum non minus quam animalium aut vegetabilium species, affectiones sibi proprias perpetuas, ac pariter univocas ab essentia sua promanantes, sortita est. Neque interim magnopere urgebit ista Quaestio, Qui demum morborum medela administrabitur, dum causae ipsorum nos latent? Quandoquidem non causarum, sed methodi convenientis atque experientiae comprobatae cognitione, affectuum plurimorum curatio absolvitur. Sed ut ad rem redeamus. Quoniam simularum omnium morborum ortus a qualitatibus vel primarum, vel secundarum vitio (quod solum in hac rerum caligine nobis licet) deducere solemus, prope est ut credam pestem peculiarem ac sui generis febrem esse, quae a particularum sanguinis spirituosorum *inflammatione*, originem ducit, utpote cujus naturae subtilissimae, prae tenuitate sua, maxime proportionatae ac adaequatae videntur. Quod si subtilitate qua potest maxima pollet (ut in principio & statu constitutionis Epidemicae videre est) subito ac quasi ex improvviso calorem nativum dissipat, & aegrum e medio tollit. Cadaveribus interim hujus morbi ferocia tam subito extinctorum maculis purpureis undequaque conspersis, atque foedatis, nempe fibris cruoris praeter intestini conflictus violentia dissilientibus, & compage ipsius prorsus dissoluta. Atque haec tragœdia prae hujus quasi flammæ subtilitate eximia, etiam sine aliqua sanguinis febrili ebullitione, vel alterius aegritudinis praesensione, cietur. Secus quam ut plurimum accidit, ubi causa morifica minus subtilis existit, & quasi obtusiori telo vitam impetit. Discriminis modus pinguiori exemplo sic adumbretur. Si acus vel quid aliud cuspidis graciliori praeditum pulvinari supponatur, ac vi adigatur, illud, aequae ab obtusiori instrumento similiter adacto, in sublime non attollitur, sed perforatur. Verum ejusmodi subitanea extinctio rarius occurrit, nec nisi (ut supra innuimus) circa initium pestis, vel incrementum. Etenim, ut in aliis febribus, plerumque rigor atque horror primum invadit, quem calor mox excipit, & tantisper excurrit, donec particulae cruoris inflammatae provido naturae ductu ad emunctoria amendantur, ac ibidem ad instar phlegmonum communium in pus vertantur. Jam si inflammatio adhuc remissior existat, febres, quas pestilentes vulgo appellant, producere solet; ut in fine pestilentis constitutionis saepenumero accidit, ac forsitan etiam uno alterove post anno, donec ista febrium species prorsus dispareat.

Certe, me iudice, in inflammatione ista, quam Latini *Ignem Sacrum* appellant, quamdam pestis imaginem non obscuram intueri licet. Est enim morbus hic apud saniores Medicos febris continua a sanguinis parte tenuiori corrupta ac inflammata originem ducens, a qua natura se liberet, eam in corporis aliquam partem externam expellit, in qua tumor, aut potius (cum tumor adeo notabilis saepe non appareat) macula rubra, lata, dispersa, quam *Rosam* appellant, oritur. Solvitur autem ista febris, postquam uno atque altero die aegrum afflixit, critice per hunc tumorem, & proinde aliquando in glandulis sub alis, vel in inguinibus dolor, ut etiam in peste fieri consuevit. * Et fere invadit hoc malum ut pestilentia, cum horrore & infrequenti calore febrili, ita ut qui ipsum ante non sunt passi, existiment lue pestifera se corripit, donec tandem in crure, aut alio loco sese affectus prodat. Quibus accedit, quod & ma-

ligni aliquid huic morbo inesse nonnulli Authores suspicantur, ac proinde curationem in sudoriferorum atque alexipharmacorum usu constituunt. Haec quidem flamma, ubi ebullitionem commoverit, cujus ope particulae sanguinis leviuscule ustulatae ac quasi syderatae brevi spatio foras ablegantur, sponte sua, nec ulteriorem noxam molita, extinguitur.

Veruntamen Ignis noster isto *Sacro* longe *divinior* est, ut qui summa qua pollet substantiae tenuitate intimiores corporis recessus ad instar fulgeris permeare aptus natus sit, spiritibus cruoris derepente profligatis, ipsiusque compage nonnunquam citius dissoluta quam natura praecipiti malo oppressa, ebullitionem febrilem (solemnem nempe machinam qua quicquid sanguini infestum est, suis e finibus amovere fatagit) concitare valeat.

Quod si quis mihi hic litem paret de eo quod huic morbum ab inflammatione oriri existimem, is attendat non modo febris praesentiam, sed & complura alia huic sententiae suffragari, nempe sanguinis detracti colorem, qui Pleuriticorum ac Rheumatismo laborantium sanguinem plane amulatur; adustam *Anthraxum* faciem, Pyrotici actualis impressioni non ab similem; nec non *Bubones* ipsos, qui inflammationem aequae solemniter excipiunt, ac eandem alij cujuscunque generis tumores consequi solent, uti, & inflammationes pleraque omnes in abscessum terminantur. Quin & anni tempestas, qua Epidemica pestis ut plurimum exoritur, ad hanc rem symbolum suum conferre videtur. Eodem enim tempore, nimirum quod inter vernum aestivumque medium est, *Pleuritides*, *Angina*, aliaque inflammatae sanguinis affectiones populariter ingruere consueverunt: quemadmodum etiam nunquam frequentiores mihi visae sunt, quam per aliquot septimanas, quae nuper *Pestis Londinensis* exortum antecesserunt. Nec vero nullius est momenti illum ipsum annum tot millium strage funestum, alioquin mitissimum ac saluberimum extitisse; omnesque qui a peste immunes perstiterunt, nunquam meliori valetudine usos fuisse; quin & eos qui ab eadem convaluissent, cachexiae aliisque affectibus a residua priorum morborum labe provenire solitis, non magis obnoxios deinceps vixisse. Quibus accedit, quod & quantacunque latitudinis *Apostemata* & *Carbunculi*, postquam inflammatae particulae una cum sanie decessissent, Chirurgicis auxiliis, iisque, non admodum conquisitis, facile sanata fuerint.

Verum perquirat hic fortasse aliquis, si pestis in inflammatione quadam consistat, qui fiat ut medicamenta calidioris census, qualia sunt *Alexipharmaca* prope omnia, tam ad hujusce affectus Therapejam, quam Prophylaxin tanto cum fructu usurpentur. Cui respondeo, illa duntaxat per accidens auxilium praestare, nempe Diaphoreseos quam suscitant, beneficio, quo particulae sanguinis inflammatae dissilantur, atque exterminantur. Quod si forte exhibita sudores commovere non valeant (ut saepe accidit) mox sanguinis incendium ab additio calore magis efferatum, eorum noxam palam proclamant. Prophylaxin ut verbo attingam, non sum nescius etiam ad illam *Antidotarium* calidorum usum passim depradicari, at quo emolumento adhuc probandum restat. Imo vinum liberius ingurgitatum, aliquaque fortiora praeservativa statis horis dietim assumpta, complures, qui alias salvi intactique verisimiliter permansissent, in hunc affectum conjecerunt.

Quod ad harum Febrium Therapejam attinet, erunt fortasse, qui ne teneritatis atque arrogantiae eonimine insimulabunt, quod ab Urbe, dum nuper pestis grassaretur, maximam partem complurium milliarium intervallo semotus, adeoque observationum copia minus instructus, de hac re tamen differere sustineam. Verum tum Medicis illis longe peritoribus, quibus per totum calamitosae luis decursum inter media pericula & mille mortis imagines commorandi animus ac fiducia non defuisset, tamen ea, quae crebriori usu de hujusce morbi ingenio annotassent, in lucem edendi voluntas haecenus defuit, mitior, uti spero, de consilio meo sententiam latari sunt omnes boni, quod meam de truculentissimo affectu sententiam, paucis quidem, sed propriis observationibus superstructam, in medium expromam.

Ac primus quidem locus *Indicationibus curativis* debetur, quae eo in universum dirigendae sunt, aut ut naturae ductum in exterminando morbo accurate sequentes, eidem subsidiariam porrigamus manum; aut ut methodo, qua natura in intestino hoc hoste debellando uti solet, minime fidentes, diversam ac tutiorem ex nostro penu atque artificio vice illius substituamus. Nisi forte hic aliquis regerat rem etiam satis feliciter per pestifuga alexiteria geri posse, quorum ingentem apud practicos copiam reperire est. Verumenim vero an non auxilium quod praesent hujusmodi medicamenta, potius manifestae ipsorum facultati, qua sudores affatim proliciendo simul materiae morificae exitum aperiant, quam occultae cuidam indoli, qua a natura ad pestilentis malignitatis labem delendam donata fuerint, referri debeat; magnam atque ancipitem habet disceptationem. Nec de hisce tantummodo, sed & de aliorum morborum alexiteriis dubitare fas est; utrum evacuationem aliquam sollicitando, potius quam virtute quadam specifica aegrotantibus non succurrant. Qui enim, v. g. in lue *Venerae* (vel *Mercurium* vel *salsaparillam*,) veneni in isto morbo reperti alexipharmaca abjiciat, adducenda sunt ei curationum exempla, in quibus ille sine sputo aut secessu, haec vero sine sudoris suscitatione sanitatem aliquando restituerit, quod ego quidem credo ei admodum difficile futurum. Mihi autem verisimile est, peculiare pestis remedium, propriumque ipsius perniciosi alexiterium adhuc in naturae sinu abditum delitescere, nec eandem nisi rationem quadam mechanica tolli posse.

Quocirca ut intentionem illam priorem paulo plenius expendamus, quae eo spectat, ut naturae in materiae morificae exterminatione suo more & modo auxilium suppeditetur; advertendum venit, quod in vera peste natura, dum neque sponte sua aberrat, neque vi aliqua transversim agitur, per *abscessum* aliquem in emunctoriis erumpentem, unde materiae exitus patescit, negotium suum exequitur. Atqui in febre, quam pestilentem nuncupamus, mediante diaphoresi per universam corporis superficiem idem efficitur. Unde colligere est, pro diversa, quam natura in utroque morbo praemonstrat, via ac ordine etiam diversam medendi rationem institui debere. Nimirum si quis materiam veram pestis, ope sudoris amoliri fatagat, is diversa a natura via insistit, utpote quae id per apostemata molitur. Contra vero qui alias quam per sudores febris pestilentis materiam eliminare tentat, is cursum instituit cum naturae ductu ac *πορῇ* nequaquam convenientem. Ceterum in

* Vide Sennertum, lib. 2. c. 26. de febr. Sympt. contin.

in peste vera, quoniam idoneo ac certo remediorum genere naturalis morbosae materiae ejectio, id est, apostematum eruptio promoveri possit, nondum constat, nisi quis forte victum corroborantem atque Cardiaca ad illud conferre posse existimet (quae tamen multum dubitarem, ne ægrum, jamjam plus æquo calescentem, in maiorem æstum conjiciant. Certe sudores in hoc casu frustra esse compertissimum habeo; quanquam haud inficior post magnos sudores ad trium quatuorve horarum spatium productos, ac deinde abruptos tumorem se in conspectum dare, quem ego a sudore proficisci minime arbitror, utpote quo vigente, nullum appareat eruptionis indicium, finito quidem, veluti per accidens consequatur, nimirum cum jam aliquam sarcinae partem, quae naturam plus satis gravabat, sudores abstulerint, ac corpus a Cardiacis ad Diaphoresin suscitandam propinatis vehementius incalcescat. Verum quam fallax & infida sit hæc peccantis materiae per apostemata a sudoribus foras evocata exterminatio; testor funestos eorum exitus, qui hoc modo tractati fuerunt, e quibus vix tertius quisque (ut modestissime dicam) medicationis ac morbi periculum evasit. E contra vero multi, quibus laudabili ritu tumores eruperunt, etiam dum negotiis suis intenti versarentur, nec ullius sive naturalis, sive denique animalis facultatis læsione percepta, sanitatem brevi recuperarunt, nisi qui malo suo fato in medicastrum aliquem incidentes, ejusque monitu, quantumvis corpore pariter ac animo optime valentes, ad sudandum in cubilibus compositi, ab eo ipso tempore deterius se habere incœperint, ac demum ingravescente ægritudine, inauspicati consilii noxam suo interitu comprobant. Verum lubricam atque alex plenam in se esse hujusce morbi per tumores judicationem ex eo manifestum est, quod interdum *Rubo* qui primum laudabiliter ac cum symptomatum remissione protuberavit, postea ex improvviso dispereat, ejusque loco *Macule purpureæ*, certissimi mortis indices, succedant; cujus retrocessionis causa magnis illis sudoribus ad eruptionem promovendam destinatis, jure tribuenda videtur, ut qui bonam materiae partem, quæ tumoris molem infarcire ac sustentare debuerat, alioversum per ambitum corporis distrahendo ac dissipando leves in auras dissolverint. Utut sit, hoc saltem planissime constat, cæteris effectibus, a Dei Opt. Max. benignitate certam amoliendæ causæ morbosæ rationem, huic autem, enormium delictorum flagello, nonnisi lubricam admodum & versatilem adjunctam esse. Atque hinc fortasse non minus commode, quam a malignitate, ut loqui amant, eximiae perniciæ causa atque origo peti possit. Nam & in *Arthritis* aliisque morbis, qui exigui habent malignitatis suspicionem, materia morbosæ recursus non minori certitudine fatum accersit. Ex quibus omnibus manifeste consequitur, Medicum, qui in aliorum morborum medicationem, naturæ ductum ac propensionem pressim, ac passibus æquis sequi tenetur, hic ejusdem auspiciis renunciare debere. Cujus effati veritatem, quia paucissimi hæcenus perspexerunt, hinc numerus eorum, quos tumulo pestis intulit, haud paulo auctior evasit.

Quare cum minime securum sit in exterminando hoc morbo naturæ vestigiis insistere, proximo loco dispiciendum venit, qua demum arte secundæ quàm diximus intentioni satisfiat, nempe aliam atque a naturali diversam, hujusce morbi solutionem aggrediendi. Hoc autem dupliciter omnino fieri posse existimo; scilicet vel per sanguis missionem, vel per venæ sectionem. Priorem quod attinet, non sum nescius, sacram apud plerumque audire in hoc morbo venæ sectionem. Verum vulgi præjudicia parum moratus, rationum in hac quæstione momenta, qua par est æquitate atque candore, paulisper expendam. Ac primum quidem Medicorum, qui grassante nupera lue in Urbe persisterunt, fidem appello. Numquis eorum, Phlebotomiam larga manu ac repetitis vicibus, necnon tumore nullo adhuc protuberante celebratam, peste laborantibus funestam esse animadvertit? Parcā quidem, vel tumore jam conspicuo, sanguinis detractionem semper damnosam esse, neuriquam mirandum est. Siquidem cum mediocris tantum quantitas cruoris adimitur, hinc naturæ, quæ tumori protrudendo totas intendit vires, rei administratio e manibus eripitur, nec interea alia satis efficax materiam morbosam evacuandi, ratio substituitur. Apparente autem jam tumore, celebrata venæ sectio, cum a peripheria ad centrum trahat, mortui naturæ, qui sit a centro ad circumferentiam, inducit motum plane adversantem. Nihilominus vix quicquam frequentius factitatum videas, quam Phlebotomiæ perverso ritu administratæ, noxam, a contrariæ sententiæ patronis universum ac in genere adversus sanguinis in hoc morbo detractionem validissimi argumenti loco torqueri; uti in *Diemerbroeckio* aliisque observationum scriptoribus passim videre est. Quod ad me attinet, equidem eorum rationationi assentire non possum, donec intellexero, quid Quæstioni superius propositæ respondeant. Sane venæ sectionem in peste convenire, complures, iique gravissimi scriptores jampridem senserunt, quorum præcipui sunt *Ludovicus Mercatus*, *Joannes Costæus*, *Nicolaus Massa*, *Ludovicus Septalius*, *Trincavellius*, *Forestus*, *Mercurialis*, *Altomarus*, *Paschalius*, *Andernachus*, *Pereda*, *Zacutus Lusitanus*, *Fonseca*, alii que. Verum qui totum curationis negotium in copiosa, qualem nos postulamus, sanguinis detractione collocaverit, unus, quod sciam, repetitus est *Leonardus Botallus*, Medicus superioris sæculi celeberrimus, quem, ne solus in hac palæstra versari videar, Lector accipiet suis ipsius verbis de hac re differentem. * Ego (inquit) ut uno verbo dicam, nullam pestem esse puto, cui hæc non possit esse salutaris supra omnia remedia, modo opportune & quantitate convenienti usurpata sit, propterea quod aut tardius aut parcius quam opus esset, aut quod utroque modo circa eam usurpandam peccatum sit. Et paulo post hæc subiungit: At in tanta timiditate & parca detractione qui fieri potest, ut quis recte possit judicare quantum ea in pestilenti morbo prodelle valeat, aut obesse? Non enim morbus pro cuius curatione requirebatur detraçtio librarum quatuor sanguinis, in quo una tantum detrahatur, si hominem interficiat, ideo interficit, quia sanguis est missus, sed quia non justo modo missus est, nec forte etiam opportune. Verum nebulones nequissimi & ignavissimi in id semper culpam convertere satagunt, non quod nocuit, sed quod per fas & nefas a cunctis vituperari exoptant. Aut si id nequitia non faciat, ignorantia tamen prave dispositionis efficiunt: utraque certe perniciofa, sed illa magis. Quæ omnia experientia confirmaturus, paulo inferius sic pergit: His observatis nemo rationis capax jure in his morbis vituperare missionem sanguinis potest, sed mirifice & tanquam divinum auxilium commendare, extollere, & confidenter usurpare, quod ipse profecto ab annis quindecim facio. Ideo in morbis pestilentialibus, in obsidione *Rupellarum*, & montibus *Hannoniæ* ab hinc quadriennium, & *Parisiis* toto hoc biennio, & *Cameraci* anno proxime

acta, in omnibus meis ægrotis (qui innumeri fuerunt) nullum praesentius ac salutaris reperi ipsa larga & tempestiva sanguinis missione.

Deinde ad curationum exempla descendit, quæ brevitati studens, huc transferre supersedeo. Libet tamen rei in hac nostra *Britannia* ante aliquot annos gestæ historiam oppido raram ac a proposito nostro non alienam, hic loci oportere.

Cum inter cæteras belli civilis calamitates, quæ patriam nostram miserrime affligerunt, pestis etiam multis in locis grassaretur, ac forte in *Castrum Dunstar*, quod in provincia *Sommertonensi* situm est, aliunde infecta, aliquot prædialiis cum macularum efflorescentia derepente examinatis, complures etiam alios corripuisset, Chirurgus quidam qui a longa in regionibus exteris peregrinatione redux tunc temporis stipendia inter alios faciebat, a prædii Præfecto enixe rogat, ut sibi liceret commilitonibus suis truculento morbo correptis pro virili succurrere; quo annuente, singulis ægris, statim a primo morbi insultu, atque nullo adhuc tumore conspicuo, sanguinem ingenti copia detraxit, donec pedibus deficere inciperent, namstantibus ac sub dio vena pertusa est, nec aderant vascula quæ cruoris in terram effluentis mensuram definirent. Hoc pacto eos in tuguriola sua ad decumbendum dimisit. Et quanquam a Phlebotomia nullum omnino remedium adhibuit, tamen ex complurimis iis, quos hoc modo tractasset, mirum dictu, ne unus quidem desideratus est. Vir Nobilissimus juxta ac morum probitate atque fide spectabilis *D. Franciscus Windham*, militum Tribunus, ac prædicti castris tunc temporis Præfectus, mihi hæc retulit, & etiamnum in vivis est, pro ea qua est humanitate rei gestæ veritatem cuilibet dubitanti confirmaturus.

Quid mihi met ipsi circa hanc rem singulare ac memoratu dignum aliquando observare contigit, Lector inferius accipiet, ubi pauca ea, quæ deserviente nupera peste *Londinensi* a me usu atque experientia annotata fuerunt, inferius ostendam.

Hujusce autem praxeos utilitatem etsi non mente tantum ac judicio assequor, verum etiam reipsa atque editis experientiis dudum exploravi, tamen pestilentis fermenti per diaphoresin dissipatio, pro ejusdem per venæ sectionem evacuatione mihi multis nominibus aridet, utpote quæ nec ægrorum vires æque prosternat, nec Medicum infamiae periculo obijciat. Atqui & hæc difficultatibus suis non vacat; primo enim, multis, ac præsertim calidioris temperamenti juvenibus, sudores ægrius proliciuntur; cujusmodi ægrotos, quo hydroticis fortioribus, ac cumulatori tegumentorum pondere diaphoresin conciere satagas, eo in manifestius phrenitidis periculum adduces; aut quod tristioris adhuc ominis est, vana spe aliquantisper lactatus, tandem pro sudoribus *Exanthemata pestilentialia* elicies. Cum enim præcipua hujusce mali labes in spirituofiori massæ sanguineae parte resideat, unde crassiorum particularum exagitatio nonnihil languidior, quam in aliis inflammationibus plerumque existat, tenuior illa portio novi caloris accessione in maiorem rabiem acta, impetu demum facto omnes cruoris fibras ultra texturæ modum distensas prorsus frangit ac comminuit. A qua fibrarum sanguinearum dissolutione macularum pestilentialium causam petendam esse censo, quippe non secus ac *vibices* a plaga fortiore in partem aliquam corporis musculosam inflata, primo intensius rubicundæ in cute efflorescunt; ac brevi post tempore livorem quendam aut nigredinem induunt.

Deinde vero, in corporibus quæ satis prompte in sudorem solvantur, si diaphoresis justo præmaturius (nempe tota materia morbosæ nondum penitus dissipata) abruptatur, bubonum, qui laudabiliter quidem sub finem sudoris prodire incæperant, postea deterior evadit conditio. Nam subducta quæ eos in molem attollere deberet materiae parte, aut de facili intro remeant, aut saltem ad legitimos abscessus nunquam perducuntur (quemadmodum etiam in *Variolis* accidere solet, quoties æger per primos dies impensius sudavit) recepto autem denuo intra muros hoste ferali, in sanguine commotio excitatur, cujus opera eo, quo superius innuimus, modo, sæpe ethymata imminentis lethi indicia foras propelluntur.

Verum quibusnam modis his aliisque difficultatibus obviam iri possit, ut luculentius pateat, quid in hoc morbo a me pro modulo meo factum observatumque fuerit, initio a nuperæ luis primordiis ducto, summa fides edisserere lubet.

Nobilem fœminam ineunte *Majo* anno 1665. ætatis circiter 21. annorum, ac temperamento sanguineo præditam invisi. Præter febrem ardentem, quæ paulo ante invaserat, vomitiones importunæ, aliaque symptomata febrilia ægram excruciant. Curationem a venæ sectione auspiciatus, postero die ad præcavendam *Diarrhœam*, (quæ, ut in hujusce Tractatus initio monuimus, ob omissam, quod postulabat in principio morbi vomendi propensio, Emetici exhibitionem, defervescente febre supervenire consuevit) Vomitorium imperavi, quod satis commode ventriculi saburram elicit. Postero mane, cum ægram iterum adirem, ei alvum profluere intelligo, quæ res ab aliquot annorum usu insolentior visa, mihi non levem sollicitudinem iniecit. Exinde autem febrem non vulgaris generis esse judicavi, (quemadmodum etiam eventus docuit) proindeque aliam ab ea quæ superius tradita est, quæque constanti successu serie hæcenus a me usurpata fuisset, medendi rationem sibi vindicare. Quocirca adscito in negotii societatem Medico alio seniore, venæ sectio, quam ægrotantis ætas, temperamentum, ac inordinata sanguinis ebullitio flagitare videbantur, ex communi nostro consilio iterum celebrata est: etiam Cardiaca moderate refrigerantia propinata, ac denique clysmata alternis diebus injecta sunt. Sub finem ægritudinis, quoniam symptomata valde anomala ac inconsueta (malignitatis egregiæ indicia vulgo habita) ingrebant, ex Alexipharmacorum classe fortiora aliquot præscripsimus. Quibus tamen omnibus nequicquam proficientibus, ægra circa diem decimum quartum e vivis excessit. Insolitum hujusce febris ingenium per aliquot post dies animum meum varie exagitabat, ac tandem in memoriam revocans, summum ardorem etiam post reiteratam venæ sectionem in prædicta ægra perseverasse; ruborem genarum adfuisse, enormis aliquot guttulas paulo ante mortem e naribus fluxisse; nec non sanguinem ipsius in acetabulis refrigeratum, ei qui a Pleuriticis detrahitur, non ab similem fuisse, quin & tussim aliquam & obscuros quosdam in partibus vitalibus dolores emicuisse; porro & eam anni tempestatem incubuisse, quæ finem veris ac initium æstatis complectitur, quæque febribus continuis producendis minus esset idonea, (illæ enim hoc tempore sua sponte quasi distillant, & in intermitentium classem se reponunt, vel in Pleuritides atque id genus alias inflammationes præcipites ruunt) denique Pleuritides eo ipso tem-

* Cap. 7. de curatione per venæ sectionem.

pore admodum populares fuisse: His inquam omnibus rite perpen-
sis, in eam deveni sententiam, ut febrim hanc, etsi pathognomi-
cis Pleuritidis, aut etiam Peripneumoniæ signis destitutam, tamen
symptomatis rationem habuisse judicarem, inflammationis cujusdam
respectu circa partes spiritales delitescens, etiam si nullus aderat
lateris dolor, nulla insignis spirandi difficultas. Ut rem contraham,
eo tandem deveni, ut eadem omnino mihi methodo procedendum
fuisse in prædicto casu arbitrarer, qua in Pleuritide sæpius cum suc-
cessu singulari usus fueram. Quæ sententia deinceps feliciter atque
ex voto cessit. Vocatus enim non multo post ad hominem consimi-
li prorsus modo ægotantem, reiteratis venæ sectionibus, quales ad
Pleuritidem supra laudantur, curationem commisi & absolvi. Circa
mensis modo memorati exitum atque initium Junii, complures ope-
ram meam implorantes ab eadem febre (quæ jam valde populariter
grassabatur) prædictæ praxeos beneficio convalescerunt. Ab hoc tem-
pore immaniter debacchari cepit calamitosa illa pestis, quæ eo tan-
dem tunculentia devenit, ut septem dierum spatio totidem anima-
rum millia in hac una urbe extinxerit.

Febri autem illi, de qua modo loquebar, an pestis appellatio at-
tribui mereatur, non ausim definite pronunciare. Hoc tamen explo-
rate cognitum habeo, omnibus, quos illo & aliquanto post tempo-
re ipsissima pestis cum universo symptomatum sibi peculiarium appa-
ratu, in mea vicinia affixit, eandem tam in primo morbi insul-
tu, quam in decursu, accidentium *ovæ populæ* adfuisse. Cæterum cum
proximo pariete ardente propius ædibus meis immineret periculum,
ego tandem amicorum suavis numerosissimis fugientium turbis me
adjunxi, familia etiam mea ad aliquot ab Urbe lapides subducta.
Eo tamen vicinis meis maturius redii, ac dum calamitosæ illius luis
in tantum perseveraret sævitia, fieri non potuit, quin meliorum
medicorum penuria ad pestiferorum auxilium advocarer. Nec mul-
to post complures febricitantes invisi, quorum febrim, illius quæ
ante decessum meum tam prosperis ægorum rebus, a me tractata
fuisset, morem atque genium æmulari non sine magna admiratione
deprehendi. Ideoque propria experientia fretus ceu duce, quibus-
cumque præceptis umbratilibus anteposendo, Phlebotomiam simili-
ter administrare non dubitavi.

Hunc autem ritum imminuendi liberalius sanguinem (cui etiam
Pisanae ac diætæ id genus refrigerantis usus accessit) in multis ægris
miro profectu continuavi, donec tandem in nonnullorum tractatione
solito successu destitutus præ adstantium protervia, qui præjudiciis ina-
nibus occupati debitam sanguinis quantitatem auferri non patiebantur,
(magno ægotantium malo, quibus, saltem dum in hoc cardine cu-
randi scopus versaretur, sanguis aut sufficienti quantitate, aut non
omnino detrahendus fuerat) insignem obicem conatibus meis opposi-
tum sensi, ac proinde alium a venæ sectione huic morbo occurrendi
modum reperiri, magnopere ex usu futurum judicavi. Nocumenti
quod aliquando infons dedi, non ex eo, quod sanguinem ademerim,
sed quod ex voto eundem adimere impeditus fuero, exemplum hic
adducam. Vocatus ad juvenem quendam, temperamento sanguineo
ac habitu athletico præditum, quem febris vehementior cum dolori-
bus capitis vertiginosis, vomitu enormi, aliisque id genus symptomati-
bus a biduo corripuerat, cum nullum adesse tumoris signum interro-
gatus responderet, statim liberali manu sanguinem emitti imperavi,
cujus refrigerati superficies puriformem Pleuriticorum sanguinem refe-
rebat, præscripta etiam pisana cum jusculis ac Julapiis refrigeranti-
bus. A meridie pro secunda vice partem sanguinis jacturam subiit,
qua etiam sequente aurora similiter mulctatus est. Sub hujus autem
diei exitu ægrum meum invisens, cum quidem multo melius se habe-
re, & nihilominus amicos ejus adversus ulteriorem venæ sectionem
animis vehementer obstinasse deprehendo; quam tamen ego denuo
celebrandam esse enixe contendi, superesse alteram duntaxat venæ se-
ctionem dictitans, quæ ægrum in sicco collocaret; sin contra niti per-
gerent, satius fuisse, ut nullo omnino sanguine detracto curatio per
sudores instituta fuisset; uno verbo, ægrum certo certius interitum.
Præfagium eventus confirmavit; nam dum hæc alteratio rei agendæ
occasionem corripuisset, maculæ purpureæ postmodum eruperunt; nimi-
rum materiæ peccantis reliquiis, quas radicitus evacuare oportuit,
cum jam omnem abscessus spem Phlebotomia toties repetita abstulisset,
mora sua universam cruoris massam pervertentibus, ejusdemque com-
pagem subtilitate eximia disrumpentibus. Æger autem post aliquot
horas satis concessit. Cum ergo frequentior hujusmodi obstaculorum
occurfus mihi molestiam faceretur, magna cogitandi sollicitudine me-
cum agitavi, equis demum reperiri possit medendi modus, qui mor-
bum non minus efficaciter abigeret, nec hominum offensionem æque
incurreret. Re diu multumque apud animum meum deliberata, tan-
dem in hanc methodum incidi, quam nunquam non proficiam,
ac omnibus numeris absolutam deinceps expertus sum.

* Primo, si quidem tumor nondum protuberaret, sanguinem pro
ægotantis viribus ac temperamento, moderate detraxi, quo facto,
diaphoresis, cujus alias sollicitatio in nonnullis corporibus non modo
summam habebat difficultatem, verum etiam majoris incendii, pro-
indeque æthymatum purpureorum periculum minitabatur, facilis erat
atque expedita. Atque hanc sanguinis jacturam, quæ utut exigua alias
gravissimum incommodum attulisset, diaphoreses immediate inse-
quentis beneficium abunde compensavit. Post venæ sectionem (quam
in lecto celebrandam curavi, cum jam omnia ad sudores proliciendos
in promptu essent) ne vel minima interposita mora stragulis ægrum
obruer, ac laciniam laneam sincipiti alligari jussi, quæ quidem capitis
obtectio ad sudorem ciendum plus proficit, quam quis facile crediderit.
Deinde, si vomitus non adesset, hoc & similia hydrotica exhibui.
24. Theriac. Androm. 3℞. Elect. de ovo ʒij. pul. e chel. cancror. comp.
gr. xij. cochinel. gr. viij. croci gr. iv. cum s. q. succi hermes, f. bolus,
quem sumat sexta quaque hora, superbibendo Coch. vj. seq. Julapii.
24. Aq. Card. benedicti & scord. comp. an. ʒiij. aq. theriac. still.
ʒij. syr. Caryophyll. ʒi. misc. f. Julap.

Quod si vomitus interpellaret, ut in peste ac febribus pestilentia-
libus sæpius accidit, medicamentum sudoriferum tantisper propi-
nare distuli, donec solo tegumentorum pondere (nisi quod lintheami-
nis pars subinde ad colligendos halitus vultui superinduceretur) su-
dor promanare inciperet. Nam (quod quidem observatu summe di-
gnum est) cum materiæ morbificæ radii versus ambitus corporis se-
le exporrigant, illico alvi profluvium & vomitiones, ab eisdem in-
trorsum reflexis, ac in ventriculum & intestina decumbentibus pro-

venientes, ultro sedantur: Adeo ut quantacunque stomachi subver-
sio præcesserit, assumpta deinceps medicamenta probe retineantur,
ac ad sudores ex voto proliciendos conducant.

Memini cum me aliquando Pharmacopola quidam ad fratrem
suum ex febre pestilentiali graviter ægotantem vocasset, atque ego
de medicamento ad sudorem suscitandum exhibendo, sermonem in-
jicerem, retulit se jam varia eaque fortiora sudorifera incassum pro-
pinasse, siquidem æger omnia vomitu rejecerat. Cui ego, adduce-
ret, inquam, ex omnibus iis quæ antea exhibuisset vel ingratiissi-
mum ac summe fastidiosum, me facile effecturum, ne illud deinceps
evomeretur. Promissi fidem eventus liberavit, quippe æger, ubi a
sola stragulorum mole paululum maduisset, largiorem Theriac Venetæ
bolus deglutivit ac retinuit, cujus beneficio in copiosorem sudo-
rem conjectus incolumitatem recuperavit.

Sed ut ad institutum redeam, inceptam jam diaphoresin hausti-
bus Zythogalæ salvia alterata, vel cerevisiæ, cui macis aliquantulum
incoxit, subinde repetitis, ad naturalis diei spatium continuari
præcepi, abstensione interim omni religiose interdicta, imo nec in-
fra quatuor ac viginti horas a sudoribus finitis indusium utcumque
madidum ac immundum mutari permitto: Id quod summa cautela
observari velim. Quod si sudatio angustiori temporis limite cir-
cumscribatur, recrudescit illico symptomatum sævitia, atque ægroti
salus, quam prolixior diaphoresis extra aleam constituisset, in acie
novaculæ reliquitur.

Et profecto Diemerbroeckium aliosque nequeo satis mirari, quo-
ties adverto eos tam levi prætextu ad diaphoresin interpolandam
adduci, ut scilicet ægotantium viribus consulatur. Primo enim
ægrum sudore diffuentem viribus melius quam antea constare, ne-
mini in hujus morbi medicatione vel tantillum versato non potest
esse animadversum. Qui me in hac re usus atque experientia do-
cuit, palam eloqui ac etiam propugnare non verebor. Multi me
authore in 24. horarum diaphoresin conjecti tantum abest, ut se exin-
de debiliores factos quererentur, quin potius quantum supervacanei
humoris sudando decessisset, tantundem novi roboris sibi accrevisse
profterentur. Circa horas autem aliquot posteriores, sæpe non sine
stupore observavi erumpere sudorem quandam, priore illo, quem vis
medicaminum expresserat, magis naturalem, genuinum, copiosum,
quique multo plus levaminis afferret, plane ac si vere criticus fo-
ret ac totius morbi eradicativus. Porro in summo sudoris vigore
jusculis ac sorbilibus confortativis ægrum rescere, quid secum tra-
hat incommodi non video; ideoque ad nihilum recidit illa obje-
ctio de virium ad longos sudores perferendos impotentia. Si qua igitur
defectio sub finem imminere videatur, jusculi ex pullo tantil-
lum, vitellum ovi, vel his similia sorberi permitto; quæ cum car-
diacis & haustibus ad sudorem continuandum ex more destinatis,
virium labefactioni abunde succurrunt. Cæterum in re adeo ma-
nifesta non opus est, ut plura argumenta adducam. Etenim, quod
hujus praxeos utilitatem palam proclamat, videre est, quod quando
æger sudore diffuit, bene se habere existimet, neque minus ex astan-
tium judicio res tota in vado constituta videatur: Atqui quam pri-
mum corpus arescere incipit ac sudor abruptitur, omnia in pejus
ruant morbo quasi postliminio redeunte.

Per horas a finito sudore viginti quatuor, moneo, ut frigus cau-
te vitetur, indusium sponte sua in corpore arescere permittatur, po-
rulentia omnia calidiuscule hauriantur, & Zythogalæ salvia alterata
usus etiamnum continuetur. In sequenti luce commune Catharticum
exhibeo, ex infusione sc. tamarin. fol. senna rhabarb. cum man-
na, & syr. rosar. fol. Atque hac medendi ratione, auno a peste
proximo, complurimis febre pestilentiali correptis sanitatem resti-
tui adeo ut ne unus quidem ex eo morbo mihi desideratus sit, post-
quam eandem exercere incœperam.

Verum ubi tumor jam enatus fuerit, venam aperire, etiam in
corpore ad fundendum quantumvis inhabili, hæcenus non sustinui,
veritus ne materia morbifica in depleta vasa confertim remeante,
subitaneus, ægri interitus destinatum diaphoresin anteverteret. Ni-
hilominus fortasse satis tuto administrari poterit Phlebotomia, mo-
do confestim ab ea peracta, ac nulla mora interjecta eliciantur su-
dores; qui ad spatium superius requisitum producti, omnem tumoris
molem paulatim absumere ac dissipare valeant, idque longe mi-
nore salutis periculo, quam si legitima apostematis maturatio, quæ
in præcipiti affectu admodum incerta ac fallax existit, serius ex-
pectaretur.

Denique, ut ad calcem tandem perveniam, sicubi circa Theoriam
me hallucinatum fuisse Lector deprehendat, errori veniam peto;
verum quod ad praxim attinet profiteor me omnia ex vero tradidisse,
nihilque uspiam proposuisse, nisi quod probe exploratum habeam.
Sane cum supremus vitæ meæ instabit dies, confido mihi adfutu-
rum alacrem in præcordiis testem, me non solum ægorum omnium,
cujuscunque demum fortis, qui sese curæ meæ concrediderant, sum-
ma fide ac diligentia salutem procurasse (quorum interim nemo a
me alias tractatus est, quam ego memet tractari cuperem, si mihi
ex iisdem morbis ægotare contingeret) verum etiam pro ingenii
modulo omnes animi nervos in hoc intendisse, ut si quo modo fie-
ri possit, morborum medela post cineres meos majori cum cer-
titudine administraretur, ratus quantulumcumque in hoc scientiæ
genere accessionem, etsi nihil magnificentius, quam odontalgia aut
clavorum pedibus innascentium curationem edoceat, longe maximi
faciendam esse, præ inani subtilium speculationum pompa, ac levi-
cularum rerum notitia, quæ fortasse Medico ad abigendos mor-
bos non magis ex usu futura est, quam Architecto ad construendas
ædes Musicæ artis peritia.

Unicam hanc annotatiunculam, ne quis forte sinistra interpretatio-
ne mentem meam detorqueat, aut eam saltem non satis assequatur,
postremo loco subjungam. In præcedenti nempe Diatriba, Naturæ
nomine sæpius utor, illique varios effectus attribuo, perinde quasi rem
aliquam singularem & seorsim subsistentem, sed per totam hanc Mun-
di machinam ubique diffusam sub hoc titulo mihi repræsentarem, quæ
ratione aliqua & consilio freta corpora quævis regeret, ac moderaretur
quale quidpiam de Mundi Anima nonnulli Philosophorum cogi-
tasse videntur. Verum ad me quod attinet, uti nec rerum, ita nec
verborum novitatem affecto, adeoque antiquam quidem vocem, sed
sensu (ni fallor) & sobrio, & a sanis omnibus non intellecto solum,
verum etiam, usitato, in hisce pagellis usutpavi. Ego enim, quo-
ties Naturam nomino, toties causarum naturalium complexum quen-

quendam significari volo, quæ quidem causæ brutæ licet, atque omni consilio destitutæ, non tamen sine summo consilio reguntur, dum suas quæque operationes edunt, suosque effectus exequuntur. Nimirum supremum illud Numen, cuius vi producta sunt omnia, & a cuius nutu dependent, infinita sua sapientia sic disponit omnia, ut ad opera destinata se certo quodam ordine atque methodo accingant, neque frustra quicquam molita, neque nisi quoad optimum est, ac toti rerum fabricæ, suisque privatis naturis maxime accommodum, exequentia perinde atque *automata* non pro suo, sed artificis consilio moveantur.

SECTIO TERTIA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica Annorum 1667. 1668. partim etiam Anni 1669. Londini.

ANno 1667. appetente Æquinoctio Verno, *Variolæ*, quæ durante illa, quæ proxime est prægressa, constitutione pestilentiali, vel prorsus delituerant, vel rarissime comparuerant, caput cœperunt attollere, jamque in dies latius grassantes sub Aurumno *Ἐπιδημιολογία* factæ sunt, a quo tempore paulatim imminuta vi, superveniente brumali frigore parcius lacebabant; at proximo Vere adolescente, postliminio invaluit hic morbus viguitque, donec ab infrequentis hyemis gelu, uti prius, retuso impetu coercetur. Posthæc tertio demum cum Vere surgente increbuit, ac jam languidior, & succiso quasi poplite, minus late dominabatur, quam duabus quæ præcesserant æstatibus. Mense vero Augusto 1669. penitus intercidit, Dysentericæ Epidemicæ locum cedens. Labente primo illo biennio, quo hæc constitutio regnabat, *Variolæ* plures in Urbe aggredebantur, quam unquam alias, quantum ego memini, seu antrorsum spectes, seu retro: Quo non obstante, cum genuinæ per id temporis fuerint, neque mali moris, paucos jugulabant, si ingentem laborantium numerum reputemus.

Quo primum tempore *Variolæ* incescebant, & novum quoddam febris genus exortum est, a *Variolis*, quales se tum gerebant, non multum abhorrens, si pustularum eruptionem demas, & quæ ab illa pendent, de qua in sequentibus speciatim agemus, *Febris* hæc, licet multo pauciores invaderet quam *Variolæ*, easdem tamen duratione æquabat: Hyeme vero cum jam illæ minuerentur, invaluit, atque illis Vere novo invalescentibus, recessit, prædominium Epidemicorum hujus constitutionis hoc pacto illis relinquens; Nihilominus per hæc tempora non plane desit unquam, donec tandem cum *Variolis* mense Augusto 1669. omnino disparuit.

Binos hosce morbos Epidemicos & tertius comitabatur, ultima præsertim æstate, quam dicta constitutio defamabat, *Diarrhœa* scilicet, aeris constitutione jam tum ad subsequenter *Dysenteriam* vergente: Utut vero hæc se res habuerit, id saltem constabat, morbum hunc febrem quæ tunc regnabat, ita proxime attingere, ut nihil aliud esse videretur, quam ipsa febris introversa & visceribus incumbens.

De tribus hisce morbis, qui soli in hac *Constitutione* Epidemicorum nomen sibi jure vendicabant, sigillatim jam agam, a *Variolis* initium faciens: quas idcirco paulo fufius tractabo; quoniam per hos annos regnabant, mihi genuinæ pro cæteris & *Regulares* maxime videbantur, utpote eadem prorsus exhibentes *παρόρματα*, & parili symptomatum agmine omnes, quotquot adoriebantur, ubique impetentes, & a quibus proinde, tanquam in suo genere perfectissimis, tum vera morbi Historia, tum etiam medendi methodus est desumenda. Notandum enim est, non tantum febrem quandam propriam & peculiarem cuilibet peculiari constitutioni competere, sed peculiare etiam *Variolarum* genus, quæ hanc quidem speciem referunt, durante hac annorum serie, aliam vero annis sequentibus, quantumlibet inter se convenire videantur quoad certa *παρόρματα* omnibus communia. Ita ludit natura morborum Epidemicorum generatione! Sed ut ad rem redeam: *Variolarum* hujus generis Historiam ante omnia præscribam; quas ideo *Regulares* mihi licebit indigare, ut ab *Anomalis* subsequentium annorum valeam dispescere: Tum etiam methodum adjiciam, quæ mihi in earundem *ὑπερπαρα* ex animo votoque maxime cessit.

CAPUT II.

Variolæ Regulares Ann. 1667. 68. & partis 69.

Variolæ, quibus annis epidemice grassantur, si *Regulares* etiam sint atque mitiores, circa *Æquinoctium Vernum* (ut hæc, de quibus sermo nobis est) ingrediuntur; quibus vero annis non tantum grassantur epidemice, sed & *irregulares*, atque periculosioris sunt generis, maturius nonnunquam mense puta *Januario*, invadunt. Integras familias contagio suo afflantes, nemini parcent, cujuscunque demum ætatis is fuerit, nisi prius hoc morbo laboraverit; Neque tamen eximuntur illi, quos adulterinum *Variolarum* genus aliquod, ad hunc morbum nihil attinentium, prius obsederit. Duplex est hærum species, (ut & *Variolarum*, quæ quibuslibet annis infestant) vel sunt enim *Distinctæ*, vel *Confluentes*; quæ licet essentialiter, ut ajunt, non differant, per illustriora tamen quæ hanc comitantur speciem, illam vero non item haud difficulter ab invicem discriminantur.

1. *Interstitiæ* vel *Discretæ* cum rigore atque horrore invadunt, quos mox excipiunt calor intensus admodum, capitis & dorsi vehemens dolor, vomiturius, ingens in sudores propensio (quod de adultis dictum volo, neque enim in infantibus hujusmodi *διαδερσις* mihi unquam observare contigit, vel ante pustularum eruptionem, vel etiam post) doloris sensus in partibus, quæ scrobiculo cordis subjacent, si manu premantur, stupor etiam & somnolentia, in infantibus præsertim, nonnunquam & Paroxyismi. Epileptici: Qui si infantes Dentitione jam perfunctos corripuerint, suspicor egoubique, *Variolas* in procinctu stare, quæ intra pauculas horas se exerente Prognostico ut plurimum fidem conciliant, & autoritatem, ita ut si forte infans insulsum Epilepticorum sub vesperam, quod fieri solet, patiat, *Variolæ* sequente aurora in conspectum se dederunt, & (quod sæpe sæpius observavi) quæ *Variolæ* infantes statim ab hujusmodi paroxysmo aggredduntur, pustulas emittunt magnitudinis conspicuæ, mites etiam

sunt, atque boni moris & rarissime conflant. Atque hæc fere sunt illa symptomata, quibus hic morbus sub initio stipatur, quæque eruptionem pustularum ut plurimum antecedunt. Quamvis interim hoc loci consentaneum fuerit subindicasse, in sanguine laxiori atque *υμεταβλήτω* nonnunquam accidere, ut separationis periodus sensim atque gradatim sine insigni aliqua ægritudine transigatur, priusquam expulsio materiæ pustularum eruptione se prodant.

Variolæ discretæ quarto ut plurimum die, (si primum etiam incluseris) ab evasione erumpunt, nonnunquam serius aliquanto, ante illum vero rarissime, quo quidem tempore, vel minuantur admodum symptomata, quod plerumque fit, vel etiam penitus evanescent, ac proinde is affectus satis pulchre sibi videtur valere, nisi quod adulti in sudores propensi vix ab illis cohiberi, utut leviter teganur, quæ quidem *διαδερσις* nonnisi pustulis jam mutationem attingentibus ægrum deserit, idque sua demum sponte. Eruptionem quod spectat, hoc se fere habet modo. Primo pustulæ subrubræ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes magnitudine, sparsim se produnt, faciem in primis occupantes, vel etiam collum & pectus, dein corpus universum. Per id temporis & fauces dolor infestat, qui una cum pustulis surgentibus augetur, quæ in dies grandescunt, & in majus fastigium elevata cutem carnesque vicinas rubore afficiunt atque inflammatione.

Circiter enim octavum a primo insultu diem (quam in hoc morbo Epocham ubique servo) intervalla, quæ prius subalbebant, pro pustularum, quibus obsidentur, numero, rubere jam incipiunt, atque in molem attolli, non sine partium distarum dolore tenso & lancinante, qui in horas auctus inflammationi & tumori prædictis viam sternit; ita ut progrediente morbo palpebræ usque adeo impleantur extendanturque, ut æger luce quandoque privetur, qui quidem palpebrarum tumor vesicam inflatam ac resplendentem per easdem extensam non male refert. Est etiam ubi temporis oculis capiunt ægri, si nempe major pustularum vis a prima eruptione se in illos effuderit. Proxime a facie iprutescunt manus, digitique pro pustularum numero distenduntur. Usque ad hunc diem pustulæ, quæ faciem obsederant, læves ad tactum fuere atque rubræ, jam vero asperiores evadunt (quod quidem primum est incipientis mutationis indicium) & subalbidæ; paulatim insuper succum quendam luteum, colore a flavo non abludentem, evomunt. Faciei interim & manuum inflammatio ad summum evecta apicem, colorem exhibet in pustularum interstitiis satis floridum, & Rosarum Damascenarum æmulum. Et sane quo mitiores sunt *Variolæ* & genuinæ magis, eo etiam magis tum ipsæ pustulæ; tum & cutis in earundem interstitiis dictum colorem ad vivum exprimunt, qualem jam descripsi. Uti vero quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; ita e contra, quæ manus & reliquum corpus, minus asperæ, albæque magis conspiciuntur in dies.

Die undecimo, faciei tumor atque inflammatio satis aperte recedunt, & pustulæ tam faciei quam reliqui corporis jam maturitatem, & justam magnitudinem adeptæ, (quæ his annis ad psum grandiusculum ascendeant) exarescunt deciduntque; atque, in hac variolarum specie, die decimo quarto vel decimo quinto ut plurimum funditus pereunt. Veruntamen manuum pustulæ, cæterarum partium pustulis pertinaciores plerumque, recentes adhuc albæque, diei unius aut alterius mora, illas vincunt. Faciei & reliqui corporis pustulæ desquamatione, at vero manuum quæ sunt, disruptione abitu sibi parant. Pustulis faciei succedunt squamulæ furfuraceæ, quas aliquando excipiunt foveæ cutis. Etenim ubi primum decidunt pustulæ, nullæ adhuc in cute cernitur inæqualitas; at vero hujusmodi squamulis exurgentibus recedentibusque vicissim; tandem excavantur foveæ istæ, quæ sæpenumero in convalescentibus ab hoc morbo diu visuntur, quamvis rarum admodum *Variolæ Interdistinctæ* ulla sui linquant vestigia, atque illæ ferme solæ, quæ sex postremis anni mensibus invasere, cum quæ hos præverterint, nullas cuti notas imprimant, nisi forte confluerint, ut postea dicetur. Decurrente morbo omni, æger vel constipatam prorsus habet alvum, vel saltem rarissime deficit. Atque hæc de *Variolis Discretis* dicta sunt.

2. Symptomata cum *Discretis* communia habet & illa *Variolarum* species, quas *Confluentes* appellavimus, nisi quod hic atrociora sint omnia: Febris scilicet, anxietas, atque ægritudo, vomiturius, &c. immanius affligunt, quibus signis Medico sagaci etiam ante eruptionem *Confluentes* se produnt. Nihilominus non ita promptè hic in sudores dissolvitur æger, ac in illo genere jam supra descripto, ubi magna, ut fit, ad eisdem propensio ut plurimum prænuñciat *Variolas*, quæ mox erumpunt, minime confluentes: *Diarrhœa* insuper nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum alterumve post illam protrahitur; quod quidem in *Discretis* *Variolarum* genere nondum mihi contigit observare.

Tertio ut plurimum die erumpit species hæc, ante illum aliquando, vix unquam post illum; cum *Discretæ* vel ipso die quarto inclusivo a primo insultu morbi, vel postea, ante illum raro admodum se monstrent. Quantoque magis quartum illum diem præverterint *Variolæ*, tanto etiam confluent magis. Quamvis autem, ut generaliter loquamur, *confluentes* diem quartum vix præstolentur unquam; fit tamen, licet oppido raro, ut ob atrociori aliquod symptoma, ad quartum vel quintum usque diem differatur eruptio. Verbi gratia, acutissimus dolor nunc in regione lumborum, Paroxyismi Nephritici æmulus; nunc in latere, qualis Pleuriticus vexat; nunc in artubus, ut in Rheumatismo; nunc denique in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu enormi ante eruptionem ægrum fatigat angitque. Hisce in casibus, licet infrequentes sint, *Variolas* solito serius erumpere animadverti, utpote ab immani symptomatum dictorum violentia constrictas atque impeditas: Quæ quidem symptomata solitis vehementiora, cum agmen ducant, mihi satis aperte indicant secuturas *Variolas*, & e *Confluentium* genere esse; & periculo minime vacare.

At vero (quod jam proxime dicendum) licet in *Discretis*, mox ab eruptione (uti dictum est) quæ morbi insulsum comitabantur symptomata, nullum jam amplius facebant negotium, in *Confluentibus* longe aliter se res habet: cum tam Febris, quam alia symptomata etiam ad multos dies a pustularum eruptione ægrum discruciant.

Variolæ dictæ nunc Erysipelatis ritu, nunc Morbillorum, erumpunt, a quibus nonnisi a Medico in his morbis versatissimo distinguuntur, saltem quoad faciem externam: Nam qui ad dispar in utroque morbo eruptionis tempus, aliasque circumstantias, quas utriusque

historia longe ad invicem discrepantes exhibet, sedulo animum advertit, haud difficulter hunc ab illo discriminaverit. Crescente morbo non in molem aliquam spectabilem, uti *Discretæ*, attolluntur, quæ faciem præsertim occupare; at sibi invicem implicitæ primo se habent instar vesiculæ rubræ vultum omnem contegentis, quem maturius etiam in tumorem elevant, quam solent *Discretæ*: dein ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinata, solitam cutis superficiem non multum superantes. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur indice digito, & ad colorem fuscum, non vero flavum, ut in *Discretis* accidit, intenduntur indies tum asperitas, tum etiam cutis color, donec tandem pellicula dicta latioribus laminis desquamatur, quod in quibusdam faciei partibus, si morbus truculentior fuerit, non nisi post vicesimum diem solet contingere. Quando atrociores fuerunt Variolæ, tanto magis pustulæ maturescentes ad colorem subfuscum vergunt, tanto etiam lentius, si suo utantur genio, abscedunt, ut econtra quanto minus confluerint, tanto magis & flavescunt, & se ocys proripiunt. Pellicula hæc seu scabies omnia pervadens, ubi primum deciderit, nulla quidem scabritie vultum afficit, at vero mox illam excipiunt squamulæ furaceæ indolis perquam corrosivæ, quæ non modo patentiores excavant foveas, quam solent Variolæ distinctæ, sed etiam faciem cicatricibus fœde deturpant. In *Confluentium* genere, si admodum sævierit morbus, humerorum etiam & dorsi cuticula nonnunquam perditur, nudatis partibus subjectis expositisque.

Animadvertendum est autem, Morbum hunc magnum æstimari, non pro Variolarum frequentia, quæ reliquum corpus, sed pro earum numero tantum, quæ faciem obfudere, quæ si iis tanquam injecta arena ubique contegatur, utut paucæ atque *Discretæ* sint eæ, quæ in reliquo corpore cernuntur, haud minus periclitatur æger, quam si membra omnia denso agmine pervaserint. Atque ex adverso quantumlibet spisse truncum & artus occupaverint, si in facie rariores comparuerint, magis in vado res est. Quod de numero diximus, & de Variolarum more potest affirmari, malusne scilicet is fuerit, an secus, vultus aperte indicat.

In *Confluentium* genere ubique observavi pustulas manuum atque pedum majores fuisse, quem reliqui corporis, & quo altius ab artuum extremitate truncum versus ascenditur; eo sensim minores & contractiores semper extitisse. Atque hæc de *Pustulis* censui dicenda.

Sunt vero & alia symptomata duo, quæ Variolis *Confluentibus* accidunt, haud minoris momenti, quam vel pustulæ ipsæ, vel tumor, vel aliud quodlibet e prædictis; *Salivatio* nempe in adultis, atque in infantibus *Diarrhœa*. Horum prius ita perpetuum se comitem adjungit, ut unicum tantum viderim Variolis *Confluentibus* laborantem, nulla superveniente Salivatione: Posterius autem, nempe *Diarrhœa*, Infantes hac specie laborantes non ita certo discruciat. Utrum providens natura has evacuationes idcirco substituerit, quod in pusillo hoc ac humili genere materia morbifica ita penitus nequeat exterminari, ac in pustulis istis majoribus ac magis fastigatis generis *Discreti*, nullus definitio, cum Historiam tantum scribam, non solvam Problemata. Hoc certo scio, quod non solum Variolas *Confluentes* plerumque comitantur, sed etiam quod quæ per illas fit evacuatio, tam est necessaria, quam sunt vel pustulæ, vel faciei & manuum intumescencia.

Dicta *Salivatio* nonnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit, nonnunquam non nisi postridie, biduo præterlapso. Materia primo tenuis exernitur, ac facile ad tempus aliquod rejicitur, ægro interim multa lintea eadem nocte conspurcante. Neque sane multum cedit Ptyalismus hic alteri illi qui ope *Mercurii* excitatur, nisi quod non ita male oleat. Die autem fere undecimo saliva viscidior jam facta, ægerime excreatur; stitulosus est æger, ruffit subinde inter bibendum, & potus per nares revertitur, atque ab hoc die cessat ut plurimum Salivatio, licet aliquando (rarius tamen id accidit) ubi per diem unum alterumve omnino cessaverit, tandem postliminio recrudescat. Dicto autem die, undecimo scilicet, tumor faciei una cum Salivatione imminui incipit, ac tunc primum ejus loco manus intumescere solent, aut debent.

Diarrhœa non ita mature infantes solet invadere, atque adultos *Ptyalismus*, quocunque vero tempore ingruerit, nisi ante sistatur, singula morbi stadia decurrit.

In utraque Variolarum specie Febris a primo statim insultu ad eruptionem usque præcipue dominatur, qua peracta inducias fere dat usque ad pustularum maturationem, & tempus in quo pus conficitur, quo demum elapso prorsus desinit.

Observavi semper in morbo vehementiori, ægrum sub vespeream quasi Paroxysmo laborasse, & funestiora symptomata vespertinis præsertim horis se ostendere, atque exacerbari.

En justam Variolarum hujus generis Historiam; vera ac genuina hujusce morbi Phænomena, prout scilicet naturaliter se habet completentem: De *Accidentibus Anomalis*, quæ eidem, ubi minus recte tractetur, superveniunt, jam proxime differemus.

Animadvertendum est itaque, ista quæ die octavo in genere *Discreti* occurrunt Symptomata Anomala, & quæ undecimo die in *Confluenti*, (facto semper a primo morbi insultu computandi initio) maximum ad ægri sive vitam, sive interitum pondus habere, magisque ad amissum expendi debere, cum liquido conslet, maximam eorum partem qui utrolibet morbi (sc. jam descripti) genere intereunt, præfatis singulatim diebus defuncti. Primo enim qui *Discretis* Variolis laborat æger, cum satis prompte sudoribus diffuat, (quo hic in adultis fieri solet jam diximus) ac sibi omnia bona promittat, si morbi, ut sperat, virus per cutis poros hoc pacto amandaverit; diligenter ideo huic methodo insistit, tum remediis Cardiacis intro assumptis; tum regimine calidiore, ut par est, adhibito (atque hæc eo facit lubentius, quod tum ab hac Methodo in principio sibi melius videatur habere, tum etiam ad male fundatam Adstantium opinionem propius accedat.) Tandem vero eliminatis per *diaphoresin* particulis istis quæ ad pustularem elevationem, atque intumescencia faciei debuerant facere, die octavo quæ turgescere, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat facies, flaccida e contra reperitur, & albescent interstitia, licet interim rubescant pustulæ atque eleventur, post ægri morrem. Qui ad hanc usque diem nullo negotio manaverat sudor, jam subito suæque sponte evanescit, neque remediis ullis Cardiacis, vel etiam calidissimis, revocari potest. Æger interim Phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementius; urinam parce reddit, ac frequenter; ac tandem

paucissimarum horarum spatio amicorum spem fallit, & ad plures migrat. Veruntamen hic est notandum, quod, si paucæ compareant Variolæ; hyems si fuerit, æger ætate provectior, aut venæsectio fuerit celebrata, regimen illud calidius in quod jam animadvertimus, non ita certo faciei turgescencia impedit, & proinde mortem accersit, atque ubi confertæ Variolæ, Ver æstive fuerit, æger ætate florens, neque sanguis detractus.

At vero in *Confluentibus* maxime periclitantur ægri, & plerique etiam moriuntur die undecimo; nam cum hoc fere tempore *Salivatio*, quæ ægrum hætenus in tuto posuit, soleat desinere sponte sua, nisi faciei intumescencia, adhuc aliquantulum persistens, ac manuum insigniter jam incipiens ejus vicem subeat, necesse est ut pereat æger: Id enim est perpendendum, quod in hoc Variolarum genere, ubi pustulæ tam sunt exiguæ, non Salivatio tantum, sed faciei insuper & manuum intumescencia ad materiam morificam rite eliminandam omnino requiruntur, quarum utralibet, si vel non adsit, vel ante justum tempus recedat, ægro protinus moriendum est. Jam vero nimio sæpius evenit in merbo calidiori, ut sanguinis crasi a regimine præservido disjecta fractaque, atque eo usque accensa, ut particularum inflammationum exterminationi sensum faciendæ non amplius competat, (ut quæ sudoribus importune extortis debentur mala jam taceamus) hinc vel non omnino intumuerint facies, manusque, vel tumor ille una cum salivatione evanuerit, quamvis enim faciei tumor ipso hoc die aliquantisper debeat remitti, non debet tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere, manuum interim tumore persistente vigenteque, quo quidem vix aliud est minus fallax Convalescentiæ προγνωστικόν, uti neque contrario certum magis imminetis periculi indicium.

Sed utut id sit, materia Ptyalismus quæ ad hunc usque diem cruda fuit, tenuis, & facile excreabilis, viscida jam facta & tenax, ægro suffocationem intentat; Potus quem assumit in pulmones fere dilabitur, unde cum tussi violenta per nares rejicitur, voce est rauca, somnolentia & stupore corripitur ingentibus, oppressus undique vi morbi, atque in hujusmodi agone ut plurimum extinguatur, eo quem jam diximus die.

Sunt & alia adhuc symptomata, quæ in quolibet morbi statu occurrunt; tam *Discretis* Variolarum generi, quam *Confluenti* pariter communis.

Phrenitis, v. g. a nimia sanguinis ebullitione nonnunquam ægrum corripit, & caloris tam parum est patiens, ut magnis viribus, ac furibundo nisu injectas prehendentium & lecto incarcerationum manus eludere conetur.

Aliquando eadem causa effectum longe diversum, seu contrarium, ut videtur, producit, Affectum sc. *Comatosum*; ita ut æger nunquam ferme evigilet, nisi continuo pulsu excitatus.

Est etiam ubi in hoc morbo, perinde atque in peste, laxata, inflammationis vi, sanguinis compage, macule purpureæ se ostentant pustulis interspersæ, mortis fere semper prænunciæ. Frequentius hoc evenit, ubi aeris Constitutio morbo isti Epidemico grassanti præcæteris favet. Aliquando in pustularum summitate maculæ nigrae exiguæ, acicularum capita vix æquantes, in medio vero subidentes, se produnt variis in locis, quæ cum nimio fervori ortum debeant suum, tandem beneficio regiminis magis temperati fuscum colorem acquirunt, posteaque pedetentim subflavum illum, qui variolis genuinis, ac suum morem obtinentibus, naturaliter competit, quod satis liquido cernitur in illa quæ circa morbum hunc versatur praxi, in quo omnia Symptomata eo sunt mitiora, quo magis pustulæ maturitatem adeptæ ad dictum colorem accedunt, atque e contra.

Adolescentum porro, & ætatis flore vigentium, (præcipue si vicino, aut alio quovis liquore spirituofo se nimium impleverint) usque adeo in hoc morbo nonnunquam sanguis accenditur furitque, ut per arterias & vesicam viam sibi faciat, & qua data porta ruat; quo quidem *mitu sanguineo* vix aliud symptoma peioris notæ atque ominis invenire licet, per omnem hujus morbi tragediam.

Ab eadem insuper causa nonnunquam, licet rarius, sanguis e pulmonibus ejicitur. Utraque vero Hæmorrhagia hæc sub morbi initio plerumque contingit, pustulis nondum erumpentibus, vel si in quibusdam locis se ostendant, in plerisque tamen aliis adhuc sub cute densæ latent, atque ejus sunt generis, quæ in maxime *Confluentes* adolescerent, nisi jam dictum symptoma ægri morte morbum finierit.

Aliquando etiam *Urine suppressio* totalis ad malorum cumulum accedit, in juvenibus præsertim, idque in statu, vel etiam declinatione *Discreti* generis.

Sunt & alia symptomata, quæ a προφασιν aliqua jam dictis contraria interdum oriuntur, si nempe æger a frigore nimis intensio fuerit læsus, vel si præter jus fasque vena fuerit pertusa ad ingentem sanguinis amissionem, aut alvus nimia Catharsi subducta, unde pustulæ nonnunquam fastigiis cedunt & derepente confidunt, superveniente insuper *Diarrhœa*, a qua ægro (adultus si fuerit, ut supra innuimus) ingens est discrimen, & anceps morbi exitus, materia sc. Variolosa intro versa, ita ut natura eidem per cutis poros debite exterminando impar prorsus inveniatur. Huc accedit, quod faciei manuumque tumor ab his retunditur, qui non minus in boni ægri rebus est censendus, quam ipsa pustularum eruptio, nisi eæ fuerint *perpaucæ*.

Quæ vero a suscepto frigore pendent symptomata, raro admodum occurrunt, si cum illis conferantur quæ a contrario, calidiori nempe regimine, nascuntur; Cum enim morbus hicce inter calidissimos jure optimo habeatur, longe minus ab hac parte peccatur, quam ab altera.

Qualis vero sit hujus morbi essentia, ob naturalem & communem mihi cum reliquis hominibus intellectus defectum, nescire plane me fateor; veruntamen prædicta symptomata pensulatim trutinata mihi videntur subindicare, *Inflammationem* eam esse (acæteris tamen Inflammationibus specie diversam (tum sanguinis, tum reliquorum humorum, in qua amolienda, per dies priores duos tresve id agit natura, ut particulas inflammatas digerat coquatque, quas postea in corporis habitum ablegatas maturat adhuc, & sub Abscessulorum forma suis demum finibus expellit. Quapropter ut fundamento alicui medendi methodus superstruatur, notandum est, duo esse hujus morbi tempora, quorum primum *separationis* est, secundum *expulsionis*. Atque primum quidem illud tempus plerumque cum febrili ebullitione transigitur, quod tribus vel quatuor primis diebus peragi solet, quorum decursu natura id satagit, ut partes ejusmodi inflammatas feligat congregetque quæ sanguinem laceant, atque etiam ut illas in carnosas corporis partes relegatas ibidem deponat, quo facto

Sto pristina quiete fruitur, sedato jam tumultu, qui, dum hoc ageretur, in sanguine ciebatur. *Separatione* sic ope ebullitionis, in sanguine peracta, *Expulsio* jam locum obtinet, quæ per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis illis *abscessibus*, in carne perficitur. Sicut enim a natura abscessuum sua specie non abluunt, ita parem cum aliis, cruditis, maturationis, atque exarescentiæ statum percurrere solent; quæ omnia si rite atque laudabili modo absolvant & exequantur, in tuto res est, cum exinde curationis summa dependeat; sin minus, omnia pessum ruitura sunt. Et quidem postremum hoc negotium, priori illo *separationis* opere, tanto plus temporis sibi vendicat, quod prius illud in tenui fluidoque corpore transigatur, atque in ipso (ut sic dicam) naturæ foco; posterius autem denso spissoque theatro, atque a vitæ fonte paulo remotiori, partes suas exequi cogatur.

His ita præmissis, Indicationes exurgunt. 1. Ut æquabilis ille tenor ebullitionis in sanguine conservetur, qui neque nimis propere separationem nimia sua vi perficiat, neque tamen torpido nimis motu eandem remoretur, vel non satis idoneam præstet. 2. Ut abscessuli, pustulæ summa cura sustineantur, quo debita tempora percurrentes, tandem contentam in se materiam omnino avehant, ipsæque etiam evanescant.

Ut itaque paucis de *primo* agamus, sollicite in primis cavendum est, hoc tempore præsertim, ne nimium affurgat ebullitio, sive id fiat ex congestis stragulis, sive ex aere loci in quo decumbit æger, igne nimium excalescente, sive ex calidiorum medicamentorum & cardiacorum usu; præcipue vero ab his cavere oportet, si æger in ætatis flore constitutus fuerit, vel sanguinem habeat generosiori potu nimis exaltatum, vel anni tempestas, aut verna sit, aut saltem ultra ætatis initium non processerit. Hinc enim fiet, ut separatio, quæ sensim lentisque gradibus peragi debebat, ut ad universalem quandam despumationem opportunius pergat, præcipiti cursu feratur, atque ita vel non satis idoneus partium numerus congregetur, vel (quod forte contingat) nonnullæ partes ad secretionem damnentur, quas alias Natura illam subire noluisse; nisi quod ultra debitos limites excurrere coacta, noxam hanc sibi creet: secretis enim illis, quæ ad separationem minus opportuna sunt, aliorum illuc propendentium motus, eorum commixtione impeditur, adeoque redduntur expulsionis minus accommodæ. Mihi quidem rationi consentaneum videtur, ut quo diutius natura *separationem* molitur, ac perficit; dummodo ebullitio non omnino torpeat, eo certius atque universalius eadem *separatio* absolvarur. Atque ex illa sic absoluta, curationis insequentis successus potissimum ut dependeat necesse est, uti ex methodo contraria, contrarius plane rei exitus; ex calido enim isto regimine nihil boni nascitur, sicut ex præcoci fructu, nihil frugi; cum frequenter usu veniat, ut vel in Phrenitidem æger prono lapsu ruat; vel (quod peioris notæ est) sudores ingentes oboriantur, ex quibus partes non secerni aptæ, neque *puris* naturæ respondentes (quod ipsum tamen pus genuina soboles est hujusce excretionis) eliminantur, vel ex Cardiacis illius administratis, calidaque custodia, Variolæ nimis protulæ in unum confluant, sædo certe spectaculo, tristemque eventum interminanti.

Atque hæc & hujusmodi symptomata ex his erroribus progigni solent, cum ex altera illa methodo nihil unquam mali observaverim. Natura enim sibi permissa negotium suum suo tempore exequitur, materiamque debito ordine ac via tum secernit, tum etiam expellit, ut (in Junioribus præsertim vegetisque temperamentis) nostra ope, nostris artificiis, atque auxiliis non indigeat, suis viribus optime instructa, suis opibus locuples, suo denique ingenio satis edocta. Neque sane vel ipse vidi, vel fando accepi, quemquam ex eo periisse, quod Variolæ primo non eruperint, nisi nimis multi perierint, quorum Variolæ primum landabiliter, & cum summa spe erumpentes, postea recedentibus pustulis præmature detumuerunt.

Quemadmodum autem inconsultum est atque periculosum, calidioris regiminis vel Cardiacorum ope coeptam ebullitionem nimis evehere; ita e contrario non minus vacat periculo mediantibus venæ sectione, clysteribus, emeticis, catharticis, aut id genus aliis eandem minuere, cum hoc pacto partium separabilium commoda secretio plurimum impediatur. Licet enim vulgare illud atque tralatitium argumentum, quo adversus Phlebotomiam, aliasque evacuationes utuntur (nempe quod non liceat a circumferentia ad centrum movere humores, cum natura in hoc morbo contrarium affectare videatur) nullarum plane virium sit; eo quod ex earundem usu contrarius omnino effectus, subitanea scilicet Variolarum eruptio, sæpissime consequi deprehendatur; aliæ nihilominus rationes in promptu sunt, quæ vehementer suadent, ut, siquidem ullo modo vitari possit, ab hac praxi nianus abstinemus. Namque (ut earum præcipua paucis attingamus) per hæc evacuationes, non tantum ebullitio nimis imminuitur, cujus interim ope partes despumandæ accurate secerni debuerant; verum etiam illud ipsum subducitur, quod coeptæ secretionis quasi pabulum continenter suppeditaret; unde sæpenumero contingit, ut Variolæ primum laudabili impetu erumpentes (eoque fortasse melius, quod evacuationes jam dictæ præcesserant) paulo post ex improvviso quasi repercussæ detumescunt, idque ob eam potissimum causam, quod materia desit, quæ quasi a tergo præeuntem insequeretur, atque agmen clauderet. His vero non obstantibus, si vel minimum suspicari licet Variolas mox erumpentes e Confluentium genere futuras esse, utile prorsus erit, ut non solum sanguis quam primum mittatur, sed & Emeticum propinetur, ob rationes alio in loco fuisse dicendas.

Tandem ut ad secundam illam Indicationem pedem promoveamus ad tempus *expulsionis* accommodatam; quo tempore materia separata, parvorum abscessuum sive pustularum ope, amandatur atque expellitur; nempe illud hic agendum est, ut pustulæ debito modo sustineantur quo rite atque ordine destinatum periodum assequantur.

Sicut itaque supra satis, ut opinor, ostensum est, imprimis periculosum esse, si æger præsentī febre, at pustulis vix dum apparentibus, in ipso *secretionis* tempore nimium calefiat, ita etiam non minori periculo plena res est, si ideam quovis morbi tempore fiat, atque illo præsertim quod ad *expulsionis* initium vergit, crudis adhuc existentibus pustulis: Quamvis enim sanguis, peracta jam *separatione*, atque relegata ad carnosas partes materia, ab intestino tumultu magnam partem immunis sit, interim tamen tenet adhuc, recensque, ac vix novo statu & quasi textura indurus, *επιδυς* est, facileque vi caloris immodici undecunque appellentis afficitur, atque adeo levissimo mo-

mento irritatus flammam concipit, & in novam ebullitionem proclivis est; quæ quidem nova ebullitio, non, uti prior illa, *separationem* jam molitur (illam quippe peractam supponimus) verum illius loco non tantum symptomata superius memorata excitat, sed & coeptam per pustulas *expulsionem* inturbat, & contentam materiam exagitando noxam parit. Vel itaque partes jam secretæ, atque in corporis *εξω* depositæ, vehementi illo rapidoque sanguinis ebullientis cursu abreptæ in ejusdem massam refoverbentur; vel partes carnosæ ultra gradum suppurationi debitum excalescunt, minus commode illam exequantur; vel denique fortassis oborta hac nova ægritudine, sanguinis œconomia, ipsarumque carniū tonus pervertitur, usque adeo ut materiam illam expulsam vincere, eamque solemnī more abscessuum coquere nequeant.

Interim non usque adeo nos illuc intentos esse oportet, quo ebullitionem nimiam in sanguine prævertamur, ut ægrum frigoris injuriis exponendo, pustularum eruptio impediatur. Gradus ille caloris ad harum *expulsionem* promovendam accommodatissimus, naturalis sit oportet, atque ejusmodi, quæ carnosarum partium temperiei conveniat, quique hunc excedit, aut ab eodem deficit, utrinque periculosus est.

Ex dictis itaque satis manifestum videtur, in quam incerto lubricoque sit loco, tum morbus ille, de quo loquimur, tum praxis medica, quæ eidem accommodanda est. Atque etiam exinde pronunciare ausim, illius famam, qui in medicando hoc morbo frequenter sese exerceret, in angusto versari; quandoquidem non vulgus solummodo mortis causam satagenti nimis Medico transcribere paratum sit, verum etiam ejusdem artis professores calumniandi aniam inde cupide arripiant, atque coram iniquis Judicibus causam dicentes, severissimam sententiam facile eliciant; eo scilicet consilio, ut ipsi pluris æstimentur, & super aliorum ruinis viam sibi sternant ad famam: id quod viris literatis indignum prorsus est, imo & vilioribus artificibus, modo probitatem colant. Hinc porro cernere est, quod minus mirum sit, si nutricibus, per se nimium plerunque officiosis & satagentibus, res male sæpenumero succedat; Nempe res ardua est, & quæ muliercularum ingenium atque judicium superat, gradum caloris huic requisiti definire, præsertim cum anni tempestas, ægrorum ætas, & vitæ ratio, aliaque huc spectantia simul pensanda veniant, id quod prudentem profecto atque sagacem Medicum omnino postulat.

Si contigerit, ut vel Phlebotomia minus opportune celebrata, vel admissio frigore pustulæ reciderint, vel facies ac manus detumuerint, Cardiacis utendum est. Sed cavendum tamen, ne in his exhibendis nimis simus: Quamvis enim sanguinem ademeris, fieri tamen potest, ut virium inde jacturam metuens, adeoque Cardiacis aut fortioribus aut sæpe repetitis utens, novam ebullitionem ex improvviso fuscites. Nimirum sanguis adhuc tenuior est, & vim calidioris stimuli facile sentit; unde fit, ut sæpe repetitæ ebullitiones in eodem excitentur, quibus ægrorum mors majori jure tribuenda est, quam prægressæ venæ sectioni. Atque hæc generatim de iis, quæ primariis Intentionibus satisfacere possint, dicta sunt.

* Jam ut calcata vestigia repetam, ac ad praxin propius accedam: Quamprimum manifesta hujus morbi indicia se produnt, ægro aura liberiore, vino, ac carniū esu interdicto, cerevisiam vero tenuiorem pane tostato leviter tepescantem pro potu ordinario, ac subinde pro arbitrio hauriendam concedo; pro victu etiam juscula avenacea, hordeacea, poma cocta, aliaque, quæ neque frigoris, neque caloris vim aliquam egregiam obtinent, aut ventriculo concocturo molestiam exhibent, injungo. Nec vulgarem illam rusticamque diætā admodum improbo, nempe ut lacte cum pomis cocto & contuso vescatur, modo cautum sit, ut eo per vices utatur, & modice, dempto etiam lactis frigore. A regimine calidiore protinus inhibeo, ut & ab usu medicamentorum Cardiacorum quorumcumque, quibus Variolas in cutem ante diem *quartum* qui eruptioni proprius est ac naturalis, temere propellere nonnulli satagunt. Cum pro certo habeam, eo magis universalem fore materiæ Variolosæ separationem, quo tardius istæ prorumpunt, proinde & securiores possumus esse, ne se denuo intro condant, & rectius maturescant, cum si ante tempus extrudantur, præcipitatur materia cruda adhuc atque inconcocta, quæ ad instar fructuum præcociorum inani spe laetatur. Adde, quod ab hac nimium festinata diligentia periculum est (in calidioribus præsertim temperamentis ac vegetioribus, quorum principia activa plus satis Cardiacorum suppleant vicem) ne natura nimis incitata coactaque, universam pene corporis substantiam in Variolas effundat; ita ut jam *confluant* illæ, quæ, nisi plus æquo properasses, in *distinctarum* ordine latiori ordine substitissent. Porro non ideo statim foras propellendæ sunt Variolæ, ubi primum aliqua morbi hujus suspicio oritur, quia sc. æger ante eruptionem vehementer ut plurimum laborat angiturque, cum ne vel una quidem instantia possit ostendi, quempiam ideo interiisse, utut graviter ægrotaverit, quod non mox prodirent Variolæ, vel naturam iidem serius ocyus extrudendis defuisse, nisi sicubi regimine calidiore & remediis Cardiacis, præmature ingestis, fuerit impedita. Etenim non semel observavi in junioribus & temperamento sanguineo præditis, regimen calidius, & Cardiacis eo animo exhibita, ut Variolas ante justum tempus exturbent, ita parum eruptionem accelerasse, ut eidem e contra obicem ponerent: Sanguine enim his modis excalescente, & in motum violentiorem, quam qui materiæ Variolosæ separationi rite peragendæ par esset, concitato, certa tantum quædam morbi indicia se prodidere, latentibus intra curam pustulis, neque se ultra efferentibus, quibuscumque demum Cardiacis sollicitarentur, donec tandem sanguine ad moderatam debitamque temperiem redacto, concessa sc. cerevisia tenuiori, demptoque partim stragulorum, quibus torrebatur onere, pustulis extirpantibus commodam viam stravi, atque ægrum in tuto, favente Numine, collocavi. Neque magis, si quid ego judicando valeo, ab illis stat ratio, qui ægrum ita pertinaciter ante diem *quartum* lecto addicunt, modo cubiculi ambitu se contineat, quam ab his, qui adeo præmature atque intempestive Cardiacis ingerunt; Etenim *Sanguinis mictus*, *maculæ purpureæ*, & reliqua symptomata lethalia, (de quibus supra) eo tantum nomine, præsertim ætate florentibus, superveniunt, quod nempe lectulo præpropere nimis affigantur. *Quarto* vero die lectulo ægrum adjudico, ac tum temporis, si eruptio parum pro votis succedat, recte exhiberi potest

B

Car.

Cardiacum aliquod blandius, unica saltem vice, quo exigantur pustulae. Inter ista quae huc faciunt medicamenta; *Paregorica*, dicta, qualia sunt *Laudanum liquidum*, *Diascordium*, &c. si in pauca quantitate aquis Cardiacis appropriatis admisceantur, ceteris praevalent. Haec enim cum sanguini aestuanti frænium injiciant, natura materiam morbosam opportunius atque liberius ejicit, atque amolitur. Neque etiam consulere in Cardiacum ante hunc diem propinare vel urgente *Diarrhoea*, atque illud, ut videtur, indicante. Licet enim, quod antea innumus, nonnumquam Variolarum *Confluentium* eruptionem praecedat *Diarrhoea* (quae oritur ab halitibus inflammatoriis vel humoribus a massa sanguinis per primos dies exagitati atque aestuantis, in intestina exoneratis) non tamen hic magis deerit natura dictis materiae Variolae halitibus in corporis habitum propellendis, (quo facto, sua jam sponte sistitur *Diarrhoea*) quam solet in halitibus istis extravertendis eliminandisque, qui in ventriculum inversi sub initio morbi vomitum provocant.

Animadvertendum vero est, quod si ad adolescentem vegetiorem accerfor, & qui insuper liberaliore sive vini, sive liquoris, cujuscumque spirituosius computatione morbo ansam dedit, non satis habeo ad frænandam sanguinis ebullitionem, ut tam lectulo, quam Cardiacis abstineat, nisi ad haec sanguis e brachio mittatur: Quod si non concedatur, obtinente vulgi praepudicio, missionem mihi saltem esse petendam existimo. Superinducta enim inflammatione ista, quam sanguini impressit liquor spirituosorum fervor, intenso illi calori, quem hic morbus naturaliter comitem habet, ita furit sanguis, ut non raro in vesicam vasorum ductu irruat; vel maculas pariat purpureas, aliaque ejusmodi symptomata, quae per omnem morbi decursum crucem figunt Medico, atque ægrum e medico tollunt. Atque haec de illis quae ante pustularum eruptionem sunt peragenda.

Ubi primum eruperint pustulae, jam proxime diligenter mecum perpendo, an *Discreti* fuerint generis, an vero *Confluentium*; cum longo haec intervallo ab invicem distent, quantumlibet convenient quoad symptomata quaedam utrisque communia. Si itaque ex pustularum magnitudine, & paucitate, tardioreque eruptione, tum etiam ægritudinis, aliorumque symptomatum gravissimorum, quae in *Confluentibus* etiam post eruptionem fatigant, evanescentia, de genere *Discreti* mihi constet; ægrum cerevisia tenuiori, jusculis avenaceis, hordeaceis, &c. reficiendum curo, modo quem supra descripsi. Atque si tempore aestivo eoque calidissimo Variolae non ita multae obtingant, quorsum attineat ægrum in lecto jugiter stratum obrutumque detinere, ego quidem non video. Quin potius singulis diebus, per aliquot horas de toro surgat, ea lege, ut tam loco, quam vestitu, frigoris pariter ac coloris nimii incommoda praevaleant. Quid quod ægroto a cubili quandoque abstinente, morbus minori cum molestia, ac etiam breviori spatio tempora sua peragat, quam si eidem continenter affigatur, quod non modo ægritudinis tardium adauget, verum etiam febrilem aestuationem fovet, & prodeuntibus vesiculis dolorificam inflammationem conciliat. Quod si aut frigidior anni tempestas, aut copiosior Exanthematum eruptio perpetuo decumbendi necessitatem ægrotanti imponat, propicio, ut non intensiore coloris gradu, vel adiectis pluribus stragulis in lecto decumbat, quam quibus in prospera valetudine uti solebat, accenso interim nonnisi hyeme incumbente, mane & sero foco medicocri. Neque etiam exigo, ut in eodem loco semper jaceat, nempe ne sudores erumpant, quos ego tum rationibus supra allatis, tum ipsa experientia fretus, fidenter affirmo non absque ingenti periculo moveri posse.

Determinante morbo, cum halituum a materia jam in pus conversa prodeuntium eruptio liberior a pustulis tandem crustosis ac duriusculis impediatur, abs re non erit *Vini Canarini semicocti cochli* 5. vel 6. vel aliud medicamentum Cardiacum temperatum exhibere, ne scilicet halitus illi putridi in sanguinis massam postliminio revertantur. Et sane jam nunc, neque prius, Cardiacis locus est. Eodem pariter tempore diæta paulo calidior & Cardiacis magis potest concedi, juscula v. g. ex pane & cerevisia saccharata, e farina avenacea cum cerevisia & saccharo, &c. Neque aliis omnino erit opus, in genere scil. *Discreti* ac leniori, si æger hac methodo ac diæta, utriusque moderatis, se tractari patiat; nisi forte an inquietudo, vigilae, aut alia symptomata phrenitidem minitiantia, paregorici usum subinde suadeant.

Haec sane reclamante licet immani isto ac male fundato hominum praepudicio, quod ex adverso militat, vera est ac genuina methodus huic Variolarum generi medendi, & obtinebit demum, me vita functo. Et licet non negem, multos regimine admodum opposito tractatos nihilominus convalescere, fatendum est tamen, (& saepe dolendum etiam, si nobiscum reputemus, quam omni prorsus periculo vacat ex sua natura hoc *Discretum* genus) plurimos etiam interire, quin & alii complures satis pariter concederent, nisi vel a frigidiore tempestate, in quam incidit morbus, vel a Phlebotomia (aliter supervacanea atque inutili) nuper celebrata servarentur. Quo nomine, si vel obstinatio amicorum, vel ægri diffidentia praedicti regimini intercesserit, tutius mihi videbatur sanguinem detrudere; quod quidem, licet in hac specie per se officiat (quatenus scil. & separationem perturbat confunditque, & pabulum insuper tum pustulis, tum tumoribus elevandis destinatum subducit) aliquantisper tamen secuturum regimen calidius pensat, ac proinde hanc, quam nonnisi coacti usurpamus, methodum, non usque adeo periculosam atque ancipitem reddit.

Ex dictis (ut obiter attingam) facile erit vulgare illud Problema solvere; qui fiat sc. ut perpauci adeo e plebe hoc morbo pereant, si ad eos comparentur, qui inter divites eodem trucidantur? quod quidem vix ad aliam causam potest referri, quam quod ob rem domi angustioris, & agreste vivendi genus, vix illis fiat copia sibi nocendi regimine magis accurato ac delicatiori. Quinimo & plures inter vulgus jugulavit hic morbus, ex quo *Mitridati*, *Diascordii*, *Decocti C. C.* usum didicere, quam in saeculis *indolentioribus* quidem, at magis *sapientibus*: cum in singulis ferme ædibus reperitur stolidi aliqua ac sciola muliercula, quae in hominum perniciem, quam non didicit, artem exercent. Atque haec de Variolarum, quas *Interstinas* appellavimus, curatione.

At si *confluant* Variolae, periculosa plena res aleae est; arbitror enim ego, genus hoc non minus ab altero illo discrepare, quam ab hoc ipsa pestis, licet apud hominum vulgus, quibus nomina & verba pro rebus sunt, utriuslibet curatio ex æquo praedicetur. In hac

morbi specie, cum intensioris sanguinis inflammationis proles sit, major pariter adhibenda est cura, ne calefiat æger, ut in prioris curatione jam dictum est. Quamvis autem species haec ex sua natura majorem sibi vendicat refrigerationem, quam altera ista, ad promovendam tamen faciei ac manuum intumescuntiam, (sine qua de ægro actum est) & pustularum elevationem atque augmentum, tum etiam, quia æger ob exulcerationes dolorificas lecto abstinere nequeat, expedit, ut in eodem contineat & se, & manus etiam suas, modo stragulis modice contactus sit, & concessa fuerit venia ab hac in illam lecti partem corpus pro arbitrio suo transferendi, ut in genere *Discreti* innumus. Praesertim vero morbo exeunte, cum jam appetat *Febris Maturatio* non tantum hac libertate non privandus est æger, sed monendus etiam, ut ea utatur, quin & versandus per se nocte atque interdiu, ut ingens calor contemperetur, & evitentur sudores, quibus amandatur lenis iste humor, quo diluendae sunt Variolae, ut mitescant.

Quandoquidem vero, ut diximus, *Ptyalismus* hanc speciem jugiter comitatur, qui cum e praecipuis sit naturae evacuationibus, atque hic in ejus locum, quae per pustulas fieri debuit, substituitur, (quae quidem per pustulas evacuatio in hac specie humili ac depressiore non aequae atque in altera procedit) summopere annitendum est, ut dicta salivatio in vigore persistet & conservetur, nec ante diem suum sistatur, vel remedium calidiorum usu, vel a cerevisia tenui aut simili alio liquore liberaliter hauriendo, ægrum arcendo. Jam cum *Ptyalismus* mos sit naturaliter se habentis, ut cum prima eruptione incipiat, & die *undecimo* minuatur, neque tamen nisi post diem adhuc unum aut alterum omnino desinat, si ante diem illum penitus cesset, in lubrico sunt ægri res. Nam cum faciei tumor (per quem nonnihil materiae morbosae evacuatur) nunquam non eo ipso die dispareat, si salivatio eodem pariter tempore se subducatur, æger materia variolosa jam putrescente, ceu veneno, inficitur, cumque nulla amplius detur porta, per quam evacuari possit, in busti limine constituitur, nisi forte (quod fit nonnumquam) manuum intumescuntia, quae ut serius quam illa faciei se ostendit, ita tardius recedit, ejus sit molis ac momenti, ut ab Orci faucibus illum eripiat. *Salivatio*, quae tanti hic est tamque necessaria, admodum promovetur, si ægro assatim propinetur cerevisia tenuis, vel liquor alius quilibet, qui nec illum calefaciat, nec ad sudores provocet.

Praeter haec vero, ut consopiatur vehemens illa sanguis ebullitio, qua haec Variolarum species alteram illam longe superat, & sustentetur *Ptyalismus*, (necessaria nempe hujusce morbi evacuatio) conveniunt medicamenta *Narcotica* praeter aliis quibuscumque: quae licet ob vim, qua donantur, incrassantem, educendae salivae videantur officere, jamdiu tamen ego me isto liberavi praepudicio, atque eadem in hoc morbo adhibui, adstipulante ubique rerum eventu, modo æger pubertatem exceperit. Sanguis enim infantium puerorumque (qui per integrum morbi stadium plerumque satis bene dormiunt) cum mitius ferveat, minus hujusmodi eget sufflamine; atque insuper horum usu *Diarrhoea*, quam in hoc morbi genere infantibus evacuationem natura instituit, cum ægri damno sistitur. Adultis vero *Paregorica* medicamenta, si frequenter usurpentur, haec adferant commoda. Primo, somnum moderate conciliando, efferam minus sanguinis ebullitionem, ac proinde Phrenesin cohibent, praeventque. Dein, ab eorum usu faciei & manuum intumescuntia, qua insignem in hoc morbo natura habet evacuationem, rectius procedit. Quin etiam, quod non parum facit ad ægri securitatem, cum non raro justo citius detumescat facies cum malis ægri rebus, tumor Narcoticorum ope ad debitum usque naturae terminum suffulcitur & protrahitur; mitigato enim sanguinis fervore, radii inflammationi opportune ad manus, faciem atque omne corporis superficiem pro morbi ingenio feruntur. *Ptyalismus* denique hisce propagatur, qui licet vi medicamenti ita fortiter incrassantis ad horas aliquot sistitur in quibusdam, mox tamen aucto novis hisce suppetiis robore, insurgit denuo natura, & coeptum opus feliciter peragit. Quin etiam animadverti *Salivationem*, quae circa diem *undecimum*, aliquando etiam citius, cum ingenti ægri periculo minui solet, exhibitis plus semel *Paregoricis*, de novo fuisse reintegratam, nec ante diem *decimum quartum*, alieubi etiam & post illum, desisse. Propio ego ut plurimum vel *Laudani liquidum* guttas 14. aut circiter, vel *Syr. de Meconio* 3j. in *Aq. flor. Paralyf.* vel simili stillatitia solutam: Quae si adultis post plenam eruptionem ad morbi usque finem singulis noctibus propinentur, non modo incommodi nihil, sed & magnum inde emolumentum capient, quod frequenti experientia didici. Expedit vero, ut censeo, paulo temporis quam aliter fieri solet, *Paregoricum* exhibere; facile enim observatum est in Variolis pessimi moris, *caloris*, ut ita dicam, *Paroxysmum* vesperti plerumque ægrum inquietudine, anxietate, aliisque symptomatis laceessere, quae si *Paregoricum* hora sexta septimave vespertina sumatur aliquatenus praecaveri possint.

Proximo loco, cum in Variolis *Confluentibus* haud minus certo *Infantes Diarrhoea* comitetur, quam *Adultos Ptyalismus*, natura, ut supra ostendimus, alterutram harum evacuationem materiae morbosae eliminandae ubique constituite, ut nec hic *Ptyalismus*, ita neque istic *Diarrhoea* frænium injicio, cum utrumque ex æquo sit absurdum. Male locata interim imprudentium aliquot muliercularum opera in sistenda hujusmodi *Diarrhoea*, multa infantium millia letho dedit, dum falso secum reputant, *Diarrhoeam* par in hac Variolarum specie atque in *Distincta* discrimen apportare; nesciae scilicet, illic tantum officere *Diarrhoeam*, ubi per pustulas fit evacuatio, hic vero naturae opus illam esse, morbo effugium querentis. Missa itaque *Diarrhoea*, & πῇ φύσει ex praecepto Divini lenis συμπτῶτον, quo coepi pede pergo, in cunis tunc jaceant infantes, ut nunc illinc auferantur, consulto; & si fuerint ablactati, eandem, quam superius adultis, diætam istis concedo.

Ultimis morbi diebus, cum facies ob pustulas crustosas, duras, aridasque, ferme riget, eandem oleo *Amygdal. dulc.* inungo per sepe, tum ad mitigandum dolorem a rigiditate ortum, tum ut effluvia calidiora liberius exhalent.

Facies ne cicatricibus deturpetur, nihil quicquam molior: cum *Olea*, *Linimenta*, &c. id tantum agant, quo tardius evanescant albi isti furfures, quibus, se invicem pellentibus excipientibusque, postquam æger jam lecto surrexerit ac mediocriter valet, paulatim succedunt foedae illae cicatrices. Sed ab his non valde metuendum est ægro, ubi ob regimen moderatius pustulae minus exacerbatae nullam qualitatem Causticam contraxere.

* Jam vero, licet methodus hæc (si caute scilicet ac prudenter circumstantiis particularibus accommodetur) prædicta illa a natura abhorrentia atque periculosa symptomata præoccupet, & securum atque perbenignum morbum reddat; a quacumque tamen causa exorta sint hæc, me nondum accersito; necesse habeo in aliquibus, quæ hic subnectam, alia via insistere, eadem ut submoveam atque debellem.

In primis igitur, si in *Discreto* genere ob regimen justo calidius, & continuos sudores, ægri facies die octavo non intumescat, (pustulis interim satis dense se exerentibus) sed flaccida sit, & pallescat pustularum interstitia, in casu posito, ultra quod ad temperatum magis regimen, & compescendum sanguinis ὀργασμὸν velis remisque contendere, *Paregoricum* aliquod medicamentum e vestigio hauriendum præcipio; quod quidem somnum blande conciliando (nisi plus nimio cerebrum incaluerit) & mitigando proinde æstrem sanguinis ferociam, sanguinem una cum calore ad faciem, prout morbi ratio postulat, tempestive determinat. Quod si eo usque processit malum hac προφασίῃ ortum, ut sudor, qui huc usque copiose inanavit, sponte sua defecerit, æger Phrenitide corripiatur, de vehementi queratur ægritudine, urinam paucam at frequenter reddat; jam non aliis auxiliis (cum in propinquo mors sit) ægro subveniri posse autumo, quam vel Narcotica afflatim exhibendo, vel sanguinem liberaliter extrahendo, corpusque auræ exponendo. Et profecto haud ita temerarium, atque ἀσέπην videbitur, quod jam proposui, si ad illos animum advertamus, qui ob copiosas narium Hæmorrhagias subito ingruentes, ferreas imminentis lethi manus salvi evasere. Illud insuper est perpendendum, quod in extremo hoc agone non idcirco instat mors, quod pustulæ intro recedant, (extant enim hæc eminentque cum insigni rubore, etiam animam agente ægro) sed quod facies non turgescat: ad promovendam vero hanc faciem intumescantiam, quicquid iddemum est, quod ad sanguinem contemperandum facit (venæ sectionem autem & modicam refrigerationem eam vim obtinere nemo, opinor, negaverit) necessario æque ac Paregoricorum usus, atque ob easdem plane rationes, debet conferre.

Non hæc ita velim intelligi, ac si in qualibet Phrenitide, Variolis superveniente, (cum nullum hic symptoma frequentius occurrat) venæ sectionem statim suaderem, sed in illa tantum, quæ ideo accidit, quia facies non turgescit, in *distincto* scilicet genere, & pustulis copia satis magna comparentibus; vel ubi ob regimen admodum calidum, & Cardiacorum usum, sanguis adeo effusus est, atque ultra omnem modum evehctus, ut inducias ferre nequeat, donec medicamentis *Paregoricis*, & reliquis eodem facientibus, ad debitam temperiem reduci possit. Cum enim ita se res habent, Medicus ad conscientiam suam potius, quam ad incertam famam se componens, vel sanguinem, ut ante dictum, detrudere debet, vel ut æger aere liberiori refocilletur, præcipere: Quod ut satis efficeretur, sæpe mihi visum est in tali agone phrenetico, ut æger lecto aliquantisper exurgeret, quo facto plures a morte liberavi. Præter ista vero quæ oculis ipsis usurpavi, innumera sunt illorum exempla, qui his modis quasi Orci faucibus erepti sunt. Phreneticorum enim nonnulli nutricum curam fallentes (miris scilicet artibus utuntur homines ita affecti) atque e lecto dilapsi aeris frigori semetipsos etiam noctu exposuerunt: Alii frigidam vel furtim, vel raptim nacti, vel etiam precibus a nutrice emendicatam hauserunt, adeoque felici errore salutem jam plane desperatam consecuti sunt.

Unicam hic loci historiam adscribere non gravabor, quam ab eo ipso accepi, cujus res agebatur. Is nempe *Bristolium* profectus, juvenis adhuc, inque ipso ætatis flore, circa mediam ætatem Variolis correptus est, iisque paulo post phrenitis accessit: Nutrix in urbem ingressa, interim ægrum suum aliorum curæ commisit, mox nempe reditura. Verum dum paulo diutius moratur, ægrotus (ut astantibus visum est) interea moritur. Astantes, & anni tempestatis, & habitus ægri, crassi scilicet atque corpulenti, rationem habentes, ne oleret cadaver, e lecto sublatum ac nudum mensæ imponunt, linteo superstrato. Nutrix tandem rediens, accepto nuncio, cameram intrat tristissimo spectaculo interfutura; mox amoto linteo, vultuque conspecto, subobscura quadam vitæ indicia conspici sibi visa est, ac proinde statim projectum corpus in lectum reposuit, adeoque sub manu consilium capiens, ac nescio quid fatagens, ægrum suum in vitam revocavit, atque diebus aliquot interpositis sanum conspexit.

Sed ut ad propositum revertar; Proximo loco, si in Variolis *Confluentibus* saliva eo usque excocta sit & viscida ob calorem præcedentem, ut tantum non suffocetur æger, (quod undecimo, ut supra diximus, die non insolens est) *Gargarisma* necessarium in usum trahatur, & ut sæpe die nocteque siringa in fauces sedulo injiciatur, serio imperandum. Componatur vero illud e cerevisia tenni, vel aqua hordei, cum melle rosarum. Vel sequens usurpari poterit: ʒi. Cort. Ulmi ʒvi. Rad. glycyrrhiz. ʒss. Passular. enucleat. n. xx. ros. rubr. p. ij. coq. s. q. aq. ad ʒijss. colatura dissolv. Oxytel. simp. & mel. ros. an. ʒij. M. s. f. Gargarisma. Quod si æger rite fuerit tractatus, *Ptyalismus*, etiam cum jam cœperit imminui, ita pulchre suo fungetur munere, ut hoc remedio opus non fuerit. Et profecto ubi eo res rediit, ut æger singulis momentis a suffocatione periclitetur, stupore obrutus, & spiritu fere undequaque præcluso, non satis tuto huic remedio fiditur: Ægro ita ad incitas redacto *Emeticum* peropportune ac feliciter nonnunquam exhibui ex *infusione Croci Metallorum*, sed dosi paulo majori, scilicet ad ʒijss. quando, ob eximiam, qua laborat æger, stupiditatem, minor dosi haudquaquam operabitur, atque interim eos exagitando humores, quos nequeat educere, ægrum in magnum vitæ discrimen conjiciet. Sed neque huic remedio satis fidere possumus, atqui (quod vere dolendum) aliud adhuc certius desideratur ad truculentissimum hoc symptomata debellandum, quod solum ac suo Marte eos fere omnes jugulat, quotquot in hac Variolarum specie die undecimo intereunt.

Cætera quæ in hoc morbo accidunt symptomata, ut præcurventur ope regiminis moderati, ita ab eodem pleraque etiam tolluntur: e. g. ut Phrenesis antedicta, a nimia cerebri excalescentia prognata, sanguine quovis modo paululum ventilando curatur, eadem methodo & Comati (quod alteri contrarium prorsus videtur symptoma, & ab obstructione corticis cerebri fit, dum halitus calidiores a sanguine regiminis ac medicamentorum calidorum usu attenuato, magna copia ac vi illic impelluntur) facile occurritur.

Sydenham Opera Medica.

* Curatio Symptomatum.

Eadem hac sanguinis contemperatione & *Maculas Purpureas* vidi sublatas: Sed neque hac, neque alia methodo quacunque, vel *mixtum sanguinis*, vel violentam ejusdem e pulmonibus eruptionem adhuc sufflaminare potui; utraque vero Hæmorrhagia hæc, quatenus mihi hæcenus observare licuit, indubie mortem prænunciat.

In *Urinæ suppressione*, quæ juniores ac vegetos nonnunquam incessit (a confusione scilicet magna & spirituum ἀρραξία, ejusdem excretionis subservientium, ob sanguinem & humores nimio fervore agitados) omnes *Diureticorum* tribus in auxilium accersivi, sed nihil æque feliciter hic mihi cessit atque e lecto eximere ægrum, qui postquam adstantium manibus suffultus cubiculum bis terve circumambulaverit, mox urinam satis copiose reddet, haud parvo cum levamine. Testes hic possim compellere Medicos quosdam e familiaribus meis, qui in hoc casu ex meo consilio idem fieri præceperunt, neque eos fessellit eventus.

At vero quæ a materiæ variolosæ repercussione ob frigus extremum, vel evacuationes indebite factas, proveniunt symptomata, usui Cardiacorum & conformi regimine sunt tollenda, qui tamen non ultra spatium, quo ista perstant, continuandus. Horum præcipua sunt pustularum depressio seu procidentia, & *Diarrhæa* in Variolis *Discretis*. Neque enim in *Confluentibus*, vel pustularum depressio mali quidquam ominatur, cum ea sit morbi natura; neque *Diarrhæa* infantium iisdem laborantium, cum salutem ista adferat, non periculum. In utroque hoc casu potio Cardiaca ex *Aquis stillatitiis* appropriatis, cum *Diascordio*, *Laudano liquido*, &c. jure optimo concedetur, idque non tantum ad dicta symptomata submovenda, sed quolibet morbi tempore, si æger de cordis dolore atque ægritudine conqueratur. Sed ut verum loquamur, symptomata hujus generis oppido rara sunt, si cum illis conferantur, quæ extremorum alteri, exitiabili magis, licet minus culpato, debentur. Et quidem opinor, rumorem illum, qui de crebra pustularum retrocessione invaluit, ex eo natum esse, quod qui earundem depressionem in genere *Confluentium* observaverint, illam pro materiæ variolosæ ob susceptum frigus recessu habuerint, cum nihil sit hic præter morbi morem: Atque in genere *Distincto* idem suspicantur, quia scilicet pustularum eruptionem atque augmentum ante diem expectant, cum non satis attenderint ad tempus illud, quo natura fructum hunc ad maturitatem solet perducere.

Ægro jam convalescente pustulisque deciduis, ubi per dies aliquot carnes idem degustaverit, circa diem nempe *Primum & vicissimum*, sanguinem e brachio extrahendum censeo, si morbus fuit vehementior, cum inflammatio, quam sanguini impresserunt Variolæ, siue adultus fuerit æger, siue infans, non minus venæ sectionem indicet, quam colluvies, quæ eidem accrevit, Catharsin: quod satis liquet, tum a sanguinis colore, qui post atrociorum morbum educitur, Pleuriticorum sanguini omnino similis, tum etiam a magnis istis inflammationibus, quæ post morbum hunc in oculos decumbunt, aliisque diris sanguinis excalescentiæ & a morbo depravati effectibus, unde etiam, qui antea pancreaticæ valebant, postea cum humoribus calidis acribusque in pulmones, aut aliam aliquam partem depluentibus, per reliquam vitam omnem configunt. At si pauciores extiterint pustulæ, Phlebotomia non opus erit. Post venæ sectionem Catharticum exhibeo ad tres vel quatuor vices.

Ad hæc, ægro a *Confluentibus* Variolis jam diu liberato, & e lecto quotidie surgenti nonnunquam accidit *Crurum tumor* ferus ac molestus; qui tamen vel sponte facessit post venæ sectionem & Catharsin, vel usu herbarum emollientium ac discutientium, (quales sunt *Malvæ*, fol. *Verbasci*, *Sambuci*, *Lauri*, cum flor. *Chamomillæ* & *Meliloti*) in lacte coctarum, facile fugatur. Atque hæc de Historia Variolarum, quæ hosce annos grassatæ sunt, quas, ut ab aliis speciebus, quæ infecutæ sunt, dirimam, *Legitimas* appellare libuit.

C A P U T III.

Febris Continua Annorum 1667. 68. & partim 1669.

J Am ut de Febre illa dicam, quæ durante *Variolosa* hac *Constitutione* dominabatur, & cum Variolis ingressa, stetit cum iisdem, ceciditque: Ita se hic res habuit; Doluit æger in regione, quæ cordis scrobiculo subjicitur, nec sustinuit, ut manu illa premere-tur; quod quidem symptoma non memini me observasse in alio morbo præter hanc febrem, & hanc speciem Variolarum. Capitis dolor, & calor totius corporis, ut etiam Petechiæ, satis manifesto indicio se probebant. Sitis interim non urgebat. Lingua sanorum similis non raro comparuit, nisi quod quandoque albidæ, sicca rarissime, nunquam vero nigra. Æger in spontaneos eosque effusissimos sudores ab initio morbi solvebatur, sed cum nullo levamine; quinimo ubi calidioribus medicamentis & regimine provocabantur isti, periculum erat, ne mox Phrenitide corripere-tur. Petechiarum insuper numerus augebatur, atque alia symptomata adhuc efferebantur omnia. Urinæ separatio, quæ satis videbatur laudabilis, vel ab initio, spem faciebat salutis; neque tamen æger magis exinde in melius proficiebat, quam post *διὰ πόσιν*, de qua prius diximus. Si minus recte tractaretur hic morbus, diutissime protraheretur plerumque, neque crisi aliqua facta, nec sponte more aliarum febrium desinens, sed vehementibus symptomatis miserum excrucians ad septimanas sex vel octo, nisi mors intercederet. *Ptyalismus* quandoque satis copiosus sub finem accedebat, si nempe nulla insignior præcesserat evacuatio, atque ægro Julapia refrigerantia imperata fuerant; quo quidem, si neque vaccinationibus, neque usu medicamentorum calidorum fuerit interceptus, morbus ultra spem omnem fugam sibi quærebat.

Ut vero febris hæc ab ista aeris constitutione epidemica penderet, quæ eodem tempore Variolas producebat, ita profecto dicta febris, si non eadem plane esset, ejusdem fere cum illis naturæ atque indolis per omnia videbatur, demptis solummodo symptomatis istis, quæ eruptionis vel consequentiæ, vel effectæ erant necessaria: Nam eodem modo uterque morbus aggrediebatur, dolor idem in partibus, quæ cordis scrobiculo subjacent, si manus admoveretur, linguæ item color, urinæ consistentia, &c. Sudores spontanei copiosi ab initio oborti ubique respondebant. Propensio itidem quam habebat hic morbus, quoties in flammam vehementiorem assurgeret, se per *Ptyalismum* exonerandi, eadem prorsus erat atque in Variolis hisce, quoties scilicet *confluebant*. Cum insuper hæc febris eo præcipue tempore sæviret, quo latius quam unquam alias, quantum ego observavi, hic locorum grassa-

bantur Variolæ, nemini dubium esse potest, quin ejusdem omnino sint profapia. Id certo scio, Phænomena practica omnia, quæ curationem respiciebant, eadem plane fuisse in utroque morbo, exceptis istis, quæ Variolarum eruptio, ejusque effecta in isto morbo indicabant, quæ cum nulla essent in hac febre, indicari proinde non potuerunt; quod quidem mihi abunde constabat ex accuratissimis illis observationibus, quas feci, dum utroque morbo laborantes tractarem. Quapropter danda mihi est venia, (non quod nova rerum nomina affectem, quæ perinde mihi sunt invisa, atque illi cui maxime, sed ut hanc febrem a cæteris distinguam) ut istam a similitudine, quam cum hac Variolarum specie habet, *Febrem Variolosam* insigniam.

Utut vero febris dicta Variolas referebat, nemo tamen sanus eadem illam methodo debere curari facile sibi persuaserit, cum in his mediantibus abscessulis particulæ inflammata in habitum corporis amendantur, eliminanturque; in hac febre autem non nisi per salivationem ejiciantur: Quia enim in morbi principio manabant sudores profusi, *Symptomatici* erant, non *Critici*; cum natura non aliam hic evacuationem videretur designasse, quam *Salivationem*, quam tamen ipsa eadem natura pervertit ut plurimum, vel *Diarrhæa*, quæ sæpissime a radiis inflammatoriis per arterias mesentericas in intestina delatis, atque eadem ad excretionem sollicitantibus, exoritur, (quod etiam in *pleuritide* usuenit, aliisque febribus inflammatoriis, ob sanguinis, particularumque fervidarum orgasmum, ut eventilentur, fatagentium) vel immensis etiam sudoribus, qui morbum hunc pariter cum Variolis ex naturæ præscripto ubique comitabantur: quibus cum symptomati essent ipsi, *Salivatio*, quæ critica alias erat futura, alio derivabatur; ita ut nisi evacuationem aliam suggereret Ars, ad septimanas aliquot perseveraret morbus, nec aliarum febrium more concoctionem subiret.

Sed ut paulo ulterius progrediamur, quo & febris hujus naturam rectius capiamus, & ea pariter substernamus, quibus *Indicationes Curativæ*, tanquam immobili fundamento, superstrui possint, omnino animadvertendum est, quod in *Febre* illa, quæ in *Constitutione Intermittentibus Epidemica* vigeat, materia, quæ a sanguine erat sejungenda, tantæ erat crassitudinis, ut separari nequiret sine prævia digestionem, quæ ad debitam evacuationem disposeretur, (determinato se. ad hoc tempore,) idque vel *diapnoia* paulo pleniori, vel dejectionibus criticis; ita ut id tantum negotii Medico daretur, sic se ad morbi genium accommodare, ne ex una parte in symptomata periculosa assurgeret, atque ebulliret, neque ex altera ita parum efferveret, ut materiæ inimicæ exterminandæ impar prorsus esset, cum febris naturæ instrumentum fuerit, ad hujus secretionis opus debita opera fabricatum. Quin & in *Peste* materia aliqua reperiebatur a sanguine segreganda; sed cum subtilissimarum fuerit partium & maxime inflammabilium, (ita ut quandoque ubi summe exacerentur, sanguinem, fulguris instar, pervaderent, nec ebullitionem quidem in eodem ciere valerent) ictu oculi per eum trajiciebat, nec nisi in glandula, aut parte aliqua externa sistebatur; ubi irretita carnes circumjacentes primo in inflammationem, postea in *Apostema*, pertraxit. Est autem *Apostema* naturæ machina, qua ista, quæ carnibus infesta sunt, amolitur, sicut *Febris* ejusdem est machina, ad diffundenda ea, quæ sanguinem male habent. Quo in casu Medicorum est, evacuationem materiæ pestilentialis, quam per hos abscessus natura molitur, prout decet, regere; nisi forte quis magis consultum esse putaverit, aliam aliquam evacuationem substituere, quæ magis penes illum fuerit, ejusque arbitrio certius obtemperaverit, quam illa naturæ. Eodem etiam modo procedit natura in expellenda *Variolarum* materia, licet ea species sit inflammationis pinguioris ac magis crassæ, quæ per pustulas ubique sparsas ejicitur. *Carbuncolorum* loco ac *Bubonum* &c. Atque in hoc etiam casu indicationes curativæ eo sunt dirigendæ, ut naturalis per pustulas evacuatio rite administretur. Jam vero cum in hoc *Febris inflammatoria* genere, de quo nunc agimus, non inveniatur crassior illa materia, non nisi prævia digestionem egerenda, sicut in febre superius descripta, incassum ebullitioni obsecundamus ad obtinendam hujuscemodi digestionem; quinimo econtra, haud leve est periculum, ne huic viæ insistentes, stimulos addamus morbo, cujus esse in inflammatione plus satis violenta consistit: atque porro, cum natura nullam huic febri evacuationem per modum eruptionis constituerit, quod in febre pestilentiali & variolis fieri cernimus, (utut rebus aliis posteriori huic morbo respondeat) necessario in hoc stabit rei summa, ut sedetur *inflammatio* evacuationibus & medicamentis contemperantibus. Hunc mihi proponens scopum, hujuscæ febris curationem aggressus sum, quæ methodo hac haud difficulter expugnata fuit.

* Ad ægrum accersitus, mox sanguinem e brachio educendum curavi, modo nimia debilitas, præsertim vero provectior ætas, non contra indicaret; & venæ sectionem insuper alternis diebus ad duas adhuc vices repetendam jussi, nisi redeuntis sanitatis signa aliter suaderent. Diebus interjectis *Enema* e lacte & saccharo, vel simile injiciendum præcepi; præscripti & Julapii sequens, vel aliud ejusmodi, frequenter per omnem morbi decursum assumendum; *℞ Aq. Portul. Laëuc. fl. Paralys. an. ℥iv. Syr. de Limon. ℥jss. Syr. Violacei ℥j. Cap. ℥iij.* quater vel quinquies in die, & ad libitum; serum lactis, a quam hordei, & similia ejus farinæ pro potu ordinario concessi; pro victu fuscula etiam hordeacea, avenacea, panatellam, poma cocta, &c. jusculis vero e carne pullorum, vel alia quacumque interdixi.

Præ reliquis omnibus edixi, ne se in lecto assidue contineret, sed illo abstinere bonam diei partem, idque quotidie; quando observaverim in hac febre, (uti etiam in *Pleuritide*, *Rheumatismo*, aliisque omnibus morbis inflammatoriis, in quibus abigendis venæ sectio & refrigeratio primas obtinent) medicamenta summe refrigerantia, & repetitam sæpissime Phlebotomiam ne hilum prodesse, dum interim æger lecto indefinenter affixus ejus calore torreatur, æstate præsertim. Quocirca nec sudores, quibus subinde difflebat æger, ab hac methodo refrigerandi, tum medicamentis exhibitis, tum jugem lecti usum vetando, me deterrebant: Et si enim, sumpta a plerumque juvantibus *Indicatione*, magnum sibi quis inde emolumentum haud injuria pollicaretur, refragabatur tamen ubique experientia, quæ magistra didici, ægrum non modo nihil exinde commodi capere, sed e contra vehementius incallescere; ita ut non raro *Phrenesis*, *Petechiæ*, cæteraque pessimi ominis symptomata mox hujuscemodi sudores exciperent, quæ non tam a morbi malignitate, quam *finistro* regimine oriri videbantur.

* *Curatio.*

Si e contra dicatur, jam laudatam febrium curandam methodum Authorum Theorias omnimode adversari, qui omnes uno ore pronunciant, febrem per *διαφορίαν* rectissime, ac maxime naturaliter expediri; hæc habeo, quæ pro me militat, præter certissimæ ac constantis experientiæ testimonium mihi in hujus particularis febris curatione nunquam non suffragantis. Suppono ante omnia viros doctos, qui sudorum provocationem ad tollendam febrem efflagitant, eos velle sudores, qui a prævia digestionem humoris alicujus in sanguine stabulantis excernuntur, in quo humore elaborando, præparandoque, ut per *διαφορίαν* eliminantur, natura certo aliquo ac determinato tempore fuerit occupata. Verum enim vero longe aliter hic se res habet; æger enim a primostatini morbi impetu in sudores uberrimos solvitur, qui soli morbi hujus pars magna sunt, & si Phænomenis omnino omnibus sit habenda fides, morbus hicce a nudo potius calore & sanguinis æstu, quam ab humore aliquo delitescente, & post debitam concoctionem e sanguine per sudores expellendo, pendere videtur. Quod si demus, hujuscemodi humorem digestionem maturandum in hac febre pariter, atque in multis aliis reperiri, quorsum attinet, Naturæ (cujus enormiora molimina in ordinem redigere opis est nostræ) plus nimio satagenti morem gerere, hujuscemodi sudores vel Cardiacis provehendo, vel regimine calidiore, cum non minus sudores respiciat, quam dejectiones, tritum illud Axioma, *Cocta, non cruda, sunt medicanda*.

Stante hac constitutione, accerfebar ad virum doctissimum D. D. Morrice (qui tum temporis Londini, jam *Petworthiæ* Medicinam cum laude facit) hac febre cum effusissimis sudoribus, & frequentibus *Petechiis* laborantem; Consistentibus aliis aliquot Medicis, utrique nostrum familiaribus, vena secta fuit, surrexit e lecto, absterfo primum sudore, medicamentis, & diætâ refrigerantibus usus est, præsentissimo cum levamine, multis malis atque periculosis symptomatis mox diffatis, & cum eidem methodo insisteret, intra paucos dies sanitati restitutus est.

Sed ad rem: Neque etiam *Diarrhæa*, quæ febrem hanc sæpissime comitabatur, me a dicta methodo vel latum unguem dimovit; quinimo expertus sum (cum scilicet ab halitibus inflammatoriis e sanguinis massa per arterias mesentericas in intestina excretis, atque eadem vellicantibus, illa nasceretur) nihil huic profluvio sistendo æque conducere atque venæ sectionem, & sanguinis contemperatorem, *aqua Hordei*, *sero lactis*, atque aliis supra nominatis procurandam.

Hæc sane methodus optime mihi cessit in hujus morbi curatione, ad quam quidem apta nata præcæteris mihi videtur. Non quod ego nunquam via longe contraria incedentibus spectator interfuerim, adhibitis scilicet Cardiacis, & calido regimine, ægro nihilominus a morbo sæpe liberato, ita tamen, ut mihi semper videretur is non mediocre discrimen adisse, nulla id suadente necessitate. Etenim *Petechiæ*, quæ aliter perpaucæ erant, his modis numerosissimæ scatebant; sitis, quæ ut plurimum vix molestabat, jam intensius urgebat; lingua, quæ alias humida solebat esse, neque a sanorum lingua, nisi quod, ut diximus, subalberet aliquantisper, multum abhorrens, sicca in hoc regimine, arefactaque, quin & nigra sæpe comparebat. Postremo illi ipsi sudores, quos Cardiacorum usu extorquere satagebant, tandem eorumdem ope penitus interciderent: Exacta enim per corporis habitum nimis larga feri copia, sanguis humori istiusmodi ulterius suppeditando par non erat, cumque ista, qua dilui debuerat, humiditate in solidum jam spoliaretur, exarescebat protinus æger; atque in externis partibus constringebatur, omnino præter naturæ morem, quem in hac febre observare solet, donec tandem sanguis humiditate ab absumptis mutuata denuo repletus, partim medicamentorum, partim etiam febris vi, serum hoc recens ingestum, ac cum illo febrem, a finibus suis pelleret. Quæ quidem crisis erat coacta nimis, & nimis periculosa, & (quod adhuc pejus) rarius etiam contingebat.

Jam vero, ut supra monuimus, febris hujus solutio, ut etiam Variolarum, (quæ soror ejus germana merito audiunt) per *Salivationem* non raro fiebat; quæ quidem nunquam non salutis fuit, ita ut eadem liberalius prodente tam maculas revera purpureas, quam Febrini ipsam evanescere oculis viderim meis. Oborta itaque *Salivatio*, nulla omnino evacuatio convenit, nec quæ vena pertusa, nec injecto quæ fit *Enemate*; cum ab utraque periculum sit, ne humor alio divertatur. At serum lactis, atque alia refrigerandi vi pollentia necessariam in *Salivatione* elicienda operam navabant, ut e contra Cardiacæ, & quæcumque alia calefaciebant, materiam inspissandam ejusdem educationi officiebant.

Superstite adhuc febre hac, necdum extincta penitus, anno maxime 1668. * *Diarrhæa*, sine manifesto aliquo febris indicio, epidemice grassabatur: Jam enim *Constitutio* ad *Dysentericam* illam accedebat, quæ insequentis anno invaluit, ut jam proxime dicemus. Hanc nihilominus eandem ego censui febrem esse cum *Variolosa* adhuc regnante, forma tantum diversa, atque alio se symptomate efferentem. Cum enim mihi constaret, rigorem, atque horrorem hanc etiam *Diarrhæam* præcedere solere, atque illam insuper ut plurimum ex eadem *πρωτοει* invadere, ex qua solebat ista, quæ tum depopulabatur, febris, verisimile mihi est visum, febrem hanc ortum suum debere radiis inflammatoriis in intestina inversis, atque eadem ad expulsiorem hanc sollicitantibus; cum interim sanguinis massa, ope hujus diverticuli a malis, quos aliter radii isti attulissent, effectibus integra maneat, atque illæsa, nullo febris visibiliter signo exterius se prodente. Ad hæc æger partes cordis scrobiculo accumbentes manu premi non tulit (quod quidem symptoma, & *Variolis*, & febris hujus *Constitutionis* accidisse jam pridem ostendimus.) Idem etiam dolor, atque eadem carnium teneritudo sæpenuero externe in Epigastrium protendebatur; nonnunquam etiam inflammatio, quæ in *Apostemate*, atque ægri morte demum terminabatur. Quæ omnia luce clarius indicabant, *Diarrhæam* hanc ejusdem omnino naturæ fuisse atque essentia cum illa, quæ tum dominabatur, febris. Sententiam hanc meam magis adhuc ratam faciebat felix eventus, quem venæ sectio, & medicamentorum, diætæ, atque regiminis refrigerantium usus, quæ in *Febris Variolosæ* curatione usurpasse nos sæpe diximus, in sananda etiam hac *Diarrhæa* perpetim habuere, utpote quæ huic methodo prompte cessit: Cum vero alia longe diversa tractaretur, sive exhibitis *Rhabbarbaro*, aliisque *Catharticis lenitivis* (ad deturbandos scilicet mordaces istos succos, qui intestina ad hujuscemodi excretionem putabantur irritasse) sive etiam astringentibus; ex levi, sua natura,

morbo

* *Diarrhæa.*

morbo in exitalem sapissime evasit; ut, qui eo anno concinnabantur *Diem obeuntium Indices*, plus satis testantur. Atque hæc dicta sunt de *Morbis Epidemicis*, qui ab hac *Constitutione* pendebant.

SECTIO QUARTA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica partis Anni 1669. atque integrorum 1670. 1671. 1672. Londini.

I Neunte Augusto * An. 1669. *Cholera Morbus*, immania *Ventris tormina sine Dejectionibus*, uti etiam *Dysenteria*, quæ per decennium jam parcius comparuerat, grassari cœperunt; *Cholera Morbus*, quem nunquam antehac ita fuisse Epidemicum animadverteram, hoc non obstante, eo etiam anno, uti semper, intra Augusti cancellos stetit, vix in priores Septembris hebdomadas evagatus. Ventris autem *Tormina absque dejectionibus* ad Autumni exitum usque perseverabant, & *Dysenterias* comitabantur, quibus etiam latius spargebantur illa: Superveniente vero hyeme tormina ista sine dejectionibus penitus disperebant, nec deinceps infestabant per sequentes Annos, quibus vigeat hæc *Constitutio*, qua nihilominus *dysenteria* *ἡπιόμικτός* sæviebat. Cujus rei hanc ego causam fuisse arbitror, quod scilicet *Constitutio* ista nondum ita perfecte in *Dysentericam* transierat, ut symptomata illa omnia quæ *dysentericos* affligunt, in singulis valeret producere. Etenim insequente Autumno cum jam redirent tormina, nullo non symptomate Pathognomico stipatus incessit morbus. Inter *Tormina* hæc dejectionibus cassa, & *Dysenterias* jam memoratas quæ ubique populabantur, exoriebatur & novum *Febris* genus, utriusque morbo comes, quæ non eos tantum invadebat, qui priorum alterutro laborabant, sed etiam illos, qui ab utroque adhuc immunes perstabant; nisi quod nonnunquam (at rarius id quidem) ventris tormina admodum levia accederent, nunc soluta alvo, nunc vero adstricta; quæcum illam febrem quadantenus referret, quæ morbis præfatis non infrequenter adhærebat, *Febris Dysenterica* nomine ab aliis distinguenda est, maxime cum, ut mox docebimus, a *Dysenteria* genio atque indole in eo tantum recederet, quod *Dejectionibus* istis caruerit, quæ in *Dysenteria* indefinenter molestant, cæterisque iis effectibus, quæ huic evacuationi necessario debebantur. Appetente jam Brumali frigore *Dysenteria* ad tempus se subduxit; *Febris* autem *Dysenterica* magis grassabatur; *Variolæ* etiam, at mitiores, & fractis admodum viribus quibusdam in locis impetebant.

* Anno vero subsequente vix dum ingressu, ipso nempe Januario, succedere *Morbilli*, qui in dies auctiores facti, nullam ferè familiam, nullos saltem infantes intactos sinebant, atque ad *Vernum* usque *Æquinoctium* sensim invalescentes, ab illo tempore iisdem ferme quibus insurrexerant gradibus paulatim referrebat pedem, & Julio mense evanescere, non amplius visi per eos annos omnes, quibus dominabatur *Constitutio* hæc, nisi quod proximo anno ea ipsa tempestate, qua in præcedente, eruperant, rari hac illac dissiparentur.

Morbilli isti *Variolarum* generi, mihi hæcenus non cognito, viam sternebant, quas, ut a cæteris distinguam, ob Phænomena irregularia inusitataque a me observata (quæ postea in earundem Historia tradentur) a præcedentis *Constitutionis* Variolis longe distantia, *Variolas Anomalas Constitutionis Dysentericæ* compellere lubet. *Variolæ* hæc, licet morbillis longe infrequentiores, non paucos tamen aggrediebantur, donec inchoante mense Julio, *Febres Dysentericæ* prævalerent, epidemice incurstantes; approximante vero Autumno, Augusto scilicet, *Dysentericæ* postliminio revertebantur, atque omnia pervastabant, etiam inclementius quam prægresso anno defluerent. Hyberno tamen frigori terga dederunt, ut prius. Verum enim vero his fugatis *Dysentericæ Febres* & *Variolæ* hyemem omnem funestabant.

At circa initium Februarii * Anni insequentis, substitutis *Tertianis Intermittentibus*, uterque morbus rarior prodibat. Dictæ *Intermittentes*, licet non admodum epidemicæ, frequentiores tamen erant, quam quovis alio tempore observasse me memini, a quo sc. expiravit *Constitutio* ista, quam sibi adeo faventem illas habuisse supra notavimus. Atque hæc, pro more *Intermittentium Vernarum* Solstitio æstivo vix præterlapso omnino evanescere. Incipiente mense Julio, *Dysentericæ Febres*, quam præcedentibus annis obtinuerant stationem, de novo repetebant; Autumno vero aliquantum provectiore, *Dysenteria* jam tertio regressa est, sed contractior quam anno ultimo elapso, quo ad *ἀκμὴν* pervenisse videbatur, supervenienti autem Hyemi tertium etiam cessit, *Febris Dysenterica*, & *Variolis* reliquam eam tempestatem iterum contristantibus.

* Cum vero, ut jam monuimus, sub ingressu utriusque anni præcedentis morbus aliquis valde epidemicus invalesceret, *Morbilli* sc. exoriente Anno 1670. *Intermittentes* autem *Tertianæ* Anno 1671. inchoato, quorum prædominio ita intercidebantur *Variolarum* copiæ, ut fines suos, prædictis annis ineuntibus, longe lateque propagare nequirent: Hac, inquam, de causa remoto jam obice, (nempe initio Anni 1672.) cum solæ dominarentur *Variolæ*, *Epidemice* admodum ex consequenti grassabantur, donec subintrante rursum Julio, *Febres Dysentericæ* denuo invaderent, quæ redeuntibus jam quarto Augusto *Dysenterias* mox facessabant; *Dysenteria* vero non pauciores tantum quam prioribus annis fuerant, sed mitiora insuper apportabant symptomata. Porro *Variolis* hinc indeque simul sparsis, haud facile erat dictu, quis morbus præpolleret. Existimo quidem ego, *Constitutionem* aeris ad *Dysenterias* progignendas minus facientem, *Variolis* eam subministrasse facultatem, qua pari passu procedere valerent; secus atque iis annis quibus *Dysenteria*, Augusto mense confertim magis trucidabant. Hyems, ut solebat, *Dysenterias* ablegavit, sed neque *Febrem*, nec *Variolas*: *Variolæ* hic etiam pro more suo, exulantibus *Dysenterias*, rerum denuo potiebantur, & per omnem reliquam brumam regnabant. Quinimo subsequente Vere, ut etiam æstatis initio huc atque illuc deferebantur, longe tamen mitiores quam pro hoc genere.

Verum enim vero quando assero, *Epidemicorum* alterum ab alio Sydenham Opera Medica.

tero, ut clavum a clavo, pelli, non statim dico, eum qui pellitur ac cedit, morbum insolidum evanescere, at vero rarius invadere. Durante enim hac *Constitutione*, uterque morbus reperiebatur, etiam illa tempestate, qua cum minus ei conveniebat; ex. gr. *Dysenteria*, etsi morbus Autumno maxime proprius, unum fortasse aut alium, licet raro admodum, Vere incessabat.

Satis itaque evicimus, quod per integram hanc *Constitutionem*, subintrante Julio (qui mensis certissima est *Februm Autumnalium* Epochæ, uti *Vernarum* Februarii) *Febres Dysentericæ* grassabantur; Autumno vero jam se propius admovente, *Dysenteria* (morbus, si accuratius loqui velimus, vere Autumnalis) iisdem succedebant, quas ab hyeme diffusas excipiebant *Febris Dysenterica* & *Variolæ*; quæ quidem *Variolæ* non eam tantum hyemem, sed & subsequens etiam ver, nec non æstatem illis conjunctam peragrabant, donec reverso Julio, a *Febribus Dysentericis* epidemice præstantibus ejicerentur: Atque hæc rerum erant vices dum vigeret prædicta *Constitutio*.

Observare insuper est, quod sicuti epidemicorum quilibet in subiecto particulari suas habet periodos, *Augmenti* sc. *status*, & *Declinationis*; ita etiam *Constitutio Generalis* quæcunque, quæ huic alterive morbo epidemico producendo favet, pro ratione temporis quo dominatur suas etiam periodos habet, quatenus scilicet in dies magis ac magis epidemicæ grassatur, donec *ἀκμὴν* attigerit suam, atque exinde iisdem fere gradibus decreseat, donec tandem penitus exoleverit, alteri *Constitutioni* locum cedens. Symptomatum enim quod attinet vehementiam, atrociora sunt omnia ubi primum se ostendit; quæ quidem paulatim mitescunt, & in constitutionis catastrophe tam sunt benigna atque *ἡπιόμικτος*, quam patitur morbi natura, in quo fundantur; quod satis demonstrant *Dysenteria*, & *Variolæ* hujus *Constitutionis*, ut mox fusius declarabimus. Hujus *Constitutionis* morbos particulariter tractandos aggredior, eo, quem ipsi servarunt, ordine.

CAPUT II.

Cholera Morbus An. 1669.

Morbus hic, qui, ut antea diximus, Anno 1669. se latius diffuderat, quam alio quovis anno, quantum ego observaveram, eam anni partem, quæ æstatem fugientem atque Autumnum imminentem complectitur, unice ac eadem prorus fide, qua veris primordia Hirundines, aut insequentis tempestatis fervorem Cucullus, amare consuevit: Qui ab ingluvie ac crapula nullo temporis discrimine passim excitatur affectus, ratione symptomatum non absimilis, nec eandem curationis methodum respuens, tamen alterius est subfellii. Malum ipsum facile cognoscitur, adlunt enim vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; Ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; Cardialgia, sitis. Pulsus celer, ac frequens, cum æstu & anxietate, non raro etiam parvus & inæqualis, insuper & nausea molestissima, sudor interdum diaphoreticus, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, cum aliis consimilis notæ symptomatibus, quæ astantes magnopere perterrefaciant, atque etiam angusto viginti quatuor horarum spatio ægrum interimant. Est etiam & *Cholera sicca* a spiritu flatuoso supra & infra erumpente, idque sine vomitu, vel secessu; cujus unicum duntaxat exemplum me vidisse memini, ineunte hujus anni Autumno, quo tempore prior illa species mihi creberrime, & facta quasi agmine sece obtulit.

* Sedula mentis applicatione; & multiplici etiam experientia edoctus, quod si hinc acres istos humores, fomitem morbi, cathartici expellere conarer, idem agerem, atque is, qui ignem oleo extinguere satagit, cum cathartici, vel lenissimi operatio omnia magis perturbaret, & novos insuper excitaret tumultus. Et si ex adverso medicamentis Narcoticis aliisque astrigentibus in ipso statim limine primum humoris impetum compescerem, dum naturali evacuationi obfisterem, & invitum humorem detinerem, æger, inimico visceribus incluso, bello intestino indubie conficeretur. Has, inquam, ob causas, media mihi via insistendum esse duxi, ut partim scilicet humorem evacuarem, partim etiam diluerem; morbum itaque hac arte mihi a multis retro annis comperta, ac comprobata, toties quoties in ordine coegi.

Pullus tenerior in tribus circiter aquæ fontanæ congiis elixatur, adeo, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat; hujus decocti (vel defectu ejus, liquoris possetici) capaciore aliquot cyatos æger tepide exhaurire jubetur, eodemque tempore bona ejusdem quantitas pluribus *Enematis* successive injiciendis inservit, donec qua per superiora, qua per inferiora, tandem omne jusculum absumptum, ac denuo rejectum fuerit. Hisce haustibus, pariter ac clysteribus, syruporum *Lactuce*, *Violarum*, *Portulacæ*, *Nymphææ*, eorumve aliquis, uncia subinde admisceri poterit; quanquam, & citra ejusmodi additamenta, jusculum ipsum per se rem satis commode exequatur. Ita ventriculo insigni liquoris quantitate sapius onerato, atque, ut sic dicam, subverso, ac reiterata enematum injectione, humores acres vel foras eliminantur, vel retusa acrimonia ad debitam temperiem revocantur. Exantlato hoc eluvionis penso, quod tres, vel quatuor horas sibi vendicat, medicamentum aliquod *Paragoricum* curationi coronidem imponit: Mihi hoc crebro in usu est. ℞. Aq. Paralyf. ℥j. Mirab. ℥ij. Laudani liquidi gutt. xvj. cujus loco Narcoticum quodvis officinale succenturiari poterit. Atque hæc quam proposui diluendi humores via multo tutius ac expeditius, quam quæ vel per evacuationem, vel per adstringentia vulgo instituitur, periculosissimo affectui occurrit, quippe cum ab illis tumultus concitior, & ferocior evadat, ac omnia fusque deque vertantur; hæc e contra hostem in mediis visceribus detineant, ac ex advena redant plane iniquitatem; ut taceam, protracto in longitudinem morbo præter periculum ex ejusmodi mora, qua in massam sanguinis tandem humores vitiosi irrepunt, atque mali moris febrem facile accedunt, etiam ægris gravissimi mali tædium procreari.

At vero diligenter est animadvertendum, quod si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitu ac dejectionibus ad horas aliquas multas continuatis, puta 10. vel 12. fuerit exhaustus, & jam frigescant extrema membrorum; hoc, inquam, casu, omisissis aliis quibuscunque auxiliis recto cursu ad facram hujus morbi ancoram, Lau-

danum intelligo, confugiendum est, quod non tantum exhibendum est urgentibus symptomatibus, sed etiam cessantibus vomitu ac diarrhœa mane, & sero quotidie repetendum, donec pristinas vires æger, ac sanitatem tandem receperit.

Hic morbus, quantumlibet epidemicus, rarissime tamen (quod supra dictum est) *Augusti*, quo primum cœpit mense, terminos excessit, ex quo mihi subest contemplari elegantissimum illud subtilissimumque artificium, quo utitur natura in epidemicorum natalibus atque ortu; licet enim eadem prorsus maneant causæ, unde plures sub finem *Septembris* æque ac mense præcedente, hoc morbo possunt corripi, nimia scil. fructuum horariorum ingestio; eundem tamen non sequi videmus effectum. Quisquis autem *Cholera morbi legitimi*, quo cum solo nobis impræsentiarum res est, phænomena studiose collegerit, fatebitur morbum istum, qui quovis alio anni tempore invadit, quamvis ex eadem occasione prognatum, atque eorundem symptomatum nonnullis stipatum, ab hoc nostro toto cælo distare, haud aliter ac si in aere peculiaris mensis huius lateat reconditum, ac peculiare quiddam, quod specificam huiusmodi alterationem soli huic morbo adaptatam, vel cruoris, vel ventriculi fermento valeat imprimere.

C A P U T III.

Dysenteria partis Anni 1669. atque integrorum 1670. 71. 72.

Ventris tormina sine defectionibus initio *Augusti* 1669. ut supra innuimus, invadere cœperant, & excurrente eo Autumno, *Dysenterias*, quæ cum iisdem ingrediebantur, æquabant numero, ne dicam exuperabant. Febris nunc iis accessit, nunc aberat. *Dysenteriarum* per id tempus grassantium torminibus dicta ventris tormina omnino respondebant; atrocissima nempe hæc erant, & per intervalla cruciabant, nullæ vero sequebantur defectiones, vel *Stercorosæ*, vel *Mucosæ*. Pari passu cum *Dysenteriis* per Autumnum hunc omnes procedebant, sed, ut jam docuimus, non cum iisdem per annos sequentes huius *Constitutionis* epidemice amplius invadebant. Cum vero tormina hæc sine defectionibus neque natura sua, neque illa, qua promptissima sopiebantur methodo, a *Dysenteriis* multum diffideant, ad has me confero.

Animadverti, morbum hunc uti nunc, ita fere semper, *Autumni* initio invadere solere, & appropinquanti hyemi pro tempore cedere, cum vero annorum series eidem epidemice producendo nimum faveat, unum alterumve, etiam quovis alio tempore potest ferire; quin & circa *Veris* ingressum, forte etiam maturius, (si nempe aura calidior intemperantiori gelu de repente soluto mox supervenerit) plures aliquos incesse. Unde, perpauci licet fuerint, qui hoc corripiantur morbo, cum tamen id tempore ita alieno contingat (satis scio illam *Constitutionem* haud mediocriter huic morbo suffragari.) Atque ita se res habuit per eos annos, quibus *Dysenteria* ita late depopulabantur; quandoque enim circa finem hyemis aut *Veris* initium, uti dictum, hic morbus hunc illumve vexabat.

Nunc cum rigore horroreque aggreditur hic morbus, quos sequitur totius corporis calor (ut in febribus solemne est,) atque hunc brevi post ventris tormina; ista vero defectiones: Sæpe vero nulla antecedit febris præsentio, agmen autem ducunt tormina, defectiones subsequuntur. Semper tamen adest ingens cruciatus, & intestinorum depressio cum dolore, quoties exoneratur avus, cum crebris iidem defectionibus, & molestissimo viscerum omnium quasi descensu. Defectiones *mucosæ* sunt omnes, non *stercorosæ*, nisi quod nonnunquam *stercorosa* interponitur, idque sine dolore insigni. *Mucosæ* hisce defectionibus intertextuntur sanguinis quædam lineamenta; quandoque tamen ne minimum quidem sanguinis per omnem morbi decursum iisdem admiscetur; quo non obstante, modo frequenter sint defectiones, cum ventris torminibus, & colluvie mucosæ, morbus haud minus recte *Dysenteria* vocabitur, quam si una manaret sanguis. Interea temporis æger, si vel ætate floreat, vel cardiaco ope incalcescat, febricitat, lingua subalbida quadam mucilagine dense obsita, & si vehementius fuerit excalescens, nigra etiam atque sicca: Prosteruntur admodum vires, dissipantur spiritus, nullum non adest febris male moratæ indicium. Non dolores tantum summos atque ægritudinem adfert hoc malum, sed, nisi perite tractetur, ingens etiam in vitæ discrimen ægrum perducit: cum enim jam imminutæ caloris vitalis ac spirituum copiarum a crebris hisce defectionibus ante exhauriantur, quam peccans materia possit e sanguine exturbari, manuum ac pedum frigore superveniente, a morte periclitabitur, etiam intra morborum acutiorum periodos oppetenda; quod si intentatas *Paracarum* manus hac vice eluserit, plura tamen diverſi generis symptomata miserum expectant: v. gr. nonnunquam progressu morbo, loco filamentorum sanguineorum, quæ eodem incipiente defectionibus permixta conspici solebant, sanguis sincerus, ne mucos quidem intermixto, largiori quantitate singulis conatibus egeritur, quod, cum corrosione majorum aliquot vasorum quæ intestina perperant, argumentum sit, ægro interitum minatur. Nonnunquam etiam intestina a magniloquio incendio, quod excitavit materiam calidam atque aeris ad partes læsas affluxus copiosior, *Gangrena* insanabili afficiuntur. *Aphæ* insuper exeunte morbo oris interna faucesque sæpenumero obsident, in primis ubi corpus diu fuerit excalescens, & materiam peccantis evacuatio medicamentis astringentibus impedita, non exacto prius per cathartica morbi fomite. Atque hæc quidem mortem imminuentem ut plurimum denunciant. Quod si prædicta symptomata superaverit æger, & morbus in longum trahatur, tandem intestina ordine quæque suo deorsum versus affici videntur, donec in rectum intestinum malum omne detrudatur, & in *Tenesmum* desinat, quo facto, longe secus atque in *dysenteriis* defectione *stercorosa* vehementissimum intestinorum dolorem inferunt, alvi sc. sæcibus teneriora adhuc intestina inter descendendum radentibus; cum defectiones *Mucosæ* eo tantum tempore inferiori intestino, Recto nempe, molestias creent, quo materia in eo solo conficitur atque inde excernitur. Hic autem morbus licet *Adultis*, maxime *grandævis*, haud raro exitialis, *Infantibus* nihilominus perbenignus reperitur, qui ad menses aliquot ab eodem quandoque afficiuntur sine quovis incommodo, modo res naturæ permittatur.

Quantum cum hac, quam descripsimus, affinitatem habeat *Endemia* ista *Hybernorum Dysenteria*, non satis scio, cum nondum ea mihi innotuerit; quin & in his, quas incolimus, regionibus quo-

modo se habeat *Dysenteria*, quam jam depinximus, si ad illas referatur quæ aliis annis infestabant, mihi pariter incompertum est, cum fieri quidem possit, ut variae enascantur *Dysenteriarum* species, ut sunt *Variolarum*, & epidemicorum aliorum, diversis *Constitutionibus* propriæ, & quæ proinde medendi methodum in aliquibus diversam sibi suo jure vendicent. Neque est, cur hos naturæ lusus in re tantopere demiremur, cum in confesso apud omnes sit, quod quo profundius in quæcunque naturæ opera penetremus, eo luculentius nobis affulgeat ingens illa varietas, & divinum pene artificium operationum ejus, quæ captum nostrum longissime superant. Adeo ut quisquis ille fuerit, qui in se receperit hæc omnia, mente assequi, & multifarias naturæ operationes indagare, partim magnis ausis excidit, neque voti per omnia compos reddetur: Convitia interim, (si quid iudicando valet) pro reperiendorum, vel utilissimorum quam fecit semente, certo certius sibi metenda proponet, idque eam tantum ob causam, quod primum invenit.

Porro observandum est, quod *Epidemici* omnes ubi primum e naturæ sinu emergunt exiliuntque, quantum ex eorum phænomenis licet conjicere, principio magis spirituosio ac subtili videntur inhærescere, quam ubi jam magis adoleverint, quoque magis ad occasum vergunt, eo magis in dies crassi atque humores sunt: Etenim quales quales demum fuerint inimicæ istæ particulæ, quas aeri intime permixtas *Constitutionem Epidemicam* formare opinabimur, omnino par est, ut easdem majori agendi potentia per ea tempora pollere existimemus, quibus primum eruperint, quam postquam earum vires fuerint refractæ. Ita primis mensibus, quibus grassabatur *Pestis*, nullo fere non die ejus contagio afflati, dum in triviis versarentur, inopinanter extincti sunt, nihil prorsus mali præsentientes, cum, ubi morbus magis adoleverat, neminem, nisi febre atque aliis symptomatibus præcedentibus, unquam prostravit: Ex quo abunde conficitur, morbum hunc in ipsis incunabulis magis efferatam atque acutam fuisse, quam post principia, licet pauciores prima acie jugulaverit, acto jam sc. habebat in humana corpora influxu. In *Dysenteriis* pariter, de quibus jam agimus, omnia universim symptomata atrociora sub primo morbi ingressu comparebant, & licet, si ad ægrorum numerum respexeris, latius in dies malum serperet, donec tandem ad statum pervenisset, in quo ex consequenti plures interibant, quam ineunte morbo; symptomata tamen sub initio sæviebant magis quam in statu, ac multo adhuc magis quam in *Declinatione*, & cæteris paribus plures pro ægrorum numero *Ελαβε πορφυρεὺς θάνατος ἢ μὲν πρῶται*. Adde quod quo diutius perseverabat morbus, eo magis humoralis etiam videbatur; v. g. primo quo invasit autumno, quamplurima nullis omnino defectionibus molestabantur; torminum vero quod spectat atrocitatem, febris intensio, subitam virium prostrationem, aliaque symptomata, insequentium annorum *dysenterias* longo intervallo post se reliquit. Quinimo *dysenteria* cum defectionibus, quæ primæ incessebant, principio magis spirituosio ac subtili videbantur inhærere, quam quæ illas sequebantur. Etenim in primis *dysenteriis*, & conatus & ad desidendum irritatio majores erant, tum etiam frequentiores; ipsæ vero defectiones, *stercorosæ* præsertim, & minores, & magis insoleutes: Quibus autem gradibus morbus in genere se promovit, iisdem etiam imminuebantur tormina. Defectiones vero magis *stercorosæ* erant, donec tandem fatiscente *Epidemica* hac *Constitutione* tormina vix perciperentur, defectionesque *stercorosæ* magis essent, quam *mucosæ*.

* Ut ad curativas indicationes tandem procedamus, cum varia quæ huic morbo accidunt symptomata diligenter ac mature mecum pensitasset, *Febrem* eam esse (sui scil. generis) in intestina introversamprehendi, cujus ope humores calidi atque acres in massa sanguinea contenti atque eandem exagitant, per arterias mesaraicas in illas partes deponuntur: unde a vehementiori sanguinis atque humorum eo contententium impetu patefactis vasorum orificiis, sanguis per sedem effunditur. Interea temporis importuno intestinorum nisu, quæ omnem adhibent operam, ut humores acres continuo infestantes expellant, mucus iste quo naturaliter obducuntur, singulis sedibus, nunc parcius, nunc copiosius, una egeritur. Proinde ultro se *Indicationes* offerre videbantur, neque mihi aliud quippiam incumbere existimavi, quam ut primum acres istos humores secta vena immediate revellerem, quo facto insuper reliquam massam contemperarem, tum etiam dictos humores per cathartica subducerem.

Hac itaque methodo sum usus; Quo primum accerserem die, venam cubiti tundendam suavi, eadem nocte, & *Paregoricum* propinavi, & sequenti aurora potionem hanc cathartica lenitivam, mihi familiarem. *℞. Tamariid. ʒij. fol. Sennæ ʒij. Rhei ʒij. Coq. s. q. Aquæ. Colaturæ ʒiij. dissolv. Mann. & Syr. Ros. solut. an. ʒi. m. f. Potio sumenda summo mane.* Hanc ego potionem electuario cuilibet cum thei pauca quantitate parato, soleo præponere; licet enim *Rhabarbarum* cholerae atque acrioribus quibusque humoribus evacuandis sit dicatum; attamen nisi *Manna* aliquid, aut *Syrupi Rosacei*, vel aliud ejusmodi, ea quantitate admisceatur, ut ad pleniorum catharsin affurgat, in *dysenteriis curandis* non admodum conducit. Quandoquidem vero satis est obvium medicamentis cathartica etiam lenissima, & tantum *Εκκρωτικά*, ventris tormina intendere, spirituum etiam defectionem, atque *ἀραιάν* universalem ægro inferre, adventitio nempe illo tumultu, quo sanguinem ac humores commovent inter operandum: eapropter solemne mihi est *Paregoricum* temporis aliquanto subicere quam post cathartica consuevimus, hora sc. pomeridiana quacumque, modo catharticum suo defunctum munere videatur; quo scil. quem concitavi motum denuo sufflaminares valeam. Deinceps ad duas adhuc vices dictum catharticum præscribo, alternis scil. diebus hauriendum; paregoricum etiam post singulas purgationes, quo supra monuimus tempore. Hoc insuper diebus a purgatione vacuis tam mane, quam sero exhibendum curo, quo sc. symptomatum ferociam debellem, atque inducias impetrem, dum cum humore peccante exterminando mihi res est. *Anodyno* autem utebar maxime *Laudano liquido*, guttis nempe 16. vel 18. in aqua qualibet cardiaca, pro dosi una.

Post venæ sectionem, & catharsin semel celebratam per totum morbi decursum cardiacum quodvis e temperatioribus, et aq. epidem. aq. scord. comp. & his similibus subinde degustandum concessi. *Ex. gr. ʒi. aq. cerasor. nigr. & fragor. an. ʒiij. aq. epide. scordii comp. & cin.*

& cinnamomi hordeat. an. ℥j. margarit. preparat. ℥jss. Sacchari Cry-
stallini q. s. adde aq. rosarum Damasc. ℥ss. (ad guttum sc. gratio-
rem) mis. de quo cap. coch. iv. vel v. in languoribus, vel ad libi-
tum. Hæc autem in primis in senioribus ac phlegmaticis usurpavi,
quo nempe spiritus magna dejectionum vi, quod in hoc morbo usu
venit, prostratos erigerem quadantenus, & refarcirem: Potus erat
lac coctum cum aquæ triplo; aut Decoctum album (quod appellant)
ex C. C. & mica panis albiss. an. ℥ij. coctis in aq. font. ℔ij, ad
℔ij. & postea q. sacchari albiss. edulcoratum: aliquando etiam lac
cerevisiatum; vel, ubi dejectio virium id postulaverit, Aq. font.
℔ij. cum Vini Canarini ℔ss. simul coctæ pro potu ordinario frigide
assumebantur. Panatella item nonnunquam vescebatur, nonnunquam
juscule e carnibus ovinis macilentioribus. Grandæviores lectulo ma-
gis addixi; Aquam item cardiacam illis familiarem liberalius induls-
quam infantibus aut junioribus par erat. Laudata methodus omni-
bus, qui mihi hætenus innotuere, in hoc morbo vincendo facile pal-
mam præripuit, qui perraro ultra tertiam purgationem duravit.

Quod si morbus præfractior his non cederet, dictum Paregoricum
ægro exhibui singulis diebus mane, & hora somni, donec omnino
convalesceret; immo quo certius adhuc hic affectus debellari potue-
rat, Laudanum prædictum octava quaque hora i. e. ter spatio diei
naturalis, propinare non dubitavi, idque in maiore dosi quam supra
recensui, nempe ad gutt. xxv. si prior dosi fluxui cohibendo haud par
fuerat. Insuper Enema ex lactis vacc. libra dimidia, & Theriac. Androm.
sesquialtera sing. diebus injiciendum curavi, quod quidem in quibus-
cunque alvi dejectionibus mire confert. Nec vel minimum quidem
incommodi a tam frequenti medicamenti Narcotici repetitione mihi
adhuc videre contigit (quantamlibet noxam inde secuturam commini-
scantur inexperti) licet plures noverim qui in morbo contumaciori
idem ad septimanas aliquot continuas quotidie usurpaverint. Hic au-
tem admonendum, quod cum alvi fluxus ad Diarrhoeam tantum au-
furgat, satis erit ut (phlebotomia ac catharsi fortiori omissa,) Rha-
barbarum solum singulis matutinis exhibeatur, nempe ejusdem pulv.
℥. ss. (plus minus pro ægri virium ratione) in Bolum s. q. Diascor-
dii concinnata, addendo ol. Chym. cinnamomi gutt. ii. noctibus autem
insequentibus Paregoricum ex aq. Cinnamomi hordeatæ ℥j. & laudan.
liquid. gutt. xiv. Dietam interim observando qualem in curatione
dysenteriae supra descripsi, atque etiam singulis diebus, si opus fue-
rit, clysterem injiciendo ibidem laudanum. Sed hoc obiter.

Ut unica instantia (neque enim pluribus convalescentium exem-
plis, nulla cogente necessitate, lectori tædium creabo) methodum
jam a me propositam commendatam faciam; vir pietate atque eru-
ditione insignis Th. Belke S. T. P. & Comiti Sancti Albani a Sa-
cris Domesticis, durante hac constitutione Dysenteria acutissima labo-
rans, me in subsidium accito, ipsissima hac methodo restitutus
est.

Infantes hoc morbo correpti eodem plane modo erant tractandi;
sanguinis tamen extrahendi quantitate, tum etiam medicamentorum,
tam Cathartici, quam Anodynæ viribus pro annorum ratione immi-
natis, ita ut v. g. Narcotici guttæ duæ infanti unius anni suffice-
rint.

Laudanum Liquidum, quod in quotidiano, ut dictum, usu mihi
erat, hanc ad normam simpliciorum præparavi. 2℥. Vini Hispanici
℔j. Opii ℥ij. Croci ℥j. pulv. Cinnamomi, & Caryophyllorum an. ℥j.
insundantur simul in B. M. per duos, vel tres dies, donec liquor debitam
consistentiam acquirat; Colatura servetur pro usu. Hanc nostram præ-
parationem Laudano officinarum solido anteferendam virtutibus qui-
dem non censeo, sed ob formam saltem commodiorem, & maiorem
dosis certitudinem, eidem antepono; cum sc. vino, aquæ distilla-
tæ, aut liquori alii cuicunque instillari possit. Et profecto non hac
mihi tempero, quin gratulabundus animadvertam, Deum Omnipoten-
tem παντα δυνάτα εἶναι non aliud remedium, quod vel pluri-
bus malis debellandis par sit, vel eadem efficacius extirpet, huma-
no generi, in miseriarum solamen, concessisse, quam sunt Opiata,
medicamentâ sc. ab aliqua Papaverum specie desumpta. Et quamli-
bet sint nonnulli, qui credulis persuadere velint, omnem fere Nar-
coticonum, Opii præsertim ipsius, virtutem ab artificiosa ac debita,
quam soli adhibent, præparatione pendere; qui tamen experientia
judice certaverit, & tam simplicem succum a natura oblatum, quam
ejus præparata cum diligenti observatione in usum frequenter revo-
caverit, nullum fere discrimen intercedere comperiet, & mirandos
illos effectus, quos edit, nativæ ipsius plantæ bonitati atque excel-
lentiae, non vero artificis polydædali solertiæ deberi certo sciet. Quin-
imo ita necessarium est in hominis periti manu organum, jam lau-
datum medicamentum, ut sine illo manca sit ac claudicet medici-
na, qui vero eodem instructus fuerit, majora præstabit, quam quis
ab uno remedio facile speraverit. Rudis enim sit oportet, & parum
compertam habeat hujus medicamenti vim, qui idem sopori concili-
ando, demulcendis doloribus, & diarrhoeæ sistendæ applicare tan-
tum novit, cum ad alia plurima, gladii instar Delphici, accommo-
dari possit, & præstantissimum sit remedium cardiacum, unicum,
pene dixerim, quod in rerum natura hætenus est repertum.

Hac methodo erant tractandæ Dysenteriae in genere. Observan-
dum est autem, quod cum primo quæ ingrediebantur anno, indolis
magis subtilis, uti dictum, ac spirituosæ essent, quam quæ sequen-
tibus annis infestabant, idcirco non ita prompte catharticks pare-
bant medicamentis, atque illis, quæ tam sanguinem diluebant con-
temperabantque, quam acres istos humores, qui ex eodem in fistu-
lam intestinale excernebantur. Quamobrem primo autumnio, quo
Tormina sicca, & Dysenteriae invadebant, methodum sequentem con-
stanter ad utrunque morbum abigendum adhibui, eventu ubique sti-
pulante; donec appetente frigore eandem etiam anno eodem minus
efficacem esse sentirem, atque annis sequentibus, cum jam magis a
subtilitate recederet morbus, prorsus inutilem.

Ita vero processu, si æger ætate florens febricitaret, cubiti venam
tundendam præcepi, atque elapsa hora una aut altera, eundem in-
gesto affatim liquore diluendum, ut in Cholera Morbo, factitatum;
non vero, ut illic, juscule e carnibus pullorum, aut lacte cerevisia-
to: at lactis ipsius fuso, quod eadem qua illic copia frigide propi-
nandum, tepide vero inferius injiciendum curavi, nec saccharo ad-
jecto, nec alia re quacunque. Tormina, & dejectiones sanguine
permixtas, rejecto jam quarto enemate semper evanescere animad-
vertebam. Hoc labore exantlato, & transmissa fero lactis omni (quod
duarum triumve horarum spatio fiet, si diligenter operam navave-

Sydenham Opera Medica.

rit æger) lectulo protinus eum commisi, ubi brevi sponte sua
in madorem solvebatur (a sero lactis sanguini immixto) quam ad
horas 24. continuari, minime provocari jubebam; nihil interim con-
cedens præter lac crudum paulo tepesfactum, quo etiam utebatur
solo ad dies tres vel quatuor postquam e lecto surrexerat. Si vel
ob lectuli, vel lactis usum nimis præmature intermissum, recidi-
vam pateretur æger, eadem vestigia denuo repetenda erant. Hæc
methodus, si certa atque expedita fuerit, non ideo a viro quolibet
prudente repudiabitur, quod fastuoso remediorum apparatu non se
vendit.

Hujusmodi Febrem symptomatis, qualia supra descripsimus, stipa-
tam iis in locis, & temporibus reperiri, quibus Dysenteria epide-
mice regnat, & methodum hanc quam delineavimus, eidem omnino
deberi, testimonio viri probi atque eruditi Doctoris Butler amplius
confirmabitur, qui Nobilissimum D. D. Henricum Houvard. a S.
Maj. Regia Britannica ad Moroccensem in Africa Legatum comita-
batur; quibus in regionibus, ut mihi ipse retulit, observavit Dyf-
senteriam per ea tempora, uti semper, epidemice grassari, &
Febrem, quæ cum illa jungebatur, omnino illi similem quam de-
pinximus; quibus ille medebatur tam in urbe Tingitana, quam
aliis in locis, sive Nostrates essent ægri, sive Mauri, dicta metho-
do, felici semper exitu. Quam quidem neuter alteri debemus,
sed pari fortuna in eandem diffusissimi incidimus. Profitebatur au-
tem, optime istic sibi cessisse in illius morbi curatione methodum
illam, qua liquoris diluvio submerguntur Dysenteriae. Atque existi-
mo ego, omnino par esse ut in calidiori isto climate longe rarius
succesfu careat hæc methodus, quam in nostra Britannia.

Primo illo autumnio, quo vigeat hæc Constitutio, Daniel Coxæ
M. D. vir ingenio, & eruditione ornatissimus, Dysenteria acutissima
laborans, me quem consuluit suadente, ope methodi jam laudatæ,
cito, tuto, & jucunde sanatus est; post tertium sc. quartumve ene-
ma, dum lecto assideret, & tormina, & dejectiones sanguineæ e-
vanuere: nec qualibet re alia, præter lecti ad dictum spatium pa-
tientiam, & lacteam dietam, ad sanitatem redintegrandam opus ha-
buit. Eodem plane modo, & idem postea alios quam plurimos hoc
malo affectos restituit exeunte eo Autumnio. Anno autem proximo,
illum etiam idem molientem spes fefellit.

Jam olim diximus, quod sæpenumero hic morbus, si diutius ex-
currat, intestina seriatiim omnia deorsum versus afficiat, donec tan-
dem omnis ejus vis in Rectum decumbat cum assidua desidendi cu-
piditate, qua nihil præter mucosum quiddam, & subcruentum excer-
nitur. Hoc si fiat, frustra erit, me iudice, qui medicari sataget,
vel quavis methodo prædicta, vel clysteribus abstergentibus, gluti-
nantibus atque astringentibus, quæ pro variis ulceris, ut supponitur,
temporibus injici solent; vel etiam fori, & infessu, suffumigiis, ac sup-
positoriis dictos scopos respicientibus. Liquer enim, hoc ab ulcere
Recti non procedere, sed ex illo potius, quod Intestina quibus gra-
dibus vires resumpserint, iisdem etiam materiæ morbificæ reliquias
in Rectum deturbaverint, quod quidem indefinenter proripit singulis
sedibus mucosam illam materiam, qua ex naturæ providentia
intestina duplicantur, elidit. Corroboranda est itaque pars affecta,
quo possit, aliorum intestinorum exemplo, jam fatiscences mali reliquias
funditus eliminare. Hoc autem ea sola præstabit, quæ corpori in
genere vires adjicere apta nata sunt. Topicum enim, qualecumque
id demum fuerit, parti dolenti applicatum, cum alienum quid sit,
contactu molesto debilitatem magis adferet, quam robur subministra-
bit. Tolerandum itaque est ægro, donec diætæ analeptica, & liquore
aliquo cardiaco, qui palato arridet maxime, pro libitu ingesto,
revocari possint vires, quibus redeuntibus pari passu suæque sponte
propriet se hoc Tenesmi symptoma.

Accidit etiam nonnunquam, licet raro admodum, ut Dysenteria
sub initio non rite curata, particulare subjectum ad annos aliquot
discruciet, integra sanguinis massa crasin quasi dysentericam jam
indepta, unde acres calidique humores intestinis continuo suppeditan-
tur, ægro interim singula vitæ munia mediocriter bene obeunte.
Hujus specimen se mihi obtulit non ita pridem in muliere quadam
meis ædibus vicina, quæ per tres annos hujus Constitutionis postre-
mos hoc malo continenter exercebatur. Cum remedia quamplurima
esset experta antequam ad me accederet, venæ sectionem tantum,
missis cæteris præsidiiis quibusque, celebrandam censui, quam ut sæ-
pius repeterem, longioribus tamen intervallis, tum sanguinis color,
pleuriticorum sanguinis æmulus, tum insigne illud, quod, post sin-
gulas vices magis, ac magis auctum sentiebat levamen, mihi ad-
debant animos; cujus ope tandem pristinam sanitatem consecuta
est.

Antequam finiam, hoc est notandum, quod tamen in his annis
quibus dysenteriae adeo epidemice grassarentur, evacuationes prius
memoratæ prorsus necessariae erant antequam ad usum Laudani de-
ventum fuisset; attamen in Constitutione quavis huic morbo minus
faventi, istæ tuto omitti possint, ac curatio compendiosiori via,
solo nempe usu Laudani, absolvi, eo quem descripsimus modo.
Atque hæc de Dysenteria dicta sunt.

C A P U T IV.

Febris Continua partis Anni 1669. atque integrorum 1670.

71. 72.

EO ipso tempore, quo sæviebat Dysenteria, & Febris quadam
illi simillima, quæ dysentericis accidere sæpe solebat, una exor-
ta est, quæ quidem non eos tantum, quos jam sauciaverit dysen-
teria, sed ab illa prorsus immunes, (nisi quod subinde, at raro,
tormina haud quidem atrocia, nunc cum dejectionibus, nunc sine
illis, paterentur ægri,) pariter incescit: Eadem enim ubique pro-
pæsus seu causas manifestas, & apparentes habuit, quas Dysenteria,
eadem etiam per omnia symptomata, quæ dysentericorum febrem co-
mitabantur. Ita ut, si evacuationes per alvum dysenteria laboran-
tium excipias, & quæ ab istis necessario pendebant symptomata,
dicta febris ejusdem prorsus naturæ cum ipsis dysentericis videretur;
& deinceps per hujus Constitutionis decursum omnem, parem cum
illis subiit symptomatum quorumlibet alterationem, eisdem scilicet
differentiis, quoad augmentum, statum, & declinationem, affecta,
quibus afficiebantur in genere Dysenteria. Hæc itaque Febris Dyf-
senteria mihi audiebat.

Memorata *Febris* nonnunquam, uti dictum, cum alvi torminibus, sed mitioribus, ingrediebant (prioribus annis maxime, quibus invasit) vel ista ad eam post accedebant, sapius vero nulla erant. Sudores, qui in febre *Constitutionis* prægressæ copiosissimi erant, ut supra notavimus, in hac rari ac pauci, sed capitis dolor in hac quam in illa specie immanior: Linguae ægrorum, licet humidæ atque albæ, ut in altera specie, crassa insuper pellicula oblinebantur. Rarius hæc per *Ptyalismum* sibi fugam quærebat, quod in alia non erat infrequens. Ad *Aphthas*, cum jam discessum meditaretur, erat propensior, quam vel prior ista, vel alia quævis febris species, quam mihi hætenus contigit videre, huic etenim perquam familiare fuit (uti, & febris etiam illi, quæ dysenteria supervenit) cum jam fere desineret, materiam scdam atque acrem e sanguine in os atque gulam deponere, unde nascebatur dictum symptoma, in iis præsertim, quos contumacior morbus diutius maceraverat, & regimen iusto calidius amplius infirmaret.

Eodem etiam morbo generabantur *Aphthæ* istæ, quæ *Dysenteria*is pervicacioribus cum febre conjunctis nullo non die accidebant, præsertim si præter regimen calidius evacuationes etiam per alvum medicamentis astringentibus prius fuerint coercitæ, quam morbi fomes e venis plebotomia, & catharsi exigeretur.

Hæc erant certissima hujusce febris *æπὶ τὴν πύλιν*; reliqua symptomata variabant quotannis, & pro manifestis aeris qualitatibus certis quibusdam temporibus, & pro dysenteria in genere progressu, tum etiam vario ejusdem statu. Sed, ut hæc clarius intelligantur, cum hoc præsertim artificio in *Epidemicorum* productione triumphet natura, rem paulo altius repetam. Notandum est itaque, quod, licet aeris qualitates manifestæ non eam vim cuilibet *Constitutioni* imprimant, ut causæ sint epidemicorum, qui ad illam proprie referuntur productivæ, (cum a recondita atque inexplicabili ejusdem conditione fluant isti,) pro tempore tamen in eos habent potestatem, & proinde intromittuntur *Epidemici*, aut etiam excluduntur, prout illis favent qualitates manifestæ, vel adversantur; *Universalis* autem *Constitutio* eadem prorsus manet, sive eam promoverint istæ, sive quadantenus retardarint. Unde etiam est, quod, cum varii *Epidemici* in eandem incidant *Constitutionem*, hic aut ille morbus particularis ea potissimum tempestate se exerat, ad quam sensibiles aeris qualitates eundem destinaverint, atque alteri demum *Epidemico* locum cedat, quem sc. diversæ subsequæ temporis qualitates advocarint. Ex quo fit, ut febris *Stationaria*, quæcumque demum illa sit, quæ ad *Epidemicum* eo anno regnantem attinet, *Julio* mense potissimum sæviat, cujus initio plures hominum catervas simul aggreditur; *Autumno* vero appropinquante, magno illi epidemico, a quo annis insignitur, rursus invalescenti decedit, & parcius infestat, ut quilibet semper annus satis docet. Excalescunt enim a prægressa estate hominum corpora febres, *Constitutioni Generali* propriæ quæ sunt, promptissime eo tempore invadunt, appetente vero *Autumno*, quo qui prædominatur *Epidemicus*, fauces resumit, istis omnino recedendum est.

Sicuti vero nominatæ *Febres* sensibili aeris qualitati acceptum referre debent, quod jam hoc mense exoriantur; ita etiam symptomata varia, a sua natura, quatenus ab ejusmodi *Constitutione* generali pendent, prorsus aliena; a manifestarum qualitatum, quæ in illum incidunt *mensum*, peculio sumunt mutuo. Hinc est, quod quibus annis dictæ febres hoc mense turmatim ingrediuntur, variis symptomatibus novis stipantur, præter illa, quæ eis sunt propria, quatenus ab ejusmodi *Constitutione* generali procreantur, eadem tamen ipsæ maneant, licet apud vulgus ob *παροξυσμὸν* diversitatem *Novæ* quotannis *Febres* audiant. Ad paucas vero tantum septimanas perseverant symptomata hæc magis peculiariora, quibus elapsis propria solummodo symptomata, quæ eis accidunt, quatenus febres sunt *Stationariæ* talis *Constitutionis*, reperiuntur per reliquum annum.

Hoc tum in aliis liquebat febribus, tum magis peculiariter in *Dysentericis* mensis *Julii* 71. & 72. in quarum priore vehemens ægritudo, & bilis ærugiosa, cum magna in diarrhæam propensitate sub morbi finem, continuo observabantur. In posteriore, doloris sensus in partibus corporis musculosis, artubus maxime, ad rheumaticorum fere dolores accedens: Faucium insuper inflammatio, mitior tamen quam in angina laborantibus. Utraque tamen hæc in eadem *Febre specifica* coibant; & eadem plane medendi ratione utraque profligabantur, differebant autem respectu tantum qualitatum sensibilibus, quibus donabantur tempora illa, in quæ incidebant. Improvisa vero subitaneaque harum febrium circa dicti mensis initium eruptio, & nova ad tempus aliquod peculiarium symptomatum facies (licet neque specie dissarent, neque methodo medendi, quam postulabant, a febre illa, quæ integrum percurrerat annum.) Hæc, inquam, plus satis evincunt, quam sit difficile certam febris speciem omni tempore e phænomenis elicere, licet eam satis recte possit dignoscere, qui ad alios morbos eodem anno ingruentes diligenter attenderit, & propria insuper febris symptomata, quæ ad hunc vel illum *Evacuationis* modum spectant, rite observaverit. Neque parum facit ad investigandam febris speciem consideratio, sive methodi, sive medicamenti, a quibus eadem minimo cum negotio expugnatur.

Quod ad reliquas symptomatum, febres *Stationarias* comitantium, differentias spectat, varia constitutionis tempora ex tantum respiciunt, atque eo nomine vel sunt intensiora, vel remissiora, illa prout intendunt, vel etiam remittuntur, symptomata aliorum epidemicorum, ad quos ipsa pertinent.

Sed ut ad rem revertamur, *Febris* hæc, quæ cum *Dysenteria*is, ut supra dictum est, ingressa, parem cum iis passum tenuit, nisi quod se paululum subduceret, dum alii horum annorum epidemici prævalerent; persistebat tamen illa, nunc plures, nunc pauciores petens, durante hac *Constitutione*.

* Pro hujusce *Febreis Curatione*, cum observassem, uti prius dictum, phænomena *Febreis Dysentericorum* quamplurimum eadem plane esse cum illis, quæ hujus anni solitarias comitantur, consentaneum mihi videbatur sanatos iri ægros meos, si evacuationem illam quadantenus imitaret, quæ natura materiam illam corrosivam atque acrem, quæ & ipsius *Dysenteria*, & supervenientis febris causa *Continens* est, solet ablegare. Ac proinde eadem ipsa methodo; tum quoad venæ sectionem, tum repetitas purgationes, febrem hanc aggressus sum, quam in *Dysenteria* curatione supra fusius deduximus;

nisi quod *Paregorica* purgationibus interjecta non hic juvare, sed & obesse deprehenderim, (secus atque in *Dysenteria*) cum ab his detineretur materia illa, quæ catharsi eliminari debuerat. Pulticula avenacea, hordeacea, panatella, & similibus sub primis morbi diebus victitabat æger; potus erat cerevisia tenuis tepescens. Post celebratam vero semel iterumve catharsin nulla suadebat necessitas pulorum carnibus, aut similibus eupeptis ægro interdiciere; cum hæc per purgationem medicatio ea indulgeat, quæ non poterant concedi, si alia viâ insisteretur. Tertia ut plurimum purgatio, interposito semper die, morbum absolvit; neque tamen perpetuum id fuit, sed alia insuper nonnunquam instituendæ erant. Si febre jam pulsa, fractiores adhuc essent ac magis effictæ ægri vires, atque is tardius convalescere (quod *Hysterici* frequentissime accidebat) *Laudano* in parva dosi exhibitio easdem restaurare, & spiritus transfugas ac dissipatos in desertas stationes revocare conabar: raro autem remedium illud repetebam, neque unquam præscripsi, nisi biduo triduove a postrema catharsi. Nihil vero æque ad renovandas vires refocillandosque spiritus faciebat, atque auræ liberior usus mox ut febris recesserit.

Ansam autem ad praxim hanc instituendam hinc primum arripui, quod nempe, nascente ferme *Constitutione* hac, dum irreposito sollicitoque animo novæ hujus febris naturam volutarem, ad juveniculam mihi vicinam advocabar, febricitantem quidem illam atque acerbissimo fincipitis dolore fere eneclam, aliisque symptomatibus, quibus *Febrem Dysentericam* onerari jam diximus: Hæc cum a me interrogaretur, & de modo, quo febris primum invadebat, & de ejusdem duratione, fassa est se a *Dysenteria*, quæ tum ubique fere grassabatur, a quatuordecim retro diebus fuisse liberatam; cui sive sua sponte discedenti, sive medicamenti ope depulsa protinus successit dicta febris cum dolore capitis. Quibus ego me rectissime occurrere posse conjectabam, si *Dysenteria* loco aliam evacuationem substituerem, ejus simillimam, quæ præclusa febris oborta est; ac proinde methodo supra laudata eandem restitui; Atque huic quidem se promptissime debebant hujus *Constitutionis* febres. Semper enim rebar, non sufficere ad comprobendam in *Acutis* medendi rationem, ut feliciter ea cederet, (cum ab imperitissimarum muliercularum temeritate sanentur nonnulli) sed requiri adhuc, ut morbus nullo negotio victus quasi suapte genio cedat, atque abitum affectet, quantum ejus fert natura. Sed hæc obiter.

Ineunte *Junio* 1672. Vir nobilissimus, ac prudentissimus Dominus Comes *Salisburyensis* hac febre laborans cum torminibus (alvo tamen non soluta) accersiri me iussit, & methodo proposita sanitati redditus est. Neque alia mihi ulla re fuit opus, dum hæc stare febris.

In adolescentibus, aliquando, & in paulo provectioribus, febris hæc caput nonnunquam petebat, unde delirabant, non quidem ut in aliis febribus phreneticorum more, sed quasi stupore, ad *Carum* proxime accidente, perculsi. Hoc illis præ ceteris accidebat, qui sub morbi principio in sudoribus quoquo modo extorquendis operam inauspicato collocarant. Non id mihi contingebat felicitatis, ut his sublevandis par tunc temporis essem, licet nullum non moverem lapidem, nullumque non e remediis hætenus notis in suppetias advocarem. Atque hæc de febre hujus *Constitutionis* possint sufficere.

C A P U T V.

Morbilli Anni 1670.

Sub initio *Januarii* 1670. (ita ut solent) præmature *Morbilli* sunt ingressi, atque indies magis invalescebant, donec instante *Verno Equinoctio* *ἀπὸ τῆς* adepti, exinde iisdem gradibus imminuti tandem *Julio* sequenti penitus extinguerentur. Horum jam ego historiam (cum omnium, quos hætenus vidi, in suo genere perfectissimi illi mihi videantur,) certam atque exquisitam, quatenus mihi tum observare licuit, literis consignabo.

Ortum habet hic morbus, atque occasum temporibus supra notatis. *Infantes* plerumque aggreditur, omnesque adeo ex illis, iisdem mœnibus conclusos. A rigore atque horrore, calorisque, & frigoris, quæ se mutuo primo die expellunt, inæqualitate tragediam orditur; tandem affulgent *secundo* die in febrem consummatam desinit, vehementi ægritudine, siti, inappetentia, lingua alba, (non vero sicca) tussicula, capitis atque oculorum gravedine, & somnolentia perpetua stipatam. Plerumque etiam e naribus atque oculis stillat humor; atque hujusmodi lacrymarum in oculos effusio certissimum est signum morbillorum ingruentium. Cui & hoc addendum haud minus certum, quod etsi in facie, exanthematum specie, hic affectus ut plurimum se prodit, in pectore tamen non tam exantemata quam maculæ latæ, & rubræ superficiem cutis non superantes, conspiciuntur, æternitat æger tanquam a suscepto frigore, intumescunt palpebræ (paulo sc. ante eruptionem) vomit, sapius tamen laborat *Diarrhœa* cum dejectionibus coloris subviridis. Dentientibus autem maxime id convenit. Infantes etiam per hunc morbum solito sunt morosiores. Ingravescunt ut plurimum symptomata ad quantum usque diem, quo tempore plerumque (licet ad diem quintum aliquando differantur) circa frontem, & reliquam faciem maculæ parvæ rubræ, pulicum morsibus persimiles, prodire incipiunt, quæ tam numero, quam magnitudine auctæ, racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis variæ figuræ, interstinguunt. Quæ quidem maculæ rubræ e parvulis quibusdam papulis rubris haud longe ab invicem diffitis, supra cutis superficiem paululum elevatis, conflantur, quarum protuberantia, digito leviter admoto, tactu potest deprehendi, licet oculorum longius remotorum aciem fere effugiat. A facie, quam primo solam occupant, sensim ad pectus ventremque, crura deinde ac tibias se diffundunt hæ maculæ; licet truncum atque artus rubore inficiant tantum, nulla eminentia sensibilis cutis æquabilitatem transgressæ. Eruptione *Morbillorum* non perinde deliniuntur symptomata, atque *Variolarum*; Vomitus tamen post eruptionem nunquam observavi; tussicula nihilominus, febrisque intenduntur, cum spirandi difficultate, oculorum debilitate defluxioneque in eosdem decumbente, somnolentia perpetua, atque inappetentia, uti prius adhuc perseverantibus. Die sexto aut circiter, frons, & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptaque cuticula, & per id temporis maculæ per reliquum corpus, & latissimæ sunt, & maxime rubescunt. Octavo circiter die maculæ in facie evanescunt, & vix in reliquo corpore cernuntur, nono vero nullæ sunt prorsus, facie atque artubus, quandoque, & toto corpore qua-

si farina conspersis, particulis scilicet disruptæ cuticulæ paulum elevatis, & vix coherentibus, quæ morbo jam abituriente in frustra distrahitur, & postea a toto corpore squamularum forma decidit. Evanescent itaque *Morbilli* die fere octavo, quo tempore vulgus (a spatio quo perdurare solent *Variolæ*, deceptum) eosdem introverti affirmat, licet revera illi cursum a natura destinatum absolvent, & symptomata quæ iisdem recedentibus superveniunt ex eo nata autumat, quod iusto citius se intro *Morbilli* receperunt. Observare enim est, febrem atque spirandi difficultatem tunc temporis augeri, importunius urgere tussiculam, ita ut nec interdiu, nec etiam noctu fere somnus possit obrepere. Infantes præsertim sub regimine calidiori, aut, qui calidioribus usi sunt medicamentis ad promovendam morbillorum eruptionem, huic malo sunt obnoxii, quod morbillis jam facessentibus se ostendit, unde in *Peripneumonia* conjiciuntur, quæ plures jugulat, quam aut *Variolæ* ipsæ, aut symptomata quodcunque ad eum spectans morbum, licet omni prorsus periculo vacent *Morbilli*, si modo perite tractentur. His etiam non raro accidit *Diarrhœa*, quæ vel morbum statim excipit, vel etiam ad plures septimanas excurrit post morbi, omniumque ejus symptomatum fugam; haud sine magno ægri discrimine, in quo abhinc orta spirituum profusione continua, verfat. Aliquando etiam post regimen intense calidum exanthemata livescunt primo, mox nigrescunt; id vero *Adultis* tantum contingit, de quibus conclamatum est, ubi primum nigredo ista conspicitur, nisi phlebotomia, & temperationis regiminis refrigerio iis actutum subveniatur.

* *Morbillis* ut natura, ita & medendi, quam sibi poscit hic morbus ratione, cum *Variolis* satis convenit: Medicamenta, & regimen calidiora periculi plenissima sunt, utut frequenter in usum revocentur ab ignavis ægrorum curatricibus, eo animo ut morbus a corde procul submoveatur. Feliciter præ aliis mihi cessit methodus illa, quæ æger ad dies binos solum ternosve ab eruptione lecto adstringebatur, quo sanguis leniter pro morbi genio particulas inflammatas facile separabiles, a quibus offendebar, per cutis spiracula diffilaret, nec lodicibus, nec igne, præter modum, quem sanus tenebat, adjectis: A carnibus quibuscumque arcebam, iuscula avenacea, hordeacea, & similia, nonnumquam, & pomum coctum concedebam; Potus, vel erat cerevisia tenuis, vel lac cum aquæ triplo coctum. Tussim, quæ huic morbo fere assidua est, decocto aliquo pectorali subinde hausto delinitam volui; uti etiam eclegmate aliquo eundem scopum artingente. At præ reliquis *Diacodium* omni nocte ab ipso morbi insultu per totum ejus decursum exhibendum curavi. Ex gr. ʒi. Decoct. pectoral. ʒi. syr. violac. & capill. Veneris an. ʒi. mis. f. Apozema. Cap. ʒiij. vel iv. ter vel quater in die. ʒi. ol. amygdal. dulc. ʒiij. syr. violac. & capill. Ven. un. ʒi. sacchari cand. albi q. f. mis. eclegma, de quo sæpius lambat, præcipue quando tussis urget. ʒi. aq. cerasor. nigr. ʒiij. syr. de meconio ʒi. mis. f. haustus, sumendus sing. noctibus. Si vero infans fuerat æger, minuenda erat tam pectoralium, quam Narcotici dosis, pro ratione sc. ætatis.

Rarissime perit qui hoc utitur regimine, nec præter necessaria atque inevitabilia morbi symptomata, novis insuper malis arretitur. Tussis præ reliquis fatigat; a qua tamen nihil est periculi, nisi morbo jam prætergresso, cumque adhuc per septimanam unam aut alteram persistat, autæ liberioris usu, ac remediis pectori dicatis, haud difficulter fugatur; quinimo sponte sua, & paulatim decrescit, & tandem fatiscit.

Si autem æger a cardiacorum, vel regiminis iusto calidiorum usu, post eorum discessum (quod valde est familiare) febre vehementi atque *Dyspnœa* aliisque accidentibus, qualia *Peripneumonicos* solent affligere, in vitæ discrimen adducatur, felicissimo semper eventu, vel tenerrimorum infantum venas in brachio secui, educta ea sanguinis quantitate, quam ætas viresque indicarent. Quandoque etiam, urgente morbo, phlebotomiam iterare haud sum veritus. Profecto haud paucos infantes hoc statim symptomate enecandos, benedicente summo Numine, misso sanguine eripui. Infantibus autem accidit illud post *Morbillosum* recessum, quibus ita est exitiale, ut inter præcipuos *Parcarum* ministros jure habeatur, plures jugulans, quam vel ipsæ *Variolæ*; nec dum mihi visus est, qui certa alia methodo eidem potuit occurrere. Quin & *Diarrhœa*, quam *Morbillos* excipere diximus, venæ sectione pariter sanatur; cum enim halitibus inflammatis sanguinis in intestina ruentibus ortum suum debeat (quod etiam in *Pleuritide*, *Peripneumonia*, aliisque qui ab inflammatione creantur, morbis usvenit) a quibus illa ad excretionem stimulantur, sola venæ sectio levamen adferet, a qua tum revelantur acres isti humores, tum etiam sanguis ad debitam redigitur temperiem.

Neque est, cur quis miretur me in teneris infantibus venæ sectionem instituendam suadere, cum sanguis, quantum ego hætenus potuerim observare, haud minus tuto ex eorum venis, quam ex adultorum extrahatur. Et profecto ita est illa necessaria, ut nec symptomati memorato, nec alijs quibuscumque quæ infantibus acciderent solent, omiſſa phlebotomia certo mederi valeamus. Exempli gratia, quo pacto puerorum *Dentitionum Convulsionibus*, quæ nono decimoque mense superveniunt, (cum gingivarum intumescens dolorque, a quibus comprimuntur nervi atque irritantur, unde etiam paroxysmi isti nascuntur) sine venæ sectione opem feremus? Quæ sola in dicto affectu *specificis* quibuscumque, vel decantatissimis, quæ hætenus innotuere, longe est anteferenda; quorum nonnulla adventitio calore nocent etiam, & dum occulta aliqua proprietate morbo adversari creduntur, manifesto calore eidem militant, atque ægrum ad plures deducunt. Prætereo impræsentiarum ingens illud solatium, quod adfert venæ sectio infantum *Pertussi*, (quam nostrates vocant *Hooping Cough*) in qua remedia quælibet pectori dicata longo post se linquit intervallo.

Quod de horum symptomatum *Morbillis* decedentibus supervenientium, curatione jam diximus, nonnumquam etiam eisdem florentibus potest competere, si nimirum artificiali, si fas est dicere, atque adscititio calori ea debeantur. Hoc anno 1670. famulam Dominæ Annæ Barington hoc morbo laborantem, una cum febre, *Dyspnœa*, *Maculisque purpureis* corpus omne deturpantibus, aliisque symptomatibus quam plurimis periculosissimis, Medicus invisebam; cum regimini, & medicamentis, quæ satis multa usurpaverat, calidiori-

bus ista omnia tribuerem, sanguinem a brachio extrahendum curavi, & Prisanam pectoralem atque refrigerantem sæpe assumendam præscripsi, quorum ope, & regiminis simul temperationis, & maculæ, atque alia omnia symptomata pedetentim evanescebant.

Hicce morbus mense *Januario*, ut dictum est, natus ad *Æquinoctium* usque *Vernum* crescebat indies, a quo tempore imminuta paulatim vi, sequenti *Julio* plane desit; nec est reversus per omnes annos, quibus hæc *Constitutio* dominabatur, nisi quod in sequenti vere, nonnullibi, licet rarius, se ostenderet. De *Morbillis* hæc dicta sunt.

C A P U T VI.

Variolæ Anomale Annorum 1670. 71. 72.

Morbilli prædicti, (quod jam supra innuimus) *Variolarum* speciem ab illa quam prærogaverat *Constitutio* præcedens, diversam introducebant, eodem fere cum illis tempore ingredientem; initio scil. *Januarii* 1659. 1670. quæ licet non usque adeo epidemica atque ipsi *Morbilli*, eosdem tamen comitabantur per omne illud tempus quo dominabantur, atque iis etiam fatiscensibus, per residuos hujus Constitutionis annos perseverantiam, *Dysenterias* nihilominus primas concedebat, sub auspiciis *Autumni* iisdem faventis atque amicissimi, grassantibus; *Hyeme* vero, *Dysenterias* aliena tempestate pressis, denuo recrudescere hæc, de qua agimus species. Atque hunc servabant ordinem per singulos hujus Constitutionis annos, nisi quod postremo quo illa vigeat *Autumno*, Anno sc. 72. (languescente jam ista *Constitutione*, & *Dysenterias* jam exolescentes segnius promovente) *Variolæ* præter solitum hoc quoque tempore grassabantur, atque ita pares *Dysenterias* concurrebant, ut haud facile esset dictu, quis morbus plures occuparet; licet quantum ego conjectando valui, prævalere *Dysenteria* adhuc videretur. Quin & hæc etiam *Variolæ*, ad exemplum Epidemicorum aliorum quorumlibet, primo statim insultu atrociore erant, atque indies increbrescebant, donec ad statum pervenissent, quem semel transgressæ, tum quoad symptomatum vehementiam, tum ægrorum numerum, sensim imminuebantur.

Sed ut particularia eorum Phænomena referamus; haud parum præter opinionem mihi primum comparebat hoc *Variolarum* genus, cum animadverterem istud quamplurimis Phænomenis insignioribus ab eo differre quod produxerat *Constitutio* præcedens, & in quibus observandis me operam satis sedulam olim collocasse rebar. Hæc tantum earum Phænomena alterius generis Phænomenis dissidentia, impræsentiarum tractabo, prætermisissis iis, quæ cum *Variolis* ita proluxe supra descriptis habebant communia.

Discretum *Variolarum* genus his tantum a genere *Discreto communi* alterius Constitutionis, disternabatur. Primo, quod cum in iis, quoties erant *interstinctæ*, Eruptio diem quartum prævertere non soleret, hic in tertium plerumque incidebat; quod *Confluentibus* solemne quidem est. Deinde non ad eam magnitudinem, procedente morbo, hic assurgebant pustulæ atque in alio genere; magis autem exasperabantur in minori mole, & sub diebus ultimis ubi jam maturuerant *nigræ* frequentius viscebantur. Illud etiam addam, quod nonnumquam, licet rarius, ægrum etiam paucissimis notatum pustulis, *Ptyalismus*, haud secus atque in *Confluentibus*, exerceret. Ex quibus conficitur, *Distinctas* hujus Constitutionis *Variolas*, ad *Confluentium* naturam propius accedere, atque *Inflammationis* magis intensæ esse participes, quam quæ in *Distincto* genere usuvenire solent.

Confluentes vero ab alijs, quas per alios annos ego observaveram, *Confluentibus*, in multis, quæ jam recensere, discrepabant. Nunc secundo, nunc tertio die se primum monstrabant, specie tumoris subrubri, atque uniformis, vultum omnem contegentis *Erysipelate* quidem densioris, nullo fere visibili pustularum discrimine; reliquum corpus congeries quædam (ceu panni latiores) ex infinitis prope modum pustulis rubris effertis in unam conflata variegabant, inter quas sparsæ, in femoribus præcipue, vesiculæ quædam satis conspicuæ, ambustorum ad instar, sero limpidiore distentæ eminebant, quod quidem disrupta subinde pellicula copiose effluebat, subiecta carne nigredine & sphacelo quasi affecta. Rarius autem occurrebat hoc tam virum symptoma, idque primo tantum mense quo hæc species regnabat: Quo tempore inter alios ita male multatos, in eunte *Januario* 1669. 1670. accersiri me curavit vir probus, nomine *Collins*, *Zythepſa* in Parochia S. *Ægidii*, cujus filius adhuc infans vesiculas habuit in femoribus Juglandem nucem exæquantem, sero limpidiore repletas: quibus disruptis subſtrata caro quasi mortificata omnino comparebat, atque non ita diu post æger fatis concessit; quæ & eorum omnium fors fuit, quos hoc tam funesto symptomate correptos vidi unquam. Die undecimo circiter, pellicula alba resplendens tumori subrubro, variis faciei partibus, & paulatim vultui omni obducta est. Pellicula hæc alba brevi post materiam quandam crustosam splendenscentem eructabat, calore quidem neque flavo, neque fusco, (qui duo in alijs *Variolarum* speciebus reperiuntur) sed rubro saturato, concretum sanguinem initante, qui matureſcente postula ad nigrorem indies magis accedebat, donec tandem facies integra nigredine, fuliginis omnino æmula, tingeretur; Cumque in alia *Variolarum* *Confluentium* specie dies undecimus in maximum vitæ discrimen ægros adduceret, & plerisque emorientium supremus esset; in hac specie æger nisi regimine immoderate calido oppressus mortis refrigerium maturius præoccupasset decimum quartum ut plurimum diem, aliquando etiam decimum septimum expectabat, quo denuo elapso, salva res erat. Notandum est tamen, quod qui lethalibus istis vesiculis ac mortificatione, quæ nonnullis primo mense, quo hæc species invadebat, accidisse memoravimus, Libitinæ destinabantur, intra paucos dies ab eruptione interibant.

Et febris, & symptomata alia omnia quæ vel præcedebant, vel comitabantur hoc *Variolarum* genus, graviora erant quam in præcedente, & inflammationis adhuc majoris manifesta dabant indicia. *Ægri* ad salivationem erant procliviores; Pustulæ & effertiores, & mole longe minores; ita ut non facile, ubi primum apparebant, ab *Erysipelate* quis eas discreverit, vel etiam a *Morbillis*, nisi quod hi ex die eruptionis, & alijs signis in historia morbillorum supra recensitis, certo innotescant. Pustulis decedentibus furfures diutius hærebant, scædioraque stigmata inurebant cuti.

Operæ pretium est & illud adjungere, quod durante hac anni *Constitutione*, qua tam epidemice sæviebant *Dysenteriae*, *Variolæ* regimine justo calidior provocatæ per *Dysenteriam* nonnumquam viam sibi facerent, quod ne semel accidisse hætenus quidem animadverteram.

Observare autem convenit, *Variolas* hæc non ita diris symptomatibus per omnia sua tempora fuisse stipatas; postquam enim binos exegerant annos, tertio, sc. 1672. mitescere cœperunt, & exuto nigro colore, paulatim ad flavum illum, & *favarum* similem, accedebant, qui *Variolis Legitimis* maturescentibus est proprius, ita ut postremo hujus *Constitutionis* anno, benignæ plane essent & boni moris, habita generis ratione. Quo non obstante, satis liquebat illas ad aliam prorsus classem relegandas esse, ex pustularum nimirum exiguitate, tam eximia ad salivationem dispositione, atque aliis.

Quamlibet ob causarum differentiarum cujuslibet specificæ qua immergimur, ignorantiam, impossibile fuerit rationem harum *Variolarum formalem* comprehendere, quatenus ab illis, quas alia promit *Constitutio*, contra distinguuntur, mihi tamen liquido constabat ex singulis Phænomenis inflammationem in his, quam in illis longe immaniore fuisse, ac proinde omnem medendi rationem in eo stare, ut pluribus adhuc repagulis sisteretur effrænata sanguinis ebullitio. Idem autem maxime efficiebatur (post *Hynoptica* dicto modo exhibitam) regimine temperato, indulgendo sc. ægro usum liberaliorem liquoris alicujus, qui non eam excalesceret, sed potius fervidissimum illum æstum (quo hic morbus, pustulis maxime ad maturitatem jam pervenientibus, miseros præ ceteris quibusque morbis fatigat atque exurit) illico committigaret. *Decoctum Album* dictum, ex pane sc. & C. C. C. exigua quantitate in multa aqua factum, & saccharo dulcoratum hic juvabat; ad *Hydrogala* e tribus aquarum partibus & lactis una simul coctis, & ægri palato & votis magis ut plurimum, refrigerando respondit; nec eo tantum profecit ingesti liquoris copia, quo insignem calorem, cum *Maturationis* febre præcipue vigentem, restingeret, sed quatenus Ptyalismum etiam promoveret, atque eundem diutius protraheret, quam poterat fieri, si æger nimio æstuarer calore. Præter hæc omnia; sæpenumero ita bene cessisse liquores hosce affatim haustos observavi, ut eorum usu *Variolæ*, quæ cum pessimis *Confluentiæ* signis exibant, progrediente morbo *Distinctæ* sint factæ, pustulæ quæ maturescentes rubram primum, mox nigram materiam aliter evomissent, flavissimæ comparerent; pro efferatis insuper atque minutulis, benigni atque optimi moris haberentur.

Neque etiam *Fluxus Mensum*, qui sæminis hoc morbo laborantibus haud infrequens accidit, liberalem horum liquorum usum quicquam prohibet; imo vero & suadet, si tempore non solito isti fluant. Etenim non jam alia de causa periclitantur sæminæ, nisi quod sanguis ab immodico morbi calore plus justo attenuatus, qua data porta ruat, naturæ ductus sequens; præsertim ubi noxia Curatrix temeritas, regimine calidiori, & *Decocto C. G. cum floribus Calendule*, &c. adhibitis, oleum igni affuderit. Quicquid autem sanguinem potenter diluit contemperatque, licet non inmediate; in quantum tamen ejusdem fluxum cohibet, tum pustulis, tum faciei manuumque tumori in statu conservandis necessario conferet: cum ex adverso remedia calidiora; licet ad hunc scopum rectius videantur collimare, cum tamen jugem hunc sanguinis fluxum promoveant, longissime aberrant. Quinimo nec dubium mihi est quamplurimas mulieres hoc errore periisse, dum sc. assistentes, ne pustulæ ob sanguinis fluxum considerent, veriti, malo huic Cardiacis medicamentis, & regimine adhuc calidiori adhibitis occurrere niterentur, quo facto misellas certius pessunderunt; quantumlibet *adstringentia* varia Cardiacis admiscentes Hæmorrhagiam sistere, atque pustularum una tumorisque debitam elevationem tueri sategerint.

Haud ita pridem *Dominam* tam virtutibus quam stirpe prænobilem, *Variolis* nigris & mali moris laborantem, tractavi. Quamvis autem ab initio iis omnibus illi interdixeram, a quibus sanguis exagitari poterat, cum tamen temperamento esset admodum sanguineo, viridi juvena vegetaque, fervida etiam anni tempestas accederet, derepente, tertio scilicet die ab eruptione, ita largo *Mensum profusio*, tempore illis non debito, correpta est, ut astantes mulieres eam jam abortivisse suspicarentur. Licet hoc symptoma ad dies multos importune urgeret, non tamen idcirco existimavi lactis & aquæ usum a me præscriptorum, intermittere debere: quid quod magis jam necessarium illum esse, & liberalius adhuc indulgendum censuerim? quod etiam per omnem morbi decursum facitavimus, præsertim cum appeteret *Febris Maturatio*. Quo quidem tempore Medicus Doctissimus, Candidissimusque, Dominus Do. Millington, ejusdem mecum olim Collegii Socius, jam amicissimus, ad sociam operam invitabatur; qui cum omnia satis bene respondere, pro hujus morbi genio animadverteret, mihi lubens assensit, ut pergeret ægra dictos liquores affatim haurire, quos ipsa sibi gratissimos, & tam ad salivam facere, quam ad refrigerium & refectionem sæpe affirmabat. Cum vero jam indurari facies cœperit, & crusta obduci, ab halitibus putridis a materia purulenta, quæ in hoc pessimo *Variolarum* genere male olebat, intromittendis ægræ nostræ metuentes, vini Canarini semicocti cochlearia paucula, semel in die assumenda, vel quoties in ventriculo ægritudine aliquam persentisceret, concessimus. Pauculis hisce, nisi quod haustulum etiam *Paregoricum* hora somni quotidie imperavimus, convaluit; neque delirio neque alio quovis symptomate, præter dictam Hæmorrhagiam, grave aliquod periculum minitante. Facies manusque satis intumescere; pustulæ, quantum tulit morbi species, satis magnæ erant; salivatio copiosa & facilis ad metas usque; postremo quantumlibet pustulæ, quæ faciem obsidebant, cum maturescerent, nigredinem affectare viderentur, in plerisque tamen ejus partibus flavescerebant.

Quibuscumque vero caloris atque inflammationis gradibus *Variolarum* species, huic *Constitutioni* peculiaris, alias aliarum *Constitutionum* species superaverit, cum tamen *discretæ* essent pustulæ, vel saltem *paucæ*, docuit experientia, non opus esse tanta prædictorum liquorum quantitate ingerenda, satis autem fuit, ut æger pro sitis modo atque imperio cerevisiam venum potaret, jusculis avenaceis, panatella, & pomo cocto subinde vesceretur, & si ex Ephebis excesserat, *Paregoricum* ex *Syrupo de meconio*, cum vel ægrotaret, vel ob nimias vigilias delirare inciperet, assumeret. Neque aliud quicquam tentabam (nisi quod ægros lecto addicerem) ubi pustulæ raræ comparebant. Atque hac sola methodo Charissimus mihi filius,

William Sydenham distinctio hujuscemodi *Variolarum* genere laborans, mense Decembri 1670. favente Numine, restitutus est.

De *Variolis* hujus *Constitutionis* nihil superaddam, cum jam aliam speciem fufius tractaverim, a quibus hæc in eo tantum discrepant, quod naturæ sc. calidioris fuerint, & magis inflammatorie; unde sequitur, diligentior adhuc operam fuisse navandam, ut restingeretur intensior iste calor, qui tam iis naturalis erat, & ægro ita certum minitabatur incendiuni.

CAPUT VII.

Colicæ Biliosæ Ann. 1670. 71. 72.

Per omnes hujus *Constitutionis* annos, cum sanguis ad humiores cholericos fervidusque in viscera deponendos propensior esset, *Colicæ Biliosæ* præter solitum plures invasit; qui morbus licet *Cronicis* annumerari debeat, ac proinde extra oleas mihi sit, cum tamen ab eadem sanguinis indispositione penderet hoc tempore, a qua & *Epidemici* plerique qui tum grassabantur, vel eo nomine hic mihi veniet tractandus, præcipue vero quia animadverti, morbum huncce eadem plane præcessisse symptomata febrilia, quæ *Dysenteriam* per illa tempora regnantem præcedere solebant; atque eundem, etiam aliquando (quod supra notavi) *Dysenteriam*, quæ post diuturnos cruciatus ægro tandem valedixisse videretur, fuisse insectum. Ubi vero *Dysenteriam* diutinam non excipiebat, plerumque a febre ordiebatur, quæ per horas aliquot tantum affligens, in hunc morbum solebat desinere. Juvenes ut plurimum temperamento calido ac bilioso præditos, æstate præsertim adoritur. Intestinelorum dolor atrocissimus est, & præ cæteris omnibus, quibuscum mortalium calamitosissimi committuntur, maxime intolerabilis. Intestina nonnumquam quasi injecta fascia constringit, nunc in punctum contractus quasi terebello perforat: subinde remittitur dolor, mox recrudescit paroxysmus, quem æger præsentens, vultu miserabili atque ejulatu ceu præsentem exhorret, & averfatur. Sub initio hujus morbi non ita certo ad unum aliquod punctum determinatus dolor atque in ejusdem progressu; neque tam crebra est vomituritio, neque alvus ita pertinaciter *Cathartorum* vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatus in puncto figitur; vomituritio succedit frequentior & major alvi adstrictio; donec tandem ab ineluctabili horum symptomatum *vitalis Peristaltici intestinelorum motus inversio* (nisi maturius quis tulerit suppetias) atque *Iliaca passio* procurantur; in quo morbo *Cathartica* Medicamenta omnia in *Emetica* statim transeunt: Enemata etiam injecta, una cum alvi sæcibus, per omnem intestinelorum ductum sursum lata, vomitu ejiciuntur. Quæ hoc modo excernitur materia, sincera si fuerit atque *æmura*, viridis aliquando, aliquando etiam flava, aut insoliti cujusdam coloris spectatur.

Cum singula hujus affectus phænomena, eum ab acri aliquo sive humore sive halitu, e massa sanguinea in intestina excusso, nasci aperte doceant, Indicatio curativa primaria mihi hæc est, ut sc. evacuetur dictus humor, tam *Antecedens* in venis, quam *Continens* in visceribus conclusus; altera vero ab hac, ut Anodynorum usu & compescatur humorum eo tendentium impetus & mitigetur immittissimus dolor.

* Sanguinem itaque e brachii venis paulo liberalius educi (si nempe id fuerit hætenus intentatum) & post horas 3. vel 4. Anodynum exhiberi curo. Postero die Catharticum aliquod lenitivum præscribo, interposito die uno repetendum, ad tertiam etiam nonnumquam vicem, prout humoris reliquæ plures mihi videntur, aut pauciores. Observandum est autem, quod si malum hoc sive fructibus horariis nimis avide ingestis, sive alii cibo cuicunque *δυσπνεύτω* originem suam debeat, unde sc. succi pravi corruptique primum in sanguinem transmittentur, atque ex eodem postliminio in viscera; rebus, inquam, sic stantibus, ventriculus ante omnia eluendus est. Lacte cerevisiato affatim hausto, & per vomitum rejecto, quo exantlato, Anodynum propinandum est; sequenti autem die primum vena secanda, & in cæteris eo, quem jam docuimus, ordine procedendum.

At vero cum & doloris vehementia, & vomituritio, ob quam intestina ad inversionem quasi feruntur, Cathartorum operationi obstant, intendendæ sunt eorundem vires, neque Leo subere excipiens, frustra enim mitius Catharticum exhibueris, nisi forte æger alvo sit facile solubili, quod diligenter inquirendum est: Cum enim hujusmodi medicamentum viam sibi facere per intestinelorum canales non valeat, æger ab eo læditur magis, dum scilicet ab ejusdem inefficaci agitatione & vomitus & dolor augentur. Potio Cathartica lenitiva ex infusione *Tamarind. fol. Senn. & Rhei*, in qua dissolvi possunt *Manna*, & *Syr. Rosaceus*, Cathartici aliis anteferenda, cum humores minus exagitet & commoveat. Cum tamen sive ob ægri aversionem medicamenti formæ liquidioris, sive vomituritionem, in ventriculo retineri vix queat, pilulæ necessario in subsidium vocandæ; inter quas *Cochiæ* mihi præ cæteris semper placuere, utpote certissimo pede quam cœperunt viam insistentes, tum in hoc casu, tum in aliis plerisque. Ubi vero tanta est sive ventriculi debilitas, sive etiam vomituritio, ut nec pilulæ possint detineri, ibi remedium primo Anodynum impero, & paucis horis elapsis Catharticum, eo temporis spatio interjecto, ut Catharticum a Narcotico tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur & pereat, eas autem inventriculo moras trahat, quæ ad virtutem purgativam eidem communicandam sufficiant, ut suam demum exerat operationem, cessante altero. Licet Catharticum modo id possit fieri, diu post Anodynum rectissime propinetur, cum etiam ad horas duodecim ab hoc assumpto, alvus isti ægrius respondeat, atque nonnisi operosius solvatur.

Cum autem huic uti in aliis plerisque morbis, in quibus indicantur *Narcotica*, Catharticum semper dolorem intendat (saltem finita jam operatione, qua quidem vigente mitius nonnumquam cum ægro agitur) idcirco solemne mihi est Anodynum ingerere, ubi primum expiravit Cathartici *ἐνέργεια*. Quale quidem mane etiam & sero quotidie hauriendum impero, spatio sc. omni inter purgationes medio, quo certius dolorem consopiam, donec Catharsis debite fuerit celebrata. Peracta Cathartici operatione humorum *ὀργασμοί* compescere (quod jam solum restat agendum) Anodyno mane & vespere jugiter exhibito, contendo; quod etiam sæpius aliquando est repetendum.

dum: nec unquam mihi contigit, dolores vehementiores sedare posse, nisi dosi largiori & reiterata, quæ enim alteri malo debellando par esset, ab hoc vincitur, violentia doloris remediis vires frangente. Tutissime autem repetuntur *Narcotica* urgente huiusmodi dolore, non item ubi ille desierit. Quamobrem doloris indicium secutus, *Narcoticum* repeto, donec vel cessaverit ille, vel admodum fuerit mitigatus; eo nihilominus interjecto temporis spatio, ut compertum mihi sit, quid a dosi præcedente sperari debeat antequam alteram superaddam. Plerumque vero, nisi ubi summe viget dolor, *Paregoricum* mane & sero exhibitum sufficit. *Anodynum* mihi familiare *Laudanum* istud *liquidum* est supra descriptum, cuius *guttæ* xvi. in aqua *Cardiaca* stillatitia solvuntur, vel augetur dosi pro doloris magnitudine.

Simplicissima hæc methodus, qua primum humor peccans venæ sectione & purgatione evacuatur, deinde *Narcoticorum* ope conciliatur quies, semper mihi felicissime cessit præ aliis quæ mihi hætenus innotuere omnibus. Cum *Enemata* Carminantia, eo fine injecta, ut humores acres exterminant, crabrones irritent tantum, & concitato humorum tumultu diuturniorem reddant morbum. Hic autem in primis animadverti volo, quod licet tam Phlebotomiam, quam Catharsin huic sedando morbo necessario esse præmittendam affirmavero, nonnumquam tamen, re ita postulante, ea utraque omissa a *Paregoricis* ordianda tela est. Exempli gratia, ubi ob prægressam ægritudinem aliquam evacuationes copiosiores non ita diu ante *Colicæ* adventum institutæ fuerint; (non raro enim ob viscerum debilitatem; maxime si accedat major caloris gradus a vino, vel spirituoso liquore alio immodicè hausto, qui nuper ab alio convalere morbo in hunc præcipitantur) hoc, inquam, in casu non modo non necessarium, sed & noxium esse censeo, alia insuper adjiciendo Cathartica novos excitare tumultus, atque omnia denuo perturbare. Illud jam taceo, quod in hoc affectu æger ut plurimum, prius quam consulatur Medicus, repetito *Enematum* usu intestina satis proluit; ita ut partim hæc de causa, partim ob diuturniorem morbi moram *Narcotica* fere sola in usum videantur revocanda.

Mense *Augusto* 1671. Nobilissimus Dominus Baro *Annesly Colica Biliosa* laborans cum cruciatu intolerabili, & frequenti vomitione, jam ab aliquot diebus ad Castellum de *Belvoir* accersiri me iussit, nullum non *Enematum* genus, atque alia insuper remedia a Medicis doctissimis experientissimisque eo locorum degentibus præscripta jam tentaverat. Ego nullis usus ambagibus, repetitum *Narcoticorum* usum ad normam jam traditam suam, quorum ope propediem convaluit, & mecum ad urbem sanus rediit.

Quandoquidem autem dolor hic præ ceteris quibusque ex sua natura recidivus sit, omnis ei revertendi ansa *Anodyno* bis quotidie ad aliquot dies exhibitio præscienda est. Quod si, quoties intermittitur *Narcoticum*, dolor subinde recrudescat, (ut nonnumquam fit) nihil a me hætenus excogitari potuit, quod ad perfanandum ægrum ita certo faceret atque *Equitatio*, vel in curru vectio, quo longiora itinera confici debueret, *Anodyno* interim mane & sero indefinenter propinato. Huiusmodi enim exercitiis materia morbum committens in corporis habitum deducitur, & sanguis perpetua agitatione comminutus de novo quasi depuratur; ipsaque demum intestina caloris nativi excitatione haud parum corroborantur ac refocillantur. Nec pudet fateri, me dicto exercitio in partes adscito morbum hunc, cui alio quovis modo devincendo par non fui, plus semel penitus expulisse. Neque vero illud tentandum est, nisi post evacuationes debitas sufficienter celebratas, neque ab eo nisi post dies aliquando multos desistendum.

Pauper quidam mihi vicinus, qui & adhuc est superstes, *Colica Biliosa* vehementissima per hos annos laboravit, quam *Catharticis*, *Clysteribus*, *Globulisque plumbeis* devoratis expugnare, diu, sed frustra erat conatus; Hic Ego ad frequentem *Narcoticorum* usum confugi, neque penitentia opera, quandiu enim ista repeterentur, satis recte habuit, sed cum his palliaretur tantum malum, non extirparetur (revertebatur enim ut primum erat exhausta *Narcoticorum* vis) Ego hominis misertus, & gravi morbo, & re angusta afflictissimi, equum ex meis commodabam, quo iter dicto jam modo peragendum aggrediretur, eoque ad dies pauculos continuato, viscera eas vires recepere, ut morbi reliquiis excutiendis paria jam essent, & sine *Anodynorum* præsidio omnino convalesceret.

Et, ut quod res est loquar, non in hoc tantum casu, sed in morbis alis *Chronicis* quampluribus hoc exercitii genus nunquam non cum uberrimo fructu usurpatum memini, modo quis in illo improbius perseveraret. Si enim nobiscum reputemus ventrem inferiorem, in quo disponuntur organa secretoria, hoc maxime exercitio vibrari, eaque succussionibus aliquot mille uno in die exagitari solere, facile credemus, eadem succum quemlibet recrementitium ibi impactum ope dicti exercitii posse excutere, & (quod majoris adhuc momenti) validioris ista caloris nativi excitatione ita corroborari, ut munere, quod iis mandavit natura, in sanguine depurando recte defungantur.

Diatam, si junior fuerit æger & calidioris temperamenti, refrigerantem atque incrassantem impero, puta hordei cremorem, panatellam, &c. & tertio quoque die, si latret adhuc stomachus, pullum teneriorem, merulamve piscem coctum; Potum non alium concedo, quam cerevisiam tenuem mitemque, vel lac cum aqua coctum, neque ulterius quidquam indulgeo, nisi equitatio ad redintegrandam sanitatem necessaria, pleniorum victum & generosiorem postulet liquorem, quibus rependantur spirituum exercitio exhaustiorum damna.

Quinimo observatione constat, quod ubi hic morbus perite tractatus diutissime fatigaverit, ita ut viscera elanguerent, atque æger extrema jam macie atque debilitate tantum non esset confectus, in hoc, inquam, casu liberalior sive *Aquæ Epidemicæ*, sive *Mirabilis*, sive alius demum cujuscunque, qua sanus maxime delectabatur, usus, hoc tempore eundem ultra spem omnem juverit; huius enim ope paucissimæ istæ caloris nativi spirituumque reliquæ excitabantur, & fermentum præternaturale visceribus adhærens, & novis paroxysmis fomitem subinde ministrans, a liquoribus magis spirituosis extinguebatur.

Porro ut in morbi curatione, ita etiam & eodem jam depulso, *Diatæ* illa tenuis, de qua diximus, adhuc aliquandiu est observanda. Cum enim morbus hic recidivam præ aliis omnibus affectet, atque insuper sedem sibi delegerit præcipua coctionis instrumenta (*viscera* intelligo, jam ab eodem infirmata) vel levissimus huius generis error malum haud leve confestim apportabit. Quocirca tam in hoc, quam in ceteris omnibus viscerum affectibus dici *δύσπνοιο* cane pe-

jus & angue sunt vitandi; & qui conceduntur, *ἐν μέτροι* ea tantum quantitate sumendi, quæ ad vitam sustinendam possint sufficere.

* *Fœminarum* nonnullas vexat *Affectus Hysterici* species quædam, *Colicam Biliosam* ita ad unguem referens, tam doloris acerbitate, quam situ, tum etiam humoribus coloris flavi viridisque vomitu reiectis, ut mihi obiter tractanda veniat, ne a quopiam pro jam dicto morbo hæc habeatur.

Quæ habitu corporis laxo crudoque sunt mulieres cum hoc malo præ ceteris conflantur, quæque alio aliquo affectu *Hysterico* jam pridem laboravere, aut, (quod sæpenumero fieri solet) quæ a partu difficili ac laborioso ob natum infantem grandiusculum, qui vires & naturam maternam nimis exhaustit, vix evasere. Regionem ventriculi, nonnumquam & paulo inferiorem, dolor haud mitior quam in passione *Colica Iliacæ* primum obsidet, quem vomitiones sequuntur enormes, nunc viridis materiæ, nunc vero flavæ. His accedit (quod sæpe observavi) major animi dejectio desperatioque, quam in morbo alio quocunque. Post diem unum alterumve facessit dolor, qui post paucas septimanas revertitur, nihilo lenius sæviens quam antequam solveretur *Paroxysmus*, *Icterus* quandoque satis spectabilem, comitem, sibi adsciscit, intra dies pauculos sponte evanescentem. Cessantibus jam symptomatibus omnibus, ubi ægra sibi satis valere videatur, levissima animi commotio, sive ab ira, sive a dolore ea fuerit excitata (quibus hoc in casu promptissime afficiuntur *fœminæ*) dolorem fere revocat; quod etiam & de ambulatione, & de alio exercitio quolibet præmature nimis suscepto dicendum est; cum ab huiusmodi causis eleventur vapores in habitu corporis laxo atque imbecilliori. *Vapores* cum vulgo dico, cum sive istiusmodi sint, sive *Convulsiones* particularum partium, utrovis pariter modo solvantur *φαινόμενα*. Hi vapores, sive convulsiones hæc, ubi hanc illamve corporis regionem invaserint, pariunt symptomata, ei, quam invasere, parti accommoda, ac proinde licet unum atque eundem ubique morbum faciant, plerisque tamen quibus miseri cruciantur affabre simulant, quod vel ex hoc liquet affectu, quicum partes *Calo* adjacentes infederit, *Colicam Biliosam* adamussim imitatur. Neque minus id patet in multis aliis corporis partibus eodem morbo tactis; v. g. nonnumquam *Renum* alterum vehementissimo dolore afficit, unde vomitus inmanis; atque etiam per ureteris ductum persæpe delatus, *calculum* simulat, & cum ab *Enematibus* aliisque medicamentis *Lithontripticis* & calculo exturbando dicatis exasperatur, uno eodemque tenore diutissime affligit subinde etiam (præter morem suum, cum per se omni vacet periculo) ægrum ad plures deducit. Vidi insuper & symptomata ab eodem prognata, quæ *vesicæ calculum* omnino referebant. Non ita diu est, a quo noctu excitabar, ut Comitissæ mihi vicinæ, dolore in vesicæ regione admodum violento & urinæ suppressione derepente correptæ, consulerem; Cum ego illam affectibus *Hystericis* variis obnoxiam certo scirem, atque ex ea augurarer, non isto eam, quem putabant, laborare morbo, *Enemata*, quæ parabat ancilla, injici non patiebar, ne ab illis cresceret morbus, at horum loco, atque emollientium, v. g. *Syr. de Althæa*, &c. quæ adferebat *Pharmacopola*, *Narcoticum* exhibui, quod symptoma illud subito compescuit. Neque sane vel una aliqua pars corporis ab huius mali insultibus penitus eximitur, sive interna ea fuerit, sive externa, ut sunt fauces, coxæ, crura, in quibus omnibus dolorem excitat intolerabilem, atque, ubi discesserit, teneritudinem quandam quæ tangi recuset, relinquit, perinde ac si carnes multo verbere fuerint emollitæ.

Quemadmodum autem quædam ad *Colicæ Hystericæ* historiam pertinentia obiter tradidi, ne scil. illa pro *Biliosa* falso haberetur; ita & quædam etiam alia *ἐν παρῶδῳ* attingam, ad *Symptomatis* doloris, qui eam comitatur, curationem facientia: *Curatio* enim *radicalis*, quæ morbum sublata causa tollit, alterius omnino est & speculationis, & loci.

Venæ sectio, & repetitæ purgationes, quæ in *Colica Biliosa* incipiente apertissime indicantur, hic locum non habent nisi in casu infra dicendo. Docet enim experientia, & exasperari dolorem, & invalescere symptomata alia omnia, a tumultu, quem ista cient, adjuta; atque adeo plus semel animadverti, *Enematum*, vel lenissimorum, repetitionem, continua symptomatum seriem invexisse. Experientiæ ratio etiam adstipulabitur, quæ morbum hunc a spirituum potius *ἀταξία* atque inordinato motu, quam humorum vitio aliquo produci dicabit, si expendamus nempe circumstantias illas, quibus ut plurimum originem suam debet: Huiusmodi sunt, magnæ atque indebitæ sanguinis profusiones, motus animi uti etiam & corporis violentiores, & alia id genus. Quæ omnia, remedia illa suadent proscibenda, a quibus major spirituum perturbatio possit excitari, atque eorum loco *Anodyna* esse usurpanda, licet *viridis* ac pravus materiæ vomitu reiectæ color contrarium indicare videatur: Subtilior enim est atque minutior colorum speculatio, quam ut evacuationibus, quas ipso facto nocentes deprehendimus, autoritatem conciliare valeat. Nullusque dubito, morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine commissos, lethalem sæpenumero evadere. Adde, quod si quis *Emeticum* vel fortissimum hodie propinxerit, ut sc. eam, quam putat, morbi mineram exhauriat, ægra postero die materiam æque viridem aut pravi alterius coloris, æque erat prior illa, evomet.

Observandum est tamen, eam quandoque sanguinis atque humorum copiam reperiri, quæ *Narcoticis* operationi eo usque obsistat, ut, quamlibet sapissime repetatur, orgasmum tamen cohibere nequeat, nisi secta prius ægræ vena, aut alio subducta; quod in fœminis temperamenti magis sanguinei atque viraginis mihi subit notare. Si ita se res habeat, vel Phlebotomia, vel Catharsis, forte etiam utraque, *Anodyno* via aperienda est. Celebrata enim harum utraque, *Narcoticum*, quod prius summa licet dosi exhibitum nihil quicquam profecit, jam etiam in mediocri dosi, effectum obtinebit, cui destinabatur. Raro autem hoc contingit, neque tum reiteranda sunt hæc remedia. Quibus præmissis, ubi opus iis fuerit, in *Anodynis* ea methodo, quam in *Colica Biliosa* proposuimus exhibendis progrediendum est, quæ crebrius parciusve sunt ingerenda prodoloris recedentis ratione. Quæ quidem methodus præsens atque inflans vehementissimi doloris *symptomata* tantum respicit; cum non hic loci illam, qua morbi causæ occurritur, tractandam in me receperim.

Cum

Cum veto hic morbus tam in Hypochondriacis, quam Hystericis (nam in utroque, ut alio loco dicitur, par est ratio) sæpissime in Icterus desinere soleat, atque iisdem passibus, quibus hic ingreditur, iste se proripiat; observandum occurrit, quod in hac Icteri specie curanda Cathartica omnia, vel omnino omittenda, ve si adhibenda fuerint, Rhabarbaro solum, vel leni quovis medicamento utendum. Etenim metuendum, ne a Cathartici novi tumultus cieantur, ac proinde symptomata omnia postliminio recurrant. In hoc itaque casu nihil omnino agendum, cum Icterus huic occasione originem debens, sensim sponte sua facessat, ac tandem brevi temporis spatio penitus evanescat: Sin autem Icterus longas moras neciat, atque non nisi ægre discedere videatur, ad Remedia confugiendum. Hoc uti soleo, ℞. Rad. Rub. Tinctor. & Curcamae an. ℥j. Chelidon. maj. cum toto, & Summitat. Centaur. min. an. M. i. coq. in æqualibus partibus vini Rhenani & aqua font. ad ℥ij Colatura dissolve syrup. de quinque Radicibus ℥ij. M. s. f. Apozema; capiat ℥ss. calide mane & sero usque dum convaluerit. At ubi Icterus per se invadit, Colica nequitiam prægressa, omnino oportet, ut præter alterantia jam dicta, etiam Cholagoga, i. e. quæ per alvum bilem subducunt, ægro exhibeantur, nempe semel vel bis antequam aggrediatur usum præscripti Apozematis, & postea semel singulis septimanis durante ejusdem usu. Ut ℞. Elethuar. e succo rosar. ℥ij. Rhabarb. subtiliss. pulv. ℥ss. Cremor. tartari ℥j. cum seq. Syr. Cichor. cum Rheo f. Bolus, Sumat summo mane, superbibendo vini Rhenani haustulum. At si vel his diu continuatis morbus adhuc obstiterit, ad Aquas ferreas, quales sunt istæ Tunbrigenes, adeundum, quæ ex ipso fonte bibendæ sunt singulis matutinis dum convaluerit. Atque hæc de morbis hujus Constitutionis.

SECTIO QUINTA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica parvis Anni 1673. atque integrorum 1674. 1675.

Circa initium mensis * Julii 1673. alia quædam Febris species est ingressa, Constitutione vero, necdum ita ad eam unice disposita, ut penitus excluderentur Constitutionis præcedentis morbi, non admodum fuit Epidemica. Nondum enim desierat ista Variolarum species, quæ Anno 1670. primum cœperit invadere, licet jam & rarius occurreret, & mitiora essent symptomata; ita ut bini hi morbi pari fere passu procederent, neuter vero multum grassaretur: Priori constitutione nondum ita prorsus evanescente; ut nullos proferret morbos veteris prosapiæ, (Dysenteria enim perpauca adhuc reperiebantur) neque Nova ita adhuc confirmata, ut eos produceret, qui alios exterminarent omnes.

Et per Autumnum hunc & Hyemem omnem Variola pari cum hac Febre incedebant passu, nentro tamen morbo admodum grassante, atque interim tantum non exstinguebantur Dysenteria. Novembri autem tum corrente, post acerrimum gelu ad dies aliquot perdurans, succedente insperato tempestate calidiori, quam ego me per istud anni tempus unquam observasse memini, paucula Dysenteria & paulo ante, & circiter Festum Nativitatis Domini hic illic spargebantur: Hæc autem extremum morientis lucernæ conatum referebant, mox enim morbus hic (ista saltem ejus species) omnino intercidit.

* Præmature admodum sequente Anno, mense scil. Januario, invadebant Morbilli, haud minus Epidemici atque erant isti, qui eodem ferme tempore Anni 1670. fuerant ingressi. Etenim in nullam non fere familiam se insinuabant, infantes præ cæteris omnes adorti. Non autem perinde regulares erant, neque typum ita ad amissum servabant, atque isti, qui prædicto anno infestabant. De hac autem illorum ab invicem discrepantia plura dicam, ubi de illis agam particularius. Hi magis indies magisque grassantur ad Equinoctium usque Vernale, a quo tempore iisdem gradibus decrescebant, donec paulo post elapsum Solstitium Æstivum tandem evanescerent.

Sicut autem Morbilli Epidemici, qui invadebant initio anni 1670. Variolas nigras ibidem descriptas introducebant, hi pariter haud minus Epidemici, qui initio hujus anni comparebant, Variolarum speciem introducere isti persimilem. Cum enim (quod prius est notatum) Variolæ præcedentis Constitutionis post priores annos duos pustulas emitterent minus nigricantes, majores insuper sensim & majores donec sub finem anni 1673. pro speciei ratione, mites essent & benignæ, jam recepta pristina feritate, & pessimis symptomatibus stipatæ revertentur. Invaluit hæc Variolarum species Autumno proximo, longius etiam in Hyemem excurrans, quæ, cum solitis calidior multo esset, morbo favebat; appetente vero tempestate frigidiore imminuta est, febri jam grassanti mox locum cedens.

* Febris hæc, quæ per annum perseverarat omnem, initio Julii 75 longe lateque depopulata est; sed Autumno jam appropinquante in viscera cœpit converti, nunc Dysenteria symptomatibus, nunc Diarrhoea se prodens, licet quandoque neque hanc haberet comitem, neque illam, sed caput magis tentabat, stupidores reddens ægros. Variolæ interea, quæ jam pauculos hinc inde affecerant, sub Equinoctium Autumnale penitus disperebant, vix unum alterumve jugulantes. Jam enim Febris alios vincens Epidemicos, anni prædominio potiebatur. Observandum est nihilominus, quod cum proclivior esset febris hæc materia moribificam in viscera deponere, quæ Dysenteriam quandoque, sæpius autem Diarrhoeam excitabat, ex hac occasione ventris tormina eam edidisse stragem vulgo putabantur, quæ febri huic revera fuerat imputanda; licet nemo, qui ægros hoc Autumno tractaverit, nescire sit, quantum invaluerit hæc febris; ut nec etiam, Dysenteriam dictam & Diarrhoeam pro symptomatibus magis quam morbis essentialibus ac Primariis haberi debuisset.

Hunc febris ista cursum tenuit per omnem Autumnum, nunc caput petens, nunc viscera, ubique sæpiens sub persona symptomatum iis partibus accidentium, ad finem usque Octobris; Quo tempore, quæ eo usque tepida atque ad instar æstatis placida fuerat tempestas, derepente in frigidam humidamque est mutata; unde etiam Catarrhi & Tusses increbuerunt magis quam alio ullo, quod meminimus, tempore. Quod autem maxime erat momenti, tussibus hæc supervenire solebat Febris hujus constitutionis Stationaria, quæ antea hinc arrepta & magis grassabatur, & quædam etiam symptomata variabat. Cum enim paulo ante insultus, ut jam dictum, in præ-

fatas partes plerunque fierent, nunc in pulmones & pleuram præ cæteris detorquebatur, unde symptomata nascebantur Peripneumonia, & Pleuritica, licet eadem omnino febris esset, quæ Julio 1673. ingressa sine quavis symptomatum alteratione progrediebatur, donec Catarrhi isti accederent.

Hi Catarrhi & Tusses usque ad exitum Novembris perseverabant, quo elapso derepente minuebantur. Febris autem eadem planemanst, atque erat antequam Catarrhi se ostenderent, licet nec ita prorsus Epidemica, neque iisdem symptomatibus stipata, cum horum utrumque per accidens a Catarrhis penderet. Quin etiam recedentibus Catharris Variolæ hinc inde spargi cœperunt, ejusdem plane generis cum Variolis anni præcedentis; sed cum jam secundum ferme annum explevisent, non ita atrocia erant symptomata, ac ubi primum invaderent. Quandiu adhuc stabit hæc Constitutio, dicere non habeo; id certo scio illam perquam Anomalam atque irregularem hæcenus fuisse, atque morbos omnes per eam natos ejusdem omnino indolis.

De hujus Constitutionis Epidemicis, eo quo se invicem ordine excipiebant, jam agam.

CAPUT II.

Febris Continua An. 1673. 74. 75.

Hæc, perinde atque alii Epidemici, mox ab ingressu socia habebat symptomata, quæ indicia haud obscura dabant majorem & spirituosam magis tunc esse inflammationem, quam ubi morbus magis adoleverat. Etenim primo quo invadebat anno, uti & Vere insequente, symptomata Pleuritica febri superveniebant, & sanguis e venis extractus (saltem pro prima & secunda vice) Pleuriticorum referebat sanguinem, at morbo jam proVectiori cessabant ea signa inflammationis intensioris.

Præter symptomata febribus universis communia, hanc febrem ista sequebantur: Ut plurimum afficiebatur æger dolore capitis & dorsi satis atroci, stupore item, & dolore articulorum, artuumque tensivo, imo & totius corporis; at mitiori aliquanto quam Rheumatismo laborantes. Primis diebus calor & frigus sibi invicem succedebant, quandoque etiam ineunte morbo æger in sudatiunculâ erat propensior. Lingua, ubi febris suo genio erat permessa, nec sicca, nec a colore naturali multum recedens, nisi quod magis alberet, neque sitis multum urgebat: Quod si excalesceret æger, ultra ordinariam febbris sortem, lingua aridissima erat cum flavedine subfusca; sitis etiam intendebatur; Urinaque, quæ aliter colorem fere naturalem servare solebat, intense rubebat.

Febris his tantum gravata symptomatibus, si perite tractaretur, die decimo quarto ægro valedicebat; pertinacissima, primo post vicesimum.

Inter hujusce febbris symptomata eminebat affectus quidam Comati haud dissimilis, quo correptus æger obstupebat delirabatque, imo ad septimanas aliquot dormitabat nonnunquam, nec nisi valido clamore expergiscebatur, a quo ægre excitatus oculos aperiebat tantum, & post ingestum sive medicamentum, sive potum, cui assueverat, mox in stuporem dilabebatur ita quandoque profundum ut in Aphonia desineret absolutissima.

Qui sic fuerat affectus æger ubi ad se rediit, die vigesimo octavo, vel trigesimo cœpit convalescere; cujus primum signum erat, quod cibi aut potus genus aliquod insuetum aut absurdum deperiret. Convalescentis caput ad dies aliquot debile atque infirmum, nunc verus hanc partem, nunc illam nutabar; aliaque aderant signa, quæ caput plurima fuisse passum ostenderent. At quo passu vires restituebantur, eo ipso discessit dictum symptoma.

Quandoque non tam dormitabat æger, quam tranquille delirabat, incongrua tamen subinde effutens ceu iratus, ac mente motus; at non eo exandescens & furoris ascendeat, quo solent ii, qui a Variolis atque aliis febribus phrenetici fiunt; a quibus hic in eo etiam discriminabatur, quod per intervalla abrupte dormiebat, stertebat etiam profundius. Adhuc non ita erat acutum hoc symptoma, atque illud, sed erat diuturnius. Pueris etiam hoc plerunque accidebat, aut iis, qui nondum adoleverunt, illud Adultis maxime. In utrisque vero si ingererentur calidiora remedia, & sollicitarentur sudores, malum in caput facile transferebatur, & dictis symptomatibus ansam præbebat.

Ubi vero symptoma hoc nec sponte sua accessit, nec medicamento- rum vi coactum, morbus intra diem decimum quartum terminabatur ut plurimum, nonnunquam etiam intra tertium quartumve, quod factum vidi.

Autumno 1675. ut supra innuimus, febris hæc per dysenteriam sibi fugam querere, nonnunquam & per diarrhoeam affectabat: Harum posterior præcipue sæpe excurrebat, stupore adhuc manente. Utraque vero quantum diligenti observatione assequi poteram, nihil erat aliud, quam febris symptomata.

* Curationem hujus febbris quod attinet, sub primum introitum, nempe Julio 1673. tum ex variis phænomenis ab istis longe diversis, quæ præcedentem comitabantur, tum ex eo quod Catharticis minus pareret, quibus felicissime febres omnes constitutionis prægressæ deviceram, statim didici, febrem hanc esse alterius plane familiaris, & diutius, quam solebam alias, in ejus specie investiganda hærebam, & ex consequenti anxius dubitabam, quem mihi curationis scopum proponerem. Quo enim tempore primum erupit hæc febris, nullum habuit alium Epidemicum sibi σύγγενον, cujus perspecto genio de hujus natura verisimile aliquid conjectare possem, cum Variolæ, uti dixi, quæ illam comitabantur nigrarum istarum, quæ anno 1670. invaserant, reliquias omnino referrent, jamque & mitissimæ essent, & tantum non exolerent. Nihil itaque aliud jam restabat, nisi ut in hunc morbum nudum & ab aliis sepositum accuratissimo examine inquirerem, atque oculo ad Juvantia & Ludentia, quam diligenter maxime potui, semper intento, viam provirili, exploratoris instar, prætentarem. Atrox capitis dolor, propensioque quam habebat hic morbus ad dolores lateribus infingendos, tum etiam sanguis Pleuriticorum similis, me statim edocebat, inflammationem haud mediocrem huic febri subesse, nec tamen eam posse ferre largiorem istam evacuationem, quæ Pleuritidi convenit: Sanguis enim post primam aut secundam saltem vicem detractus glutinis colorem, quo tegebatur superficies, protinus amittit, nec repetita adhuc venæ sectione levatur.

batur æger, nisi forte morbus in Pleuritidem veram transfret; quod nonnunquam accidebat post regimen iusto calidius, præsertim primo Vere quo invadebat, sc. Anno 1664. quo tempore a Solis accessu occasionem nactus (cum enim nondum adolefceret morbus & principio magis spirituosus inniteretur quam postea) ad genus Peripneumonicum videbatur accedere. Cum vero & experientia & exemplo a repetita Phlebotomia deterreret, licet luce clarius esset febrem hanc, præcipue sub primum ingressum, haud parum inflammatoriam fuisse, nihil jam restabat, quo ejus calor restingui posset præter *Enemata* sæpius repetenda, & medicamenta refrigerantia. At præter hos affectus inflammationem aperte prodentes, illud *stuporis* phenomenon, febri huic quam alii cuilibet familiaris, omnino indicabat, continuo repetenda esse *Enemata*, quibus materia febrilis, quæ ita prompte caput petebat, ab eo diverteretur; quin & venæ sectioni repetitæ, quam ægre tulit propria hujus morbi natura, substituebantur illa, atque ejus pensabant defectum, sanguinis fervorem placide ac sensim contemperantia, & causam eliminantia morbificam. Porro judicabam emplastra *Epispastica* satis ampla cervici posteriori applicita in hac febre potius ex usu fore quam in aliis, quibus materia febrilis haud ex æquo caput tentabat; Etenim a cruciatu & fervore vehementibus, quos dicta *Epispastica* parti, cui imponuntur, solent imprimere, materia, quæ secus in caput ascenderet, in locum affectum corrivatur. His, & regimini ad eundem refrigerandi sanguinis scopum facienti, tandem morbus quasi naturaliter sponte sua cedebat, quantumlibet sæviret, si methodo ab hac diversa eum quis aggrediretur; quod mihi ab experimentis plus satis frequentibus abunde liquebat.

Hunc itaque cursum institui: Sanguinem e brachii venis mittentium, ea quantitate, quæ ægri viribus, ætati, aliisque circumstantiis convenire mihi visa est, ante omnia curabam, atque eodem fere tempore emplastrum *Epispasticum* bene largum nuchæ applicandum. Die proximo clysterem lenitivum ita temporis injiciendum præcepi, ut ante noctem sedari posset tumultus, qui ab eo inter operandum excitaretur, hora scilicet secunda tertiave post meridiem. Repetebatur *Enema* illud singulis diebus, donec imminueretur morbi vis. Quo quidem tempore ab eo cessandum esse duxi, imo & maturius, si nempe febris diem quartum & decimum excessisset, jamque inveterasceret, quo in casu licet ab *Enematis* præcedentibus debellata non fuerit, eadem tamen post elapsos hos dies supervacanea esse conperi: Morbi enim acie per ebullitionem prægressam jam retusa, atque ægro *ἔξω βέλους* constituto, & a symptomatibus violentioribus, quæ ab eo pendebant, securo, nihil prius erat, quam ut morbum suo uti genio, & quasi sensim deflagrare, ac suis viribus ruere sineremus. Quod mihi semper cessit melius quam evacuationem qualemcumque violentiorem hoc tempore moliri. Ægro interim carnibus interdixi, cerevisiam vero tenuem ad arbitrium concessi.

Restat & aliud, quod, quia multiplici experientia astipulante ægris optime solebat vertere, in describendo hujusce morbi regimine mihi minime prætereundum fuit, nempe ut æger quotidie lecto abstineret, saltem ad horas aliquot; vel si id vetaret major ejus debilitas, vestes saltem indueret, & supra lectum cubaret, capite paulo elatiori. Etenim cum magnum illum impetum, quo febris in caput ferebatur, & inflammatoriam simul sanguinis diathesin contemplerer, subiit mihi in mentem, ægrum a corporis postura nonnihil emolumentum capere posse; si nempe ea talis fuerit, ut a circumambientre nullatenus aufereretur calor (quod omnino fieri necesse est, si in lecto se jugiter contineat) neque sanguinis in capitis arcem tendentis impetus promoveretur, cum illinc cerebri fervor intendatur, proindeque spiritus animales calefiant atque exagitentur, a quibus & vehementior cordis vibratio & febris augmentum.

Quantumlibet autem ægris conducatur in febribus omnibus, quæ inflammationis intensioris sunt participes, ut non semper lecto incarcerationum, animadvertendum est tamen, eosdem, si diutius, quam par erat, pro una vice a lecto abfuerint, declinante præsertim morbo, in dolores vagos, qui in *Rheumatismo* desinere possint, nonnunquam de facili incidere, nonnunquam etiam superficiem corporis *Ittero* deturpari; quæ si cui contingant, lecto addicendus est, quo apertis cutis spiraculis commode diffilari possint istiusmodi particulæ, quæ malorum alterutri fomitem præbent, hoc vero ad diem unum aut alterum tantum, sudore non provocato: Hujusmodi autem accidentia oppido rara sunt, nec nisi in febris declinatione comparent unquam; quo tempore cum jam morbus mitior est, longe tutius ægro permittes, ut in lecto assidue decumbat, quam vel initio, vel in statu; quinimo per hoc tempus id magis confert ad materiam febrilem digerendam, quæ, si æger maturius lecto affigatur, efferatur magis atque incenditur.

Hic si quis objecerit, dictam methodum, licet ad sanguinis impetum a capite emolliendum rescindendumque ægrum, satis commodam, minus tamen expedire, eo quod evacuationi per sudores, qua materia febrilis jam concocta eliminanda omnino erat, officiet: Respondeo, nihil agere contra sentientem, nisi prius argumentis confecerit hujusmodi evacuationem omni febri deberi, quod haud ita in proclivi atque facile est. Docet enim experientia, non autem ratio, quamnam febrium species per Diaphoresin, & quæ per Catharsin sit exterminanda, &c. Quinimo est cur arbitremur, dari quasdam febrium species, quas natura methodo sibi peculiari, sine visibili aliqua evacuatione, ablegat, reducendo scil. in sanguinis massam eique assimilando materiam illam morbificam, quæ cum eodem minus quadrabat. Qua ego nixus ratione, sæpenumero tam in hac febrium specie, quam aliis, modo intermittentes non essent, mox a primo insultu, totoque sanguine nondum inquinato, easdem in ordinem redegi, imperato tantum cerevisiæ tenuissimæ, quoties ac quantum desiderarent, potu, esuque tam jusculorum, quam aliorum, cujuscunque generis sint, ægris interdicto; Præmissis interim & exercitii consueti usu, & aura liberiore, nullaque prorsus evacuatione vel semel instituta. Sane omnimoda solum hujusmodi per biduum triduumve abstinentia liberos meos, ac amicitia mihi conjunctissimos, curavi; Verum hoc remedio non nisi in junioribus ac temperamento sanguineo præditis est utendum.

Quod si demus, naturam non alia methodo quam per diaphoresin morbum vincere posse, an non eos volumus sudores, qui morbo jam fatiscente prorumpunt, & prævia digestionem fluunt, non vero istos, qui primis morbi diebus protrusi, ab interrupta furentis naturæ œconomia nascuntur; Hujusmodi, opinor, sudores non erunt

promovendi, at conpescendus potius tumultus ille, cui ortum suum debent. Istiusmodi autem sudores multas febrium species, licet non omnes, solent comitari. Neque enim sum nescius, quasdam febrium species ejus esse indolis, ut in *παράκμῃ* sudorem hunc criticum sibi postulent; Tales sunt particulares intermittentium paroxysmi, magna item & frequentissima naturæ febris ab illa pedens constitutione, quæ ad intermittentes epidemice producendas unice faciat. In his enim, si cui methodo insistatur, quæ non eo tendit, ut materia morbifica digeratur primum, dein per sudores eliminetur, augebitur morbus: Quo circa nullæ hic evacuationes locum habere debent; nisi quatenus morbi impetum primis diebus, quibus aggreditur, sufflaminare valent, ne inter medentium operas æger fato succumbat. Quin & febris pestilentialis causa, cum tenuissima sit & perquam subtilis, vel primis morbi diebus, sudoribus diffilari potest, suffragante ubique experientia.

Istis autem in febribus, in quibus ordinario symptomatum ductu, & si suo genio uti permittantur, nusquam videmus, naturam materiam morbificam jam præparatam tempore præfinito evacuare solere; nescio an non plus satis temerarius is fuerit, qui sudore provocando vim morbo inferre cogitet, atque ægrum ea sola methodo restituere, cum ut docet divinus senex, *τῆς φύσεως ἀντιπαρτέστιν; καὶ ἐπὶ πάντῃ*: Atque illud quidem usu venire autumno in febre hac particulari, de qua hic agimus, quam, multiplici experientia edoctus, satis scio sine sudoribus fugari posse; ægrum etiam, dum eisdem importunius sollicitamus, sæpenumero nulla cogente necessitate in manifestum vitæ discrimen conjici, a materia morbifica in caput sursum lata: Attamen neque in hac febre, neque in alia qualibet, vel ex eis, quæ sudore critico solvi non solent, si forte hujusmodi sudor morbo jam imminuto sponte supervenerit, quem symptomatum omnium remissione debita concoctionis sobolem esse arbitremur, Medicorum prudentissimus quisque eum contemnet; ubi vero non ita sponte exit, qui certo scire possumus, an non hominem e medio tollamus, dum humores regimine & cardiacis calidioribus ad ejusmodi sudores disponere nitimur? Si quis forte in thesaurum inciderit, nisi desipiat, humo tollet; stultus autem sit oportet, qui hac fretus fortuna omnem adhibet operam, ut alium ejusmodi cum vitæ periculo adipiscatur. Quo vero cunque modo hæc se res habeat, mihi abunde constat, solam febrem calorem eum secum adferre, qui materiam febrili ad coctionem præparandam possit sufficere, neque eo intensiorem a regimine fervido forinsecus accersendum.

Præfatam methodum per venæ sectionem atque *Enemata* in hujusce febris curatione quam felicissime succedere comperiebam; eam vero, quoties a diaphoreticis lacefferetur, non solum mali moris symptomata, sed etiam dubium semper exitum habuisse; Inter symptomata eminebat tacitum illud delirium, quod non tam insana loquacitate se prodebat, quam *stupore* coma æmulante, quod, uti diximus, huic febri frequens solebat accidere. Hoc symptoma, (licet nonnunquam sponte sua ortum illud viderim) a nimia tamen curatricum diligentia in provocandis sudoribus male posita, ut plurimum invitabatur: Hoc enim pacto materia morbifica, quæ in hac febris specie sudoribus morem gerere recusabat, vehementer exagitata in caput tandem elevabatur cum ingenti ægrorum discrimine.

Jampridem animadverti in curatione febris constitutionis alteritis, quod per ultimos annos hujusmodi *Stupor* pueros maxime, atque eos, qui ex exphebis vix excefferant, subinde invadebat, sed nec ita profundus, nec perinde epidemicus atque erat is, qui hanc febrem comitabatur. Neque tamen illum, licet huic inferiorem, multo minus hunc, ubi primum ingrederetur morbus, edomare potui; licet nullum non lapidem moverim, repetitis venæ sectionibus, non in brachiis tantum, sed cervice etiam & pedibus, emplastris vesicatoriis, cucurbitulis, enematis, diaphoreticis omnis generis, &c. in partes adscitis. Tandem statui, post sanguinem e brachio eductum, *Epispasticum* cervici applicatum, atque enemata duo vel tria e lacte & saccharo injecta primis morbi diebus, nihil quicquam amplius moliri nisi quod ægrum & a carnibus, & a liquoribus spirituosis quibuscunque arcerem: Ad naturæ methodum interim attendebam, cujus ego velligiis inhærens symptoma hoc superare tandem discerem. Morbus interim cui invigilabam, tuto licet tarde recedens, tandem evanuit. Huic itaque methodo insistendum mihi esse duxi in febribus, quas deinceps tractavi universis; quod quidem, si & symptomatis magnitudinem & eventum ubique votis respondentem spectamus, haud parvi momenti mihi videtur.

Et sane mihi nonnunquam subiit cogitare, nos in morbis depellendis haud satis lente festinare, tardius vero nobis esse procedendum, & plus naturæ sæpenumero committendum, quam mos hodie obtinuit. Errat enim, sed neque errore erudito, qui naturam artis amiculo ubique indigere existimat. Nanque id si fieret, parcius humano generi eo prospexisset, quam postulat speciei conservatio; cum ne minima sit proportio inter morborum ingruentium frequentiam, & facultates, quibus pollent homines ad eosdem fugandos, vel iis sæculis, quibus medendi ars maxime caput extulit, & a quampluribus exculta est. Aliis in morbis quid hoc profecerit nescio. Illud satis scio ex diligenti observatione mihi adstipulante, quod in febre, de qua jam egimus, dictum symptoma post usurpatas evacuationes generales, venæ sectionem dico, & enemata, solo tempore feliciter solebat vinci.

Antea diximus, convalescentiæ prænuncia signa ut plurimum ad diem usque *Tricesimum* differri solere, (in *stupore* scilicet paulo confirmatori) ægro nonnunquam etiam *Aphonia* correpto: quibus elapsis, incongruum aliquod atque absurdum sive cibi, sive potus genus importune flagitabat, ventriculi fermento a morbo diuturniore impense vitiato. Hoc in casu, quandoquidem jam exhaustæ corporis vires refectione omnino indigerent, lubens ea etiam concessi, quæ minus ægro convenire viderentur, modo palato magis ariderent.

Mense Septembris 1674. filium novennem Librarii cujusdam ædibus meis vicini, nomine *Nox*, hac febre una cum symptomate jam sæpe memorato laborantem tractabam: Extracto e brachio sanguine, & clysteribus per primos aliquot morbidies continuos injectis, importunissimæ matri obstabam, quæ rem ocys expedire acriter urgebat, quam ego cum salute filii stare posse arbitrabar. Datis itaque induciis, nulloque medicamento alio propinato præter Julapium aliquod e vulgaribus, quod pacandæ quidem matri potius destinabatur, quam filio restituendo, tricesimum circiter diem melius habere cœ-

pit; edulia varia etiam absurda misere discipiens, quorum pars aliqua concedebatur, licet nullo alio nomine concedi debuisset; atque ita tandem prorsus convaluit.

Quamvis autem *Stupor* hic ad *Comatis* accedens naturam, huic febris aliis symptomatibus frequentius superveniebat, quandoque tamen, at rarius, *Phrenesis* absque stupore nonnullos invadebat, in qua æger insomnes dies noctesque agebat, nulla ratione poterat regi, aliaque patiebatur symptomata iis similia, quæ vel ab aliis febribus, vel a Variolis in phrenesin actos infestabant. Inducias non tulit symptoma hoc, ut solebat affectus comatosus jam memoratus, donec fieret digestio, ægrum vero intra paucos tollebat, nisi inflammatio cohiberetur. Atque hic mihi suppetias præ cæteris tulit *Vitrioli spiritus*, quem post venæ sectionem atque enematis unius alteriusve injectionem cerevisiæ tenui instillatum pro potu ordinario concessi: Qui intra dies paucos & somnum conciliabat, & sanitatem, superatis symptomatibus, ægro reddebat; quod quidem nulla alia methodo efficere valebam. Atque hoc reiterata sæpe experientia mihi abunde constabat.

Febri huic, Autumno 1675. & *Dejectiones Dysentericæ* superveniebant, quandoque & *Diarrhæa*. Istas ego statim perispexi *Symptomáticas* fuisse huic febris, non vero, ut in constitutione præcedenti, *originales* & primo ortas. Quo non obstante, cum morbi causa in sanguinis massa clauderetur, venæ sectionem ea indicabat; quæ quidem, propinato etiam post Narcotico ad duas vices symptomati huic debellando par erat.

Septembri 1675. Domina *Conysby* juxta Equillia Regia habitans me accersivit; laboraverat ea hac febre, ventris torminibus derepente jam correpta, quæ deinceps excipiebant dejectiones sanguineæ ac mucosæ: Licet protritæ jam ab aliquot diebus, ob morbum diutinum, vires essent, maxime vero a dejectionum frequentia, quæ nocte prægressa multum fatigaverant, sanguinem tamen e brachio statim educendum curavi, & paulo post Narcoticum exhibendum, quibus peractis ea ipsa nocte dejectiones stercorosæ conspiciebantur. Mane & vesperti sequentibus Narcoticum repetebam prædictum, imperato etiam medicamento cardiaco moderatori, quo spiritus refocillarentur, atque ab his statim convaluit.

Diarrhæam quod attinet, quæ eodem fere anni tempore huic febris haud raro accidebat, minus adhuc ista facebat negotii, cumque ea neque ægro prodesset, neque etiam officeret, quantum mihi observare licuit (sive adesset stupor, sive etiam abesset) nullam ab illa indicationem curativam elicere valebam, modo intra eos staret limites, ut æger ab ea de vita non periclitaretur: quo in casu Narcoticum sine dubio indicabatur, atque in eo solo probandus anodynorum usus per omnem morbi hujus decursum: ingens enim illa propensio qua hac febre laborantes in stuporem ferebantur, ab his intendebatur, ac proinde nisi urgente necessitate in usum nunquam erat revocanda.

Notandum est haud raro accidere tam ab hac febre, quam febribus aliis convalescentibus, iis maxime quos illa diutius maceraverant, nec nisi post longas magnasque evacuationes tandem dimiserant, (præsertim si invalidiori essent corporis habitu) ut noctu in lecto cubantes incalescerent primum, mox sudore diffunderent, a quibus vehementer infirmabantur, & vires tardius recipiebant, nonnulli etiam præcipitabantur in tabem. Cum symptoma hoc non aliunde nasci existimarem quam a sanguine ob morbum contumaciorem eo usque depauperato debilitatoque, ut fucos, quos recenter advestos nequireret assimilare, per sudores ejicere moliretur, illa affectus author semper fui, ut singulis auroris noctibusque cochlearia quinque vel sex vini Malacensis annosioris haurirent, cujus usu ægri vires crescebant jugiter, & evanescerent sudores. Atque hæc de febre hujus constitutionis continua, quam ob insignem stuporem eam fere semper comitantem, lubet *Comatosam* appellare.

C A P U T III.

Morbilli Anni 1674.

O Riente anno, mense sc. *Januario* 1673. 1674. ingressa est *Morbillorum* species quædam ab ea diversa, quæ eodem mense Anno 1669. 1670. invaserat; neque tamen minus epidemice sæviebant hi atque isti, sed non perinde erant regulares, neque ita constanter typum observabant: Nunc enim citius, nunc serius erumpebant; cum in alia specie, eruptio in diem ab invasione *quartum* semper incideret. Adhæc humeros, & cæteras trunci partes, primum occubabant; cum isti alteri faciem primum peterent, & in reliquum corpus paulatim spargerentur. Nec hac in specie observare licuit, nisi rarissime, eas cuticulæ desquamations ad instar farinæ inspersæ, quoties recederent morbilli, quæ in alia specie haud minus certo conspiciebantur, quam post febris scarlatinæ decessum conspici solent. Plures insuper e medio tollebant, quoties imperite tractarentur, quam priores illi. *Febris* enim & *Dispnoea*, quæ morbillis abiturientibus solebant accidere, vehementiores erant, & *Peripneumoniam* hic propius referebant, quam in altero genere. Quantumlibet autem fuerint *Anomali* atque irregulares hi *Morbilli* quoad jam memorata symptomata, in præcipuis tamen satis iis competebar historia, quam de morbillis tradidi, cum morbos An. 1670. epidemicos describerem, quæ idcirco impræsentiarum repetenda non erit. Hi, uti etiam priores isti, ad Verum usque æquinoctium invalescebant, a quo tempore decrecentes, appetente solitio, aut non diu post, evanescere.

* Curatio, cum nulla ferme in re ab illa differat, quam in morbillorum historia jam fuisse tradidi, exinde petenda est. Unicam tantum hic, pro meo more, instantiam adferam methodi, qua illas aggredebam.

Februario 1674. Domina virtutibus ornatissima, atque in exemplum nata, Comitissa *Satishuriensis* me accersivit: Infantium unustantum tempore ægrotabat, mox reliqui (5 autem vel 6 erant) quos omnes eadem methodo tractavi. Lectulo eos addixi ad dies binos ternosve ante eruptionem, ut sanguis, pro suo genio, particulas facile separabiles morbum committentes, per cutis poros eliminaret. Neque autem vel stragulis, vel igni quibus sani assuerant, quidquam adjici patiebar, ab esu carnum arcebam, iuscula avenacea, hordeacea, ac subinde pomum coctum concedens, cerevisiam tenuem

* Curatio.

insuper, vel lac cum aquæ triplo coctum pro potu: Urgenteque pro more tussi, præsanam pectoralem sæpe assumendam præscripsi. His peractis, omnino convalere, brevi illo spatio quod hic morbus solet percurrere; neque vel per ejus decursum, vel eodem fatisciente, symptomate quovis morbo huic non familiari, tentabantur.

Duobus primis mensibus, quibus hæc morbillorum species se prodebat, intercurrebat & *Febris* quædam *Morbillosa* hic illic sparsa, in qua *exanthemata* nonnulla per truncum corporis, colli præsertim posteriora, atque humeros erumpebant, æthymata morbillorum imitantia, a quibus in illo saltem determinabantur, quod non universum corpus pariter occuparent, quas diximus partibus contenta, febris etiam (licet ejusdem plane generis) immanior erat, & ad dies 14. nonnunquam etiam plures, protraheretur. Nec venæ sectionem tulit hæc febris, nec enemata, ab utrisque irritata; at methodo quæ morbillis superius dicata est, lubens concessit. Atque hæc de morbillis fuerunt dicenda.

C A P U T IV.

Variolæ Anomale An. 1674. 75.

Q Uemadmodum morbilli epidemici initio anni 1670. incurstantes *Variolas nigras* ibidem delineatas introducere, ita etiam hi, qui haud minus epidemice grassabantur initio Anni 1674. Variolarum speciem introducebant tam earum similem, ut eadem istæ revixisse omnino viderentur, non aliæ subnasci: cum enim (uti jam diximus) in priora illa Variolarum specie post elapsos priores annos duos, pustulæ minus in dies nigræ comparerent, & grandiores etiam pedetentim conspicerentur, donec exeunte anno 1663. morbus jam mitis, habita generis ratione, ac benignus esset, jam pristina ferocia, & infauisto malorum symptomatum agmine stipatus denuo revertebatur. Etenim pustulæ fuliginem nigredine æquabant, ubi nempe confluerint, & æger non prius exstingueretur, quam ad maturitatem istæ pervenerint; immaturæ enim fusco tantum erant colore. Pustulæ quin etiam perpussillæ erant, si numerosæ, (paucae enim ubi fuerant tantum, haud erant minores, quam in aliis Variolarum generibus, nigræ vero rarissimæ) verbo dicam, istas quas anno 1670. descripsimus satis referebant; licet non in omnibus cum iis quadarent, distarent autem pauculis quibusdam, quæ quidem majorem sub his quam illis aliis putredinem latere, naturæque eas esse magis crassæ & incoctilis ostendebant. Maturæ enim pejus olebant, ita ut iisdem graviter laborantibus præ fœtore vix quirem accedere. Tardius etiam periodum absoluebant, hærebantque diutius, quam ulla species alia, quam mihi adhuc videre contigit.

Notatu interim est perdignum, quod quanto mitior est morbi species, tanto citius pustulæ ad maturitatem, atque morbus ad finem perducitur. Ita in specie ista regulari Variolarum confluentium, quæ anno 1667. ingressa est, dies *Undecimus* maximum adferebat vitæ discrimen, quo semel elapso, non amplius ut plurimum ægro metuentum erat. In proxime sequenti specie anomala confluentium, quæ initio anni 1670. coeperunt invadere, æger die *Decimo quarto*, vel ad extremum *Decimo septimo* maxime periclitabatur, quos si æger superaverit, salvus omnino erat, nec quenquam post hunc diem ab hoc morbo interemptum hæcenus observavi. At vero in hac specie confluentium, æger etiam post diem *Vicesimum* contrucidabatur, nonnunquam & si convalesceret, quæ paucorum fors erat, non tantum tibiæ intumescerent, (quod quidem in Variolis confluentibus quibusque familiare est) sed brachia insuper, humeri, crura, partesque aliæ; qui quidem tumores ab intolerabili dolore *Rheumaticorum* per omnia æmulo, tragædiam ordiebantur; postea haud raro suppurabantur, & in sinus ingentes & partium musculosarum apostemata desinebant, ægro in vitæ periculo etiam ad multos dies a discessu Variolarum adhuc versante. Adeo ut mihi luculenter constaret de gradibus, quibus hic se epidemicus promoveret per tres hæc constitutiones, quarum posterior priorum semper exuperavit, tum quoad majorem putredinem, tum quoad morbi materiam minus coctilem.

Videntur autem mihi hæc quas jam tracto *Variolæ*, nova quædam Variolarum species, e priore jam inveterascente suborta. Quamvis pro aeris diathesi eum producente epidemicum, Variolæ nigræ, quæ initio anni 1670. primum se ostendebant, ad *παράκμην* suam usque progredierentur, tamen ad instar recidivæ alicujus morbi a materia pristina denuo fermentescente, aer rursus ad Variolarum productionem faciens, ex veteri penu easdem deprompsit; qui quidem morbus redintegratus sumptisque de novo viribus, reviviscere plane & quasi rejuvenescere videbatur. Tanto autem magis anomalæ hæc erant, tantoque magis intensam redolebant putrefactionem, quanto materia, e qua generabantur, ista crassior erat atque faculentior, ad quam præcedentes primum ortum referebant. Quod ut magis elucescat, existimandum omnino est, nullam ejusmodi diathesin in ipso aere supponi debere, quæ hunc hoc in loco epidemicum propaget, alium vero longe diversum in alio non ita multum distante; hoc enim si fieret (sit autem subinde) quilibet ventorum motus constitutionem diffilare valeret; vero autem similis mihi videtur hunc vel illum particularem aeris tractum effluvis repleti a minerali aliqua fermentatione, quæ aerem, per quem feruntur, particulis nunc huic animalium generi, nunc alteri exitialibus, contaminantia, morbos variis terræ affectibus appropriatos eo usque propagant, donec expiraverit subterranea illa halituum minera; quæ pariter in novam denuo fermentationem agi possit, ex reliquiis nempe materiæ exolescentis, uti in casu jam memorato. Mihi vero, qui non ultra, quam res ipsa loquitur, sapere audeo, perinde est, an hæc, an alia aliqua hypothæsis phænomena rectius solvat. Id saltem pro comperto habeo, quas jam tractavi Variolas, præcedentis constitutionis Variolis fuisse simillimas, nisi quod & crassiorum naturam, & putredinem longe intensiorem redolere viderentur. Quibus etiam de causis duabus, ubi admodum confluerent, plures orco dabant, quam species alia quælibet, quam mihi hæcenus videre contigit; & si quid meo iudiciotribuendum sit, pestem ipsam, pro numero sc. ægrorum, perniciæ æquabant, licet, ubi *Discretæ* invaderent, haud certius intentarent periculum, quam alia quævis species, & tam pustularum magnitudine, quam colore, aliisque circumstantiis boni se moris esse faterentur.

* Curationem quod attinet; jam a multis annis miratus sum indi-

* Curatio.

indicationes plane contrarias, quas hic mihi morbus subinnuere videbatur. *Hinc* enim luce clarius fuit, a calidiori regimine symptomata, quæ a nimia inflammatione pendent, statim produci, febrem scilicet, phrenesin, maculas purpureas, & similia, quibus hic morbus præ cæteris quibusque est obnoxius, inde vero regimen iusto frigidius faciei manuumque intumescentiæ, quæ hic apprimè est necessaria, officere, & pustulas flaccidiores reddere. Postquam hæc diu multumque apud me satis anxie revolvèram, intellexi tandem, utrique huic incommodo eodem simul tempore posse occurrì. Usus enim aquæ cum lacte coctæ, cerevisiæ tenuis, aut liquoris alterius similis liberaliorem concedendo, penes me erat internum sanguinis ὀργασμὸν frænare; atque ex adverso ægrum in lectulo jugiter detinendo, ne brachio quidem exerto, blando ejus calore pustularum elevationem & faciei manuumque intumescentiæ valebam promovere. Neque hæc secum methodus pugnare videtur; sanguis enim, eruptione jam finita, particulas inflammatas in corporis habitum eructasse putandus est, neque jam stimulis ad ulteriorem materiæ secretionem indigere: Ita ut, cum tam in habitu corporis, maturandisque abscessibus rei cardo versetur, id tantum sit agendum *sanguinis* nomine, ut sc. sanguis ab halitibus calidis, a carne pustulis obsessa retro agendis, fartus tectus conservetur; *Pustularum* vero, ut blando partium externarum calore ad maturitatem illæ perducantur. Jam vero, ut ut feliciter mihi cesserit hæc methodus, uti prius docui, in Variolis aliis *Confluentibus*, in istis tamen hujusce constitutionis illa me fefellit, ita ut eorum plerique, qui vehementius laborabant, interirent, sive methodo jam a me laudata, sive regimine & cardiacis calidioribus uterentur. Omnino itaque intellexi, desiderari adhuc aliquid præter ista, quæ vel ad compescendam sanguinis ebullitionem, vel ad pustularum elevationem, manuumque atque faciei intumescentiæ facerent, desiderari sc. aliquid, quod putrefactioni magis intentæ, quam in his Variolis præ cæteris quibusque observaram, vincendæ par esset. In mentem mihi tandem venit *Vitrioli Spiritus*, quem existimabam utrique intentioni, tum putredini oppugnandæ, tum perdomandæ caloris ferociæ, satisfacere posse. Quamobrem ægro sibi relicto donec & dolor & vomitatio, quæ eruptionem præcedere solent, jam desinerent, & Variolæ conferto agmine prodirent omnes, tandem die quinto sextove dictum *Spiritum*, cerevisiæ tenui ad levem aciditatem instillatum, pro potu ordinario concessi ad libitum fumendum, liberalius vero, cum appareret febris maturatio, quem potum, donec perfecte convalesceret, imperavi usurpandum quotidie.

Hic *Spiritus*, seu morbo revèra specificus, symptomata omnia ad miraculum fere compescerat. Facies & maturius, & longe altius intumescerat. Variolarum interstitia, ad calorem magis rubrum, & rosæ Damascenæ æmulum magis accedebat: Pustulæ quoque minutissimæ grandæsciebant, saltem quantum ea species patereretur: Pustulæ etiam quæ aliter nigre comparuissent, hic materiam quandam flavam & colorem flavum referentem eructabant. Facies deinceps, pro nigra, colore flavo saturato ubique tincta conspiciabatur; Celerius maturesciebant, atque tempore alia omnia diei unius aut alterius spatio, citius percurrerant. Hæc autem accidebant omnia, si liquorem nempe laudatum liberalius haurirent: Quapropter, quoties ægrum copiam subjugandis symptomatibus debitam respuere animadverterem, spiritum istum, vel syrupum, aliquo in cochleari permixtum, vel aquæ destillatæ cum syrupo junctæ additum, subinde ingressi quo pensaretur scilicet liquoris parcius usus.

Varia hujus medicamenti commoda recensui, incommodi ne minimum quidem ex eo natum hæcenus potui deprehendere: Licet enim salivatio die undecimo decimove fere ab eo sistatur, cujus vicem per id temporis dejectiones aliquot subire solent; tamen ab his minus ægro erit periculi, quam ab ista fuit; Quandoquidem, quod plus semel diximus, qui Variolis *Confluentibus* laborant; eo præcipue urgentur discrimine, quod saliva his diebus viscidior reddita fauces præcludat, cui quidem symptomati hoc in casu diarrhœa succurrit, quæ vel sponte sua desinet, vel saltem, nullum amplius a Variolis periculum est, lacte & aqua mistis, & Narcotico assumptis facile compescetur.

Ægro interim in lecto jacenti, inclusis quoque brachiis, stragula præter solita adjici non patiebar; concessi etiam, ut ab hac in illam lecti partem se pro arbitrio transferret, ad sudores arcendos, in quos proclivissimus erat, hoc non obstante remedio. Jusculis interim avenaceis atque hordaceis victitabat, nonnunquam & pomo cocto. Ultimis diebus, si vel langueret æger vel ægotaret stomacho, vini Canarini cochlearia tria quatuorve indulsit. Haustum vero paregoricum jam a quinto sextove die singulis vespertinæ propinandum adulto (infantibus enim eo non erat opus) præscripsi; *Laudani Liquidum* sc. guttas 14. in Aq. fl. Paralyt.

Die decimo quarto ægrum e lecto surgere permisi, vicissim primo sanguinem e brachio educendum curavi, catharticum deinde ad duas vel tres vices exhibui; quibus peractis ægri facies coloratior ac magis vivida conspiciabatur, quam solebat eorum, quos hic morbus ita male multaverat: Adde, quod methodus laudata vix paritur faciem cicatricibus deturpari, quæ ab humoribus calidis æstatisque proveniunt cuticulam rodentibus.

Die Julii 16. 1675. Vir nobilis mihiqæ amicus Dominus *Elliot* Regi a cubiculo, domesticum e suis meæ curæ commisit, fera hac Variolarum *Confluentium Nigrarum* specie propediem laboraturum: Habebat is annos octodecim circiter, temperamento erat admodum sanguineo, & in hunc morbum a nimia computatione recens inciderat: Confluebant pustulæ densiore agmine quam alias vidi unquam, ita ut nulla fere inter eas intercapedo linqueretur, qua distinguere possent. Remedii hujus δρασμωδὲς confusus viribus, venam nullus secui, licet tempus quo accersebar, id liberum faceret; atque etiam fecare debuissim, cum a nimia vini ingurgitatione vitaretur morbus. Post eruptionem finitam, die vid. quinto vel sexto, *Spiritum Vitrioli* in lagenas aliquot cerevisiæ tenui repleas jussi instillari, atque hunc potum ordinarium concessi pro arbitrio fumendum. Die octavo ea sanguinis quantitas e naribus fluxit, ut Nosoconia hoc symptomate territa, me ocys accersendum putaret: Adveniens ego, cum ab immodico sanguinis calore & impetu insultato illud oriri animadverterem, cerevisiam tenuem dicto spiritu imprægnatam uberius adhuc hauriendam imperavi, quo factò hæmorrhagia dicto citius est coercita. Salivatione satis copiosa, faciei

& manuum intumescentiæ, pustularumque augmento rite procedentibus, morbus se satis feliciter expedivit; nisi quod ultimis diebus dejectiones aliquot mucosæ sanguinem æque interpellarent, quæ forte nullum faceffissent negotium, si venam, eo quo diximus nomine, mox accersitus aperuissim. Nihilominus nullo alio præsidio dyfenteriam adoriebar, quam Narcotico illo, quod alias etiam, si hoc symptoma non urfisset, singulis noctibus fuisset assumendum, quo vis ejus retusa erat donec evanescerent pustulæ; posteaque extracta e brachio sanguinis quantitate satis larga, lacteque atque aqua affatim haustis, subito convaleuit.

Eodem fere tempore quidam e meis vicinis Dominus *Clench* duos mihi liberos sanandos tradidit, quatuor annos habebat alter, alter adhuc lectebat, nec dum sextum mensem attigerat. Pustulæ utriusque perpustillæ erant, *Confluxiles* admodum, & ad erysipelatis modum prodiebant, generisque nigri dicti. *Vitrioli Spiritum* utrisque in potu omni instillandum curavi, quem non obstante ætate, junioris præsertim, tenellula, nihilum averfabantur: quin & nullo symptomate graviore affecti convalescere illico. Amicissimus mihi vir, Dominus Doctor *Mapletoft*, utrosque mecum invisens, ætate majorem jam convalescentem reperit, minorem vero in cunis adhuc laborantem.

Animadvertendum est autem, quod, sicuti Variolæ, hujus constitutionis quæ non confluebant, satis erant benignæ, ita neque remediis jam præscripto opus habebant; satis vero erat ista eas methodo tractare, quam generi *Distinctio* jam supra debere docuimus.

Habes jam, lector, quæ de *Variolis* mihi erant dicenda omnia; quæ licet non nemo fortasse parvi penderit pro sæculi genio, scio tamen ego haud parvo mihi labore, cura atque industria, per multos annos continuos ea stetit; neque jam a me fuisse evulganda, nisi vicisset charitas in proximum, & studium aliis benefaciendi, vel pretio existimationis propriæ, quam satis intelligo a subiecti novitate gravandum fore. Neque tamen video, cur aliquem male habeat nova methodus ei morbo medendi (cujus nec apud *Hippocratem* vestigium ullum, nec apud *Galenum* invenitur, nisi quis forte locus difficillima ratiocinatione torqueatur) cum quæ a modernis adaptantur curationes, a magnis illis rei medicæ luminibus non instituræ, æquo jure ab his negliguntur, atque ab illis magnifunt.

Quin a pari ratione nemini mirum debet videri, si quid immutavero in ea methodo, qua expugnandæ sunt istæ febres, quæ ab iis pendent constitutionibus, quæ Variolis epidemicae sunt; Etenim si in prioribus illis mundi sæculis Variolæ nusquam gentium comparuerint, sequitur neque istiusmodi febres uspiam locorum extitisse unquam: Vero autem simillimum est, ne quid dicam audacius, Variolas nondum tunc temporis in rerum natura fuisse repertas: si enim per antiquiora tempora perinde atque nunc dierum hic morbus invaluisset, sagacissimum *Hippocratem*, opinor, is nunquam latuisset, qui cum morborum historias & clarius intellexerit, & descripserit accuratius quam post natorum quispiam, & hujus etiam descriptionem genuinam, atque simplicem pro suo more nobis reliquisset. Quocirca opinari mihi fas sit, morbos certas habere periodos pro occultis illis atque adhuc incomptis alternationibus, quæ ipsius terræ accidunt visceribus, pro varia sc. ejusdem ætate ac duratione: quodque, sicuti alii morbi jam olim extitere, qui vel jam ceciderunt penitus, vel ætate saltem pene confecti exolvere; & rarissime comparent (cujusmodi sunt *Lepra* atque alii fortasse nonnulli) ita qui nunc regnant morbi aliquando demum intercident, novis cedentes speciebus, de quibus nos ne minimum quidem hariolari valeamus. Hæc se ita res habere potest, quicquid de ea videatur nobis βραχυβόιος, qui heri tantum nati sumus, cras forte interituri, neque quas de morbis authores, vel antiquissimi, congeserunt rationes, ævi multo productioris, si cum antiquissima mundi Epocha conferantur.

C A P U T V.

Tussis Epidemicae Anni 1675. cum Pleuritide & Peripneumonia supervenientibus.

Cum tempestas placida ac repens, imo vero æstatis simillima, præter solitum ad postremos usque *Octobris* dies perseveraret, Anno 1675. eam vero mox exciperet alia multrum diversa, frigida scilicet atque humida subito ingruens, *Tussis* ubique numerosiores grassabatur, quam alio quovis, quod meminimus, tempore, nemini fere parcentes, cujusunque is fuerit sive ætaris, sive temperamenti, integras vero simul familias pervadentes. Neque numero tantum erant spectabiles (cum quælibet hyems haud paucas nobis generet) sed etiam ob anceps illud periculum, in quod eos, quos affecerant, per accidens conjiciebant. Cum enim *Constitutio*, & jam, & per Autumnum omnem modo elapsam, in producenda febre epidemica supra descripta omnes nervos intenderet, cumque jam nullus existeret morbus alius epidemicus, cujus contranifu hujus vires aliquantisper possint refringi, tussis istæ febri sternebant viam, atque in eam quam libentissime commigrabant. Interea, quemadmodum tussis constitutioni opitulabatur in febre producenda, ita etiam febris occasionem ex tussi natam arripens, jam pleuram ac pulmones haud aliter invadebat, ac caput invaserat vel septimana illa, quæ hatum tussium exortum fuerat prægressa; Quæ tam improvisa symptomatum mutatio nonnullis, qui minus diligenter adverterant animum, ansam præbuit, febrem hanc pro *Pleuritide Essentiali*, aut *Essentiali Peripneumonia* habendi, licet eadem omnino illa maneret atque fuerat per integram hanc constitutionem. Nunc enim, uti prius semper, cum dolore capitis, dorsi, atque artuum quoslibet aggrediebatur; quæ symptomata omni ubique hujusce constitutionis febri conveniebant. Materia tantum febrilis, cum stipulante tussi in pleuram ac pulmones uberius deponeretur, symptomata dictas partes attinentia excitabat; attamen febris quantum mihi licuit observare, eadem prorsus cum illa fuit, quæ ad eum usque diem fuerat depopulata, quo hæc tussis primum comparebat; quin & remedia quibus promptissime parebat, idem plane demonstrabant. Et quantumlibet lateris dolor punctorius, respirandi difficultas, color detracti sanguinis, & reliqua signa pleuritidis familiaria, *Essentialem Pleuresin* subesse innuerent, non aliam tamen medendi methodum postulatit hic morbus, quam quæ febri hujus *Constitutionis* quadrabat, ab illa vero quæ *Vera* pleuritidis conveniebat, abhorrebat admodum, ut ex infra dicendis liquebit. Addo, quod cum Pleuritis, quoties est morbus primarius, eo plerumque anni tempore soleat invadere, quod inter

Ver atque *Ætatem* ambigens, utriusque quasi fibula est, hic morbus alieno prorsus sydere uatus, pro symptomate tantum febris, quæ isti anno propria fuit, ducendus est, atque accidentalis tussis sobole.

* Ut ad eam methodum rite procedam, quam huius anni tussibus, tum etiam istis quæ aliis contingunt, (modo ab iisdem causis nascantur) deberi monuit experientia, animadvertendum est, effluvia ista, quæ a sanguinis massa per insensibilem transpirationem ablegari solent, a frigore cutis spiracula subito contrahente introverti, & in pulmones deponi, quos irritando, tussim mox excitant. Cunque hoc pacto detineantur calidæ istæ & recrementitiæ sanguinis exhalationes, quo minus per cutis poros exeant, febris in sanguinis massa facile accenditur; ubi scilicet vel tanta est halituum copia, ut pulmones iis eliminandis haud sufficiant, vel calore adventitio sive remedium, sive regiminis iusto calidiorum quasi adjecto oleo ignis augetur, & qui in febriam jam plus fatiserat proclivis, in eandem præceps agitur. Verum enim vero, qualiscunque fuerit febris *Stationaria*, quæ illum annum funestat, atque per id temporis dominatur, nova hæc febris statim in ejus nomen ac familiam adoptatur, eiusdem ubique genio obsequens, licet symptomata quædam adhuc retineat a tussi, quam habuit parentem, pendencia; ac proinde satis constat in tussi qualibet ex hac *propagata* nata, non tantum ipsi morbo, sed & febri, quæ tussi huic paratissima accedit, occurrendum esse.

Hac innixus basi, iis qui meam implorant opem hoc modo succurrere conabar. Si tussis nondum febriam, atque alia symptomata, quæ ut plurimum se adiungere solerediximus, accesserant, satis esse arbitrabar, ægrum a carnibus & liquoribus spirituosis quibuscunque arcere, hortabar item ut exercitiis uteretur moderatis, & frueretur aura liberiore, pitisanam pectoralem refrigerantem subinde hauriens. Sufficiebant nimirum paucula hæc & ad tussim perdomandam, & febriam, aliaque symptomata quæ illam comitari solebant, præveniendæ. Sicut enim abstinencia a carnibus, & liquoribus spirituosis, tum etiam refrigerantium usu ita contemperabatur sanguis, ut impressioni febrili ineptior esset; ita etiam exercitii operis fervida illa sanguinis effluvia, quæ, quoties corporis pori a repentino frigore occluderentur, intro acta tussim excitabant, via sibi naturali ac genuina exhalabant opportunius, & cum bonis ægri rebus diffilabantur.

Tussim quod spectabat sedandam, haud vacabat periculo Narcoticis atque Anodynis illam aggredi; nec minus periclitabatur, si quis liquoribus spirituosis calidisque medicamentis idem moliretur, cum utroque modo inviscata, atque indurata tussis materia, halitus isti, qui a sanguine placide ac sensim discedentes tussiendo in auras invanescentes, jam exitu negato, in cruoris massa præcludunt febriam ibidem ciebant. Atque hoc sæpenumero non paucis e vulgo inconfultioribus pessime cessit, qui cum spiritu vini ustulato aliisque calidis liquoribus tussi obicem ponere niterentur, affectus pleuriticos & peripneumonicos invitabant, atque insana hac sapientia morbum sua natura levissimum & facile sanabilem, in periculosum ac sæpe lethalem transformabant: Nec minus hallucinabantur (licet magis cum ratione insanire viderentur) qui provocatis sudoribus morbi causam exterminare volebant: Quamvis enim non diffiteamur, sudores sponte prorumpentes haud raro præ cæteris quibuscunque præsidis causam morbificam expellere, liquet tamen, nos, dum in iis extorquendis sumus, sanguinem incendere, & quem servare volumus ægrum letho dare posse.

Quandoque vero, non tantum ubi minus rite tractaretur morbus, quo scilicet supra descripsimus modo, sed etiam nonnunquam sua sponte (maxime in delicatioribus ac tenellulis) nunc statim ab initio, nunc post diem unum aut alterum, tussi superveniebat calor ac frigoris vicissitudo quædam, capitis, dorsi, atque artuum dolor, ad sudores nonnunquam propensio, noctu maxime (quæ omnia pariter symptomata febriam huius *Constitutionis* plerumque sequebantur) quibus sæpe adijungebatur lateris dolor, nonnunquam etiam pulmonum quasi constrictio coarctatioque, unde difficulter respirabat æger, inhibebatur tussis, excitabatur febris vehementior.

Febri, & pessimis ejus symptomatibus rectissime, (quantum accurate facta observatione mihi constitit) occurrebatur venæ sectione in brachio, & epispastico nuchæ applicato; clystere item quotidie injiciendo. Ægrum interim monebam, ut singulis diebus ad horas aliquot lecto absisteret, abstineret a carnibus, nunc cerevisiam tenuem, nunc lac aquæ permixtum, nunc pitisanam aliquam refrigerantem ac lenientem forberet. Elapso jam biduo triduoque, si nondum minueretur dolor lateris, sed adhuc vehementer urgeret, sanguinem secundo detraxi, & ut in usu enematum persisteret adhuc, suasi. Enemata autem quod attinet, diligenter advertendum est (tam in hac, quam in aliis febribus) ea, jam fractis morbi viribus, & retusa acie, non diu & continuo repetenda esse, maxime in fœminis passioni hysterice obnoxiiis, aut vis hypochondriacis; cum talium sanguis atque humores *εὐμεταβλητοί* sint, ac nullo fere negotio exagitantur atque æstuent, unde perturbatur corporis œconomia, & symptomata febrilia etiam ultra solidam periodum egros discruciant.

Sed ut ad rem revertamur, dum hoc pacto spatium morbo concederemus, quo sanguis calidas illas particulas, quæ in pleuram ac pulmones impegerant, sensim excuteret, symptomata universa placide solebant evanescere; cum qui morbum ferocius atque hostili manu aggrediebantur, ingenti remedium molimine bellum inferentes, vel suos ægros amitterent, vel saltem phlebotomia sæpius repetita quam vel postulabat morbi genius, vel etiam tuto ferebat; eorundem vitam redimere cogerentur. Cum enim in vera pleuritide venæ sectio repetita omnem numerum absolvat, solaque ad curationem sufficiat, (modo non obstiterint medicamenta & regimina calidiora, quæ contra militant) ex adverso in hoc symptomate satis erat semel, vel ut plurimum bis veniam secasse, modo ægro concederetur ut e lecto exurgeret, & potu refrigeranti uteretur. Nulla autem cogebat necessitas, si bene observaverim, sanguinem sæpius educere, nisi ubi a calore foris accedente admodum intenderetur dictum symptomata; neque etiam in hoc casu periculo id omnino vacabat.

Hanc jam nactus ansam, paucula de eodica quod omnium ore tritissimum est, *Pleuresin* scilicet quandoque ita *Malignam* reperiri, ut per eos annos phlebotomiam ferre nesciat, saltem toties repetitam, quoties hic morbus communiter deposcit. Censeo quidem *Pleu-*

resin veram atque *Essentialem*, quæ, ut posthac dicetur, omnibus annorum omnium constitutionibus indifferenter infesta, omnibus indifferenter annis venæ sectionem pariter repetitam indicare; aliquando tamen accidere ut febris ejus anni proprie epidemica, a repentina aliqua manifestarum aeris qualitatum alteratione, materiam morbificam in pleuram aut pulmones libenter deponat, ipsaque febris nihilominus eadem prorsus maneat. In hoc casu, etsi venæ sectio possit concedi, ut huic symptomati, si multum sæviat, occurratur; generaliter tamen si loquamur, non multo plus sanguis symptomatis ratione educendus est, quam febris nomine debuerat educi, a qua pendet istud symptoma: Namque si hæc ejus sit indolis; ut a repetita venæ sectione non abhorreat, potest ea repeti in pleuritide quæ ejusdem symptoma est; at vero si febris repetitam venæ sectionem respuat, neque juvabit ista, imo & nocebit in pleuritide, quæ cum febre statim cadetve. Hoc autem modo se res habuit, me saltem iudice, in *Pleuritide symptomatica*, quæ febriam comitatur hoc in loco grassantem, quo tempore subingrediebantur *Tusses*, hac nimirum hyeme 1675. Atque hoc quidem mihi ideo reticendum non erat, quod existimem dubio illum tramite errare, atque incerto duci filo, qui in febrium curatione non continenter ob oculos habet anni *Constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo epidemice producendo favet, ceterisque morbis omnibus una concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis.

Novembri anni præfati, Dominum *Thomam Windham*, Domini *Francisci Windham* Equitis filium natu maximum, hac febre laborantem tractabam. Querebatur is de lateris dolore, aliisque symptomatibus, de quibus cæteri hoc morbo affecti. Venam haud plus semel tundendam curavi, epispasticum nuchæ apponi, enemata quotidie injici; nunc pitisanas atque emulsionem refrigerantes, nunc lac aquæ immixtum, nunc cerevisiam tenuem propinavi, suasi ut lecto absisteret quotidie ad horas pauculas, qua methodo intra paucos dies restitutus est, & celebrata catharsi omnino convaleuit.

Norandum autem est, quod tametsi symptomata hæc, quæ tussi supervenire solent, ea prope essent, quæ hanc hyemem funestabant, attamen tussis ipsa sine illis sola invadens, ea tempestate magis dominabatur. Hujus autem medela neque venæ sectionem, neque clysteres sibi vindicabat, modo febris a regimine vel medicamentis calidioribus non excitaretur. Cum satis erat ad eam compescendam ægro liberioris aeris foras usum concedere, & carnis esum, ut & vini ac id genus liquores spirituosis, qui febri ansam præbeant, omnino interdiceret. Potro *Tabellas* sequentes sæpiusculæ devorandas imperavi; quæ quidem ad tusses a frigore susceptas coercendas omnibus aliis, quæ mihi adhuc innotescunt, longe præcellunt. *℞. Sacchar. Cand. ℥iij. Coq. f. q. aq. communis usque dum adhærescat extremis digitorum, tum adde pulv. Liquirit. Enul. Campan. sem. anisi & sem. Angelic. an. 3℔. pulv. Irid. & flor. Sulphur. an. ʒij. ol. chym. sem. anisi ʒj. f. s. a. tabellæ, quas secum continuo portet, ac earum unam frequenter assumat.*

At priusquam his quæ de morbis epidemicis disserui, ultimam imponam manum, objectioni, quam contra eorum nonnulla adferendam prævideo, occurrendum mihi est, quod nempe non satis cum *malignitate* ista pugnare videantur, quæ pluribus horum morborum adhæret. Non is sum, qui receptam a viris doctissimis sive hujus sæculi, sive antiquioribus, de malignitate opinionem convellere aut possim, aut etiam velim, cum ista indicia plus satis se prodant manifestis, in epidemicis plerisque. Liceat mihi tantum quæ de ejus natura sentio in medium proferre, quo hæc nostra praxis minus a ratione abhorreere videatur. Ipse enim cum eruditissimo *Scaligero*,

Non mihi, sed rationi, aut quæ ratio esse videtur, Milito; securus quod mordicus hic tenet, aut hic.

Censeo itaque ego *malignitatem* eam omnem, quæ epidemicis competit, (qualiscunque tandem fuerit specifica ejus natura) particulis calidissimis ac spirituosissimis, humorum in humano corpore contentorum naturæ plus minusve adversantibus, consistere ac terminari, quia solæ istiusmodi particulæ humores ita subito alterare valent, atque in morbis malignis fieri videmus. Censeo item calidas illas & spirituosas particulas assimilando maxime agere: Cum ex naturæ lege quodlibet principium activum sui simile procreare satagat, & quæcunque ei obstitunt ad propriam indolem inflectere atque accommodare. Ita ignis ignem generat, & maligno infectus morbo socium inficit, spirituum sc. emissionem, qui humores mox inficiendos sibi assimilant, & in naturam suam perducunt, trahuntve.

His præmissis, omnino sequitur nihil esse prius, quam ut dictæ particulæ sudore eliminentur; hoc enim modo morbus confestim funditus extirparetur: At hic reclamant experientia, docetque hoc in omni *malignitatis* specie fieri non posse. Quamvis enim in ipsa *Peste* particulæ pestilenciales, tum quod admodum fuerint subtiles, tum etiam quod sanguinis partibus maxime spirituosas insideant, dissipabiles sint, atque excitato sudore non interruptendo ejici queant; in aliis tamen febribus, ubi particulæ assimilantes non in eam subtilitatem sunt evectæ, atque etiam humoribus magis crassis incorporantur, minera illa maligna non tantum sudoribus diffilari non potest, sed sæpenumero etiam augetur, quibus isti sollicitantur, diaphoreticis. Quanto enim magis usu calefacientium æquantur particulæ hæc calidæ ac spirituosæ, tanto magis intenditur ea quam habent assimilandi facultas, quantoque etiam magis excalescunt humores isti, in quos agunt, tanto libentius in assimilantium castra migrant, eorundem impressionibus cedentes. Cum ex adverso ratio dictare videatur, medicamenta illa quæ contrariæ sunt naturæ, non tantum particularum calidarum atque acrium vim inhibere, sed etiam humores condensare obfirmareque, quo spirituum morbificorum fortius sustineant impetum, vel etiam frangant. Atque appellanda hic mihi venit experientia, qua magistra edoctus sum & purpureas febrium maculas, & Variolarum pustulas nigras, eo promptius sumpsisse incrementum, quo magis calefieret æger, easdem vero pro ratione moderationis regiminis, quod iis omnino debetur, decrescere solere ac minui.

Jam si quis me roget, qui fiat ut, cum *malignitas* in ejusmodi particulis calidis ac spirituosis consistat, haud raro ita parca febris signa conspiciantur, etiam in morbis summe malignis; responderem percontanti, primo in præcipua illa, & maxime insigni malignitatis instantia, ipsa *Peste*, abunde constat particulas *νοσηράς* ita supra modum subtiles esse atque aculeatas, (præsertim ubi primum incipit grassari) ut auræ ad instar sanguinem pervadant, ac syderatis quasi ejus spiritibus, ne in ebullitionem quidem illum attollant, unde æger sine febre perit.

At vero in minori isto malignitatis gradu, qui in aliis epidemicis reperitur, symptomata febrilia ita parum conspicua redduntur, nonnunquam a confusione in sanguine, atque humoribus excitata a particulis inimicis eorum in gremio conclusis; unde natura quasi oppressa non potis est symptomata illa magis regularia exercere, quæ morbo competunt, at anomala sunt. *φαινόμενα*, fere omnia ob *οἰκονομίαν* penitus everfam, dirutamque, quo in casu deprimitur sæpe febris, quæ, obtinente genuino naturæ ductu, omnino vigeret. Quandoque etiam pauciora se ostendunt febris indicia, quam pro morbi genio, ob metastasin, mineræ malignæ, vel in genus nervosum factam, vel in alias partes corporis, vel etiam humores extra sanguinis potioria, dumurgeret adhuc materia morbum committens.

Quicquid vero id fuerit, ne hariolari quidem possum, quænam alia medendi inethodus malignitati qualicunque adhibenda sit, præter eam, quæ epidemico, cui inhæret, debetur: Ita ut sive epidemicus de eorum numero sit, qui primo concoctionem materiæ febrilis, mox ejusdem rite dispositæ eliminationem per sudores sibi vendicant; vel eorum, qui per eruptionem aliquam fugam sibi quærunt; vel etiam eorum, qui ab artis præsidio viam sibi aperiendam præstolantur; in singulis his, inquam, generibus, *Malignitas* morbi comes, ipso cum morbo stabit, cadetque, pari usa fortuna, & pari etiam passu recedens; atque ex consequenti, quæcunque evacuatio febrim in genere competit, eadem & malignitati debetur: quantumlibet evacuationes istæ sibi invicem fuerint contrariæ. *Malignitati* itaque isti, quæ *Febres Autumnales Intermittentes* comitatur, uti & *Febrem Continuum*, quæ ejusdem est indolis, medebitur diaphoresis, quæ concoctionem subsequitur, seu ejus effectum. *Variolarum malignitati* subveniet tempestiva abscessulorum maturatio, atque ita de reliquis: in quibus omnibus, peculiaris *malignitatis* species istis præsertim modis, ac methodo illa optime superatur, quibus libentissime cedunt peculiæres isti morbi, ad quos illa spectat, sive hac methodo procedendum fuerit, sive altera. Hoc mihi distat ratio, nisi pro Junone nubes, atque huic etiam experientia jugiter suffragatur.

CAPUT VI.

Anacephaleosis.

Atque ita demum animadvertimus, spatium illud annorum, quo finiuntur prægressæ observationes, genera *Constitutionum* omnino *Quinque* peperisse; Quinque nimirum peculiæres aeris *Diathefes*, totidem *Epidemicorum* species peculiæres, febrium nominatim, producentes: febrium autem harum prima, quæ iis annis infestabat, quibus *Intermittentes Autumnales* maxime grassabantur, unica mihi videtur, (quantum observatione diligenti, fidaque hætenus assequi potuero) in qua natura ita omnia symptomata moderabatur, ut materiam febrilem debita coctione præparatam certo suo tempore ad exitum disponeret, vel per justam *διαφύσιν*, vel *διὰ πύλον* paulo liberaliorem, (quæ idcirco *Febris Depuratoria* mihi audit). Et proæcto facile adducor, ut credam, præcipuam hanc esse, atque *Primariam Naturæ Febrem*, tum ob regularem illam methodum, qua utitur in promovenda materia morbifica, eademque præfinito tempore digerenda; tum etiam quia hæc febribus aliis quibuslibet frequentior occurrit, cum credibile sit *Febres Intermittentes* epidemice sæpius grassari, quam alios morbos quoscunque, si illis nempe habenda sit fides, qui de earum frequentia in sæculis jam elapsis tot & tanta scripserunt; quicquid demum in causa fuerit quod ita raræ comparuerint, a quo *Pestis* hanc urbem est depopulata: Enim vero *Febris hæc Pestilentialis Inflammatoriis* iis omnibus, quæ post invasere, se ducem præbebat, ac *πρόδρομος*. *Febri* autem isti *Primariæ*, de qua supra, adaptantur, ni fallor, illustria illa, atque necessaria Axiomata, quæ tradiderunt *Hippocrates*, alique Medici antiqui; quorum ope ita est regenda, ut præparetur materia febrilis ad crisin per sudores rite faciendam: neque enim satis video, qui possint accommodari dicti aphorismi subsequenteribus istis febrium speciebus, quæ diversam longe habent indolem; & raro ejusmodi methodo aliqua solvi solent, qua nos adjuti, si ad eam accedamus scilicet, eamque perficiamus, morbos hocce subjugare possumus. Utut vero hæc se res habeat, notatu dignum esse autumo, quod cum febris hæc, quæ ab illa *Constitutione* penderet, qua *Intermittentes* cæteris prædominabantur, (si vel diutius persisteret, vel æger nimis evacuationibus fuerit exhaustus) subinde in *Intermittentium* castra de facili transiret; istæ febres quæ sequentes funestabant annos, etiam si diutissime cruciarent, rarissime tamen *Intermittentes* fierent; indicio satis manifesto eam *Febrem Continuum* atque *Intermittentes* istas, vel natura quadantenus convenire, vel non multum ab invicem abhorreere.

Jam si quis a me percontetur, quo demum pacto *Febris Continua* speciem ex notis in febrium descriptionibus a me traditis queat expiscari, cum plerumque singulæ iis implicentur symptomatibus, quæ omnibus in genere competunt febribus, (cujusmodi sunt calor, sitis, inquietudo, &c.) Huic ego responderem, difficile id quidem esse, at non plane impossibile, modo quis serio, atque adamussim exegerit circumstantias eas omnes, quas in historia præcedenti indigavimus; maxime si in urbe aliqua, aut loco alio hominibus referto, examen instituat. Ponamus enim Medicum ad febre continua laborantem accersiri, id primo habet adminiculi ad judicium rite formandum, quod vel ex observatione propria, vel aliis indicantibus facile resciscat, quinam alii morbi præter hanc febrem, & cujusdem generis, eo locorum epidemice grassantur; quo cognito, non amplius dubitabit cujus generis esse debeat febris ista, quæ huic alteri epidemico regnanti famulatur. Quamvis enim fieri possit ut febris iis tantum se prodatur symptomatibus, quæ omnibus omnino febribus sunt communia, (præsertim si in *αταξίαν* & confusionem agatur e methodo, quæ ab ejus curatione proflus aliena est) alii tamen epidemici characteres naturæ, atque indoli suæ proprios ac peculiæres appetissime agnoscent. Verbi gratia, qui *Variolas* inspexerit, facile conjectabit, (modo ejus morbi historiam probe calleat) vel a die quo primum erumpunt pustulæ, vel ab earum magnitudine, atque colore, &c. ad quodnam *Variolarum* genus species illa particularis fuerit referenda: atque ubi semel cognoverit, quænam sit illa *Variolarum* species, quæ eo anno atque per loca ista increbrescit, satis illi constabit de specie febris cujusvis per id temporis, atque eo locorum grassantis. Et sane si morborum historias ad unguem perdidicissem (quam ego mihi laudem minime arrogo)

Sydenham Opera Medica.

sicuti epidemico quovis conspecto non dubitarem de febris tum regnantis genere pronunciare, licet ne unam viderim quidem; ita *Febris* quælibet conspecta, quisnam ei jungeretur morbus epidemicus, me satis doceret, an *Variole* scilicet, vel *Morbilli*, vel *Dysenteria*, &c. Cum tam peculiare aliquot horum genus, quam febris peculiaris, particularem quamlibet constitutionem jugiter comitetur.

Secundo autem, præter indicia illa, quæ epidemicorum una invadentium consideratio nobis suggeret, & ipsa cujuslibet febris symptomata ad ejusdem speciem dignoscendam, haud obscuram lucem fœnerantur. Quamlibet enim, ut supra innuimus, febres in universum omnes quædam habent symptomata omnibus communia, sunt tamen & certæ aliquæ distinctionis notæ, quas singulis speciebus sigillatim impressit natura; quæ cum subtiliores sint ac magis reconditæ, non nisi a cautissimis, & minutissima quæque pensulatim trutinantibus erui solent, aut investigari. Inter hæc signa distinctio semper existimavi ego, ægri sive sudationem, sive siccitatem in hoc, vel illo morbi tempore, febris speciem præcipue præ cæteris demonstrare, modo illa a statu naturali ac suo, methodo minus congrua non fuerit dejecta. Atque hoc ipsum liquido mihi constabat in febribus omnibus epidemicis, quotquot observationes hæ nostræ hætenus complectuntur. Exempli gratia, iis in febribus, quæ vigeant exolefcente *Intermittentium Autumnalium* prædominio, ægri externa arefcebant, nec vel minima sudoris præsignatio ante materiæ febrilis concoctionem, quæ die decimo quarto plerumque perficiebatur, in conspectum se dabat. Neque etiam cieri hic poterat sudor sine ingenti ægrorum discrimine, qui in phrenesim, aliaque symptomata periculossima mox a coacto sudore præcipitabantur. In *Febri Pestilentiali*, quæ hanc quidem subsecuta est, (*Inflammationum* autem omnium, quæ ab illo tempore invasere, chorum duxit) nulli sudores sponte sua prorumpébant, at a sudorificis excitari poterant, vel primis morbi diebus, atque iis semel obortis æger nullo non symptomate levabatur. Febre proxime succedente, quæ *Variolas* iis annis comitabatur, quibus illæ *Regulares* erant, æger sua sponte effusissimis sudoribus totus dimanavit, vel a morbi initio; at qui istis indulgebat æger, intendebat illico symptomata omnia, haud mitigabat. In binis febribus, quæ duabus *Variolarum Anomalarum* speciebus, atque *Dysenteris* se comites adjungebant, & sudores anomali etiam fuere; at plerumque solis primis diebus exeuntes, licet qui primam febrem comitabatur sudor, quam qui posteriorem, aliquantisper esset copiosior, sed in neutra emolumento fuit ægro, cum non a prævia concoctione, sed a confuso particularum noxiarum motu is eliceretur.

Arduum vero id mihi in primis videtur, novæ febris speciem, vertente primum anni *Constitutione*, indagare, cum necdum specimen ejus aliquod quis oculis usurpaverit, nec dum resciverit, qualesnam demum sint futuri morbi epidemici, quos ut plurimum febris prævertit. Molestum esset singula enumerare, quæ iis annis, de quibus egi, occurrebant; quo liqueret anfas haud obscuras a natura nobis suggeri, quibus adjuti hoc præstare valeamus; ac proinde cognitio hæc a per diligentibus atque accuratissima circumstantiarum omnium observatione necessario penderet. Quantumlibet autem difficile id fuerit, imo si & impossibile plane supponamus, novæ febris, ubi primum ingreditur, speciem certo distinguere; tamen ad curationem quod attinet, Indicatio a *Juvantibus* & *Ledentibus* sumenda, nobis saltem relinquitur; cujus ope viam paulatim prætentantes ægrum in tuto possumus collocare, modo ne plus satis properemus; qua quidem *festinatione* nihil ego quicquam exitiusius esse autumo, nec re ulla alia febricitantium plures vita spoliari. Neque pudet fateri, me non semel in curandis febribus, ubi nondum constaret quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo, & mihi, & ægro consuluisse optime; dum enim morbo invigilarem, quo eum opportunius confodere valerem, febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se typum redegit, ut jam mihi innotesceret, quibus armis esset debellanda. Sed, quod dolendum omnino est, ægrorum quamplurimi, haud satis guarari, quod perinde sit Medici periti quandoque nihil agere, atque alio tempore efficacissima adhibere remedia, probitatis, atque fidei fructum hunc capere nolunt, sed vel negligentia vel ignorantia id imputant; cum Empiricorum insulsius quilibet medicamentis medicamentis adjicere æque novit, ac solet magis, quam Medicorum prudentissimus.

Hæc sunt fere quæ hætenus observavi, saltem quæ ad normam aliquam reduci potuerint, de *Morborum Epidemicorum* speciebus, atque ordine illo quo invasere ab anno 1661. ad finem usque anni 1675. Quo quidem tempore *Variole*, & *Febres Continue* earum comites, quæ ferme a biennio dominatæ sunt, mitiores jam factæ videntur exolefcere. Qui post sequentur morbi, solus novit, qui novit omnia.

SECTIO SEXTA.

CAPUT I.

Febres Intercurrentes.

Observationes annorum, quos jam descripsi, satis arguunt febrium alias *Stationarias* merito audire; ejusmodi febres intelligo, quæ, cum a particulari quadam, ac nondum satis cognita hujus aut alterius anni *Constitutione* pendeant, singulæ suo ordine invalescunt, grassantur admodum, & quasi cæteris dominantur per continuam illam annorum seriem. An dentur etiam aliæ species præter jam dictas: An etiam exacto quodam annorum curriculo, aliæ alias certo ac constanti ordine excipiant, an secus se res habeat, nondum mihi licuit deprehendere. Sunt vero & aliæ *Febres Continue*, quæ licet jam parcius, jam inclementius sæviant & depopulentur, tamen cum *Stationariarum* quibuslibet, ut etiam & secum invicem eodem anno indifferenter commiscuntur, quas idcirco *Intercurrentes* appellandas censeo. Quid tam de illarum ingenio, quam de methodo medendi eisdem adhibenda, hætenus observando didici, in sequentibus tradam. Sunt vero, *Febris Scarlatina*, *Pleuritis*, *Peripneumonia Notha*, *Rheumatismus*, *Febris Erysipelatosa*, *Angina*. Et forte aliæ quædam.

Jam vero cum universos hosce morbos vel adhuc comitetur febris, vel saltem fuerit comitata, donec xonerata in partes, sive has, sive illas,

illas, pro morbi ratione, materia febrili, sibi exitum invenerit; nullus dubito febrem ipsam pro morbo primario habendam, reliquosque affectus a quibus ut plurimum morbi isti nomen mutuuntur, symptomata esse, quæ vel peculiarem *velocitatem* modum, vel partem, in quam ruit morbi vis, præcipue spectant. Verum modo de re conveniat, nullam de nominibus movebo litem; mihi integrum fuerit morbum hoc vel illo nomine designare, pro arbitrio meo.

Animadvertendum est, quod sicuti *Febris Stationaria*, de quibus supra egimus, magis minime epidemice infestant, quod jam diximus, prout annorum constitutio in secreta atque inexplicabili aeris temperie fundata, eisdem favet, ita etiam *Intercurrentes* hæc nonnunquam, licet non ita frequenter atque istæ, epidemice grassantur. Quamvis enim plerumque oriantur ab hac vel illa particulari corporum particularium *anomaliam*, qua sanguis atque humores quoquo modo vitiantur, aliquando tamen originem debent suam mediate quidam causæ alicui generali in aere manifestis qualitatibus hominum corpora ita disponente, ut exinde tales talesve sanguinis atque humorum dyscrasie generentur, quæ *Intercurrentium* ejusmodi *Epidemicarum* causæ fuerint immediatæ. Uti cum gelu acris diu perseveraverit, se in Veris usque pomeria longius extendens, de repente autem calidior tempestas succedat, *Pleuritides Anginae* similesque morbi alii solent invadere, qualiscunque demum fuerit *Constitutio* annorum *Generalis*. Et quoniam hi nonnunquam epidemice grassantur perinde atque alii isti, idcirco ut hos ab illis febribus dispeccam, quæ ad certam annorum seriem determinantur, omnibus indifferenter annis communes *Intercurrentes* appellare libet.

Quanto autem a se invicem intervallo dissideant duo hæc febrium genera, quantum ad causas aere subministratas, quoad alias tamen causas externas, ad procatasticas spectat, sæpenumero conveniunt. Ut enim jam mittamus contagium, quod quidem nonnunquam febrium *Stationariarum* aliquibus anam exporrigit, & crapulam taceamus, qua matre profeminantur tumistæ febres, tum hæc etiam, de quibus jam ago; causa evidens externa febrium quamplurimarum inde pendenda est, quod quis scilicet vel præmaturius vestes abjecerit, vel ab exercitio incallescens se frigori incautius exposuerit: unde poris subito occlusis, retentisque iis halitibus, quibus alias per cutis spiracula patebat exitus, hæc vel illa febris species in sanguine succenditur, prout vel generalis constitutio, quæ tum temporis obtinet, vel particulares humorum dyscrasie in hanc vel illam febri speciem potentius determinaverint. Et sane existimo plures modo jam designato, quam *Peste*, *Gladio*, atque *Fame* simul omnibus perire: Etenim si quis ægrum Medicus de prima morbi occasione paulo minutius interrogaverit (modo ex acutorum istorum numero sit quos supra tractavimus) audiet quasi semper, vel eum vestem aliquam temere deposuisse, cui pridem assueverat, vel corpus motu excalescens subito frigori permisisse, atque ex alterutra harum *procuratorum* incidisse in morbum. Quam ob causam familiares meos semper moneo, ut nullo alio anni tempore quicquam vestium, quibus assuevere, sibi detrahant, nisi mense uno ante *Solstitium Æstivum*: Nec minori cum studio eosdem hortor, ut ab exercitio calefcentes frigus sedulo evitent.

At vero diligenter hic loci notandum est, quod licet morbi isti, qui sub *intercurrentium* titulo jam mihi tractandi veniunt, plerique, si non omnes, *Essentiales* fuerint morbi, sæpenumero tamen affectus quidam, tum eos quoad phænomena referentes, tum eodem etiam insigniti nomine, istis febribus superveniunt quas *Stationarias* appello, & sunt nuda earum *symptomata*: Quo in casu non jam illa methodus adhibenda est, quæ iis debetur, quoties morbi sunt *essentiales*, aut ista potius quam sibi postulat febris, cujus nunc sunt *symptomata*, ad quorum quidem curationem ea leviter tantum inflectenda est: In genere autem ad anni febri seriem attendendum est, investigandumque quo illa pacto facillime expugnari possit, venæ sectione, an sudoribus, vel alia methodo qualibet. Hoc si suspede habeatur, cum ingenti ægrorum discrimine persæpe errabimus. Si quis objecerit hos ipsos affectus, quos ego *essentiales* voco, & de quibus jam ago, revera *symptomata* tantum esse, respondeo, *symptomata* ea forte esse respectu febris ad quam proprie spectant, ac *symptomata* sunt saltem febrium, quæ illa semper ac necessario produciunt. V. gr. in *Pleuritide* *essentiale* febris ejus est indolis, ut semper materiam morificam in pleuram deponat; in *Angina* *essentiale* ejus indolis est, ut eadem ad fauces semper amandet, atque ita se res habet in cæteris: Cum ubi affectuum memoratorum utervis febris superveniat, quæ ad hanc illamve annorum constitutionem spectat, atque ab ea pendet, idem per accidens tantum, neutiquam vero necessario produciuntur. Quo nomine haud parum a se invicem determinantur.

Jam autem, ut affectus *Essentiales* mihi dicto ab iis qui *Symptomatici* tantum sunt, rite distinguamus, multum confert nobiscum perpensis, quod qualia sint *symptomata* quæ invasionem febris hujus alteriusve *Stationariae* comitantur, talia omnino erunt *symptomata* quæ insultum sive *Pleuritidis*, sive *Anginae* sequuntur, quoties ejusmodi febris accidentia sunt tantum. Quod quidem cernere erat in *Pleuritide* *symptomata* prædicta, quæ febri per hyemem grassanti, anno 1675. superveniebat. Quotquot enim hac laborabant *pleuritide*, ubi primum corripiebantur, capitis, dorsi, & artuum parietebantur dolore; quæ certissima erant & maxime vulgaria febrium earum omnium *symptomata*, quæ & antequam ingrederentur *Pleuritides*, invadebant, atque illis expirantibus adhuc durabant. Cum quoties uterlibet horum *intercurrentium* morbus *Essentialis* est, omnibus indifferenter annis pari modo aggreditur, nihil prorsus habens commune cum febre *Stationaria* per id tempus regnante. At hæc *symptomata* omnia quæ post emergunt magis perspicua sunt, cum non obscurentur ac confundantur ab aliorum *symptomatum*, quæ naturæ sunt diversæ, & ad aliam spectant febrem, admixtione. Præter hæc, Anni tempus, quo *essentiales* *intercurrentes* plerique, non tamen omnes, solent infestare, haud raro subinnuit ad quam classem hujusmodi affectus referendi sint. At vero ad morborum, tum horum, tum aliorum etiam omnium *Diagnosin*, iis demum instructissimus accedet, qui observatione hac diligenti ita intime eorum phænomena rimando perscrutatus fuerit, ut ubi eos inspexerit, genus statim norit distinguere; licet differentiarum characteristicarum aliarum ita sint fortasse subtiles ac delicatæ, ut easdem alteri verbis nequeat exprimere.

Quandoquidem autem variæ hæc febrium species, (quantum quidem assiqui possum ex phænomenis, quæ tum morbos ipsos, tum medendi rationes attinent, sedulo penitatis) peculiari, ac cuilibet

morbo propriæ sanguinis inflammationi ortum debent suum, in eodem refrigerando temperandoque omnis mihi fere curationis vertitur cardo: Methodo interim pro morbi genio variata, & cui, experientia jugiter suffragante, ea species libentissime concedit, materię morificæ eliminandæ ubique satago. Et profecto in febrium quarumlibet curatione omne punctum tulerit, qua porta excludenda venit materia febrilis, quicerto norit; venæ sectione v. gr. sudoribus, catharsi, aut si qua est alia magis appositæ.

C A P U T II.

Febris Scarlatina.

Scarlatina Febris, licet nullo non tempore possit incidere, ut plurimum tamen exeunte æstivo se prodit, quo quidem integras familias, infantes vero præ cæteris infestat. Rigent, horrentque sub initio, ut in aliis febribus, qui hac afficiuntur, neque vehementer admodum ægrotant; postea cutis universa maculis parvis rubris interstringitur, crebrioribus certe & multo latioribus, magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt illæ quæ *Morbillos* constituunt. Ad duos tresve dies persistunt hæc maculæ, quibus demum evanescentibus, decedenteque subiecta cuticula, restant furfuraceæ quædam squamulæ ad instar farinæ corpori inspersæ, quæ ad secundam aut tertiam vicem se produnt, conduntque vicissim.

* Cum hic morbus nihil aliud mihi videatur, quam mediocris sanguinis effervescentia a prægressæ Æstatis calore, aut alio aliquo modo excitata, nihil quicquam molior, quo minus sanguis sibi despumando vacet, & materię peccanti, quæ satis prompte adjungitur, per cutis poros ablegandæ. Quamobrem tum hinc & a venæ sectione, & ab Enematum usu mihi temperans (quibus remediorum formis facta evulsione particulas sanguini infestas cum eodem intimius permisceri, & motum naturæ magis congruum sufflaminari autumo) tum ex altera parte ab exhibendis Cardiacis, quorum æstu impetuosis forte exagitabitur sanguis, quam prorogata & leni illa separatione in qua jam totus est; (Quid quod & vehementior febris hoc fomite possit accendi?) satis habeo ut æger a carnibus insolidum abstineat, & a liquoribus spirituosis quibuscunque, tum ut neque usque foras prodeat, neque se perpetim lecto affingat. Cute jam penitus desquamata, & cessantibus symptomatibus, e re fore existimo, ut purgetur æger leni aliquo medicamento, ætati atque viribus accommodo. Simpliciter hac & naturali plane methodo hoc morbi nomen, (vix enim altius assurgit,) sine molestia, aut periculo quovis facillime abigitur. Cum econtra si plus negotii ægris facessamus, vel lectulis continenter incarcerando, vel Cardiacis aliisque remediis supervacaneis nimis docte, & (ut vulgo videtur) secundum artem supra modum ingeltis; morbus statim intenditur, & æger non raro nulla alia de causa, quam nimia Medici diligentia ad plures migrat.

Veruntamen hoc animadvertendum volo. Si *Convulsiones Epilepticae* vel etiam *Coma*, huic morbo sub initium eruptionis supervenerint (quod quandoque accidit in pueris ac junioribus hoc morbo laborantibus) omnino oportet, ut *Epispasticum* amplum ac forte posteriori cervici applicetur; atque porro ut *Paregoricum* e Syrupo de Meconio statim exhibeatur, repetendum singulis noctibus usque dum convaluerit; imperando interim ut æger bibat pro potu ordinario lac cum triplo aquæ coctum, & a carnis esu abstineat.

C A P U T III.

Pleuritis.

Hic morbus, quo nec alius frequentior, nullo non tempore infestat, potissimum vero anno inter Ver & Æstatem ambigente. Nam per id temporis sanguis a nova solis vicinia calefactus in effervescentias & inordinatos motus effrænatus ruit. Temperamento sanguineo prædictos præ reliquis aggreditur, sæpe etiam rusticos, & duro jam fractos membra labore. A rigore plerumque atque horrore orditur, quos excipiunt calor, sitis, inquietudo, & cætera febrium *symptomata* plus satis nota. Elapsis pauculis horis, (licet aliquando multo serius ingruat symptoma hoc) æger vehementi dolore, eoque punctorio, in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc ex adverso versus anteriora pectoris se propagat. Tussi etiam crebra affligitur, quæ magnum adfert cruciatum, a partium inflammatarum contentione ortum, unde spiritum subinde reprimat, ut prima tussendi molimina coerceat. Quæ singulis vicibus *Anacatharsi* rejicitur materia, sub initio morbi pauca & tenuis conspicitur, & sæpe sanguinis particulas intermisit; sed procedente morbo copiosior est, & magis concocta sanguine etiamnum permixta. Febris interea pari passu incedit, quin & vires sumit a symptomatibus illis, quæ ab ipsa nascuntur. Atque dicta febris cum funesto comitatu omni, (Tussi scilicet, sputo sanguinis, dolore, &c.) pro ratione liberioris materię morificæ expectorationis, sensim minuitur. At materia hunc morbum committens, non semper, eodem procedente, concoctionem expectorationi debitam attingit: fit enim non raro, ut materia paucula adhuc & tenuis, sicut in principio morbi, tussiendo educatur, & consequenter febris cum reliquis symptomatibus ne hilum remittat, donec ægrum jugulaverit. Æger interea nunc alvo est nimis adstricta, nunc soluta nimis, dejectionibus crebris & liquidissimis. Est ubi morbo admodum invalescente, & venæ sectione non celebrata, æger ne tussire quidem valeat; sed immani dyspnœa laborans, tantum non suffocetur inflammationis vi; quæ tanta aliquando reperitur, ut pectus ne ad spatium quidem respirationi debitum sine exquisitissimo dolore queat expandi. Est etiam ubi post ingentem inflammationem, & omissam phlebotomiam, quæ nascente morbo fuerat imperanda, mox ad apostema res redit, pure in thoracis cavitatem subinde depleto; quo in casu, quamvis primaria febris vel omnino cessat, vel minus saltem urget, attamen in vado non est æger, sed *Empyemate*, atque *Febre Hæctica* succedentibus, miser *Tabe* extinguitur.

Jam vero licet *Pleuritis* propriæ illi atque specificæ sanguinis inflammationi, quæ eam, quando affectus primarius existit, producere solet, originem suam debeat, per accidens tamen aliis febribus quan-

quandoque supervenit, cujusunque demum generis ea sint, ex præcipatione scilicet materię febrilis in pleuram, vel musculos intercostales. Atque illud quidem in ipso fere febris initio accidit, cruda adhuc existente materia febrili, nondumque per idoneam ebullitionem subacta, adeoque nec ad separationem debitam per loca magis conferentia præparata. Hoc autem incommodi sæpissime ex intempestivo, ac præpostero calidorum medicamentorum usu insertur, qualia a nobilibus quibusdam sæminis exhiberi solent; quarum interim benevolentia, charitasque multo melius in pascendis pauperibus, quam in iisdem medicandis, collocaretur. Atque illæ quidem eo consilio (si tamen ullo utantur) id faciunt, ut in primo statim febris insultu provocetur sudor; parum cogitantes, quam inconsulto atque infelicitate idem tentent. Natura enim hoc pacto, turbata, humores adhuc crudos existentes expellere, qua data porta, cogitur; atque adeo nunc in cerebri meninges impetu fertur materia febrilis, indeque *Phrenitis* nascitur; nunc ad membranam costas succingentem idem malum appellit, ex quo *Pleuritis* oboriri solet; præsertim ubi ægrorum ætas ac temperamentum, annique tempestas inter Ver atque Æstatem ambigens, sua etiam symbola ad hanc rem contulerint; Certe enim tempestate illa febres in Pleuritidem transire proclives sunt.

Pleuritidem autem ejusmodi quam diximus præcipationi ortum suum debere, evacuati per venæ sectionem cruoris color subindicare videtur. Nimirum sanguis (saltem ille qui post primam vicem extrahitur) ubi refrixerit, sevi liquati præ se fert speciem ad crassitatem satis conspicuam, ac superficiem habet veri puris æmulam, & tamen ab eo longe diversam, utpote quæ fibris, instar reliqui sanguinis, arte contextitur, nec ad modum puris defluit, quin a reliquo divulsa discolor illa pars, formam cuticulæ tenacis, & fibris refertæ exhibet; & fortasse nihil aliud est quam fibræ sanguinæ, quæ rubicundo ac naturali suo integumento per præcipationem exutæ, ambientis aeris frigore in membranam hujusmodi subalbidam concrevere. At vero (ut id obiter attingam) animadvertendum est, quod si sanguis e secta vena non recto flumine versus Horizontem profiliat, sed per cutim repens perpendiculariter dimanet, utut celeri se proripiat gradu, sæpe tamen ad dictum colorem non accedit, cujus ego me causam nescire fateor: Neque æger ab istiusmodi sanguinis missione perinde levatur, ac si modo primum descripto fluat: Quinimo cum hoc ipso modo extrahitur, sive orificium angustius, sive quid aliud obstiterit, quo minus pleniori exeat gurgite, neque hic sanguis Pleuriticorum sanguinem colore æmulatur, neque æger par exinde commodum capit. Observavi etiam, quod si sanguis recens extractus, quocumque demum modo fluxerit, immisso digito agitur, superficie rubenti, ac florida, ut in aliis morbis quibuscumque, spectabitur.

Utut vero sanguis se habet, morbus hic tametsi insamis, & pleurisque aliis snapte natura periculosior, tamen si perite tractetur, facile vincitur; & quidem non minus certo, & constanter, quam alii Medicorum conatus ad homines ab orci faucibus liberandos, morboque averruncandos, perducere ad exitum felicem solent.

Variis hujusce morbi Phænomenis diligenter perpenfis, nihil aliud illum esse arbitror, quam febrim a propria, & peculiari sanguinis inflammatione ortam, qua natura materiam peccantem in pleuram deponit, nonnunquam & in pulmones, unde *Peripneumonia* suboritur; quam a priore, gradu tantum, & pro majore ejusdem causæ intentione, extenuque latiori differre autumo.

* Hunc itaque in dicto morbo pellendo mihi scopum propono, ut scilicet sanguinis inflammationem reprimam, & particulas ejusdem accensas, quæ in membranam costas succingentem vim fecerunt, & incendio collabefecerunt omnia, per evacuationes debitas revellam.

Quamobrem in venæ sectione spem ponens maximam, ut primum accersor, sanguinem e brachio lateris affecti ad uncias decem aut circiter mittendum curo. Potionem deinde sequentem statim a venæ sectione primum celebrata sumendum præscribo.

2℥. Aq. Papav. Rhæad. ʒiv. Sal. Prunell. ʒj. Syr. Violar. ʒj. M. F. Haustus. Eodem tempore sequentem emulsionem præscribo.

2℥. Amygd. dulc. N. vij. Sem. Melon. & Pepon. an. ʒss. Sem. Papav. alb. ʒij. contundantur simul in mortario marmoreo, sensim affundendo Aq. Hord. ℔. jss. Aq. Rosar. ʒij. Sacchar. cand. ʒss. M. F. Emulsio; Cap. ʒiv. quarta quaque hora. Pectoralia etiam impero frequenter usurpanda, e. gr.

2℥. Decoct. Pectoral. ℔. ij. Syr. Violar. & Capillor. Ven. an. ʒijss. M. F. Apozema; Cap. ℔ss. ter in die.

2℥. Olei Amygdal. dulc. ʒij. Syr. Violar. & Capill. Ven. an. ʒj. Sacch. cand. ʒss. M. F. s. a. Eclegma, de quo lambat sæpius in die. Oleum etiam Amygd. dulc. per se, vel Oleum Sem. Lini recter extractum magno sæpe cum fructu assumuntur.

Dietam quæ spectat, carnibus omnino interdico, atque insuper earundem decoctionum quilibet limpidissimo. Consulo, ut iusculis vescatur hordeaceis avenaceis, & panatella, & pro potu utatur pristana ex decocto ordei cum rad. acetosæ, liquirit. &c. ac nonnunquam cerevisia liqulata tenui.

Porro, sequens unguentum præscribo. 2℥. Ol. Amygd. dulc. ʒij. Ung. Pomati, & Dialtheæ an. ʒj. M. F. Linimentum, quo inungatur latus affectum mane & sero, superimponendo folium brassicæ. Jubeo item, ut indictorum remediorum usu persistat per omnem morbi decursum.

Eodem ipso die, quo primum accersor, si dolor vehementer urget, sanguinis eandem quantitatem rursus detrahi præcipio, vel nihilo minus die sequenti, ut etiam tertio die; atque hoc modo ad quartam usque vicem, continuis quatuor diebus, (nisi prius æger convalescerit) venæ sectionem repeto, ubi scilicet dolor, atque alia symptomata admodum sæviunt: At vero, si vel morbus remissior, & minoris periculi, patiatur, ut lentiori pede progrediar, vel etiam dejectæ ægri vires non facile ferant venæ sectionem post tam brevem intervallo repetitam; Phlebotomiam jam bis celebratam non deinceps repeto, nisi interjecto die uno aut altero inter singulas vices. Qua quidem in re normam mihi statuo contra indicantia; hinc nempe morbi violentiam, inde vero imminutas, fractasque ægri vires ad invicem trutinatas. Et quanquam in curandis morbis integrum mihi esse volo, ut plus, minusve sanguinis pro rei ratione demendum præcipiam, raro tamen observavi *Pleuresin* confirmatam in adultis minori quam 40. circiter unciarum sanguinis impensa sanatam: licet in pueris semel tantum aut bis secuisse venam ut plurimum suffecerit. Neque, quæ nonnunquam supervenit, *Diarrhœa*, repetendis jam dictis ve-

Sydenham Opera Medica.

* Curatio.

næ sectionibus obicem ponit, quæ quidem ipsa hac methodo brevi sistetur, etiam non adhibitis medicamentis restringentibus.

Enemata vel in solidum omitto, vel maxima, qua fieri potest, inter repetitas venæ sectiones intercapedine curo injicienda, eaque non nisi simplicissima illa e saccharo in lacte soluto.

Durante morbo id ago, ne æger nimis exasuet, ac proinde liberum illi facio, ut lecto quotidie eximatur, idque ad horas aliquot, prout vires suaserint; quod quidem tanti est in hoc morbi genere, ut si æger lecto jugiter affigatur, neque hæc tam larga sanguinis evacuatio, neque remedia alia utcumque refrigerantia, ad dicta symptomata perdomanda vel minimum aliquando proficiant.

Mox ab ultima venæ sectione, nisi forte prius id contingat, symptomata omnia mitescent, & æger (qui per aliquot adhuc dies, & a liquoribus spirituosus quibuscumque, & a crassioribus cibis arcendus est) pristinas vires non ita diu post resumet: quo quidem tempore non abs re erit, ut alvus tenuiori aliquo Cathartico sollicitetur.

Jam vero si quem moveat, quod huic viæ insistentes *Expectorationes* vix quidem attingamus, nedum, quibus illa rationibus per varia morbi tempora sit promovenda, operosius differamus; sciat ille hæc non per incuriam nobis excidisse, sed dedita opera, diuque satis cogitata, neglecta tandem fuisse & præterita: Cum semper existimaverim in summo discrimine versari illos, qui morbum hunc expectorationi eliminandum committerent. Nam ut tardium hujus methodi, qua natura materię morbosicæ ejiciendæ satagit, omittamus, nimum periculosæ insuper res est aleæ, cum non raro eveniat, parte aliqua materię jam concocta, forte etiam per *ἀνακτάσειν* rejecta, reliquam adhuc crudam manere, idque successive, præstantissimis quibusque remediis maturantibus, expectorantibusque incassum usurpatis, cum expectoratio nunc quidem satis auspiciato procedat, nunc penitus supprimatur; ægro interim usquequaque periclitante, atque pro meo in expectorationem imperio (quod sane nullum prorsus est) sive vivis, sive etiam mortuis adjudicando: Cum e diverso, mediante venæ sectione, morbosica materia penes meum sit arbitrium, & orificium a Phlebotomo incisum tracheæ vices subire cogatur. Quinimo constanter assero, huncce morbum, qui, si juxta præcepta a nobis damnata tractetur, inter patentissimas orci januas merito recensetur, æque certa ac tuta methodo jam a me præscripta (ut de brevissimo quo jam profigatur tempore nihil jam dicam) ac alium quemlibet morbum debellari. Nec dum mihi innotuit vel minimum damni a tam larga sanguinis (ut imperitis videri potest) detractioe cuiquam fuisse illatum.

Sæpe quidem aggressus sum in tractando hoc affectu, *Senectus* rationem aliquam stabilire, quæ citra ingentem hanc sanguinis jacturam subsisteret: nempe vel humorem resolvendo, vel expectorationis promotione illum evacuando: Sed nondum ea fors mihi contigit, ut huic ipsi, supra memoratæ praxi, parem aliquam reperire potuerim, cujus beneficio (non obstante tristi illa apud Hippocratem de *Pleuritide sicca*, prognosi) ægrum etiam non moratus expectorationem ab insultu morbi vindico; per ipsum sectæ venæ orificium, & Pleuritidi fugam parans, & sanitati reditum.

Quandoquidem vero hujus morbi curatio in repetita venæ sectione fere tota stat, quæ tamen ab imperitis Chirurgis, & nescio quibus Medicastis in locis ab oppidis populosioribus longe diffitis celebrata, miseros a *punctura Tendinum* in artus amittendi, atque adeo in vitæ magnum discrimen sæpissime conjicit; non e re fore duxi, rationem huic malo succurrendi, si forte fortuna impingatur, hic subnectere. Qui vero punctura hujusmodi plestuntur, dolorem non statim sentiunt, sed duodecim horis post Phlebotomiam se eodem affici conqueruntur, non tam in orificio nuper facto, quam in partibus ad axillam tendentibus, ubi tandem dolor se figit, & tunc maxime percipitur, cum brachium extenditur; attamen læsa pars tumore admodum insigni non afficitur, eodem avellanæ magnitudinem vix superanti, sed ex orificio humor aqueus, vel ichor quidam jugiter destillat, quod quidem præcipuum puncturæ tendinis diagnosticum est habendum. Ita curatur, ut & propriis oculis ipse observavi.

2℥. Rad. lilior. albor. ʒiv. Coq. ad teneritudinem in lactis vaccini ℔ij. Deinde 2℥. farin. lini, & avenac. an. ʒij. Coquantur farinæ ad Cataplasmatem consistentiam in seq. lactis a radicibus prædictis colati, & radicibus contusis misceantur f. Cataplasma, parti affectæ calidè applicandum mane & vesperi.

C A P U T IV.

Peripneumonia Notha.

H Yeme ingruente, at sæpius sub ejusdem exitum, Vereque adhuc nascente, quotannis emergit febris *Symptomatibus Peripneumonici* haud paucis conspicua. Paulo habitiores, ac crassos ea præcæteris aggreditur; virilem ætatem vel affectuos, vel etiam (quod sæpius accidit) prætergressos, liquoribus spirituosus (vini maxime spiritui) plus æquo addictos. Cum enim in hujusmodi hominibus sanguis humoribus pituitosis, brumæ tempore congestis, fuerit oneratus, atque idem ab ineunte Vere in novum motum cieatur; tussis hanc nata occasionem, mox subingreditur, qua ministra dicti humores pituitosi in pulmones irruunt: quo tempore si forte æger nullo vivens consilio, liquores ejusmodi spirituosos adhuc liberalius hauriat, crassescente jam sere quæ tussim excitabat materia, & ab ea præcluduntur pulmonum aditus, & febris omnem sanguinis massam depascitur. Primo febris insultu nunc incalescit æger, nunc friget: Vertiginosus est, de capitis dolore queritur lancinante, quoties tussis importunius fatigat. Potulenta omnia vomitu rejicit, nunc sine tussi, nunc illa vexatus. Urina turbida cernitur, & rubens intente. Sanguis detractus Pleuriticorum sanguinem refert, anhelus sæpenumero spiritum crebro ac celeriter ducit. Si moneatur ut tussim provocet, haud aliter dolet caput, ac si in partes mox dissiliret (qua loquendi formula ægri ut plurimum utuntur.) Dolet & thorax omnis, vel saltem pulmonum coarctatio adstantium auribus percipitur, quoties tussit æger, pulmone non se satis dilatante, præclusis adeo ab intumescencia, ut videtur, meatibus vitalibus, unde intercepta circulatione, sanguineque quasi præfocato, nulla sere, præsertim in habitioribus, febris indicia sunt; licet hoc accidere etiam post ob materię pituitosæ copiam, qua horum sanguis gravatus in penam ebullitionem nequit assurgere.

* In curanda hac febre id mihi negotii dari sentio, ut sanguinem istum, qui ad pulmonum & suffocationem & incendium facit, Phlebotomia revellam; ipsos pulmones remediis pectoralibus deobstruam atque eventilem; & diætæ refrigerantis ope, totius corporis calorem compescam. Cum vero *hinc* materiæ pituitosæ faburra in venis contenta, pulmonum inflammationi fomitem quotidie subministrans, venæ sectionem sæpe repetitam videretur indicare; *illinc* vero observatio, quam facere potui diligentissima, me doceret Phlebotomiam sæpe repetitam febricitantium iis qui crassiore essent corporis habitu (præsertim ætatis florem prætergressis) pessime cessisse, atque adeo ab ejusmodi repetitione haud minus abstereretur; *Catharsin* ergo celebriorem venæ sectioni succenturiabam, quæ ei satis recte substituitur, in illis qui a largiori & iterata sæpius Phlebotomia abhorrent.

Ad hunc itaque modum progressi, sanguinem e brachio in lecto jacentis extrahendum præcepi, nec passus sum ut eo surgeret ad duas trefve horas; cum omnis sanguinis eductio, quæ universam corporis compagem labefactat quadantenus concutitque, hoc pacto facilius toleretur; ita ut mitius cum ægro agatur, cum in lecto cubanti uncia decem fuerint detractæ, quam si sex septemve tantum amiserit, postquam e cubili surrexerit, die sequenti potionem sequentem mane sumendam propono.

℞. *Cassie extract.* ℥j. *Glycyrrhiz.* ℥ij. *Ficus pingues* N. iii. fol. *Senn.* ℥ij. *Agarici trochiscat.* ℥j. *Coq. f.* q. *Colat.* ℥iv. *dissolve* *Manna* ℥j. *Syr. Ros. solut.* ℥ss. *Mf. f. potio.*

Postridie sanguinem secunda vice mittere soleo, atque interjecto die uno potionem Catharticam modo præscriptam iterum exhibeo, diebus alternis jugiter repetendam, donec omnino convalescat æger. Diebus a purgatione vacuis, *Decocto Pectorali*, *Oleo Amygdal. dulc.* ac id genus aliis, ut utatur consulo.

A carnibus & earum jusculo, maxime vero a liquoribus spirituosius quibuscunque, ægrum interim inhibeo, quorum loco ptisanam ex hordeo & liquiritia, (Cerevisiam item tenuem, si eam efflagitet) pro potu ordinario concedo.

Atque ista quidem methodo vincenda est *Peripneumonia* hæc *Notha*, orta ab exundanti colluvie pituitosa in sanguine aggesta ob Hyemis analogiam, & in pulmones explosa; in qua tantum iterata venæ sectio, sed & Catharsis etiam indicabatur, secus atque in *Vera Peripneumonia*: quam ego ejusdem plane indolis cum *Pleuritide* esse arbitror, atque ab illa in eo tantum differre, quod *Peripneumonia* pulmones universaliter afficiat. Quin & utrinque morbo pari omnino methodo medemur, venæ sectione sc. præ cæteris, & medicamentis refrigerantibus.

Notha hæc *Peripneumonia*, licet ad *Asthma siccum* aliquantulum accedat, tum quoad spirandi difficultatem, tum etiam alia quædam symptomata, ab illo tamen satis dignoscitur, cum in ista manifesta febris atque inflammationis signa se prodant, quæ in hoc nusquam comparent, quamlibet in hac specie minora sint longe ac obscuriora illis, quibus insignitur *Vera Peripneumonia*.

Diligenter autem animadvertendum, quod ubi vini spiritui aut aliis id genus liquoribus, cum hoc morbo conflantes se olim addixerint, minime tutum erit eos statim ac derepente ab iis depellere; sed sensim id agendum, quo minus *Hydropi* tam repentina mutatio ac abrupta viam sternat. Quod etiam in morbis quibuscunque ab hac *πρωΐσσει* oriundis, observari debet. Cum vero de *Spiritu Vini* mentio fuerit facta, hic obiter dicam. Optandum sane esset, quod aut idem omnino exulet, aut saltem spiritibus reficiendis, non vero iisdem extinguendis usurpetur: nisi quis internum ejus usum prorsus abdicandum maluerit, proindeque a Chirurgis solum ad *Ulcera digerenda* foribus immiscendum, aut *Ambustis* extus admoventum: quo postremo casu omnibus remediis, quotquot adhuc inventa fuerint, hic liquor facile palmam præripit, cum cutem subjacentem ab omni putrefactione tueatur ac vendicet, atque eo nomine curationem, quam cito absolvat, *digestionem*, quæ non nisi admodum tarde sua tempora percurrit, etiam non moratus: nempe si linthea spiritu vini imbuta partibus ab aqua ferventi, pulvere pyrio, vel simili læsis, quam primum hoc infligitur malum, applicentur, eademque spiritu dicto madefacta subinde repetantur, donec dolor ab igne penitus evanuerit, & postea solum bis in die.

C A P U T V.

Rheumatismus.

Nullo non tempore incescit hic morbus, maxime *Autumno*, & præcæteris annis florescentes & οἱ γένου χλωρόν. Hac ut plurimum occasione nascitur, æger sc. five exercitio aliquo vehementiori, five alio modo excalefactus, mox repentinum frigus admisit. A rigore atque horrore orditur tragœdiam, quos statim excipiunt calor, inquietudo, sitis, & reliqua illa infelix symptomatum caterva, quibus stipantur febres. Elapso die uno alterove, (est & ubi citius) æger atroci dolore, nunc in hoc, nunc in illo artu infestatur, in carpis, humeris, genubus præsertim, qui locum subinde mutans, vicissim illos occupat, rubore quodam & tumore in parte quam postremum affecit adhuc residuis. Primis aliquot diebus, febris, & symptomata jam memorata quandoque coincidunt; febris autem sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immanius sævient, materia sc. febrili in artus translata; quod satis arguit febris ipsa sæpius recrudescens ob materiam morificam ab intempestivo externorum usu repercussam. Morbus hic quoties a febre sejungitur, *Arthritis* sæpe audit, quamvis essentialiter ab illa distinguatur, prout cuius facile constabit, cui uterque morbus intimius fuerit perspectus: unde forsitan petenda est ratio, cur tam sicco illum pede transiverint scriptores Medici: Nisi forte arbitremur, hanc morbi speciem ad reliquam malorum Iliada de novo accessisse. Utut se res habeat, jam plus satis grassatur hic morbus; & licet rarissime hominem e medio tollat, febre semel depulsa, tamen & vehementia doloris & diuturnitas eum prorsus contemni non sinunt. Etenim si minus perite tractetur, non ad menses tantum, sed ad annos etiam aliquot, imo per omnem adeo vitam miserum haud infrequenter discruciat; quamvis in hoc casu, non eodem semper vigore, sed paroxysmis quibusdam periodice repetitis, ad instar arthritidis, subinde lacescit: imo vero potest fieri, ut ubi diu multumque vexaverint dicti dolores, tandem fonte desistant, atque interim æger omni membrorum motu ad

mortem usque privetur, digitorum articulis quasi inversis, & protuberantibus, ut in arthritide, nodosis in interna magis quam externa digitorum parte se prodentibus: stomacho nihilominus valeat, & cætera sanus vitam toleret.

Est & alia hujus morbi species, licet non hujus esse profapiæ vulgo credatur, quæ *Lumbago Rheumatica* aptissime dicitur: immanis dolor, scilicet idemque fixus circa lumborum regionem, ipsumque aliquando ad os sacrum se demittens, *Paroxysmus Nephriticus* mentitur: nisi quod æger non vomitur; nam præter dolorem atrocissimum, & vix ferendum circa ipsos renes, aliquando & ureteres per omnem eorum ductum ad vesicam usque, eodem licet mitiori, tentatur. Qui & mihi olim imposuit, tanquam a materia aliqua fabulosa in iis partibus hærente penderet; cum revera materiæ *Rheumatismi* peccanti & inflammatae ortum suum debeat, quæ quidem partes illas jam solas urit, intacto reliquo corpore. Immanis hic dolor, nisi abigatur eodem modo, quo prior species pariter etiam perdurat, pari sævitia excrucians; adeo ut miser nequeat procumbere, sed vel lecto exiliat, vel super eodem sedeat, corpore interim perpetua agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato, reductoque.

* Cum utraque hæc morbi species ab inflammatione videatur oriri, quod tunc jam dicta arguunt phænomena, tum præsertim sanguinis venæ sectione educti color, utpote qui pleuritico sanguini tam est similis, quam ovum ovo, neque quisquam reperitur, qui hos inflammatione laborare vel quidem dubitaverit; his, inquam, ita se habentibus, censeo ego, curationem non aliunde quam a Phlebotomia debere sumi, sanguine interim temperato, ejusque nimio fervore represso, tum medicamentis refrigerantibus atque incrassantibus, tum etiam conveniente regimine.

Ac proinde ut primum accersor, statim sanguinis ℥x. e brachio lateris affecti mitti jubeo, & Julapium refrigerans incrassantque ad hanc fere normam præscribo. ℞. *Aq. Nymph. Portulac. & Lactuc. an.* ℥iv. *Syr. e limonibus* ℥ij. *Syr. Viol.* ℥i. *M. f. Julap. de quo bibat ad libitum*: vel etiam emulsionem in curatione morbi laterali jam descriptam. Ad dolorem sedandum, *Cataplasma e mica Panis sili-ginei*, & lacte croco tincto, vel fol. brassicæ parti affectæ applicandum, & sæpe renovandum curo. *Dietam* quod spectat, carnibus prorsus interdico, quin & eorum jusculo, quantumlibet tenui limpidoque; quibus substituo juscula hordeacea, avenacea, panatellam, & ejusmodi. Cerevisiam tenuem mitemque pro potu tantum concedo, vel etiam (quæ magis ad rem facit) ptisanam ex hordeo, rad. Liquirit. Acetosæ, &c. in aqua fontana incoctis. Volo interim, ut per aliquot horas singulis diebus lecto se absterneat, cum calor, qui a jugi decubitu, morbum promoveat intendatque.

Die sequenti sanguinis tantundem detrahi præcipio; atque intercalato die uno alterove, pro ægri viribus, tertio; dein interjecto trium quatuorve dierum intervallo (prout ægri vires, ætas, constitutio, aliæque circumstantiæ suadent monentque) quarto, atque ultimo, ut plurimum, venæ sectionem repeto; raro enim usuvenit, ut ultra quartam vicem venam incidamus, nisi vel regimen justo calidius præcesserit, vel medicamina calidiora ægro præter necessitatem fuerint ingesta. Quin & Anodyna sive Paregorica dicta remedia effusorem sanguinis missionem postulant: Quamobrem utut sæviat dolor, per omnem hujus morbi decursum, religiose mihi ab his temperandum existimo, modo mihi animo sit curationem a sanguinis missione solum petere, cum illorum usu figatur morbus, neque tam facile venæ sectioni cedat, quæ ideo ob hæc ipsa medicamenta officiose nimis exhibita, sæpius quam erat opus, celebranda est. Quid quod & in morbi statu, neque eam, quam titulo pollicentur, *ἀναλγησιαν* valeant præstare?

Interim dum prædicta remedia, diætæque sedulo usurpantur, *Enema* e lacte saccharato subinde injici curo, diebus scilicet a Phlebotomia vacuis. Porro ut hæc omnia ad dies minimum octo ab ultima venæ sectione diligenter observentur, serio hortor moneoque; quibus elapsis, *Potionem Catharticam*, e lenitivis præscribo mane hauriendam, & infrequenti vesperi dosim paulo liberaliorem *Syr. de Mecnio in Aqua fl. Paralyf.* quo sc. sanguinis orgasmus, unde & recidivæ periculum aliter intentari poterit, penitus reprimatur. Quibus rite peractis, ut in pristinum vitæ genus, quoad victum, exercitia, atque aerem, pedetentim se recipiat, lubens patior, ita tamen ut neque vinum, neque liquorem spirituosum quemlibet, neque etiam cibos, sive sale, sive aromatis conditos, sive etiam *δυσπέπτα* quæcunque, nisi diu postea degustare liceat.

Post venam, quoties supra innuimus, pertusam, ægri dolores admodum imminuentur, neque tamen adhuc prorsus evanescunt; at vero resarcita, quam fecerat sanguinis detractio, virium jactura (superveniente maxime proximo illo anni tempore, quod magis faciet ad redintegrandum corporis robur, quam id, quo primum decubuit æger) symptomata ad unum omnia cessabunt, atque æger pancreatice imposterum valebit.

Jam vero, tametsi prædicta methodo, aut alia huic simili, tempestive atque sub ipso morbi ingressu adhibita eum, quem jam dixi, finem ut plurimum sortiatur; non raro tamen accidit, ut ubi æger per errorem contrario plane modo fuerit tractatus, doloribus vagis, nunc quidem mitioribus, nunc vero atrocioribus, per omnem vitam misere discrucietur: qui quidem minus cautis nullo negotio imponunt, & pro *Scorbuti* symptomatibus vulgo habentur. Hic enim obiter, sed & libere tamen dicam, quod licet nullus dubitem, quin *Scorbutus* in his plagis Borealibus revera inveniat, tamen eum morbum non tam frequentem, quam fert vulgi opinio, occurrere persuasum mihi habeo; multos autem ex iis affectibus (ne pluribus dicam) quorum nomine *Scorbutum* incusamus, vel morborum *Fientium*, nondum vero *Factorum*, quique nullum adhuc certum induerunt typum, effecta esse; vel etiam infelices reliquias morbi alicujus nondum penitus devicti, a quibus cæterique humores contaminantur: Verbi gratia, quibus in corporibus materia aliqua *Arthritidi* producendæ apta recens geratur, nondum tamen in artus depluit, varia se ostendent symptomata, quæ *Scorbuti* suspicionem facient, donec *Arthritis* jam formata, atque actu se exercens, nullum amplius dubitandi locum relinquit. Neque ignoramus, non pauciora symptomata *Scorbutum* mentientia, *Podagricos* jam a paroxysmo liberatos infestare (dum scilicet vel intempestivus evacuantium usus, vel ægri

ægri effœta ætas, vel alia aliqua causa naturam interpellaverit, quo minus materiam omnem Arthriticam in artus exonerare valuerit; quæ adhuc retenta, cum *τὴν ἀντιπρόθεον* existat, totam sanguinis massam inquinat, & confertissimo pessimorum symptomatum agmine hominem laceffit. Quod quidem non de *Arthritide* tantum, sed & *Hydrope* adhuc incipiente dictum volo; de quo morbo licet vulgo jactetur, *Ubi desinit Scorbutus, ibi incipit Hydrops*, hæc tamen regula sæpe sæpius non aliter est accipienda, quam quod, ubi primum se *Hydrops* manifestis prodit indicibus, præconcepta de *Scorbuto* opinio statim collabascit. Potest & idem hoc affirmari de quamplurimis aliis morbis Chronicis, vel adhuc in corpore humano nascentibus, quique proinde nondum certum aliquem sibi cuderunt typum; vel etiam de illis, qui licet partim fugati sint, nondum tamen penitus debellati exterminatique videntur. Et sane nisi hoc concedamus, *Scorbuti* nomen, uti hodie fit, in immensum crescet, & omnem fere morborum numerum absolvet. Cum, si id sedulo agamus, ut abdita cujusque morbi penetrabilia perscrutemur, eumque post irregularium symptomatum vela latentem eruamus, sua se mox specie sit proditurus, & ad illam ad quam attinet familiam haud difficulter relegendus. Quin & methodus, qua hujuscemodi morbi sunt abigendi, non adulterinis illis symptomatibus, sed ipsi morbo, qualisnam is demum fuerit, seu perfecte formato, jamque actu existenti accommodanda.

Sed hic notandum, non adeo consultum esse, quando *Rheumatismus* aliquot annorum diuturnitate altas radices egit, sanguinem tam brevibus ac sub ejusdem primordiis fiebat, intervallis mittere; quin præstare, septimanarum aliquot intercapedine repetitas illas venæ sectiones discernere; quæ tandem vel penitus materiam morbificam averruncabunt, vel saltem eo conducent, ut fontanella in crurum alterutro excitata, & spiritu quovis volatili in vino Canarino mane & sero exhibito, reliquæ ejus extirpentur.

Jam vero quantumcunque discriminis inter verum *Rheumatismum*, ut supra innui, & *Scorbutum* intercedat, aliam tamen speciem esse *Rheumatismi*, quæ ad *Scorbutum* quam proxime accedit, omnino confitendum est, utpote quæ insigniora hujus morbi symptomata æmulatur; & pariter eadem ferme remedia sibi vendicat, ideoque mihi *Rheumatismus Scorbuticus* audit. Dolor nunc hanc, nunc illam partem obsidet, sed eadem in tumorem ac in alia specie raro attollit, neque febrem sibi comitem adjungit. Insuper non adeo fixus manet, sed indolem magis vagam ac incertam refert, cum anonialis inconditisque symptomatibus stipatus. Nunc hunc vel alium artum discruciat, mox internas solum partes afficit, proindeque ægritudinem parit, quæ, redeunte externarum partium dolore, iterum se proripit; ita ægrum alternatim divexans, ac in diuturnitatem longam se protrahens, ad instar morborum, qui vel maxime Chronici habentur. Fœminas præ reliquis adoritur, ut & viros, qui imbecilliori natura sunt; adeoque ad affectuum hystericorum classem referri debere plane suspicarer, nisi quod iterata experientia comprobasset, eum remediis hystericis minime cessisse. Illi etiam, qui longum & repetitum *Corticis Peruviani* usum experti sunt, huic malo sunt obnoxii; quod quidem (ut obiter attingam) unicum est incommodum, quod ex hoc remedio illatum novi unquam. Sed utut id sit, hic affectus sive ex hac occasione, sive ex alia quacunque causa originem ducit, quam facillime debellatur vinciturque usu sequentium, quæ nisi privato commodo publicum prætulisse, prorsus mihi reticenda essent. Etenim his solis quam multos, eo quo descripsimus modo laborantes, sanavi, quibus venæ sectiones, quantumlibet repetitæ, Cathartica, diætæ lactea, pulveres testacei, &c. ne hilum profecerunt. Atque hæc sunt.

2℥. *Conserv. Cochlear. hortens. rec.* ʒij. *lujul.* ʒj. *pulv. Ari Comp.* ʒvj. *cum f. q. syr. Aurant. f. Electuar. Capiat.* ʒij. *ter in die per mensem integrum, superbibendo aquæ sequentis ʒij.*

2℥. *Cochlear. hortens. M. viij. Beccabung. Nasturt. aquat. sylvic. mentæ, an. M. iv. Cort. Aurant. n. vj. nuc. Moschat. confus.* ʒʒ. *Infundantur in Cerevisia Brunsvicensi ʒxij. ac distillantur organis communibus, & eliciantur tantummodo Aquæ ʒi. xij. pro usu.* Atqui præcisa dosi *pulv. Ari comp.* observetur, aut saltem eadem non minuatur.

C A P U T VI.

Febris Erysipelatosa.

Nullam non corporis partem, idque nullo non tempore incescit hic morbus, at præ reliquis faciem, exeunte præsertim æstate, quo tempore sæpe dum subditi versatur, corripitur æger. Facies siquidem ex improvise in tumorem attollitur, qui subito exorsus cum dolore ruboreque summis, denso minimarum pustularum ordine distinguitur, quæ aucta magis inflammatione in vesiculas subinde faceffunt: hinc per frontem ipsumque caput latius serpit, oculis interium tumoris magnitudine plane obrutis (rusticus *Syderatio* audit) neque multum profecto abludit, nisi quod adsunt pustulæ, ab iis symptomatibus, quæ insidit ab apum vesparumque aculeis comitantur vulnera. Hoc se habet modo *Erysipelatis* notissima species ac vulgaris.

At vero quamcumque corporis partem hoc vitium obfederit, ut etiam quocunque anni tempore rigor atque horror, nisi præcesserint (quod nonnunquam pridie, aut nudius tertius solet contingere) huic se inflammationi ut plurimum adjungunt, sitis insuper, inquietudo, ac reliqua februm indicia, procedente morbo, uti primum febris dolorem, tumorem, atque alia peperit symptomata, (quæ indies ingravescunt nonnunquam in *Gangrena* terminantur) ita hæc invicem haud mediocrem ad febris augmentum conferunt operam, donec remediis idoneis utraque reslinguantur.

Est & alia hujusce morbi species, licet rarius occurrens: Hæc quolibet anni tempore invadit, idque hac ut plurimum *πρὸς αἵματι*, quod scilicet æger vinorum subtilium magis magisque attenuantium potationi paulo liberalius indulserit, aut liquoris similis spirituosi. Febriculam, quæ in agmen ducit, mox excipit: pustularum per universum fere corpus eruptio, quæ urticarum puncturas referunt, & nonnunquam in vesiculas attolluntur, mox recedentes tuberculorum more sub cute se condunt cum pruritu mordacissimo & vix tolerando, at quoties levissimam scalpurationi subeunt, rursus apparent.

* Hic ego materiam peccantem sanguini permixtam rite evacuantem *Sydenham Opera Medica.*

* *Curatio.*

dam, ejusdemque sanguinis ebullitionem remediis illam contemperantibus sufflaminandam censeo; eam denique, quæ jam partibus impacta est, materiam evocandam, discutierendaque.

Hæc ut fiant, ubi primum accedo, satis largam sanguinis quantitatem e brachio extrahi præcipio, qui quidem pleuriticorum sanguinem fere semper æmulatur. Die sequente blandam illam potionem Catharticam mihi in praxi familiarem exhibeo, & hora somni (si paulo frequentius dejecerit æger) haustum aliquem Paregoricum, e. gr. *Syr. de Meconio in Aq. fi. Paralyf.* vel alium ejusmodi. Peracta Catharsi, partem affectam sequenti decocto foveri jubeo. 2℥. *Rad. Alth. & Lil. an.* ʒij. *fol. Malv. Sambuc. Verbasc. an. M. ij. flor. Melilot. summit. Hyper. & Centaur. min. an. M. j. Sem. Lini & Fœnugr. an.* ʒʒ. *Coq. in f. q. aq. ad ʒiij.* Coletur liquor & tempore usus adde singulis libris decocti, *Spir. Vin.* ʒij. Stupæ e panno laneo levis texturæ hoc decocto immerfæ ac expressæ calide, admoveantur parti bis in die, quæ post forum quotidie illiniatur seq. mixtura 2℥. *Spir. Vin.* ʒʒ. *Theriac. Androm.* ʒij. *pulv. Piperis longi Caryophyl. an.* ʒj. *M. Charta emiporetica hac mixtura madefacta parti circumvolvatur.*

Æger insuper ut jusculis tantum hordeaceis atque avenaceis, cum pomis assatis vescatur, volo; tum etiam cerevisia utatur tenuissima, & per horas aliquot singulis diebus a lecto sibi temperet. Hac methodo tum febris, tum alia symptomata citissime ut plurimum fungatur. Sin aliter, rursus venam seco; quod & tertium nonnunquam fieri debet, interposito semper die uno, si parva nempe adsit sanguinis diathesis, & febris intensior. Diebus a venæ sectione liberis *Enema* e Lacte cum *Syr. Violaceo*, & *Julap. refrigerantia* ex *Aq. Nymph. &c.* in *Rheumatismi* curatione jam dicta, qualibet hora diei usurpanda præscribo. Ut plurimum vero unica venæ sectio & subsequens Catharsis, si tempore adhibeantur, rem expediunt.

Quæ urticarum puncturas, cum pruritu, refert species, pari modo est amolienda, nisi quod hæc remediis ab extra applicandis minus egeat.

Hic obiter dicam, quod licet non solum hic affectus, de quo jam loquimur, sed & plerique eorum, qui cutim impetunt, & eruptionem aliqualem comitem sibi adjungunt (modo Chronici ii non sint) facile huic methodo cedant, ac proinde sanguinis missione Catharsi iteratis brevi se proripiant, eorum tamen aliqui via plane diversa tractandi sint, nec evacuationes modo dictæ quantumlibet repetitæ, nec pulveres testacei sanguini edulcorando destinati quicquam proficiunt, cum recementa quadam pravam diathesin adepta intimius cuti impingantur, non nisi remediis, quæ sanguini robur ac vim conciliant, proindeque cutis spiraculis deobstruendis apta nata sunt, ullatenus amovenda debellandaque: Cum successu itaque non vulgari sequentem methodum aggressus sum in *Pruritu ferino*, atque inveteratis id genus cutis eruptionibus. Ut.

2℥. *Theriac. Andromach.* ʒʒ. *electuar. de ovo ʒj. rad. serpentar. Virg. subtiliss. pulverat. gr. xv. lapid. Bezoard. Oriental. gr. v. cum f. q. syr. e Conditura Citri f. Bolus, sumendus mane & hora somni per dies 21. superbibendo Cochlear. vj. seq. Julapii.*

2℥. *Aq. Card. Benedict.* ʒ. vj. *aq. epidem. & theriacal. stillat. an.* ʒij. *syr. Caryophyl.* ʒj. *ms. f. Julapium.*

Singulis matutinis post assumptum medicamentum sudet horæ unius vel alterius spatio, vel potius pluribus stragulis quam solet coopertus in lectulo levi madori indulgeat per dictum tempus. His finitis, si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti linimento partes affectæ inungantur. 2℥. *Unguent. ex oxylapatho ʒij. unguent. pomati ʒj. flor. sulphuris ʒij. ol. Rhodii ʒʒ. f. liniment.* Verumtamen medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi venæ sectione atque catharsi rite præmissis, quæ tamen solum adhibita curationem non absolvent, ægrum tamen contra febrem præmuniant, ob usum medicaminum calidorum alias occurrarum.

Est & alia *Eruptionis* species, etsi minus frequens, ad cujus medelam nullæ prorsus evacuationes conferunt. Hæc tamen in aliis quandoque partibus, ut plurimum tamen in pectore apparet, ac loco aliquo determinato se figit, vix cutim supereminens, atque latiore maculam præ se ferens, nisi quod aliquando porriginosa, ac quasi furfuracea, cum squamulis colore ad flavum vergente tinctis, cernitur. Hac sive *macula*, sive *impetigine* vigente, æger bene se habet, eadem vero evanescente, ut sæpe fit, leviculam ægritudinem patitur, atque urina ejus turbidior, & rubicundior, sed ad flavedinem accedens redditur. Io hujus etiam affectus curatione eadem via atque iisdem, post evacuationes universales, plane remediis insistendum ac in pruritu ferino modo dicto, ac proinde, quod non omittendum, vini, ut & carniū *ἀπέναντον* usus omnino concedendus, cum refrigerantia omnia magis officiant quam prosint. Atque ita hæc postrema eruptionis species curatur, quæ tamen aliquando non nisi *Aquis ferreis* diu epotis cedit.

C A P U T VII.

Angina.

Quolibet anni tempore aggreditur, maxime tamen illo, quod Ver atque Æstare interjacet, juvenes præ cæteris, & temperamento sanguineo præditos; Rufos etiam, quod non semel observavi, præ reliquis omnibus. Rigent horrentque innox a primo morbi insultu, sequitur febris, & paulo post dolor, & faucium inflammatio, cui nisi mature succurratur, æger statim nec deglutire valet amplius, nec spiritum per nares ducere, sed cum sensu quodam strangulationis præcluduntur fauces ab inflammatione & tumore Uvulæ, tonsillarum, laryngis, ita ut tantum non suffocetur. Ingens ab hoc morbo periculum, utpote qui paucis nonnunquam horis hominem jugulat; quoties scilicet magna vis materiæ febrilis in prædictas partes conjicitur, neque satis tempestive convenientium remedium usu, ingruenti occurritur procellæ.

* Opem laturus, sanguinem cum primis e brachio copiose detraho, mox ex ranula utraque; dein, ut partes inflammata melle *Rosaceo spiritu sulphuris* ad summum acorem permixto, tangantur, author sum: mox *Gargarisma* sequens præscribo, non vulgari modo usurpandum, sed ita ut in ore sine ulla agitatione contineatur, donec incalescat, dein expuatur, & repetatur subinde. 2℥. *Aq. Plantag. Ros.*

C 3

* *Curatio.*

Ros. rubr. & Sperm. Ranar. an. ℥iv. Album. ovorum in aquam agitando redact. N. iij. Sacch. cand. Alb. ℥iij. F. Gargarisma. Jubeo etiam ut de emulsione in cura Morbi lateralis præscripta vel simili, in dies sumat.

Sequenti mane, nisi febris & dolor inter deglutendum perceptus aliquantulum remiserint, venam in brachio rursus ferio, Catharsi in diem posterum rejecta. At si utraque hæc minuatur, Catharticum lenitivum statim exhibeo; quod quidem post sanguinis missionem præ omnibus aliis perutile, ac apprime necessarium esse multiplici experientia comperii. Si forte an, quod quidem oppido rarum est, febris, aliaque symptomata, etiam post Catharsin, bellum minentur, iterata, ut prius, venæ sectione perdomanda sunt, ut & *Epispastico* amplo ac forti, posteriori cervici applicando. Per integrum hujusce morbi decursum, Enema refrigerans emolliensque omni mane, dempto illo, quo Catharsi vacat, injiciendum, atque ægrum hoc pacto reficiendum quotidie præcipio. Carnes, cujuscunque demum generis, & juscula ex iis parata sacra sunt; jusculis vero hordeacis, avenaceis, pomis coctis ac id genus aliis vescitor, prisana ex hordeo, vel cerevisia tenuissima utitor. Lectulo interim per horas aliquot quotidie absistat: cum hujus tepor tum febris, tum reliquis symptomatibus, quæ hac methodo expugnare satago, vires addat. Animadvertendum est autem, quod istiusmodi *Angina*, quæ febris, mihi *Stationarie* dictæ, symptoma tantum est, illa ipsa methodo curari amat, quam febris ea sibi vendicat, ac proinde vel per *διὰ πόρον* & cutis spiracula exterminanda est, vel per aliam qualemcunque methodum, quæ febris primariæ, cui inhæret, debetur, quod sedula observatione dignum.

Sunt & aliæ febres *Intercurrentibus* jure merito annumerandæ, quæ, quoniam alio aliquo modo immediate abitum sibi parant, & in hoc vel illo symptomate desinunt, vulgo febres non habentur; licet tales ab origine vere fuerint, atque affectus ille, a quo morbus nomen mutuatur, febris tantum sit *Symptoma*, quæ in illo demum terminatur. Impræsentiarum duas tantum, *Hæmorrhagiam* scilicet *Narium*, ac *Hæmoptoen* leviter perstringam.

* *Hæmorrhagia Narium* quavis anni tempestate infestat, præcipue sanguine præservido, temperamento vero debiliore præditos; idque magis ætate ingravescente, quam adolescente. Primo ut plurimum appulsu febris præ se fert indicia, qua de repente sibi per nares, qua data porta, faciente viam, dolor & calor sinciput adhuc torquent. Sanguis ad horas aliquot profluit, dein aliquandiu sistitur, mox denuo erumpit, atque hæc vicissim: donec tandem vel remediorum usu, vel sponte sua ob imminutam copiam deperditamque cohibitus, omnino cessat; ita tamen, ut ægro singulis annis a recidiva metuum sit, si vel a liquoribus spirituosus, vel alia occasione qualibet astuare contingat.

Eum hic mihi scopum propono, ut sanguinis fervor nimius atque ebullitio, unde oritur dicta præter naturæ modum extravasatio, franis omnibus compescatur, ejusque impetus alio vertatur. Ea propter frequenter brachii venas tundo, & sanguinem liberaliter extraho, *Pleuriticorum* sanguini colore semper respondentem. Vicius rationem refrigerantem atque incrassantem injungo. Ut aquæ fontan. partes tres, laetis simul coctas, & frigide hauriendas, poma cocta, juscula hordeacea, & similia a carnibus abhorrentia. Julapia insuper refrigerantia atque incrassantia, una cum emulsionibus, in morbis inflammatoriis supra descriptis. Lectulo item ut absistat per aliquod spatium quotidie, nec vel semel quidem omitatur. Haustu quin etiam hora somni Paregorico e Diacodio, ceu catena constrictus sanguinis furor coerceatur. At vero cum hujusmodi *Hæmorrhagias* non raro comitetur lymphæ acrior, quæ sanguini permixta ejus motum adjuvat, venarum orificia referando, præter revulsionem, & refrigerationem, solemne mihi est Catharticum blandius, vel in ipsius morbi *ἀκμῇ* propinare, cujus operatione finita, Anodynum exhibeo præter solitum viribus auctum; & ubi symptoma penitus evanuerit, aliud demum Catharticum.

Quoad externas applicationes, lintea quadruplicata immerfa aquæ

frigida, in qua *Sal prunelle* dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ ac utrinque cervici sæpius in die. Item post universas evacuationes peractas liquor sequens applicetur. 24. *Vitriol. Hungar. & Alumin. an. ℥j. Phlegmatis Vitriol. ℥ss. Coq. tandiu, donec omnia fuerint dissoluta. Liquorem frigescentem filtra, & a Crystallis subinde natis separa. Liquori residuo adde Ol. Vitriol. duodecimam partem. Turunda ex linteo raso liquore hoc probe humectata, nari ex qua sanguis stillat indatur, per dies duos isthic relinquenda.* Quo etiam liquore linteamina imbuta & applicata sanguinem sistunt ex quacunque demum parte externa idem defluat.

* *Hæmoptoe* etiam, quæ in ætatis ac veris confinio homines calidioris temperamenti, ac minus robusti adoritur, & quorum pulmones minus recte valent, præ senibus item juniores, ejusdem fere indolis cum *Hæmorrhagia* jam tractata mihi est, cum & hæc quoque febris sit, quæ tam nomen, quam essentiam exuit suam illa quæ soluta est crisi; hoc fere tantum discrimine, quod in morbo *priori* sanguis nimium agitatus in narium venulas, in *hoc* vero in pulmones impetum facit; utque in illo, durante fluxu dolor & calor sinciput jugiter lancinant, ita in hoc pectus interque obsidet cum debilitate quadam. Quin & hoc vitium eandem fere quam *Hæmorrhagia* methodum medendi sibi vendicat, nisi quod Catharsin minus ferat, a qua, præsertim repetita, æger facile in tabem conjicitur. At Phlebotomia crebro celebrata, Enema quotidie injectum, Diacodium hora somni propinatum, diæta insuper, ad medicamenta, tam incrassantia, quam refrigerantia, opus pro voto absolvunt.

Atque hæc sunt, quæ hæcenus observavi de numerosa ista morborum tribu in varias familias dispersita, qui *Febrium* sub nomine censentur, atque de iis symptomatibus, quæ ab illa pendent, in quibus id serio egi, ut nullas purationes meas, nulla imaginaria cerebri commenta orbi venderem, animo vero sincero candidoque, nullique adeo hypothesei adstricto, eorum historiam & naturalia Phænomena aliis traderem; curationes etiam pari fide, & cautela pari subnecterem. Quod si vehemens desiderium methodum certiorum minusque lubricam, in utilissimo tuendæ mortalium vitæ negotio, expiscandi constabiliendique, me in semitas nullo antea pede calcatas pertraxerit; nemo eruditorum, uti spero, mihi imputabit, quod vel speris aliorum judiciis meo nimium fidam, vel rebus studeam novis; cum & non spernendus rerum eventus mihi hæc investiganti ingentes hucusque animos dederit, & posterorum experimenta sine dubio meam fidem sint liberatura. Et profecto haud oscitanter inipugnandum est hoc morborum tam pestiferum agmen, quod nullo non die cum genere humano bellum gerit internecinum, atque *ἀσπιδον*, & cujus telis duo ad minimum hominum trientes, si eos demas, qui violenta morte perimuntur, confossi quotannis occumbunt. Indefinites horum morborum impetus, & quotidianæ, quas etiam de viris robustissimis & ætate maxime florentibus reportabant, victoriæ (non obstantibus suppetiis iis omnibus, quas nobis hæcenus attulere speciosæ istæ methodi in speculativorum libris satis fidenter descriptæ) animo meo hæc primum agitati minus satisfaciebant, cum reapse cernerem, ludrica ista cerebroforum commenta ita parum ad reintegrandam ægrorum sanitatem conferre, ut qui ad asylum hæc confugerant, quicquid pollicerentur Thrasones Dogmatici, haud meliori in loco essent, quam qui neglecta arte se totos naturæ permiserant. Si quid ego hic egero, quo vel periculi, vel etiam difficultatis, quæ in his morbis perfanandis plerumque occurrunt, pars aliqua levetur (quod salva verecundia, me mihi polliceri posse saltem spero) scopum quadantenus affecutus sum, & dulcissimum improbi laboris in bono proximi quærendo recte collocati, fructum fero. Hæc præcipua fere sunt quæ jam habeo comperta, (vel saltem ad methodum aliquam novi reducere) circa *Febres & Symptomata*, quæ ab eisdem pendere ad hunc usque 30. Decembris diem, Ann. 1675. quo hæc conscribo.

* *Hæmorrhagia Narium.*

* *Hæmoptoe.*



EPISTOLÆ RESPONSORIÆ DUE A THOMA SYDENHAM M. D.

I. De Morbis Epidemicis ab Anno 1675. ad Annum 1680. ad ROBERTUM BRADY, M. D.

II. De Luis Venereæ Historia & Curatione ad HENRICUM PAMAN, M. D.

CLARISSIMO VIRO

THOMÆ SYDENHAM, M.D.



EMO uspiam Medicorum, Vir eruditissime, adhuc vim aeris & influentiam in humana corpora attente perpendit, nec in vita nostra perennanda quas agit partes, eorum quispiam consideravit satis, viresque quas exerit in fermentando, & circumducendo sanguinem, aut in motibus animalibus quibusque peragendis cujus sit energiae, & efficaciae, horum non aliquis notavit; neque ejusdem temperiem naturalem, alterationes multiplices & mutationes, quas Constitutiones haud perperam indigatas, ne leviter quidem, vel Medici, vel Historiae Naturalis Scriptores attigerunt, multo minus perscrutari satagunt. Fieri sane nequit, cum in omnes corporis partes, etiam reconditissimas, aer sese insinuet, quin quas subit alterationes & mutationes a rebus quibus impregnatur easdem sanguini & succis communicet, & imprimat; unde ut plurimum ab hac vel illa prava aeris constitutione oritur hujus vel illius indolis prava sanguinis Diathesis. Optimo itaque consilio observationes Medicas circa morborum acutorum historiam & curationem juxta varias annorum & eorundem partium constitutiones instituisi, cum in iisdem, aeris actiones in sanguinem, succos, & spiritus praesertim (si ipse non sit spirituum materia) conspiciantur. Et nullus dubito quin Februm indoles ab annorum temperie, in quibus grassabantur, observata utilissimam, si non unicam, methodum constituit ad praxim stabiliendam. Perge itaque, & si quae adhuc restant Observationes Februm annorum nuperrime elapsorum, fac ut palam fiant, qua in re quam maxime humani generis salutem prospicies.

In Sectione prima, Cap. quinto libri tui, paucis egisti de usu Corticis Indici, & ejusdem exhibendi methodo. Equidem scio, quosdam haud infimi subseclii Medicos, qui in magna quantitate & dosi saepius repetita eum exhibent; alios item qui ex eodem extracta, infusiones, & ex infusionibus julapia, & emulsionem conficiunt, quibus modis se non tantum intermittentes, sed & continuas quasdam certo curare affirmant: Magnum procul omni dubio in curandis intermittentibus est remedium. Ego quidem per 20. plus minus annos dictum Corticem varia forma & multiplici preparatione maximo cum successu exhibendum curavi. Si vero peculiare quippiam de usu hujus Corticis nosti, vel quid melius progrediente experientia fueris edoctus, id ne graveris precor in lucem proferre.

In curatione Rheumatismi frequentem Phlebotomiam, & larga manu celebratam tanquam necessariam proposuisti. Quererem Ego an non rejecta tam severa & crudeli methodo, alia non humani sanguinis adeo prodiga, nec minus certa inveniri possit. Dum haec agis, Dignissime Vir, malevolorum jurgia, & invidorum stigmata atque calumnias sat superque persenties; neque nunc minus quam olim nomini tuo aut famae parcent, licet ingenuis fere omnibus displiceant, & candidioribus, apud quos solemne est istiusmodi detractores despiciere. Isti vero, si Februm historiam longo usu comprobant, vel earundem essentias, causas, & differentias, vel veram tandem medendi methodum explicari volunt, Te Ducem & viam praemonstrantem sequi necesse habent; cum vix, aut ne vix quidem, alia, vel earum naturam investigandi, vel curandi ratio possit assignari. Maeste itaque esto, & sperne sciolorum dicteria; sciolorum hominum ingenia excita; tu methodum monstrasti, & si tua non placet, qui carpunt, dent politiore & magis firmam. Vale, Vir integerrime, qui hisce peragendis totam Medicorum turbam merito devincies, inter reliquos vero,

Tibi jure meritoque amicissimum,

Cantabrigiae,
30. Decembr. 1679.

R. BRADY.

Amplissimo Doctissimoque Viro

ROBERTO BRADY, M. D.

Collegii Cajo-Genevillensis Custodi, nec non Regio in Medicina apud Cantabrigenses Professori longe celeberrimo.

ME certe, Vir Humanissime, si quid in morborum curatione profecero, ad omne id cuius efflagitanti impertiendum praeter ceteris qui nunc sunt homines facillimum esse omnino par est: si enim ea tantum mihi innotescant quae & reliquis mortalibus, (quod mihi plus satis constat) nullo pacto mihi obsuerit levidentia ista & e triviis desumpta evulgare; sin autem assecutus sim aliquid quod e re medica sit, & ad certiore morborum Therapeiam faciat, non tam mihi laudi dabitur, quam aliis daretur quibuslibet, ea in lucem exponere; Qui & a podagra jam ab annis plus minus triginta, & calculo diu male mulctatus, facile mecum reputo, quam serio gauderem, si quod meis malis levamen aliorum indicio possit asserri. Cum autem paucissimis ingens illud privilegium a Deo Opt. Max. concedatur, ut publico commodo hac in re inservire queant, iisque tantum, quibus e meliore luto quam mihi finxit praecordia Titan, votis agentem Sydenham Opera Medica.

dum est, quod reapse effectum dare non satis est virum. Semper enim existimavi, neque sine ratione, majoris esse felicitatis certam vel levissimi alicujus morbi debellandi methodum aegris mortalibus prodidisse, quam vel *Tantali*, quod ajunt, vel *Cræsi*, thesauros accumulasse. Feliciorum hoc illum dixi; dicam & meliorem, sapientioreque: quod enim uberius & sapientiae & bonitatis suae specimen quis potest edere, quam, cum se e communi generis humani natura decisum animadvertat, ea quae molitur omnia ad publicam magis omnium utilitatem, quam ad suam ipsius, qui tam exilis totius particula & contempta res est, jugiter referre? Ut enim (loquor cum maximo illo dicendi sentiendique magistro Cicerone meo, sui saeculi, ne dicam universae hominum naturae Genio) leges omnium salutem singulorum salutem anteponunt, sic Vir bonus & sapiens & legibus parens & civilis officii non ignarus utilitati hominum, plusquam unius alicujus, aut suae consulit. Cicero de fin. bon. & mal. Quinimo satis liquet, quod cum facinorosi sit hominem jugulare, boni viri erit eundem vel conservare, vel alios iis instruere praesidiis, quibus adjuti eum ab interitu vindicent, etiam auctore vita jam functo. Et vox illa plane inhumana, & scelerata audit eorum, qui negant se reculare, quo minus ipsis mortuis terrarum omnium deflagratio consequatur.

His autem impraesentiarum missis factis, fatendum est, debere me ea, quae de his morbis, de quibus percontari libuit, animo volutavi, ut ut exilia, tibi plane aperire, Tibi, inquam, eximio viro, & Sparta quam ornas dignissimo; cujus ego & eruditioni & probitati, animique candori ea tribuo encomia, quae reliqua Togatorum gens, inter quos nites. Praetereo etiam, quantum tibi debeo gratiarum, quod te tam male habeant immerita illa, quibus a nonnullis proscindor convitia; de quibus hoc habeo dicendum, quod si vita innocua hominis, qui neminem neque facto neque dicto laeserat, me ab illis sartum testum reddere valuisset, nunquam in me detonerant. Cum autem nullo id meo crimine evenerit, neque, ut spero, eveniet unquam, stat sententia non me ideo plectere, quod alii deliquerint, id tantum ratus ad me attinere, ut viri probi scilicet officio defungar, & boni Medici, quantum patitur tenuitas nostra.

Moreni itaque geram in tradendis observationibus, quae mihi in morbis, de quibus sciscitabar, occurrebant. Primum autem agam de Februm intermittentibus nunc apud nostros Epidemicis. Quo nomine non abs re fore arbitror annos istos ordine, sed breviter percurrere, qui illum excipiebant, quo clauderetur *Historia Acutorum Morborum* (qualis illa demum fuerit) qui per praeterlapsos annos 15. grassabantur, & quaedam obiter perstringere in eorundem curatione a me pridem notata. Quo facto melius innotescet, quo tempore & quibus gradibus, quae jam obtinet februm constitutio, nobis obrepserit.

* Annus 1676. eosdem peperit morbos quos genuerat constitutio postremo loco commemorata in dictis observationibus, viz. Annor. 1673. (in cujus Autumno ea se primum exeruit) 1674. & 1675. At vero exolescente ferme hac crasi, mitiores erant, quam pro suo genio, qui subpullulabant morbi, & minus insuper Epidemici; non obstante peculiari ejus anni indole, quantum ad manifestas aeris qualitates, quibus ab annis praecedentibus perquam abludebat, cum & aestatis fervor, & frigus hyemis omnes ferme annos, quorum memoriam habemus, longo intervallo superaverint. Et cum tam ingens tempestatum discrepantia similes tamen morbos produceret, satis hinc liquet, non tam manifestam quam occultam aeris temperiem Epidemicis morbis favere. At vero fatendum est, morbos eisdem quoad symptomata quaedam aliquando a manifesta aeris diathesi pendere, quod & *Morbilli* & *Cholera Morbi* hoc anno invadentes testatum faciunt, de quibus breviter agam.

Morbilli enim nascenti anno coorti, licet non admodum Epidemici, id tamen eximii habebant, quod solito longius procurerent; nam cum pro mote suo mense primum Januario comparentes, ad Aequinoctium usque vernali ingravescerent, dein paulatim imminuti cum Solstitio fere expirarent, hoc anno ad Aequinoctium ferme Autumnale pertingebant, ab aestatis calore, nisi fallor, aucti viribus, quo diutius obisterent. Neque tamen methodum medendi ab usitata illa diversam postulabant.

Exeunte aestate *Cholera Morbus* epidemice jam saeviebat, & insueto tempestatis calore evehctus, atrociora convulsionum symptomata, eaque diuturniora secum trahebat, quam mihi prius unquam videre contigerat. Neque enim solum abdomen, uti alias in hoc malo, sed universi jam corporis muscoli, brachiorum crurumque praeter reliquis, spasmodis tentabantur dirissimis, ita ut aeger e lecto subinde exiliret, si forte extenso quaquaversum corpore eorum vim posset eludere.

Quamlibet autem hic morbus non aliam a recepta medendi rationem sibi vendicabat, *Anodyna* tamen fortiora, eaque saepius ingerenda quam alias solebam, omnino indicabantur. Ex. gr. Ad quendam vocatus per id temporis truculentissimo illo, quod inodo descripsi, symptomate tantum non enectum, (me autem comitabatur *Carolus Goodall* M. D. cujus animi candor, probitas illibata, summus in me amor, labor improbus in morbis dignoscendis curandisque una cum nomine mihi semper occurrunt) & enormi vomitione, spasmodumque violentia animam agentem, cum sudore frigido, & pulsu vix micante, guttas 25. *Laudani liquidi*, a me jam olim publicati, in cochl. i. Aq. *Cinnamomi fortis* exhibendas curavi,

veritus sc. ne vehiculum paulo copiosius medicamento rejiciendo (quod in vomendi tam impenso conamine persæpe fit) ansam daret: dein lecto assidens quasi ad semihoram, & expertus remedii vires nec Vomituritioni compescendæ, nec sedandis convulsionibus adhuc pares esse, toties illud ipsum repetere, & dosin in tantum augere cogebar (interposito tamen spatio, ut quid a jam ingesto mihi foret sperandum prius ediscerem, quam novas adferrem suppetias) donec tandem pervicacissima illa symptomata sub jugum victoris mitterentur, quod tamen vel minimo corporis motu excitata denuo excutere satagebant. Serio itaque imperavi, ut & corporis quieti modis omnibus indulgeret ad paucos dies, & medicamentum jam dictum, sed in minori dosi, subinde assumeret, etiam postquam convalesceret, ad *ἑξίαν* sc. confirmandam, quod nobis ex animo cessit.

Neque est cur me quispiam justo audaciorem pronunciet, eo sc. nomine, quod tantam Laudani liquidi vim ægro infundere non dubitaverim; cum iudice experientia certo constabit, quod in quibus affectibus ex *Opio* parata indicantur (sunt autem tres; *vehemens dolor, vomitus vel dejectio enormior, & insigniores spirituum animalium ἀταξίαι*) in iis & remedii dosi & repetendi vices cum symptomatis magnitudine omnino sunt conferendæ. Quæ enim dosi remissioni symptomati coercendo par est, ea ab alio fortiore superabitur, & quæ alias ægrum in manifestum vitæ discrimen conjiciet, eundem impræsentiarum ab orci faucibus liberabit.

* Atque hi sunt morbi isti, qui hoc anno populabantur, iidem sc. ut jam innui, cum morbis trium annorum præcedentium. Quales autem fuerint, qui annum sequentem viz. 1677. funestaverint, non habeo dicere. Cum enim molestissimo sanguinis mictu, a motu vel levissimo, sub anni initio male mulctaret, neque ita diu postea podagra etiam, quæ non jam tam artus, quam viscera sævissimo dolore excruciat, accedentibus insuper virium & appetitus prostratione, crurum tumore, aliisque symptomatibus non minus periculosis (quem si tum fuerim extinctus, mors certe non tam a bonis quam a malis abstraxisset, haud equidem repugnantem) me domi meæ ad menses tres continere, deinde redintegrandæ sanitatis causa per idem fere spatium rusticari cogebar. Autumno reversus ad meos, febres intermittentes hinc inde sparsas esse (quarum tamen pars maxima ægros non in urbe primum invaserat) ab amicis didici; cum autem mihi per valetudinem non liceret ægros invisere, de hoc anno nihil melius silentio possum adferre.

* Proximi anni (viz. 1678.) *Constitutio* prorsus immutata *Febris Intermittentibus* (quæ jam ab anno 1664. ad tredecim sc. annos urbe fere exulaverant, nisi quod nonnullos sporadice occuparent, vel ex agris forte comitarentur) usque adeo favebat, ut Epidemicæ rursus audirent; neque eum tamen gradum hodie tuerentur, quin & fines latius proferent, donec hæc, a qua pendent, aeris *διαθεσις* suam *ἀμυν* attigerit. Quantumlibet autem dictæ intermittentes pauciores aliquot etiam tempore Verno fuerint adortæ, eo usque tamen exeunte Æstate, & Autumno subeunte præ cæteris sæviebant, ut nulli amplius morbo Epidemicæ nomen relinquerent. Hyeme vero paululum fatiscente *Variolis* locum cedebant, atque aliis insuper Epidemicis, qui per omnia dominabantur, donec intermittentibus apta tempestas in orbem rediret.

Sed ut jam edisseram, quæ de harum febrium & natura & causis sedula observatione affectus sum; in primis notandum est, quod licet olim *Quartana* frequentius occurreret, nunc dierum aut *Tertianæ* erant, aut *Quotidianæ*, (nisi quis postremas has *Duplices Tertianas* malit appellare) & pariter quod licet *Tertianæ* Quotidianæque aliquando cum rigore atque horrore invadentes, subsequente primum calore, mox etiam sudore, tandem in omnimoda *ἀνυπεξία* definerent, atque post statam periodum ægros de novo lacefferent; ne hunc quidem jam morem servabant ultra tertium quartumve paroxysmum, maxime si æger lecto addiceretur, & assumptis cardiis calidioribus oleum camino, quod ajunt, addiderit. Postea vero febris hæc eo usque etiam præter indolem suam incrudescibat, ut *Intermissionis* loco *Remissionis* tantum ægro concederet, & magis in dies ad *Continuam* speciem accedens, tacto cerebro tandem haud paucos extingueret.

Curationem quod spectat, jam a multis annis mihi innotuit, quam sit periculosum eam in tertianis & quotidianis (quæ cum recētes sint nullumque typum indutæ in continuitatis vicinia adhuc hærent) per sudorifica moliri: quamvis enim notissimum sit simul cum sudore prorumpente inquietudinem atque alia symptomata statim evanescere, & *ἀνυπεξία* succedere, & ex consequenti huic paululum esse indulgendum, saltem non esse obsistendum paroxysmo fatiscente, tamen est compertissimum, quod si justo copiosius eliciatur sudor, quæ intermittebat, febris jam fit continua, ægerque tanquam incerto aleæ casu in vitæ discrimine versatur, hic servatur, perit ille. Ratio est hæc, nisi mea me fallit conjectura, quod sc. istiusmodi profusus sudor; cum materiæ febrilis, paroxysmi calore eo usque evectæ, ut jam per despumationem ejici possit, modum exuperet, exterminata ea parte, quæ unico paroxysmo respondet, de reliquo sanguini incendendo impenditur. Hujus itaque methodi inefficaciam; & aliarum evacuationum, venæ sectionis v. gr. & catharticos incommoda (quarum utraque relaxando tonum sanguinis morbum protrahunt) dum mecum perpenderem, *Peruvianus Cortex* certissimam mihi spem fecit, de quo vere affirmare possim, non obstante tam vulgi, quam perpaucorum & doctis præjudicio, me nihil mali ægris accidisse ab ejus usu vidisse unquam, vel cum ratione suspicari potuisse, nisi quod illi, qui longum & repetitum corticis Peruviani usum experti sunt (ut in *Capite de Rheumatismo* præmonstraverim) in speciem quandam *Rheumatismi Scorbucici* nonnumquam incidunt. Hoc autem malum perquam raro ex hac occasione nascitur, & quando accidit, facillime remediis ibidem descriptis cedit.

Et profecto si tam effectuum durationem, quam corticis hujus innocentiam exploratam haberem, principem illi locum inter omnia quotquot sunt remedia deferre nullus dubitarem; cum non tantum in hoc morbo insignium esse virium deprehendatur, sed & in uteri & ventriculi etiam affectibus: Tantum abest, ut de ejus insalubritate merito quis conqueratur.

His autem potissimum de causis, nisi fallor, dictus cortex male audit. Primo, quia plurima illa horrendaque symptomata, quæ febres intermittentes jam diutius ægrum cruciantes comitantur, etiam

ubi ne minimum quidem corticis degustaverit, cortici, vel semel assumpto, imputantur. Secundo, quia cum occulta vi, & non per sensibilem aliquam evacuationem morbum averruncet, statuunt plerique materiam morbum comitantem quæ propelli debuerat, tanquam hostem intra mœnia vi corticis astringente inclusam latere, novos naturam tumultus, atque ægrum non penitus evasisse cum adhuc catenam trahat. Ast hi non satis attendunt sudores paroxysmum finientes id omne quod in lucido sanitatis intervallo accumulabatur prorsus eliminasse, manere tantum morbi seminum tempore maturandum; quodque cortex fugientem paroxysmum a tergo urgens, & intercepto qui debuerat subministrari morbi comite sive fomite, non potest in sanguine retinere, quod jam in illo non nisi tanquam in embryone reperitur; ac proinde neque strangulationum, neque obstructionum, quæ vulgo obijciuntur, reus est peragendus.

Quo autem pacto deprehendamus corticem vi sua adstrictoria febres fugare? Qui id probare velit, necesse erit prius alia adstringentia pari virtute prædita in medium afferat; mihi certe vel eorum fortissima adhibendi in experimentum nondum evoto cessit. Quid quod illos etiam sanat, qui ab ejus usu tanquam a cathartico assumpto (quod nonnullis accidit) frequenter alvum deponunt? Id verò deum est recte sapere suo se quemque pede ac modulo metiri. At si quis fucum sibi faciens, aliis se præditum esse facultatibus existimaverit, quam quæ inserviunt percipiendæ vel *Naturali Theologia* (ut Deo scilicet rerum omnium Architecto & Moderatori debita veneratio cum profundissima animi prostratione jure merito exhibeatur) vel *Philosophiæ Morali* (ut virtutem exerceat, & mores tam ad privatum quam publicum societatis humanæ bonum accommodet) vel denique *Arti Medicæ, Mathematicæ, & Mechanicæ* (quibus vita communis adjuvatur.) Hic primum Hypothesin aliquam e schola *Naturalis Philosophiæ* depromat, qua vel unicam differentiam specificam rerum in natura possit enodare; ex. gr. rationem reddat, quare *Gramen* omne viridi ubique colore, nusquam alio cernitur infectum; &c. Hoc si effecerit, in ejus castra haud invitus transiam; sin aliter, non verebor dicere quod Medici cura omnis atque industria, in explicanda morborum historia, iisque remediis adhibendis, quæ experientia indice ac magistra eisdem valent depellere, debent collocari; observata tamen ista medendi methodo, quam recta ratio (non speculationum commentis, sed trito & naturali cogitandi modo innixa) ei dictaverit. Dicam itaque paucis quod usu didici de methodo, qua cortex nobis usurpandus venit.

Cortex Peruvianus, cujus *Pulvis Patrum* vulgo nomine insignitus, annis abhinc quinque & viginti (si bene memini) apud Londinenses nostros in exterminandis febribus intermittētibz, maxime quartanis, primum cepit inclarescere. Idque optimo sane jure, cum hujuscemodi morbi rarissime ab ullo alio sive remedio sive methodo medendi antea expugnarentur, unde etiam opprobria Medicorum & erant & audiebant. At vero non ita multo tempore elapso, duabus de causis, non quidem levibus, damnatus in desuetudinem prorsus abiit. Primo, quia paucis horis ante adventum paroxysmi, pro recepto id temporis more, exhibitus ægrum nonnumquam & medio tolleretur; quod & civi cuidam Londinensi eidemque Senatori Urbano, *Underwood* nomine, & Capitaneo nomine *Potter* in vico vulgo dicto *Black Fryars* Pharmacopolæ memini accidisse. Funestior hic pulveris exitus, quamvis oppido rarus, Medicos tamen paulo cordatiores ab ejus usu merito retraxit. Secundo, quia æger ope pulveris a paroxysmo alias invasuro liberatus, quod plerumque eveniebat, tamen intra dies 14. recidivam ut plurimum pateretur. In morbo scilicet recenti, necdum temporis cursu suoque Marte committigato. Maxima pars hominum his permota rationibus spem de hoc pulvere jam pridem conceptam protinus abjiciebat: Neque enim tanti aestimabant paroxysmum ad paucos dies protelare, ut se eo nomine in vitæ discrimen a pulvere intentatum induci paterentur. Ego vero jam ab aliquot retro annis haud vulgarem hujus corticia vim serio perpendens, animoque revolvens, non alio magis quam hoc Herculeo medicamento febres intermittētes debellatas iri confidebam, si qua par erat cura accederet, & diligentia. Diu itaque multumque apud me agebam, ut & *Periculo* a pulveris usu impendenti, & *Recidivæ* intra paucos dies subsecuturæ (quæ duo erant amolienda incommoda) possem occurrere, atque ægrum hujus ope ad perfectæ sanitatis gradum promoverem.

Primo, *Periculum* quod minitabatur, non tam ex ipso cortice natum arbitrabar, quam ex eo quod minus opportune ægro ingereretur; cum enim vix ingens materia febrilis diebus a paroxysmo vacuis in corpore fuerit aggesta, pulvis prædictus, si immediate ante paroxysmum deglutitur, facit quo minus materia morbifica ipsa naturæ methodo, paroxysmi scilicet impetu, possit eliminari, quæ proinde præter fas inclusa ægrum in vitæ discrimen solet conjicere. Hoc ego me malum propulsare posse existimabam, materiæque pariter febrili de novo generandæ obicem ponere, si ubi primum paroxysmorum unus affligere desierit, confestim pulverem exhiberem, quo insecutus inflammaretur, & diebus intermissionis statis subinde vicibus eundem repeterem usque dum novus invaderet paroxysmus, atque ita paulatim tutoque proinde sanguinis massam salutaris corticis virtute penitus inficerem.

Secundo, cum *Recidivæ*, (quæ intra dies 14. plerumque accidebat) ex eo mihi videbatur nasci, quod sanguis non satis exfaturaretur virtute febrifugi, quod utut efficax, una tamen vice morbo penitus exterminando par non fuit, idcirco autumabam nihil ad eam præcavendam æque posse conducere, atque methodum repetendi pulveris, etiam devicto ad præsens morbo, justis semper intervallis, antequam scilicet vires præcedentis dosi prorsus elanguescerent.

His itaque rationum momentis innixa mens eam, qua jam utor, mihi methodum dictabat. Ad ægrum *Quartana* febre laborantem accersitus (*die Luna* v. g.) si paroxysmus eodem die sit invasurus, nihil prorsus moveo, sed id tantum ago ut spem faciam, eum a proxime venturo liberatum iri. Ac proinde binis diebus intermissionis (*Martis* sc. & *Mercurii*) corticem exhibeo hunc in modum. 2℥ *Cortic. Peruv. subtiliss. pulverat.* ʒj. qm̄ s. q. syr. *Caryophyl. vel de Rosis siccis, f. Electuar. dividendum in 12. partes, quarum unam capiat quarta quaque hora, incipiendo immediate post paroxysmum, superbibendoque haustum vini cujuslibet.* Vel, si *Pilule* magis arri-deant. 2℥. *Cortic. Peruv. subtiliss. pulv.* ʒj. cum s. q. syr. *Caryophyl. f. Pil. mediocris magnitudinis, quarum capiat vj. quarta quaque hora.* Sed minori cum molestia, eodem tamen fructu, hujus *Pulveris*

uncia una admisceri poterit *libris duabus Vini Clareti*, atque ejus *cochl.* viij. vel ix. exhiberi iisdem quæ dicta sunt temporis intervallis. *Die Jovis*, quo metuitur paroxysmus, nihil impero, cum ut plurimum nullus accedat, reliquiis materiæ febrilis per solitos sudores, qui præcedentem paroxysmum absolvunt, desumptis ejectionis e sanguine, atque intercisâ novæ mineræ ad fomiris accumulationem repetito pulveris usu, diebus paroxysmos determinantibus adhibiti.

Verum enim vero ne morbus denuo recrudescat (quod e prædictis incommodis erat alterum) *die octavo* præcise, a quo postremam dosin æger assumpsit eandem præfati pulveris quantitatem, (*Unciam sc. in partes 12. divisam*) eadem qua prius methodo, certo certius exhibeo. Quamvis autem repetita hoc modo semel medicatio persæpe morbum conficiat, non tamen prorsus in tuto collocatur æger, nisi Medico tertio quartove eandem methodum eodem temporis intervallo iteranti parere non gravetur; maxime ubi sanguis a prægressa aliqua evacuatione fuerit debilitatus, aut se æger incautius auræ frigidiori ferendum exposuerit.

Verum etsi hoc remedium nulla purgandi vi polleat, tamen ob peculiarem quorundam corporum temperiem atque idiosyncrasiam sæpe accidit, ut ab ejus usu tanquam a cathartico fortiori assumpto æger violenter expurgetur. In hoc casu omnino oportet, ut *Laudanum* cum eo exhibeatur, quo minus hanc operationem, tam suæ naturæ, quam morbo plane contrariam, cedere valeat, neque pulvis justo citius per alvum expulsus disperdatur, antequam suo fungeretur munere. In hoc itaque casu *Laudani* ejusdem *gut. x.* vino instillari jubeo, & post alternam pulveris dosin assumi, modo diarrhœa persisterit.

Dicta methodus usu mihi venit in cæteris intermittentibus sive *Tertianis*, sive *Quotidianis*; utraque enim statim a finito paroxysmo aggredior, & reperito per jam commemoratâ paroxysmorum interstiria medicamine (quantum scilicet earum fert indoles) urgeo atque a tergo premo; hoc tamen discrimine, quod cum quartana rarissime nisi *Uncia una* in doses dispersita, reliquæ *sex Drachmis* possint ita expurgari, ut inducias saltem concedant.

At vero tertianæ, quotidianæque, etsi post unum alterumve paroxysmum omnino videantur intermittere, tamen non ita raro (quod & a me ante est notatum) postea ad contrinuarum fere speciem vergunt, & ad *Remissionem* tantum, etiam diebus, quæ *Intermissionem* pollicebantur, accedunt; præsertim ubi æger lecto defixus regimine justo calidiore, aut medicamentis febrî per sudores ejiciendâ dicatis fuerit multatus. Hoc in casu a remissione quantumlibet exigua (id enim mihi unum superest) ansam arripiens, pulverem quam proxime a paroxysmo (quantum conjectura valeo) ingerendum propino, nempe quarta quaque hora, ut modo dixi, ne quidem ipsum morans paroxysmum, cum aliter in spatio interjecto plus satis brevi alexetaria corticis vis sanguini impertiri nequeat.

Tum autem febres quædam apud nos grassantur, etsi post secundum tertiumve paroxysmum reponere se in classem continuarum nitantur, tamen ad intermittentes debeant referri; nulla mihi est religio *Corticem* vel in maxime *Continuis* hujus speciei sumendum proponere, qui dicto more iteratus ad apyrexiam certo ægrum perducet; modo assiduus lectuli calor, & intempestivus cardiacorum usus continuitatem febrî non conciliaverint; quo in casu Peruvianum corticem nihil quicquam profecisse plus semel observavi. Neque mihi unquam contigit, ut viderem vinum in quo propinatur cortex (quod jure quis possit suspicari) febricitanti obfuisse; e contra vero, calor, sitis, cæteraque febris symptomata ut plurimum post assumptionem hujus remedii quantitatem sufficientem, mox evanescens, vino haud obstanti. Hic autem observandum, quod quo magis febris sive sponte sua, sive regimine calidiori ad continuitatem accedat, eo major corticis quantitas exhibenda; ita ut nonnunquam viderim morbum hunc non nisi sesquiunciam, vel unciam ejusdem duabus cessisse.

Cum vero sint aliqui qui corticem hunc nec in pulveris forma, nec electuarii, nec randem pilularum ferre queant, his ejusdem infusum in frigido factum propino, *℞ij. sc. Corticis grosse pulverati in Vini Rhenani ℞ij.* aliquandiu macero. Liquor hic per manicam Hippocratis sæpiuscule trajectus, colore limpidus adeo non officit, ut vel delicatolorum palato ardeat; ac dictæ infusionis unciam quatuor ad dies aliquot factâ, virtutem drachmæ unius corticis in pulvere exhibiti videntur continere. Quæ cum nec ingrata sit, nec ventriculum premat, duplo frequentius usurpari poterit, quam reliquæ ejusdem remedii formulæ, nempe donec paroxysmi terga dederint.

Quandoque accidit, ut in hoc morbo male formato, nec dum in typum regularem evecto, æger ob vomituritionem fere continuam corticem deglutitum, quacunque demum forma exhibeatur, retinere nequeat: In hoc casu vomitio prius est compescenda, quam cortex propinetur. Ad quem scopum colligans jubeo, ut sexies vel octies spatio duarum horarum *succi limonum recens expressi Coch. j. cum salis Absint. ℞ij. assumat*. Deinde *Laudan. liquid. gut. xvj. cum aq. Cinamom. fort. Coch. j.* Ac brevi post, si vomitus cessaverit, usum Pulv. Peruv. aggrediatur.

Pro infantibus, quorum ætas tenella vix feret ut alia forma hoc remedium assumatur (saltem ea quantitate qua devincatur morbus) sequens Julapium præscribere soleo. *℞. aq. Cerasor. nig. & Vini Rhenani an. ℞ij. Cort. Peruv. subtilissime pul. ℞ij. syr. Caryophil. ℞j. nif. f. Julap. Cap. Cochleare unum alterumve pro ratione ætatis, quarta quaque hora, donec paroxysmi non amplius discurrant; instillando alternis dosibus, si Diarrhœa adfuerit, Laudani liquidi gutt. j. vel ij.*

Observandum est insuper, quod cum breviora paroxysmorum interstiria in tertianis & quotidianis intermittentibus non satis temporis concedant ad sanguinem febrifuga corticis virtute plene exsaturandum, fieri non potest, ut æger proximum a prima medicatione paroxysmum, uti in quartana solet evenire, certo effugere valeat, sed in his medicamentum sæpe non nisi post biduum promissam curationem absolvet. Animadvertendum autem quod si æger, non obstante abundanti cautela superius radita, nihilominus recidivam patiatur (quæ in quartana ipsa rarius accidit, quam in tertianis, vel quotidianis) ramen prudentis Medici erit non nimium pertinaciter insistere methodo corticis per dicta intervalla exhibendi, sed pro suo judicio aliis modis curationem aggredi, cui præcæteris *Decoctum amarum*, quod appellant, magnopere conducere vulgo creditur.

Dietam quod spectat cæterumque regimen, nec a cibo nec a potu arcendus est æger, qualis qualis is demum fuerit qui ad stomachum facit, fructibus tamen horariis & liquoribus frigidis (utpote & in-

firmandæ sanguinis massæ & febrî postliminio reducendæ admodum conferentibus) semper exceptis. Vescatur itaque carnibus eupeptis & euchimis, & vino modice utatur pro potu ordinario; qua re sola ægros nonnunquam restitui, etiam eos, quorum corpora ob frequentem febris recursum contra corticem quasi communita, salutiferam ejus vim perpetim eludebant.

Neque vero se temere auræ frigidiori committere debet æger, donec sanguinis pristinum vigorem de novo obtinuerit.

Hic autem advertendum, quod cum de febribus intermittentibus olim agens ægrum sublaro morbo sedulo purgatum iri admonuerim, hoc intelligi velim de iis solum febribus quæ vel sponte sua, vel alio sive medicamento sive methodo præter corticem Peruvianum erant debellatæ. Etenim curatio, cum huic remedio, de quo jam loquor, innuitur, purgatione nec eget, nec eandem plane ferr. Ita potenter dictus cortex sine ope cathartico non solum *Paroxysmis*, sed & *Dyscrasiæ* quam corpori iidem inflixerunt, subvenit. Vitandæ itaque ante omnia evacuationes qualescunque, cum vel blandissima catharsis, quinimo enema a lacte saccharato in morbi discrimen certissime, forte in morbum ipsum denuo ægrum conjiciet.

Hic autem commemorare libet, quod sub primis hujus constitutionis annos symptomata quoddam insigne febribus intermittentibus quandoque supervenerit. Nempe earum paroxysmi non cum rigore & horrore, quas postea febris excipit, invadebant, sed æger iisdem plane symptomatibus tentabatur, ac si *Apoplexia* vera laborasset; quæ tamen nihil aliud esset, utcunque hunc affectum æmularerur, quam ipsa febris caput impetens; ut ex aliis signis, ita ex colore urinæ satis liquebat; quæ in intermittentibus ut plurimum rubore saturato extat, qualis cernitur in urina eorum qui iestero laborant, etsi non adeo intense rubet, & pariter sedimentum deponit pulverem laterum fere ferens. Hoc autem in casu quantumlibet evacuationes omnes, cujuscunque demum generis sint, indicari videntur, ad revellendos scilicet ex cerebro humores, ut in apoplexia primaria fieri solet; eadem tamen omnino omittendæ sunt, utpote quæ originariæ hujus symptomatis causæ, febrî nempe intermittenti prorsus adversentur, ac proinde mortem accersant: quod & ipse novi. Ar e contra expectandum donec paroxysmus sponte sua evanuerit, quo tempore cortex, modo citius idem ingeri non poterit, quamprimum est exhibendus, & intervallis ab ejusmodi accessionibus liberis idem sedulo repetendus, usque dum perfecte convalesceret æger.

Nonnunquam accidit, etsi perquam raro, ut senes qui diu hoc morbo antea laborarunt, ac interea venæ sectionibus & catharticis imperite fuerint multati, in *Diabetem* incidant, etiam febre jam perfectè fugata. Etenim cum sanguis eorum abhinc debilitatus assimilandis succis ei illatis prorsus impar reddatur, iidem per vias urinarias crudi adhuc & inconcocti exitum sibi quarunt, proindeque præ ingenti urinæ copia, quoties eam reddunt, excreta sensim vires labefactantur, & quasi substantia corporis per hanc cloacam exinanitur. In hoc affectu, uti & in omni *Diabete*, ex quacunque *προσέσει* originem ducat, curativæ indicationes ad sanguinem invigorandum corroborandum, ac pariter ad fluxum urinæ præternaturalem restringendum, omnino dirigendæ sunt. Ut *℞. Theriac. Adrom. ℞ij. conserv. flaved. Aurant. ℞j. Diascordii ℞ss. Zinzib. condit. & nuc. mosch. condit. an. ℞ij. pulv. e chelis Cancr. compos. ℞ss. Cort. exterior Granator. rad. Angelic. Hispan. Coral. rubr. præp. & trochisc. de terra Lemnia an. ℞j. boli Arm. ℞ij. Gum. Ar. ℞ss. cum s. q. syr. de ros. siccis f. Electuar. de quo sumat ad magnitudinem nuc. mosch. maj. mane hora quinta pomerid. & nocte per mensem integrum, superbibendo seq. infusionis Coch. vj. ℞. rad. Enul. Campan. Imperator. Angelic. & Gentian. an. ℞ss. sol. absinth. Rom. marrub. alb. Centaur. min. & calaminth. an. M. j. Baccar. Juniper. ℞j. Incidantur minutim, & infundantur Vini Canarini ℞v. stent simul in infusione frigida, Coletur tantummodo tempore usus. Vescatur cibis *επιεικούς*, vix. Carne vitulina, vervecina, &c. Abstineat ab esu olerum & fructuum qualiumcunque, & singulis passibus bibat vinum Hispanicum.*

Eadem fere methodo atque iisdem remediis contumax iste & diuturnus affectus, *Fluor sc. muliebris*, sanatur ac *Diabetes* modo dictus, nam utrobique indicationes curativæ eadem sunt, quantumcunque inter se hi duo morbi diffidere videantur. At in *fluor muliebris* curatione venæ sectio celebrata, ac postea catharsis ex *Pil. Coch. maj. ℞ij.* tribus vicibus repetita *Corroborantium* usus præmitti debent, deinde vero per totum processum omnino omittendæ; cum quælibet evacuatio evertat quicquid corroborans substruxerit. Sed hæc obiter.

Hæc habui de Peruviani corticis usu summam dicenda: Neque enim remedium pompæ libuit indulgere: Cum sane qui aliquid cortici adjiciunt præter vehiculum eidem in ventriculum transmittendo necessarium, aut ex ignorantia peccant, ut mihi videtur, aut dolo malo, a quo vir probus ex animo abhorrebit, qui cum pars sit ejusdem communis naturæ, ut *ἀνθρώποις* fraudem faciat, nullo unquam privato suo commodo poterit adduci. Quod superest, si ætati placuisset ad ea animum advertere, quæ annis abhinc quatuor in historia acutorum morborum radideram (quæ & ante illud tempus mihi innotuisse omnino est credibile) quo pacto sc. cortex in interjectis paroxysmorum spaciis debuerit ministrari, rum postea repeti ægro jam convalescente: viverent fortassis haud pauci eorum, quos jam terra tegit, ut ut homines vilipendant tenues, sane illos conatus nostros communi omnium bono dicatos, & monita spreverint ibidem dictata verbis insequentibus, quibus ea breviter continentur, quæ hic fufius explicare visum est, viz.

Curandum est ante omnia, ne premature nimis hic cortex ingeratur, ante scil. quam morbus suo se Marte aliquantisper protriverit (nisi collabescens & jam fracta ægri vires eundem temporis sumendum esse dictaverint) neque enim illud solum est metuendum, ne a propere ejus usu inefficax iste reddatur & spem ægri fallat, sed etiam ne de ægri vita agatur, si sanguinem omni fermentationis nisu se dissipanti derepente injiciamus remoram. Proximo loco, neque Catharsi, multo minus venæ sectione, subducenda est materiæ febrilis pars aliqua, quo liberius cortex suo fungatur munere: cum enim ab utraque labefactetur quadatenus œconomia corporis, eo promptius *teriusque* recrudescunt paroxysmi, evanescente semel pulveris vi. Mihi enim magis e re fore videtur, ut sanguinem dicto medicamine sensim longioreque a paroxysmis intervallo leviter inficiamus, quam ut uno omnino ictu paroxysmum jam instantem tentemus confodere; hoc enim pacto & plus temporis remedio conceditur, quo suum opus plenius absolvat, & evitatur quicquid ibi est periculi, quod ægro poterit.

poterit oriri ex subito isto atque intempestivo nimis sufflamine, quo paroxysmum jam invalescentem atque omni se ope exerentem conamur opprimere. Postremo brevibus istis temporis intervallis repetendus est pulvis, ut non protinus evanescat prioris dosi virtus antequam altera exhibeatur: crebra enim repetitione ista evēgia tandem recuperabitur, profligato insolidum morbo. His adductis rationibus hanc ego methodum ceteris antepono. Peruviani corticis ℥j. cum syrup. Rosar. rub. ℥ij. misceatur; æger vero quantitatem nucis moschatae majoris mane & fere quotidie devoret diebus a genuino paroxysmo vacuis donec confectionem omnem absumpserit. Repetatur porro ad tres alias vires, interjectis semper diebus quatuordecim. Morb. Acut. Sect. I. Cap. V.

Quantumlibet autem cortex supra laudatus in febribus hisce incedendis, omnibus aliis, quotquot adhuc inventa fuerunt, palmam facile præripiat, attamen in *Tertianis Vernalibus*, si modo æger sanguineo temperamento præditus esset, atque etiam ætate floretet, remedia sequentia curationem absolvisse observavi. Ex. gr. Mittatur sanguis e brachio die a paroxysmo libero, & post aliquot horas eodem die exhibeatur Emeticum ex infusione Croci Metallorum; ita tempus præfigendo, ut vomitorium opus suum absolvat ante invasionem paroxysmi insequentis, quo elapso immediate aggrediatur usum sequentium. ℥. Extracti gentian. Absint. & Centuar. min. an. ℥ij. Misceantur ac dividantur in ix. doses, quarum unam capiat quarta quaque hora, superbibendo decocti amari sine purgantibus & vini albi an. ℥ij. est & altera methodus curandi has tertianas, in pauperibus, scilicet quorum facultas proluxo apparatus Medico ferendo non sit. Ut ℥. Serpentar. Virginian. subtiliss. pulv. ℥j. vin. alb. ℥ij. Misceat duas horas ante paroxysmum, & stragulis bene coopertus sudet per tres vel quatuor horas, idem faciendo per duas alias vires paroxysmo ingruente.

* Sequenti anno (nempe 1679.) sub initio Julii eadem febres de novo vires redintegrabant, & quotidie increbrescentes mense Augusto quam immanissime debacchabantur, ac magnam stragem edebant. Cum autem de his jam fufius egerim, nil amplius adjiciam, nisi, quod Novo Epidemico a manifesta aeris crasi pendenti sub mense Novembris prorsus locum cedebant.

Etenim una cum Novembri subingrediebantur Tusses cæteris quas mihi contigit observare annis ἐν δυνάμει, cum in singulis fere familiis universi laborarent. Harum alia opem medicam non magnopere desiderabant; alia vero pulmones ita vehementer agitant, ut æger ventriculi contenta per os ejicere subinde cogeretur, vertigine insuper correptus, a nisu violentiori & laborioso. Primis fere diebus tussis, siccam æmulans, nullam materiam spectabilem exantlavit; mox ætate auctior nonnihil; atque ut verbo expediam, tum in eo quod parcius expectorarent ægri, tum etiam conatu vehementiori, & paroxysmorum duratione ad Tussim puerorum Convulsivam mihi propius accedere videbatur, nisi quod mitius aliquantum sæviret. In hoc saltem convulsivam superabat, quod & febre, & solitis ejus symptomatibus stipata ægrum invaderet, quæ in tussi puerorum nondum me vidisse memini.

Solemne sit licet tusses sub hyemis adventum affligere, mirabantur tamen omnes eas hoc anno ita præter solitum increbrescere: quod quidem hac præcipue de causa arbitror contigisse. Cum mensis Octobris crebrioribus quam solebat, & ferme continuis perma- duisset imbribus, & sanguis hominum tempestati consentiens particulas crudas atque aquosas affatim imbibisset transpiratione per cutis spiracula a primo frigoris insultu prohibita, natura colluviem hanc ferocem vel per ramos venæ arteriosæ, vel, quod alii volunt, asperæ arteriæ glandulas eliminare satagit, & tussis ope explodere.

Curatio rite ut institueretur, quoties scilicet Medico fuit opus, tam per venæ sectionem, quam catharsim evacuandum esse nullus dubitavi. Neque enim alia aliqua methodo æque commode ejiciuntur redundantes feri particulae, ac per phlebotomiam & cathartica, quæ tam insigniter vasa emulgent. Remedia *Pectoralia* quod attinet, (præter quam quod eorum usu gratificamur ægris) non intelligo quo pacto amolendæ tussis causæ queant conferre, cum omniseorum actio, vel in intransigenda materia, quoties iusto tenuior vim expultricis facultatis eludit, vel in eadem attenuanda, quoties ob visciditatem ægrius expuitur, poni videatur. Id certo scio inutiliter in his tantum temporis impendi; nonnunquam etiam sanguinis massam eo usque debilitari a retentis particulis feri naturæ inimicis, pulmoneque insuper tussi irritatos ita conquassari motu violento ac fere continuo, ut non raro via sternatur ad *Tabem*; a cuius insidiis celeritate curationis æger vindicari debuerat. Neque multo tutius adhibentur sudorifica, a quorum usu æger nonnunquam in febrem incidit, nonnunquam etiam particulae sanguinis facile inflammabiles ita pleuræ impinguntur, ut accendatur *Pleuritis*, quod per decursum dictæ tussis epidemicæ ingenti vi hominum cum suo magno periculo contigit.

Sanguinis itaque e brachio eduxi quantitatem moderatam: *Epispasticum* satis amplum ac forte posteriori cervici applicandum curavi, quo materiæ peccantis pars aliqua alio derivari possit. Post hæc Catharticum e lenioribus, infusionem scilicet *Senæ*, *Rhei*, cum *Manna*, & *Syrup. Rosaceo Solutivo* quotidie exhibui, donec vel prorsus convalesceret æger, vel admodum imminuerentur symptomata. Vel, si potio minus ægro arrideret, *Pilul. Coch. Majoran. scrupuli ij.* quotidie devorandos imperavi; hora scilicet quinta matutina superdormiendo.

Hac etiam methodo, phlebotomia scilicet & reperita catharsis, eaque sola expugnatur Tussis Puerorum Convulsiva; malum alias pertinacissimum & pene insuperabile. Alii quid valeant hic præstare plane nescio, me in variis atque omnis fere generis remediis operam non semel perdidisse satis scio. Sed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim sunt ingerenda proratione ætatis. Quæ quidem κατ' ἐπιχρᾶσιν evacuatio eo nomine, ut arbitror, dictæ tussi medetur, quod scilicet, licet non multum humoris ferofi in pulmonibus inveniat, fervidiores tamen & spirituosus halitus e massa sanguinis in pulmones statim temporibus transmissi atrociores illos tussendi paroxysmos in tenellis excitent; horum autem in pulmones impetus haud alia methodo æque sisti posse videtur & præcaveri, atque hac qua motus priori contrarius (per viscera scilicet) morbi causæ conciliatur.

Verum in morbis Epidemicis cujuscumque demum generis sint, (si modo recens adhuc ægrum corripuerint) summopere cavendum,

ne alvus ei ducatur, nisi misso prius sanguine. Qui enim morbi a constitutione aeris epidemica pendent, aut jam febres sunt, aut in earum classem levissima de causa transeunt; cum ex tumultu in sanguine, & humoribus a catharsi, vel lenissima excitato, & subsequente calore facile accendatur febris, quam alias natura propulsasset consuetis materiæ morbificæ evacuationibus; *gravedine* ex. gr. aut Tussi in hoc, de quo jam agimus, Epidemico, aut *Diarrhæa*, quoties febris cum illa faciens epidemice grassatur. Idem potest dici de quacumque alia aeris constitutione, qua corpus ad certum aliquod febris genus determinatur; quæ quidem non semper actu invadit, sed benignioris naturæ ductu morbi fomes e sanguine, mediante evacuatione aliqua ejus genio accommodata, exturbatur. Hoc constanter assero, quantumlibet mos jam obtineat exhibendi cathartica ante celebratam venæ sectionem, vel quod adhuc est periculosius, ea penitus omitta. Licet enim objiciatur sæculentias in primis viis stabulantes toties in vacuas venas propelli, quoties detrahitur sanguis, alvo non prius subducta, certissimum tamen est evacuationem, quam isti præmitti volunt, nullo modo refarcire posse injuriam sanguine illatam a tumultuante cathartico phlebotomiæ præmisso. Atque negari non potest catharticum mox a dempto sanguine assumptum longe mitius vim suam exerere, neque perinde sanguinem, vel calefacere, vel exagitare, atque idem solet si phlebotomiam præcedat. Neque paucos, ex infantibus maxime, vel ob ignoratam hanc rem, vel neglectam periisse existimo.

Atque hoc mihi suffragante experientia multiplici compertissimum est. *Experientia*, inquam, optima duce & magistra, ad cuius leges, & normam nisi exerceatur Medicina, eam prorsus exulare fatius esset. Luditur enim, quod ajunt, de corio humano plus satis, cum hinc Empirici, neque morborum historiam, nec methodum medendi callentes, & Receptis tantum freti, isthinc sciorum vanissimi spem omnem in affectato artis ambitu, & speculationibus utrinque pari fere momento disceptatis ponentes, quasi junctis viribus majorem edunt stragem, quam ederent morbi eorum destituti auxilio. Ea demum praxis, eaque sola ægris mortalibus opem feret, quæ indicationes curativas ex ipsis morborum phænomenis elicit, dein firmat experientia: Quibus gradibus magnus Hippocrates ad cælum ascendit. Et si dicta methodo ars medica a quoquam traderetur, licet morbi unius aut alterius curatio cuilibet & vulgo possit innotescere, integra tamen ars, quaqua patet, homines prudentes, & peritos etiam magis exquireret, quam in statu hodierno, neque, vel minimum Artis honori exinde decederet. Cum enim subtilitas longe accuratior in naturæ operationibus (in quarum observatione vera praxis medica fundatur) quam in arte aliqua, hypothesebus etiam luculentissimis suffulta, inveniat, medendi ars; quam præcipit natura, rude vulgi ingenium longiori intervallo superabit, quam ista, quæ a Philosophia docetur. Fidem hic mihi facient *Febres*, quæ duas e tribus in medicina facienda partes occupant, & quemvis mihi arbitrum constituo, vel mediocriter cogitationibus indulgere solitum, vera dicam necne. Quis enim, vel ex insulsiſſimis Empiricis est, qui se huic morbo curando imparem fatebitur, si id tantum agendum est, ut duabus istis indicationibus curativis, quæ vulgo obtinent, fiat satis? Nempe ut sudoriferorum ope exterminetur materia morbum committens, & symptomatibus eatur obviam, quæ ejusmodi evacuationibus superveniunt. Certissimum enim est, *Theriaca Andromachi*, *Pul. e chelis Canor. comp. Aq. Epidem. &c.* intro assumptis, una cum regimine calidiori sudores posse propelli, quem sibi scopum unice proposuit in hujus morbi curatione, maxime si forte *Malignitatis* nomen auribus usurpaverit. Et ad mitiganda quod attinet symptomata, *Diacodium* in promptu est, quo somnus invitetur, quoties urgent vigiliæ, *Enema* quoties alvus non respondeat, & sic de cæteris. At nec ipse valet comprehendere suo Marte, nec e Medicorum præscriptis ediscere, quæ demum illa sit febris species, quam debellare satagit; si modo credamus (credent saltem forte posteri) varias dari febrium species, quarum singulæ suam sibi methodum medendi a reliquis diversam fere postulant; Unam insuper eandemque febrem, cujuscumque sit generis, uno modo ubi primum aggreditur, atque alio paululum diverso per singulos gradus quousque grassabitur, tractandam esse. Quo pacto indicationes curativas ab hoc vel illo phænomeno minus insigni mutabitur, naturalem morbi historiam ignorans (quæ sola veram medendi rationem indigitare poterit) cum nequeat judicare, an hoc vel aliud phænomenon a curandi quam adhibet methodo, an ab ipso nascatur morbo? Dies deficeret enumerantem varia & subtiliora illa minutioraque, quæ in hoc atque in aliis morbis curandis observanda occurrunt: quæ cum tot sint & tanti momenti ad liberandos a morte homines, semper licebit posteris & feris nepotibus aliquid adjicere iis observationibus, quibus traditur varietas pene infinita operationum naturæ in morborum productione, & curativæ indicationes ex eo fonte depromendæ enumerantur. Non itaque vileſcet ars, si quid hujusmodi lucem aspiciat, quin potius illustrabitur, & difficilior redita nonnisi sapientes & tubacti iudicii viros in filiorum numerum cooptari sinet. Sed hæc obiter.

Tusses modo dictæ, si imperite tractarentur, *Febrem* accendere solebant ei haud absimilem, quæ Hyeme Anni 1675. adeo epidemice grassabatur, & cujus historiam tradidi *Sect. quinta Cap. quinto* libri de *Morbis Acutis*. Sed num febris hæc soboles tantum esset an effectus tussis epidemicæ, eadem ipsa methodo febrem, felici semper cum successu, aggressus sum, quam in tussis curatione supra descripsi; nempe *Venæ sectione*, *Epispastico* cervici appposito, & *Cathartico* deinde tribus auroris exhibito. Quamlibet enim in tussi sine febre nullum præstinebatur tempus, quandiu æger purgandus esset (utpote quæ continuari deberet, ut supra notavi, donec vel prorsus convalesceret, vel admodum imminuerentur symptomata) in febre tamen, quæ a tussi pendebat, purgatio per tres dies instituta ei prorsus debellandæ par erat; quod in constitutione, de qua jam agimus, sæpiusculè observavi.

Hic autem notandum occurrit, licet hanc febrem, quando se primum exerebat, comitarentur defluxiones in pulmones molestissimæ; post mensem tamen unum vel alterum, cum colluvies ista feri sensim e sanguine eliminaretur, febris ejusdem plane indolis hinc inde sine tussi aliqua infestabat (non penitus deleta, sed manente adhuc in sanguine malæ crasis impressione) ac proinde haud diversam curationem ab ea, quam tussis comitabatur, sibi vindicabat.

Verum eodem, quem dixi, modo hæc febris se extendebat usque ad initium anni 1680. quo hæc conscripserim; quo tempore etiam cum anno surgente *Febres Intermittentes* modo dictæ apparere incipiebant. * Exinde vero ad initium usque anni 1685. quo *secundam* hanc nostram *Editionem* jam conficio, eadem adhuc perduravit. Etenim tametsi in hac urbe non adeo epidemice nunc temporis invadunt ac in quatuor primis annis, & mitiores etiam sunt, in aliis tamen locis, nunc his, nunc illis, non minus grassantur ac sæviunt. Atque etiamnum generalis constitutio intermittentibus producendis adeo favet, ut ad hunc usque diem affirmare possim, me ne unicam quidem febrem per hos dies vere *Continuam* vidisse unquam, nisi forte re male gesta in earum classem fuerit evecta, vel una esset *Intercurrentium* mihi dictarum, quod scilicet omni fere anno invaderent. Ita pertinaciter hæc constitutio huiusmodi intermittentibus conducit, cuius certe acies prius est retundenda quam *Continuæ depuratorie* mihi dictæ, epidemice grassari fuerit integrum. Etenim in intermittentium specie natura plus satis festinare videtur, & agendi vehementia iusto citius tempora materia morborum subigendæ, mox etiam despumandæ, debita percurrere: Quod in depuratoria secus accidit, in qua non nisi post dies 13. vel 14. apparent signa materiæ febrilis tandem concoctæ, per sudores subinde, vel potius per *διαπνοήν* paulo plenior, eliminandæ. Hisrite perpenſis nullus dubito quin febres istæ *Depuratorie*, quæ annis 61. 62. 64. regnabant, quasi sæces fuerint *Intermittentium* quarundam, quæ ante id tempus per seriem annorum certam sæviissent, (quanto autem tempore hæc invaluisse haud equidem scio) Cum enim constitutio quæ ad intermittentes faciebat sævitiam suam deponens jam ferme exolevisset, febres quas postea parturiebat, magis humores erant ac terreæ, unde non nisi lente ac pedetentim sanguinem depurare sategerit, quæ in primis constitutionis annis subtilioribus principiis innixæ, atque adeo intermittentium typo indatæ, celeri passu suis temporibus defungi solerent. Quod si res ita se habeat, verisimile mihi videtur, hanc febrem (*Depuratoriam* volo) postliminio reverſuram quam primum præſens constitutio aliquantulum remiserit, eandemque serie quadam annorum permanſuram, antequam *Pestis* eam exceperit. Per annos autem omnes, quotquot demum ii fuerint, quibus febris hæc grassabitur, *Intermittentes* etiam subinde se exerent, ac forſan nonnunquam pro brevi tempore epidemice evadent; quando scilicet manifesta aliqua ætis temperies ad id symbolum suum confert. An huic febrī *Cortex Peruvianus* æque medebitur ac nunc dierum febribus intermittentibus solet, non habeo certo dicere. At in *Peste* atque *Epidemicis Continuis*, quo eandem ordine excipient, debellandis, non alios effectus ex ejus usu expectare licet, quam eos, quos hodie in *Pleuritide*, *Peripneumonia*, *Angina*, ac id genus *Febribus inflammatoriis* videmus, quibus non tantum non prodest, sed & plane obest. Sed utut id fuerit, eo quem diximus modo in posterum epidemiorum alii alios excipient, siquidem natura eundem ordinem, ac per 24. annos ultimo præterlapsos, observaverit.

Atque hæc fere sunt omnia, Vir plurimum honorande, quæ de morbis epidemicis annorum nuperrime elapsorum observavi. In *Rheumatismi* vero curatione (nam & de illo etiam morbo quærebatur) sæpenumero mihi subiit tecum dolere, quod non nisi ingenti sanguinis vi repetitis venæ sectionibus educita, ea possit perfici; unde non tantum ægri vires pro tempore franguntur, sed si paulo fuerit natura debilior, aliis etiam morbis ad annos aliquot obnoxior fere redditur; cum post illos elapsos materia rheumatismum prius committens jam in pulmones depulsa, ægro scilicet frigore perculso, vel alia aliqua *προβόλη* leviori diathesis latens in sanguine jam foras in actum protrudatur. His de causis experiri statui, an nulla alia methodus daretur a reiterata toties phlebotomia diversa, qua hic morbus possit debellari. Serio itaque perpendens, quod affectus iste (ut jam pridem in *Acutorum Historia* subinnui) ab inflammatione videatur oriri, quod tum cætera arguunt phænomena, tum præsertim sanguinis e pertusa vena color, utpote qui *Pleuricorum* sanguini per omnia similis est; tandem vero simile esse judicabam morbum hunc diætâ simplici, admodum refrigerante, & medicoriter nutriente, ægro imperata, æque feliciter atque repetitis venæ sectionibus profligari posset; etiam evitatis, quæ alteri methodo adjugebantur, incommodis: neque me sefellit *Diætâ e fero lactis* phlebotomiæ loco substituta.

Prægressa æstate Pharmacopola mihi in vicinia nomine *Malthus* (vir probus, & ingenio non vulgari) me accersebat. Rheumatismo autem misere cruciabatur his symptomatis stipato. Coxendice primo ad biddum claudicabat, exinde pulmones dolore tentabantur gravativo cum dyspnœa, quæ post aliud ferme biddum evanescebat; dein caput vehementer cœpit dolere, mox etiam coxendix dextri lateris, quæ omnium primo laborabat; posteaque, pro morbi indole, omnes fere tam brachiorum quam crurum articuli per vices molestantur. Cum debiliore esset & sicco corporis habitu, veritus ne minus firmas jandiu vires & labescentes dempto copiosius sanguine prorsus exfolverem (maxime cum ætas eo usque adoleverit, ut jam metus esset, ne superveniens hyems redintegrandis viribus frequenti venæ sectione attritis intercederet) imperavi, ut solo *lactis fero* ad dies quatuor vesceretur æger, quibus elapsis, præter serum lactis pro victu ordinario panem simillagineum concessi loco prandii semel nempe in die, donec penitus convalesceret. Tenui hac diætâ contentus, ad dies octodecim perseverabat, nisi quod postremis eorum alium insuper panem pro cœna indulgerem. Serum autem e *lactis libris octo* domi paratum quotidie infumebat, quo satis bene nutriebatur. Post hos dies cum non amplius urgerent symptomata, & jam sub dio versaretur, carnes etiam permisi, pullorum scilicet elixorum, cæteraque *ὑπερπτα*. Tertio autem quoque die solo lactis fero victitabat, donec tandem pancreaticæ valeret; incommodis quæ supra memoravi hac methodo cluis, quibus decimo abhinc anno pessime excipiebatur, venæ sectione ex meo præscripto in curationis subsidium tunc adhibita ac sæpe repetita.

Si quis hanc methodum tanquam rudiorum & artis laude carentem contempserit, sciat is velim, primo leviora tantum ingenia res quaslibet vilipendere, quod simplices fuerint & aperitæ, dein me, vel imminutæ existimationis pretio, publico hominum bono

inservire paratissimum. Quibus edico quod nisi obstarent præjudicia vulgi, nullus dubitarem methodum jam dictam aliis etiam morbis, quorum impræsentiarum nomen reticere liber, accommodare. Quod sane magis ægris prodesset, quam solemnior illa remedium pompa, quæ in jam moribundis, tanquam bestis, ut mox immolentur, coronatis, male collocatur.

Quod vero etiam ista, quæ pro vilissimis habentur, & nullius sunt pretii, accedente ea, quæ in Medico quæritur, solertia, & *ἀγχινοίᾳ* hominibus ab orci faucibus liberandis queant inservire, exemplo docebo: quod licet ad morbum, de quo jam agimus, nihil pertineat, non tamen prorsus est *ἀπροσδύουσον*, nec ab eo quem mihi proposui scopo alienum. Duobus abhinc mensibus quidam in vicinia me rogabat, ut servum inviserem, qui haud modicam *Mercurii Sublimati corrosivi* quantitatem deglutiverat, sive, ut postea audiui, ex amore *μελαγχολῶν*. Hora fere elapsa erat, a qua venenum hauserat, cum ad eum accederem, jamque os & labia valde intumescabant, vehementer ægrobat, ardente ventriculi dolore, caloreque tantum non confectus: Ego tres *Aque tepide* congios repetitis haustibus summa qua potui celeritate & diligentia ebibendos imperavi; atque ut toties nova ingereretur copia, quoties ventriculus jam ingestam per vomitum ejecerat: volui etiam ut eluerentur intestina, aqua tepida sine ullo additamento copiose per sedem injecta, ubi primum ventris termina admonerent venenum jam per inferiora exitum quærere. Paruit miser, jam vitæ avidus, & plures etiam aquæ libras, quam præscripserim, absorpsit. Amici, qui ægro, utpote in casu insolito, affiderent, ab eo didicerunt, quas primum evomuit aquas gustu perquam acres fuisse, sale scilicet venenato plenius exsaturatas; singulis autem vicibus rejectas aliquam tempus acredinis partem amittere, donec tandem nihil prorsus saperent. Quæ mox urgebant tormina, sola aqua injecta ad modum Enematis leniebantur. Hoc tam nullo rerum apparatu, benedicente Numine, intra paucas horas convaluit æger, nisi quod labia non statim detumescerent, ore etiam a veneni particulis, quæ aquam, quam evomuerat penitus infecerant, adhuc exulcerato. Quæ symptomata *Diætâ a lacte* solo ad quatriddum adhibita mox evanuerunt. Aquam *Olea* (quod hic una cum opere ignari solent perdere) atque aliis omnibus liquoribus ideo prætulī, quod cum ea magis esuriret, exinde magis idonea mihi videretur devorandis salinis hujus veneni particulis, quam alius quilibet liquor, qui vel crassior esset, vel particulis alieni corporis jandiu prægnantior.

Sed ut ad *Rheumatismum* revertar. Utut e fero lactis diætâ conveniat juvenibus, atque iis, qui temperate & cum consilio vixerunt; tamen inconsultum fuerit virilem ætatem prætergressos, vel vino ac aliis liquoribus spirituosius jam a longo tempore plus æquo addictos hac methodo tractare; utpote quæ in huiusmodi hominibus ventriculum labefactet, & pariter præ inusitato frigore sanguini inducto viam sternat ad Hydropem. In hoc igitur casu omnino par est, ut eo fere modo, quem Libri nostri *de Morb. Acut. Sect. VI. Cap. V.* tradidi, curetur æger: Tametsi ex quo eum scripsi, experientia didicerim, satius esse post secundam vel ad plurimum post tertiam venæ sectionem *Cathartica* sæpe sapienter exhibere atque repetere, donec symptomata omnia penitus cessaverint, quam Phlebotomiæ rem totam committere. Etenim ob Catharsin suppetias ad averruncandum morbum Phlebotomiæ ferentem, citra ingentem istam sanguinis jacturam subsistere fas erit: atque porro locus relinquatur *Paregoricis*, a quibus alias, utut sæviret dolor, ægro temperandum esset, cum illorum usu figatur morbus, neque tam facile venæ sectioni cedat. Purgativa vero ista e *Lenitivis* solum consent, ut *Tamarindis*, *Senna*, *Rheo*, *Manna* & *Syr. Ros. Sol.* cum alia, quæ ex *Scammonio*, *Zalapio* &c. parantur, tumultum cieant & dolorem exasperent. At singulis vespertinis post peractam Catharsin *Syr. de meconio* ℥j. aliquantulum temporibus, quam id fieri solet, propinetur.

Hic autem commemorare libet, me per constitutionem instantem observasse affectum quendam modo *Rheumatismum* æmulantem, modo etiam a *Nephritico dolore*, quoad sævissimum lumborum cruciatum non multum abludentem, qui cum febres intermittentes excipere solet, translationi materiæ febrilis in musculosas corporis partes originem suam debebat. Hoc symptoma haud diversam medendi methodum postulabat ab illa, quam morbus ipse, cui adhæret, febris nempe intermittens, sibi vindicabat; cum a frequenti Phlebotomia & quibuscumque aliis evacuationibus exasperaretur illud, atque æger in vitæ discrimen conjiceretur. Quod ut nemini imponat, id attingere volui.

Atque hæc sunt, Spectatissime Vir, quæ in his affectibus, de quibus sciscitari libuit, sedula observatione habeo comperta: quæ si ant tibi placuerint, aut profuerint aliis, mihi cedent ex animi sententia; me saltem pro tenuitate mea debitum tuæ claritati observantiæ speciem exhibere conatum mihi serio gratulabor.

Tibi semper Addictissimus,
THO. SYDENHAM.

Hætenus vidimus Clarissimum Authorem nostrum Constitutiones Epidemicas Londinenses Annor. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. imo ex parte usque ad annum 1685. magna cura describentem. Utinam alii plures eidem studio incubissent! Historia morborum sic minus manca foret, & iisdem recurrentibus constitutionibus in subsequentibus annis, apertior, ac multo facilius daretur via ad morborum per ea tempora vigentium medelam. Verum pauci admodum diligentioris observationis negotium, non parum sane difficile, in se suscipere dignati sunt; inter quos si insigniores aliquot seligeremus, atque hic insertos traderemus, ut sic aliquatenus plenior fieret Constitutionum Epidemicarum Historia, Docto Lectori perutile quid nos facturos opinati sumus. Sunt autem Præclarissimi illi Observatores, quos in Scenam jam producimus, Bernardinus Ramazzini, Lucas Schrochius, Michael Bernardus Valentini; Johann. Jacob. Hæderus; Gustavus Casimirus Gabriel; Conradus Bertholdus Bebens; Rudolphus Jacobus Camerarius; Ambrosius Stegmannus; & Medici Uratislavienses.

* Anni 1680. 81. 82. 83. 84.

BERNARDINI RAMAZZINI

in Mutinensi Liceo Medicinæ Professoris

DISSERTATIONES TRES
DE CONSTITUTIONIBUSAnnorum 1690. 1691. 1692. 1693. 1694.
in Mutinensi Civitate & illius
Ditione.

Dissertatio Prima.

DE CONSTITUTIONE ANNI 1790.

Solemnis Astrologorum, quos Judiciarios appellant, fere ubique est consuetudo, ut cum annus extremo senio confectus est, & ad sui finem properat, illico successuri anni genesim in antecessum describant, & ex astrorum positu illius indolem, genium, mores, num salubris, an insalubris, num frugifer, an sterilis futurus sit, suas Ephemerides evulgando prænuncient. Contraria quidem, sed tutiori methodo mihi visum est incedere, siquidem anni jam exacti naturam, ac temperiem, qui morbi grassati fuerint, quæ remedia praxis salutaria deprehenderit; quæ noxia, compendiosè enarrare constitui, quod institutum posthac singulis annis prosequi mihi in animo est, donec Operis filum abrumpat

— Mors ultima linea rerum.

Id autem ingenuis professoribus nec injucundum, nec praxi profus inutile futurum credidi, quando ars Medica solis observationibus ortum suum, ac progressum debet, majorem quoque in dies habitura, si ea quæ in morborum curationibus nova, & insolita quotidie accidunt, accuratius observarentur. Erit tamen, non secus ac in Astrologorum Ephemeridibus, hic quoque divinationi locus; non enim ea solum quæ hoc anno apud nostrates acciderint, referre satis duxi, sed pensum meum existimavi, ulterius causas disquirere, undenam tam copiosa morborum seges in agris nostris prodierit, ac si non philosophari, saltem divinare, quem exitum habitura sit hæc epidemica affectio. In rebus autem abstrusis, & alta caligine involutis vaticinari quoque humanam imbecillitatem perdere non debet, multoque minus in arte Medica, quando ipse Divinus Præceptor tradidit, *Medicinam, & Vaticinationem esse valde cognatas, cum amborum Artium unus sit Apollo Progenitor.*

II. Exacte perdiscendam *Temporum Constitutionem & quemque morbum, & qui morbus sit bonus, & qui periculosus, aut in Constitutione aut in morbo*, verba sunt, immo Oraculum Hippocratis in libro de diebus Judicatoriis; nam ut ibidem ait, *Plerumque Hominis Natura Universi potestatem non superat.* Nomine autem Universi procul dubio divinus senex aeris potestatem nobis designavit, ex cujus vitio omnes fere epidemiales affectus ortum ducunt. Plurimum autem momenti, tum ad prænoscentos futuros morbos, tum ad eosdem profligandos, & rectam victus rationem instituendam, quæ a morbis vulgaribus optima præservatrix dicitur, plurimum inquam momenti habere, non solum præsentem temporum constitutionem, sed etiam anteaestas diligenter observare, nemo non videt, cum ex iis, tanquam ex sua radice variæ, & insolentes aeris alterationes progerminant, quæ modo hanc, modo illam morbi popularis speciem quandoque inferant. Antequam ergo Epidemici affectus, qui colonos nostros, & Cispadanæ Regionis humiliorem partem afflixit, descriptionem aggrediar, operæ pretium duxi, prægressas constitutiones paulum perpendere.

III. Quatuor, aut quinque annos non vulgaris siccitatis in tota pene Italia præcessisse jam satis constat, quo tempore uberrimus fuit frugum omnium proventus, & satis prospera valetudine in universum uti concessum fuit; adeo verum deprehensum est vulgatum illud, quod *in siccitatibus omnia sint salubriora.* Anno vero huic præcedenti circa Vernale Æquinoctium ingentes pluviae ceciderunt, quæ identidem repetentes totum Veris tempus horridum, & ignavum reddidere. Æstas subsecuta, & ipsa fuit magna ex parte pluviosa. Circa Solstitium signa rubiginis in frugibus observari cœpta, quæ rubigo sensim augescens triticeam segetem maxime corripuit, frumenti culmos usque ad aristam maculis veluti sanguineis adspersens. Eadem pestis fabas quoque, ac reliqua legumina obsedit, adeo ut spem præconceptam de anni fertilitate pauci dies eluserint: solabatur tamen annorum antecedentium felix ubertas, ut venturis temporibus provisa sufficerent. Sub initium Septembris, ac multo magis sub Æquinoctium ipsum largiores pluviae delapsæ, quæ per totum Octobris mensem perseverarunt, ut flumina immensam aquarum vim intra suos aggeres non nisi improbo labore continerint. Postremi duo menses fere impluvii fuerunt, & annum 1689. satis placide clausere. In prædictis constitutionibus non nisi morbi Sporadici observati sunt, nec multa funera annum infestarunt.

IV. Ineunte autem anno 1690. (quem rubigalis lues, fruges & quodcumque fructuum genus depascendo, & febrium Ilias primo rusticanam gentem, mox urbanam quoque corripiendo, nefastum reddidere) constitutio pluvialis postliminio, sed gravior recurrens, ac fere continua, omnium animos obnubilavit. Sic hyemem humidam, nimbosam cum exiguo frigore, nivibus vix delapsis illico tabescentibus ægre transigimus. Martius mensis porro sine pluviiis præter morem, & magna aeris tranquillitate usque ad Æquinoctium exactus animos erexerat, cum Cælum denuo omnes, quas in sinu suo contineret aquas, visum est super nos effudisse. Unius Nyctemeri spatio aquis oppleta sunt omnia, ut hæc Civitas Insulæ specimen præferret. Horret animus agricolarum calamitates in hac magna e-luvione referre, qui

Ducebant senios illic ubi nuper ararant.

Neque id solum visum est in Mutinensi agro, sed etiam in Finalenfi, Mirandulano, & Ferrariensi, qui situs pars olim fuit antiquæ Vallis Padusæ, inquam omnia flumina ex Apennino descendunt a Placentina Urbe usque ad Adriaticum Mare, Strabone teste, exonerabantur, antequam structis aggeribus Padum subire cogerentur; quare in his locis ad longum tempus stagnarunt aquæ, non admittente Pado ad satietatem pleno, non solum circumjacentes aquas,

sed per Scultennam, & Gabellum proprias aquas in agros nostros eructante. Perstitit deinde eadem pluviosa constitutio non solum toto Veris tempore, sed per totam fere Æstatem, ut nulla pene dies sine pluvia visa fuerit. Hinc factum, quod una cum pluviiis flante ut plurimum Borea, nulla unquam Æstas nostro in hoc climate extiterit, in qua remissior fuerit caliditas, ut patuit ex Thermometris, unde nunquam serior fuit frugum maturitas, messe Julio mense præacta. In Barometris quoque observatum est multo elatiorem quam alias fuisse Mercurium, aere crasso, & nebuloso existente, cicadæ hoc anno ut plurimum aphonæ observatæ sunt, illarum loco per totam fere Æstatem coaxantibus ranis; sic pro Vere hyemem, & pro Æstate Ver sortiti fuimus.

V. Nullus annus in his Regionibus pisculentior unquam fuit, quare cum pisces ubique pretio vilissimo prostant, plebs urbana hoc alimenti genere familiariter usa est, multoque magis plebs agrestis, quæ facili negotio propriis in agris, & in ipsis laribus pisces captabat. *Neptuno pro Cerere victum subministrante*, ut de Ichthyophagis scripsit Diodorus Siculus, donec super cibo isto levissimo nascente rusticano stomacho, sicut olim gens Hebræa in deserto, allia, & cœpæ appetere. Ab amico mercatore fide digno, qui Manruanum agrum hisce temporibus peragravit, ut sericum emeret, accepi, rusticos illos ægrotis suis febricitantibus, & nauseabundis allia, & cœpæ coctas pro ferculo præbuisse, quod cum in aliquibus feliciter cessisset, passim exinde hoc remedii genus, tamquam elixir proprietatis, quo mirifice recreabantur, valde ex usu fuit.

VI. Sub initium Junii denuo, sicut anno ante actio apparere signa rubiginis. Vim rubigalis morbi prima persensit Morus, nec illi quidquam profuit ipsius prudentia, cujus symbolum in censu plantarum audit. Mox eadem rubigo, pessimus omnium frugum morbus, & paulatim augescens frumenta, & omnia legumina, sed præsertim fabas occupavit, neque solum in locis humilioribus, ubi computruerant aquæ, sed etiam in editioribus, ut supra viam Æmiliam, & in ipsis Collibus. Luctuosum sane, ac deplorandum spectaculum omnium oculis fuit, campos circumquaque non virentes, sed attritos, & fuliginosos intueri; sicut enim anno huic præcedenti hæc lues rubro colore fruges infecerat, ita hoc anno, *non Creta, sed Carbone notando*, eandem magna atredine respererat. Sic frumentatio pessum ivit, frumento partim a rubigine absumpto, partim ob aquarum colluviem in lolium converso. Sed neque plantarum fructibus, qui Æstatis principio, vel sub Opore maturefcunt, pestis hæc pepercit. Nunquam in tota Estensi ditione uvarum, sicuti rerum omnium maxime ferace, parcius fuit vindemia, botris ab eadem peste paulatim exesis. Nucibus tantum, quarum præter morem ante actis annis magna penuria fuerat, hæc rubigalis lues non nocuit. At neque hortensis familia vim hujus morbi cuncta depauperantis effugit, nam olera fere omnia sydereo veluti afflatu ustulata sunt; adjecta quoque altera clades, nam erucæ, & bruchi hortos omnes depopulati sunt, nudis stolonibus relictis. Melonum, sicuti & reliquorum fructuum, magna fatuitas, ut & ipsa animalia illorum esum quandoque respuerent.

VII. Vix risum forsitan tenebit aliquis, quod res tam minutas adeo curiose persequar; at is sciat, quod magnarum calamitatum non raro exigua sunt signa, &

Sæpe exiguus mus

Augurium tibi triste dabit.

Quemadmodum in re nautica ex levi nebula magnæ tempestatis signa captantur, ita & in re Medica ab exilibus indiciis magni morbi impendentes non raro providentur, quare Hippocrates: *Nihil negligere.* Sic non immerito Cleombrotus apud Plutarchum, Demetrium dicentem, ridiculum esse ex rebus minutis de grandibus facere indicium, arguebat his verbis: *Artem Medicam pestilentem æstatem ex araneorum frequentia prænunciare, atque ex foliis ficulneis, quando Vere Cornices pedem referunt, quis confitebitur qui res pusillas statuatur vestigia non esse magnarum.*

VIII. Pluviosam constitutionem quæ ab anni principio usque ad totum Julii mensem obstinate perfluerat, magna postmodum siccitas per duos fere integros menses excepit: hujusmodi tamen siccitatem non multa caliditas comitata est, & qualis cæteris annis apud nos persentiri solet, præsertim cum *Procyon furit*,

Sole dies referente siccus.

Post æquinoctium vero cœperunt denuo apparere pluviae, ad quarum primum aspectum nemo non expavit, fuere tamen valde moderatæ, & quantum sufficerent ad terram strigiosam ac veluti saxeam ob prægressam siccitatem emolliendam, adeo ut colonorum votis pro desiderata frumenti satione responderit. Ultimi duo menses, sicuti priori anno cum perpetua fere serenitate, & modico frigore quantum prima pars hyemis postulabat, anni cursum absolverunt.

IX. Hæc itaque fuit hujus anni constitutio, omnium non solum vegetabilium, sed etiam animantium naturæ, ut modo videbimus, valde infesta. Quamvis ergo hyems adeo intempestiva fuerit, nihil tamen contigisse scio, quod ad Medicam lancem trutinari debeat, neque id mirum, nam tunc temporis cudebantur morbi suo tempore, & loco erupturi. Epidemicos affectus, non præsentium constitutionum, sed præcedentium esse productum, & sobolem scite annotarunt Montanus, & Vallesius, duo clarissima Medicinæ lumina, idque apertis verbis ipse quoque Hippocrates asseruit: *Cum fieret autem*, inquit ille, *totus annus humidus, & frigidus, & Borealis. per hyemem quidem salubriter degebant maxima ex parte, ante Ver autem multi quidem degebant morboide.* Succedente itaque Verno tempore, ac circa medium Aprilis mensem magna febrium seges in Mutinensi agro intra viam Æmiliam, aliisque proximis locis, ubi diu stagnarant aquæ, ex improvviso caput extulit. Tertianæ omnes intermittentes ab initio fuerunt, & neminem novi, qui in principio hujus epidemici affectus alio febris genere tentatus fuerit. Indiscriminatim rusticolæ omnes, cujuscunque sexus, ætatis, temperamenti, vitæ generis corripiebantur, cum magno horrore, frigore, & tremore, interdum quoque vomitione accedebant hæc febres; copiosi quidem sudores in principio hujus epidemici affectus ipsas comitabantur, qui postea in morbi progressu remittebant; pauci integre judicati sunt, sed omnes fere, qui evasisse videbantur, experti sunt recidivas; neminem tamen hujusmodi febrium genus, licet tam populariter grassatæ fuerint, quod sciam, sustulit. Multoties accidit, ut cum in die intermissionis celebraretur phlebotomia, eadem die febris corripere, & de simplici tertiana duplex fieret. Nec id solum

solum ruri observatum est, sed etiam in oppidis, & in hac civitate, cum eodem tempore oppidani quoque & plebs urbana iisdem tertianis febribus intermittentibus exercebantur, sed longe inferiori numero, ac gens rusticana.

X. Perseverarunt itaque huiusmodi febres per totum Veris tempus cum ejusmodi typo; accedente vero Æstate, in duplices tertianas omnes conversæ, & quæ de novo accesserunt, huiusmodi typum servarunt. Duplici tertiana igitur omnes fere agricolæ eodem tempore laborarunt, quæ quidem ut plurimum intermittens erat, sed valde protracta, ut paucae horæ pro apyrexia numerarentur. Vespere ut plurimum exacerbabantur, illas stipante magno symptomatum satelitio, veluti vomitione, anxietate, capitis dolore, vertigine, in nonnullis stupiditate, in aliis mentis emotione; quod autem non raro mihi observatum est, magna erat virium nocturna prostratio, ac interdum cum asphyxia, ut proximi Silicernio viderentur, mane cuncta hæc remittebant oriente Sole, ad cuius matutinos radios, e lectulis exurgentes se exponebant, ac vitales spiritus ex inexhausto illo luminis, & caloris fonte veluti potabant. Cum hoc anno curiosius rusticatione, quamvis parum tuta, oblectatus fuero, non semel admiratus sum, quo modo ægri, qui tota nocte eum morte luctabant, mane sub porticibus, velut angues ad solem cutem curantes, erecti starent, ac tantum virium iis superfuisset, ut campos etiam peragrarent; persistit tamen in omnibus satis commoda cibi appetentia, quin per sepe non paucos audivi de nimis parca alimonia conquerentes, ac revera huiusmodi febres, quantum observare licuit, fuere magis famelicæ, quam siticulosæ.

XI. Verminatio nunquam alias major fuit, nec solum in pueris, sed etiam in provectioris ætatis hominibus. Memini me vidisse rusticum quendam annorum circiter 40. sub porticu ad solem ex febris accessu rigentem, atque una valde singultientem, a quo cum sciscitatus essem, num vermes rejecisset, ac ille respondisset, se aliquot vermes inferius, ac superius deiecisse, singultum, a cuius molestia se potissimum liberari instabat, a vermibus stomachum lacepsentibus fieri asserui; cum autem forte pulverem Chinæ Chinæ sibi a Medico forensi præscriptum in promptu haberet, permisi ut illum assumeret. Siluit pertinax singultus una cum febre, quæ tamen paucis post diebus rediit, sed sine tam molesto symptomate. Alias postea expertus sum huiusmodi remedii genus in lumbricis puerosum enecandis, quod mihi feliciter cessit.

XII. Sanguis, qui in hac constitutione secta vena educebatur; ut plurimum crassus, & subpallidus apparuit; in nonnullis etiam Icterodes observabatur, quamvis exterius in corpore similis color non floreret. Alvi excrementa in omnibus fere febricitantibus crassa erant, & compacta. Quæ per os rejiciebantur, subacida potius erant, quam amara. Urinæ ut plurimum crassæ, ac turbidæ multumque lateritii sedimenti habentes reddebantur, ac per sepe in febrilibus, in quibus nulla erat cacoethiæ suspicio; hypochondria in omnibus dura, ac distenta.

XIII. Quibusdam, postquam illos huiusmodi tertianæ febres diu exercuissent, apparere parotides, quæ ut plurimum suppurabant; at neque hoc pacto contumacissimæ febres summovebantur. Curavi mulierem utero gerentem, quæ, cum per integrum Septembris mensem febricitasset, obhortida parotide, ac feliciter suppurata, & ad longum tempus perpurgata, nondum tamen, cum jam anni finis imminet, a febre immunis est; adeo contumax, ac pene indomabilis erat fomes; cui hærebant hæc febres. Cæterum nunquam visæ contumaciores febres ad recidivandum magis pronæ, & quæ magis Medicorum industriam eluderent; siquidem nec repetitæ phlebotomiæ, nec purgationes, nec mille alexipharmaca, quæ pleno gutture tanquam manus Deorum Receptariorum Chorus adeo celebrat, quicquam profuere. Immo observatum, citius ac tutius restitutos, quibus nec sanguis ductus, nec purgantia exhibita, nec ullum aliud remedii genus administratum, toto salutis negotio naturæ morborum medicatrici commisso. Felicius tamen cessit, quibus purgationes, & vomitiones præscriptæ, quam quibus pluries secta est vena; ii nanque in deterius semper labebantur. Vidi pauperem agricolam a duplici tertiana ad longum tempus conflictatum, & jam in magno discrimine versantem, cui nec detractus fuerat sanguis, nec ullum aliud remedii genus adhibitum, solo vini generosi potu meo consilio propinati feliciter convaluisse; sic multos alios novi hoc solo cardiaco restitutos, aquæ usu, ac cæteris remediis ablegatis.

XIV. Cum autem huiusmodi tertianæ febres non solum colonos, sed etiam oppidorum majorum, & Urbium incolas, si non tam populariter, saltem eadem contumacia fatigarent, ac usu potius remedium exasperarentur, quam autescerent, mihi visum est hoc anno apud nos contigisse id quod apud Plutarchum legimus in libro de Oraculorum defectu, quod nempe in hac constitutione, quædam Medicæ artis Aracula obmutuerint, dum causam ignorarent, quare præconceptæ opinioni de magna medicamentorum supra morbos quoscunque potestate tertianæ febres intermittentes, ut plurimum citra malignitatis suspicionem, minime auscultarent; quare locum habuit Virgilianum illud:

*cessere Magistri,
Phillydrides Chiron, Amphionisque Melampus.*

XV. Major itaque pars medentium apud nostrates, ut vulgi calumniis, & assiduis ægrorum querimoniis se subducerent, in hac tempestate Peruviani corticis sacram anchoram confugere, at parum prospere; nam in periculosiores scopulos ægrotantes suos per sepe deduxere. Usq. febrifugi per aliquot dies equidem sub dolo cinere latebat ignis, verum postliminio violentior recrudescerebat. Qui tamen peritiores erant, ac rebus ægrotantium magis, quam propriæ ambitioni consultum volebant, *Nabant sine Cortice.*

XVI. Hoc itaque tenore processit febrilis acies per totam Æstatem, ac totum Autumnum, rura, & oppida infestando, frustra *Quartanam sperantibus ægris*, & intervallum aliquod a quotidianis paroxysmis expectantibus; nam pauci hoc anno visi sunt quartanarii; sicuti nec observare contigit synochas illas, vel febres arden-tes, sed solum tertianas, quæ quidem sub finem Autumni, & prima parte Hyemis rariores fuere, sed graviores, intermittentes quidem in principio, sed quæ tandem in continuas, & lentas migrarent, ut plurimum cum solita periodo circa vespertas ægris horrescentibus.

XVII. Febrili huic exercitui, qui stativa castra posuerat inter Padum, & viam Æmiliam, quam transgredi ausus non est (cum in toto illo tractu, qui colles, & hanc viam interiacet, inculcata valetudine, & secuta rusticatione uti concessum fuerit) multi ali-

morbi junxere se comites, qui sporadice vagantes multas prædas agebant, ut alvi profluvia, Icteri, Apoplexiæ, Hydropses, Catarhi præfocativi, aliique affectus. Qui dysenteria hoc anno laborarunt, citius, ac felicius evasere, quam qui diarrhœa.

XVIII. Vim hujus constitutionis viri robustiores, & adulti facilius tolerarunt, minus feminæ, ac pueri, quorum qui infra trimatum erant, fere omnes periire. In solo Finalis oppido plus quam tercentum pueros referunt extinctos, ut ex ejusdem oppidi Necrologio constat. Magna quoque fuit infantilis strages in Mirandulano agro, & Novellariensi. Ad dies aliquot febriles paroxysmos tolerabant, postmodum fiebant Icterici, ac paulo post Epilepticis insulsi- bus correpti occumbebant. Cæterum præ multitudine hominum decumbentium pauci sunt extincti, ac potius ex diuturnitate morbi, & frequentibus recidivis, quam ex febris vehementia succubuerunt; qui tamen fuere superflites magna ex parte facti sunt Icterici, Lienosi, & Cachectici.

XIX. Vim hujus male moratæ constitutionis experta quoque sunt cujuscunque generis animalia, quæ in magno numero interiire; sicut autem in eam quam describit Silius Italicus, quæ sicca fuit, & præservida, *Vim primi sensere Canes*, ita in hac frigida, & præhumida clades pecudum fuit, quibus, postquam per dies aliquot ægro- tasset, veluti per crisin apparebant Variolæ in capite, & collo, ac plerumque ab iisdem excæcabantur; sic quæ ex vehementia morbi non perierant, tandem ex inedia contabescabant. Sues quoque turmatim suffocati moriebantur. Vidit etiam per sepe infelix arator concidere

Inter opus Tauris, medioque recumbere sulco.

Nunquam parcius nobis mellificarunt apes, vel propriis in sedi- bus extinctæ, vel alio migrantes; Bombyces quoque initio quidem catervatim peribant; qui vero superflites fuere in ipso opificio semianimes, & ignavi concidebant. Nimius esset si cuncta singillatim recensere vellem. Extispicium aliquod, pecudum præcipue, quarum major fuit strages, identidem celebrare, ac hariolari quænam esset talium morborum causa, non abs re fuisset, si per tempus licuisset.

XX. Scio non defuturos qui me coarguant, quod ad Veterinariam transgrediar; oblatrent quantum velint, quod talia observare Medicam artem profitenti indecorum nequaquam crediderim. Egit id Medicorum Maximus, quem non puduit scrutari, quare bobus facilius quam cæteris animalibus excidant femora, hæc autem sunt illius verba, nemini, quod sciam, observata; *Bobus tunc magis excidunt femora, cum tenuissimi existunt, sunt autem tenuissimi Boves ad finem hyemis. Tunc etiam maxime luxantur, si tamen, & huiusmodi quiddam in Medicina scribere convenit. Verum convenit utique.* Atqui si celebriores Anatomici tot sectiones, tot experimenta per mortes brutorum agunt, ut anatomiam in hoc genere comparatam, quam in Medicina desiderari dictum erat Sapientissimi Baconis, jam habeamus, cur non licebit quoque illorum morbosos affectus observa- re? Quin Medico Chirurgo licere interdum absque artis dedecore bestiis mederi ostendit Eruditissimus Vir Carolus Patinus in sua elegantissima Oratione in Archi-Lycæo Patavino anno 1682. habita.

XXI. Atque hæc sunt quæ in morbida hujus anni constitutione magna ex parte ipsemet observavi, & quæ ab ingenuis Professoribus, & fidis Amicis mihi communicata sunt, quæ quidem referre prout obvenerint, non magni negotii est, at illorum causas rimari, ac in medium proferre, quæ Jatrosoforum, & eruditorum hominum palato sapiant, hoc opus; audendum tamen pro viribus, ac

Tentanda via est, qua me quoque possim

Tollere humo

XXII. Communes morbos, quos populares, & epidemicos appel- lant a communibus causis progigni extra omnem controversiæ aleam est; Communes autem causæ sunt potissimum aer nobis circumfluvius (aliunde tamen, sive ex superioribus, sive ex inferioribus infectus) communia alimenta mali succi, & aquæ corruptæ. Ex his omni- bus, sed promptius ab aere, tanquam e communissimo fonte, e quo nemo non potare cogitur, morbos quosdam derivari, qui multos eodem tempore afficiant, omnium pariter est consensus. Ad hanc vero nostram ruralem epidemiam excitandam in unum convenisse & aerem viriatum, & prava alimenta ingesta, fas est arbitrari. Pri- mum quidem locum aeri a sua naturali temperie non solum secun- dum anni tempora recedenti, sed particulis humanæ naturæ incongruis ad satietatem pleno, concedendum putarim; secundum autem locum pravis alimentis, & aquis vitiatis. Quamvis autem de miasmate con- tagioso aliqua posset esse suspicio, dum uno in aliqua familia a febre correpto, cæteri paulo post ex eadem febre decumberent, id tamen potius in communem diathesim ad maturitatem eodem tempore eve- ctam, non secus ac cum Autumno fructus eodem tempore matu- rescunt, referendum duxerim, quam in effluviū aliquod contagio- sum, quod e primo ægrotante expirans cæteros afficeret.

XXIII. Quanti autem referat ad bonam valetudinem in aere pu- ro, & fœdis exhalationibus maxime remoto degere, nemo non no- vit; nam sicuti pisces felicius degunt, ac esca salubrior sunt, si in aqua pura, ac sincera vivant, secus vero si in aqua fœda, & corrupta; ita homines feliciorem vitam, ac longæviorē ducunt, si aer sin- cerus sit, secus autem si crassus, & nebulosus; Nec abs re vulga- tum dictum illud, quod tales sint corporis nostri humores, ac spi- ritus, qualis sit aer; hinc iis in locis ubi aer tenuior est ac defæ- cior, vividiora, & acutiora ingenia florere solent, ubi vero cras- sior, hebetiora, ac stolidiora, quare Bæotii, & Batavi antiquitus male audiebant, unde Horatius:

Bæotum in crasso jurares aere natum.

XXIV. Non vacat hic disquirere, quare ad vitam perennandam adeo necessarius sit aeris usus, quomodo in vascula pulmonum se in- sinuet, quid in massa sanguinea efficiat, dum illi permiscetur; circa id infudarunt doctissimi viri ac ultimo Etmullerus in elegantissima sua Dissertatione de abstruso respirationis negotio; solummodo circa illa examinanda immorabor, quæ insignem aeri mutationem inferre possunt, ac illum a sua naturali mediocritate dejicere. Certum est enim, quod si aer respirationi idoneus esse debet, & consequenter ad vitalia munera, necesse est, ut quandam servet mediocritatem, ut neque supra modum crassus sit, nec nimis tenuis; nam si tenuior sit, ac rarior quam par est, respirationi inidoneus evadit, ut Ma- china Boyeliana satis evincit, ac testantur qui in editissimis mon- tibus difficiliorem experti sunt respirationem, quam in imis valli- bus, id annotante Thoma Cornelio; si vero crassior sit, & ad sa- turitatem vaporibus, & exhalationibus oppletus, ad respirationis mu- nus obeundum minime aptus est, immo suffocationis periculum inferre, ut ex

ut ex eadem Machina Pneumatica pater, & metallorum fossiles in fodinis sæpenumero experiuntur, qua de causa Hippocrates *Somnum in frigore cooperto*, ut ipse ait, commendabat, nimirum, ut Valeſius, & Ballonius interpretantur, dormiendum eſſe in amplo conclavi, ſed corpore ſtragulis bene conteſto, qua ratione facilior eſt anhelitus, nec a frigido aere partes ſentientes pungente interturbatur ſomnus.

XXV. Notabiles autem in aere alterationes (non de iis loquor, quæ ſecundum naturæ leges, & varia anni tempora ex neceſſitate fiunt, ſed de intempeſtivis) venti potiffimum, & imbres copioſi efficiunt: Solares enim radii ob æqualem Solis ad noſtrum verticem acceſſum aerem ſemper æqualiter calefaciunt, ſi is aliunde alterationem non ſuſciperet. Haud ſecus terræ exhalationes, ex paludibus, & ſtagnis, ſeu nimis ulgiſoſo ſolo eundem non raro contaminant. In noſtro vero aere a copioſis imbris, & lutulentæ conſtitutione vitiatum fuiſſe, exiſtimandum eſt, ſicuti etiam a ventis Borealiſus intempeſtivum reditum, qui cum Verno tempore, ac per totam ſere æſtatem numquam fuiſſent, Solarium radiorum vim hebetando, vaporum a leni calore elevatorum diſcuſſionem prohibuerint, & volatiles ſpiritus, quos in ſuo ad noſtrum verticem acceſſu Sol quaquaverſum diſſundit, verſus Auſtralem plagam retro pulerint. Ex quo factum, ut iis in locis, ubi ſtataræ fuerant aquæ, aer circa Veris principium tepeſcens, multos vapores, & tetras exhalationes in ſinu ſuo exceperit; aer vero ſic pollutus, ac partibus volatilibus, quæ a Sole promanant, ulterius deſtitutus, dum intia corpora eorum, qui hiſ in locis degebant, admitteretur, totius mæſſæ ſanguineæ craſin, & cæterorum fluidorum ſyſtaſim naturalem perturbavit.

XXVI. Reor itaque a naturali ſuæ dulcedinis, & fluiditatis ſtatu maſſam ſanguineam deſciſſiſſe, & craſſiorem conſiſtentiam, quam par eſt, acquiſiſſe; ſicuti, & proportionem ablatam inter bilem, & ſuccum Pancreaticum, illa quidem languidiori, hoc fortiori reddito. E Cælo potiffimum volatiles ſpiritus in terram deſluere, e terra vero, utpote ſuccis mineralibus reſerta, continuo acidas particulas ſuſſum efferri, ingeniouſum eſt clariſſimi Sylvi excogitatum, ſed rationibus, & experimentis confirmatum. Quare cum in huius anni pluviouſa, & frigida conſtitutione aer partium volatiliſum, & ſpirituouſarum magna penuria laboraret, aliaque ex parte acidis particulis e terra lutulenta, ac veluti fermentata elevatis maxime abundaret, mirum non eſt, ſi poſtmodum intra vitæ hōſpitia exceptus talem diatheſim induxerit, e qua tam magna februm propago emanavit. Acidam vero dyſcrāſiam potius, quam biliouſam, & alchalinam in univerſum prævaluſſe, duo potiffimum evincunt; primum, quod hoc anno in tam ampla februm ſegete nullam ſynochum, nullam febrem ardentem obſervare contigerit; alterum, quod huiusmodi febres, ut plurimum, veluti ſuperius annotavimus, potius famelicæ fuerint, quam ſiticolæ.

Nec miretur quiſpiam, quod tertianæ febris naturam ex prædominio acidæ mineræ potius deducam, quam alchalinæ, qualis cenſetur biliouſus humor; nam ex quanam materia, quæſo, in hac conſtitutione tam horrida, procelloſa, ac media æſtate frigida, poſt uſum ciborum pituitoſi ſucci, ex quanam materia, inquam, tanta bilis copia gigni debuit, quæ ſufficeret ad procreandam tam numeroſam februm ſobolem, ac illam tandiu alendam? Nec deſunt Profeſſores celeberrimi, qui ab hoc non multum diſſentiunt, inter quos Etmullerus, qui pro cauſa proxima tertianæ febris intermittētis ſtatuit fermentum ſalino acidum, in legitimis quidem magis volatile, & activum, minus autem volatile, & ſubjecto viſcido irretitum in noſtris.

XXVII. Præter aeris malam conſtitutionem, tanquam huius epidemici affectus comuniſſimam cauſam, aliæ quoque, nec parvi momenti in idem conſpirarunt, ſcilicet ut humores ad acidam dyſcrāſiam diſponerent; nimirum prava alimenta ingeſta, ut fruſtus horrei a rubigali lue vitati, nimia piſcium ingurgitatio, edulii genus noſtris agricolis inſolens, in quorum ſtomacho cibus fortioribus aſſueto facile putreſcebat, hoc eſt facile aceſcebat, cum nullo evidētiore ſigno putreſcentia ſe prodāt, quam per acorem; hiſ addi poſſunt puteales aquæ ex nimia illuvione cœnoſæ, & ſemiputridæ, ac denique Boreales venti, qui acidi nitroſi Promuſcondus appellantur. Ex hiſ itaque communibus cauſis, ceu ſontibus, harum februm originem probabilius, quam a quacumque alia deduxerim; neque enim ad cæleſtes influxus recurrendum, quaſi aſtra maligniori lumine ruſticanam gentem potius, quam urbanam, veluti innocentiores aſpicerent, cum præter id, improbabile ſit, quod cæleſtes influxus tam arcto ſpatio potuerint circumscribi, ſicuti neque ſubterraneæ exhalationes culpari poterant, cum terræ motus nullus præceſſerit, neque in hac noſtra magna planitie Ciſpadana, & Tranſpadana extent antra, & terræ hiatus charonei, e quibus perniciouſa effluvia poſſent erumpere, & aerem inquinare.

XXVIII. Quod ſpectat ad cauſam internam, quam conjunctam appellant, hæc non niſi craſſam, & viſcidam pituitam, cui acidum fermentum hæreret, referenda erat, vel ſtabulantem in ſtomacho, ut placet Etmullero, vel ductus laterales Pancreatis obſtruentem, ut ſtatuit Sylvius, quæ materia in venas tranſfuſa, & partibus ſpirituouſis ſanguinis permixta febrilem efferveſcentiam excitaret; ut enim cruoris maſſa effœta ſit, & vapida, ſemper tamen aliquid oleoſi, & ſulphurei continet, quod ad ſtammulam vitalem alendam ſufficiat. Focus itaque febrilis hoſpitabatur extra vaſa ſanguinea, quemadmodum in febris omnibus periodicis, cum alioquin perdifficile ſit intermittentes febres ab iis quæ vere continuæ ſunt diſtinguere, cujuſmodi febres ignis nomine divinus Præceptor inſignire conſuevit, ut ex variis hiſtoriis in libris Epidemicorum videre eſt. Non enim concipi poſteſt, ajeat ſcientiſſimus Carteſius, quanam poſſit eſſe circuitus cauſa, niſi materia quædam, quæ maturatione indigeat, antequam maſſæ ſanguineæ miſceatur, quæ per venas ad cordelata potis eſt tot excitare turbas, & febrilem tempeſtatem ciere, quæ non alio pacto ſedetur, quam eadem hoſtili materia ſub forma ſudoris per corporis ambitum diſcuſſa, vel per urinarias vias ablegata.

XXIX. Rarum quidem eſſe, quod tertianæ febres epidemice ex aeris vitio obſerventur, ait Doctiſſimus Etmullerus, ac revera febres, quæ alicujus pravi ſeminii in aere latentis ſoboles ſunt, nulum certum ordinem ſervare ſolent, multoque rarius eſt, quod ſint de genere intermittētium: hoc anno tamen huiusmodi februm genus in hiſce Regionibus populariter graſſatum fuiſſe, tam ruri, quam in oppidis, (quamvis poſtea ob diuturnitatem in continuas, & lentas migrarent) ſat perſpectum eſt. Haud abſimilem conſtitutio-

nem, quæ in Anglia anno 1658. ac magis per rura, & pagos, quam per oppida, & Urbes deſcendit, Doctiſſimus Willis in ſuo Tractatu de febris deſcribit; ſuæ tamen febrilis epidemice originem, & cauſam procatarticam non in aeris vitium Vir ille peritiſſimus reſert, ſed potius in prægreſſam conſtitutionem nimis æſtuoſam, & illi climati inſolentem, febrem tertianam intermittētē epidemiam obſervavit quoque Celeberrimus Batholinus Haſtiaz, anno 1652. ſed & ipſe illius cauſam calidiſſimæ, & ſicciſſimæ æſtati, præter mo-rem, & conſuetudinem illius Cæli adſcribit; hanc vero noſtram ruralem epidemiam lubet referre in conſtitutionem præhumidam, ac frigidam huic Cælo inſolitam, ac ſimul in aerem ob cœnoſam colluviem vitiatum. Si enim huius epidemici affectus cauſa eſſet ex totius anni intempeſtiva conſtitutione, quæ frigida, & procelloſa toti pene Italiæ communis fuit, non ſatis conſtat, quare hic popularis morbus, in humilioribus tantum locis, ac ubi ſtagnarint aquæ, ſedem fixerit, & non amplius ſpatia occupavit; cum tamen Incoiæ cæterarum regionum, quæ ab huiusmodi atmophæra remotiores erant, (ut totus tractus ſupra viam Æmiliam verſus colles) nunquam alias a febris magis ſecuros ſe vixiſſe meminerint.

XXX. Qua de cauſa porro, a conſtitutionibus tantæ ſiccitatis, quales, ut dixi, ad plures annos experti fuiſmus, ad conſtitutionem imbrum adeo ſeracem talis factus fuerit tranſitus, certe hic mihi hæret aqua, ut dici ſolet, & ad hanc veritatem eruendam Delio notatore opus eſſet. Nullus proſecto Aſtologorum, qui ex imaginariis aſtrorum configurationibus futuros rerum eventus prædici poſſe exiſtimant, tam magnam illuvionem prædixit, neque poſtquam facta eſt, rationem ullam attulit, cur ita fieri deberet. Sint utique aſtrorum in hæc inferiora influxus, quos velle negare magnæ dementiæ eſſet; at modus quo agant, id omnino indeprehenſibile eſt. Recte quidem Ptolomæus in libro qui *Aliaſta* inſcribitur, ſtellarum effectus incertos eſſe, & varios pronunciavit, quoniam incertum eſt qua ratione materia ſubjecta influxum recipiat. Obſervandas quidem magnas temporum mutationes, æquinoctia ſcilicet, & Solſtitia, ut in illis *neque medicamenta exhibeamus, neque uramus, neque ſecemus*, pluribus in locis monuit Hipp. ſicuti etiam conſiderandos exortus Canis, Arcturi, & Plejadum occaſum, nam ut idem ait, *morbi hiſ maxime diebus indicantur, aliis perimunt, aut in ſpeciem aliam tranſmutantur*; quare vero tam magnæ altercationes, tum in magno, tum in parvo Mundo diſtis temporibus ſtant, ſcrutari velle, id eſſet mere divinare. Satis ſit igitur quoad rem noſtram, quod hoc anno tam magna, & inſolita aquarum inundatio morboſam hanc conſtitutionem invexerit, contrario proſus modo, quo in Ægypto votiva Nili inundatio, miraculi ad inſtar, ſolet peſtem abigere, quamvis Alpinus mutationem illam aeris in ſalubriorem ſtatum ad Nili incrementum ſubſequentem in eteſias videatur potius referre, quæ tunc temporis Sole ſignum Cancrī ſubeunte, & ſeptentrionali plaga ſumigante, flare incipiant, & Campſinos ventos peſtis veſtores repellant. Quæcumque ea cauſa ſit ob quam Nilus, Ægypti Pincerna, ſalubritatem invehat, certum eſt tamen, ad illius incrementum morbos populariter graſſantes deſcere, & in magna illa inundatione demergi, adeo verum eſt illud Cæſi: *Differre pro natura locorum genera Medicinæ, & aliud opus eſſe Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia*. Annus jam agitur centeſimus, ex quo haud abſimilis inundatio Ciſpadanam, & Tranſpadanam Regionem occupavit, unde poſtea ſubſequeſta eſt ſumma annonæ caritas, tritico in lolium converſo, ut reſert Paulus Craſſus Corrigienſis in doctiſſimo ſuo libello de Lolio; Inchoarunt autem tunc temporis circa Maji principium pluviæ, quæ poſtea per totam æſtatem obſtinatiſſime perdurarunt. Obſervantur itaque per intervalla quædam eadem temporum conſtitutiones recurrere, ſive in aſtrorum vim nobis ignotam id referamus, ſive in juſtam Dei viſdictam, qui ſicut olim Univerſali Diluvio totum Orbem puniit, ita particularibus eluvionibus quaſdam particulares Regionem aliquando pleſtat.

XXXI. Rubigalem ſuem non exiguum operam ad morboſam hanc conſtitutionem conſuliſſe ſuperius dixi; at ne id gratis, ac veluti diſtatorie pronunciſſe videar, libeat in diſquirenda, & examinanda rubiginis natura paululum immorari. De rubigine multa quidem veteres ſcripſere, at de illa ſecundum ſuæ Philoſophiæ ſyſtemata ratiocinati ſunt; In ſacris quoque Codicibus rubiginis ſit mentio, cum aliquando hac, velut iræ ſuæ miniſtra, Deus populo ſuo fruges, & fruſtus omnes ademerit, ut illum ad bonam frugem perduceret; nonnulli vero ex recentioribus de hac peſte aliquid ſcripſere, ut Ruſcellius, Levinus Lemnius, Ludovicus Vives, Langius, ſed ea quæ a veteribus ſcripta fuerant recoxere. Vegetabilem itaque familiam ſuis morbis laborare, iſque diverſi generis, multoſque graviſſimos Auſtores de iis ſcripſiſſe, ut Varronem, Plinium, Columellam, alioſque jam ſatis perſpectum eſt. Rubiginem vero, frugum omnium, & fruſtum communem morbum, ut illam Theophrastus appellat, adeo exhorruerunt antiqui, ut ad avertendam hanc peſtem ſibi Deum ſinxerint, quem Rubigum, teſte Varrone, appellabant, unde Rubigalia feſta emanarunt, quæ a Numa Pompilio Regni ſui anno XI. referente Plinio, inſtituta ſunt, & ad 7. Cal. Maji celebrabantur. Maſtabant autem lactentem Catulum in huiusmodi ſacrificio, unde Columella:

Hinc mala rubigo virides ne torreat herbas,

Sanguine lactentis catuli placatur, & extis.

Litabant autem lactentem catulum eo quod a Rubigali Numine, mediante maligno Canis ſyderis influxu putarent hanc labem in terras immitti; quare cæca ſuperſtitione ac non niſi habita ratione nominis, id agebatur ſacrificium, ut ingenue Ovidius:

Pro Cane ſydereo canis hic imponitur Aræ,

Et quare id fiat, nil niſi nomen habet.

XXXII. Rubigalia itaque ſacra, ſicut & Floralia, ut cuncta bene deſtoreſcerent, inſtituta ſunt, ac celebrari ſolita, ſub finem Aprilis, propterea quod huiusmodi tempore a rubigine frugibus, & fruſtibus valde metuerent, occidente tunc temporis Cane, ſydere per ſe vehementiſſimo, qui occaſus ex Plinii obſervatione tunc in 4. Cal. Maji incidebat. Obſervabant autem veteres multa attentione Canis occaſum, ubi nos vix ortum, qui perſæpe credimus eodem tempore ubique inchoare dies caniculares, veluti non raro doctos alioquin, & celebres Profeſſores, ita quidem, ſed turpiter ſentientes, audire contigit, cum tamen juxta diverſam latitudinem, quam variæ regiones habent, varii ac diverſi ſint aſtrorum ortus & occaſus, quod non ignotum Galeno, qui tradidit, eodem quidem tempore omnibus

in plagis fieri tum Æquinoctia, tum solstitia, astrorum vero ortus, & occasus communes esse iis solum qui sub eodem vertice habitent.

XXXIII. Hanc pestem Græci *Ῥυβίνη* Latini Rubiginis nomine appellavere, sive a rodendo, ut Varroni placet, seu quod rubro colore fruges inficiat; Uredinem quoque seu Carbuncularem morbum vocavit Plinius, quod fruges exurat, veluti hoc anno contigit, cum fruges, & plantæ omnes carbuncularent, ut Pliniano vocabulo utamur. Hos equidem rubiginis noxios effectus observare, & contemplari licuit; at quænam sit hujus pestis natura, & indoles, non tam facile est decernere. Sapere ignis naturam, seu acrimoniam lixiviale, & alchalinam ex sale acri, & volatili, proclive quidem esset asserere; ac multa obstant, ne in hanc sententiam eam. Gigni rubiginem ex rore, sed vitiato, serenis noctibus, vel in plenilunio, vel interlunio; quibus temporibus luna frigidius lumen ad nos reflectit (cum in plenilunio, Æstivo tempore a nostro vertice multum absit, in interlunio vero totum lumen, quod a Sole recipit, eidem regerat) antiquorum fuit opinio; cui recentiorum quoque non pauci subscribere, inter quos Ludovicus Vives in doctissimis suis Commentariis in librum D. Augustini de Civitate Dei, ubi scripsit, *Rubiginem esse Rorem putrefactum, fruges tenues corrumpentem, & friantem*. Generari utique rubiginem ex rore, serenis noctibus, (cum ros non decidat nisi sereno Cælo) & silente luna, veritati valde congruum videtur; nam re vera sub initium Junii prope interlunium, signa rubiginis observari cepta in frugibus, plantarum foliis, quæ parvis maculis nigricantibus distincta, punctulari morbo laborare videbantur; argumentum evidens inusmodi stigmata a roris guttulis, ubi diu hæserant, fuisse inusta.

In rore (quem lunæ, & æris filium Alcmon dixit, & raritate ita appellatum Isidorus tradidit, eo quod non sit crassus ut pluvia) multum liquoris volatilis salini, ratione cujus abstergit, & alvum solvit, omnes docent Chymici, qui pro egregio menstruo ipsum commendant ad extrahendas omnium vegetabilium tincturas: ex eodem quoque tradunt elici spiritum, qui ad metalla dissolvenda efficac sit, quo spiritu utebatur Cnosellius ad parandam coralliorum tincturam, ignita corallia in roris spiritum projiciendo. Vim hujus salis sentiunt, qui manibus rorem tractant, aut nudis pedibus per campos, & prata rorulenta incedunt; nam manus, & pedes scabræ fiunt, idque ob salinas, & nitrosas particulas, quæ cutim arrodunt. Vi quoque pollere graciliora reddendi corpora tradit Plutarchus, ac propterea mulieres habitiores illius usu nimiam polysarciam emendare. Sale saccharino pariter divitem esse rorem ut multis morbis opituletur per analysim, & per ignis examen se deprehendisse testatur Helmontius. Multa de roris viribus scripsit in doctissimis suis Animadversionibus Excellentissimus D. Joseph Lanzonus, Medicus Ferrariensis, cui non parum debeo, quod ea quæ in hac constitutione ipse observavit, mihi per literas benigne communicavit.

XXXV. Hæ sunt nativæ dotes matutini roris, ac præsertim Majalis, in salubri tamen constitutione, ac solo minime uliginoso, nec palustri; at si ex malis temporum constitutionibus, & noxiis afflatus, seu pravis e terra exhalationibus ros vitietur, in rubiginem degenerat malum, quo nullum noxius est, & cui ait Plinius, *non comparantur grandines, neque procelle, quæ nunquam annonæ intulere caritatem*. Gigni rubiginem itaque ex rore existimo, dum multa nitrosa, & acida corpuscula e solo elata, & per aerem undequaque dispersa, salinis particulis, quibus naturaliter ros abundat, fociantur, quæ simul in magno aeris receptaculo fermentata, & exhalata, modo nobis imperceptili, in liquorem coeant, qui postea sub forma roris deciduus & plantis inhærens, eandem maculis diversæ coloris sugillet, uti apud nos factum his duobus annis cum in priori, plantæ omnes, & fructus rubris veluti peticulis, hoc anno vero nigris laborare viderentur. Præpollere aquæ in rubigine acrimoniam acidam, & corrosivam, haud absimilem aquis stygiis, & spiritibus nitri, & vitrioli, longe verisimilius, quam alchalinam ex sale acri, & caustico, quando nulla causa animo fingi possit, quæ in tam remissis caloribus hujus constitutionis unctionem, & acredinem accerere potuerit.

XXXVI. Neque huic meæ opinioni quicquam refragari S. Scripturæ auctoritatem crediderim, dum apud Amos Prophetam fit mentio rubiginis his verbis. *Percussit vos in Vento urente, & in Ærugine, multitudinem fructuum vestrorum, & Vinearum vestrarum, Oliveta vestra & ficeta comedat Eruca*. Cum non magis Austrini flatus sua caliditate, quam

----- *Boreæ penetrabile frigus adurat*.

XXXVII. Displicet quidem, quod eo tempore quo sæviit rubigalis lues, aliquando experimento non pertentari, ut certius illius naturam explorarem; siquidem nimis sero animum subiit cogitatio de hac rurali epidemia, & rubigali peste describenda. Non destiti tamen, quin postmodum variis experimentis pervestigarem, num ea quæ mente excogitaram veritati congruerent; expertus itaque sum variis liquoribus modo acidis, modo alchalicis, & lixivialibus, plantarum folia, flores, & fructus aspergendo, attente observans, qui inde color emergeret; folia itaque recentia fabarum, quæ apud nos circa finem Octobris feri solent, spiritu vitrioli irroravi, & non multo post flaventes maculæ, ubi guttula liquoris hæserant, apparere; placuit autem magis in fabis experiri, tum quia in hoc leguminis genere vim suam magis exercuit rubigo, tum quia Theophrastus testatur, *Fabam inter legumina magis æruginem sentire*. Fabarum itidem folia liquore alchalico, & urinoso, ac lixivio acerrimo adpersi, neque notam ullam alicujus coloris inuri deprehendi. In aliis quoque plantis, ac variis oleribus, ut foliis lactucæ, brassicæ idem pertentavi, & ab acidis spiritibus seu vitrioli, seu nitri, flavas maculas prodire, nunquam tamen nigras, observare contigit. Rubiginis itaque naturam in acida potius acrimonia quam alchalice lubet statuere. Congruunt autem huic meæ opinioni ea quæ in strage animalium evenere; nam, præter malam aeris diathesim brutis quoque noxiam, ob pascua rubiginosa sanguine acidiori reddito, ac in motu suo præpedito, vel subitæ mortes integros greges pecorum sustulere, vel obortæ sunt Variolæ, quas ex sanguinis stagnatione fieri, dum in orbem agitur, communis est recentiorum opinio. Tubercula autem illa quæ in capite, collo, & cruribus pecudum viscebantur, revera Variolas fuisse, licet profecto asserere, quando nec figura, nec colore, nec liquore in illis contento, nec magnitudine, nec modo quo solvebantur, post suppurationem nigra crusta supersisteret, quicquam a puerorum variolis discrepabat. Ni-

hilo. secius eadem pascua infecta cæteris animalibus cladem intulere. Sic apes haud amplius ex florum calicibus nestareum laticem, sed acidum delibantes, partim extinctæ sunt, vel alio suas colonias transfulerunt. Pariter neque mirum, quod hoc anno cicadæ ut plurimum taciturnæ fuerint, cum, præter remissum æstatis calorem, qui illas ad cantum nequaquam ciceret, vel nutritum rorem nascæ non fuerint, (si tamen verum quod rore pascantur) vel quod majori ex parte perierint. A cicadarum obmutescencia malas temporum constitutiones prænunciari, scripsit Doctissimus Mercurialis, qui anno 1577. observavit in Agro Patavino, aut nullas, aut rarissimas cicadas cecinisse, unde postea gravis subsecuta est epidemia. Cicadas autem reipsa rore nutrirî fabulosum non esse reor, etenim non in arboribus pernoctare, sed super solum ipsum, & in aprico loco ad rorem facilius excipiendum, mane autem ad solis ortum super arbores evolare ex agricola quodam didici; a quo cum sciscitatus essem, quare in villa quadam, quæ Roboretum dicitur, pene Gabellum flumen, tanta sit æstate cicadarum copia, ut illic hujusmodi infecti genus suum habere videatur emporium, id fieri dixit ille, quia solum illud arenosum sit; in quo facilius quam in solo argilloso parva foramina efficiant, in quibus deponant ova pro fœtura in secuturam æstatem.

XXXVIII. Hæc omnia itaque rubiginis naturam satis in propatulo statuere videntur, luem mehercle, & animalibus, & plantis valde perniciosam. Quare autem solæ nuces rubiginis noxam non senserint, id fortasse in causa fuit, vel quod hujusmodi fructus gemino operimento sit munitus, vel quod corticalis substantia multo sale volatili abundet, qui diversam indolem ab acido possidet. Succum e viridi cortice nucis juglandis, tanquam remedium a se repertum, & magnæ virtutis ad faucium phlegmonas tollendas, multis laudibus extollit Galenus; putabat autem ille, talem effectum præstare hunc succum, eo quod vi adstrictoria polleret, & simul tenuium esset partium, ex tinctura pene ineluibili, qua manus tractantis inficit, partim tenuitatem deducens, vim autem adstringendi a salubri effectu, quem observabat, dum inflammationi moderetur; pro rato enim, ac veluti lege habebatur, quod in principio phlegmonis utendum esset repellentibus, & adstringentibus, ne pars ob laxitatem fluentem humorem tam facile reciperet, quod etiamnum apud non paucos Professores frequenti in usu est, quod num recte, an perperam fiat, non est hujus loci disquirere. Hujus succi efficaciam ad inflammationes sanandas agnoscunt quoque recentiores, vim autem adstrictoriam prorsus negant, iuno vim dissolventem ipsi adscribunt, inter quos Leonardus e Capua, qui corticem nucum viridum multo sale volatili divitem esse ait, & qui potis sit grumos sanguinis dissolvere, & illius acetositatem emendare, quo pacto non sanguinis fluxum in partem adstringendo prohibet, sed sanguinis refluxum per venas ad cor referendo promovet. Sicuti autem priscis ignoscendum, si ob ignoratum sanguinis circularem motum, non aptas interdum naturalium effectuum ætiologias asserant, ita nostro huic sæculo gratulandum, de quo verius pronunciare libeat id quod de suo ævo scripsit Plinius, scil. *Non minus ingeniosam fuisse antiquitus observationem, quam nunc rationem*. Ex nucum viridi cortice parari decoctum in Auglia expertæ virtutis ad luem Gallicam perdomandam, quam Recentiores omnes in acidi prædominio statuunt, nuper accepi a Cl.D. Nathan Lacy Medico Anglo, & insigni Anatomico. Cum itaque nucum putamen multo sale volatili abundet, mirum non est, si rubigini obliterit, & inclusum nucleum a communi lue præservarit. Atque hæc de Rubiginis natura, & indole.

XXXIX. Modo superest, ut symptomatum, & quarundam observationum perquirantur causæ. Adnotatum, vespertinis horis has febres exacerbari consuevisse, una cum virium nocturna prostratione, ut ægri morituri viderentur, mane vero oriente sole, velut redivivos tantum virium habuisse, ut e lectulis exurgentes deambulant. *Quale est vesperi exacerbari, tale ipsius morbi, & cujusque constitutionis ad se mutuo ajebat Hipp.* Vespertinæ itaque exacerbationes morbi naturam superius descriptam, & causas morificas satis indicabant. Virium autem dejectionem noctu factam, & matutinam earum veluti redintegrationem in solis recessum & accessum, & acidæ dyscrasiæ prædominium referendum putarim; Sole namque occumbente, & volatiles spiritus per aerem dispersos secum trahente, spiritus vitales sanguinis ab acido coagulante figebantur; unde facultatum omnium torpor, qui porro ab iisdem solaribus radiis matutinis discutiebatur, non secus, ac quando a brumali frigore fluentium aquarum cursus noctu intercipitur, qui postea a sole novo lumine terras lustrante, restituitur. In hac rerum universitate nihil esse utilius sale, & sole scripsit Plinius; sic Celsus Leucophlegmatia laborantes soli subijci oportere ajebat, utendumque frictione manibus aqua madefactis, cui sal, & nitrum, & olei paulum esset adjectum. Mirum itaque non erat si in casu nostro a blando solis calore liquato veluti pituitæ gelu, cruor solitum cursum per sua vasa repeteret, & consopitæ facultates ad consueta munia exercenda revocarentur.

XXXX. Præ cæteris notatu dignis observavimus inexpugnabilem harum febrium contumaciam, ut non solum omnem Medicorum industriam eluderet (cum neque venæ sectionibus, neque purgationibus, neque cardiacis quicquam auscultarent) sed usu remediorum magis exasperarentur, quod factum existimo ob malam aeris diathesim, quæ morbum aleret; quare licet etiam opportuna remedia quandoque adhiberentur, nihil remittebat morbus, imo sæviebat magis, ac satius profecto fuisset multis hanc Camarinam non movere; tanti est Oraculum illud Hippocratis, quod initio hujus Differtationis attuli, nempe *Hominis Natura interdum universi potestatem non superat*, quæ Hippocratis verba si medentes attente perpenderent, tot medicamentis ægros non fatigarent, in epidemicis præsertim effectibus, quorum vera curatio non innotescit, nisi cum busta plena fuerint.

XXXXI. Venæ sectio profecto in his febribus non fuit saluberimum remedium, nec quemquam novi, de quo dici potuerit cum Galeno, quod illius febris sanguinis missione jugulata fuerit, quin ubi pluries celebrata est phlebotomia, magis attritæ sunt vires, & febres magis protractæ ægros vel ad mortem, vel ad cachexiam deduxere. Cur autem in his febribus tam improspere cesserit sanguinis detractio, obviam est arbitrari, massam sanguineam sale volatili, & particulis spirituosissimis ob malam aeris diathesim, & diætæ errores effectam, per venæ sectionem pauperiorem redditam, unde

major acidi præpollentia, & bilis depressio consequeretur, febrisque exinde protractior fieret. Venæ sectionem febribus intermittentibus non esse per se aptum remedium, cum de foco febrili, qui extra vasa sanguiflua larem habet, nihil detrahat, commune est recentiorum assertum, sed solummodo per accidens convenire ajunt, quatenus obviam iri possit multis symptomatibus, ac periculis, quæ in corpore præsertim plethorico nimiam effervescentiam sublequi possent, scilicet inflammationes, & vasorum disruptiones, qualis fuit casus a Ballonio memoratus de quodam nobili viro, cui tertiana febre laboranti ob neglectam sanguinis detractionem ruptæ sunt venæ in quarto paroxysmo, & tanta foras sanguinis excretio est consecuta, ut eo ipso die illi obeundum fuerit. In hac vero nostra rurali epidemia sanguinis effervescentia non adeo magna fuit, ut de ejusmodi periculo metuendum esset, imo potius lenta, ex acidi prædominio, & propter bilem enervatam, quæ in confluxu cum succo pancreatico, & cum lymphâ minus efferveret: propterea V. S. non adeo proficuum fuit remedium, ut in prægressis præcedentium annorum constitutionibus, quas valde siccæ, & æstuosas esse diximus, quare cum in iis valde turgeret bilis, & sanguis facile exardesceret, mirum non erat si tunc adeo conferret V. S. & a periculis percaveret, quæ nimiam sanguinis effervescentiam, & rarefactionem committantur; assueti autem Professores venam facile tundere ubi constaret esse febrem, ac nullum alium scopum sibi præfigentes, quam solam caloris febrilis attemperationem, in hac constitutione a cæteris toto Cælo diversa, repetita venæ sectione utentes, ægros persæpe in extremam perniciem præcipitarunt. Nollem equidem quod quis me inter hæmophobos recenseat, sed nec inter hæmatochitas numerari velim. Est ubi liberaliter sanguinem demamus, est ubi parce, est ubi nihil, licet sit eadem affectus species. In Stymargi famula usque ad animi defectum sanguinem detraxit Hipp. licet frigido affectu laboraret: rationem autem addidit; *Oportet enim, inquit ille, devenire ad occasionem, & occasionis initium.* Causa morbi nimirum est attendenda, ex qua potissimæ desumuntur indicationes. *Similitudines parere errores etiam bonis Medicis, contrarium autem facere causam, monitum est ejusdem Hippocratis, nam re vera cognita causa, non tam facile a recto tramite, & legitima curatione deflectitur.*

XXXXII. Quærit idem Ballonius, Practicus olim Celeberrimus Parisiensis, cur phlebotomia febres quasdam miraculi ad instar tollat, alias potius exasperet? Paucis quidem respondet, at illius verba ponderanda sunt, non numeranda. *Febres, ait ille, aliæ sunt venosæ, aliæ gastricæ, id est quedam phlogosim sequuntur potius venosi generis, quam vitium humorum in præcordiis contentorum; quæ venosi sunt generis, hæc primo quoque tempore per phlebotomiam cessant, quæ alii sunt generis non facile phlebotomia solvuntur, contra potius cathartico egent.* Tales erant tertianæ istæ intermittentes hujus nostræ constitutionis, erant enim potius gastricæ, quam venosæ, ac propterea ad venæ sectionem magis exacerbabantur, & contumaciores fiebant, attamen prospere cesserunt purgationes, & vomitiones usu emeticorum, quibus non raro penitus avulsus est febrilis fomes. Claudam hunc locum digna animadversione ejusdem Ballonii in eos, qui ut nil non agant, ex quacumque re occasionem captant mittendi sanguinis. *Nam si induxerint in animum (inquit ille) venam referare, & id cunctanter faciunt, figittula sanguinis e nare fluat, tunc quasi trophæum reportantes, clamant oblatam legitimæ phlebotomiæ occasionem; si luculenta sit hæmorrhagia, audacius secant, quia naturam copiam gravari ajunt, si infra modum sanguis fluat, compensandum istum defectum aperitione venæ contendunt.*

XXXXIII. Non minus disquisitione dignum est cur in hac constitutione tam sæpe contigerit, quod tertiana simplex in duplicem migrarit ea ipsa die, qua secta est vena. Id olim observarunt Amatus Lusitanus, & B. Castellus, nec quenquam scio, qui præter hos hujusmodi phænomeni, quod aliquando in praxi observatur, mentionem habeat; refert autem Amatus cuidam juveni 25. annorum tertiana febre laboranti, cum venam die intermissionis secisset, vespere febrem ex simplici factam fuisse duplicem, hujusce rei rationem reddit his verbis: *Nec enim credere est, ob sanguinis extraktionem, ex simplici duplicem factam fuisse, cum dubio procul nisi sanguis extractus esset, in tertianam continuam futurus erat morbus:* hujusmodi excusationis genus plerique Medicorum nostris etiam temporibus in promptu habent, quotiescumque ex aliquo male administrato remedio pejor æger se habeat; statim enim obtrudunt, quod multo deterius se haberet, nisi tali remedio usus fuisset; meliorem itaque Æthiologiam, & ævo nostro accommodam perquiramus; puto ergo in illo casu (sicuti & in nostra constitutione) culpandam potius venæ sectionem, quam febrem, quæ ex sui natura proclivis esset, ut in tertianam continuam migraret. Refert Amatus juvenem illum vigente Autumno ægrotasse, sanguinem in prima pellicula exceptum atrum fuisse, in secunda rubicundum sine ulla aquositate; & rationi congruum est igitur in illo juvene ob prægressos æstatis calores, partes magis spirituosas, & volatiles sanguinis absumptas, ac postea massam sanguineam Autumnali tempore in acidam dyscrasiam degenerasse, eo prorsus modo, quo vina postquam per æstivos calores ebullierint, Autumno facile acefcunt (ut ex atro sanguine prima pelliculæ, nam sanguis secundæ rubicundior erat, quia arteriosus) secta itaque vena, & systasi cruoris magis debilitata, ac depauperata, mirum non fuit si acidum prævalens, ac veluti sine adversario licentius insultaret, ex quo tertiana simplex in duplicem transierit. Convaluit autem Juvenis illé post bonam purgationem ex pharmaco, nam febris illa fortasse fuit potius Gastrica, quam Venosa. In hac vero constitutione non ab exhaustu spirituum ob nimium æstivi massam sanguineam acorem contraxisse arbitror, sed potius ob frigidam anni constitutionem ac diætæ errores, obruta bile, & concentratis partibus cruoris magis spirituosæ, acidum stomachi fermentum, & succum pancreaticum magis viguisse, & post celebratam phlebotomiam vim majorem acquisivisse, unde febris simplicis in duplicem tertianam fieret conversio.

XXXXIV. Culpanda itaque potius in his casibus est venæ sectio quam aptum remedium, quam quicquam aliud, quod idem fuisse existimo B. Castellum (si recte memini, & in Adversariis meis bene adnotavi) in aureo suo libello de Abusu venæ sectionis, quem libellum mihi olim Romæ ostendit D. Antonius Maria Rubéus, Præceptor meus, Vir Doctissimus, & immensæ Eruditionis, aderatque Excellentiss. D. Hieronymus Brasavola nunc Romæ Professor celeberrimus & mihi conjunctissimus, cum tunc in Urbe ageretur, quare in-

terdum contingat, quod tertianæ simplices, sanguine die intermissionis detractio, duplices evadant. Opponet, scio, aliquis harum febrium propensionem ut in duplices transirent, cum sponte, ut superius dictum, sub initium Æstatis tertianæ omnes simplices duplices factæ fuerint; at regeram ego, nullas fere duplices tertianas toto Veris tempore vifas esse, tum ruri, tum in hac urbe, nisi eas quas venæ sectio geminavit, quare non video, quomodo ab hoc crimine phlebotomia tanquam innocens possit absolvi.

XXXXV. Eandem ob causam, nihilo secius quam venæ sectio, noxius fuit in hac constitutione aquæ usus; etenim in frigida, & humida tempestate, bile valde refracta, & acido exuberante, quid opis expectandum erat in his febribus ab aquæ potu? non nisi meracle, ut aqualiculo infracto, & distento, Cacoehylia cumularetur, sanguis pigriori lapsu per sua vasa fluere, ac tandem Cachexiæ, & Hydropes succederent. Novi juvenem in hac Civitate, qui in Hydropem ascitem incidit, cum illi tertiana febre laboranti suavisset Medicus, ut biberet quantum vellet, imo interdum coegisset. Succurrit mihi in hanc rem Terentianum illud, ubi Medicus in scenam inducitur.

Quod jussi ei date bibere, & quantum imperavi date.

Mox hac revertar.

Multoque magis noxius fuit hoc anno aquæ usus, ac ruri præsertim, quod ob pluviarum assiduitatem, aquæ cœnosæ, & graveolentes essent; in hac vero urbe non adeo gravem noxam intulit aquæ usus; hæc enim civitas purissimos habet fontes, & admirandæ originis, quorum fontium historiam brevi editurum me spero. Invaluit autem apud nostrates opinio, quod venæ sectioni, & aquæ potui, tanquam duabus solidissimis columnis, tota curandarum febrium moles innitatur. At num id recte? Profecto in hac constitutione neutrum ex usu fuit. Haud sum nescius scripsisse Hippocratem, *Aquam non præstare bonum alimentum igni;* at nomine ignis intellexit Hippocrates febres continuas, & essentialiter tales, non vero intermittentes, summam Venosas, non Gastricas. At forsitan aliquando si otium suppetet, de aquæ abusu in febribus aliquid conscribam.

XLVI. Verum quali potu, inquit aliquis, utendum erat in his febribus? Ego certe vini usum raro, quod sciam, interdixi, imo suasi, ut modico vino uterentur, eoque non olygophoro, sed mediocriter generoso, multoque ab orci faucibus hoc solum cardiacum eripuit; Bilis enim erat potius acuenda, quam sufflaminanda; & partes sanguinis spirituosæ in motum ciendæ, quod præstare poterat vini usus, & ea remedia quorum vis in alchali volatili sita est, quod solo naturæ ductu in agro Mantuano fecere agricolæ, qui suis febricitantibus allia, & cæpas cum salubri eventu præbuere. Morbos quosdam chronicos, prævis eduliis (sed quæ vere in centum medicamentorum, casu potius, quam arte repertorum reponi debeant) aliquando sanari compertum est; sic diuturnas quartanas allii usu cum multo meraco sanatas observarunt Antonius Benivenius, & Amatus Lusitanus. Vini autem generoso, potius quam tenui, utendum duxi, nihil metuens a febrili effervescentia; in hoc enim sæpius peccatur, quod rem agi sine periculo creditur, si vinum tenue in diuturnis febribus, & chronicis morbis permittatur; at hujusmodi vina ut plurimum acidiuscula sunt, & acorem sanguinis exaltando, morbi causam deteriore efficiunt; quem errorem notavit olim Crato, qui in podagra sicuti vinum meracum, sed in modica quantitate commendat, ita vina tenuia improbat, quæ venas multa ferositate impleant, quod idem sentit Willis: sicut enim a vini spiritu dulcificantur spiritus salis ac nitri; ita quoque a vini generosioris temperato usu sanguis ad acorem vergens dulcescit. Variantibus itaque temporum constitutionibus varianda est methodus, & ut ait Sulmonensis Poeta.

Nam quoniam variant morbi, variabimus artes,

Mille mali species, mille salutis erunt.

XLVII. Sic neque Peruviani corticis usus hoc anno, ut superius adnotavimus, admodum salubris fuit: immo in extremum vitæ discrimen ægros non raro deduxit. Id ego in non paucis observavi, sed præcipue in nobili virgine, quæ cum ad 40. dies duplici tertiana conflictata fuisset, & post solita remedia administrata, ex meo consilio, assentiente quoque Excell. D. Antonio Abbate Serenissimi Ducis nostri Archiatro, Chinam Chinam sub forma boli assumpsisset, cum in vino infusam respueret, postmodum stupida, & comatosa evasit, cum pulsu adeo exili, ut vix perciperetur, ac trium dierum spatio in tali statu perstitit, donec soliti paroxysmi redeuntes stuporem discusserint. Insalubrem autem fuisse hujus remedii usum crediderim, eo quia, cum massa sanguinea multis cruditatibus scateret, ac crassiorem haberet consistentiam (ut ex sanguine per venam sectam educto satis patebat) ideoque segnis esset ad motum, quotidiana illa febrilis effervescentia esset loco remedii, qua cessante, fieret quædam veluti in vasis stagnatio, & congelatio, unde functionum animalium torpor, & vitalium quoque interceptio; adeo verum est illud Celsi, quod febrem lentam interdum augere oporteat, *fortasse enim, ait ille, curationi opportunior fiet.*

Scio equidem, hujusmodi doctrinam non solum plerisque Medicorum, sed etiam aliis, qui artem Medicam non profitentur, esse suspectam, ut ipsi Senecæ, qui beneficium sanationis levioris morbi factæ a graviore morbo exprobrat his verbis: *Multi quos auxerant morbos, & irritaverant, ut majori gloria sanarent, non potuerunt discutere, aut cum magna agrorum vexatione vicerunt.* In hac tamen constitutione experientia ipsa satis evicit, febrilem effervescentiam stimulantem potius fuisse, quam frænandam, & usum calidorum magis profuisse, quam frigidorum; sicuti in historia Poly-cratis, vice versa, frigida magis, quam calida juvissse scripsit Hippocrates, ianuens hoc dicto Divinus Præceptor, non tanti faciendum præconceptum de natura morbi iudicium, ut illud ipsimet experientia in contrarium reclamanti velimus præferre. Observatum est tamen feliciore eventu exhibitam Chinam Chinam agrestibus, quam oppidanis, & urbium incolis; Gens enim rusticana ubi tantillum a morbi falce levata est, illico laboribus, & exercitiis se dedit; quare non erat metuendum, ut tam perniciosi effectus in iis consequerentur, quales in urbanis observabantur. Sic Doctissimus Ertmuller tradidit: non tam facile pati recidivas post assumptum hoc febrilem homines exercitiis, ac laboribus deditos; sicuti desidiosos, & otio innutritos. De hac nostra itaque constitutione libet proferre id quod olim de quadam simili scripsit Hippocrates ingenua certe confessione, more tamen magnorum viro-

rum, & magnam rerum fiduciam habentium. Nihil memorabile proderat, non ventris turbatio, non venæ sectio, neque quæcumque alia tentavi.

XLVIII. Nullas febres synochas, vel ardentes hoc anno, quod sciam, observatas diximus, sicuti paucas quartanas: de prioribus quidem non est quod miremur, nam partibus spirituosius, & ad conflagrationem aptis non adeo turgebat massa sanguinea, imo crassius & frigidius succis abundabat: sic vina tenuia, & acidiuscula non tam facile fervorem concipiunt, veluti vina generosa, ubi æstivum calorem senserint; magis quidem mirum est, quod in tanta febricitantium frequentia tam pauci visi quartanarii, idque magis, si verum esset quod nonnulli asserunt: non nisi ex majori visciditate materiæ differre quartanas a tertianis, consuetam itaque febrem quartanæ generum animadvertens, & huiusmodi febrem, tanquam fructum Autumno maturentem, considerans, cujus uberius est proventus, cum Æstas magis fervida ac torrida præcesserit; præterea rationi congruum est, quod in hac constitutione frigida, & humida, in qua non multum fieret partium serosarum per cutis poros diffusio, succum pancreaticum ad eum fixitatis gradum, qui ad quartanarium circuitum requiritur, evehi non potuisse, seu quidquam aliud defuisse, quod humana imbecillitas assequi nequit, cum nihil sit quod ipsos medicinas proceres magis transversos agat, quam pervestigatio causæ, cur statis horis recurrant febriles paroxysmi, ac tam exacte, ut ipsa automata aliquando superent.

XLIX. Verminationem in his febribus satis familiarem, & præsertim in rusticana gente superius recensuimus, cujus rei causam fuisse reor, tum prava alimenta putrefactioni obnoxia, qualia fuere pisces, & fructus horæi; tum ventriculi fermentum ex mala constitutione vitiatum, & inproportionatum ad cibum recte subigendum; quare vermium seminibus, seu ut lubet ovulis, quæ in alimentis ipsis laterent, integris manentibus, & a tenui calore fortis, mirum non fuit si facile in magna copia prodierit verminosa soboles. Usum Chinæ Chinæ valde proficuum ad necandos vermes expertus sum, quod præstare ob insignem amarorem, quem possidet hic cortex, non abs re crediderim, si tamen tutior est praxis, quæ verminosos affectus curat per aloetica potius, quam per saccharata, & mellita. Haud sum nescius apud nostrates quoque facta fuisse experimenta, & observatum, quod lumbrici in aqua ubi dissolutum fuerit mel, vel saccharum, citissime moriantur, in amarissimis vero liquoribus ad integros dies vixerint; ast ab iis quæ extrinsecus apparent, medicamentorum vires metiri velle, non adeo tutum existimo, quin errandi periculum subsit. Suspiciari enim licet, quod medicamenta propinata, quæcumque ea sint, iis quibus armantur viribus cito spolientur, dum primo cum stomachico fermento, cujus vim transmutativam nemo non novit, mox in intestinis cum bile, qui humor suapte natura ferox est, & cum succo pancreatico spiculis armato congregari debent; quod si ulterius pervadant, cum lymphâ quoque in communi receptaculo iisdem sit concertandum. Sic crocus Martis, qui aperitivus dicitur, ut notat Junchen, nisi acidum superfluum reperiat in ventriculo a quo solvatur, adstringens evadit. Id ipsum quoque testatur Chirurgia Infusoria, qua constat, quod liquor purgans in venas canis infusus magnam excitat purgationem, nullam vero, vel paucam si per os idem liquor, vel in majori dosi, injiciatur, idque ob acidum copiam quo caninus stomachus abundat, quod acidum vim catharticam, & emeticam potenter infringit. Hanc ob causam venena quædam, ut ait Celsus, non gustu, sed vulnere nocent, & psylli e serpentum moribus venenum innoxie exugebant. Quot vero, & quantas subeant mutationes medicamenta per os assumpta, dum varias corporis regiones præterlabuntur, ingeniosissime explicat Bellinus, ut nihil præstantius. Reor itaque ex medicamento assumpto, & succis quibus commiscetur, gigni novum concretum, & quo illæ operationes, quæ postea consequuntur, promanant, & quæ solius medicamenti efficaciam solent adscribi.

L. Postquam huiusmodi febres miseros ægrotantes diu fatigassent, diximus nonnullis apparuisse parotides, quibus licet suppuratis, eadem tamen pervicacia febres persistant. Idem quidem magnam humorum crudelitatem in toto venoso genere significabat; sed hanc non esse potissimam harum febrium causam, & fomitem satis demonstrabant, qui fomes, in ventriculo, & pancreate præcipue sedem fixerat. In nonnullis pariter post multos febriles paroxysmos supervenerunt diarrhææ, ac dysenteria, irritata ad expulsionem natura, tum a copia, tum a pravitate succorum; neque enim hæsitati locus, quin etiam aliquando malignum quid subesset in his febribus, quamvis intermitterent; plures tamen sustulit diarrhæa, quam dysenteria, eo quod forsitan in iis qui diarrhæa laborarent communicata esset labes massæ sanguineæ, quæ serum acre per glandulas intestinales excerneret; in iis vero qui dysenteria vexarentur, mali fomes esset extra venas, viscida nempe, & acida pituita intestina abradente, & excoerente. Frequentes porro fuere recidivæ non solum ob diætæ errata, sed ob communem causam, aerem nempe vitiatum, qui febrile miasma ad aliquod tempus consopitum in novos motus, & exorbitantias ciceret; eandem quoque ob causam adeo contumaces fuerunt hæc febres, cum nihil sufficeret ad abstergendam labem illam, quam aer continuo inspiratus fere inelutibilem redderet; adeo gravis est morbus, quem Cælum fecerit. Sic pacari non visa est affectio, nisi cum sub anni finem humidæ, & nebulosæ tempestatis sicca, & serena successit: quare sicuti ex Hippocrate: *Quicumque morbi Æstate auferunt, Hyeme desinere solent*, idque non nisi ob naturalem temporum mutationem; ita in hoc epidemico affectu optimi remedium loco esse cepit aeris in vitalem temperiem restitutio.

LI. Præ multitudine ægrotantium tam ex genere agresti, quam urbano paucos interiisse superius monuimus, quod sane præter opinionem medentium contigit, qui majorem stragem pertimescebant. Duas potissimum ob causas in epidemicis affectibus pereunt homines, vel ob humorum διαχυσιν vel εἰσιν ut ipsis vocibus Hippocraticis utar, id est vel ob massæ sanguineæ diffusionem a sale acris, & alchamico factam, vel ob ejusdem concretione, ab acido exuperante, frequentiora tamen funera sanguinis διαχυσιν, quam εἰσιν soler inferre; propterea, grassante pestilentia, ut plurimum acida primas tenent. Cum ergo in hac nostra constitutione acidum quidem præpolleret, sed non earum esset virium, reluctantem præsertim febrili effervescentia, ut potius esset lethalem stagnationem inducere, ac fluxum, & refluxum sanguinis prohibere; hinc est quod, licet hominum myriades eodem tempore decumberent, pauci in libitina censebantur.

Sydenham Opera Medica.

sum venerint. Sic mirum non est, quod scæminæ, & pueri ob molliorem habitum, & vitam minus actuosam, hujus epidemici vim magis senserint, ac multo magis lactentes pueri, in quorum venis, ob lac vitiatum, & ad coagulationem aptum, facilius sanguinis statio succederet, sic narrat Hippocrates in quadam constitutione, *ex laborantibus mortuos esse maxime pueros, adolescentes, vigentes ætate, glabros, subalbidos, & qui in socordia vixerint*. Fiebant autem pueri ictერი ob hepar obstructum a viscida pituita redundante, ac a febrili calore in motum concitata, quæ in hepatis substantia defixa, bilis secretionem prohiberet, cujus signum erat, quod in omnibus tensum, ac durum hepar persentiretur; sero autem acris, & acido in cerebri membranas transfuso, convulsi moriebantur, morbo alioquin pueris familiari, sed huic constitutioni magis proprio, utpote valde aptæ ad acorem massæ sanguineæ conciliandum.

LII. Si vero quærat aliquis, cur hæc mala constitutio agricolarum magis, quam oppidanorum, & urbium incolas vexarit, videtur satisfieri posse dicendo, potissimam causam fuisse aerem a fœdis exhalationibus vitiatum ob nimiam illuvionem, quæ campos, & agricolarum domos inundavit, non sic urbes, & oppida in editioribus locis posita; huic causæ addi poterit victus pravus, & insalubris, ac præsertim nimia piscium ingurgitatio, alimenti genus colonis nostri insuetum, & quod in illorum stomacho facile putresceret. Scio equidem a non vulgaribus Medicis pisces ægris quoque exhiberi solitos, tanquam laudabile alimentum, ac multo magis sanis corporibus, verum, ut ait doctissimus Plempius, illorum usus *Athletis non convenit, non castra sequentibus*, non agricolis addam ego, quibus utilior est caro bubula, & suilla. Id ipsum testatur Galenus, qui piscium usum in hominibus otiosis, senibus, & ægrotis commendat, non sic vero in iis qui corpus exercent; his addendum, quod sicuti pisces, qui in rapidissimis fluviis capiuntur, ex Athenæi sententia, omnium sunt optimi, ita hi essent omnium pessimi, quod in aquis stagnantibus fieret illorum captura.

LIII. His quoque causis accenseri possunt labores, & exercitia sub assiduis imbris, unde pororum cutis restrictio, sudoris paritas, ob frigidam, & humidam anni intemperiem, cum alias per Æstatem sub assiduis laboribus copiosissime sudare consuevisset, quas causas in oppidanis, & civibus, qui meliori victu utuntur, nec aeris injuriis sunt ita expositi, non tam facile quis reperiat. Sedes præterea hujus ruralis epidemici e civitatibus, & oppidis majoribus circumscribi videbatur; quare Mutina, & Regium, eo quod essent veluti in circumferentia, & apennino proximiores, minus hanc labem sentire; magis autem Ferraria, & oppida Mantuanæ ditionis, Pado proximiora, ubi major fuit infantilis clades, quemadmodum a variis Professoribus, ac aliis per literas accepi. Magna vero hæc placentias his locis circumscripta, & tota colonis oppleta, in cujus sinu ad longum tempus stagnarunt aquæ, hujus epidemici affectus sedes, ac domicilium fuit.

LIV. Circa cæterorum affectuum examen, qui has febres comitati sunt, quales fuerunt apoplexiæ, epilepsiæ, catarrhi præfucativi, cachexiæ, & hydropes, non multum immorabor; ejusdem enim constitutionis soboles fuerunt, & acidi prædominium significabant, vel sanguinem, & reliqua fluida coagulantia, vel nervosum systema occupantis; hæc omnia itaque verissimum esse Divini senis oraculum comprobant, quod *Morbi in pluviarum multitudine magna ex parte fiunt, febres longæ, alvi profluvia, putredines, morbi comitiales, apoplexiæ, & angina*.

LV. Ut autem circa res venturas Conjectoris quoque partes agamus, superest videndum, num sperare liceat, postquam pacata est non parum hæc affectio, an in totum ea desitura sit, an potius hæc eadem, vel deterior exsuscitari possit. Sperare licet utique, malam hanc constitutionem emendandam, cum postremi hi duo menses cum perpetua fere serenitate, & aeris tranquillo statu annum jam clausissent; nam, ut ait Montanus: *Tempora consequentia secundum naturam existentia corrigunt vitia precedentium præter naturam existentium*; at metus subest ne ob aliquam annonæ caritatem infelices coloni, qui ad sedandam latrantis stomachi rabiem atro pane, & consufano uti cogentur.

(Nam tener, & niveus, mollique siligine factus
Servatur Dominis)

Metus inquam subest, ne proximo Vere, & Æstate novis calamitatibus vexentur. Sic in Æno Civitate Thraciæ, ex Hippocrate, *usu leguminum continenter utentes Fœminæ, & viri, crurum impotentes fiebant*, quam historiam citat Galenus, aitque sæpe evenire, ut ob caritatem annonæ exitiales morbi oriantur. Vox λιμῆς, quæ famem significat, non nisi per solam diphthongum discrepat ab ea quæ perniciosam epidemiam denotat, unde effluxit dictum illud *Εκ λιμῆς Ἀνίμω*. Quamvis enim edulia mali succi videantur aliquando sat bene concoqui, attamen ut egregie monet Galenus, *Nobis non advertentibus, pravus succus ex ipsis post longum tempus in venis colligitur, qui postea exiguum ad putredinem occasionem nactus febres malignas accendit*. Quodcumque malum avertat Divina Clementia, & priorem salubritatem huic Cælo restituat.

Talis fuit Anni MDCXC. apud nos Constitutio, atque hæc indoles Epidemici Affectus, qui Colonos nostros, & Urbanos quoque afflixit, divinarunt jam Astrologi pro suo lubitu, & ex syderalibus schematibus Anni, qui modo successit, præfagia deduxerint, quod ego ejusdem, postquam cursum suum absolverit, si fata dabunt, medicam historiam conscribam.

BERNARDINI RAMAZZINI

Dissertatio Secunda.

DE CONSTITUTIONE Anni 1691.

Ruralem epidemiam, quæ præcedenti anno Mutinensis agri, & proximarum Regionum colonos graviter afflixit, urbana epidemia hoc anno excepit, quæ nihil urbanitatis, immo insolentia plurimum in infelicem plebeculam potissimum exercuit. Instituta itaque meo inhærens prægressam constitutionem, qualiscunque ea fuerit, in fine cujuslibet anni describendi, eo libentius id exequar, quod hæc constitutio ab ea, quam superiori anno experti fuimus, toto cælo differens satis uberem materiam suggerat mentem exercendi, quando in

D

re me-

re medica nil foret utilius, quam succedentes sibi ad invicem constitutiones conferre, ut recta medendi methodus institui posset, quoties eadem tempora, ac iidem morbi recurrerent. Quæ si attentius a professoribus observarentur, non esset forsitan, quod medicina comparata desideraretur, sicuti anatomiam comparatam desiderari aiebat sapientissimus Verulamius, quæ si haberetur, ut ille ait, & individuorum interiores structuræ ad invicem componerentur, non tam pro morborum causis culpantur humores, quam mechanicum viscerum artificium, quod cum ut plurimum inemendabile sit, omnem medicam opem, & magnos promissores sæpissime eludit.

II. Superioris anni constitutio, ut in mea Dissertatione super illam edita, ob assiduos, & copiosos imbres impense humida, & lutulenta in universum extitit, unde gravis epidemia una cum annonæ caritate effluxit; hujus anni vero constitutio ex opposito maxime sicca, & pulverulenta, primo quidem ob aquilonares ventos, postmodum vero ob continuum, & flagrantem æstum merito audiit. Sicuti autem prima pars hyemis, quæ antecedentem annum clausit, statum satis placidum, ac serenum, ut diximus, fortita est, ita pars altera, quæ huic anno fores aperuit, eandem serenitatem, ac tranquillitatem secum inexit, donec Januario mense ad finem vergente, flantibus ventis septentrionalibus, frigora adeo intensa fieri cœpta, ut illico congelationis fluminibus cuncta præ nimio gelu horrescerent. Cum autem nulla prorsus nives decidissent, hyemem non solum algidissimam, sed siccissimam exegimus, ita ut in tota Cispadana, & Transpadana Regione pulverulentæ essent viæ, non secus ac Augusto mense, cum insana Canicula campos torret, quod apud nos prorsus insolens est, ex quo factum, ut Boreæ penetrabile frigus sata consueto nivali vellere destituta mirum in modum exureret.

III. Morbi qui hisce temporibus vagabantur erant apoplexiæ, pleuritides, peripneumoniz, catarrhi suffocativi, angina, erysipelata; præ cæteris tamen affectibus morbi pectoris grassabantur magis, ac busta implebant. Sanguis qui secta vena educebatur multum pituitæ, & polyposæ concretionis præferebat. In nostro hoc Nosocomio variis cadaveribus dissectis, præcipue in cachecticis, ac demortuis ex morbo pectoris reperti sunt polypi, non solum intra cordis sinus, sed etiam intra ipsam Aortam. Remedia quæ magis ex usu erant, & quibus promptius morbus auscultaret, ea fuere, quæ vi pollerent crasin sanguinis compactam referandi, & fluxibiliorem reddendi, ut spiritus salis armoniaci, sal volatile, cornu cervi, sperma ceti, & similia. Non deerant tamen qui cum alioquin scirent, quod sulphur balsamum pulmonum passim audiat, in hujusmodi affectibus spiritum sulphuris exhiberent cum suis aquis pectoralibus; at num recte, & ex arte id agerent, ipsi viderint: indubium tamen est, quod partes integrales concretæ longe diversas possident qualitates ac ipsum concretum, sicuti vero verius, spiritum sulphuris alterius esse indolis ac ipsum sulphur. Repetita sanguinis missio non adeo felicem fortiebatur eventum, ut alias. In hac tam rigida, ac horrida constitutione magis exercebatur plebs urbana, quam agrestis, ac senes valde periclitabantur, quare Medicis sæpè numero nil tale cogitantibus morbus plus habens in recessu quam in fronte facile imponebat; nam ex improviso, cum prius satis commode cœnassent, tanquam confecto silicernio, paulo post occumbebant, ac citius quibus detractus fuisset sanguis.

IV. Horum affectuum tam multiplex, ac discolor sylva ab eadem prorsus radice succreverat, ac propterea eodem modo averruncanda; omnium itaque unam, ac eandem esse theoriam, ac praxim dictabat ratio; veram autem, ac potissimam causam fas erat referre in pravam diathesim quam sanguis haberet ad concrendum. Cum enim ex præcedentis anni frigida, & lutulenta constitutione, nec non ex pravo victu ob rei annonariæ angustiam, talis esset in universum massæ sanguinæ dispositio, mirum non fuit, si succedente postea hyeme tam rigida, ac summe Aquilonari, majorem promptitudinem ad grumescendum adsciverit, unde pullularint morbi, qui ex sanguinis stagnatione variis partibus, ob retardatum illius circularem motum, genesium suam deduxerint.

V. Apoplexiæ autem, pleuritides, peripneumonias, catarrhos suffocativos, erysipelata, ac reliquos memoratos affectus a sanguinis stagnatione, ob prædictam ad concrendum dispositionem generari, unanimis est recentiorum omnium consensus, quidquid circa horum affectuum theoriam in contrarium senserint antiquiores Medici, qui in hujusmodi affectibus partem aliquam mittentem robustam, & aliam recipientem imbecilliorum imaginabantur. Duplicem fluxionum causam commentus est Galenus: unam in qua pars ipsa humorem ad se traheret: aliam in qua humor a parte robustiori ad debiliorem transmitteretur. Hujusmodi doctrinam primus forsitan cœpit convellere Helmontius, nullam enim in fluxionibus partem mandantem, dirigentem, nec sagittarium, aut scopum agnoscit hic Auctor; qui tamen exemplo spinæ digito infixæ, & indignantis Archæi, non satis exposuit ob ignoratum sanguinis circulum; quomodo fiant humorum decubitus, quod solum accidit eo quia præpedito, & intercepto sanguinis per venas refluxu, vel propter fibrarum crispaturam (ut in vehementi dolore) vel propter massæ sanguinæ nimis crassam ac densam texturam, humores circa vasorum extremitates, vel in carniū porositatibus detineantur; quare si congrue loqui velimus, detentiones potius, quam fluxiones sunt appellandæ.

VI. Neque interdum exiguus labor mihi impendendus fuit, ut aliquibus a præjudiciis occupatis persuaderem erroneum prorsus esse comminisci, quod cum pars aliqua inflammatur, ac in tumorem assurgit, tunc humores majori impetu ad eam partem ferantur, quam ad alias; si vera est, non commentitia lex circularis motus sanguinis, qua stante, stant ac stabunt perpetuo tot clarissima recentiorum excogitata, quot in dies intercidunt antiquiorum placita; nam revera si mentis aciem intendamus, pigriori lapsu sanguis movetur ad partem quæ inflammatione tentatur, quam ad alias ubi expeditæ sunt viæ, ac nullum repagulum, quod sanguinis cursum remoretur. Quidam autem res in cute solum, non intus reputantes, cum vident partem brevi temporis intervallo minorem attolli, ut in phlegmone, putant sanguinem pleno fluente eo confluere, quod sane locum habet, cum vas aliquod sanguiferum disruptum est, & in aliquam cavitatem sanguis decidit, vel extra corpus effunditur; non ita vero in phlegmonum, & aliorum tumorum generatione, qui non aliam ob causam sunt, quam quod, præpedito circulari sanguinis motu, plus sit quod arteriæ ad partem deferant, quam quod venæ referant, sive id fiat ob lutulentam sanguinis crasin, sive ob fibrarum motricium crispaturam ex vi dolorificæ passionis, ut in vulneribus, ac nervo-

rum puncturis. Huic autem veritati fortasse manus darent, si cum brachio vinculum injicitur ad celebrandam phlebotomiam, veram causam perpenderent, quare infra nexum tumeant venæ una cum mole carnea, quod non fit, quia tunc temporis sanguis eo rapidius moveatur, (multo enim velocius ante eo propellebatur ubi nullus erat obex, ac minor resistentia superanda) sed quia ibi detinetur ob interceptum ejusdem per venas ad cor refluxum.

VII. Haud absimilis quoque est catarrhi generatio, de cujus natura ac ortu inter Medicos non satis convenit. Popularis, ac vetus opinio est, caput catarrhi fontem, ac scaturiginem esse; unde frequens proluvium in fauces & pectus, ac etiam usque ad extremos artus. Opinionem hanc de catharri ortu, ac descensu, ex quo etymon desumpsit (cum non nisi descensum, ac defluxum hæc vox sonet) unde voces *κατάρρεος* & *ἀνάρρεος*; a Galeno usurpatæ, ut humorum descensum, vel ascensum innueret, hanc, inquam, opinionem eliminarunt e scholis recentiores omnes Anatomici, ut Willisus, Richardus Louver, Stenon, Rolfincius, Etmullerus, Blancardus, ac inter Italos nostros Doctissimus Bellinus. Hi omnes ad Anatomicum Tribunal, omnibus indiciis, quibus caput hujus criminis Auctor insinuitur, diligenti examine perpenfis, nullaque apparente via, per quam caput sordes suas in fauces, ac thoracem expuat, ipsum plenis suffragiis absolunt. Non desunt tamen adhuc qui

Obstipo capite, & figentes lumine terram,

Antiquorum placitum veluti mordicus tueri, nec desinant in morbis pectoris caput non solus pharmacis, sed ferro, & igne tanquam reum plectere. Per quos porro ductus cerebrum superfuitates suas, quibus procul dubio diffuit, possit excernere, inter quærenda esse ait celeberrimus Stenon, nisi tamen per observatos a Blancardo ductus in jugulares venas fiat ejusmodi excretio.

VIII. Catarrhi fontem non veriti sunt alii astruere esse ipsum vitæ fontem, cor scilicet, quod per arteriarum ductus circumquaque catarrhi materiam deferat; hinc rheumatismi & tumores, & quidquid nomine fluxionum venit; quod assertum est Rolfincii, cui consentiunt Schneiderus, Wedelius, & alii, qui catarrhum a massæ sanguinæ sero prodire variis observationibus testantur. Sat celebre est experimentum Richardi Louver de Cane, cui cum arte venas jugulares vinxisset, partes omnes supra ligaturam tumescere, nec non copiosas lacrymas ex oculis & plurimam salivam ex ore profluere observavit; quo tandem tanquam ex angina suffocato ac dissecto, nullæ partes sanguine perfusæ repertæ sunt, sed solum musculi omnes, & glandulæ sero limido distentæ apparuere. Ab hac opinione non multum dissentientes alii glandulas catarrhi fontes statuunt, ut Stenon, Etmullerus, & alii; si enim glandularum structuram accuratius perpendamus, constabit eas esse fasciculum arteriarum, venarum, nervorum, & vasorum excretoriorum; ideoque in illarum sinum deponi serum ab arteriis, & superflui aliquid a nervis: quæ opinio valde probabilis est, & usibus glandulis a natura destinatis magis congrua.

IX. Hanc tamen doctrinam de catarrhi origine ex sanguinis laticæ in glandularum substantiam rejecto ex Helmontio habemus, qui primus forsitan caput insens a catarrhi infamia vindicavit, ob quam tam sæpe inurebatur. Hic enim Auctor, licet motum sanguinis circularem ignoraret, mente tamen concepit, id quod credebatur e cerebro depluere nil aliud esse quam laticem serosum huc, & illuc delatum a spiritu impetum faciente, ac initio vitali, ut ipse ait, nimirum e corde, tanquam primo impulsore, quin & ad glandulas ipsas ablegari, quas non ut vasorum pulvinaria essent, a natura constructas fuisse astruit, sed ad emunctionem laticis e massæ cruoris; ac re vera hic latex serosus Helmontii, præter alios usus hunc habet potissimum, quod sanguini socius, ac totum corpus pervadens ad variarum partium culinas everrendas inserviat, & sales dissolutos combibendos, ut exinde per glandulas excretices extrudatur, & sic tota cruoris massæ defæciatio evadat. In hunc finem in palato, lingua, faucibus, & naribus copiosas glandulas natura construxit, ut sanguis arteriosus, qui per carotides ad cerebrum deferri debet pro nervosi succi, & spirituum animalium elaboratione, sincerior reddatur, mucosa parte per has glandulas repurgata in statu etiam naturali, quando alia ex parte constat, eos qui sunt emunctæ naris, nec multum desputores, lubricæ sanitatis esse, ut referunt de Francisco Galliarum Rege, qui cum esset *ἀμύχων*, aurium ulceri obnoxius fuit dum vixit.

X. Atque hæc quidem quotidiana per nares, & ex faucebus mucæ excretio iis etiam qui satis commoda valetudine fruuntur familiaris esse solet; cæterum ubi corpus cacochymum sit, ac serosus latex luxuriat, qui suoque genio promptus est ad concrendum, mirum non est, si accedente Boreali constitutione, qualis fuit, de qua hic sermo, tunc temporis grassentur populariter tusses, rheumatismi, & quodcumque aliud morbi genus, quod in fluxionum censu reponitur, detenta in glandulis vitata, ac superexcedente lymphæ, non ex naturæ providentia, quæ se hoc fasce levare satagens noxium humorem ad extrema detrudat, sed ex mechanico partium artificio, ac particulari humorum textura, juxta varias aeris alterationes, ea lege, ut decubitus ibi fiant, ubi major est dispositio ut humores detineantur. Neque id fieri in nostris corporibus magis miremur, quam in automate alioquin bene constructo, quod interdum ad quasdam aeris alterationes a solito suo munere aberrat, & ab ignaro popello tanquam insanum ridetur. Mira est autem, ac pene divina vis ventorum in aere alterando; talem enim affectionem aer possidet, qualem ventus qui perflit, ac talis est sanguinis dispositio; qualis est aer quem spiramus. Sic ut refert Vitruvius, apud Mitylenem (quæ Urbs in Lesbo erat quidem magnificenter extructa, sed non prudenter posita) cum flabat Auster, homines ægrotabant; quando Corus, tussiebant; cum Septentrio, restituebantur in salutem. M. Varro quoque cum Romana Classis Corcyræ esset ac tota pene ægrotaret, immisso fenestris novis Aquilone, & obstructis pestilentibus, suos incolentes reduxit.

XI. At quorūm tot speculationes, inquiet aliquis? Ut juxta veram horum affectuum theoriam congrua medendi methodus instituat, regeram ego; Ubi enim ingruunt hi morbi, qui non capite decidunt, sed ab humorum stagnatione pendent, illico ad vehementia cathartica, inunctiones, phænigmos, cucurbitulas, ad narcotica quoque, ac mille alia remedia ad materiam fluentem revellendam, interceptandam, derivandam, suspendendam quoque, ut putant, ceratis capitalibus, confugiunt; Interim neglecta manet vera morbi causa, ad quam oppugnandam serio, ac omnibus nervis esset incumbendum,

ut postquam sufficiens evacuatio est facta, usu alterantium, ad naturalem sanguinis texturam restituendum, fluidæ substantiæ æquabili tenore per suos ductus cursum repeterent. Quot vero modis per venæ sectionem peccatur? Jam phlebotomus veluti gladius Delphicus passim tam in magnis, quam in levibus morbis stringitur ad innocentes victimas sæpius maculandas, quam graves effectus jugulandos.

XIII. Postquam Mundo innotuit circularis sanguinis motus, scopi equidem quos in morbis, qui ab humorum fluxione pendere supponuntur, sibi proposuerant Medici, non tanti sunt ponderis ut creditur. Certe intercipientia locum nullum habent; quomodo enim quis intercipiat materiam ad partem per arteriam fluentem nisi arteriam ipsam vinciat? neque enim jure postliminii, aut redhibitionis actione redire potest humor unde est egressus nisi per circulum. Revulsio vero per V. S. de throno suo jam decedit; imo si stricte loquamur, fere nulla est, qui enim fiat, ut humor per arteriam fluens per eandem possit revelli? Profecto si qua sit per V. S. revulsio, per id solum tempus fit quo vena est aperta; tunc enim sanguis per venam sectam, ac pariter per proximam arteriam quæ illi humorem suggerit, majori velocitate movetur, quam per alia vasa; illa vero clausa, cessat hæc in velocitate inæqualitas, ut ingeniosissime ad demonstrationem usque explicat Bellinus. Non ibo tamen inficias, quin diminuta sanguinis copia minor humoris portio ad partem laborantem deferatur, & minus sit sanguinis stagnantis incrementum. Quanti autem sit facienda per V. S. revulsio, & quam facile quibusdam imponat, qui hoc nomine inscitia suæ velum præcedunt, explicat egregie Andreas Cnosellius in quadam sua consultatione pro Jo. Casimiro Poloniæ Rege, cui obimmodicum hæmorrhoidalis sanguinis fluxum laboranti cum magni nominis Medici frequentem sanguinis missionem e brachio suaderent ad revellendum sanguinem fluentem ac ipse acriter renueret, hæc scripsit verba, quæ utpote elegantissima, & magni ponderis hic libuit apponere. *Et quomodo sanguini ad peremptoriam medicæ revulsione citationem, dicam, & locum, scribere possumus, qui privilegio speciali vitalitatis in circulum, & in se ipsum rediens cum spiritu suo hospite nullius loci, & temporis leges respicit, neque locum standi ullum in universo corporis foro agnoscit?*

XIV. Revellenda itaque esset ex quorundam animis, quibus alte insedit hæc de vi revulsione per V. S. opinio, cum revera non nisi ad demendam plenitudinem conferat venæ sectio. Condonandum quidem aliquid Emilio Parisano, & Primirofio, qui non aliam ob causam, ut ait Leonardus e Capua, in Harvæum stylium acuerunt; nisi quia stante sanguinis circuitu viderent revulsionem, per tot sæcula adeo celebre præsidium, fere penitus corrui, non ita vero nosrorum temporum Professoribus in tam clara luce cæcutientibus. Multum profecto Hippocrates revulsioni in fluxionibus detulit, ut passim in illius operibus videre est; locus tamen insignis apud eundem extat, qui revulsioni videtur parum favere. Ad sistendum immodicum mensum fluxum jubet ille ut vincula injiciantur supra genua; verum quidem est, quod præcipit quoque ut eodem tempore vinciantur brachia; nodum hunc solvere annisi sunt Rotarius, & Fonseca, sed non plane satisfaciunt; meum sane non est hujusmodi scrupulos dissolvere, meliori enim vindice dignus est hic nodus, proferam tamen quod sentio. Quidquid sit de efficacia hujus remedii, & num eventui respondeat, videtur Hippocrates mente attigisse motum sanguinis perennem per suos ductus; multis enim in locis mentionem habet de sanguinis stasi, & interceptione venarum, quam *φλεβὴν ἀπὸ λήψεως* appellat; ut ergo fluxum catameniorum cohiberet, sanguinis stationem, seu saltem remoram aliquam humoribus impetrandam curabat, tam in partibus supra, quam infra cor, vinculis ad brachia, & femora injectis, nihil veritus quod ligaturæ supra genua ad uterum quicquam traherent. Ac re vera quid magis ex improvviso hæmorrhagias sistit, quam superveniens animi deliquium, cui necessario consecutaria est cordis a motu feratio, ac eodem tempore sanguinis stasis?

XV. Sic autem ratiocinari nos cogit Divinum prorsus inventum circularis motus sanguinis, quod unicuique *πανόβητος* innumeras discussit errorum tenebras, effecitque ut humani corporis, cæterorumque animantium, quibus præcordia finxit Divinus Opifex, vera, ac genuina œconomia innotuerit. Cor enim nectaris vivifici, quo corpus universum sustentatur, promus, & condus est, habens ad latera arterias, & venas administras; Arteriæ sinistro penu alimoniam depromunt, ac partibus omnibus, vel remotissimis dispensant. Venæ affidentes quod a nutritione reliquum fuit suis radicibus, tanquam manibus, recolligunt, & ad dexterum cordis condum comportant. Iisdem venis medio in itinere succenturiant venæ lacteæ, quæ novum comineatum sanguini sub forma candidi laticis refundunt, qui postea in pulmonibus admirando artificio purpurascit. Hæc est vitalis facultatis vera, & naturalis œconomia, cui non parvas superpetias fert animalis potestas, quæ pro beneficio purioris sanguinis ad cerebrum delati uberem spirituum influxum per nervos cordi suppeditat ad illius motum perennandum. Sic binæ istæ potentia, licet sedibus, & regimine distinctæ, tanquam fœderatæ Provinciæ, sibi invicem collata beneficia rependunt. Sicuti autem in civitate bene constituta, quousque legibus suis vigor præstat, summa tranquillitate degitur, iis autem pessundatis, turbarum plena sunt omnia, ita in humano corpore circularis motus sanguinis lege servata facta tecta valetudo est, ea vero infracta, susque deque aguntur omnia, ac intestinæ seditiones subsequuntur.

XVI. Quamvis autem lex ista, quam primus tulit Harvæus, vel cujus prima fundamenta jecere Itali nostri, ut Andreas Cæsalpinus, Realduus Columbus Cremonensis, pro rata, immo sacra habeantur, non defuit tamen qui nuper legem hanc abrogare contenderit; is fuit Homobonus Pifo Medicus Cremonensis, qui edito libello sub titulo *Ultionis Antiquitatis* circularem sanguinis motum tanquam recentiorum commentum traduxit. Hic mihi non vacat ejusdem rationes, ac fundamenta expendere; solum hoc innuam, quod illius primum argumentum ab hujus legis inobservantia petitur (eo quod Medicorum quotidiana praxis, præcipue circa usum V. S. suppositæ doctrinæ de sanguinis circuitu quicquam non respondeat) Professoribus incuriam exprobrat, quod equidem verum est; ac maxime dolendum, cum innumeri pene sint, qui passim crepent hunc circularem sanguinis motum, sed postmodum, vel ob inscitiam, vel oscitantiam, non bene pensatis iis, quæ ex tali principio consequuntur, operibus tollant quod magnifico verborum apparatu statue-

Sydenham Opera Medica.

rant. Verum cum huic malo medelam aliquam apponere sit necessesse, Professor in hac Civitate mihi jamdudum conjunctissimus Opus jam molitur, cui hunc vult esse titulum. *Rationarium Medicum Sæculare, quo summam, ac veluti facta supputatione apparet quid lucri ex celeberrimis Inventis Anatomicis hujus sæculi Arti Medicæ, tam quoad theoriam, quam quoad praxim accesserit.* Habent mercatores sua rationaria, sicuti & diligentes œconomi, habent & Principes, ut olim Augustus, qui diuturnæ valetudinis tædio rationarium Imperii Senatui tradidit; non abs re forsan erit si Medica Respublica rationarium suum habeat, quod monstret quantum Medicinæ pomeria ampliavit hoc nostrum fortunatissimum sæculum, & quod simul pro saniori medendi methodo inserviat. Hujus operis editionem usque ad finem hujus sæculi animus illi esset differre, spe forsan quod novo aliquo invento sæculum hoc coronetur, cum adhuc vivant multi egregii viri novarum rerum repertores, inter quos Celeberrimus Malpighius, qui Romæ nunc degit ad Pontificiæ valetudinis custodiam, verum ego non desino collegam hunc meum urgere, ut ad meditata serio incumbat, ac utinam eo usque illi fata vitæ lineam protendant, ut opus hujusmodi ad umbilicum deducat. Verum e diverticulis in viam.

XVII. In iis ergo affectibus, qui ab humorum fluxione fieri supponuntur, iterata V. S. ad tot scopos implendos totum corpus depulcat, & morbi causam persæpe deteriore efficit. Ubi enim vasorum plenitudini quæ vires premit, factum fuerit satis, seu ad humorum orgasmum inflaminandum si adsit, sanguinis sufficiens copia detracta fuerit, satius profecto esset iis hæere remediis quæ sanguinis debitam crasim restituere nata sint. Certe in hac hyemali constitutione catarrhis obnoxia repetita V. S. non adeo salubriter cessit. Multos pleuriticos certo scio inopinato periisse, postquam bis, vel ter secta fuisset vena. Præ cæteris pius Sacerdos firmiter alioquin habitus ex pleuritide laborans, postquam tertia vice extractus est sanguis, eadem die interiit. Non solum autem turpis est calamitas, ægrum epoto medicamento occidere, ut aiebat Hippocrates, sed etiam si detracto sanguine paulo post intereat. Senioribus vero in hac tam rigida tempestate periculosum fuit sanguinem etiam semel detrudere. Nobilis mulier nonagenaria, ex pleuritide spuria decumbens, cum instaret, ut sibi tunderetur vena, ac ego renuerem, alter Medicus accessit illi morem gessit, & citissime eam sustulit.

XVIII. Ut constet quali cautione in serum regime sit procedendum quotiescumque ab aliquo rheumatico affectu premantur, in Boreali præsertim constitutione, insignem oppido, ac notari dignam Hippocratis historiam hic lubet apponere. *Halicarnassensis qui in domo Xantippi diversabatur aurem hyeme dolebat, & caput non mediocriter; erat autem annorum circiter 50. Vena secta est juxta Mæximachum, lesum est caput evacuatum, ac perfrigeratum, non enim facta est suppuratio. Phreneticus factus est, & mortuus.* Tot circumstantias hic apposuit Divinus Præceptor, ut credi possit, historiam hanc plus continere in recessu, quam in fronte; raro sit, nec scio, quod alibi in ullo ægrotante annorum numerum definierit Hippocrates, consideranda igitur erat ætas ad senectutem vergens, anni tempus hyemale, humor peccans, crassus nempe, ac frigidus, ætati ac temporis congruens, qui obstructionem faceret, ac tensionem in parte, atque hinc dolor, ex alieno præscripto (mentionem enim facit curantis Medici, quod illi non adeo familiare) missus est sanguis, at quoniam eventus? perfrigeratum est cerebrum, subsequente caloris nativi necrosi, ac prohibita est suppuratio; neque enim tanquam parergon, ut ait Vallesius, adjecit Hippocrates illa verba, *non facta est suppuratio*, perniciosum enim effectum ex intempestiva V. S. secutum innuere voluit, prohibitam scilicet humoris maturitatem. Lethargicum autem potius, quam vere phreneticum factum fuisse interpretatur Vallesius; cum in libris Epidemicorum quoscunque delirantes phreneticos senex Cons appellare consueverit.

XIX. Sæpius quoque mihi advertere obigit, quod in hac rheumatica constitutione, si febre superveniente missus fuerit sanguis, deterior factus fuerit affectus, ac etiam quandoque cum funesto eventu. Ut plurimum ubi catarrhi urgent, vel in pectore, vel quacunque alia parte, si febris superacceserit, multis ex professoribus solemne est ad phlebotomiam, tanquam ad sacram anchoram, confugere. An tum navis securior? Periti nautæ ventis etiam adversis aliquando utuntur, ut portum fortiter occupent: Febris autem non tam horrendum est monstrum, quod etiam a perito artefice sub jugum mitti nequeat, nec sine aliquo emolumento. Est ubi febris sanguinis missionem hortetur, est etiam ubi dehortetur; sed opus est diorsimo. Si nimis densam compagem sanguis adsciverit, & ad statim aptus, vel in pectore, vel in capite resaguet, si febris postmodum accendatur, vel parce, vel nullo modo sanguis mittendus; sæpe etenim naturæ ipsi manu gladium abripimus, quo morbum se sola potuisset conficere; si vero contrariam diathesim sanguis habeat, & ob orgasmum aliquem ad diarrhoeam, seu diffusionem promptus sit, febris superaccedens V. S. hortatur. Locust est insignis apud Hippocratem, quem hic referre non abs re fuerit. Quicunque *derepente obmutescunt, si sine febre fuerint, ipsis Venam secato.* Solemne est Hippocrati in libris Epidemicorum illud verbum adjicere *ἀνύπερος*, magni enim ponderis ad rectam curationem est hæc consideratio, num affectus sit cum febre, vel sine febre; non solum enim a febris præsentia, sed etiam ab ejusdem carentia desumendæ sunt indicationes, ut in hoc loco Hippocrates, qui tamen interpretandus, ubi crassi humores naturant onerent, ac periculum sit ne calor innatus suffocetur. Videant ergo quantum a via, quam trivit Hippocrates, defleant, qui a febre alicui affectui superveniente illico oblatum sibi scopum tudentes venæ ad ravim usque conclamant.

XX. Præ oculis itaque semper habenda anni conditio; etenim sicuti in maxima frugum abundantia, *Annus est, non Terra quæ fructificat*, ut ait Theophrastus, ita in quibusdam temporibus non particularis corporum dispositio, sed anni constitutio ea est quæ morbos progerminat; attente idcirco observandum quam diathesim sanguis asciscat, sive id in sensibiles qualitates, sive in insolita effluvia e terra expirantia referre placeat, & quænam remedia prosperum fortiantur eventum; sæpe etenim sit, quemadmodum scite advertit Tho. Sydenham, morborum epidemicorum accuratissimus Scriptor, ut qua methodo quis morborum quasdam species feliciter curaverit, veniente annæ, eadem methodo deteriores reddat, quare idem Auditor ingenue fateatur, se nunquam satis cavisse, ne qui primi se illius curæ commisissent, vita periclitarentur, donec multiplici obser-

varione, ac perspecto morbi genio, ad veram curationem recto pede procederet. Sic phlebotomia, quæ alias in memoratis affectibus salubris esse consueverat, in hac constitutione non insignem operam præstitit, quod procul dubio referendum erat in prægressam antecedentis anni constitutionem frigidam, ac nimbosam, & subsequentem hyemem nimis horridam, ob quam adeo crassam compagem sanguis contraxerat, ut si plus æquo detraheretur sanguis, & calor innatus labefactaretur, humores ad motum ineptiores redderentur, ac facilius concreverent. Talem autem fuisse sanguinis texturam ejusdem sanguinis conditio multam pulsem in superficie præ se ferentis, nec non multi polypi in dissectis cadaveribus ac deuatis ex catarrho intra cordis sinus, & ipsa vasa sanguifera reperti, satis demonstrarunt.

XXI. Frequens autem hisce temporibus in demortuis ex repentino casu polyporum observatio, si non aliud, id saltem præstat, quod vera quorundam affectuum causa innotescat, & culpa vacare credatur Medicus, si monstrer quam mala bestia cubet in præcordiis. Id præterea consequitur, ne diversa morborum nomina nobis imponat; Syncope enim cardiaca, catarrhus suffocativus, & apoplexiæ species quædam non aliam per se agnoscunt causam, quam polyposas concreciones in corde, vel in vasis sanguiferis stabulantes. P. Salius particulare caput de syncope cardiaca instituit, aitque illam fieri ex sanguine in venis, & arteriis coalescente, sic casum refert puellæ subita morte extinctæ, cujus cadavere dissecto, ex arteria magna sanguis concretus eductus est, non aliter quam gladius e vagina extrahi solet. Refert quoque Riverius puerum 5. annos natum ex catarrhodecumbentem, postmodum lyporhymia correptum subito interiisse, aperto vero cadavere, in sinistra cordis auricula materiam crassam, & compactam repertam fuisse, quæ, ut ipse ait, laridum coctum referret, cui polypi nomen non indidit hic Auctor, cum nondum in Microscopico Erythro polypos explicata esset Anatomicorum solertia. Nuper apud nos vir sexagenarius, præpinguis habitus, subita morte oppetiit, dissecto cadavere ad explorandam mortis causam, ex præcordio fere duæ libræ concreti sanguinis extractæ sunt, ac in trunco arteriæ magnæ ascendentis inventus polypus lacertulæ longitudinem, & magnitudinem referens. Intercepto itaque ob hujusmodi extranea corpora sanguinis in orbem itu, ac reditu, & mutuo inter cor, & cerebrum interrupto commercio, non suggerente corde sanguinem cerebro per arterias pro spirituum animalium generatione, nec cerebro cordi spiritus animales ad perennandum illius motum (quando cordi a motu nulla sunt feriæ) necesse est, ut subito sublegetur interitus. Casus autem hujusmodi, vel a syncope cardiaca, vel a catarrho suffocativo, vel etiam ab apoplexia fieri dicamus, parum refert. Binas apoplexiæ species statuit Heurnius, unam quam parvam appellat, ac ait fieri ob *φλεβὼν ἀπόλειπιν*, id est ob prohibitum sanguinis in cerebrum influxum, alteram magnam ob interceptum spiritum animalium e cerebro effluxum. Tres vero apoplexiæ species ex Hippocratis doctrina tradit Martianus, quas tamen in essentia convenire, & a sanguinis *στάσις* pendere autumat, quæ quidem sanguinis statio a polypo crassamento induci potest, cujus generatio, ut ut non sit momentanea, accedente tamen aliqua causa, quæ sanguinem in motum rapidiorem cieat, & præexistente prava totius massæ sanguinæ dispositione ad grumescendum, mirum non est, si sanguinis stagnationes ex improvviso contingant, ac interrupto spiritum vitalium radio, qui a corde jugiter influunt, cerebrum, lunare sydus microscopii, eclipsam patiatur. De hac apoplexiæ specie, in qua morbi causa est extra cerebrum, pluribus in locis agens Divinus Præceptor, in libro de morbis hæc abet ipsa verba, quæ utpote notatu digna, sanguinis circuitum adumbrantia ex nativo fonte hic transferre placuit. αἱ φλέβες ἐπὶ τὴν ἐς αὐτὰς ἐρῶσιν φλέγμα, ἀνάγκη ὑπὸ πυκρότητος εἶναι φλέγματος, τὸ αἷμα ἐστὶν ὄναι μᾶλλον πυκνόν, μὴ κινεῖσθαι δὲ τὸ αἷματος ἐκ οἷοιτε μὴ ἔχει, καὶ τὸ σῶμα ἀπρεμίζειν, καὶ κεκοφώσθαι. id est, postquam vena pituitam in se ipsas traxerint, necesse est præ pituitæ frigiditate sanguinem tunc magis sisti. . . . dum autem sanguis non movetur, fieri non potest, ut non etiam corpus quiescat, ac torpeat.

XXII. In apoplexia, ac præsertim ubi in paralysem degenerat, sæpius observavi, modo loquelam amitti, voce superstiti, modo utrumque, quod quidem observatione dignum, tum ad prognosim, tum ad curationem, non enim idem sunt destitui loquela, ac voce destitui, αὐδὴ loquela significat, φωνή vocem, quæ duo diversis organis perficiuntur, sermonis enim lingua est dædala, vocis autem larynx, & trachea. Observatio doctissimi Wilisii est, ad gravis vocis efformationem truncum asperæ arteriæ deprimi, ad vocem autem acutam efformandam sursum attolli, quem motum alternum præstari ait a ramulo nervi recurrentis cartilagineos annulos deorsum trahente, & a nervo altero a plexu paris vagi eosdem sursum attollente; sic exolutis nervis ad linguam pertinentibus ἀνάσιν subsequitur, ἀφασία vero si exolvantur qui ad laryngem, & tracheam dimittuntur: poterit ergo aliquis esse ἀναυδός, & non ἀφωνός, ut muti, ac infantes recens nati, qui sonos edunt licet non articulatos, non tamen e converso potest esse quis ἀφωνός, & non ἀναυδός. Quare Hippocrates in historia Pythionis, qui postea die 10. mortuus est, scripsit hæc verba: Circa vesperam omnia exacerbata sunt, ἀναυδός, ἀφωνός. Loquela destitui malum quidem signum est, perniciosius vero etiam voce privari, idcirco Divinus Præceptor ut pessimum Pythionis statum indicaret, has binas voces apposuit. Neque vero tam aphonia, quam anaudia fieri possunt, tum ob exolutionem, tum ob convulsionem; procul dubio Pythione aphonia convulsiva erat, nam die 6. dolores vehementes ipsum tenebant; in hoc itaque distinguuntur, quod aphonia quæ intensione consistit, fatalis est ad crudelissimam mortem; quæ vero in exolutione, moriendi sensum adimit, ut ait doctissimus Duretus. Cum itaque ob nervorum, & muscutorum vocalium tensionem, quam ob laxitatem fieri possit aphonia, quotiescunque illa appareat, diligenter advertendum num convulsoria sit, vel exolutoria, ut apta remedia præscribantur, τὰς αἰτίας enim, & λύσεις contrarii sunt affectus. Sæpe autem fit, ut si in maligna febre aphonia superveniat, ad aliquam excusationem apud vulgum aucupandam soleant nonnulli magna utique confidentia pronunciare, ægrum apoplectico insultu correptum fuisse, cum tamen aphonia illa convulsiva sit; perraro enim in acuta febre aphonia apoplectica succedit, quod tamen aliquando observatur, & qualem casum nuper habui præmanibus. Vir enim robusti alioquin habitus, post 12. paroxysmum tertianæ febris factus est ἀναυδός, καὶ ἀφωνός, resolutum eodem tempore brachio, & crute dextro; ac jam vocem ex integro recuperavit, sed

nondum perfectum sermonem. Narrat Forestus, textorem quandam ob leve vulnus in extremitate pollicis in dextra manu obmutuisse, quem veluti linguæ paralyti affectum a se curatum ait; ego autem pace hujus celeberrimi viri, crediderim obmutescentiam illam ortam fuisse potius ex convulsione linguæ: nam æger ille & nutu, & scripto, ut idem Auctor refert, indicabat sibi linguam tamquam filo constringi.

XXIII. Atque hi quidem vagabantur affectus ob superius memoratas causas, quibus addendum, quod cum anni prava constitutione conspiraverat rei annonariæ penuria, quæ sola potis est crassis humoribus corpora infarcire, ob prava alimenta, ac præcipue ob usum leguminum, quæ suapte natura ægre coquuntur, unde cacochymia; propterea urgente frugum inopia, caute usurpanda magna remedia, præsertim in popularibus, quod in praxi diligenter observandum. Sicuti enim ex Hippocrate difficulter ferunt purgationes qui pravo utuntur cibo, eo quod illorum corpora, ut Galenus interpretatur, cito exolvantur, vel ob syncopem stomachicam, in quam facile incidunt cacochymici ubi purgantur, ut Heurnius, haud secus per V. S. quoque in summum discrimen adducuntur, uti frequenti observatione mihi compertum. In quibusdam oppidis hujus ditionis, ac præcipue Castrovitti, & Scandiani, idem accepi, quod apud Ænum civitatem Thraciæ ob annonæ caritatem evenisse scripsit Hippocrates, ut multi ob usum leguminum, acervi præsertim, in crurum exolutionem inciderint. In hujusmodi ergo calamitatibus cautum esse oportet Medicum, nec adeo liberalem in profundendo humano sanguine, uti quibusdam aliis temporibus. Ad has itaque circumstantias, & præcipue ad anni constitutionem, tanquam ad versoriam, mentis acies porius convertenda, quam ad decerpendum ex libris generales morborum curationes, ne vetus parcemia obrudatur, Nauta ex libro.

XXIV. Quare autem plebs urbana in hac constitutione prædictis affectibus magis obnoxia fuerit, quam agrestis, id forsan factum crediderim, quod rusticana gens vitam actuosiorem degens, sanguinem magis fluxilem haberet, ac minus aptum ad stagnationem, seu quod in rurali epidemia in altera mea Dissertatione descripta, febres diuturnæ, quæ agrestem populum exercuerunt, vicem Crisæ suppleverint, sanguinis facultiam sensim repurgando, ac ad meliorem crasin totam massam humoralem perducendo.

XXV. Circa æquinoctium cæpit frigus mitescere, ac tam subita facta est permutatio ab intenso frigore ad immoderatum æstum, ut ab æquinoctio usque ad Martii finem calor hand multum distaret ab æstivo, sole in occasu flammeo apparente, non secus ac Augusto mense; subsecuta quidem postmodum Aprilis mense aliqua caloris remissio, sed firma semper, & constans persistit siccitas, sereno, ac præfudo cælo; cum itaque nulli prorsus imbres per totum Aprilis mensem decidissent, non lenis timor omnes corripuit de anno parum frugifero, non modici tamen solaminis erant plantæ omnes fructiferæ floribus passim albescentes, quæ fructus tum præcoces, tum horæos abunde pollicebantur, uti revera contigit, hoc anno laboranti Cerei succenturiante Pomona. His addebatur, quod calor non proportionate ad solis accessum augescens siccitatem in dies auctiorem reddebat, quare toto Vernali tempore terra non minus arida, ac dehiscens vifabatur, quam cum findit Canis æstifer arva. Perseverante pariter Majo mense hac arida constitutione, nisi identidem, ac sporadice modicis imbris delapsis, magna herbarum inopia hoc anno laboratum est; fabis quoque ac omnibus fere leguminibus ob humidi defectum arefactis, exigua quoque spe superflite, quod eandem ob causam triticea messis ad bonam frugem perducere posset.

XXVI. In hac Vernali tempestate, ac præcipue in prima Veris parte, iidem pectoris morbi, non adeo tamen graves, ut hyeme, perseverarunt. Sub finem autem Veris tertianæ febres, tanquam spicilegium prægressæ messis, caput denuo extulerunt. Nunquam apud nos annus scabiosior visus est, omnibus fere urbanis, ac rusticis quoque, fœda scabie laborantibus, quæ neque ad iteratas purgationes, neque ad repetitas phlebotomias quicquam mitescebat; Sanguis qui secta vena educabatur, multum feri flavi præferebat, ac urinæ valde coloratæ apparebant. Haud secus quam anno elapso magna fuit animalium strages, ac pecudum præcipue, ita ut ovillus grex totus pene deletus fuerit.

XXVII. Quoniam nullus morbus adeo popularis est ac scabies (si tamen illam in morborum classe licet reponere, quando Hippocrates scabiem turpitudinem potius, quam morbum appellat, & Plato malum vocat mixtum ex dolore, & voluptate, ac propterea græce dicitur πᾶθος γλυκύπικρος) quoniam inquam, nullus affectus adeo familiaris est, & qui medicos conatus magis eludat, ut hinc ansam captarit Helmontius vulgarem Medicorum praxim traducendi sub titulo Scabiei, & Ulceris Scholarum, perfricemus paululum, si licet, hoc ulcus. Ingenuo pudore profecto fateri licet, nihil fere laudis medicinæ professoribus ex scabiei curatione accedere; imo non raro iis palmam præripi a superveniente vetula, quæ solo linimento interdum præstat, quod magna remediorum supellectile præstitisse non potuerunt qui morbos Herculeos se perdomuisse deprædicant, quin interdum, ut ait Poeta:

Inque ipsos sæva medentes

Erumpit clades, obsuntque Auctoribus artes.

Quam labem omni studio, ac juxta omnes Politicæ regulas a se debet arcere ex Galeni consilio quisquis Medicus; nam scabies, ut idem ait, cum deformes reddat quoscunque tenet, multo magis Medicum Clinicum deformem, & hortendum efficit, cui hac fœditate laboranti obrudi possit dictum illud Poetæ Tragædi, quod affert Plutarchus:

Ἀλλ' ἂν ἰατρός αὐτὸς ἔλκεσι βρύων;

id est Aliis medens, at ipse ulceribus scatens.

XXVIII. Scabiei curationem solis topicis esse perficiendam, ablegatis omnibus internis remediis, quæ corpora incassum fatigant, vult Helmontius: observans enim quam facili negotio corpus exacte sanum ex solo contactu alicujus scabiosi infici possit, credidit scabiem pendere a pravo cutis fermento, quod ejusdem alimentum corrumpat, nequaquam vero ab interno viscerum vitio, quare solis topicis suadet abigendam; ast hujusmodi opus periculosa plenum alex merito censetur. Balloni itaque celeberrimi Practici consilio hæere placet, qui cum diorsimò procedens explicat ex mente Hippocratis, quando scabies sit morbus, & quando abscessus, hoc est rectam semitam indigitat, qua Medicus certo pede ad scabiei curationem procedat. Labet autem hic ipsum Hippocratis locum afferre: Impetigi-

ves, & lepra, & vitiligines alba, quibus quidem Juvenibus horum factum est, aut paulatim conspectum multo tempore augetur, his non putare oportet abscessum esse, eam papularum eruptionem, sed morbum, quibus vero horum aliquid est factum multum, & derepente, hoc sane fuerit abscessus. Hunc locum pariter observans doctissimus Mercurialis, Quid sit, ait, abscessum esse, & non morbum, atque e converso, non omnes intelligunt. Scabies itaque, alique cutanei affectus in morborum classe sunt recensendi quando paulatim fiunt; quando vero confertim, ac præcipue post gravem aliquam ægritudinem, non morbi nomine, sed *Αποσώσις* insigniri debent; est ergo in scabie, ubi liceat solis topicis incumbere, ait Ballonius, cum nimirum scabies est solius cutis morbus, est etiam ubi necesse sit internis partibus prospicere usu purgantium, & alterantium, ac nefas sit solis topicis scabiem exterminare velle, hoc est cum scabies est alterius morbi soboles, ut in cachexia.

XXIX. Chronicorum affectuum eam esse naturam, ut qui *hyeme auferantur*, æstate desinere soleant, qui vero æstate, hyeme finire debeant, scripsit Hippocrates. Hanc autem esse scabiei indolem, ut hyeme luxuriet, ac magis sæviat, æstate vero evanescat, vere saltem mitescat, jam norunt omnes. Quando igitur scabiosus aliquis curandus suscipitur, libere protestandum esset, non institui curationem, nisi ut facilius æstivo tempore tam scædus morbus extirpetur, atque hanc esse hujus pestis naturam, apud nos saltem (de lepra non loquor morbo Ægyptiis endemio, ut refert P. Alpinus, obaquam cœnosam, & salinos pisces, quorum usus apud illos valde familiaris est) ut æstivi caloris beneficio facilius, quam cicoraceis abigatur; satis abunde testante experientia, quod nulla prævia purgatione, vel phlebotomia, ulloque alio remedio, quotquot agrestes per hyemem scabie laborant, superveniente æstate, non secus ac angues, pforæ exuvias deponant, ac illis niteat *assiduo curata cuticula Sole*. Verum hujusmodi protestatio ad avertendam calumniam quandoque non satis est. Laborabat olim F. Petrarca sicca scabie, ut ipse refert, ac postquam a medicamentorum diuturno usu se frustra exhaustum videret, Medicos, quibus ex sua natura insensus erat, objurgare cœpit, ac iis respondentibus, expectandam esse Æstatem, ira percitus eosdem dimisit his verbis: *Ego autem neque Medicis credo, neque ab Æstate spero quicquam, sed ab illo, de quo scriptum est: Æstatem, & Verum plasmasi*. Pforæ itaque potissimum remedium ab æstivo calore pendet, qui potis est novam crasin in massam sanguineam invehere, ac illam particulis spirituosissimis saturare, quo pacto acidum illud luxurians, quod cutem exarabat, infringitur. Purgationes itaque ut ut repetitæ, iteratæ V. S. illitiones, Balnea, & omnis medicus apparatus persæpe præstare nequeunt quod solus aer æstivus. Cum hoc Vere cuidam docto Amico meo levem purgationem ad sanandam scabiem, qua vexabatur, præscripsissem, nec ideo melius haberet, ac illo urgente quid agendum superesset, per jocum remedii loco dictum illud Satyrici adduxissem:

Durate, atque expectate Cicadae. Ille ad me conversus; & T. quoque, inquit, ad græcas Calendas honorarium expecta.

XXX. Utriusque casus duo habemus notatu digna exempla apud Hippocratem in libris Epidemiorum, quæ hic lubet asserere. *Late pustula non valde pruriginosa, quales Simon habebat hyeme, qui ubi ad ignem inungeretur, aut calida lavaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderat*. Manifestum specimen hinc habemus scabiei cum morbus est; nam ex facta inunctione, vel in ipsa hyeme, opem sentiebat; si enim scabies illa fuisset abscessus, ac alterius morbi productum, non solum ex intempestiva unctione nil opis sensisset, sed gravem noxam expertus fuisset. Observanda quoque illa verba: *Vomitus non proderat*; signum evidens, corpus illud fuisse sanum, ac totum vitium in externis corporis partibus extitisse. Corpora sana difficulter ferre purgationes effatum est ejusdem Hippocratis, qui pariter ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, præcipit ut dejectiones inspiciantur, quæ si sint similes sanis, ait, tutum esse corpus alere, sin minus, purgationem instituendam; fieri enim potest, ac sæpenumero contigit, ut corpore sano intus existente tubercula in cute progerminet,

XXXI. Exemplum aliud scabiei, prout abscessus dici meretur, sequens est: *Homo quidam Athenis prurigine toto corpore vexabatur, & cutis crassa erat & velut lepra aspectu: huic nemo opitulari potuit: transgressus ad Melum, ubi sunt calida Balnea, a pruritu quidem, & cutis crassitudine liberatus est, sed hydropicus factus mortuus est*. In hoc casu certe affectio illa pruriginosa abscessus erat, ac fructus morbosæ radices in visceribus implantatæ; vel immoderate, ut putat Vallesius in Commento, aquis illis thermalibus usus fuerit homo ille, ut suffocato innato calore cessaret illa peccantium humorum excretio ad cutem ablegari solita, vel ut verisimilius interpretatur Martiannus noster, aquæ illæ sulphuratæ essent, ac propterea, ut idem ait: *Densata a balneo cute humores pruritum excitantem ad hepar retrocedentes scyrrum induxerint*, ex quo factus fuerit hydropicus, satis sit quod illi magis consultum fuisset, prospexisse ad id quod latebat intus, quam quod in cute apparebat.

XXXII. Ut ad rem nostram hæcenus dicta applicemus, popularis hæc scabies in classe abscessuum profecto erat collocanda, utpote productum præcedentis constitutionis nimis pluviosæ, nec non & pravi victus ob annonæ caritatem; sic refert Galenus, sua ætate cum plurimas Romano imperio subditas gentes vexaret fames, ac frigus omnibus in urbem asportatis, agrestes, quibus relicta fuerant solum *σπείρα & χέδρα*, ac etiam in exigua copia, ut fruticum germi-nibus, & bulbis velsi cogerentur, omnes sub Veris finem a variis cutaneis affectibus confictatos fuisse, quorum alii erysipelas referrent, alii herpetem, & alii pforam, impetiginem, & lepram. In hac itaque nostra populari scabie solis topicis fidere tutum negotium non erat, & quotquot sive sponte, sive alieno consilio scabiem unguentis antipforicis abigere tentarunt, id suo periculo sunt experti. Rem oppido notatu dignam hac occasione mihi observare obtigit. Novi multos, qui tædio hujus scædi morbi unguentis scabiem exterminare etiam in ipso Vere tentarunt, sed postmodum scabiem retro pulsa febre correptos, urinas nigras, & fuliginosas illico reddidisse; cum autem usu remediorum humores ad cutem propellentium reproducere scabies, urinae sanis similes reddebantur; denuo autem retrocedente scabie, vel rursus etumpente, hæc reciproca in urinis apparebat mutatio; quamvis autem hujusmodi urinae cum parva febre, quæ malignitatis speciem aliquam præferret, me suspectum non parum haberent, sollicitus tamen circa scabiei reproductionem semper bonam

Sydenham Opera Medica.

spem alui, & quotquot habui præ manibus, vidi tandem a morbo superstites. Animo autem versans quare ad scabiei retrocessionem urinae redderentur fuliginosæ, id fieri posse credidi, quod acidum in cute luxurians, & pforam efficiens, ob factas illitiones haud amplius expirans, & venis resorptum, & cum alchali sanguineo permixtum ferum sanguinis acedine infuscarit, non secus ac quando limpida vitrioli solutione cum infusione gallæ perinixta, atramentum conficitur. Pro regeneranda vero scabi non semel, nec sine prospero eventu usus sum remedio a Zacuto Lusitano proposito, & ab Etmullero commendato, jubendo, ut æger, cui retrocessisset scabies, decumberet in liureis ab aliquo scabioso infectis. Remedia porro quæ magis ex usu fuere, si non ad scabiem extirpandam, saltem ad eam moderandam, ut superveniente æstate facilius aboleri posset, fuere præsertim ea quæ ex viperis parantur, quibus multos vidi feliciter sanatos. Ubi liceat igitur internis remediis uti ad scabiem radicibus extirpandam, nihil profecto consultius quam ad diaphoretica confugere, non secus ac fit in lue gallica; sicuti enim inter hos duos affectus magna est cognatio, ita eadem fere methodo curandi. Sic Heurnius ad pforam debellandam, purgatis prius noxiis humoribus, ligni Indici, ac falsæ decoctum valde commendat; ait enim quod hoc remedio facile expirat concepta in habitu corporis contaminatio.

XXXIII. Horrent nonnulli in scabie, aliisque cutaneis affectibus, cane pejus & angue viperina remedia, veriti ne excedens caliditas & ustionis nota hepatis, & toti massæ sanguineæ imprimatur; ait ego magis horreo nimium refrigerantium usum, nec quenquam novi, qui exhaustis integris ptisanis, seu post diuturnum feri, & cicoraceorum usum a scabie, ut ut sicca, & arente, liber evaserit; scio equidem pene assiduus esse scabiosorum querelas de nimio calore, tum interna, tum externa perurente, at iis præbendæ non sunt aures; graviter quoque pueri, quibus perniones ob violentum frigus oborti sunt, de nimio calore in pedibus conqueruntur, nec sine ratione, ob subsecutam aliquam inflammationem, an ideo in pernionibus applicanda refrigerantia? Cordati Medici ergo erit morbi causam animose aggredi, sanguinis vitiosam crasin emendando, remediis potissimum quæ illius acorem temperent, qualia sunt ex viperis parata, quæ sale volatili abundant. Quidquid sit de viperæ temperie, de quo consulatur Jo. Baptista Spontonus in sua Echidnologia, experientia satis planum facit, nihil esse ad pforam, ac lepram quoque perdomandam efficacius, quam viperina medicamenta (quando tamen id agere liceat, nec satius sit hunc hostem inquilinum alere) nec adeo nos sollicitos esse debere, ne plus æquo incalescant viscera, dummodo tam scædi morbi eminium penitus restinguatur. At nunquam cessaret scalpendi libido, tam ferax est observatorum hæc materia, nisi ad alia festinaret calamus.

XXXIV. Exacto Vere, Æstas successit adeo fervens, ut nunquam huic similis visa fuerit, idque præsertim Canicularibus diebus, quo tempore præter modum aer excanduit caliditatis excessu supra reliquos annos, ut Thermometri loquebantur, ad multos gradus ascendentes. In hisce ardoribus identidem cecidere pluviae, sed nihilo scius remittebatur æstus, qui constans persistit per totum fere Septembris mensem; hac Æstate nullatenus spiravit etesia, unde a continuo æstu nullum levamen, hanc ob causam multa animalia, ac præsertim canes, agebantur in rabiem. Nunquam alias cecidere crebriora fulmina, a quorum uno ictus est agricola, indumentis omnibus perustis, præter lora coriacea; is ad nonnullos dies attonitus jacuit, sed postea sine ullo remedio in se rediit, & adhuc superstes est. Hisce temporibus febrium cohors derepente incubuit, ac passim per vulgus grassabatur, ut integræ familiæ eodem tempore febricitarent, densiorque erat ægrotantium numerus ea in parte civitatis, ubi magis patulæ sunt viæ, ac humiliora tecta. Quotquot milites in arce reperti sunt, simul ex febre decumbebant, ut rusticam militiam accersere oportuerit ad illius custodiam. In septo Hebræorum, ubi vici angusti, ac ædes altissimæ, caligantesque fenestras, nulli fere hoc saltem tempore ægrotarunt, cum tamen cæteris annis primi sint recutiti, qui æstivarum ægritudinum impetum sustineant. Ruricolæ, licet diurnis laboribus ad solis radios fere in sudores solverentur, cum tamen sub dio suis in planstris per noctem somnum captare soleant, immunes ut plurimum degebant; sola itaque plebs urbana, & omnes, quibus & domus, & res angusta domi esset, exercebantur; salubris tamen erat morbus; nam febres istæ tertianæ intermittentes erant, ac ut plurimum exquisitæ, & quæ die septima, ac etiam citius, post unam vel alteram phlebotomiam per sudores judicarentur. Nullus annus Medicis quæstuosior, & gloriosior unquam fuit, cum ægri omnes ferme incolumes evaderent; medicum factum tamen parumper temperavit Autumnus *ἄρσις*; nam protraciores erant febres, & aliquando in malignas degenerabant. Remedia cordatis Medicis erant venæ sectio, & frigida usus, hæc enim utranque paginam, ut dici solet, implebant, qui vero parva attollentes, ut plura viderentur præstitisse, vel ut Septuagintarios benevolos haberent, cardiacis calidioribus usi sunt, tanquam camino oleum addentes, ægros in extremam perniciem præcipitarunt. Limonium succus, spiritus vitrioli, sulphuris, & similia erant egregia cardiaca; diversis itaque artibus, ac diverso telorum genere, cum hoc febrili exercitu congrediendum fuit. Anno superiori hostis irritandus erat ad pugnam; hoc vero illius impetus parumper sustinendus, & acutis telis frangendus, qualia sunt acida omnia. Sanguis qui secta vena educabatur, spumeus erat, & croceus, urinae similiter multa bile saturatæ. Multis ex febricitantibus papulæ apparebant in cute, ac præsertim pueris, quales efflorescentiæ Variolarum erant veluti prodromi. Variolæ quidem per æstatem paucos sustulerunt, aut autumnus, & in prima parte hyemis paucis perpecerunt, ac minus iis quibus detractus fuisset sanguis. Multis tertianæ febres in quartanas migrabant; sicuti autem præcedenti anno Peruviani corticis usus in quartanis, ac diuturnis febribus improspere cessit, ita hoc anno saluberrimus fuit, & ii qui passi sunt recidivas febres mitiores postmodum experti sunt, ac antequam Hyems accederet, perfecte convalescerunt. Ubi primum æstus cœpit mitescere, quod circa Æquinoctium contigit, visa est pacata febrilis tempestas, quæ sensum in summam tranquillitatem cessit, adeo ut duobus postremis decedentis anni mensibus in foro Medico pene continuæ essent feriæ.

XXXV. Hujus febrilis tempestatis causam saltem occasionalem in immodicum aeris æstum referre placuit, qui potis fuerit bili nimiam acrimoniam adsciscere, ut cum succo pancreatico, minus apte, quam par est, ebulliret, & in massa sanguinea febrilem effervescentiam

tiam ciceret. Neque mirum sit, quod exiguo tempore adeo permixta fuerit sanguinis, & omnium fluidorum crasis: magna est enim vis caloris, quidquid Helmontius dixerit, calorem qualitatem Rerollæam appellans. Multa quæ suapte natura dulcia sunt, ad ignem amarefcere, alia vero magis dulcescere quotidie observamus; sic ut ait Gal. Lac coctione eam dulcedinem acquirit, quam mel deperdit. Vinum quoque per totam hyemem, ac etiam Vernum tenipus, nativam dulcedinem servans, ubi Æstatem senserit aulterum sit, nisi in hypogæis, & frigidioribus locis asservetur. Calor itaque ac frigus, sive sint causæ immediatæ, sive excitantes, & occasionales, subitas mutationes, in nostris corporibus parere possunt & humorum texturam, citius quam quis putet, invertere. Narrationem oppido curiosam apud Lucianum habemus de febre quadam Tragœda (sic enim illam appellare liceat) quæ Abderitas temporis fere momento invasit. Egerat Archelaus Poeta Tragicus media Æstate, multoque æstu, apud Abderitas, Euripidis Andromedam, ex quo factum, ut multi ex Theatro febricitantes exierint, ac universi postmodum febre gravissima correpti fuerint, quæ die septima plurimo sudore erumpente, nec non sanguine e naribus profluente, solvebatur, superstitie tamen ridicula quadam mentis perturbatione; nam ut refert Auctor, *omnes quasi ad Tragœdias agendas impellebantur, & jambica personabant, multumque vociferabantur, maxime autem Euripidis Andromedam canticis referebant, plenaque adeo Civitas erat pallidis, ac macilentis illis Tragœdis septimanis*. Haud aliter apud nos immodicus æstus plebem urbanam inter angustias suarum ædicularum conclusam in febres agebat, aspectu quidem terribiles, nec sine mentis emotione, sed quæ postea die septima, oborto sudore post celebratam liberali manu phlebotomiam solverentur. Hac de causa eos qui circa urbis pomeria lares habebant, seu ubi magis patula, & ampla sunt viarum strata, ut in ea parte quæ *Herculeæ Additio* appellatur, facilius febres adoriebantur; ubi vero urbs magis conferta est, & vici angusti, & anfractuosi, minus a febribus populares exercebantur. Neque fortuito urbium conditores, angustas, & anfractuosas vias esse voluisse censendum est, ut in iis urbibus, quæ adhuc aliquid antiquitatis retinent, qualis est Mutina, ut nempe magis salubritati, quam pulchritudini consulerent. Sic Nero postquam flammis Romam absumpsit, intentus postmodum illius reparationi, dimensis viarum ordinibus, ac laetis spatiis, splendidiorem quidem urbem pro Imperii majestate, sed minus salubrem reddidit, nam, ut ait Tacitus, *compertum est veterem illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustie iterum, & altitudo tectorum non perinde Solis vaporem percurrerentur*. Hanc ob causam opulentiores cives, qui in amplis Conclavibus a recto remotioribus degebant, sicuti etiam populus Apella, vim febrilis hujus tempestatis minus sensere. Magni profecto momenti est ad prævationem a morbis æstivis in amplo, ac frigido Conclave degere, ac somnum capere, ut a diurno calore attritæ vires per nocturnum somnum reparentur. *Somnum in frigore cooperto commendat Hippocrates*, quem locum in altera mea Dissertatione exposui; si ergo vel in ipsa hyeme præstat quiescere in loco ubi sit aura frigidior, idque in gratiam respirationis, dummodo totum corpus stragulis sit coopertum, ne a frigore carne pungente intortetur sopor, multo magis æstate præstabit in frigido Conclavi somno indulgere.

XXXVI. Hic autem immoderatus aeris fervor si febrem hanc popularem excitavit, viam quoque aperuit, ut citius referatis poris, per sudorem febrilis materia evanesceret, idque beneficii secutum, ut exterminata radicitus scabie, plebs nitidior, ac vegetior apparuerit. Ac profecto gravis hæc morborum tempestas omnino desisset, ni Variolæ, quo magis ambientis calor tepescebat, eo ferocius sæviissent, cum non solum puellarem ætatem demeterent, sed etiam grandævos, ac præcipue utero gestantes, quotquot hoc morbo laborarent. De Variolarum natura, & causis, cum tot extent doctissimorum hominum scripta, nil addam, nisi quod in hac variolosa constitutione, quæ circa Autumnum finem vim suam magis exercuit, facilius evaserint ii quibus nec detractus fuit sanguis, nec ullum administratum remedium, toto curationis negotio naturæ commisso. Neque mirum quod V. S. noxia fuerit; si enim ex Hippocrate *Autumno paucissimus sanguis sit in homine* ob prægressam Æstatem, quæ corpora exhaurit, id certe apud nos hoc anno locum habuit, quare virtus jam debilis ab exhaustu ob præcedentem æstivum fervorem, secta vena illico labascere videbatur, ac fieri minus apta ut noxium humorem ad cutim protruderet.

XXXVII. Sicuti in superioris anni constitutione noxius fuit Chinæ Chinæ usus, ut adnotatum, ita in hac ab illa toto cælo diversa, valde salubris compertus est; & multi quidem quartanarii hoc autumnum per urbem vagari visabantur, sed quotquot ad hoc remedium confugere, vel integre sunt restituti, vel si nonnulli recidivas passi sunt, paulo post convalescere; hinc practicam cautionem, ulteriori tamen observatione confirmandam, elicio, securiorem esse Chinæ Chinæ usum, quando humores fræno potius egeant, quam stimulo. Anno elapso ob frigidam, & humidam constitutionem tota humoralis massa, utpote crassa, ac segnior fluens stimulanda erat, ac ad motum cienda, hac Æstate vero, ad orgasmum prona, ac nesciens stare loco, erat potius sufflaminanda, quod mire præstabat Peruvianus cortex, humorum impetum compescendo. Eandem ob causam aquæ usus in altera constitutione adeo noxius, in hac saluberrimus fuit, sicuti pariter acida omnia, quæ celebrioribus cardiacis palmarum præripuerent, ut quæ partium Alchalarum vim frangerent. Hermeticorum enim estatus est, Alchalia per acida, & acida per Alchalia emendari.

Atque hæc pauca de hujus anni constitutione, tumultuarie fateor, ac inter armorum strepitum, visum est conscribere, hyemantibus apud nos Germanorum copiis, quæ hac Æstate in Pedemontana Regione adversus Gallos militarunt, cæterum, urgente adhuc rei annonariæ angustia, vereri licet, ne venturo quoque anno popularium morborum nova seges succrescat, quod omen despuo.

BERNARDINI RAMAZZINI

Dissertatio Tertia.

DE CONSTITUTIONE Annotum 1692. 1693. 1694.

Intermixtam varias quidem ob causas, sed potissimum ob parum prosperam valetudinem, Operis incepti texturam resumens, mor-

bos qui hisce tribus annis apud nostrates populariter vagati sunt, nec non ratiores quædam, quæ peculiari observatione digna credidi, compendiose referam haud dubia spe quod apud cordatiores Medicos veniam sim impetraturus, si minus apte, quam par est, res exponatur, modo fideliter (quod in historica narratione potissimum expetitur) id fiat, quod me præstiturum sanctè polliceor. Horum vero trium annorum constitutiones non se junctim, ut priores duas, exponere, sed unico fasce simul complecti libuit, ne eadem chorda, cum risu oberrans res easdem repetere deberem, quando unica & eadem fere morbofa Tragœdia totum hoc triennale spatium absumpsit, nec exordium obtinuit, donec cæli temperies in statum cælo diversum permutata novos morbos in scenam produxerit.

II. Ut ergo a constitutione anni 1692. exordiar, Hyems satis regularis fuit, ac legitima, nec quid insolens habuit quod nostro huic climati non congrueret; primo quidem Boreales venti ad aliquot dies satis valide perflarunt, terra nondum nivali vellere adoperata, unde metus erat ne fata exurerentur; sed ventis postmodum silentibus, ac modicis nivibus delapsis, Hyems propriam temperiem, & eas condiciones obtinuit, quas in libro de aere, Aq. & Loc. n. 25. recensuit Hippocrates, nimirum ut sit *moderata, neque valde clemens, neque frigiditate excedat*. Morbi itaque hyemales observati sunt; ut tussis, pleuritides, erysipelata, apoplexiæ, ac in iis præcipue qui præcedenti anno a gravi aliquo morbo conflictati fuerant; major tamen pars eorum qui ægrotarunt, evasit, demptis paucis quibusdam e senioribus, & silicernio jam proximis. Nihil itaque hyemali tempore observare licuit quod τὸν ἐπιδήμιον redoleret.

III. Neque vero sibi debita temperie multum descivit Vernale tempus; satis enim moderatæ fuerunt pluvix, ac interpolatæ, quales agricolarum votis responderent, sicuti Æstas quæ successit non admodum fervida, ut præcedenti anno, neque nimis sicca extitit, sed pluviiis identidem labentibus, ac etæis suo tempore flantibus, talis fuit, qualis nostro cælo congrueret; quare messem si non plane frugiferam, qualem publica necessitas optabat, non improbam tamen exhibuit. Haud secus Autumnus stadium suum regulariter percurrrens, cum prima parte hyemis non admodum rigida, annum clausit. Sic totum annum satis placidum, ac austrinum quoad primam qualitatem temperiem exegimus.

IV. Non ea vero moderatione sequens annus processit, illum enim totum intemperatum, ac prorsus exilem experti fuimus. Hyemem totam cum perpetua cæli serenitate, & mitissimis frigoribus transegitur sine pluviiis, ac sine nivibus, neque solum in hac planitie nostra, ubi sedet Mutina, sed neque in editissimis Apennini jugis, quæ alias per totam hyemem, & vernum quoque tempus albescent, Mari supero, & infero canum verticem ostentantes, sic neque Gabelus, & Scultena (inter quæ flumina urbs hæc posita est) glaciem, ut cæteris annis, sensere, quod multum contulit ad annonæ caritatem levandam, cum tota hyeme per hæc flumina frumentatores e proximis regionibus commeatus ad nos abunde conveherent, ad plebem nostram, & Germanos milites alendos, qui hoc anno quoque apud nos hybernarunt. Sic veris speciem Hyems tota Austrina exhibuit, cui postmodum Ver successit hyemis naturam, veluti mutatis vicibus, referens; ab Æquinoctio verno etenim usque fere ad solstitium perpetua fere fuerunt frigora cum ventis Aquilonantibus, ac perennes fuere pluvix, eæque adeo ingentes, ut passim flumina ruptis ægeribus campos inundarint.

V. Jam nefastum annum, & infalubrem nemo non prævidebat, tum ob pluviarum vim magnam, quæ morborum sunt seminarium, tum ob apparentia in Mororum foliis signa rubiginis, quæ sterilitatis prodroma est, ut annis superioribus summa totius Cispadanæ, & Transpadanæ regionis calamitate experti fuimus. Eodem modo subsecuta Æstas usque ad Caniculares dies Veris speciem exhibuit, quo tempore satis curiosum fuit, apud nos saltem, luscinias audire pro cicadis arbuta rumpentes. Sic ventum est ad Æstatem cum mitissima aeris temperie, nobis tamen impropria, pluviiis identidem magno impetu delabentibus; hinc ob solum valde uliginosum, & satis blandam caloris temperiem ad tantam altitudinem, ac densitatem omne frugum genus excrevit, ut metus anni parum frugiferi ex omnium animis fere exciderit; at improvisa rubigo, cujus non obscura indicia, ut dixi, apparuerant, spem omnium repente elusit; illico enim frumenta, fabæ, & quæcunque leguminum genera sydereo affluxu veluti percussa exaruerunt. Inopinus itaque casus cum agricolas, tum urbanos quoque perculit; summam enim frugum penuriam non ante visam impendere præsentiebant omnes, quando ex præcedentium annorum sterilitate exhausta essent tum publica, tum privata horrea, nec aliunde commeatus, ut ex Mantuano, & Ferrariensi agro, possent suppetere, cum eadem rubigalis contagio totam Cispadanam, ac Transpadanam Regionem pervasisset.

VI. At non solum Cereales opes absumpsit hæc pestis, sed omne etiam subsidium, quod pomifer Autumnus solet suggerere, eodem tempore sustulit; solum enim acerbis adhuc fructibus passim respersum spectabatur, quin & plantæ ipsæ honore frondium orbatæ media æstate visabantur. Uvarum quoque proventus, qui ab initio aureus sperabatur, ob eandem causam non nisi paucissimus prævidebatur: Mærore itaque cuncta plena erant, dum agricolæ in agris non tererent nisi leves culmos, stipulasque volantes, quare sine Cereris, & Bacchi muneribus in omnium præcordiis frigeat sanguis. Harum calamitatum causa potissima frigida, & pluviosa constitutio passim culpabatur, quoties enim in hisce Regionibus Æstas sicca, & fervens præcessit, nunquam frumenti inopia laboratum fuit, ut apud nos Oraculi loco Virgilianum *Geo. 1. illud coli possit*:

Magna que cum magno venit tritura calore.

VII. Autumnus porro Æstatis vicem supplens summis fervoribus & obstinatissima siccitate totam humiditatem, quam terra post tam ingentes pluvias ad satietatem hauserat, absumpsit, ne calor remissus nisi circa primam partem adventantis hyemis, quæ & ipsa leges suas nullatenus servans, verum satis placida, & mitis decedenti anno Vale dixit. Sic in hujus anni 1693. constitutione nulla ex illius partibus legitimam, ac propriam temperiem servavit, sed una alterius vices subeunte, omnes extemporaneæ fuerunt.

VIII. Sicuti autem prima pars hyemis, quæ præcedentem annum clausit, satis placida, ut modo dixi, extitit, ita pars altera quæ Anno 1694. fores aperuit, asperrima, ac rigidissima facie apparuit; per totum enim fere Januarii mensem flarunt Boreales venti cum perpetua cæli serenitate, ut squalidum, ac pulverulentum solum undequaque

que viseretur, non secus ac æstivis mensibus, quod apud nos prorsus insolens est, sic totam hyemem serenam sine aquæ guttula e cælo decidua traduximus: apparente autem Verno Æquinoctio cælum voris communibus respondit largis imbris effusis, qui usque ad Aprilis initium perdurarunt, quibus postea, flante Austro, ingens caliditas successit, ut die quinta Aprilis in meo Thermometro liquor 70. gradum pertigerit, quo interdum neque Junio mense devenire consuevit. Reliquum porro Veris, ac totam Æstatem cum pertinacissima siccitate, & immoderato calore transiegit. Autumno quoque eundem tenorem, quod siccitatem spectat; servante: quare annum signare licuit præ ceteris valde siccum, & squalidum, colonis tamen non prorsus ingratis, cum, frugum, & vini proventus non improbandum suppeditavit.

IX. Fufius forsitan, quam res ipsa videatur exigere, horum trium annorum constitutiones me profecutum fuisse putabit aliquis, cum in cujuscunque anni constitutionibus sigillatim nihil eorum, quæ ad rem medicam spectant, & quod meum institutum est, attigerim, quasi *παρρηγοῦν ἐργον* præmiserim; verum id consulto egisse me fateor, siquidem, cum ex superius memoratis pateat quam dissimilis, & discolor fuerit harum trium constitutionum facies, & alia ex parte cum eadem prorsus Epidemia per totum hoc tempus, plus minus, grassata fuerit, satis liquere potest quam parum firmo talo stet illorum opinio qui ex manifestis aeris qualitatibus, caloris scilicet, frigoris &c. putant satis explicari posse Epidemicorum affectuum genesim, ac indolem, ut etiam ex prægressis constitutionibus prænunciari possint ægitudines, quæ populariter vagari debeant.

X. Egit id equidem divinus Præceptor, ut ex Sectione tertia Aphorismorum, *Aph. 11.* & libro de Aere, Aq. & Locis satis liquet, nam prægressa Hyeme sicca, & Aquilonia, & Vere pluvioso, & Australi pronunciavit *necessum esse*, ut Æstate acutæ febres fierent, lippitudines, & intestinorum difficultates; sicuti ex hyeme Australi pluviosa (& serena) Vere autem sicco, & Aquilonio, mulieres gravidas abortivos fetus edituras: cæteros vero montales difficultatibus intestinorum, & siccis lippitudinibus obnoxios fore: Verum Galenus, 3. de *diff. Resp. c. 1.* licet Hippocraticæ doctrinæ ita adductus, ut Hippocratis libris etiam spuris usum se scripserit, asserere non est veritus in citati Aphorismi commentariis, Hippocratem usum potius fuisse rationali methodo quam observatione, & experientia. Huic Galeni interpretationi nullatenus assentiens doctissimus Marcurialis ait nil tale de sapientissimo Viro, qualis fuit Hippocrates, credendum, qui non tam audacter pronunciasset *necessum esse*, ut posita tali constitutione temporum tales ægitudines emergere debeant, nisi ratione, & multiplici experientia fuisset abunde instructus. Celeberrimus Lucas Tozzius in nuperis suis Commentariis in Hippocratis aphorismos asserit observationibus potius, & iteratis experimentis, quam confectis argumentis, Hippocratem ita pronunciassse, nulla ratione apparente, quæ suadeat isthæc eventura; ingenue enim fateatur vir egregius sibi observatum, quod post hybernæ tempestatem siccam, & Ver pluviosum subsequutæ non fuerint acutæ ægitudines.

XI. Quot porro disceptationes inter ipsos medicæ proceres pro genuina Aphor. 13. tertiæ sect. *Si vero hyems Australis, & pluviosa, & serena fuerit &c.* (cum tot sint interpretationes quot interpretes) jam satis constat. Menardus enim *l. 9. Epid. 1.* vocem illam *εὐδίας* volebat expungendam, tanquam supposititiam, cum intelligi nequeat quomodo vox illa *εὐδίας*, quæ serenitatem ex illius interpretatione significat, aliis cohæreat quæ hyemem pluviosam, & Australem repræsentant; Leonicens vero in omnibus antiquis codicibus vocem illam reperiri ait, ac pro placiditate, & clementia interpretatur. Hinc inter illos celeberrimos viros pro simplici vocula talia orta sunt dissidia, adeo ut, referente Brasavola in citati aphorismi commento, *Seniores illi alioqui reverendi apud multos pro re tam levi preliantes in derisum venerint, cum a rationibus ad iurgia devenerint.*

XII. Abundet quisquis in suo sensu ut lubet, & ex anni temporum in manifestis qualitatibus exorbitantiis tanquam ex fonte morbosas constitutiones derivet; ego sane ex quo ad Epidemicorum affectuum naturam contemplandum animum adverti, his quæ tam confidenter, & magnifice proferuntur, experientiam respondere non video, & quod me angit, in hac Provincia quotannis hospitem me agnosco; licet enim videam quo passim itur, non satis tamen video qua sit eundem, nisi postquam a via longe aberraverim. Profecto si rem accuratius perpendamus, quilibet annus semper affectus aliquos secum infert, qui *τὸν ἐπιδημῶν* sapiunt, nec tales putantur, quia aliquando leves sunt, licet propterea epidemicam naturam non exuant; demiror autem non parum, quomodo insurgente aliqua populari tempestate medentium plerique nullatenus affectus ingenium perpendentes, nec qua methodo natura ipsum sponte expugnet, illico totis viribus, & vulgari methodo ob analogiam quam habeat ad congenere morbum, ad illius oppugnationem insurgens, & remedium multitudine indiscreta, & frequenti visitatione maneri suo satisfactum existiment. Mundus autem, qui vult decipi, intempestivam huiusmodi sollicitudinem magis commendat, quam prudentem cunctationem, magnisque muneribus, & encomiis eos cumulat, qui, ut ait Sinonius, *parum docti, satis seduli, multos agros officiosissime occidunt.*

XIII. Affectus ergo Epidemicus, qui tribus hisce annis in suis constitutionibus inter se tam dissimilibus cum urbem, tum villas, & vicina oppida multis funeribus infestavit, fuit febris purpurata, seu petechialis, ut appellant, quæ aliquando quidem post multam stragem editam visa est velle receptui canere, sed postmodum auctis veluti viribus violentior irruerat, ac populariter grassabatur. Circa Æquinoctium Vernalis anni 1692. hæc febris primo caput extulit, ac sub initium levi quadam velitatione discurrens, mox per totum Veris tempus, & partem æstatis usque ad Canis exortum sub peticulari larva sævitiam suam exercuit. Ubi ergo æstas incanduit, febris hæc purpuram deposuit, nec illam resumpsit donec calor æstivus cœperit remittere, circa nimirum Arcturi exortum, quem morem annis quoque sequentibus rite servavit, vestem quidem, sed mores, ac genus haudquaquam mutans. Febres enim quæ in summo æstus sine periculis visabantur, haud secus malignæ erant indolis, quam vibices post mortem apparentes satis demonstrabant.

XIV. Observatione vero dignum fuit, quod post plenilunium, ac multo magis silente luna ferociebat febris, quæ postea ad novum ejusdem lumen mitescebat; nec mea tantum, sed aliorum quoque professorum constans fuit observatio, quod non parum contulit ad hujus febris prognosim, & curationem; num vero super epidemicos

Sydenham Opera Medica.

affectus peculiare jus aliquod habeat lunare sydus, ut illius mutationibus, & variis phasibus auscultent, non indignum est observatione.

XV. Admirandum certe fuit id quod die 21. Jan. 1693. contigit; facta enim per noctem lunari eclipsi, major pars ægrotantium obiit, ac eadem pene hora, qua nimirum luna laborabat, quin & nonnulli repentina morte occubuerunt; unde per totam sequentem diem magno strepitu, ut hic vetus consuetudo obrinuit, personantibus campanis, non levis horror omnes perculit. Tunc mecum ipse novitatem hanc perpendens admirari cœpi, quomodo Hippocrates tam diligens rerum omnium ac præsertim cœlestium observator, qui in libro de Aere, Aqu. & Loc. n. 30. periculossima ambo solstitia pronuntiavit, maxime vero æstivum, sicuti & utrunque æquinoctium, edicto veluti cavens ne huiusmodi temporibus medicamenta exhibeamus, neque curemus, neque secemus, sicuti astrorum ortus, & occasus, ut Canis, Plejadum. Arcturi observandos esse præcepit, ut ex pluribus locis illius Operum *De Med. Purg. n. 5. 1. in 6. Epid. de Diet. num. 2. 4. Epid. num. 11.* videre est, & cometis a se observari mentionem facit, quem subsequutus est terræmotus, luminarium porro defectus alto silentio transiegit. Quin & practici fere omnes solis, vel lunæ defectus non plaris faciunt, quam eorundem syderum oppositiones, & ordinarias coitiones. Unus, quod sciam, Guilelmus Ballonius lib. primo suorum Epidemiarum insignem casum refert; ait enim Parisiis accidisse, quod dum plures Medici apud illustrem mulierem ægrotantem consulturi simul convenissent, ac tunc temporis solis defectus contigisset, illique ad contemplandum solis defectum in vase aqua pleno, ut solet fieri, sublimiorem ædium partem conscendissent, illico ad ægram decumbentem revocati fuerint, quæ dum solis defectus perduravit animam agere visa est, neque e gravi periculo evasit, nisi postquam sol in apertum erupit, claraque in luce resulsit.

XVI. Alterationem in aere oppido insignem in solis defectu observare mihi licuit anno 1694. die 27. Junii, ut in Ephemeridibus meis Barometricis eodem anno editis annotavi; nam in ipso solaris eclipsi tempore Mercurius ad duas lineas in meo Barometro se extulit, hoc est aer temporis fere momento gravior est redditus, ac idoneus propterea ad subitas in microcosmo alterationes producendas; quare si ex divini Præceptoris sententia ad æquinoctia, & solstitia advertere oportet, ne quid magnum in illis circa ægros moliamur, non incongruum quoque erit, si medentes Clinici ad luminarium defectus, oculos non solum, sed mentis aciem intendunt. Nollem tamen quis crederet velle me quod rerum agendarum scopi ex corporum cœlestium vario situ, & configuratione desumi debeant; nam ubi morbi sævities urget, lotium potius, quam astra contemplari necessum est, ut ajebat Menardus, & opportuna remedia, vel reclamante cælo, sunt adhibenda, quando *omnis dilatio est Animæ periculum*, in morbis tamen popularibus, qui non raro a causis superioribus natales suos deducunt, & in quorum curatione non tam facilis, ac certa methodus habetur, non prorsus alienum est talia respicere; nam ubi agitur de humano corio, *Nihil timere, nihil negligere*, ex divini Præceptoris 2. in 6. *Epid. Oraculo.*

XVII. Verum e diverticulis in viam; Symptomata quæ febrem hanc malignam comitabantur, antequam pericula apparerent, erat ingens totius dorsi lassitudo, capitis dolor, aurium surditas, fanticum ardor, mentis stupiditas, præcordiorum anxietas, & totius corporis segnities; dorsi vero, & regionis lumbæ lassitudo adeo certum erat febris peticularis signum, ut raro falleret: quin sub initium hujus prævæ constitutionis, antequam febres istæ palam grassarentur, mulieres quæ ad morborum symptomata aliquando attentiores sunt quam medentes ipsi, ex huiusmodi suorum ægrotum querela febris naturam prænunciabant, & Medicos monebant, cautos opus esse, nec temere celebrandam phlebotomiam; quarum dictis, ac præagitationibus cum persæpe medentes non auscultarent, apparentibus postea maculis, multa probra ab iisdem cum artis dedecore perferre cogebantur. Si vero faucium ardor cum genarum rubore accessisset, hostem detectum clamabant, nec amplius hæsitandum de febris natura, jam in faucibus prodentibus se periculis. Profecto in hac malignarum febrium pertinaci constitutione quæ per triennium sæviit, Medicis non minus cum mulierculis, quam cum febre luctandum fuit, adeo ut (quod fateri non pudet) necesse fuerit, sicuti inferius exponam, illarum consiliis, & monitis morem gerere, non tam ad illarum importunitatem declinandam, quam quod re vera experientia rerum magistra esset obsecundandum.

XVIII. Pulsus parvi erant, & valde compressi, una cum magna virium prostratione primis etiam diebus quæ morbo augefcente languidiores fiebant, adeo ut ægrotantes veluti statuae in lectulis decumbentes jacerent, integro fere carniū, & totius corporis habitu, quodque admiratione dignum fuit, quotquot hujus febris violentiæ succumbebant, pleni, ac succulenti veluti pingues mortis victimæ libitiniis tradebantur; fortiores autem, ac robustiores cum sæminas, tum viros adortæ sunt hæc febres, non ita vero seniores, nec eos qui vitam debebant valetudinariam. Urinæ vero vel in ipso hujus febris principio perturbata, plus minus, apparebant, prout major, vel minor morbi esset sævities, nec nisi in fine morbi in iis qui evasere, ad naturalem statum redibant.

XIX. Peticulæ vero, ut plurimum quarta die, & septima erumpabant, & ii quibus primis diebus apparere, omnes fere sublati sunt, primum autem in collo, dorso, & pectore visendas se præbebant; observatumque neminem evasisse, nisi tandem ad extremos pedum ungues maculæ ille se expandissent, in superioribus partibus paulatim evanescente, quibus autem pectoris, & dorsi fines non transilierunt peticulæ, mortem obtigisse: variæ autem, ac diversi colores erant, prout varii, ac diversi erant ægrotantium habitus, aliæ erant rubræ, aliæ pallidæ, aliæ fuscæ coloris, aliæ parvæ, aliæ latæ, aliæ in summo, aliæ in profundo, & quas nonnisi oculis transversa tuentibus liceret inspicere: quod genus peticularum fuit valde ominosum.

XX. Faucium inflammationem comitem hæc febres ut plurimum sibi junxere, quæ inflammatio in morbi vigore in crustam albam, & ulcerosam degenerabat, quod non minus negotium Medicis facebat, quam febris ipsa, cum ægri ob id omnem cum cibum, tum medicamentum averfarentur, & multi, qui cæteroquin pacata aliorum symptomatum tempestate evasuri credebantur, in ipso veluti portu naufragium perpeffi fuerint. Sitis porro in his febribus non adeo ingens erat, ut in aliis acutis febribus assolet, nec multæ quærelæ exaudiebantur, sive non sitirent, sive mens obscure ægrotaret.

XXI. Quicumque ex hac febrili incurfione fati ope, vel Medici evafere, nulli excretioni vel per sudorem, vel per urinam, vel alias vias, per quas natura crifes fuas moliri folet, falutem acceptam referre poterant, fed folum peticularum fuo loco, & tempore apparitioni, & earundem per totum corpus expansioni, lentaeque evanefcentiae, falutis beneficium debebant; quin iis quibus alvi fluxus fupervenere funeftum fuit; Alvi fluxus autem anno praecipue 1693. hifce febribus peticularibus per Autumnum fupervenere; quo tempore dyfenteriae graves Hebraeos potiffimum exercuerunt; culpabantur fructus horae, quibus gens recutita numquam fatis impletur, fed aliae caufae altiores fubefle poterant.

XXII. Satis frequens fuit in his febribus fingultus, quamvis parvae febres viderentur, fymptoma quidem non minus moleftum, quam ferale, & funeftum; quotquot enim in hac febre fingultuofi comperiti funt, omnes in libitinae cenfum devenere. Vix obtinui, ut fingultuofi cadaver diffecaretur, ac ventriculus nigris notis fparfim compunctus repertus eft. Verminatio quoque multa paffim exitit, & ii, quibus ab initio vermes per os prodire, omnes fere extinfti funt.

XXIII. Nonnullis fuppreffa eft urina, vacua prorfus exiftente vefica, praecipue vero id obfervatum in iis quibus pulfus erant parvi, ac pene oblitterati, ut contigit in juvene quodam Hebraeo, quicum afphyxia, ac totus gelidus vixit ad quatuor dies, nec urinae quicquam reddidit; antequam autem infelix ifte obiret, quamvis toto corpore perfrige factus (nullibi arteriis micantibus) adeo robuftus erat, & ad motum expeditus, ut etiam ipfa die, qua e vivorum ftatione decessit, a lectulo furrexerit, & fuas veftes induerit.

XXIV. Non pauci poft exantlatum morbum veterofi fiebant, ac ftupidi, rerumque peractarum prorfus immemores, nec nifi poft multos dies fibi reddebantur; idem infortunium iis obigit qui in his febribus gravem furditatem perfeffi fuerant. Mercator quidam cum ex peticulari febre praeter omnium opinionem convaluiffet, furdus omnino ad 40. dies perftitit, ac poftmodum paulatim ex afle reftitutus eft.

XXV. Frequentiora in urbe quam in proximis agris fuere funera, ac felicius plebs ruralis fine ullo ut plurimum remedii genere vim morbi eludebat, five quod in aere falubri degerent, five quod Medicis carerent; non femel idcirco mentem fubiit Virgilianum illud, lib. 2. Georg.

*O fortunatos nimium sua fi bona norint
Agricolae.*

Ac urinam medentes, cum aliquis popularis morbus debacchatur, curiofius scrutarentur a ruficana gente, quae magis fidit Parocho, quam Medico, quali methodo natura ufa fuerit in fanandis morbis eorum qui evaferint; fic enim naturam tanquam optimum ducem fequentes, minus a recto tramite aberrarent, ac tutiori methodo ad curandos aegros fibi commiffos procederent. Cum autem in his cafibus fibi quisque pro ingenii fui modulo regulam coningat, fecundum quam opus fuum molitur, & in communi morbo tot, ac tam diverfa remediorum genera in ufum revocentur, merito cum Celfo l. 7. in Proem. cum quis convaluit, dubitare poteft fecunda valetudo Medicinae, an corporis beneficio contigerit. Indubium tamen eft, quod in communi morbo, ficuti communis eft caufa, ita communia, & eadem fere deberent efle praefidia. Quotquot autem ex viris agreftribus, quos e peticulari febre evafiffe novi, & interrogare potui, non alio modo convaluiffe referebant, quam macularum circa feptimam diem per totum corpus, & ufque ad extremos artus expansione, & earundem lenta evanefcentia fine ulla fenfibili humorum excretionem.

XXVI. Quo tempore in hac urbe, & in tota campeftri regione, quae circumiacet, ferociebat haec febris, in vicinis collibus, ut in Saxolenfi, & Scandianenfi ditone, nulli fere aegrotantes vifebantur, neque eo pervafit maculofa haec febris, quae tantum in editoribus locis, & in ipsis Apennini jugis (veluti faltu quodam exiliens) vim fuam pariter ac in nofta planitie exercuit.

XXVII. Sanguis porro, qui fecla vena, vel cucurbitulis fcarificatis, five venis fedalibus apertis, educabatur, in univerfum fatis laudabiles notas praeferebat, quantum oculorum acie licebat aflequi, fatis enim floridus, ac rubicundus apparebat, multoque magis qui a natura per narium haemorrhagiam profundeabatur, neque in ullo aegrotante cujuscumque temperamenti fanguinem extractum videre datum eft, qui glutinis fpecimen aliquod praeferreret.

XXVIII. Profecto mihi fateri necesse eft in hac peticularium febrium constitutione, adeo improfpere venae fectionem ceffiffe, ut omnes aegri exhorrefcerent quoties fanguis miffio per venae fectionem praeponebatur, cum vero fuiffe popularem confidentiam in ufu cucurbitularum fcarificatarum, ut aegros interdum decipere oportnerit, quoties urgeret neceffitas fanguinem ex vafis majoribus ob plethoricam difpofitionem educendi, finendo ut aegris cucurbitulae dorfo, & fcapulis applicarentur modicum fanguinem extrahendo, deinde paucas poft horas fanguine ex vena largiori manu ducto; Ea enim haeferat opinio, nec folum apud vulgus imperitum, fed etiam apud fapientiores, quod ubi praemiffae fuiffent cucurbitulae fcarificatae, nullus amplius efset timor de peticularum retroceffione, quamvis poftmodum non femel ex vena mitteretur fanguis; fic curiofum erat Chirurgos paffim videre cum facculis cucurbitularum plenius per urbem curftantes; dum inconfultis Medicis plebeculae hoc remedii genus adminiftrarent. Sufpectam itaque, ne dicam infamem, ut fcopulos Acroceraunia, venae fectionem in hifce febribus fuiffe fateri lubet, ficuti ex adverfo gloriofam cucurbitularum tum fcarificatarum, tum fccarum appofitionem, five id fieret ob confirmatam in omnium animis opinionem de hujus remedii efficacia, five quod revera in illo aliquid abditum efset, quod Medicos lateret.

XXIX. Reliqua porro remedia, quibus hujus febris oppugnatio tentabatur, eo collimabant, ut humorum motum ad corporis ambitum promoverent, qualia funt quae fale volatili abundant; fic nullum non ex diaphoreticis in ufum revocatum, nihilo felicius tamen prodibant maculae, ni forfan hoc pacto, oleum camina addendo, ut dici folet, febrilis incandefcentia augebatur (quae fibi relicta humorum fugam maturaffet) & diftrahebatur natura, quae non tam propere depingebat in cute quod intus moliebatur. Ego mehercle parum profici obfervans, per alcalica ad acida confugi, monente Hippocrate, De loc. in hom. n. 20. quod si quis non profuerit, ad contraria se convertat, nec improfpere fuccellum ex illorum ufu adverti, fufflamino aliquantisper humorum orgasmo. Non aufim tamen afferere, vi hujus, vel illius remedii evafiffe, vel periiffe quendam, cum

Andabatarum ritu necesse fuerit cum hac febre dimicare, neque magis felices in fuis curationibus fuiffe Medicos feniores, & longoufu expertos, quam juniores, ac e fcholis nuper egreffos, cum in tenebris tam videant caeci, quam oculati.

XXX. Ad folicitandam peticularum eruptionem paffim friftiones humidae ex unctione Aetii ex ufu erant, ficuti & veficantia brachii, & cruribus appofita; fed haec magis Medicorum exiftimationi apud vulgus, ne quid inaufum, aut intentatum fuiffet, conducere vifa funt, quam aegrotantium faluti, quibus acuebatur febris, nec propterea facilior contingeat peticularum eruptio, nifi forfan ob id retardabantur, facta ferofae materiae per vias urinae profufione. Sic in hac febrili incurfione omnibus remediis tum internis, tum externis parum proficientibus fatius erat lente feftinare, & humorum maturefcentiam opperiri, fpretis querelis adftantium, qui urgebant, velis, & remis, ut dici folet, ingruenti tempeftati occurrendum & prolataudo magnas corrumpi opportunitates, quibus adverfis clamoribus medentes non aufi obftitere, intempeftiva, & incerta remedia praefcribendo, fibi e manibus victoriam eripi viderunt, non fecus ac Pompejus M. qui cum tergiverfando hoftem comineatum inopia laborantem facile vincere poffe cognofceret, militibus tamen, & fociis moram increpantibus, praedium miferabili eventu commiffit, oblitus folitum se laudare eos Medicos, qui nihil unquam aegroti cupiditatibus quicquam indulfiffent.

XXXI. Cum primum graffari coepit peticularis haec febris, nec dum fufpicio efset de populari affectu (febribus diverfae indolis intercurrentibus) purgationes, ut hic fieri affolet, in morborum principio, per medicamenta minorativa dicta inflituebantur; fed paulo poft prodentibus fe peticulis, fuaebant medico tacita praecordia culpa, ob metum ne hujusmodi purgatio Exanthematum eruptioni impedimento foret, humoribus ad interna retractis, peticulis tamen poftmodum feliciter erumpentibus, & ftadium fuum abfolventibus, profeffores, qui attentius res obfervabant, experientia edocti a blanda purgatione non abhorrebant; Ego fane ubi tempeftive accerfirus fui, & ftomachum impuritatibus oneratum efle conjeftavi, quamvis certus de peticulari febre, levem purgationem praefcripfi, neque non folum ullam noxam exinde proficisci, fed facilius Exanthema apparere obfervavi. Similem cafum refert Ballonius, qui l. 1. & 2. Epid. ingenuae fatetur, in febribus, quas de genere peticularium non putarat, medicamentum purgans, & venae fectionem praefcripiffe, & innocuum utrunque remedium reperiffe. Id eft quod inonebat Divinus Praeceptor, lib. 1. de Morb. num. 1. & 7. obfervandum efle quae bona per fortuitum fuccellum Medici aegrotos curantes faciunt.

XXXII. Ad oppugnandam vero tam infenfi hoftis pervicaciam in fubfidium quoque accitus eft Peruvianus cortex, qui caeteris remediis fuccenturiaret; praecipuus autem illius ufus fuit in iis qui evaferant ex morbo non bene, ut par fuiffet, judicato per debitam fuo loco, & tempore peticularum eruptionem, & evanefcentiam; iis enim diuturnis febribus vexatis febrifugum illud exhibebatur, cujus ufus non multum contulit aegris fubinde in ftupiditatem, & foporem delapfis.

XXXIII. Dyfenteris porro, quas anno 1693. per Autumnum peticulari febre fuperveniffe fuperius dixi, egregie contuliffe opiatorum ufum obfervavi; nec forfan ulla eft affectio in qua fecurius, & liberaliori dofi exhiberi poffit hoc remedii genus quam in hujusmodi morbo, fractis licet, ac pene attritis viribus. Cuidam acerrima dyfenteria laboranti pluries exhibui laudanum opiatum ad 3. & 4. grana, fed parva levamine; vixerat hic ad plures dies omnino gelidus, ac fine pulfu, vires tamen non erant adeo languidae, ut huc, & illuc fe jactare non poffet; verebar ne largiori dofi exhibitum laudanum, reliquum flammae vitalis, quae fuperebat, reftingueret; Laudanum rursus ad grana 5. exhibui, ex quo aeger placide dormivit, & excalefactus eft, quod non tam doloris, qui dyfenterias comitatur, fedatione factum crediderim, quam propter virtutem opii diaphoreticam. Cum fatis obvium efset in hac constitutione (ac praefertim graffantibus dyfenteris, & verminofa affectione) hujusmodi in toto corpore perfrigerationem, una cum pulfus abolitione, obfervare, non femel fubiit admiratio quare in ventriculi, & inteftinorum affectibus, tam frequens fit talis perfrigeratio, ac pulfus obfcuratio, non ita vero in morbis pectoris ut in pleuritide, cum tamen haec partes, & ipfae membranae fint, & cordi proximiores, ni forfan id fiat quod numerosior nervorum foboles in inteftinis, & ventriculo implantetur quam in pleura, & pulmonum membrana, & ob doloris fenfum acutiorem, tracto in confenfum cerebro, fpirituum animalium ad cor influxum intercipiatur, unde poftea fidente pulfo totum corpus perfrigeretur.

XXXIV. Talis fuit hujus purpuratae febris indoles, ac talia fymptomata, quae multam habent convenientiam cum iis, quae apud Fracastorium De morb. Contag. l. 2. cap. 6. leguntur defcripta, qui Auctor caput particulare inflituens de lenticulari febre, quae anno 1528. in Italia primum graffata eft, mentionem expreffam habet de laffitudine, & fractione, ut ipfe ait, in toto corpore, fenfum hebetudine, oculorum rubore, pulfu humili, urinae fuppreffione (quod pefsimum fignum fuiffe ait) macularum circa quartam, & feptimam eruptionem, fit pauca, ac fere nulla; hocque praecipue annotat, fenef pauciffimos febre hac laboraffe, fed pueros multos, ac juvenes robuftos. Mihi fane dum caput illud perlegerem non parvae admirationi fuit, quod febris lenticularis a Fracastorio defcripta, & petechialis noftre (ut communi utar vocabulo) tam fimilis fuerit facies, ac ingenium, ut hanc efle veluti fobolem alterius, vel priorem illam redivivam caput extuliffe arbitrari quodammodo liceat. Advertens tamen febre illam eadem pene Regiones, & populos eodem fere viftu utentes in feftaffe, multaque alia perpendens, quae refert Vir ille doctiffimus, circa illius febris caufas, ut Padi, & Athesis inundationes, fructus, & olera a rubigine exufta, mirari defui. Si enim major diligentia in conftituendis morborum annalibus a Medicis adhiberetur, iisdem temporum viciffitudinibus recurrentibus, eosdem pene morbos recurrere, & naturam eundem morem in illis abigendis fervare facili negotio obfervaremus; nam ficut in Politicis, ut ait Tacitus, potius alii homines, quam alii mores, potius aliud hominum, quam aliud morborum genus.

XXXV. Sicuti autem magnae tunc temporis fuerunt inter Medicos Difceptationes circa caufas illius febris, & rectum curationis modum, ut pene ludibrio haberentur, veluti ipfe Fracastorius refert, cum non folum circa praefidia chirurgica, & pharmaceutica adminiftranda, fed etiam circa viftus regimen diffiderent, ut apud eundem Aftorem, non fine rifu primo, fed poftea non fine commiferatione legi poteft;

potest; sic pariter inter nostrates professores non minores fuerunt controversiæ, publicis ob id disputationibus habitis, & quod magis dolendum est, inter celeberrimos nostri ævi Scriptores magnæ sunt dissensiones circa febris purpuratæ causam, & genuinum curationis modum; ex quo satis constat quam parum post tot gloriosa inventa a Fracastorii ævo usque ad nostra tempora Ars Medica profecerit, cum nondum quicquam certi constet de malignarum causis, & illarum rationali curatione.

XXXVI. Verum his omisiss, quæ Medicæ artis infirmitatem satis in propatulo ponunt, experiamur num detur conjectare saltem, si non statuere, quæ fuerint hujus febris germanæ causæ, & qualis esset in febrientium corporibus sanguinis, & aliorum liquorum status, & conditio, quod ex habitis observationibus, & morborum eventu elici posse arbitror, quidquid Poeta dixerit, successus improsperos iis ominando, qui ab eventu facta notanda putant. Etenim cum in re Medica a juvantibus, & nocentibus securius quam aliunde potiores petantur indicationes, eventum & experientiam, tamquam optimos duces, sequi oportet, siquidem illorum vestigiis inhaerendo, tutiori, & compendiosiori via veritatem attingimus.

*Quid norunt homines, nisi quantum lumina possunt
Tendere?*

XXXVII. Cum ergo isthæc maligna febris promiscue cujuscunque sortis homines adorta fuerit, tam egenos, quam divites, otiosos pariter, ac negotiosos, & in omnibus idem pene drama luserit, communem fuisse illius causam, procul dubio statuendum est, eamque ex aliqua ex sex rebus non naturalibus licet deducere. Alimenta quæ terra suggerit, ut cereales fruges, olera, plantarum fructus, carnes animalium (cum ex herbis, & terræ fructibus alantur) a rubiginosa lue vitiati potuisse, & hoc pacto in massam sanguineam pravos succos invehere, ut exinde malignis febribus primus fomes succreverit, non prorsus a ratione alienum videtur. At cum in constitutione ann. 1690. unde labor hic meus exordium sumpsit, sævissima rubigo fruges omnes, & fructus pestifero afflatu absumpserit, neque per totum annum illum, ne unam quidem malignam febrem, sive peticularem, sive sine peticulis, mihi saltem, observare licuerit, sed tantum ruralis epidemia tertianarum febrium intermittentium per totam Estensem ditionem, & proximas Regiones oberravit, ac talis, ut nullus ex rusticis pene fuerit, qui tertianæ febris intermittenti non litarit, ego non satis video quomodo corrupta alimenta a rubigali peste pro potissima causa culpam debeant; neque pariter caritatem annonæ, quæ ad multos annos Regiones istas exerceret, incusare licet; quamvis enim ex Hippocrate 4. in 2. Epid. in Æno ob esum leguminum crura, & genua multis vitiata fuerint, penes nos tamen tam qui pane optimo, quam qui confusaneo vescerantur eadem peticulari febre cum iisdem symptomatibus premebantur.

XXXVIII. Multo minus aquas (quarum usus tam necessarius est ad hominum vitam sustentandam) causari licet: quamvis enim aliquando aquæ corruptæ, & vitiatæ populares morbos invexerint, hoc tamen de aquis nostris suspicari nequaquam licet; Regiones enim istæ aquis salubribus abundant, ac præsertim urbs ista, quæ Divino munere non aliis dato, fontes habet, qui purissimam aquam, non temporariam, sed perennem æquo semper tenore profundunt, ut in Tractatu meo de admiranda fontium Mutinensium scaturigine satis exposui.

XXXIX. Cum ergo inter sex res non naturales nullam aliam communiorē causam reperire sit præter aerem, quo nihil communius, & æque necessarium (cum unum, & eundem locum incolentibus diversa esse possint ciborum, & potionum genera) aer vero ejusdem fere sit naturæ, ad occultam aliquam aeris labem, & inquinamentum recurrendum est, quod in massam sanguineam tales invexerit dispositiones, ut ad excitandam hanc malignam febrem satis virium habuerint. Quænam vero, & quales essent hujusmodi aeris dispositiones non adeo obvium est exponere; profecto in solas qualitates elementares pravam illius diathesim referre non adeo tantum est; nec animus veritatis avidus tam facile acquiescit, multoque minus cum per totum hoc triennium, ut superius annotavi, tam dissimiles fuerint cujusque anni Constitutiones, ac nihilo fecius purpurata febris eodem fere tenore tyrannidem suam exercuerit. Pro re indubia tamen habendum, aerem hunc quem inspiramus, ac totam atmosphæram varias, ac diversi generis particulas, tum ex superioribus, tum inferioribus corporibus in sinum suum suscipere, cælum nempe, seu astra, ut solem, lunam, & reliqua sidera, lumine suo potissimum, quod inficiari non possumus, in aere profundere, & ejaculari, ut ex solarium macularum evanescentia licet conicere, ac globum terræque eodem modo in ejusdem gremium omnigenas substantias eructare, non tam vi solaris luminis, quod illum plus minus modo in hac, modo in illa parte calefacit, quam vi caloris centralis, & ignium, quos ipsa terra intra sua viscera recondit, ex quo conicere est (quamvis oculorum acie id percipi nequeat) nihil esse in hac rerum universitate quod sit magis heterogeneum, utpote particeps terrestrium impuritatū, & cælestium effluviorum, quam æreus Oceanus.

XL. Hinc ergo expiscari licet hujus nostræ Epidemiæ causam, ex aere nimirum ab heterogeneis, ac omnigenis particulis hinc inde, ac præcipue ab Australi plaga susceptis vitiato, cum hisce annis Austrini status dominatum obtinuerint, silentibus ut plurimum borealibus ventis, qui nubila detegerunt, & aeris impuritates eo repellunt, unde decesserant, ad Australes scilicet plagas, ex quibus omne malum ad nos profectum suspicari fas est. Quod vero in hac Tragœdia præcipui Actores fuerint Australes flatus, hinc conjectare licet, quod dum in hac urbe, & in campestri regione grassaretur hæc febris, villæ, & oppida ad collium radices posita satis salubriter degerent, ac veluti in portu aliorum spectarent naufragium, utpote ab Apennini jugis protecta ne ab Austrinis flatibus adeo infestarentur, non ita vero loca in sublimiori parte Apennini sita, sicut & urbs nostra cum tota planitie iisdem flatibus magis exposita.

XLI. Quam male autem apud nos, ac fere ubique Austro audire soleat, nemo non novit, cum non solum Medici, sed populares quoque, tanquam morborum pestilentium parentem Austrum deprædicent. Quid vero secum ad nos comportet ventus iste, num gravis sit, ac noxius ob nimiam humiditatem, unde nomen sumpsit (Auster enim Νότος græce dicitur) an quia Lybiæ deserta veneatis animalibus infecta transgrediens, ut putat Langius l. 1. Ep. 19. collectum virus ad nos deferat, non tam facile est decernere; id certum tamen, ac ipsis sensibus obvium, nihil magis, ac temporis pene momento aeris statum immutare posse, quam flantem Austrum,

ut aer ex ponderoso levior reddatur, ac ob id forsan nobis insensus, & vitalibus muniis minus idoneus, veluti sat manifestis notis testatur Barometer; nam, ut in Ephemeridibus meis Barometricis hoc anno 1694. editis annotavi, quoties ex Australi plaga flant venti, illico Mercurius e sua sublimitate ad infimam usque stationem decidit, quæ minor in Barometro non observatur. Cum autem Austriana constitutio aerem leviores efficiat, dum cuncta tunc temporis nimia humiditate diffuunt, quæ sita quidem mihi est ratio, num vero reperta fuerit, ut verum fatear, mihi hæret aqua, ut dici consuevit.

XLII. Austrinam ergo constitutionem aerem vitiantem, magis quam quodcumque aliud culpæ licet, ita tamen ut a causis procacitatis hujus peticularis febris non excludam alimenta a rubigali lue vitiata, tanquam communem causam cuicumque hominum generi, illegitimas anni temporum vicissitudines, ac intemperantias, pluviarum multitudines, verbo, complurium causarum syndromem, unde humoralis massa a naturali sua temperie degenerans talem dispositionem nacta fuerit, ut hæc maligna febris emerferit, quæ eo utique perduravit, donec aere in contrarium statum migrante sanguis, ac spiritus crasin priori contrariam adsciverint.

XLIII. Qualis porro grassante hac febre fuerit sanguinis, & aliorum liquorum status, num ad fluorem, vel ad concretionem potius vergerent, mihi quidem non satis constare visum est. Revera si tum recentiorum, tum antiquorum Medicorum Oracula consulamus, tam varia, ac dissidentia inter se responsa pro statuenda genuina, ac vera febrium malignarum causa referuntur, ut quilibet ex librorum lectione animo potius distractus, quam instructus abscedat. Hic mihi non vacat, nec multum refert, longa nomenclatura nostri ævi Scriptores in binas acies divisos, tanquam ex adverso dimicantes recensere, quorum alii proximam, & immediatam malignitatis causam in sanguinis promptitudine, ob acidi præpollentiam, & Gorgonios spiritus, ut ajunt, ad concrendum constituunt, alii in sanguine nimis dissoluto, & ad fluorem evecto ob sal volatile, & alchali acerrimum illi permixtum, adeo ut in hoc bivio, in quam partem quis se dedat magnos habiturus sit Patronos, quibus causam suam tueatur, non ex voto res successerit. Sic in re tanti momenti, qualis est maligni morbi cognitio, tam parum inter ipsos Medicinæ Antesignanos convenit, ut post tot gloriosa Anatomica, & Chymica inventa adhuc nesciatur quid sit sentiendum, nec qua sit eundem.

XLIV. Despicatui tamen nequaquam duxerim notionem illam malignitatis, quam experimenta ex Medicina infusoria desumpta nobis suggerunt; siquidem acidis liquoribus in vena animalium vivorum injectis, & iisdem animalibus post mortem dissectis, sanguis in venis, & in ipso corde concretus, & grumefactus, sat manifeste conspicitur, sicuti liquoribus lixivialibus, & alchalis similiter infusis sanguis sine fibris, ac totus dissolutus observatur, adeo, ut ex hujusmodi observatione omnia venena tam externa, quam intus genita ad alterutra ex his classibus satis commode referri possint. Debemus hoc sane Medicorum nostræ ætatis solertiæ, qui hujusmodi experimentis, & sensuum ministerio, lucem aliquam mentibus nostris affundunt, quomodo scilicet, & quibus spiculis armentur in nostris corporibus humores alibiles cum venenatam naturam accersunt, & malignas febres accendunt, ut potis sint modo sanguinem coagulare, modo fundere, atque dissolvere, quod non parvi momenti est, ut in morbis malignis (acri judicio re prius pensitata) recta curatio institui possit, nec indiscriminatim Alexipharmata exhibeantur, alchalicis stimulis equum currentem interdum incitando, cum acidorum fræno opus esset.

XLV. Quamvis autem venenorum naturam, tum eorum quæ propinantur, seu ab animalibus per morsum, vel alio modo inferuntur, tum illorum quæ in corporibus nostris progigni solent, & malignos morbos excitant, revera feliciter explicent recentiores Medici, quam priores, qui ad publicum occultarum qualitatū asylum provocabant, ac meliori methodo credantur curari maligni morbi quam olim, corrigendo nimirum per acida enormitates ab alchali productas, & per alchalia quæ ab acido ortum duxerint, id tamen antiquiores Medicos non prorsus latuisse censendum est. Ab hisce duabus oppositis in sanguine dispositionibus, nimia scilicet laxitate, & adstrictione morbos omnes deduci, opinio fuit Asclepiadis, ut pluribus in locis refert Galenus, 2. de Elem. cap. 3. quod idem sensisse visus est Vegetius in Arte Veterinaria l. 1. c. 28. pro medela sanguinis nimis adstricti venæ sectionem commendans. Extat apud Hippocratem 7. Epid. n. 39. sat insignis historia, vere memoratū digna; ex qua satis liquet, præcos illos in malignis morbis, non quæcumque antidoti nomine insignita essent præscripsisse, ut etiamnum a nonnullis factitari video, qui ubi constiterit febrem esse malignantis naturæ, cælum terræ miscant, nullum non Alexipharmaci genus præscribendo. Maligna febre laboravit Nicoxenus, *lingua ardebat*, ait Hippocrates, *calor foris secus non valde fortis, exolutio corporis vehemens, vox fracta, ut operosum esset exaudire, clara tamen, tempora collapsa, oculi cavi, pedes molles, ac tepidi, juxta splenem distensio, urina clara, decubitus supinus, cura diducta, ac disparata ob exolutionem, penitus vigil.* Et quid non ut malignissimæ febris ideam quis concipiat? Superstes tamen evasit; at quonam remediorum apparatu, ac molimine Domitor ille morborum febrem hanc adeo mortiferam subegit? *Potus erat aqua de farina crassa in ipsa macerata, sed, & de pomis simulque mali punici succus, & lentis torrefactæ, & farinæ letera cocta.* Verba sunt divini senis; quibus autem remediis nostra hæc ætate tentaretur hujusmodi febris curatio novit Deus; certe timendum esset, ne id contingeret quod apud Plutarchum reprehendebat Erasistratus, ut scilicet *ὁ μὲ μεταλλικὰ, καὶ θηριακὰ, καὶ τὰ ἀπὸ γῆς, καὶ θαλάττης αἷς τὸ αὐτὸ συγκακρύνοντας.* At quæso Vallesii egregii Commentarios, sive expositionem audiamus, *Animadvertendum*, ait ille, *aliquando febrem malignam cum Exanthematis pituitosam, aliquando biliosam, aliquando etiam atrabiliariam, & curationem ita variare; huic non tam crassorum, quam acriorum, & tenuium humorum fuisse redundantiæ indicavit usus, & pervigilium. Ob id consulerunt ille potiones, quæ aliis fuissent adversissimæ; fuisset tamen huic adversissimum Theriaca utri, aut decoctis, & herbis calidis, quævis essent Alexipharmace, ut Dictamni, & scabiosæ, & Cardui benedicti, quod aliis talia solent esse usui.*

XLVI. Sicuti autem in determinanda malignarum causa in genere adeo inter se dissentientes sunt Medicinæ Proceres, sic multo minus in explicanda febris peticularis natura, & causis consentiunt; neque recentes ac nostrorum temporum tantummodo sunt controversiæ, etenim

etenim An. 1528. grassante per Italiani lenticulari febre, ut Clarif. Fracastorius l. 2. de Contag. Morb. c. 6. refert, tanta fuit pro hujus febris curatione inter Medicos discordia, ut pene ludibrio haberentur, cum ob ignoratam febris causam, & morem, neque in victu instituendo, neque in alio remediorum genere administrando convenirent, adeo ut, eodem referente, inter has controversias magna Mortalium pars, & Nobilitas perierit. Nostra hac ætate, tanquam in binas acies oppositas, Medicinæ Scriptores divisos observo peticularis febris naturam, vel per sanguinis coagulationem, vel per ejusdem dissolutionem exponentes. Celeberrimus Willis, Simon Pauli, Auctores Zod. Med. Gallici, alique plausibili sane ratiocinio putant in hujusmodi febre naturalem syphilin sanguinis in crassam, ac nimis lentam secedere ob acidi prædominium, adeo ut, dum sanguis in orbem agitur, illius particulæ fixiores a venarum extremitatibus, haud rite absorbeantur, & captivæ detentæ picturam cutim efficiant. Etmullerus, Sylvius, Menjotius, alique hujus febris naturam, & peticularium generationem a fibris sanguinis dissolutis a sua statione dimotis, ob sal acre, & volatile sanguinem ac fusionem disponens deducunt, quo pacto similiter cruore ab arteriolarum osculis effuso illius partes tenuiores, tanquam transfusæ, a circulari motu exorbitant, ac sui erroris notas in cute designant.

XLVII. Ne vero in recensendis aliorum placitis ulterius immorer, arbitrari licet in hac febre nostra peticulari cruoris massam ad fluorem potius, quam ad concretionem pronam fuisse, cujus asserti præcipuam conjecturam stabilire licet super manifestas notas, quas sanguis eductus præferbat, semper enim roseus ac purpureus, nihilque glutinosi præfens, mihi aliisque Professoribus apparuit, tam æstivo tempore, quam hyemali. Cum sanguis ergo emissus toto calo diffunderet ab eo qui solet educi in quibusdam morbis, ut pleuritide, peripneumonia, erysipelate, aliisque affectibus interdum popularibus in quibus sanguis colore, & lentore vitium suum prodit, mihi visum est, *Oculis magis, quam opinioni credendum* (ut ipsius Hippocratis l. de Dieta n. 5. verbis utar) & accensionem quandam partium tenuiorum sanguinis, & præcipue feri e valis diffusionem, ex qua tot symptomatum enarratorum diritas ortum duceret. Talem autem massæ sanguineæ adfuisse dispositionem multa alia attestabantur, ut primo quidem quod truculenta hæc febris juvenes habitiores, & succulentos corripere, ut superius annotavimus, valetudinarios vero, & seniores præteriret, non secus ac *Præterit imbelles ira Leonis oves*. Seminum enim illud intus per inspiratum, vel quomodocumque ab aere susceptum, & quod multum alchalicæ acrimoniæ occuleret promptius diathesim suam exerebat in iis in quibus sanguis optimus esset ac particulis spirituosus refertus, quam in valetudinariis, & senibus, quibus sanguis est effertus, ideoque aptior ad retundenda acuta spicula, quibus armatum erat malignum miasma, quæ forsan est ratio, cur senes *Pestilentiam minime sentiant*, ut scripsit Plinius, l. 7. H. N. c. 50. seu pesti minus sint obnoxii quam juvenes, de quo Zarotus in Martialem. Sicuti enim vina generosa æstivo tempore facilius putrescunt quam dilutiora (saltem in hac urbe, quæ ob aquarum subterranearum copiam Hypogæis caret) cum vina meraca, & generosa sub aere æstivante ob copiosos spiritus quibus turgent facillime in Zymosin corruptivam urgeantur, non ita vero vina Olygophora ob partes aquosas quibus abunde scatent. Talem quoque sanguinis diathesim testabantur virium subita prostratio, pulsus parvi, quæ duo satis constant, ac vigent in iis morbis, (ut in affectibus pectoris) in quibus sanguis per venam sectam emissus manifestam præbet concretionem. Usus præterea acidorum salubrior compertus quam alchalicum, sicuti, & vesicantium applicatio minus prospera, ut quæ sanguini ad fluorem prono stimulos adjicerent, idem confirmare videbantur, quibus accenferi poterat V. S. patum salutaris, a qua ægrotantes cane pejus, & angue abhorrebant.

XLVIII. Nec mirum improspere cessisse venæ sectionem perstite hujusmodi humorum dispositione, quod ut plurimum in Epidemicis, & pestilentibus constitutionibus evenit, in quibus phlebotomia non admodum bene audit (cum perraro contingat ut ejusmodi temporibus ad fixitatem humores vergant, ni potius ad liquationem tendant ob aereum venenum satis tenue, partibus sanguinis spirituosioribus nimis hostile. Eandem ob causam in omnibus malignis febribus suspensio pede ad venæ sectionem progredi solet ob metum ne una cum sanguine collabascant vires; idcirco Celsus de febris pestilentis cura l. 3. c. 7. ajebat, *Sanguinem non facile mittere, Alvum non facile ducere*, ac valde rationabiliter Doctissimus Vir Jo. Baptista Scaramuccius Urbini Medicus Primarius in Theorematis suis Physico-Medicis Theo. 1. Sanguinis missionem improbat, ubi sales lixiviales præpolleant, a quibus aliqua dissolutio possit emergere.

XLIX. At cur talia e cucurbitulis scarificatis vereri non licebat, inquiet aliquis, quasi sanguis per eas emissus non ex eodem fonte prodiret, ac is qui per venam sectam educitur, ni forsan floridior etiam sit is, qui per cucurbitulas extrahitur sectis multis arteriis? Non ibo certe inficias sanguinem per cucurbitulas educum vividiorē esse, fuisse tamen proficuū cucurbitularum usum, quam phlebotomiam, non popularis confidentia, sed experientia quæ ratiociniis nostris persæpe illudit, satis evincit. Neque suarum rationum fulcimento carebat hoc præsidii genus. In hac enim febre, in qua humores a natura ab intus ad extima propellebantur, hoc pacto magis promovebatur ad corporis ambitum illorum motus, ac variis in locis incisa cute expirabat aliquantisper occultum illud venenum quod ad cutem protrusum inibi hærebat ab aere ambiente repercussum.

L. Huic præpostero, ut rebar, cucurbitularum usui & ipse sub initium hujusce popularis morbi non parum obfuit, urgebamque levandam prius per venæ sectionem naturam eo quo premebatur fasce, nec intempestiva cucurbitularum appositione sollicitandum humorum motum, tempore præsertim ebullitionis; reclamabam sanguinis missionem nullatenus trahere a circumferentia ad centrum, imo toto eo tempore quo aperta sit vena, majori nisu ad eam partem quam ad reliquas sanguinem moveri, fidendumque potius rationi quam eventui, quem stultorum Magistrum esse ajebat Q. Fabius M. apud Livium l. 22. At fors melior eorum qui hoc præsidii genere, vel in ipso morbi principio, utebantur, vellebat aurem, monebatque vertendum stylum, nec tanti faciendas esse rationes confictas, quanti experientiam ipsam. Extant sane multa apud Auctores de cucurbitularum usu, ac si placet etiam de abusu (ut Hippolytus Obicius in suo libro de multiplici in Medicina abusu c. 7.) ac revera omnes fere in acutorum morborum principio (nisi prius per V. S. plenitudini provisum fuerit)

illarum usum improbant, Fracastorius tamen in febre lenticulari, quæ ipsius ætate, ut superius memoravimus, pervagata est, venæ sectioni parcendum volebat, ubi præsertim valde sparsa contagio esset, & cucurbitularum appositionem commendabat, nisi magna adesset plenitudo. Quanti porro faceret in hac febre cucurbitularum usum P. Alpinus ex solo capite quod in libro de Medicina Egyptiorum l. 2. c. 16. instituit, dignosci potest; disquirat enim, *An errent Egyptii Medici non utentes cucurbitulis pro adjuvanda Exanthematum eruptione*; ex recentioribus vero P. Borellus annotavit anno 1648. febres malignas epidemicas purpuratas cum magna clade grassatas fuisse, & frequentem cucurbitularum usum valde profuisse.

LI. Hinc mihi visum est considerandas non esse peticulas ut simplex malignæ febris signum, veluti communis fert opinio, nec a criticarum excretionum censu excludendas, quod ex Clar. Diemerbroechii observatione, qui peticularum historiam egregie absolvit, confirmari potest; refert enim hic Auctor sibi observatum in denatis ex purpurata febre partes omnes internas peticulis obfatas esse, quod tamen multo ante, si non oculorum, saltem mentis acie, pertigerant Vallesius in historia Simonis; Balloisius in suis Epidemiis, Fernelius in libro de Febribus. Mihi quidem cadaver nullum disseccare non licuit, ut ex autopsia peticularis hujusce diffusionis per interiora corporis certior fierem, (quando apud nos nullo pretio quicquam ex plebecula cadaver aliquod ex suis domesticis pro simplici inspectione permetteret) constans tamen observatio, quod ii qui ex hac tempestate evaserunt, per nullam sensibilem humorum excretionem convalescerint, ut superius annotavi, sed per solam peticularum suo loco, & tempore apparitionem, ac per totum corpus expansionem, lentamque earundem evanescentiam, ad credendum compellit, naturam post factam primis diebus justam humorum ebullitionem virulentum illum ichorem despumasse, ac illum primo quidem in partibus internis, mox in externis quoque deposuisse, ut hoc pacto per mille arteriarum oscula retro illo miasmate exantlato tota massa sanguinea pristino suo nitore redderetur. Curiosum autem est id quod Diemerbroechius refert sibi in cadavere ex hac febre extincto observatum, nimirum, maculas hæcæ ab ipso periosio initium ducere, & lata basi instar fumi lampadis recenter extinctæ.

LII. Non tam modicum igitur esse illud quod in peticulari febre e sanguineo penu secernitur censendum est, imo toto eo tempore quo hujus morbi historia absolvitur, talem esse diacrisim, quæ in criticarum censu reponi possit, quamvis non adeo sensibilis sit, ut reliquæ evacuationes criticæ, tum ob materiæ tenuitatem, quæ insensibiliter expirat, tum quod illius pars major per interiora corporis diffundatur, in cute pyramidis tantum apice apparente: Sic non inepte explicari posse crediderim superius enarrata symptomata, quæ febrem hanc comitabantur, sicuti & modum quo natura harum febrium curationem moliebatur; dorsi enim, ac totius corporis lassitudo, qualis in febribus, quæ *πρωϊδης* dicuntur, non aliunde quam ab ichore illo ab arteriarum osculis in membranas, & musculorum fibras refuso ortum ducebat, sicuti & præcordiorum anxietas, faucium ardor, aurium surditas, mentis stupor, ab eadem materia pendebant ad partes transmissæ, ubi functiones animales, & vitales exercentur. Cum enim natura totum venosum genus a pravo illo miasmate expurgare vellet, non unam sibi viam eligebat, quo noxios humores eliminaret (ut aliquando per vomitum, alvi fluxum, urinarias vias, cutis poros solet efficere) sed tot sibi fores aperuit quot sunt arteriarum oscula, idcirco omnes fere corporis partes noxam sentiebant, donec rejectamentis illis discussis priorem tonum recuperarent. Cum hoc modo itaque in hac febre expugnanda natura procederet, mirum non est, si suspensio pede ad venæ sectionem, alique remedia administranda procedendum erat, ne distraheretur natura, & cur felicius res cesserit Medicis sanguinis abstinentiis quam philematicis, quam ob causam pagani facilius evadebant, quam urbani, qui persæpe mendo ægrescebant.

LIII. Ubi vero malignum illud virus præpollebat ad internecionem usque spirituum animalium, & vitalium, cuncta in pejus citissime ruebant, peticulis seu vix se prædentibus, seu subito evanescentibus, quibus præsto aderant summa virium prostratio, asphyxiæ, totius corporis perfrigerationes, singultus, & ischuriæ spurix, quæ satis frequentes fuerunt; cessante enim spirituum animalium influxu, & feriente corde a naturali motu, nullus fiebat arteriosi sanguinis ad renes appulsus, & consequenter nulla seri secretio; qui autem ex hac febre occumbant pleni, & succulenti, ut diximus, efferebantur, eo quod non ingens esset calor, qui febres istas comitaretur, (quam ob causam non admodum sitirent) & quia pertenuis esset quod per transpiratum exhalaret. Cur vero decrecente luna, ac eadem silente, magis sæviret hæc febris (si in re tam abstrusa licet aliquid conjicere) id fieri potuisse crediderim, eo quod sicuti in Microcosmo dicitur luna gubernatrix tenebrarum, & mobilis undæ, cum illi uni æquor obtemperet, sic super Microcosmi lympham dominatum obtineat, & quemadmodum omnia in Plenilunio Maria purgantur, ut ait Plinius l. 2. H. N. cap. 98. ita in hac febre, dum luna pleno lumine vigeret, sanguineum serum in motum ciceret, unde promptius macularum eruptio, & totius massæ humoralis repurgatio contingeret, ejus vero lumine deficiente, ac per totum tempus illud, lenius moverentur humores, ideoque minus apti ad exitum, & sic conclusi febrem auferent.

LIV. Quoad reliqua symptomata, quæ hisce febribus in progressu superveniebant, ut singultus, alvi fluxus, verminosa soboles, hæc non solum morbi sævitiam prodebant, sed primam regionem crudis humoribus oneratam fuisse demonstrabant, propterea blanda purgatio, non Mochlica, in principio harum febrium peticularium non prorsus fuit incommoda, quamvis casu instituta, nec credita febribus hujus profapiæ multum conferre; leniter enim educta humorum saburra in stomacho contenta, natura exinde ad perficiendum opus suum pro massæ sanguineæ a pravo miasmate expurgatione per macularum diffusionem ad cutem usque facilius procedebat. Hoc documentum blandæ purgationis in principio vel neglectum, vel parum salutare creditum, non levi damno ægrotantibus fuisse crediderim, præpeditis enim, ac conspurcatis primis viis, cardiacis remediis, quibus oppugnanda erat febris, præcludebantur fores, vel iis non licebat cruoris sedem, & cordis penetralia nonnisi deturpata facie subire. Hanc ob causam suspecta sunt alexipharmaca in malignarum principis, nisi ab obstructionibus expeditæ sint viæ, ut apud Galenum, 5. de San. tu. cap. 6. Septalium, Caut. Med. lib. 5. num. 47. lib.

lib. 2. cap. 13. & alios videre est, quidquid in contrarium sentiat Manelphus in libro suo de febribus.

LV. Haud me latet non adeo probari a multis in principio harum febrium purgationem hanc per medicamenta Syrmefina dicta, ut P. a Castro in aureo suo Opusculo de Punctulari Febre, ubi in specie electuarium lenitivum improbat, Antonio Ponce a S. Cruce, Vallesio in commento historiarum Simonis apud Hippocratem, ac inter recentiores Ettmullero, qui suspectos habet in purpuratis febribus clysteres ipsos, nedum purgantia; non desunt tamen qui levem purgationem admittant, ut Septalius qui Galenum lib. 5. Anim. num. 47. ipsum testem adducit in famosa historia Simonis, cui lata Exanthemata erant, purgationem aliquando commendantem.

LVI. Usus porro Peruviani corticis parum salutaris compertus est, vel quod tunc temporis exhiberetur, cum stimulo opus esset non frano, dum remedium istud, ut diximus, prescriberetur in febre lenta peticulari febre non bene judicata superfluit, vel quod tale presidii genus febribus hujus profapia non conveniret. Varie profecto audit, ac variam experitur sortem, vel in iisdem locis, ac regionibus, famosum istud febrifugum, ut eodem tempore laudetur ab his, culpetur ab illis, & modo probrosius, modo magnificis titulis vocetur, medicinam dolosam Peruvianum corticem vocat Willsius de Febr. cap. 6. Richardus vero Mortonus Medicus Anglus in Pneumologia, plantam qua detrahitur cortex iste, arborem vitæ appellat; numid contingat ob remedii inefficaciam, quod non omnibus febribus, nec in quolibet temperamento conveniat, an ob medentium incuriam, qui non rite suo loco, & tempore illud exhibeant, merito ambigi potest. Mehercle omne febrium genus tam magnas, quam parvas, intermittentes pariter, ac continuas gladio hoc Delphico jugulare velle summa dementia est, & funesti casus ubique memorantur, in quibus China China inauspicato assumpta ægrotantes vel inopinato sustulit, vel ad insanabiles ægitudines sensim deduxit. Cautiones certe notatu dignas pro recto Chinæ Chinæ usu videre est apud celeberrimum Ettmullerum in Dissertatione de usu, & abusu Præcipitantium, ubi spiritum salis armoniaci proponit ad excitandam febrem a China China sopitam, quotiescunque, abdominis dolores, artuum ostocops, alvi oclusio, nocturni sudores, aliaque mala supervenerunt; refert enim observatum spiritum salis armoniaci febres ab hoc cortice fugatas prompto revocasse. Non est hujus loci in usum, & naturam tam celebris febrifugi altius inquirere; solum hac occasione memorare libeat, annotasse me in prima mea Dissertatione de constitutione Anni 1690. (quod ulteriori observatione confirmatum comperi) in frigidis & humidis constitutionibus quæ corpora nostra crassis humoribus infarciunt, parum salutarem esse corticis Peruviani usum; in calidis vero, & ficcis constitutionibus, in quibus humores aliquo egent suffamine, remedium istud egregiam operam præstitisse.

LVII. Quamvis autem in hac mea Dissertatione præcipuam curam impenderim, ut hujus malignæ febris, quæ tandiu pervagata est, indolem, ac genium explorarem, & exponerem quibus præsidii illius oppugnatione tentata fuerit, non ideo tamen inficias ibo multas alias graves ægitudines sporadicas eodem tempore hunc vel illum afflixisse, ac etiam sustulisse, quales sunt morbi particulares secundum varia anni tempora, ut Æstatis cholera; Autumnus febres erraticæ, & Quartanæ, & modo morbi Hyemales, & Vernales, sed quia in iis nil Epidemici annotare licuit, eos propterea silentio transigere volui, quando illorum Theoria, & Therapeja apud Præcitos Scriptores satis vulgata est, nec illorum curatione quicquam magis desideratur quam medentis judicium, & prudentia. Quia vero in morbis vulgaribus (qui ut plurimum satis vulgari diligentia tractari solent) memorandum illud τὸ θείον Hippocratis dilitescere video, in illorum indagine potissimum mihi desudandum fuit, nec unquam desistam quin Professores exhorter, ut in hunc campum pedem immittant ubi non spicilegium, sed segetem amplissimam contemplationum semper invenient, & quæ ipsis decori, & ægris salutis futuræ sint.

LVIII. Ad duos fines nos militare scripsit divinus senex, in Epist. ad Cratenam, unum Hominis, alterum Artis; nostra vero hac ætate nescio quo genio, medentum Primores in rebus quæ decus quidem aliquod arti, sed nullum pene ægrotantibus præsidium possint inferre sunt occupatissimi, cum enim toti sint in minis explorandis, ac tanquam in haruspicina ad extispicia intenti, ex viscerum fibrillis naturæ opera, ac magisteria alioquin deprehensibilia divinare præsumant, ad gloriam, & nominis celebritatem aucupandam solum incumbunt, quasi eo res deducta fuerit, ut in re medica non nisi professoribus, exercendi ingenii, & famæ comparandæ locus relictus fuerit. Quid si Aristophanes hodie viveret? quibus salibus, curiosam hanc diligentiam non perficeret? liceat referre illius versiculos, qui in sua puritate plus habebunt leporis, & energię; interrogatus ergo Socratis discipulus a Therpiade per quamnam viam canerent culices, num per superiora, an per inferiora.

ἔφασκον εἶναι τὸν ὑπερὶ τῆς ἐμπέδος
σερὸν διαλέπτου δότος αὐτῆς τὴν τροπὴν
βία βαδίζειν ὅθεν τὸ ὑπὸ πύγῃ.
ἔπειτα κοίλον πρὸς σεῶν προσκείμενον,
τὸν βρωκτὸν ἢ χεῖν ὑπὸ βίας τῆς πνεύματος.

Idest ex versione Andreæ Divi Justinopolitani.

Dixit esse intestinum pulicis
Augustum, per parvi autem existentis ipsius spiritum,
Ut ire recta in podicem,
Postea concavum ad angustum adjacentem
Podicem sonare a vi spiritus.

LIX. Absit tamen quod anatomicam indaginem tanquam laborem improbum traducam; solum dolendum videtur, quod cum Spartam hanc satis ornatam, & exultantem esse pateat quantum praxis medica exigit, omnes fere qui ingenio magis præstant in id usque ad temporis dispendium incumbant, cum ad alia magis usui futura mentem ac vires possent intendere, inter quæ non postremum sane locum meretur Epidemicorum æstium historia, qua nihil in re medica forsan magis desideratur, & minus excolitur.

HISTORIA EPIDEMICA

GERMANIÆ.

Constitutio Epidemica Augustana Ann. 1695.

D. N. D. LUCÆ SCHROCKII,

Academiæ Cæsareo-Leopoldinæ Naturæ Curiosorum Præsidis.

Præclarum institutum, quo singulorum annorum Epidemias erudito calamo conscribere nuper incepit Italiæ suæ ornamentum, Illustr. D. Bernardinus Ramazzinus, Archiater & Professor Mutinensis meritisissimus, insigni utilitate cum sese commendat, simile quid etiam in Germania nostra moliri, & breviores de Epidemica annorum constitutione relationes exhibere dum intendimus; idem circa dilectam Patriam meam, Augustam, vicinumque districtum; quantum observare mihi datum fuit, simplici historia fideliter tentare, simulque Nobilissimos meos Dn. Collegas naturæ curiosos ad similem, observata possibili brevitate, præstandam operam humaniter invitare libuit. Eo majorem autem ad hoc pensum stimulum, cum nostri quondam Nestoris I. celeb. Dn. Georgii Hieronymi Welschii manuscriptus libellus, quem Epidemica Vindelicæ inscripsit, ab anno Christi usque ad 1677. in manus meas devenerit; quem laborem mihi hucusque continuare placuit. Quamvis autem hæc in publicum emittere nunquam animus mihi fuerit; Welschianis illis partim nimis succinctis, partim & imperfectis existentibus, meis autem collectaneis in propriæ solum memoriæ subsidium destinatis, si tamen vel tantillum utilitatis in rem medicam ac posteritatem inde resultare posset, publico, qualecumque demum fuerit, haud denegabo.

Ut autem anni 1695. statum exordiar, postquam solstitium hyemale frigore intenso annum 1694. terminavit, non minus insequens annus, multis nebulis conitatus, frigore molestus intravit; & quamvis paulo post temperatior aura, Zephyro flante, quin & pluvias adducere, redderetur, euro tamen & austro circa finem Januarii St. Greg. nives spargentibus, insignes frigoris molestias denuo persensimus, easque, licet post bacchanalia mirior aura per aliquot dies spirasset, usque ad æquinoctium vernale perferre coacti fuimus. Unde in hac aeris anomalia non potuit non insignis in sanguine mutatio contingere, & cum primis lymphæ non tantum ab intromissis ex pluviosa constitutione copiosioribus aqueis moleculis multum augeri, sed calidiorem etiam ob auram magis rarefieri, quam tamen frigidior superveniens denuo condensare, inque liberiore transpiratione impedire, ac passim stagnationem inducere valuit; quo in statu cum nec digestionem aut debitæ secretionem sufficienter celebrari, nec sanguinis motus placide promoveri, spirituumve puritas aut vigor conservari queat, facile colligere datur, quam variæ in œconomia animali & vitali turbæ excitentur, eo graviores futuræ, si una impuriore, falsæ, sulphureæque lateant particule, quæ hinc fermentatione concepta malignam vel venenatam quasi naturam induant, aut etiam latentem antea malignam auram suscitent. Cum vero aliquot jam per annos tale quid in urbe nostra sedem fixisse comperiamus, ut licet cessare nonnumquam per unam alteramve septimanam videatur, mox tamen exferere se denuo incipiat, quin & contagio se haud obscure propagare nitatur, experientia nos edocuit, toto hoc tempore febres continuas fuisse obortas, quæ majori ex parte malignitatis notas, tum consuetis symptomatibus, tum maculis peticularibus ostendebant, quibus aquosæ pustulæ, ut plurimum dum morbus ad declinationem vergeret, cum nova caloris symptomatumque exacerbatione, in multis superveniebant: paucissimi erant, qui per morbum delirabant; in plurimis pleuritidem primò vel catharrum mentiebatur morbus, quamvis etiam tum temporis, præter arthritides vagas, pleuritis non infrequens esset, & aliquos graviter; quin & pustulis illis miliaribus malignis simul affligeret. Dira etiam intermittentium febrium, quotidianarum, erraticarum, & tertianarum cohors urbi incubuit. Quæ morborum facies, remissiore quidem in vere, frigida cum mitiore aura semper reciprocante, continuabat; quibus, ex ejusdem feri hic ibi stagnantis, & glandulas inundatis ad coagulum pronitate, catharri pectori infesti, & nonnullos cum febrili effervescencia occupantes, accedebant, quotidianæ vero & erraticæ febres, hecticarum fere æmulæ, magis magisque se diffundebant, atque ægrotos in juvenili ac teneriori ætate constitutos graviter affligebant, Medicisque ob mali pertinaciam multum negotii, fere usque ad autumnale Æquinoctium faciebat, aderat in omnibus circa officium ventriculi superius præcordiorum compressio, appetitus prostratus, virium lassitudo, corporis extenuatio, caloris intensio, vespertino tamen ut plurimum tempore exacerbatio; in quibusdam exiguus hujus, in aliis fere continuus sensus, sudoris rara eruptio; ardor vero & dolor tensivus manuum ac pedum ægros admodum torquebant: nec paucierant, quos, perseverante adhuc morbo, loquela, sine deperdito tamen linguæ motu, destituerat, aliquibus etiam surditas, & aliquibus sensuum internorum stupor, per plures dies, vel duas tresve hebdomadas accesserant; malo hoc postea, recedente febre, sponte quasi iterum cessante. Medicamenta autem quæ acorem præternaturalem atque lentorem lymphæ, non negligendo ea, quæ genus nervosum ac spiritus confortare &c. poterant, ex. gr. specificum antihecticum Poterii, gammarorum lapillos, elixirum proprietatis beat. nostri Clauderi, essentiam corticis Peruviani &c. proficua deprehendi; sicut tinturam bezoardicam D. Mich. sal cornu cervini volatile, essentiam inumæ Clauderianam, Diacordium Fracastorii, thiacam cœlestem Greiffianam, pulverem Sabaudicum, rubeum Pannonicum, cum antimonio diaphoretico, unicornu fossili & marino, pro subjectorum & symptomatum varietate, in tempore & provide propinata, non inefficacia in malignis fuisse, experientia docuit.

Cum sol Genellorum signum ingrederetur, & crebrioribus pluviis perfunderemur, catharri frequentes esse cœperant, tonsillarum in primis intumescentiam inducentes, (consuetisque feri coagulum externe & interne resolutibus medicamentis obtemperantes) præcipue cum frigus insolitum, de quo alibi locorum non minus passim conquerebantur, æstatem subinde odiosam reddidisset.

Circa Æquinoctium autumnale, itidem frigore molestum, humorum convulsivum asthma in puerilem ætatem sæviebat, aliquos etiam

etiam trucidabat. Postea tamen, licet haud clementior esset aeris, pluviosa nempe & frigidiuscula ut plurimum temperies, imo post medium Octobrem, totum insequentem mensem, nec non dimidium Decembrem frequentissimæ nebulæ, ac per plures sæpe dies continuæ aerem occuparent, Morbo attamen magnas dabat inducias; quæ vero collecta interea ex vaporosis istis halitibus novo infirmitatum apparatu & serosa colluvie, eo acius insurgerebat, & sole Scorpionis signum egressuro, arthritides vagas, rheumatismos, in quibusdam intensio dolore nucham, frequentissime autem pectus tussi graviori excruciantes, in senibus quoque apoplexias fortes lethales accersebat; quin & febres denuo malignæ, petechiis & pustulis stipatæ, hætenus rariores observatæ, majori jam impetu pluribus insultabant, cephalalgia in principio morbi vehementi, brevi tamen recedente, intensis dorsi doloribus, præcordiorum compressione, tussi, alvi constipatione molestæ; cuni interea urinæ color non multum a statu naturali recederet, vel justo dilutior compareret, nec pulsus admodum irregularis esset. Frigore autem ultimum anni mensem, satisque intense ejusdem exitum comitante, pacatiora rursus tempora, atque populariter grassantibus morbis liberiora sequebantur, postquam febrium malignitas supradictis remediis, rheumatismi autem infusi thee, aut analogi veronicæ, betonicæ &c. succinatorum, saliumque volatilium urinosorum, non neglecto, ubi opus erat, moderato opiatorum, in primis pilularum de cynoglossa Nic. usu; arthritides denique cinabarinis, antimoniatis, lumbricatis, quin & cum in quibusdam febrilem aliquem insultum alterius diebus deprehenderem, kina-kina, quibus subinde blandior ex pauco scammonii sulphurati & antimonii martialis fixi pulvere alvi laxatio interponebatur, atque dolorum sævitia per demulcentia in primis cataplasmata (spirituosis & oleosis eam magis exasperantibus) mitigabatur, essent devicta.

Cum etiam Excellentissimorum Dominorum collegarum curiosorum aliqui petito meo, in simili materia submittenda, benevole subscripserint, eorundem historias subnectere, & ordine, quo fuere transmissæ, adducere lubet.

Constitutio Epidemica Hassiaca Anni 1693. & 1694.

DN. D. MICHAELIS BERNARDI
VALENTINI,

*Missæ d. 5. Aprilis Ann. 1695. Gissa Augustam
Vindelicorum.*

Præcedente hyeme pluvioso, sed in fine gelidissimo, sub primo Vere & insolitus aeris fervor ingruerat, qualis & per omnem ætatis cursum observabatur: quæ mutatio subitanea non poterat non inæqualem & præternaturalem humorum & spirituum motum causare, quem & hominum & brutorum strages infecuta est. Boves sane & vaccæ catervatim succumbebant, cujus rei causa statuebatur inter alia ros corrosivus, lintea maculis plus minus luteis conspurcans, & omnino corrodens, de cujus ætiologia elegantissime D. Ramazzini. Ex carnificum observatione plerumque phthisi pulmonali necabantur, ad quam sine dubio haustus frigida copiosior post æstum intensissimum multum contribuere poterat. Homines præter dysenteriam & febres malignas sub finem Junii & initium Augusti hic locorum infensa erat febris quædam intermittens, ut plurimum tertiana, sive simplex, sive duplex, solo fere calore molesta, ut a plurimis ab acutis vix distingui potuerit. Præcedenti enim levi frigesculo calor intensissimus, virium summa prostratio, anorexia &c. accedebant, quæ præmissis vomitorio, corticis Peruviani usu plerumque curabantur, cui regulus antimonii medicinalis quandoque præmittebatur, venæ sectio, quam vel ipsi urgebant aliquando ægri, nunquam noxia erat, morbumque protrahebat, aut ad minimum summam, fugata licet febris, virium debilitatem inducebat.

Hanc sequebatur paulo alia

Constitutio Anni 1694.

In qua hyemem satis inclementem calor Veris extraordinarius excipiebat, ut arbores brevi admodum in flores se induerent, qui tamen omnem, quam primum injecerant, spem eludebant, postquam frigore subito superveniente prorsus emarcuerant. Sequebatur Æstus summe calida, qua ultra hominum memoriam vix sicciior observata fuit, sub cujus cursu morbilli, sed benigni fere moris grassantur, aut sponte aut bezoardicis & expellentibus solitis cedentes, in quibus tussis & asthma præprimis erant molesta, quæ spiritu salis armoniaci anisato, seu ut hic locorum audit, spiritu peccorali anisato optime sistebantur. Annonæ summa fertilitas, duplicato modum infarciens, qua frumentorum caritas hic subito sublata fuit. Autumnus & Hyemis initium pluviis crebrioribus mædebant, variisque catharris, pleuropneumoniis & febribus malignis a milite & castris ad hyberna redeunte fere allatis, plurimisque funestis erant molesta, quæ omnia frigus horrendum sub cœpti modo anni 1695. initia excepit.

Constitutio Epidemica Basileensis Anni 1695.

DN. D. JOANNIS JACOBI
HARDERI,

*Missæ die 20. April. Ann. 1695. Basilea
Augustam Vindelicorum.*

Morbi, qui cum hyemali tempore, tum eodem jam finito, epidemice fere grassabantur, sunt colicæ passionis pertinaces: apud infantes vomitus, seu variolæ essent erupturæ, præcedente horrore, inde iæctus cum dejectionibus verminosis; apud adultos quoque febres verminosæ: jam vero præter febres continuas ac intermittentes, pleuritides, & pleuropneumoniæ: singuli aeris variam constitutionem, & subitanæ immutationem, pro secunda matre agnoscences.

Constitutio Epidemica Berolinensis Anni 1695.

DN. D. GUSTAVI CASIMIRI
GAHLRIEP,

von der mühlen,

*Missæ d. 5. Januarii Ann. 1696. Berolino
Augustam Vindelicorum.*

DN. Præside me ad id excitante, 1. Januar. 1695. (22. Decem. br. 1694.) cœpi dietim mutationem aeris ac tempestatum notare, ac observavi a plenilunio die proxime præcedenti 31. (21.) Decembr. illucescente frigus, quod hætenus satis temperatum fuerat, paulatim invalescere, nivibus subinde permixtum. 8. Januarii (29. Decembr.) autem, sub ultima quadra aere nimbofo rursus parumper remittere. Sequentibus vero diebus denuo ingravescere, moderato tamen adhuc ad usque novilunium 14. (4.) Januarii ingruens. Quod subitam gelu remissionem cum nivium ac ventorum copia, postea nubilo cælo gelu iterum moderatum biduum circiter durans ad meridiem usque 18. (8.) induxit. A quo soluta rursus glacie vix medii diei inducias dedit; Nam redintegratis viribus revertens primam lunæ quadram in 22. (12.) incidentem cum pertinentibus illuc diebus, rigoroso gelu transiegit, ut & plenilunium 30. (20.) lucens, sicque primum hunc mensem finit.

Alterum eodem vigore inchoans ultimamque quadram 7. Febr. (28. Jan.) orientem ad 13. (3.) usque transiens, atque remissionem sic unius, viginti quatuor dierum, nonnunquam tamen paulum mitigato, rigore pensans duravit. Tum vero accedente eodem die 13. (3.) novilunio, rursus aliquantulum remittens pluviis glaciem, quam tot diebus gelu pepererat, unica die liquans, ac parum quod ejus restabat, copiosa nive intermixtis quoque procellis tegens, mox insequenti mane ad ingenium rediit; perque biduum gelando continuavit. Mox vero 17. (7.) rursus remisit; At sequenti die denuo redintegrato vigore, prima quadra 20. (10.) apparente, nec quicquam obstante ad 23. (13.) usque perrexit. Quo die remisso paululum rigore pluviæ nivibus succenturiavit unica tantum die: Graviori enim impetu interpolatis subinde sereno cælo nivibus ac quandoque ventis irruens, quatrimum ad 28. (18.) usque hujus secundi mensis adeoque ultimum perstitit.

Quo die a violentia priori desciscens nivibus ac grandini pluviæ interspersit; sed sequenti 1. Martii (19. Febr.) cum plenilunio denuo vim pristinam induens non modo pristinum exeruit robur, sed & auxit. Verum vix biduum servavit ab illa sævitia. 3. Martii (21. Febr.) deficiens, ac nocturnum frigus, & quandoque gelu diurnis pluviis ac nivibus temperans, reliquum illius quadra & sequentis postremæ 8. Martii (26. Febr.) apparentis ad novilunium usque 15. (5.) accedens vario & invariabili cælo transiit. Tum priorem indolem Borea flante induit, sereno cælo gelu, nocturnum præcipue, satis validum reducens ad post primam quadram 22. (12.) radiantem ad 24. (14.) usque continuando. Inde viariam cælo faciem sumente, nunc serenam, nunc nubilam, nunc undosam, nunc siccam, nunc tranquillam, nunc turbidam cum plenilunio 30. (20.) lucente & sequenti die 31. (21.) Martium cum trimestri primo terminante, ad ultimam usque quadram etiam 6. Aprilis (26. Martii) subsequenter, die nocturne alternando frigus moderatum calore temperavit.

Morbi hujus primi trimestris initio reliquæ fuere præcedentis varii & inconstantis autumnii, diarrhææ, dysenteriæ, febres variæ, & quartanæ præsertim & duplices tertianæ, erraticæ nonnullæ. Quibus sese iunxere pleuritides, peripneumoniæ sed raræ, tussis sicca & humida, harumque soboles phthisis, ut & hæcticæ, sed paucæ, malignæ item febres variolis præcipue, morbillis, purpura nonnunquam, rarius tamen petechiis, sic satis adhuc benignis, intermixtis. Tertio mense accessere prioribus etiam apoplexiæ subito quosdam perimentes, & paralytes quandoque reparabiles, catharri contumaces ac tussis implacabiles, arthritides vagæ valde contumaces, & dolores ac defluxiones aliæ scorbuticæ pertinaces; plerique tamen horum morborum præter variolas sporadici fuerunt, non Epidemici.

Secundi trimestris exordium a prima Aprilis (22. Martii) ad prædictam ultimam quadram 6. Aprilis (27. Martii) accedentem usque de amœnitate præcedentis mensis participans ac veris verum initium exhibens, cum prædicto ultima quadra degeneravit, ac ingratum denuo frigus nocturnum, aerem tempestuosum, nives, grandines, pruinas, similesque inacceptos Veri hospites advexit, ad 10. Aprilis, (31. Martii) usque, qui æthere mitius paulo aspirante pluviæ lenes, frigidas tamen adhuc, sparsit. Sequentes duo pluviæ vento impetuoso ac frigori haud usque quaque grato miscere, atque aeri turbulento, non tamen plane gelido, ac novilunio 13. (3.) Aprilis tranquilliori cælo, moderatiorique frigore placide ingruenti præmiserunt. Verum 14. (4.) ad pristinum statum tetricum, turbidum, frigidum & immitem rediens 15. (5.) gelu nocturnum ac serenius paulo cælum induxit. Cui mox gravius gelu nocturnum sudo interdiu mitigatum per biduum, huicque rursus aer temperatus ac serenior alterum biduum durans successit. Quod nubilum rursus & frigidum excepit, succedentibus nocte sequenti nivibus, quas primæ quadra 21. (11.) appropinquantis prodromos mane pluviæ sunt subsequuntæ, a meridie cælum relinquentes nubilum, in pruinosam noctem declinans, inque temperatum insequens mane ac vernal tandem de die aerem desinens. Qui post noctem placidam, ac mane ventos nonnullos pluviolis madentes, amœnum postera die produxit 24. (14.) per biduum durans, tandemque tertia 26. (16.) die in æstivum fere solis ardorem, pluviæ admodum fertilis prænuncium transiens. Cui gratum successit sequentibus diebus sudum pluviis nonnullis irrigatum ad 29. (19.) usque plenilunio tum lucente, ac ventorum aliquid blandiorum, etesias dixisses, intercalante. Sequens dies serenus tonitru pomeridie inexpectato, & mature nimis pluvia copiosa stipatum, prima hoc anno vice submitit, sicque finem primo huic secundi trimestris mensi imposuit.

Sequens 1. Maji (21. April.) amœna serenitate inclutus, successorem habuit sui fere similem, paulo tamen magis nubilum & frigidum, perinde ut & reliquos temperato & verno cælo soleque calente ablandientes ad 5. Maji (15. Aprilis) ultimæ quadra dictum. Cui nubiloso & sparsis subinde pluviis ab amœnitate illa de-

degeneranti, procellosum & frigore pluviis ac nivibus inacceptum accessit biduum. Illique rursus ad 10. Maji (30. Aprilis) ingratum frigidum, udum ac pluviosum cælum. Donec 13. (3.) Maji appropinquans novilunium post temperatum sereno magis aere unicum diem inconstantem & variam, pluviis, ventis, frigore, moderato tamen, intermixtam tempestatem induxisset, nubilum æther rarius solaribus radiis pervium ad 17. (7.) usque continuavit, sudo tandem semet rursus & calore moderato biduum durante commendantem. Quem pluvia denum ingrata triduum continuantes, & in grave tandem tonitru desinentes 21. (11.) ipso primæ quadræ die, secutæ. Hasque rursus sudum in pluvias ac tonitru a meridie terminans. Atque istas denuo sequenti mane sereno aere, frigus, hoc pluviae lenes, clementiori paulo cælo exceptæ, illud denique sereni aliquot rursus dies aeris clementiæ ac vernæ amœnitatis postliminio quasi cum plenilunio 28. (18.) radiante reducis, ac ad 31. (21.) usque mensis hujus Maji terminum perdurantis, mox tamen in pluvias denuo ac ventos fatiscantis quasi præcursores.

A primo enim Junii (22. Maji) ingrata pluviis, ac nimbis tempestas, noctes gelidæ ac pruinosæ, venti Boreales, dies a nocturno gelu rigidi, nec nisi a meridie paulum a Sole culminante degelantes succedere, ad ultimam usque quadrantem 5. Junii (26. Maji) apparentem favientes. Hæc commodiori rursus tempestati locum dedit cælo sereno & amœno, calore grato pluviolis lenibus ac sæcundis ad 7. Junii (28. Maji) usque durantibus; Mox vero ab illo, vario & turbulento, frigido & pluvioso ad novilunium usque 11. (1.) accedens perseverantibus permutatæ. Hoc insequens dies solis radios serenior cælo, frigore tamen molesto admisit 13. (3.) denuo in pluviosum pristinum ac nubilum statum transiit, 14. (4.) Nubilum sudo temperavit, subsequenter hunc aliquod ad primam usque quadrantem 19. (9.) illucescentem & comites ejus (25.) (15.) solo, qui frigidior, nubilus ac pluviosus, excepto serenis ac paulo mitioribus. Ipso etiam plenilunio his accensendo ut & reliquis, præter 30. (20.) qui mensem hunc, simulque trimestre secundum tonitru ac imbre clausit.

Cujus trimestris primus mensis catarrhis, rheumatismis, tussibus, febribus catarrhalibus, aliisque diversorum generum, tertianis simplicibus ac duplicibus satis frequentibus, paucis quartanis, affectibus scorbuticis, hic endemiis, variis varios varie affligentibus infestus.

Alter, qua morbos, priori fere affinis, nisi quod in hoc variolæ nonnullæ & purpureæ febres, pleuritides veræ & spuriae, petechiæ febrium ardentium malignarum nonnullarum comites, colicæ & hysteriæ passiones, hypochondriaci affectus, anginae sese quandoque parcius tamen offerrent.

Tertius, præter præcedentium nonnullos, menstrua inordinata, cachexias, ventriculi imbecillitates & cruditates, hypochondriorum dolores, colicas, diarrhœas &c. tulit.

Mensis Julii, qui tertii trimestris primus, initium præcedentis Junii fini postremum si exceperis diem, ultima quoque quadræ 3. Julii (23. Junii) lucente, computata ad 7. Julii (27. Junii) usque aeris serenitate, & sic satis jucunda tempestate respondit. Hic vero nubilus fuit ac turbidus, cujus morem sequentes ex parte imitati mane sereno cælo, pomeridie turbidum nubilum ac pluviosum subjunxerunt. Excepto 10. Julii (30. Junii) qui rursus totus turbidus, frigidus, nubilus, & pluviosus adeoque extreme ingratus fuit, subsequenti 11. (1.) Julii novilunium nubilum cælum sudo correxit, hacque ratione reliquis quatuor ad 16. (6.) usque commoda satis tempestate exemplo quasi prævit. Ille autem a præcedentium more deficiens nubilus, frigidus ac pluviosus successores habuit seipso meliores ac mitiores, æstivo calore, ac sæpius de die sudo, noctu quandoque pluvia moderata commendabiles, ad primam quadrantem 19. (9.) lucentem, ut & plenilunium 25. (15.) fulgens perseverantes & usque 29. (19.) qui, insolito hoc tempore, frigore, pluviis ac circa vespere tonitru variis, similes sui sequaces habuit, præsertim 31. (21.) frigidum valde, breveque sudum imbre copioso pensantem, sicque mensem hunc ingrato epiphonemate terminantem.

Succesit eodem fere tenore 1. Augusti (22. Julii) primam quadrantem adveheus, simulque aerem instabilem frigidum ventosum, tonitru & pluviis quibusdam mixtum; Huic æqualis fere 2. Augusti (23. Jul.) sudum frigidum pluviis ac ventis subinde variis 3. Augusti (24. Jul.) ad meridiem usque 4. Augusti (25. Jul.) amœnam reduxit serenitatem, sed instabilem ac imbre pomeridiano dilutam. 5. Augusti (26. Jul.) turbidus mane & imbribus udus, a meridie ferior, sed frigore horridus. 6. Augusti (27. Jul.) totus pluviosus & imbribus madens, perinde uti & sequens 7. Aug. (28. Jul.) ingrato, turbido & pluvioso aere sædus. Omnes hi & præcedentes nonnulli, quod Julii potiore partem & Augusti initium insolito hoc anni tempore frigore, sereno licet nonnunquam intercedente cælo, æstivam alias his temporibus debitam amœnitatem deturparint, simulque satorum proventus, incrementum & maturitatem impederint, sicque annonæ caritatem induxerint, infames merito audiunt & infasti dies. 8. Augusti (29. Jul.) novilunii 9. Augusti (30. Julii) apparentis antesignanus, & sequentes gratam ac æstate dignam, sed heu! sero nimis reducerunt tempestatem, præter 13. (3.) qui eam a meridie pluvia vento, ac tonitru paululum turbavit; stabilem aliquando, ac nisi quod amœnitati pluviolam quandoque interspergerent, ad ultimam usque quadrantem, simulque terminum hujus mensis 31. (21.) nempe ejus, paulo prioribus frigidiorum diem percurabilem.

Septembris exordium 1. Sept. (22. Aug.) præcedentis tempestatem æmulatum cum tonitru pluviam admisit, sic temperato aere ac sereno ut plurimum cælo lenibus nonnumquam pluviis a meridie præsertim alterato, reliqui subsequentes ad novilunium 8. Sept. (29. Aug.) incidens, quod temperatum alias udum imbribus junxit vespere, hacque ratione 15. (5.) addendo etiam procellam ad primam quadrantem 16. (6.) orientem paulo præcedentibus frigidiorum procedendo, varioque sequentibus diebus cælo 20. (10.) temperando nubila serenis, moderato quandoque quoque frigore & pluviis ad plenilunium 22. (12.) radians, imo ipsam ultimam quadrantem exiguu discrimine a præcedentibus discrepantes perrexerunt, sic simul 30. (20.) & hunc tertium tertii trimestris mensem abolverunt.

Morbi hujus trimestris primo mense; Julio nimirum præter scorbuticos affectus & hypochondriacos alii non adeo frequentes fuerunt, febres fortassis nonnullæ, tertianæ & continuæ, pleuritide quando-

que tam vera, quam spuria stipatæ, colicæ passiones, hemicrania, catarrhi.

Secundi, Augusti nimirum febres variæ ardentes præsertim acutæ & continuæ cum & sine delirio, cephalæa enormi, & similibus febrium symptomatibus comitatæ, nonnunquam & diarrhœa contumaci, quædam etiam cum exanthematis variis purpura, petechiis raro tamen nec usquequaque malignis. Nec defuerunt scotomiæ, lipothy-miis nonnumquam complicatæ.

Tertii, Septembris febres rursus variæ, catarrhales præsertim vario typo luxuriantes, tertianæ tamen pleræque, continuis quandoque combinatæ, rheumata, leucophlegmatia, vertigines, cephalæa graves & continuæ, febrium præcedentis mensis ardentium & continuarum affectu & pedisseque, pleuritici dolores spurii.

Primordium ultimi trimestris mensis Octobris triste fuit 1. Oct. (21. Sept.) cælo existente frigido, turbido ac pluvioso. Sequentes & quidem 2. Oct. (22. Sept.) frigida ac serena, 3. Oct. (23. Sept.) mane frigida & pluviosa, a meridie ferior & mitior, 4. Oct. (24. Sept.) mane nebulosa & frigidula, a meridie serena & amœna 5. Octob. (25. Sept.) cum prima quadra constantem ad 10. Octob. (30. Sept.) usque tempestatem amœnæ serenitatem induxit. Hæc decima nebulosa ac turbida tota fuit 11. (1.) & 12. (2.) plenilunio insignis mane nebulosa, a meridie serenitate aerem temperaverunt, quas sequentes ad 26. (16.) imitatur. Hæc vero a præcedentibus turbidior paulo calidior ac udo aere diversa, focias sibi sequentes duas ascivit, 29. (19.) a meridie serena, 30. (20.) ultimæ quadræ dicata, tota nubilosa. Sequens 31. (21.) sicque mensis hujus postrema mane præcedenti similis, a meridie undosa fuit.

Morbos hic mensis paucos habuit, eosque scorbutico ut plurimum & hypochondriis originem debentes, præter febres nonnullas tam intermittentes, quam continuas, malignas rarius, diarrhœas, haud tamen frequentes, dysenterias paucissimas, epilepsias infantum quasdam, dentitioni plurimum imputandas, arthritides vagas, sed & has scorbuticas, hystericas passiones.

November secundus quarti trimestris mensis a 1. Nov. (22. Oct.) ad 4. Nov. (25. Oct.) a pluvia immunes, nubilos tamen dies præbuit, quarta serena quidem magis, ac frigida quoque magis fuit. Eam nebulosi, turbidi, frigidi & ingrati excepere dies, quos inter & 6. Nov. (27. Oct.) Nova luna distinctus, tempestate cateris æqualis, ad 8. Nov. (29. Oct.) ejusdem tenoris, 10. Nov. (31. Oct.) nebulosum, turbidum & frigidum tulit aerem, sic & sequentes ad primam usque quadrantem 13. (3.) lucentem continuarunt, 14. (4.) præter nebulam, quam dedit matutinam, prioribus similis fuit. Cujus defectum sequens 15. (5.) pluvia pensavit. 16. (6.) & 17. (7.) prioribus incommodis ventos addidere frigidos & immites. 18. (8.) a pluvia immunis, frigidus tamen adhuc & turbidus fuit. 19. (9.) ad ingenium undosum rediit. 20. (10.) cum plenilunio mitiorem paulo reduxit, sed turbidum etiamnum aerem ad noctem usque radiis illustrem, quam frigidus, pluviosus ac procelloso secutus 21. (11.) in gelu primum hoc anno definens ac 22. (12.) ut & 23. (13.) continuans. 24. (14.) a serenitate præcedentium duorum deficiens pluvias turbido frigori miscuit. A quo dissimilis 25. (15.) gelidus fuit atque serenus. 26. (16.) perinde cœpit, sed in pluviam desiit. 27. (17.) amœna & serena tempestate, 28. (18.) ultimæ lunæ quadræ, sudo, miti ac sereno cælo, exemplo admodum hoc hyberno tempore ut raro, sic grato prævit. Sed æmulum nullum nec imitatore invenit, 29. (19.) a serenitate illa mox descivit, temperatus tamen adhuc, & sic noctem habuit pluviosam, a sequente 30. (20.) ac hætenus ultimo hujus mensis die ficiore, mitiore, paululum tamen turbido hac in parte diversam.

Morbi; quos hic mensis aluit, haud frequentes fuerunt scorbutici plerique, defluxiones nimirum, externas potissimum partes passim invadentes febribus catarrhalibus complicatæ, catarrhi quoque alii, ac tussis, æque valde contumaces, arthritides vagæ, cephalæa, quartanæ nonnullæ, colicæ passiones & nephriticæ, ut & pleuritides, tam veræ quam spuriae, paucæ tamen. Cardialgiæ, anginae, diarrhœa sed parvæ, dysenteria adhuc parviores. Id quod hic annus peculiare his locis habuit ob fructuum proventus valde concisum; frigus enim ab ineunte vere calore frequentius arborum floribus infestum, ne in fructus erumpere possent, obsuit, ac quicquid etiam hujus offensam effugerat, a frigore æstatis insolito & autumnii, ne vel adolesceret vel maturefceret impeditum fuit, hinc sublata causa sublatus quoque fuit effectus.

Postremus hujus ut quarti trimestris, hic anni mensis December prima die (21. Nov.) turbidus fuit, procelloso ac frigidus. 2. Dec. (22. Nov.) serenior cum frigore gelu reduxit sequentibus diebus ad novilunium 6. Dec. (26. Nov.) apparens & sequentes etiam usque ad 9. Dec. (29. Nov.) continuans. Qui glacialis initio in pluviam subito liquefens, pluvias lenes per biduum durantes addidit, donec 11. (1.) primæ quadræ 12. (2.) lucentis antea mbulo cum serenitate gelu moderatum reddidit, ac eodem tenore ad 15. (5.) vespere usque perdurans, 16. (6.) gelu mitiori aere turbido temperavit. Hanc vero insequens 17. (7.) mane gelu rigidus a meridie austro satis austere flante degelavit. 18. (8.) primas hoc anno nives plenilunii 19. (9.) appropinquantis præcones sparsit, respirante simul aliquatenus gelu. Cui tamen rursus dies noctesque gelidæ, & quidem nonnullæ satis intensæ succedere, nivibus quandoque 21. (11.) & 22. (12.) præsertim, qui densam mane adjecit nebulam, in aerem tandem elevatam ac nivis raræ specie stellulatum adinstar recidentem, nec non 25. (15.) & præcipue 26. (16.) ubere illarum proventus sæcunda, ut & 27. (17.) ultima quadræ præcursor gelu moderatum nivibus intertexens. Ultima quadræ 28. (18.) splendens copiosa nives primum leni cum gelu tulit, mox flante circa vespere Favonio plane eas colligans: Quas tamen nos sequens rursus gelida quadrantem constrinxit; Sol vero 29. (19.) denuo solvit ac leniter degelavit 30. (20.) gelu pristinum recuperavit vigorem, ac satis intenso rigore 31. (21.) mensem hunc simul annum ipsum terminavit.

Morbos hic ultimus mensis genuit adinstar præcedentis febres sporadicæ, primum varias intermittentes & continuas, & ex his quoque mixtas, catarrhales, malignas etiam, purpura, morbillis, variolis quoque variegatas, defluxiones, catarrhos, erysipelata, cephalæas, anginas, ophthalmias graves, diarrhœas nonnullas & tussis contumaces.

Constitutio Epidemica Berolinensis An. 1696.

DN. D. GUSTAVI CASIMIRI GAHRLIEP,

Missa die 25. Februarii An. 1697. Berolino Augustam
Vindelicorum.

A Nni 1695. mensis ultimus vario variatus æthere, temperatum rigido miscuerat gelu. Hoc ipso tenore, in gelu tamen adhuc quam calore magis propenso, Januarius sequentis millesimi sexcentissimi nonagesimi sexti anni initium, stylum Gregorianum si sequaris, ad 10. ejusdem usque perseveravit, a 1. 10. st. Juliano ad ultimum ejusdem seu 22. 31. aeri udo, pluviis ac nivibus quandoque intermixtis, paucis tantum sparsim intercalatis diebus gelidis, ac paucioribus adhuc serenis, remisso fere pene penitus frigore delens, hyemis, alias ordinariæ hoc mense, loco Veris primordia substituens, integrum sui dimensum absolvit.

Successit hinc Veri quasi prænunciator Februarius, quem, si paucas noctes exceperis, aliquatenus gelidas, nonnullosque dies nubilos ac pluviosos, serenitate atque amœnitate, proleptis etiam in hortis, meo quoque floribus, colchico, croco vernali, & similibus præcocibus, cum Vere certantem, Majum potius, quam Februarium dixisses.

Quem Martius excepit frigus, noctibus præsertim gelu rigentibus, ac diurnis nivibus, pluviis, & grandine quandoque, cum solis splendore sed rariori alternantibus, florum ulteriorem proventum intercipientibus ad 17. 27. usque quicum sequentibus verno sudo ac tepore gratus hunc primum anni quadrantem terminavit.

Venti uti in hoc, sic in sequentibus fuerunt pro ætheris varietate varii, nec ullo ordine enumerandi.

Januarii morbi fuerunt præcipui, febres ardentes, ac malignæ diversis symptomatibus stipatæ, ac malignitatem, nunc hujus, nunc alterius generis exanthematis prodentes, præsertim variolis, epidemice grassantibus, partim malignis, & confluentibus, partim benignis, quæ a subsequentibus postea morbillis exceptæ nonnunquam, & petechiis mixtæ.

Februarii febres variæ, catarrhales, ardentes, malignæ etiam, petechiis & morbillis suspectæ, ut & pleuritides nonnullæ fuerunt.

Martio mense rariores fuere febres, molestæ tamen, ac quædam malignitatis non expertes: præterea, & intermittentes nonnullæ, tertianæ potissimum, raræ quartanæ. Ophtalmiæ denique, & oculorum inflammationes, tam hoc, quam præcedentibus, & sequentibus mensibus frequentes, contumaces valde, ac quædam etiam periculosa. Defluxiones ut plurimum a capite ad partes subjacentes, pro causa agnoscens.

Febrium illarum epidemiarum occasionem præter ætheris, & aeris perpetua varietate turbati, varia contenta cum aere hausta, ac in corporibus continua illa aeris mutatione, accedente diætæ nonnunquam inordinatæ vitiis, sic vel aliter prædispositis, humores fermentando moventia, & in orgasmum illum præter naturalem cientia, sicque nunc hac, nunc alia ratione exagitantia, atque ad separationem, & expulsionem particularum noxiarum ipsis communicatarum, sed iisdem infestarum stimulantia. Qualia autem sint illa miasmata, cujus naturæ, substantiæ, materiæ, formæ, quarumve qualitatum, & accidentium, aut, ut cum modernis loquar, cujus configurationis, texturæ, motus, activitatis &c. determinare meam transcendit, ut ipsum æther, ingenii mediocris, & ob ætatem quodammodo jam torpentis, sphaeram, hujusmodi subtilitatibus neutiquam quadrantem.

Aprilis a primo die styli Gregoriani aut 22. Martii Juliani paucissimis sparsim intercedentibus diebus pluviis uti 31. 10. Martii hujus circa vesperam, ac quibusdam ventosis uti 5. 15. 8. 18. 9. 19. 10. 20. 13. 23. & sequenti ad meridiem usque, omnes fere a frigore nocturno, diurno vero tepore remittentes, ad æstivum calorem paulatim, & serenitatem transeuntes, æstatem pene loco veris induxit.

Quo prope tenore Majus etiam, variato licet nonnihil, & aucto dierum ab æstiva amœnitate deflescentium, frigidorum, turbidorum, & pluviosorum numero, & ordine processit ac transiit.

Junius magis fuit Majo, & quotidie fere, serenitate tamen nonnunquam, sed transitoria intercedente, pluviosus & quandoque nimbosus.

Morbi Mense Aprilis pauci fuerunt, paucisque funesti, præter enim continuantes adhuc oculorum inflammationes illas contumaces, sparsasque hinc inde febres, tam intermittentes, & inter eas, & quartanas simplices, & duplices, sed raras, quam continuas, immo & quædam malignas eryspelatodes, pleuriticas, & morbillosas, vix alii occurrerunt hoc mense morbi.

Majus paulo copiosiores morbos tulit, sed epidemicum nullum, nisi prædictas sæpius ophtalmias, & inflammationes oculorum, febresque, quas cum Aprili fere communes ac convenientes habuit.

Junio mense, pauciores adhuc, scorbutum, præcedentibus quoque mensibus non rarum, & veneream luem sororios illos, illam malignitatis prævaræ, hunc pravitatis spurcæ, sed sub illius larva sæpius latentis, stigmatibus notatos, nimis hic, proh! omni tempore frequentes, si dempseris, fuerunt.

Cum pauci hi, qui hoc trimestri fuerunt morbi, cum priori trimestris morbis genio, & moribus fere convenerint, causæ quoque eadem aut parum diversæ proculdubio eos produxerunt, insolitus præsertim his locis hoc anni tempore calor æstivus fere; Quod vero rariores fuerint, aeris æquabilitas, & perpetua fere calori moderato juncta temperies, serenitas, & amœnitas. Talis enim cum fuisset Aprilis, nec Majus ab ea admodum deflesteret, paulo quidem plures, sed ejusdem fere farinæ morbos aluit: Prædictos si exceperis, qui omnium hic temporum dici merentur, sicque ex parte endemii. Qui etiam Junio mense magis, ob aeris majores turbas, frigusque cum celo pluvioso quandoque recrudescens, illis affectibus præcipue infestum malitiæ suæ, & infamiae notas exuerunt, ac Medicis proinde plus atque Chirurgis negotii facesserunt.

Julii initium, turbido prima die celo, tonitru secunda superaddidit. Succedente æstivo unius alteriusve diei æstui, pluvias tandem sudo ac tranquillo temperatoque aeri nonnunquam intersparsit ad Caniculæ usque ortum, qui aliam aeri faciem frigidam procellosam,

ac nimbosam induit, sudo tamen sequentibus diebus interpolatam, ac æstu gratis subinde etefiis, ac pluviolis suavis temperato emendatam.

Augustus Julio, variato tamen nonnihil mutationum tam aeris quam æstus ordine, amœnitate, ac temperamento respondit.

September 22. Aug. st. v. imo. die mox procelloso, & nimbo ab æstivo aliquatenus calore, simulque amœnitate præcedentium mensium gratia recessit, atque frequentiores aeris turbas, ventos, pluvias, temperamento præcedentium addidit.

Morbi mense Julio, præteriti Junii morbos tam paucitate, quam motibus æquarunt, propter affinitatem forte temperiei aeris. Nisi quod catarrhi, ac tussis ob repentinam cum Canicula ingruentem caloris æstivi præcedentis in frigus, pluvias, & nimbos mutationem, ac effectus alii scorbutici paulo frequentiores hoc mense, quam præcedenti fuerint, pleuritides quoque nonnullæ, & anginae satis frequentes a defluxionibus scorbuticis ortæ, valde contumaces ac periculosæ, eo præsertim symptomate, quod ut plurimum in tumorem grandem ac apostema tandem juncturam, ac processus maxillæ inferioris occupans, idque cum cruciatibus insignibus, donec nimirum maturuerit, ac interne sponte crepuerit, maxillam immobilem reddens, sicque oris aperitionem, ac cibi assumptionem plures dies præcluderent fame fere pereundum fuerit affectis, deserierit. Quod tamen incommodum, & periculum nonnulli imposito mature emplastro resolvente, & discutiente, sicque discussio tumore evaserunt.

Causam hujus symptomatis sane peculiaris, si quis præter communem omnium phlegmonum ac tumorum, affluxum nimirum & stagnationem in crassati aere prædicto frigido ac uvido sanguinis, desideraverint, ac cur juncturam illam potius quam illam faciem aut colli partem affecerit? quæsierit & flagitarit e principis mechanice eruendam juxta hodiernam medicinæ theoriam, hunc ad perspicaciores me, nondum in his apicibus satis exercitato, & veterum adhuc placitis quadantenus inhærente remittere cogor.

Augustus, ut & ex parte September sequens, quasdam adhuc affectus servavit reliquias, in cæteris quoque Julio mense morborum varietate ac febrium præter catarrhales nonnullas, raritate conformis.

September prædictis febres quasdam, etiam ardentes, asthmata, anginas, rariores tamen, inflammationes oculorum, aliaque similia symptomata superaddidit, aeris proculdubio ab æstivo fervore in autumnale frigus, & udum ætheris temperamentum jam degenerantis, soboles.

Octobris primum biduum Septembris æquavit exordium frigore, aere turbido, ac pluviis. Alterum biduum sudo ac temperate calido æthere acceptum, sequens triduum pluviis, vento frigido, ac aere turbido incommodum, quadriduo tandem amœniori rursus pensatum. Cæteri ad 10. 20. usque, vario celo, si frigus autumnale, moderatum tamen exceperis, temperati, pruina nocturna sequentis gelu nocturni prænuntia, hyemem præcocem minata, dubiam reliquis diebus serenitate satis stabili ventis rariis pluviisque interpellata, cæli faciem, ac frigoris intensioris aliqualem tandem metum fecerunt.

November a primo, excepto solum 27. 7. Octobris, qui totus udosus, ad 5. 15. usque serenitate ac amœnitate aeris, Verni fere commendabilis, frigore postea auctiori, & intercalatis diebus nubilis, ventosis atque pluviosis paulo inamœniori, temperatus tamen adhuc, hyemis exordium satis tolerabile, ad ipsum usque sui finem effecit.

A Decembri non minus, qua initium tolerabili, exceptus, ad 30. 10. Novembris usque serenum ac gelidum. Qui mutata facie nivem primam pluviis nonnullis intermixtam, sequenti mane tulit, cui gelu postea, ad ipsum usque sui ipsius & anni finem, remissis quidem nonnunquam, ac nivibus paucis interpolatum continuans successit.

Morbus October præter prædictam in guttur, & maxillæ juncturas febri cararrhali junctam, & defluxionem nondum plane deservientem, arthritidem vagam scorbuticam, nephritim, hypochondriacos quosdam affectus & scorbuticos aluit. Præterea diarrhœas nonnullas, parcas tamen, cholera: Dysenteria vero, utut provenit hoc anno fructuum arboreorum satis fuerit, gula adhuc non otiante, oppido raræ, id quod admiratione non indignum.

November pleuritides frequentiores, ut & affectus nonnullos hystericos, colicos, scorbuticos, oculorum inflammationes, catarrhos, tussis, & id genus alios, autumnale frigido, & pluvioso, nimbofo, & alias variato ætheri debitos, febres præterea catarrhales, continuas initio, mox accessionibus & paroxysmis interpolatas, in ardentes quoque quandoque easque malignas degenerantes induxit.

December præter enumeratos hæmoptoen quandoque, etiam non præsertim aut præcedente pleuritide, rheumatismos, aliasque defluxiones varias, scorbutis nonnunquam mixta prodidit.

Causas horum morborum, & symptomatum eos stipantium, præter diætæ vitia, & obnoxiam hinc forte aut ob nativitatis stigma, corporum ad recipiendas varias tum ab aere frigido, & humido autumnali, frigido vero & sicco hyberno injurias, tum ab exorbitantibus animi pathematis molestias ac vicissitudines prædispositorum diathesin, indeque nascentes humorum alterationes, fermentationes, ebullitiones, alias assignare aut determinare vix ausim. Quod si vero quis certa quædam, sed vix præcognita aut dignoscenda, nedium definienda ætheris miasmata, occultis, sed nunc in exilium actis, qualitatibus valde affinia, accusare velit, huic haud difficulter astipulabor.

Cæsareo Leopoldinæ Naturæ Curiosorum Academiae Præsidi. Perillustri ac Generoso Domino Dn. LUCÆ SCHROKKIO, Sac. Cæsareæ Majestatis Archiatro, ejusque Personæ Imperialis Medico, S. R. I. Nobili, Aulæ Cæsareæ, Palatii Lateranensis, & Consistorii Imperialis Comiti, Academiae Patavinæ Recuperatorum Collegæ, ac Reip. Augustanæ Physico ordinario, Patrono ac Fautori Magno,

Salutem Officiosam

CONRADUS BERTHOLDUS BEHRENS.

C Um nullas unquam ab illustri generositate tua literas accipiam, in quibus non subinde, continuatione historiae Epidemicæ semel cœptæ, hortaris: Tum in primis singulare illud Societatem nostram

nostram exornandi, ac medicam rem promovendi studium, ex proximis luculente apparer. Ego vero, quamvis hæcenus urgentibus viris magnis, & quorum iussu capessere fas est, Genealogicis edendis occupatus sim, non tamen par erga hæc, tanto apud me loco sunt, ut res, quibus rotum me dedicavi, artis scilicet nostræ, sive apud ægros faciendæ, sive scriptis illustrandæ iis posponam; Ac propterea multo citius generosa tua magnificentia in officio meo defunctum vidisset, modo materia historiæ Epidemicæ consignandæ apta se obtulisset.

2. Post solstitium enim vernalis anni elapsi, & luctuosissimam patriæ nostræ variolarum lue, vix cum media ætate deservescerentem, quin adhuc sporadice grassantem, parum dein ea ætate circa morbos accidit, quod quidem epidemici nomen mereri, aut descriptioni ansam suppeditare posset; Neque enim quod unus atque alter inordinatæ diætæ usus, animique affectibus abreptus, tertiana seu duplici, seu simplici, colico dolore, vel si sexum attendas hysterico corripiatur, hic sanguinem sputat, istum calculus torqueat, hypochondriaci aere nubilo, & circa solstitia magis angantur, alius alio modo laboret, epidemium statim est, si quidem nec adeo multi eodem tempore, & ex causa communi uno dictorum morborum affligebantur. Pleuritides quidem nothæ, & peripneumoniæ pituitosæ uti apud nos omnium temporum morbi sunt, ita & subinde iis quidam tam adultæ quam minoris ætatis decumbunt, verum nec illæ singulari aliquo symptomate, seu ut vulgo in constitutionibus epidemicis fieri solet, stipatæ erant, nec causæ alicujus universalitas accusari poterat, inter sporadicos affectus tum potius numerandæ.

3. Illud vero forte huc referri posset, quod mulieribus, quales ego intra duorum circiter mensium spatium non paucas novi, circa æstatis declinationem frequentes effluxus essent; cum mensibus per duos tresve circuitus subsistentibus, & nausea quadam comitante, ut & aliquali ventris intumescencia superveniente, gravidæ se arbitrantur; postea vero abortis derepente dorsi lumborumque doloribus, parturientium haud absimilibus, cum maxima anxietate, hystericaque syncope, grumi sanguinis enormes, massula informis, substantiam modo vesicalem, modo pinguedinem membranofam referens in medio tamen cava, humoremque nephitin olentem continens, excideret, ac sanguis primo færidus, grumofus, dein vero floridus in magna copia excerneretur, & agræ, veluti puerperæ, per aliquot septimanas lecto affixæ decumberent, donec sensim restitutæ, pristina sanitati redderentur. Forte autem quis dubitaret, an circa generationis pariendi negotium epidemici quippiam accidere posset, egoque ipse primo anceps hæsi. Cum vero annum hujus seculi octuagesimum quantum gravidis valde noxium & perniciosum existisse, & haud absimiles abortus provenisse diversis in locis, Excellentissimi Viri *Hannæus & Mullerus*, in Decuria secunda, anno quarto & sexto Miscellaneorum nostrorum, notarint, expedita res est, nec video quo pacto & effluxus ejusmodi epidemice contingere posse quispiam negare posset; Ab aere vero sanguineam massam concitante eosdem dependisse non arbitror, namque eo modo & alios ejusmodi fermentativos effectus, diarrhœas sc. contagiosas & dysenterias habuissimus, de quibus tamen illo autumno vix quippiam apud nos auditum, siquidem unum atque alterum junioris ætatis viridia deficientem, aut colicas quasdam adultorum excretiones exceperis. Nec malum cibum potumque, quamvis alias ad constitutiones morborum epidemicas suum symbolum conferant, hic quippiam attulisse opiner, alterius enim sexus tantum labes erat, & personarum in statu certo constitutarum. Arbitror vero ejusmodi mulieres, individuali, si ita loqui liceat, sua corporis massæque sanguineæ constitutione ac effectus hujusmodi concurrisse. Cum enim pleræque illarum circa tempus vernalis febres insultus perpassæ fuissent, ac ab eo tempore ventriculi imbecillitate laborarent, hinc massa sanguinea nondum debite restaurata, nec spiritus animales vigorosos suppeditante, ovula quoque muliebria debite constituta esse non potuerunt, ut ea propter, quamvis a femine virili fecundata, & ad uterum promota; tamen contentorum staminumque expansionem pro corpusculo fœtus sensim effigando, adipisci non potuerint, sed in informes massulas excreverint, ac mora putredinem contrahentia partes uterinas ad excretionem ejusmodi & effluxum stimularint, conferente symbolum suum sanguine matris ichoroso & acriori. Rem certe ita se habuisse, vel inde palam evadit, quod quædam eo malo affectarum in cachexias lethales delaberentur, aliis cum tempore ad statum naturalem devenientibus. Cum vero debilis ejusmodi constitutio a causa communi, febribus sc. vernalibus dependerit, hinc quoque ratio epidemice effluxuum magis patet. Ut enim recte observat Illustris *Ramazzinus* in Dissertatione prima, epidemici morbi non constitutionum præsentium, sed præcedentium producta sunt.

4. Et hæc quidem ante solstitium hyemale; Illo vero ingruente, ac aere magis boreali existente, juniores, qui circa æquinoctium vernale variolis laboraverant, maxime infestabant tusses acres & convulsivæ, peripneumoniæ, febresque, forte eandem ob rationem, quod digestionem scilicet ab eo tempore imbecilliori existentem, sensim sensimque exhalantibus sc. per æstatem partibus tenuioribus multa viscida ac acris pituita in præcordiis se accumularit, & superveniente aere boreali, acorem contraxerit, similique modo sanguinem infecerit, ut dein cuncta hæc quasi in peripneumonias & pleuritides notas, aut quoque simplices diaphragmatis irritationes, quarum producta convulsivæ tusses sunt, collimarent. Atque uti in tussi nihil magis conducebat ac lenientia, acrimoniæque demulcentia, ita quoque plurimi laxativorum in primis beneficio in integrum restituebantur, non pauci tamen convulsionibus supervenientibus ante primum sepiendum suffocabantur.

5. In adultis vero eo tempore præ cæteris quoque affligebant peripneumoniæ, pleuritides, phthises, arthritides vagæ. Peripneumoniæ, pleuritidesque, post solstitium hybernium in majori copia, pituitosæ magis, ac tunc quidem senibus inmaxime lethales. Incipiebant cum dolore ventriculi tensivo, dorsi quoque ac cordis angustii. In quibusdam pleuritide notha decumbentibus, & quasi alias hypochondrii sinistri dolores molesti erant, diarrhœa quadam serosa, ramentis interdum sanguineis comitata, cum levamine superveniebat.

6. Phthises quidem omnium annorum circa autumnum morbi sunt, tum tamen vitio magis præcordiorum existere videbantur, cum eorundem, hypochondrii in primis sinistri dolores frequenter concurrerent, flatulentia vomitusque eruginosi, nec sputum cruentum esset, quod ipsum tamen, siquidem phthises hæc primario a pulmonum ulcere dependissent, continuo cruentum esse debuisset. Non autem novum, dari phthisicos toto morbi decursu nihil omnino

cruoris ejicientes, notavitque post alios id anno nono Decuriæ primæ miscellaneorum nostrorum Excell. *Dn. D. Scharfius* in juvene phthisi ex sputo sensim post nimium opiatorum usum suppresso, exemplo licet huc non admodum quadrante, illud tamen, quod volo, abunde probante. *Zacutus Lusitanus* ejusmodi phthises incruentas asthmaticas vocat; quæ ipsa tamen denotatio apud ægros nostros locum non invenit; non enim memini, quosdam ex iis asthmate simul laborasse, nec in iis qui forte obierunt, vomicas simul adfuisse suspicor. Phthises enim nostræ pleræque vel ex catarrhis existerant, vel ab humoribus in præcordiis corrosivam fere aciditatem contrahentibus, similique qualitate serum sanguinis, sputi materiam imbuentibus, dependebant. Hinc etiam in non uno sputa æruginosa notabantur, in aliis etiam biliosa. Non tamen adeo semper lethales erant, quin aliquot ab omnibus pro deploratis habitos, solo lactis caprilli potu, utpote optimo & nunquam satis laudato, corrosivam ejusmodi succorum sanguinisque acrimoniæ corrigente, partim restitui, partim adhuc servo, cum reliqua auxilia acori opposita, modo ignea sua volatilitate febrem comitem auferent, modo salinis spiculis tussim magis irritarent, decocta autem pectoralia tonum ventriculi admodum laxarent, & agris appetitum omnem auferrent. Lac vero ipsum, methodice tamen usurpatum, notante id simul Illustri *Wepfero*, Medico quondam nulli secundo, in Epistola ad Verzascham, hypochondria emendet, febri lentæ resistat, habitum firmiorem, colorem nitidiorem, viresque robustiores conciliet, quin novos plane homines efformet, methodice dico usurpatum; namque in biliosis complexionibus, aut ructibus jam existentibus acidis assumptum, per vomitum instar materiæ caseosæ rejectum vidi, quique in prandio pisces, aut alios cibos inconvenientes subjungebant, iis febris de nocte augebatur.

7. In febribus tertianis quartanisque, quæ tamen admodum paucæ, magis ac alias insignis dorsi dolor notabatur, & vomitus in paroxysmis molesti erant. Quartanæ tamen non admodum rebelles existerant, & aliquot vulgatissima methodo, & remediis fere domesticis absque corticis Peruviani usu fugavi.

8. Arthritides autem vagæ præludia erant scorbuti cum novo anno secuturi. Dolores modo totum corpus corripiebant, de membro in membrum, aura citius, desilientes, in quibusdam etiam tubercula subito erumpebant, mox iterum evanescentia, cum subsequente leviori paralyti. Inter consueta contra hunc morbum remedia mixturam simplicem satis laudare nequeo; quæ uti alias divinum remedium in plurimis morbis existit, ita & hic debita cum circumspicione usurpata, nunquam me, quod sciam, fefellit.

9. Cum novo vero anno aer, rarissimo valde, nec senibus observato exemplo, plane æstivus, tepidus, ac humidus ultra duos menses constanter perstitit, ita ut ne pruina quidem noctu terras obtegeret, & ranæ coaxare inciperent. Sub ipsum æquinoctii tempus nix iterum & hyems per aliquot septimanas valde aspera, unde, & morbi tum majori numero ingruerant, ceu fieri consuevit temporibus anni debitam suam constitutionem non servantibus. Ex iis vero erant apoplexiæ, deflexiones, febres varii generis, cachexiæ, scorbutus.

10. Apoplexiæ, non senibus tantum, quorum alias morbus est, sed & iis, qui vegetæ adhuc ætatis, contingebant; ægri subito animo linqui videbantur, quibusdam per somnum obveniebat malum. Non tamen adeo lethales erant, sed lymphæ nervosarum partium obstructionem extravasatione sua causante, seu ope sudoriferorum volatiliū, seu quoque propter febrem interdum una supervenientem resoluta, inque motum iterum comitata, circa diem octavum plerumque terminabantur, absque remanente paralyti. Quibusdam rubedo in parte quapiam externa, altero ab insultu die superveniebat, quæ tamen topicis resolventibus facile cedebat. Nec tamen omnes qui subito ita interibant apoplexia proprie dicta extinctos opiner. Quidam non infimæ sortis vix trigesimum ætatis annum excedens, & ex frequentiori erysipellate sinistram pedem tumidiorem gerens, per octiduum de gravitate cordis ac oppressione ejusdem, ut & punctione in latere dextro querebatur, cui ut levamen daret, venam in brachio aperit, sanguine nimis largiter educto. Altero vespere inter choreas subito animo defecit, stertit & dicto citius exstinguitur; cadaver mane apertum, & quantum in tumultuario isto casu licuit, pervestigatum, viscera partesque omnes, præterquam pulmones, sanas retulit. Ex his enim lobus dexter undique annatus, & parenchyma ejusdem per transversum dissectum, abscessibus sinuosis obfusus se præbuit, haud absimilem in modum quem notarunt in Miscellaneis nostris Excellentissimi Viri, & quidem Decade prima, anno secundo *Dn. Wincklerus*, Decade secunda, anno octavo, *Dn. Doleus*, & anno decimo, *Dn. Hartmannus*. Præterea attactu diffuebat pulmo, nigriorque erat, ut adeo sanguis per choreas ejusmodi concitior redditus, per illum pulmonis lobum, juxta proportionem motus acquisitam, moveri non potuerit, atque hinc in dextro cordis ventriculo, in quo magna ejus grumescens copia existerat, sufflammatum fuerit, illeque quasi syncope correptus, momento citius expiravit. Nulla interim in cute livoris macula, aut sanguinis exaribus, ore vel auribus eruptio, eoque modo plerosque extinctos arbitror, qui circa æquinoctium illud passim subitanea morte obibant; Vix octiduo post, alius subito inter eundem in platea expirabat, vespere, sexagenarius fere, & colicis doloribus obnoxius. Animo sensim defecisse, & se deficientem de momento in momentum percepisse supervenientes notarunt. Post mortem pars illa sinistri lateris a collo ad costarum notharum extremitatem livida deprehensa, quod etiam sanguinis in corde & vicina regione grumescentiam arguit.

11. Febres varii generis erant sine dubio juxta temperamentorum, constitutionumque in individuis varietates ita discrepantes. Aliquibus ephemera, sed adhuc semel post unum alterumve diem repetentes. Quædam primis diebus intermittentes erant, & remittere videbantur, dein vero evadebant continuæ. Vere vero intermittentes, quo magis vernalis tempus appropinquabat, eo minori numero. Quæ vero primo statim insultu continuæ apparebant, in iis modo calor, modo frigus, de cætero acutæ valde, cum dolore nuchæ invadentes, & levi delirio primis statim diebus, circa diem nonum pleræque seu ad salutem, seu ad mortem terminabantur. In quibusdam petechiæ apparebant, quas a malignitate scorbutica haud erronee quispiam deduxerit. Aliis vermes in principio, præcedentibus magnis cordis angustiiis, & comitante delirio, proveniebant, quorum tamen aliquot, quamvis ætate provectos, servatos memini, cum alias in malignis pro pessimo signo vermium in principio excretio habeatur. Quorum vero sanguis per venam sectam eductus in superficie instar

instar pultis albæ concreſcebat, ſiſquamvis in principio nulla pleurítica, aliæ pectoris affecti ſymptomata adeſſent, tamen circa ſeprimum calore remittente tuſſis & phlegmatum expectoratio ſuperveniebat. Malignitas vero major, quo magis ad æquinoctium accedebant. Quibuſdam in locis adeo acutæ & contagioſæ, ut ægros altero die obiſſe, ſuperveniente puſtula magna & nigra in femorum altero fama referret. Alio in loco junioribus bubonum in inguinibus tumor ſuperveniebat. Quidam circa diem octavum melius habentes, & ſanorum ſimillimi, in primis quibus urina poſt quartum diem apparebat citrina, circa duodecimum maligne relabebantur, maximo cum delirio, & generis nervoſi ſymptomatibus, in quibus deſperata res erat. Video hoc ipſum ab Excellentiffimo *Ridlin*o, anno primo Linearum medicarum, vocari, febrium malignarum inducias, nec ineleganter, noſtri tamen ægri in medicamentorum uſu continuabant; & nihilominus cum febre redibant malignitas. Alii, qui videbantur reſtituti, levi circa res non naturales commiſſo errore recidebant. Certa vero methodo omnes ii, qui continuo ægrotabant, tractari non poterant, citius vero evadebant, qui temperato tam medicamentorum, quam aliarum rerum regimine tractabantur, in primis vero acidorum medicamentorum uſui, ſi quidem pectoris conſtitutio eadem concedat, facile cedebant.

12. Deſuxiones; neque enim vox adeo abſurda ſemper, ut non interdum retineri queat, cum catarrhorum in extetnis partibus deſcenſus omnino accidat, & evidenti exemplo a generoſa tua magnif. anno tertio, decuriæ ſecundæ Miſcellaneorum noſtrorum probatus, & a me quoque circa initium Februarii, in quodam Societatis Jeſu Profeſſore obſervatus, cui poſt acerbum ſcapulæ ſiniſtræ dolorem juxta tractum ſpinæ dorſi humor ſenſibiliter deorſum rubeat, ad os ſacrum uſque, ubi per aliquot dies ſubſiſtit. Exin tam diaphoreticis internis, quam topicis reſolutus quaſi, ſeu potius mobilis factus, per femur iſtius lateris & pedem ad plantam uſque deſcendit, & denotie magis affligens, donec tandem remediis convenientibus plane diſcutteretur. Deſuxiones inquam, magno numero circa id tempus occurrebant, ad oculos, aures, maxillas, uvulam, cum ejuſdem & faucium eroſione interdum, ad pectus, ſcapulas, & quorſum non? Interdum ſubito, ut ita loquar, recedebant, calore aliquo febrili & laſſitudine per octiduum ſubſequentem, in quibuſdam vero membrorum contractura, aliisſque latentis ſcorbuti ſymptomatibus. In primis quoque frequens humorum ſeroſorum ad ſiniſtrum ſcrotum deſcubitus, præcedente quadam quaſi horripilatione, ſiniſtri hypocondrii dolore, & in inguine tenſione. Ad hydroceles vero pertinebant, hydragogiſque internis, & topicis hiſ in caſibus conſuetis curabantur.

13. Cachexiæ pedumque tumores in primis circa æquinoctium vernum notabantur, præſertim in iis, qui aſthmati & catarrhis obnoxii erant. In pleriſque cum diminuta urinæ excretionem, eaque modo viſcidum, & album, modo rubrum ſedimentum referente. Etiam in puerperis quibuſdam obſervatum hoc malum, quibus alias nihilominus lochia rite ſtuebant. Cauſa vero imminuta huius excretionis, cum nulla circa veſicæ regionem gravitas deprehenderetur, hinc in maſſa potius ſero ſanguinea nimis viſcoſa & tenaciori quærenda, cui etiam curatio conſentit: namque ægri a nullis remediis melius habebant, quam ab attenuantibus incidentibuſque, ſalibus ſcilicet diureticis fixis cum volatilibus combinariſ.

14. Reſtat ſcorbutus, qui ipſe quamvis endemium apud nos malum ſit, non memini tamen intra aliquot annorum ſpatium, adeo frequentem extitiſſe, ac poſt ſolſtitium hyemale. Non quidem me fugit, prudentes Medicos interdum ejuſmodi affectus, quorum genuinas appellationes ac cauſas ægri aut horrent, aut propter terminorum artiſ ſubtilitatem capere nequeunt, ſcorbuti nomine efferre, nec minus & illud commune diſterium me latet, ſcorbutum eſſe aſylum ignorantæ medicæ, plurimoſque affectus, quorum nomine eum inſuamus, vel morborum ſentium nullumque adhuc certum typum adeptorum effecta eſſe, vel etiam infelices reliquias exiſtere morbi aliqujus nondum penitus deſtructi, a quibus ſanguis & cæteri humores contaminentur, ceu utrumque recte animadvertit *Sydenhamius*. Cum ramen ſuperioris ævi Medicis placuerit ejuſmodi dyſcræſiæ maſſæ ſero ſanguineæ, in qua partes nitro ſulphureæ cum quadam viſcoſitate, præ cæteris magis exaltatæ, & ſpiritus vitales (utor termino communi) ſimul depreſſæ exiſtant, ſcorbuti nomen impoſnere, & verba uſu valeant, ceu nummi, hinc quoque præſente ejuſmodi ſanguinis ſtatu, ac ſymptomatibus ab eodem dependentibus, voce hac uti nolle, neſcio quæ animi ſingularis opinio exiſteret. Et certe non apud adultos ſolum, ſed & qui junioris adhuc ætatis erant, & in infantia conſtituti, frequentia ejus generis ſymptomata notabantur. Morbillorum enim radices hand incommodè quis in diatheſi ſcorbutica quæſiverit, in aliis laſſitudines, hæmorrhagiæ qualem inſignem in puella octo annorum deprehendi, quam ſuppreſſam maculæ magnæ ſanguineæ in pectore & pedibus ſequebantur, cum vermium excretionem. Supervenit deſu brachiorum pedumque contractura, & horum circa veſperam intumeſcentia; In adultis vero non modo morbis ſupra enumeratis comitem ſe adjungebat ſcorbutus, ſed & inſuper aliis ſymptomatibus moleſtus erat. Hinc frequentes de laſſitudine cum appetitu proſtrato, ſudoribus nimis, ptyaliſmo, doloribus membrorum nocturnis, immobilitate, contracturis querelæ, alii tuberculis inſeſtabantur, maculiſque, quidam vero tantum, quando in lecto incaleſcerent, gingivæ plurimis ſanguinolentæ, & in iis qui alias per rotam vitam nec quicquam de ſcorbuto perceperant, quique diætæ malum hoc cauſanti non aſſuetierant. Aliis phlogofes eryſipelatoſæ in facie partibuſque externis, quibus ceſſantibus, puſtiones in præcordiis cum febre erratica ſuperveniebant, phthiſin minantes, niſi præventum fuiſſet. Singulare in vitriario quodam, alias arthritidi ſcorbuticæ obnoxio, linguæ ſymptoma initio huius menſis deprehendi. Hic cum per aliquot dies ptyaliſmus præceſſiſſet, ſubito palpitatio tremula apicis linguæ cum aphonía ſupervenit, ſectiōne venæ raninæ ſublata. Exemplo *Auguſtini Thonneri* ſymptoma hoc ad ſcorbutum refero, qui haud abſimilem linguæ convuſionem, in quodam arthritide ſcorbutica laborante obſervavir. Ex ſola certe lingua excoſiata, puſtuliſque in eadem valde dolentibus latentis ſcorbuti indicia deſumpſit Excellentiff. *Ridlinus*, Linearum medicarum anno primo, medela opinionem comprobante. Ad ſcorbuticam quoque claſſem ſymptomata a ſpiritu defectu exiſtentia referas, uti vertigines, oculorum caligines, lipothymias, melancholias, ſive illis inordinate diætæ, animique alterationes progreſſæ, ſive in altero ſexu menſes

Sydenham Opera Medica.

ſuppreſſi, & graviditas anſam darent. Denique nec illius obliviſcendum arbitror, nullo anno majores de ventriculi imbecillitate querelas apud illos fuiſſe, quibus ex ſui cætus inſtituto tempore quadrageſimæ piſcium eſus incumbit, quam digeſtionis debilitatem, an ad ſpirituum propter diateſim ſcorbuticam defectum, & fermentum ventriculi proin non ſatis exaltatum recte referam, penes alios judicium eſto. In curatione vero ſymptomatum ſcorbuticorum illud in primis magni momenti deprehendi, cujus etiam in aureis ſuis obſervationibus meminit Illuſtris *Pechlinus*, aciduſculos liquores, amaritudine balſamica delibutos, palmam obtinere. Siquidem ſi quopiam in morbo, certe in ſcorbuto ebullitionis tempora, a reliquo ejus motu, maſſæque ſero ſanguineæ ſtatu probe dignoſcenda, & medicamenta juxta varianda.

15. Er hæc quidem de conſtitutione morborum apud nos a ſolſtitio æſtivo anni ſuperioris communicare potui; Non quidem talia ſunt, quæ ab aliis conſignari non potuiſſent, ſed quorum continuationem a me fieri poſſe illuſtris rua magnif. cenſuit, ego vero maxime vellem, quod ſupereſt, neque enim ulterius progredi termini Epistoſares patiuntur, Te, Magnifice Domine Præſes, ut in præſidium ac incrementum artiſ ſocietatiſque noſtræ, quin & totius Reip. litterariæ in multos annos quam feliciffime ſuperſtitem Deus ſervet, ex animo voveo, & nemo non ex ſocietate mecum, quo ſummas ingenii dotes, atque elegans in primis maximeque ſubactum judicium practicum in lectiffimis ſcholiis ulterius demirari liceat. Ipſe ego proſecto tota vita mihi gratulabor, quod ILLUSTRIS SCHROCKIO PRÆSIDE, eam felicitem naſtus ſim, qua in SOCIETATEM LEOPOLDINAM, recepto, impoſterum cum exercitatiſſimis in arte viris conferendi occaſio mihi ſuppeditetur. Scripſi Hildeſii d. xxviii. Aprilis anni c10 10c Lxxxxvi.

Conſtitutio Epidemica Auguſtana Ann. 1699. & 1700.

DN. D. LUCÆ SCHROCKII,

Academiæ Cæſareo-Leopoldinæ Naturæ Curioſorum Præſidis.

U Ti anni proxime præcedentis exitum zephyti, pluvioli & tepidi, vehementia comitata fuit, ita præſens annus 1699. ſimili cum auſtrina temperie incepit, atque tam conſtans venti huius, cum Auſtro tamen & Africa ſubinde reciprocantis, ferocia uſque ad ſolis in Aquarii ſignum acceſſum notabatur, ut incolarum nemo tam diu horum impetum continuiſſe recordaretur, & rariora ac breviora hyemis indicia intercurrerent. Et quamvis auſtrina conſtitutio alias peſſime Medicis, ipſi etiam Hippocrati Sect. 3. aph. 5. non bene audire ſoleat, hic tamen vires exerere ſuas non valuit, ventorum potentia atomos morbiſcos, quæ in putredinem proclives, & aerem inquinare aptæ fuerant, feliciter ubique diſcutiente; impedire tamen eadem non proſus poterat, quo minus ex collectis jam antea, & porro huc uſque coacervatis lymphæ ſuperfluitatibus, aereque interdum frigido inſenſibilem tranſpirationem retardante, pleuritide aliqui corripenterent; Catarrhi autem in prægreſſo Decembri faucibus inſeſti, nunc magnam incolarum partem, gravius mitiſſe, & modo fauces ſolas, ſed rarins modo, ſimul & frequentius pectus, ſive glanduloſam aſperæ arteriæ texturam ex improviſo, cum horrore occuparent; concomitante utplurimum capitis dolore, & febrili intenſo calore ſubſequentem (ſed diaphoretico ſumpto paucas intra horas denuo recedente) nec non diuturniore, dum reconvaſcentes aeri citius quam decebat ſe exponebant, tuſſi humida ſuperſtite, qua multum craſſi ſputi expellebatur. Et hæc anginæ nothæ ſpecies hyemali tempore quod epidemica evaſerit, quæ alias inter vernaſes morbos ab Hippocrate Sect. 3. aph. 20. refertur, minus mirari licuit, cum præſens hyems naturam primi veriſ indnerit, ſicque prægreſſum menſibus prioribus frigis viſcoſi ſeri collectioni anſam cum dediſſet, mitior illa ſuccedens temperies fluxionem ejuſdem ſive liquationem promoverit. In ipſa morbi invaſione, quæ ſuffocationis metum ſæpe incutiebat, aliquot olei amygdalarum dulcium, aut olivarum cochlearia præſentaneo cum emolumento fuere propinata, reliquum autem curæ blandis diaphoreticis, cephalicis temperatis, expectorationem promoventibus, aliſque pro circumſtantiarum & ſymptomatum diverſitate, externis etiam, emplaſtro de meliloto, malactico ſimplici, & officiis noſtris diſto filii Zachariæ, non inanes ſuppettias ferentibus, abſolutum fuit. Qui ipſi catarrhi, faucibus, pectori, dentibus inſeſti, in vernum uſque tempus, mitiores tamen utplurimum, epidemice graſſari continuant. Præter hos morbilli quoque plurimos in puerili in primis ætate, licet nec adultioribus parcerent, invaſerant; & per aliquot, vernaſes etiam, menſes ſe exeruerant, benigni tamen & facile iterum diſſipati, quamvis intenſo utplurimum calore incipientes, quin & capitis eryſipelas in multis notabatur, moleſta quidem febrili incaleſcentia, tumore & pruritu periodum ſuam decurrens, aſt cum cuticulæ deſquamatione, modera-toque ſub caloris externi regimine non difficulter admodum iterum evaneſcens.

Erant eodem, & ſubſequo tempore, quibus febricula, hecſticæ ſere æmula, & quotidie calore quodam præternaturali, vel præcordiorum, circa ventriculi ſuperius oriſcium compreſſione, incerta periodo recurrens, cum appetitu imminuto, ſiti vel nulla vel tolerabili, & virium laſſitudine, inſeſta fuerat. Tinctura autem bezoardica bis in die, ſine ſudoris coactione, ſumpta, interpoſitoque pillularum noſtratiſ Immanuelis nominis venientium uſu, citiori vel tardiori circuitu, prout cauſa morbiſca, viſcoſa, in glandulis fortæſſe minoribus ventriculi vicinarumque partium hærens, incuneata magis vel minus erat, ſine periculo finita. Licet & hecſticæ febriculæ puerili ætati inſeſta eſſent, a collectis viſcidis acidisſque in ſanguine particulis, & glanduloſas in primis viis partes obſtruentibus oriri a me creditæ, eſſentiſque alchalicis & abſorbentibus terreſtribus medicamentis, poſt laxativorum uſum, mature propinatis, non admodum difficulter abigendæ.

Dehinc eurus, penetrante quidem frigore, ſerenotamen dies comirante, nos aliquandiu inſeſtabat, cum ſol in Aquarii ſigno eſſet conſtitutus, quo tamen dimidio emenſo, novas zephyri, ab Africo ſæpius intercurrente adjuti, impetus ingruerant, ac nives plures ſpargebat, quæ vero brevi, cum aeris temperies utplurimum ad temperatiorem ſtatum inclinaret, iterum liqueſcebant; uſque dum aer

E non

non multum amplius a ventis agitatus, aliquot ante æquinoctium vernale diebus copiosam nivem demitteret, atque exin frigoris inclementia per longum tempus nos afficeret, sub potiori zephyri dominio, qui post calendas Majales vehementia sua vernalium deliciarum proventum tardabat, tandem in longiores pluvias resolvebatur; cui cum circa solis in Geminos ingressum eurus succedens serenitate grataque calidiore temperie nos refecisset, lætior terræ facies vernantes suas amœnitates eo liberalius protruserat. Sub vario deinde, modo pluvioso, modo sereno Jove, præter reliquorum ventorum reciprocationes, zephyri potissimum nova violentia concuti aer cœpit, usque dum euro leniori spirante, calor æstivus mense Julio constanter ingrueret, Siriusque campos exsiccaret, messes quidem ita maturiores nec illaudabilem reddens, succum tamen granis cerealibus, ut justo macriora existerent, subduceret. Interea febres continuæ petechiales, quandoque insuper pustulis miliaribus aquosis stipatæ, interdum vero malignitate equidem non carentes, sine tamen istiusmodi efflorescentiis periodum suam absolventes, cum horrore, virium prostratione, cephalalgia, dorsi dolore quandoque & siti non admodum molesta, nec appetitu prorsus prostrato incipientes, per urbem, usque dum Virginem sol accederet, notabantur: non paucis, inter succedentia in morbi progressu deliria, & faucium ariditate, exitiales factæ, ubi vel ab imperitis tractatæ, vel per initia neglectæ, aut etiam decumbentes immorigeri mœnitis Medicorum fuerant, quam ipsam ob causam habitantibus in pagis vicinæ nostræ Hebræis non levem cladem in Majo attulerant: Laniorum etiam familias in urbe, quas præ aliis invaserant, crebris funeribus contristaverant: ast in principio ubi ex arte tractabantur, non admodum refractarias eas notare licuit, ita ut etiam in prima, quod dicitur herba, oppressas, paucoque alexipharmacorum, tincturæ bezoardicæ, theriacæ cælestis cum chinchinæ extracto &c. usu abactas non una vice notaverim; sicut etiam reliqui sub tepidiori per morbi decursum corporis custodia, per continuatum diaphoreticorum usum haud difficulter evaserant. Alvus in nonnullis obstructa per plures dies nullum incommodum attulisse, nec somnolentia in morbi decremento diutius instans noquisset observabatur.

Sole in Virgine versante, cælum, euro crebrius perflatum, humidius & frigidiusculum primo, postea constanti radiorum solarium præsentia animatum, denuo excalescens cum esset, diarrhœæ simplices, paucioribus cruentæ tenellam præsertim puerilem ætatem, immo vix dum in lucem editos fœtus, hoc æstivo tempore infestarent, excretionem aquosa, pituitosa, acidum redolente; quorum ærotulorum magnam partem, ob parentum, & qui curam puerorum agebant, negligentiam, remediorumque internissionem trucidarunt; quibus enim medicæ manus prudenter adhibetæ, non infeliciter evasissent, atque coraliorum in primis aut terræ signatæ pulverem, cum theriacæ cælestis tantillo maritatum, aliaque stomachi fibras roborantia conduxisse notavi, causam vix aliam fuisse suspicatus sum, quam pulmentorum ex farina cum lacte coctorum esum, quæ ipsa farina ex tritico ante annum tempore humido cælo collecto, atque exactam maturitatem non adepto parata, plurimas crudiores particulas absconditas, non infrequenter mucidam, quod sapor odorque testabatur, corruptionem expertas habuit, quæ dein tenero in pulsionem ventriculo in liquorem acido viscidum abeuntes, digestionem vitiarunt.

Interea etiam magna illa Solis eclipsis d. 23. Septembr. compa-ruit, quam multi nostratum ex plebe, vana persuasione seducti, licet multum reformidassent, ut sanitatis inde jacturam si fecissent, haud mirari quis potuisset, quamvis nec tunc temporis, nec postea ullos morbosos effectus observare datum fuerit; quæ enim in Octobri & Novembri lymphæ stagnationes in plurimis odontalgias, & catarrhos leviores produserant, aeris potius, quæ eclipsin a d. 27. Septembr. usque ad d. 27. Octobr. infecuta fuit, inclementiæ, nebulis crebris, pruinis, pluviiis, frigore horridè debebantur. Ipsa solis obumbratio, quam cælo prius admodum sereno, nubium sparsarum ob orientali plaga progressus antecesserat, cum sensim cresceret, remissioreque caliginem induceret, eurus subito exoriens, non tamen impetuosus, horridiusculam auram reddidit, campique, ex nonnullorum relatione, quasi rore maduerunt; quæ tamen cuncta tum obnubilatione cessante, & ipsa recesserunt.

Sol in Scorpionis signum ubi pervenerat, & eurus præsertim, ad meridionalem tamen plagam quandoque inclinans spirabat, plures serenos frigidiusculos numeravimus dies, matutinis tamen crebris nebulis turbatos. Novembre autem ineunte, zephyrus (qui altero post solis in Sagittarium ingressum die vehementissimus erat) temperatior eos, varique constitutos, ut plurimum tamen serenos reddidit, & tandem sub multivaria in Decembris aeris alteratione, atque cum reliquis ventis, videlicet primum cum euro frigido, circa medium mensis Austro, temperato, & tandem Borea frigido alternatione, in nives, & frigus despumabat. Nec singulares morbi notabantur, nisi quod in dicto mense ultimo puerilem ætatem, non quidem admodum multos, Variolæ benignissimæ, quas nostrates aureas dicunt, quibus vero majores pustulæ, longiori quam priores decursu finitæ, in nonnullis interspersæ fuerant, occuparent; omnes tamen absque singulari periculo paucis temperatioribus remediis, & blando externo regimine facile abigerentur; insuper febres quotidianæ, quales jam circa anni principium infestæ fuerant, repullulascerent: quæ majori cum calore, sine horroris ut plurimum sensu ingruiebant, & facile in hecticam declinabant, difficilioremque in multis curam reddebant, tandem tamen, cum interpolato laxativorum usu, pulveribus absorbentibus, nitratis, chinchinatis, martialibus medicamentis cedebant.

Principium anni 1700. serenitate, frigori juncta, cum se commendasset, paulo post varia cæli facies, nebulosa, nubila, nivosa, pluviosa, serena, frigida, temperata comparuit, quin & d. 28. Januarii tonitru ac fulgure tempestuosa exstitit, cum per aliquot dies zephyrus, hucusque semper, nisi quod ad semimeridionalem plagam sæpius inclinaret, se exserens aerem multum prius concussisset; qui etiam venti M. Februario continuarunt, & hyemale frigus constans inter nives sæpius delapsas, induxerunt; quod circa solis in Pisces ingressum ab euro incrementum sumpsit, nivæque, in M. Martio sensim liquatas, subinde spargere non intermisit. Interea Januarii febres quotidianas in fine præcedentis anni memoratas producere non prorsus cessabat, & nonnullos apoplexia, diverso fato terminata, alios rheumatismo artuum superiorum, qui usque in Aprilem, juxta cum febribus nominatis notabatur, atque a repetitis sudoribus, præcipue quos Laconicum coriariorum proliciebat, soluto, infestabat,

Infantes autem in glandulis faucium ipsisque pulmonum vesiculis, non sine febrili incallescencia invadens, atque grave asthma inducens stagnatio periculo non levi exposuit, multosque eorum, præsertim aut serius, aut negligentius curæ commissos in sepulchrum præcipitavit, cum reliqui orgasmum istum refranantium absorbentium, & viscosam colluviem blande per alvum sputumque educantium usum salutarem experirentur. Quæ cuncta sicut inæqualitati aeris, lympham modo incaffantis, modo in fluorem iterum eliquantis deberi, arbitror; ita ejusdem etiam aeris effectum fuisse non dubito, quod diversas puerperas abdominis præcipue in hypogastrica regione tormina corripere, eaque lochiorum evacuationem non ad votum succedentem, & hinc ex sanguinis stagnatione nervosam fibrarum tensionem inducentem comitem haberent; quæ ipsa medicamentis castorinis, aliisque fluorem sanguini debitum blande restituentibus, ac viscosas impuritates una per alvum eliminantibus ideo cedebant. Ab eadem aeris inæqualitate etiam, antequam æquinoctium vernum advenisset, Icteri, Martialibus remediis debellati, & febres petechiales continuæ, cum cephalalgia ingruentes, in quibusdam pleuritide comitatæ, cæterum nihil singulare ostendentes, nec admodum lethales, usque in Aprilem, frigidum, & primo quidem ab euro serenum; postea succedente zephyro, cum semimeridionali vento alternante pluviosum, sparsim ut vix epidemicos inter morbos referri mererentur, notabantur, sed Majus, crebros zephyri flatus expertus, graviori cæli amœnitate illuxit, in fine tamen frigidus evasit, morborumque semina (præter Variolarum, nunquam uti hætenus, ita per totum reliquum anni decursum plane cessantium) prorsus suppressisse visus est; quos nec postea repullulare variorum ventorum, aerea, si quæ ingruerent, inquinamenta ex omni mundi plaga dissipantium vicissitudo, sub grata calidioris, nec non temperatioris auræ alternatione, permiserat. Quamvis postea per æstatem febres quotidianæ, & rheumatismi subinde denuo caput extollere conarentur, inque mense Augusto dysentericæ aliqua vestigia notarentur, vix tamen memorari hic merentur. Post caniculares dies primo frigidiuscula aura spirabat, postea longior aeris serenitas non levem terræ siccitatem inducebat, usque dum post æquinoctium autumnale zephyri vehementia, ab aliis ventis sæpe interrupta, crebras pluvias suscitaret, tepidioremque ut plurimum auram redderet, quæ austrina constitutio, paulo post non tantum Variolas in plures infantes diffuderat, sed etiam tussis continuas in multis, & febres petechiales in quibusdam produserat; & has quidem non sine contagii nota, ut integræ etiam domus alicubi inficerentur, & non pauci succumberent, quos tamen non tam morbi violentia, quam quod negligenter, & imperite, præsertim a stupida fœdi carnificis temeritate, quæ nescio quo infortunio plures demeraverat, tractarentur, mortis prædam fecerat, cum alii rite & mature curati, paucis assumptis alexipharmacis, primos morbi impetus prorsus, vel intra biduum retunderent, vel salvi tandem evaderent. Omnes præcedaneo horrore, subitam virium prostrationem & præcordiorum oppressionem patiebantur; nonnulli cephalalgia per initia torquebantur; deliria vero & inquietudines interdum subsequabantur, sitis rarius urgebat, nec calor præternaturalis externa indicia aderant; urina ut plurimum & pulsus non multum a naturali statu recedebant. Talia etiam civis cujusdam uxorem cum filio 17. annorum invaserant, qui empiricæ etiam illius imperitiæ expositi mortui sunt. Filia autem 19. annorum eodem malo correpta in morbi augmento vermem duas spithamas longum mortuum vomitu excreverat, motibusque membrorum convulsivis & continuis deliriis agitata, nil cibi & medicamentorum ulterius assumere voluerat, quin & potum omnem, quamvis fances aridæ essent, & muco viscidissimo incrustarentur, per biduum respuerat; quæ tamen, cum utrique humero vesicatoria applicare curassem, tumque ipsa deglutire iterum aliquid inciperet, sicque cephalica alexipharmacis mixta admitteret, mentem paulatim & membrorum tranquillitatem resumpsit, & circa tertiæ hebdomadis a decubitu finem suborta diarrhœa evaserat. Altera filia duodecennis tertio, & quarto morbi die vomitu crebro agitata, nil cibi, potus vel medicamentorum retinere poterat, data theriaca cælesti cum chinchinæ extracto motus ille ventriculi perversus sedatus est, die autem decimo caput intumescere, & immensum dolere cœpit, sed propinatis ibidem cephalicis, & alexipharmacis, nec non vesicatoriis utrique humero impositis, parotidique sinistræ tumore suborto, postquam ille a cataplasmati usu discussus fuisset, atque diarrhœa supervenisset, convaluit. Filia 15. annos nata, & filius undecennis parem morbi insultum passi, intra octiduum sanitatem recuperarunt. In omnibus his sudor fere nullus prolici poterat; maculæ etiam punctulares lente, nec satis ad votum prodierant. Pater prima morbi indicia sentiens, sumpta bis tinctura bezoardica, ejus violentiam elisit, inter medicamenta etiam pulveris nostri alexipharmacis officinalis, qui ex terr. sigill. C. C. phil. præp. rad. angel. Zedoar. corr. citr. & myrrh. componitur, repetitum usum in primis proficuum expertus sum; qui non tantum lymphæ visciditatem corrigere, ejusque coagulum resolvere, sicque ad diaphoresim disponere, sed etiam balsamicis suis partibus sanguinem a corruptione præservare valuit, tussis magna vehementia adultis æque ac pueris infestæ, convulsivi aliquid alere visæ fuerunt, & magnam humoris viscidii copiam excreverunt; quibus vero, ut alia taceam, continuatum herbæ thee vel veronicæ, cum radice liquiritiæ infusæ usum præcipuam medelam attulisse observavi. Quo sub Morbonæ dominio reliquum anni, varias cæli mutationes, temperatiorum in primis auram producens, transigimus.

Constitutio Epidemica Berolinensis Ann. 1699.

DN. D. GUSTAVI CASIMIRI
GAHRLIEP.

von der mühlen.

J Anuarii prima dies tota pluviosa, vespertino tonitru sexies satis vehementer reboante insolito, & hoc saltem tempore raro phænomeno tremendum edidit ostentum. 2da inconstans mane ex parte serena, & sicca, reliqua nimbis ingrata. 3tia mane pluvii molesta in Caurum a meridie valde impetuosum desuit. Sequentes ad decimum varii ut plurimum pluvii, quandoque nivium flocculis mixti, nonnunquam frigore temperato in grave tandem gelu degenerante distincti; succedente demum nive, hisque pluviiis, vernam fere cum sudo-

temperiem ad 19num usque reducentes, cælo nimirum de die fere-
no; noctu vero gelido, revertente sic paulatim fortiori gelu, triduum
durante; tum vero rursus in pluvias ac temperiem aeris leniorem
per quattriduum declinante, ac succedente denuo 28vo gelu satis ac-
rid ephemerio, in nebulosum, & pluviosum quattriduum una cum
mense terminante.

Februarius eodem typo cœpit, mox vero 2do, succedente gelu
ad 11num usque continuavit, in pluviam vesperti solutum, sed
12mus mane rursus gelidus, cælo quidem obscuro & flocculos sub-
inde niveos spargente, octiduum continuavit; 29nus tandem remis-
sior toto biduo pluviosus ac nimbosus. Verum 22do post mane obs-
curum sequens 23us sereno cælo pluvias ac grandinem miscuit,
succedente post pacatiori 24to, rursusque nimbofo, ac nivofo,
25to, tandem a modico mane gelu in amœnum triduum 28vo
& ultimo transiit.

Martius a pauca nive, sereno mox rursus cælo exorsus variis, &
inter se alternantibus tempestatum vicissitudinibus, Aprilem potius
referens, nivibus pluvias, gelu deliquia miscens ad 12num usque
perrexit. Constantiori postmodum frigore, sereno ut plurimum cæ-
lo, nivibus, nonnunquam parvis interpolatum ad 24tum usque con-
tinuavit. Inde remittens, post biduum pluvialis quibusdam asper-
sum, vespertim versus clarescens, 27mo in amœnam serenitatem,
sequenti tamen 28vo turbida tempestate, nimbis, pluvias, ac gran-
dine fœda interceptam, mox vero tolerabilioti biduo redditam,
30mo una cum trimestri hoc primo in vernam amœnitatem desit.

Morbi hujus trimestris initio frequentiores ac epidemici fuerunt
præcipue febres peculiare catarrhales, malignitatis non expertes,
difficiles, periculose, & quibusdam exitiose, quibus ardentes postea
succedere, pleuritide ut plurimum comitatz, eaque acuta quando-
que, & maligna, nonnullis lethali, tandem variolæ. His ob va-
rium adeo cælum Februario mense substitutz febres acutz ardentes,
& continuæ intermittentes, aut subinde potius exacerbata, mali-
gnitate ac petechiis infames, aliaque paulo mitiores quidem, sed
variis exanthematis, purpura, morbillis malignitatis latentis indi-
cibus fœtz, quæ & sequenti Martio, totoque adeo trimestri, & ul-
tra durarunt, ac haud paucos ad plures miserunt.

Aprilis primus cœptam sub finem mensis præcedentis amœnita-
tem vernam, quibusdam 4to præsertim, 6to & 8vo cum æstivis de
serenitate, & æstu certantibus, ad nonum usque serie vix interrup-
pta, nisi nubilum, utut rarius, horis potissimum pomeridianis in-
tercedens, cælum variationis insinulaveris, continuavit. Sequens
quattriduum a nono ad 10num serenitati pluvias induxit leves ac
fœcundas. Inde ad 18vum euro in aquilonem paulatim deviate,
aer quandoque serenus, ut plurimum turbidus, siccus tamen, simul-
que frigidus, nonnunquam ventosus, 18vus serenus fere totus, cir-
ca vespertim fœcundam sparsit pluviam. Succedente hinc cum sudo
temperato, & ameno octiduo, 21num procellosum, & subfrigidum
si exceperis, ad vigesimum septimum usque, qui varius, manet tur-
bidus a meridie tonitru, pluvia ac grandine horridus, circa vespere-
ram demum serenus, triduo comitatus, turbido tandem in pluvio-
lam sub ipso mensis exordio delituit.

Majus tota, & amœna serenitate ver initiavit, sed a successore
paulo asperiore, aquilone nimirum afflante, destitutus, zephyro tan-
dem subeunte in pluviosum transiit quattriduum a biduo sereno denuo
exceptum, sed 10mo sub vespere pauca asperum pluvia. 11mus mane
serenus a meridie sudus, successore 12mo sereno ac sicco inter-
serto, pluvium & circa vespertim tempestuosum substituit triduum.
Cui biduum æque turbidum, sed præcedenti ternario siccus accessit,
donec 18vus serenus & amœnus vernam gratiam ac jucundita-
tem, quindecim dierum continua serie ad ipsum usque mensis ter-
minum durantem redintegravit.

Junius eodem quidem tenore inchoavit ac biduo ad vespertim us-
que sereno continuavit, in pulviam vero satis grandem aut imbrem po-
tius & tonitru circa hanc defecit, 4tus nubilosus, & frigidulus, sic-
cus tamen successorem tota die Cauro impetuosius flante nimbosum
habuit, triduum tamen serenius & amœnius accersentem, ad nonæ
(quæ pentecostes prima erat) usque meridiem in pluvias fatiscen-
tem, 10mo succedenti vario turbido ac subinde madido, 11mo ma-
ne nubiloso a meridie claro, 12mo sereno, amœno ac temperato
toto. Huic 13us mane serenus ac ventosus, a meridie pluviosus,
Iride bis apparente, ac biduanam serenitatem nunciante, notabilis
successit. Quæ tamen a biduo inconstante excepta, quattriduo ad-
didit paulo constantius, mox tamen in biduo e sudo & pluvias
mixtum desciscens 21num totum pluviosum ad meridiem usque 22di
a meridie clarescentis succedaneum habuit, 23tus sudo & æstivo
calore gratus. 24tum ejusdem amœnitatis ad occasum usque solis
imbre degenerem, socium sibi ascivit, ut & triduum sequens, &
pluvialis tamen quandoque madens, 28vus pluviosus a 29no sicco
& a meridie sereno correctus, cum 30mo toto æstu ac sudo acce-
ptissimo ultimum secundæ hujus anni quadræ mensem clausit. Tri-
mestre hoc secundum morbos haud adeo frequentes aluit præter scorbuti-
cos nonnullos aliis ut plurimum complicatos, utpote arthritidi vagæ,
nephritidi, colicæ. Febres quasdam catarrhales, quandoque, utut rarius
malignas. Majus scorbuticis prædictis hypocondriacos quosdam, &
at raro maniacos junxit. Hisque epilepsias infantum præsertim & pue-
rorum diarrhœas; subinde & dysenterias hoc anni tempore alias insoli-
tas, febres quasdam cum colica scorbutica aut hysterica passionibus com-
binatas accensuit. Junius his malignas nonnullas cum pleuritide, quan-
doque & in peripneumoniam degenerante concurrentes, exanthema-
tum quoque miliarium peculiari quodam genere, ut & petechiis,
iisque periculosis ac quibusdam lethalibus, infames superaddidit.

Julii primus dies sudum ultimo Junii inchoatum per quattriduum
ad 5tum usque propagavit, cujus vespere pluviam sparsit raram.
Sextus mane serenus, rorantibus subinde tamen pluviarum guttu-
lis, aspersus a meridie imbrem fudit valde largum, sequentes se-
ptem nubo, aliquando & imbris & nimbis turbato cælo varii
fuerunt. 14tus æstivum redintegravit sudum, ac excepto 19no to-
nitru & pluvias circa vespertim turbido, & 20mo pluvia vespertina
madente, ad 28vum usque jugi sudo & æstu gavius est; Hic tan-
dem serenitati huic satis durabili triduum tonitruosum, pluviosum
ac quandoque grandinosum succenturiavit, ac 31mo demum sereno
& amœno finiit.

Augusto a triduo sic satis sereno, pluvias tamen quandoque in-
terpellato exorsus, 4to sudum produxit amœnum, ad vespertim us-
que

que sequentis durans, tum vero tonitru horrendo ac imbre valde
largo turbatum, 6to sudo subinde pluvias miscuit, 7mo tonitru su-
peraddidit, subsequente vario quandoque ventoso, turbido ac plu-
vioso ad 20num usque cælo, postea vero sereniori ac tranquilliori,
non tamen omnino a pluvias immunis ætheri abblandavit ad 28vum
usque; una cum triduo sereno toto, ac æstivo calore amœno, men-
sem hunc claudentem.

September sudum æstivo fervore jucundum primo die continua-
vit, 2do a meridie pluvias quasdam miscuit, sequens nubibus id
subinde temperavit. 5tus idem reparavit, a meridie pluviam a-
spersit, 6tus a pluvias immunis, 7mus & 8vus raras sereno pluvias
intercalavit; A nono ad 18vum æther æstivum, sudo rursus & tem-
perato calore amœnum affulsit, 18vus pluvias paulillo asperso, 19no
& 20mo redintegratum sed frigidulum, 21mo & subsequente biduo
paulo mitius, 24to nebulosum, sed mox rursus serenum cum suc-
cessore toto 26to sudum pluvia matutina modica, ac nubo postea
interpolatum ad 30num usque adeoque postremum reduxit, sicque
trimestri huic tertio gratum reddidit terminum.

Tertii hujus trimestris a priori haud multum abludentis Julii
hypocondriacas nonnullas & scorbuticas affectiones variis comi-
tatas symptomatibus, & hæc inter præcordiorum præcipue oppressio-
nibus & angoribus molestas; febres continuas ardentes, aliasque pa-
roxysinis subinde vehementibus graves, nec omni malignitate va-
cantes symptomata periculosa, pleuritides, hæmoptoes, deliria, ad
phrenesin durantia, inducentes. Epilepticos insultus frequentissime,
adeoque epidemice diarrhœas nonnunquam & dysenterias periculo-
sas, a tergo trahentes. Augustus eodem fere tenore transiit, nisi quod
febres continuæ ardentes, malignæ admodum, frequentiores adhuc
ac petechiis quoque stipatæ successerint, atque Septembri quoque conti-
nuarint, in hæticam haud raro, tussis contumacissimas, colicas quoque
passiones, diarrhœas & dysenterias transeuntes, periculosas, raro ta-
men lethales, purpura sæpius, variolis raro, morbillis frequentius notatas.

October autumnus congener a primo ad 19num usque vario cælo
sæpius pluvio, raro sereno, semper horridulo transiit; Hic serenus,
præter parum pluvias 23tio sparsæ octiduum adduxit serenum & 25to
præsertim æstivo sudo fere compari, a biduo paulo nebulosiori exce-
ptum, 29no nebuloso turbido ac pluvias raris tamen interpolatum, bi-
duo alio sereniori, sed euro afflante frigidulo surrogata compensavit,
tandem postremo biduo in primam glaciem sub ipso exitu dirigit.

Novembris primus, ejusdem cum prædictis postremis genii, serene-
nus nimirum & gelidus, 2dus gelidus adhuc, sed nubilosus ac turbi-
dus sequenti nocte primas sparsit nives, remittente parum gelu,
noctu rursus pruina, tum mane nebulam in pluviam delique-
scemtem tulit. Subsequentem 5to sicco, mitiori æthere grato, tum
pluviosa nocte ad meridiem usque sequentis interferta, inde clare-
scemte rursus aere post turbidum 7mum, triduum subsecutum sudo
temperato valde amœnum ad vespertim usque 11mi pluvia roran-
tem, cui quattriduum rursus serenum successit, ac 18vum mane plu-
violam spargentem, si exceperis, ad 21. usque a meridie pluvia
quoque rara cum sequentibus duobus madentem. 24tus ejusque suc-
cessor nimbofo affecit habuere turbidos ac pluviosos, solo 30mo
mensis nimirum ultimo sereno ac temperato excepto.

Decembris primus & secundus alternatim pluvias serenitati, ille
mane, hic vesperti subordinarunt, 3tus in gelu pronus a nocte ge-
lida, meridie nivofo, reliquo sereno in triduum brumali frigore ri-
gens transiit; 7mus mitior, cum 8vo toto nives addidit; 9nus tempe-
rato gelu serenus; 10mus totus nivofo a procellosa nocte in se-
renum ac temperatum gelu migravit, quod 11mo fortius; 12mo subtur-
bido cælo per triduum subsequens satis rigorosum, in gelicidium
tandem desit, 16to nebuloso cum sequente, cælo etiam sereno pau-
lulum remittens, biduum substituit penitus degelascens, sed redinte-
grato 20mo gelu ac meridiem usque mitiorem, 21mo & 22do ne-
bulosis ac pluviosis 23. a nocte serena gelicidium a meridie adduxit ad
24ti usque sequentis meridiem, in pluviam tandem fatiscemtem.
25tus nebulosus ac nubilosus totus mite restituit gelu, cælo sereno cum
nivibus quandoque alternante; ad 31num usque & postremum hujus
ut trimestris sic anni totius, robur successive validius acquirens.

Postremum hoc trimestre, perinde uti priora, febres obtulit va-
rias satis sequentes satisque vehementes, acutas & ardentes nonnul-
las simulque malignas pleuritide, & peripneumonia quandoque, ut
plurimum funestis, diarrhœa, cholera, ictero, catarrhis cum deflu-
xionibus molestis in dentes, tonsillas, guttur, pulmones &c. de-
pluentibus contumacibus; cephalæa, cardialgia, palpitationibus cor-
dis intensis, purpura subinde, morbillis, variolis & haud raro pe-
techiis stipatus. Præcipue autem colica quædam scorbutica valde
frequens fuit, prima facie levis, ac haud magni momenti visa,
mox vero nunc diarrhœæ, nunc dysenteriz, nunc pleuritidis in
peripneumoniam sæpe degenerantis, contumacis, periculose & haud
raro lethalis, Protei instar larvas induens.

Constitutio Epidemica Basileensis Anni 1699.

Dn. D. JO. JACOBI HARDERI.

Pincipium Januarii fere ad usque hujus medium, varia tempe-
state eaque subita dyscrasia ac mutatione, novi anni auspiciis
præfuit: imminente paulatim novilunio cælum læta serenitate, aerque
desiderato pruinae incremento ac siccitate ad usque finem hujus mensis
favere perrexit: inde vero obscurior aer ingruit, Februariique initium
nunc nebulosum fuit, nunc pluviosa cum nive mixtum, ventis per inter-
valla fortiter spirantibus: Pleuritides & pleuropneumoniae cum febribus
continuis jam frequenter homines invadebant: neque catarrhi ferini
iisdem pepercerunt, variolis teneriori infantia subinde infestis.

Martii principium pluvialis nix ingraturum reddidit, quæ instante
plenilunio, magna & insolita cohorte, arva montesque adeo obse-
dit, ut itinerantibus non parvo fuerint obstaculo: inde blandiore
accedente aere, nix paulatim fundi, & fertilis tempestatis spes ma-
jor affulgere cœpit: usque tamen interpolata circa finem hujus, &
Aprilis initium nivales pluvias, eandem rursus extinguere cœpe-
runt. 8. 9. & 10. April. interdum calore blando terræ gremium re-
ficiente, noctu vero pluvia cum tantilla nive idem irrigante, fe-
bres continuæ hoc tempore satis adhuc infestabant.

Dies 12. April. calidiusculæ pluvias fugata in arvis, montibusque
adhuc dum hospitas nix maximæ sui parte, affulgente deinceps
E 2 fere-

serena tempestate, cum exoptato calore solis, florum fructuumque fecundo parente, tantum non prorsus evanuit.

Maji initium multa pluvia comitabatur, in montibus hic illic nive per intervalla interspersa, inde optata tempestas ingruit, soli desiderato calore singulis terræ fructibus & seminibus, in vitam excitatis, cujusmodi in Junium usque & ultra fecundissime continuavit: Julius, quem canicula promittit fervorem minus largum, sensit frequentibus pluviis præter votum illum attemperantibus: neque ejus defectum Augustus majori calore, quem ab hujus medio ad finem usque demum experti sumus, sarcire potuit: unde uvarum maturitas quam Septembri mortales præstolantur, versus finem usque hujus a nobis desiderata fuit; & quamvis dies calidi interpolate aluxerint, noctes tamen frigidiusculæ, eandem non parum sufflaminarunt. Sub finem Octobris nivalis tempestas jam ingruere cœpit, quæ subsequenter hinc Novembri & Decembri mensibus, in primis circa medium finemque hujus cum multa Brumæ sævitia, ingruit; præter febres continuas & in quibusdam locis satis malignas, alii morbi rarius frequentes erant.

DN. D. RUDOLPHI JACOBI CAMERARII,

Academici Naturæ Curiosi,

Schediasma Tubingæ missum ad Historiam Epidemicam,

Anno 1699. & 1700.

Laudabile est institutum historiæ epidemiæ Germanicæ, in appendicem ephemeridum ab annis aliquot referri solitæ, quod ex multitudine observationum per diversas provincias collectarum progressu temporis acquirendam spondet notitiam meliorem & plenior de subdolis, alias & occulte, utut populariter, grassantibus morbis. Hanc ego collectaneorum supellectilem hac quidem vice non venio locupletatum, nec plenam descriptionem constitutionum utriusque anni hic inferere necesse duco; Quoniam qui suis temporibus grassari solebant catharri & inflammatorii pectoris morbi, quæque intercurrerent variolæ, cum aliis levioribus, tanti momenti non videbantur, epidemicarum autem febrium pristina frequentia & malignitas ab aliquot retro annis per Dei gratiam in urbe dominium non obtinebat: Sed ea fata, quæ per tristes olim annos communiter plures experiri solebant, jam paucis & vel uni atque alteri solum obtigere, idque modo quodam sporadico potius quam epidemico, hoc annotare cum licuerit, communicare etiam operæ pretium visum fuit.

Exemplum quod huic rei fidem faciat singulare pro an. 1699. suppetit in una domo, scilicet Aprili mense primus in familia pater, vir robustus, idemque hæctenus sanus bibliopæges, febre maligna plane ex improvise modoque acuto abripitur. Hunc post breve tempus, liberis interim etiam correptis, evadentibus omnibus, intra mensem ultima sequitur in familia mater; sic viduata domus, cum altum de simili malo in urbe esset silentium, nec per hunc annum ante & post ita acute abriperetur quisquam. Nihil etiam contagii hinc retulerunt vicini, aut qui alias tristes illas ædes visitarunt. De causa illa manifesta non constabat. Audiebantur quidem tum temporis hinc inde varii pauperum morbi sub annonæ caritate ob diætæ vitia, vertigines, tormina, alvi fluxus, sed hæc in pagis potissimum, minus in urbe; Constitutio autem aeris per istum mensem, utut sæpe blanda, mitis, velut æstiva, hinc & leviter tempestuosa, in principio tamen & sine fuit frigida, humida, cum & vicinis alpisbus diu inhaereret nix, quin nova sub medium & finem ibi caderet.

Pro anno 1700. duo suppetunt exempla, notata in binis ædibus: ubi principium continuæ non communis febris iterum deducendum est a mense Aprili, qua sub ejus finem correptus fuit sartoris filius, absque omni, quantum quidem constat, causa evidenti, nec ab alio quocunque infectus. Hunc sequitur toror major, hanc minor natu; omnes medico nullo consulto vel absque vel cum medicamentis, ut ajunt, domesticis evadunt, ita tamen ut ad quinque & sex septimanas protenderetur apud singulos plena convalescentia. Quarta in ordine mater demum die septimo vel octavo Junii (non enim simul tres priores personæ decubuerant; sed una fere resurgente dejecta fuerat altera) cum male habere circa præcordia inciperet, sumit purgans, nescio quale aut cujus suavis, & movetur fortiter, sed abhinc statim lecto attingitur, alvum ad tredecim dies habet clausam, tunc suppositoriis & enemate tarde & parce motam, jacet soporosa, omnium negligens, excitata & interrogata sibi non male esse dicit; tandem subdelira, nullis usa medicamentis, in tertia demum septima die vigesimo quarto Junii moritur, livide post mortem nigricans. Ipso die sepultura frater defunctæ, lanio robustus, quinquagenarius, tabellarius, post varios quidem errores diætæ, largos certe in vino excessus, agrotare incipit, sc. prævio horrore maligne deicitur die vigesimo sexto Junii; Dicitur autem turbatus & vestibus indutus die mansisse extra lectum, ludens, garriens, cum pulsus præ spasmiis jam explorari vix posset, & ut ajunt, pleuriticus. Quidquid sit de ipso, quem non vidi, moritur satis acute mane diei secundi Julii, convulsus. Abhinc terrore percussa alterius fratris uxor, etiam deicitur, sed evadit; Cum vero insuper binæ personæ aliis in ædibus, quibus cum ista familia nihil intercesserat commercii, febre, sed mitiore & remittente, corripenter, caderetque vir sanus hæctenus ex improvise apoplecticus lethaliter, imo de subitaneis per patriam casibus tristes hinc inde advolarent nuntii, magna utique tum pavidorum commotio. Sed redeundum ad ædes sartoris. Die altero post sepulturam matris, filia annorum septendecim nondum menstruata, mane circa horam octavam agrotare incipit, friger, a meridie incalescit, atque ita hinc continenter febricitat, ut extra lectum plane non degere, quin sæpe in eo ne quidem se erigere posset, pleurisque tamen diebus horas matutinas experiretur meliores, pomeridianis autem sentiret exacerbationes omnium symptomatum, quorum præcipua erant dolor capitis, & ut aiebat cordis, cum levi tussicula, alvo tarda, pauca, siti non nimia, appetitu nunquam plene abolito, lingua mucosa, molestia quadam deglutitionis, absque maculis, (uti & priores omnes) absque singulari delirio, mittens urinam nunquam rubram, cum nebula post moram crassa albide pallida. Hæc filia post dies quatuordecim evadit feliciter, usa decocto rasur. corn. cerv. rad. glycyrrhiz. sem. fœnicul. pulveribus pannonicis, alexipharmaco, cervino, (prout hic in officinis juxta descriptionem

B. Parentis in gratiam pauperum prostant minus pretiosi) bis in die aut ter, alternis enim noctibus dabantur grana quatuor extracti bezoardici, descriptionis ejusdem, cum vehiculo & mixtura aquarum mellissæ, card. bened. cerafor. tilia, Syrup. acerosit. citr. cui addebantur cornu cervi ustum, antimonium diaphoreticum, & tinctura bezoardica, cum pulveres illos porro sumere recusaret. Tandem ultimus in domo pater, die duodecimo Julii languere visus, sibi que metuens, ne ordo jam ipsum tangeret, a deglutitis noctu septem pilulis bezoardicis, & drachma dimidia theriacæ Andromachi mane in vino hausta, largiter sudans præservatur, nilque ultra mali passus, finem ita imponit malæ febri, inducias hinc iterum urbi nostræ (utinam bene longas) concedenti.

Hæc de hac familia. Interim alibi in urbe lotrix, cum prioribus non communicans, circa idem tempus cum ista muliere, sc. die octavo Julii, post loturam lintheorum, sub horam vespertinam septimanæ horrore gravi correpta, hinc ob æstum, sitim, acutum capitis dolorem, cardialgiam, tussim frustraneam, dolores costarum pleuritidem æmulantes, die decimo Junii mane venam secari jubet in brachio (unde sanguis extractus mora temporis nullam contraxit crustam, sed mundam servavit superficiem) decursu dierum mane & meridie melius, a vespere in noctem semper pejus habet, tum dyspnoica subinde & subdelira; Die decimo tertio mensis observantur in collo ipsius & pectore maculæ minutæ rubentes, die decimo octavo per collum efflorescentes vesiculæ milliares; Alvus die decimo quarto ante meridiem sponte novies non torminose soluta per morbi decursum manet lubrica, laxior communiter sub exacerbationibus; Urina mittitur nunquam tincta, plerumque turbida; cum sedimento post moram laxo, crasso, pallido. Sic afflicta scæmina sub usu prædictorum medicamentorum, quibus hic accesserat decoctum pectorale alexipharmacum, electuarium diafœcordium, & cortex Peruvianus, evasit feliciter; equidem in sexta septimana jam iterum lotricem agens, notabile adhuc sub declinatione emergens narravit phænomenon, pruritum scilicet fere universalem, valdeque molestum, quo ad fricandum vehementer corpus urgebatur, unde & in squamulas elevata & siccata cuticula abscesserat passim. Cæterum hæc non uti prior, infecit quenquam, sive nemo ab ea laboravit similiter, nisi quod filiola annorum quatuor eam videretur sequi, febricitabat enim per dies quatuordecim continenter, cum exacerbationibus vespertinis, sine maculis; convaluit autem absque medici ope, cum post longam anorexiam & abstinentiam appetitu ferebatur in lac acidum eoque satiaretur.

Hæc sunt fata familiarum, quas in alta velut pace securas hostis improvise diversimode aggressus graviter exercuit, modo unam & alteram in domo eligens personam, reliquis parcens, alias nulla prætermissa paucas fataliter abripiens; Ibi in una domo persistens, decursu intra breve tempus absoluto, hic extra domum ad consanguineos & affines sese extendens, diu tamen protracta successione in eadem, ad mensem sc. usque tertium. Illum alias novimus morem talium febrium, quod cum epidemicam minantur invasionem, accedentes subdole & sparsim se prodant, & cum finis earum adest, recedentes subinde tamen, cum minime credis, recurrant; Hic autem neutrum locum habere videtur, sed alia ratione tristitem sui memoriam renovasse malignitas; idque non tam hyberno, quo major olim communiter notabatur, quam æstivo potius hac vice tempore, quo Mars apud nos (utinam per Dei gratiam diu) quiescit, & qua mediocre fuit annonæ pretium. Addendum hac occasione post hyemem inconstantem, ventosam, lutulentam & gelidam, non minus varium successisse verum tempus, nive iterum alpisbus diu, ad finem usque Aprilis, inhaerente; Junium in specie sæpe, ipso die septimo fuisse pluviosum, ad exundationem fluviorum in utraque circa urbem valle. Respondebant interim tali constitutioni morbi varii, inter quos præcipue hybernæ variolæ, vernæ scabies, pleuritides, peripneumoniz, sub initium Maji perquam frequentes: Abhinc autem inter benignos nec multos morbos observabatur singularis illa malignitas, ad paucas determinata personas. Quibus sub finem pro declaranda temporum istorum de cætero bonitate addi potest, quod a quo tempore fana de novo remedio antidysenterico percipuit, nullus observatus inter nos fuerit æger, quo cum ejus periculum fieri potuerit.

S E R I U S M I S S A

DN. D. AMBROSII STEGMANNI

Historia Epidemica Mannsfeldiaca Anni 1697.

CUM temporum inæqualitas, Hippocrate & experientia teste, plurimos pariat morbos, nec minima utilitas, iudice perillustri Domino Præside ex epidemica annorum constitutione, diligenterque illorum observatione resultet in reipublicam Medicam, operæ pretium duxi & Ego, ut circa Comitatum Mannsfeldiactum ex epidemica constitutione propullulantes morbos, quantum mihi observare datum fuit, annotarem & ephemeridibus adderem. Ab anno itaque 1697. bono cum DEO, initium faciam: Cujus Mensis Januarii incepit gelu rigoroso congelare aquas, & nive conspergere terram ad quintum usque diem, quem inconstans, ingruente ultima lunæ quadra, aeris tempestas excepit, & per reliquos hujus mensis dies mox pluviis, mox nive, mox turbinibus continuavit.

MORBI. Per hunc mensem tumores insoliti hominum capita occuparunt, ut tertio majores extiterint, quos tamen sudorifera & vesicatoria optime dissiparunt. Sicut & pleuritis notha in gravidas nimium quantum sævit. Nec non catarrhi suffocativi primæ, mediæ & ultimæ ætatis homines invaserunt, qui affectus tamen appropriatis suis remediis auscultarunt.

FEBRUARIUS, inconstante aeris temperie, multis comitatus nebulis matutinis & vespertinis ad nonum usque diem continuavit, quo frigus intensum ingruit & ad 24. Septembris sc. diem duravit, reliquos hujus mensis dies rursus aer pluviosus, udosus & nebulosus excepit.

MORBI. Mense hoc morbus Hungaricus, superveniente ut pl. 7mo die angina, febresque petechiales multis exitiales fuere. Petechiæ in plerisque absque ullis datis medicamentis 2do statim & 3tio die maxima cum virium prostratione & malignitate eruperunt. Et licet multi his laborantes sanis similes viderentur, tamen præter omnium opinionem die septimo extincti sunt. Die 5to ut pl. in sexu nobiliori hæmorrhagiæ narium, in sequiori menstrua cum infallibili lethalitatis indicio; erumpebant. Quibus mox ab initio delirium super-

superveniebat, morbo absolvebantur sic, & diversos ex pauperioris sortis hominibus vidi superstites, qui negligentius vivebant, in frigore jacebant, nec ullam sui corporis curam habebant. Ex decumbentibus etiam quidam recidivam sunt passi, ita ut intra mensem bis fuerint petechiis insigniti, qui tamen omnes vita privati sunt. In quibusdam febre hac demortuis, facies vivorum simillima & sudore guttatim conspicua, deprehensa est. Admirationem etiam subii, quod bubones pestilenciales, in quibusdam peste, tempore ultimæ contagionis, olim infectis, hoc mense rursus intumuerint, purulentamque materiam de se dederint. Optima bezoardica lege artis & summo studio adhibita respuebat omnia hæc febris; Itidemque vomitoria & venæ sect. in principio etiam administrata erant de nihilo. Sola vesicatoria, quæ tamen plurimi recusabant, primis statim diebus in diversis corporis partibus simul applicata, multos eripiebant e faucibus mortis.

MARTIUS & APRILIS mox pluviis & tonitru, mox nive, mox turbinibus mutantur suos dies.

MORBI: Catharri & tusses nimium quantum infestant homines, in his Pillul. de Succin. Craton. it. de Cynogloss. associatis Elixeris pectoralibus multum profuerunt.

MAJUS insolito aeris fervore & tonitru ingruit, & usque ad X. diem continuavit. Reliqui hujus mensis dies pluviosi & ventosi, noctes vero ob flantem Boream summe frigidæ extiterunt, ut exinde fructus & fruges ob glaciem obductam frigore sint tactæ & læsæ.

MORBI. Hoc mense pleuritis, hæmoptisis, arthritis vaga scorbutica, & in primis febres catharrales multo infestantur.

JUNIUS intravit rursus insolito aeris fervore, cujus XI. diem Boreas excepit & usque ad XX. diem duravit, quo rursus aeris fervor cum tonitru ingruit, & mensem finiit.

MORBI. Hoc mense melancholia multos utriusque sexus homines invasit, qui truculentas manus sibi suisque intulerunt, supervenit & quibusdam melancholicis epilepsia paucas post horas lethalis.

JULIUS crebrioribus pluviis, flante Borea, per totum mensem ita molestus, ut Vulcanus tunc temporis superbiret in nostris fornacibus.

MORBI. Hoc mense febres tertianæ & quartanæ, it. Partus difficiles sequiori sexui periculosi fuere.

AUGUSTUS, SEPTEMBER & OCTOBER pluviosi & ventosi flante Borea & Euro extiterunt.

MORBI. Catharri, tusses, & pleuritis vagarunt hinc inde.

NOVEMBER & DECEMBER maxime inæquales fuerunt, & mox pluviis, mox nive, mox frigore mutantur suos dies.

MORBI. His mensibus icterus in quibusdam cum diarrhœa, in aliis cum vomitu, in plurimis cum tumore ventris observatus est, & totas familias infectis, paucos tamen intra dies pillulis meis Martialis & sale cachectico Ludovici profligavi hunc morbum. Sic & arthritis vaga scorbutica & podagra multos infestavit.

Epidemia Mansfeldiaca, Anni 1698.

JANUARIUS frigore intenso per 4. dies spirante subsolano continuavit, 5to die aer nebulosus ingruit, 6to & 7tmo Aquilo nivem, d. 12. 13. 14. zephyrus pluvias protulit, d. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Euro notus nivem & intensum frigus reddidit. Reliqui mensis dies, flante zephyro, rursus pluviosi extiterunt.

MORBI. Tussis, catharri, & pleuritis notha multis molesti fuere.

FEBRUARIUS pluviosus & australi aere usque ad sextum continuavit diem, 7mo frigus intensum, spirante euro-noto, ingruit, & per reliquos hujus mensis duravit.

MORBI. Pleuritis, tumores sub axillis & morbilli admodum familiares fuere hoc mense omnis ætatis hominibus.

MARTII primi VI. dies, flante zephyro, pluviosi extiterunt, VII. frigus, spirante Euro-noto, intensum rursus ingruit, & usque ad XX. continuavit, quos reliquos mensis hujus dies aer meridionalis cum pluviis & tonitru absolvit.

APRILIS totus pluviosus, spirante aere meridionali, extitit.

MAJUS eodem aere & pluviis usque ad 18. diem continuavit, d. 19. Subsolanus radiis solaribus terram siccavit, quam tamen d. 27. pluvix & grandines rursus humectarunt, & ad finem usque hujus mensis perdurarunt.

JUNIUS, JULIUS, AUGUSTUS, SEPTEMBER & OCTOBER mox pluviis, mox radiis solaribus & aere validiori, mox frigidiori, variante Aquilone & Austro, admodum molesti extiterunt.

MORBI. Licet maxima aeris inæqualitas per totum ferme annum extiterit, minimi tamen morbi has oras visitarunt. Nam præter melancholiam, maniam & furorem uterinum, plane nullus alius in Comitatu Mansfeldiaco per mensem Julium, Junium & Augustum observatus est morbus. Hi autem affectus permultis familiares fuerunt. Nam XV. melancholia, VII. mania, & octodecim furore uterino laborantes meam solummodo implorant opem, quibus etiam ad unum omnibus appropriatis suis remediis & inprimis vesicatoriis & venæ sect. Deo auxiliante pristinam reddidi sanitatem. Nymphamaniacæ in primis mira passæ sunt symptomata. Quædam nil nisi obscena proferebant verba, veneremque intuebant. Quædam insomnia phantastica recitabant, & modo hunc, modo illum Sanctum, I. Principem, I. alium Magnum pro sponsis habebant. Aliæ cantabant, saltabant, & modo in caput, modo in pedes se conjiciebant, varique absurda immiscebant. Aliæ rhythmis componebant, totas paginas e Bibliis recitabant, & chiliastras se profitebantur. Extitit autem, quod mirandum, furor uterinus contagiosus, nam iisdem in ædibus sæpe 2. 3. & plures decumbebant mulieres hoc affectu. Vidi etiam oculis meis: Quod præfecti cujusdam uxor in paroxysmo ejusmodi furente constituta, ex adstantibus mulierculis rusticam quandam virginem ad osculandam manibus arripere, recusantique colaphum impingeret, ex quo terrore rustica hæc, altero die post, eodem affectu infecta fuit.

NOVEMBRIS initium frigidum fuit, reliqui vero ejusdem dies mox pluviis, mox nive rursus molesti extiterunt.

DECEMBER mox frigore, mox pluviis, mox nive, mox turbinibus annum absolvit.

MORBI. Hisce mensibus variolæ suis maculis primæ, mediæ & ultimæ ætatis homines signarunt. Vidi enim vetulam septuagenaria propinquior, & virum sexagenariorem, variolis absque vitæ lætura decumbentes. Sic & bruta a variolis non immunia fuere, ex quibus pennata, utpote anseres & gallinæ, tum domesticæ, tum

Indicæ, hisce infecta perierunt ferme omnia. Oves & porci vero, quibus expellentia (utpote cineres ex stipitibus fabarum, vel frumento fecalino cum urina humana, vel rob. Sambuci &c.) ab Œconomiis curiosis propinata sunt, ut pl. evaserunt superstites.

Constitutio Epidemica Berolinensis Ann. 1700.

DN. D. GUSTAVI CASIMIRI
GAHRLIEP.

von der mühlen.

JANUARIUS inus st. Greg. gelu quod annum præcedentem finierat, cum degelasciente tepore imbris ac nivibus mixto commutavit, & ad festum Apparitionis s. ut vulgo vocant trium Regum usque continuavit; sequenti festum die gelu cælo sereno vires recuperavit; ac per triduum servavit, 10mo rursus & sequentibus; 12mum gelu aliquali & nivibus diversum, cum 16to, 17mo & 18vo blandum gelu nocturnum, cælo nubilo a meridie pluviis rorantibus, si exceperis ad 25tum usque remittens, 26tus priorem vigorem reassumpsit, illique nives superaddidit; eoque tenore sequentibus 20no excepto, ad 30mum usque duravit, tandem 31mo ac ultimo illius mensis, pluvioso, a meridie vario desit æthere.

Februarius temperato quidem frigore cœpit, sed nivibus, quandoque alias pluviis, utut raris interpolato varius fuit ad 22dum usque, a quo redintegrato per triduum brumali rigore, sereno interdum cælo, 25to sensim remittente, 28vo circa vesperam pluviam tandem delicit.

Quam primus Martii serenitas excepit dies, huncque sequentibus gelu nocturnum, subinde & diurnum, nivibus 3tio & 4to opertum. Succedentibus a 5to ad 11mum satis rigidum, remittens 12mo ad 25tum usque Cauro impetuosius flante noctu valde gelidum, & hujus sequaces ad finem usque mensis, Cauro licet ab Aquilone repulso ac hinc 30mo succedente Euro eodem fere tenore perdurantes.

Morbi hoc anni quadrante præter scorbutum fere endemium ejusque affeclas, ut & cognatum malum hypochondriacum, fuere frequentiores catarrhi, tusses, febribus, quandoque catharralibus, variis defluxionibus, in genas, dentes, maxillas, guttur, scapulas, ipsum quoque pectus & pulmones, pleuritide item tam vera, quam spuria, indeque ut plurimum pullulante hæmoptoe, hancque nonnunquam excipiente aut phthisi, aut hæctica, haud raro etiam nephriticis doloribus complicata. Præterea febres quoque aliæ variæ, interque illas quædam malignitate non vacantes, morbillis & variolis & purpura sese prodentes.

Aprilis primis diebus Euro-noto spirante paulo remissior, 6to vernæ amœnitatis prænuntio, variantibus subinde ventis & nonnunquam satis asperis flantibus, sereno tamen plerumque cælo, rarius pluvias rorantes spargens, ad extremum usque diem temperatus fuit.

Cui majus fere totus respondit, frigidior equidem paulo præter 12mum & 17mum sudo & tepore verno amœnos, ad 22dum in pluvias comite tonitru circa vesperam cum sequenti toto & 24to mane udo solutum, succedente biduo sereno ac temperato, postque 27mo mane pluvio, tandem ad 31mum adeoque ultimum serenitas & amœnus.

Junius serenitatem & amœnitatem vernam Maji cœptam ad 6ti usque vesperam cum pluvia tonitru advehentem continuavit, 7mus & 8vus præcedentibus nubilosiores, circa vesperam rursus pluviis fuerunt, reliqui ad 12mum obscuri & frigidi, sicci tamen; a 12mo vero, 20mo mane pluvioso, vesperi tonitruoso excepto, ad 22dum & 23. serena & amœna temperie commendabiles, ac hos inter 14tum, 15tum, 16tum & 17mum æstivo fere æstu graves fuerunt, subsequentes pluviosi, quandoque tota die ac nubili ad 30mum usque & ultimum mane nubilum, postea præcedentibus sereniores.

Morbos hoc trimestre præter prædictum scorbutum & ab illo dependentes cachexiam, dolores, tumores id genus alia symptomata, febres genuit omnis generis, communes, ephemeræ, intermittentes varias, etiam septiduanam, paroxysmo septimo quoque die recurrente, rarius, si unquam antehac in praxi occurrentem, continuas, arduas, cum & sine exacerbationibus, catarrhales, malignas haud raro, pleuritide, arthritide, catarrhis aliisque variis defluxionibus, tussi, doloribus præcordiorum & hypochondriorum, asthmate, interdum convulsio infesta, purpura, morbillis atque variolis aliisque exanthematis fœdas, passionibus item hystericas, nephritides, diarrhœas, hæmorrhagias etiam uteri, &c.

Julii prima dies serenitatem ultima Junii cœptam continuavit. Verum frequentes mense fere toto alternis diebus sudum cum pluviis nunc parioribus, nunc copiosioribus alternando, æstivum sereni cæli æstum sic imbris & pluviis temperarunt.

Augustus a primo ad 7mum fere pluviosus, triduum ad 10mum usque serenum intercalavit, sequens triduum mane siccum vesperi pluvia maduit, 14tus vento nubes dissipante serenas, 15tum successorem habuit totum udum & imbrosum, 16tum mane pluvium, postea serenum, serenitate triduum continuante, biduum rursus mane nebulosum post raras spargendo pluvias vidimus. Sudo 22do interfecto 23tio nubilo, tonitruoso ac pluvioso in serenitatem tandem declinanti, 24tus successit serenitas & amœnus, atque huic frigidulum pluviis subinde madens ad finem usque mense septendium.

September facie a primo rorante nonnunquam alias sereno, in sudum æstu sæpius grave mutata, ad 13tium usque mane serenum, licet a meridie post tonitru grave imbrum, commendabilis, triduum accivit varium pluviis serenitati interspersis, ac frigore, moderato tamen, non usquequaque gratum; triduo alio sudo gratiori exceptum, biduo rursus interpolatum vario, 22do sicco 23tio toto fere pluvio ac frigido 24to mane nebuloso ac nubilo, a meridie sereno, substituti triduum ejusdem fere tenoris frigidum tum serenitas bidui postremi mensem nunc simulque trimestre hoc absolvit.

Quoad morbos id præcedenti fere compar, nisi quod frequentiores adhuc fuerint febres, præsertim ardentes & malignæ, petechiales quoque, pleuritides in phthisin quandoque declinantes, quædam veræ, quædam etiam nothæ, dysenterix, & diarrhœæ, ætui partim & inordinatæ, in potu præsertim & fructuum horariorum ingurgitatio-

sitatione, diæta originem debentes nonnunquam lethales variæ, febribus interdum comitatæ defluxiones cum tumoribus artuum, præcipue genarum valde contumacibus.

October a primo ad quartum usque nubilum & a meridie rorantem, indeque ad octavi usque vespertinam pluviam serenus, temperatus ac sudo fere jugi veris instar amœnus; Noctu inter octavum & nonum tonitru horrendo terribilis, nono sparsis a meridie pluviis paulo horridior, primo sine pluvia nubilus, primo sudum redintegravit, biduo succedente vario ac quandoque pluvio, 16to vespere pluvia madens, cætera cum sequentibus quinque serenus, 21mo nubilus subindeque rorans ac Austro flante frigidus, 22do mane pluvius ac nubilus cum sequentibus quinque siccus, 27mo nubilus totus ac imbrofus, 28vo Vulturno aspirante nebulosus mane, postea cum insequentibus ad 31mum ac mensis hujus postremum, paululum rorantem & frigidum, serenus atque siccus.

Novembris primus, durante adhuc Vulturno, gelu induxit, & per biduum continuavit, quod tertio rorante mane parumper calo remisit, succedente 4to toto pluvioso; cum biduo turbido sicco tamen, mane præsertim atque huic ad 12mum usque varia, quandoque nebula, alias serena, sicca subinde, rursusque pluvia tempestate; tandem Cauro afflante gelu 13tio serenum accessit, ac sequenti mane turbido & a meridie nive prima comitato, usque ad 19mum a rigore remittentem & pluviis madentem duravit. Tum post biduum pluvium, biduum successit gelidum, procellosum & grandinosum; huic demum nix mane pluviis mixta, a meridie ac sequenti 24to in imbres deliquescentes, sequenti vero nocte Austro flante, rursus gelascens, diurno succedente per quatrduum sudo, vespere vento paulatim ad eum regrediente in nivem resoluta, ac biduo subsequente toto pluvioso, nebuloso, ac inamœno mense terminante.

Decembris primus gelu reduxit ac nives, quod ad 5tum usque circa vespem pluvia sparsa remittentem duravit, hunc sequens biduum adhuc remissius prima die pluviis vespertinis tulit, altera siccus fuit, 8vus mane nebulosus valde ac pluvius, postea siccior, 9vus, totus nebulosus & zephyro aspirante imbrofus, 10vus mane paulo serenior, vespere pluviosus, 11vus mane turbidus, post serenior, tandem nubilus & udus, 12vus blandum gelu, nonnunquam nivibus, nonnunquam gelicidio interpolatum reduxit, ad usque 20mum, qui rigorem majorem addidit ac quatrduum continuavit, circa vespem 24ti remittens ac vario celo, ut plurimum tamen uvido, ad 31mum usque perseverans; sicque hoc trimestre simulque annum ipsum temperato, at ingrato frigore claudens.

Ultimum hoc trimestre morbos produxit prioribus nec frequentia, nec varietate, nec gravitate cedentes, passiones hypocondriacas, iliacas, colicas, hystericas, nephriticas, febres varias, præsertim acutas, ardentes, continuas, catharrales, pleuriticas, malignas quoque variolis & petechiis infames, & quandoque funestas. Defluxiones & catharras, suffocativos quoque, in genas, guttur, pulmones &c. depluentes. Asthmata convulsiva quoque nonnunquam & anginas causantes. Diarrhœas & dysenterias, cephalgias, hemicranias, cardialgias, odontalgias, hemiplegias, apoplexias, elephas, præsertim infantum. Tumores varios & dolores ut plurimum contumaces, & innumera alia scorbuta præsertim & Veneræ sui familiaria symptomata, brumali frigori, cœlique frigidiori ac humida constitutioni variabili & inconstanti ex parte tribuenda.

Constitutio Epidemica Uratislaviensis

Anni 1699. 1700. & 1701.

Excellentissimi Domini Uratislavienses uti hætenus inter naturæ curiosos solertia & curiositatis palmam non paucis aliis dubiam reddere allaborant, ita laudabili instituto, circa conferendam morborum in Germania epidemicorum historiam, & ipsi favere, ac Patriæ suæ celeberrimæ similem statum delineare decreverunt; Cujus priores tres anni de morbis, qui anno 1699. 1700. & 1701. Uratislaviæ grassati sunt, publicis typis jam descripti legantur, & pro hoc nostro volumine paulo prolixiores sint, synopsis eorum hic dare libuit, omisissis iis morbis, qui epidemicorum censum haud ingrediuntur.

Cum Anni millesimi, sexcentissimi, nonagesimi noni Januarius horridum Uratislaviensibus reddidisset nebulæ & venti, variis vicissitudinibus, potissimum intercurrente pluvia, subinde tamen & frigore, quamvis remissione, graves; initium quoque, imo majorem fere partem Februarii sub eadem cœli inconstantia transegerunt, nisi quod alterna frigoris vis majori impetu corpora concuteret, & aer circa plenilunium serenus languentes animos excitaret; quæ cœli inclementia, ineunte mense Martio, continuavit, non raro tamen effusus ad plenilunium usque, quæ illico tabescebat, nivibus, & terra pruinis horrente; cum e contra mollior aer, vergente ad finem mense, ac sudum, tellurem foveret. Primus ergo hic anni quadrans toto fere decursu excessit in humida constitutione, quam etiam accuratæ tam barometricæ, quam thermometricæ observationes confirmant. Quo tempore, cum primis sub Januarii principium, dolores spasmodici sanguineo-cholericos, & melancholico-phlegmaticos affligebant, frequens erat arthritis, prædominabantur tamen in subjectis iracundiæ obnoxii & diætæ aromaticæ ac vinosæ deditis, præcipue liberaliori vini Hungarici, a solo calce viva fere penitus substrato infecti, potui inhiantibus. Plures intempestivo frigidi & humidi aeris accursu admissi, pleuritis notha occupabat, temperatioribus diureticis magis, quam diaphoreticis cedens. Multi de dolore lumbos infestante conquesti, pro nephriticis promiscue a Medicis non satis exercitatis, & vulgo habiti fuerunt, cum tamen non semper renes, sed plurimas etiam alias partes in illa corporis regione latentes, affici posse, sagaciores Medicos fugere nequeat.

Sub finem ejusdem mensis in scenam prodibat febris petechialis, quæ licet post 14. Aprilis diem conticeceret, mense tamen Majo iterum ferocire, & quidem cum catarrho suffocativo, præprimis in ætate teneriori incipiebat, ac non æque in infantes, pueros & senes, sed in fœminas, & frequentius in mares sanguineos & sanguineo-phlegmaticos sæviit, ac præprimis iis gravis ac infesta incubuit, qui vino atque spiritu vini se obruerant, ac corpus cacochymicum prava victus ratione contraxerant; cæterum prævio horrore, cum quadam gravedine, tussi, imo & faucium inflammatione & tumore invadebat, aderat præceps subita virium prostratio, pulsus exilis & imbecillior, frequens tamen & inæqualis; calor qui horrorem sequeba-

tur, in sanguineis intensior totum corpus occupabat, maxime vero caput, unde in fluidioris habitus corporibus, cephalgia acutior, rubor faciei, oculi scintillantes, vigiliæ, deliria furiosa, jactatio corporis, sitis &c. In sanguineo phlegmaticis, quorum sanguis sero viscido abundat, color multo mitior apparebat, qui non paucis imponere solet ægris & Medicis, ut parum periculi subesse, cum magno suo discrimine credant, a quo fallaci calore forte febris illa maligna vocari meruit, sumpta metaphora ab hominibus malignis, qui aliud fronte promittunt, aliud in intimiori cordis recessu premunt: in his calori respondebat sitis tolerabilis, & quies corporis sine manifesta jectigatione, sed debilitas gravis ac continua in somnum propensio, ac non consulta antea taciturnitas, cardialgia, lingua modo lento succo obducta, modo fissuris asperis & scabris dehiscens, aur retorrido calore cum vicinis faucibus arebat. In hominibus melancholici temperamenti, quorum tamen non nimis multi hac infirmitate detenti fuerunt, statim ab assumpto alimento vel medicamento status & hypochondriorum murmura. Cholericis loquacitate sua aliorum anres obtundebant, & calore acriori tangentis manum urebant. Omnes cujuscunque complexionis, graviter nausea cibi & appetitus dejectio infestabat. Sensim deinde æstus invalescebat, ut luculentus calor in partibus externis deprehenderetur. Exerebant se etiam dolores varii, modo pungentes, modo mordicantes. Circa quartum, septimum, imo etiam undecimum diem, in pectore, dorso, brachiis, lumbis & cruribus, maculae rubentes, puncturis pulicem similes, sine levamine erumpebant, aliquando etiam majores lenticularum magnitudinem æquant; rubrae illæ meliores, deteriores vero citrinæ, livida, violaceæ, in primis si hæmorrhagia gingivarum circa dentes incisivos superioris maxillæ enormior juncta fuerit, nigra, præprimis majores omnium pessimæ. Urina non uno modo comparata erat, nec alvi excretio; hæc liberalior salutaris admodum post diem septimum observata, & accedente sudore solutionem morbi promittebat; cum e contra siccitate alvi hæc febris pessime tulerit. Vermes per alvum cum sedibus aliquoties rejecli. Pejus cum iis agebatur, quos vomitus partim humorum variorum, partim quorumvis assumptorum, aut etiam inanum cum nausea, & cardialgia affligebant, præsertim si singultus iis se comitem adjungeret. Sudores primis statim morbi temporibus sine levamine, sed post quartum morbi diem, circa septimum, undecimum &c. felicius indices erant: cadaverosus erat funestus. Cum hæmorrhagiis quidam evaserunt, morbus nequaquam intra quatuordecim dies finiebatur, sed ad 21. imo & ultra ad 40. usque extendebatur. Solvebatur rarissime per hæmorrhagiam, aliquando per abscessum, frequenter per sudores, sæpissime autem tum per hos, tum per diarrhœam; quandoque etiam per tumores in variis corporis partibus, cum primis in ano, per exanthemata miliaria, pedum scabiem, icterum &c. Cura sine V. S. (qua sanguis eductus in superiori parte, crassa alba spissa, tenacissima obductus, in inferiori vero, modo floridus & fluidus, modo concretus & coagulatus fuit deprehensus) peracta felicius successit. Quibus statim ab initio mite evacuans datum, facilius morbum superarunt, quale fuit potio Sydenhamiana in dosi aliquantum minori, pulvis ex Antimon. & Nitro depur. Tart. Vitriolato ac grano ij. vel ij. scam. sulphur additis apud ditiores granis paucis auri fulminantis, vel etiam quæ simul ad malignitatem habent respectum. Vomitoria in principio hominibus phlegmaticis aut melancholicis robustis & nauseantibus, præsenri conatu vomendi, interdum cum successu data. Cæterum fere tota cura per placidum sudorem, seu potius madorem, bezoardicis, pulv. Bez. Sennerti, Rumbaum, Doring. Pannon. rub. &c. Mist. simpl. Essentia scordii saturatori, myrrha, diascordio, absoluta; fortiora, volatilia salia, bezoardica calida ac spiritiosa omissa, quia obfuerunt: camphora plane præterita, cum vis ejus alexiteria non nisi nuda traditione & opinione hominum nitatur, & interne plus detrimenti quam auxilii spondeat. Diarrhœam, nisi esset colliquativa, aut inflammationi intestinorum superveniret, nequaquam suppressere studuerunt, quinimo non raro laxans ordinarunt, ac interne per totum morbi cursum nitrosa cum sufficienti potus quantitate ea intentione ægris propinarunt, ut ventriculus & intestinorum volumina rite abstergerentur, & materia biliosa acris ac urens e corpore prosciberetur, alvi tamen profuvis modum excedentibus nitro in exigua dosi exhibitio, interpositisque terreis pulveribus, aut diascordio Fracast. frænum iniecerunt, reliquis etiam symptomatibus convenienter obviam iverunt.

In Januario odontalgia seu hemicrania laborabant istæ potissimum mulieres, quibus negotium mensium magis impeditum, nec nulli erant, qui ophthalmia vexarentur. Illis tinctura odontalgica Myns. & Wedelii &c. his decoctum cort. granator. &c. profuit. Occurrebant etiam quos icterus sædabat, & Martialia liquida præcipue cum salinis, aliisque juvabant.

Mense Februario, præter Variolas & morbillos, aliæ quoque maculae cum febre sub noctem ingravescente, & tussi ferina, corpora infantum occuparunt, latæ rubeæque, morbillis non admodum dissimiles in facie, minutissimæ vero & puniceæ in dorso, lumbis & pectore; nonnullæ elevatiores ad naturam Variolarum accedebant, ac pruritu & fervore molestissimæ, tandem per abscessionem epidermicis in squamulas resolvebantur. Grassabantur etiam aliæ mitiores Variolæ, a forma acuminata die Spitzblattern vocatæ, nec non quas Schaafs Blattern nominant, pustulæ sc. latiores minusque acuminatæ. Graviore ob intensiorem æstum erant rubeolæ, diaphoreticis fixis curatæ.

Fuere etiam qui difficulter admodum respirabant, & de gravedine solum quadam ventriculi conquerebantur, paratam in scorbuticis medelam inventientes, acetosa, acetosella, rad. ari, helenii &c. non in cochlearia, si maculae fervidioris intemperiei indices deformabant.

Infantes tussis convulsiva fatigabat satis frequenter, in qua pulvis antepilepticus Ludovicianus utilis.

Alii, lactentes æque ac ablactati, omni hyeme atrophia corripuntur, cum febricula circa vespem ingruente, inquietudine & siti nocturna, fame, torpore, abdomineque tumente; a ductuum lacteorum & glandularum, viscerumque glandulorum lenta ac viscida obstructione, in qua tinctura & operitiva vitriolata, arcanum duplicatum &c. profuit.

Erant etiam quidam hæmoptoici, atque inter hos pauci, qui sine noxa evaserunt, in lentam tabem & phthisin præcipue prolapsi; V. S. malum hoc cessasse compertum est, nec non largiori nitri exhibitioni.

Non paucos quoque malum hypochondriacum torquebat, solis flipatum symptomatibus, hypochondriorum distensione, ventriculi concoctione languida, rusticis acidis, vomitu, rugitibus, sputatione crebra, alvo segni, duritie, tumore in regione lienis, anxietatibus præcordialibus, cordis palpitacionibus, vertigine, pavoribus in somno, aurium tinnitu, doloribusque variis. Cura eorum in crassis humoribus attenuandis erant, per nodulos aperientes, martialia, urinosâ volatil. myrrham, crocum, mixturam simpl. tincturam vitrioli. — tart. D. L.

Illucescente Martio turmatim scabiosi occurrerunt curandi; id quod, præter externa, blandis diaphoreticis in primis fuit præstitum.

Circa idem tempus non paucos tantum non exanimabat molestissimus pruritus, præprimis senibus & cælibus gravissimus, ac inter hos hominibus siccioris constitutionis. Conducebant iis medicamenta nitrosa, & diuretica saponaria, quæ salsos & acres atomos ad vias urinarias deducunt.

Primus Aprilis dies serenus illuxit, & calore suo Veris delicias sperare iussit. Non diuturna tamen hæc felicitas fuit; nam nebulæ & pluvie a meridie primis diebus gratum solis aspectum ad breve tempus ademerunt. Qui sicuti dies, vernali tepore ad plenilunium omnia brumali aura quasi rigentia blande vegetabant. Deinde cælum varium erat, interdum serenum, interdum nebulis obductum, nimbos ac pluviam effundebat. Majus, quo alias omnia rident & est formosissimus annus, nebulis, pluviis & ventis, si paucos amœniores dies excipias, rigidus erat. In Junio iterum amœnior ac serenior aer, cujus jucunditatem etiam vergente ad finem Majo degustare licuit, comparuit; neque tamen ad finem processit sine imbribus quorum iram proximi Uratislaviæ accolæ, perruptis aggeribus, gravem, cum damno sanitatis & facultatum experti sunt. Grassabantur tum morbi plerique ab Hippocrate enumerati, ubi de vernalibus ei sermo, furores, melancholiæ, epilepsiæ, fluxiones sanguinis, anginæ, gravedines, raucedines, exanthemata varia, & articulorum dolores; febres insuper intermittentes: in ætate puerili & adolescentia sanguinis excretiones e naribus, hæmoptyses juvenibus magis familiariter evenere, quemadmodum vomitus cruenti viris & fœminis, vitæque sedentariæ deditis, hæmorrhoidales autem depletiones paulo annosioribus acciderunt; mictus quoque cruenti exempla notata. Circa loca illa corporis, quibus sanguis erumpit, ingeniosissimum D. Stahlum, Hallensium Practicum, & Professorem secuti, spasmodicas passiones, sanguinis congestionem, vasorum & pororum tensionem, atque turgescientiam, cum sensu ardoris, lancinationis & pulsationis observant, quin etiam fere ad ejus mentem, curam felici cum successu instituerunt: violentioribus vero sanguinis depauperationibus, efficacissimis remediis occurrerunt. Insolita uteri hæmorrhagia septuagenariis proximas, quæ nullo remediorum genere cohiberi potuit, in mortem præcipitavit.

Typus febrium intermittentium non unius generis erat: nonnullis paroxysmi omni die, aliis tertio quovis molesti erant, quibus quovis die duo paroxysmi erant superandi. Nec infrequentes tertianæ duplices, in quibus paroxysmo primo non responderet secundus, sed tertius, secundo quartus, tertio quintus, quarto sextus &c. ita tamen, ut non tantum tertio die, sed etiam intercalari febricitarent. Semitertiana paulo quidem rarior: at non prorsus defuere, qui omni die quidem febre corripentur, sed tertio quovis die duorum paroxysmorum impetum sustinerent. Vigebant quoque febres erraticæ, quæ incertis recurrebant diebus & horis. Ambigebatur, an in censum febrium intermittentium referri debeant etiam illæ, quæ contra communem intermittentium indolem, tragœdiam a calore satis intenso auspicabantur; nam utur ἀπυρεσία, quæ initio adesse videtur, genium intermittens redoleat, languor tamen magnus, pulsus aliqua agitatio, & cætera symptomata continuatis opinionem confirmabant. Eadem fere mens erat de illis quibus malignitas conjuncta est, & tamen remissione quadam non caret, sc. doloso intermissionis cineri primorum dierum suppositum fuisse ignem continuatum, elucet ex eo, quod sequentibus exacerbationem quidem caloris & symptomatum, non item veram remissionem observare liceat. V. S. omissa, vomitoriorum tempore intermissionis frequentior usus fuerat; nec purgantia omissa. Quoniam vero hæc febres focum habent in primis viis, incidentibus cura fuit peracta, præsertim tartaro vitriolato, arcano dupl. sale lixiv. absinth. centaur. min. card. ben. &c. quæ cum acria sint, incidunt, dissolvunt pituitam, & reluctantur acido, additiis, præprimis post aliquot febrilium paroxysmorum decursum, subinde præcipitantia; in exanthematica, antiscorbutica; in contumacioribus cortex Peruvianus; in pulvere vel electuario, cum essentia segnior sit; in vino generoso albo maceratus rarissime spem expectationemque implevit; in febribus cum inflammatione quadam conjunctis nunquam non noxius deprehensus; in febribus etiam aliis calidioribus obscure remittentibus funestus fuit, quibus non alia, quam quæ malignis debetur, ratione medendum: & eximia prudentiæ medicæ statuitur, etiam vere intermittentes, epidemice grassanti aliqua maligna febris, alexipharmacis & bezoardicis oppugnare, ne ægri in prædominantem epidemiam prolabantur.

Vehementius eodem anni tempore dentientes laborabant, ob turgescences nutrices, & ipsorum infantium humores.

Sæviebant quoque pathemata spasmodica, ac epilepsia passim pusillorum corpora hoc mense torquebat, multosque jugulabat: In symptomatica, fomitem in pituita viscida & acida habente, resolventia, incidentia, & modeste evacuantia omne ferunt punctum; in idiopathica, quo te veritas, vix apparet, specificis voto non respondentibus.

Multis negotium facessere visa est cardialgia: alii morsus, punctiones & lancinationes: alii rosiones sese percipere ajebant: nonnulli de tensivo & compressivo tantum dolore, ad utrumque latus pertingente, & cinguli alicujus instar constringente conquererantur: plurimi vero gemitibus & alte ductis suspiriis, anxietatis interpretibus, adstantium aures obtundebant. Inanes vomitus ut plurimum cardialgiæ erant comites, quos imperiti emetica indicare credebant; sæpe etiam in fœminis, passionibus hystericis obnoxii, deliquia superveniebant; singultus etiam jungebatur.

Nonnulli bubonibus infestabantur; alii tumoribus aliis; præprimis paroridibus, quæ iis, quorum vires violentia morbi fractæ erant, mortem denunciabant; profuerunt autem emollientia, discutientia, his vero non satisfaciuntibus, suppurantia.

Sydenham Opera Medica.

Frequens erat illis diebus coryza, conjuncta cum κρυθαλμία, dolore capitis, sternutatione; nec non depravata auditio, modo enim erant, qui sonum talem quod tintinnabulum pulsatum edit, sibi percipere viderentur, modo qui de sibilo quererentur; nec nulli, qualem, qui pulsationem intra aurem sentirent; pulsus autem ille exacte cum pulsu arteriæ convenit, nec aliunde, nisi ab arteria dilatata pendere verisimile est; senes nonnulli sonum fluctuum allisioni similem, vel strepitus varios in auribus suis excitari ajebant: ubi sane aer aliis fœtus corpusculis in ejusmodi sonitu non tantum organum immediatum auditus, sed & partes cerebri, in quibus filamenta nervi auditorii terminantur, concutit, ac eo ipso varios sonos excitat. Varia contumaci huic malo, & aliquando in omnimodam surditatem abeunti opposita, non semper optatum eventum consecuta fuerunt.

Raucedo etsi hyberno tempore maximopere soleat esse frequens, ac facile curetur; quia fortassis tantum ab exasperatione superficiæ glottidis a frigore aut acris falsisque humoribus induta, dependet, occurrerunt tamen aliquot etiam in Majo exempla raucedinis omnem artem eludentis.

Mense Junio aliquot anginæ exempla oblata fuere, i. e. laryngis seu pharyngis inflammationis, in juvenibus potissimum sanguineæ constitutionis, post motus corporis impetuosiores, aut nimias spirituosorum potuum ingurgitationes; horrorem ingens æstus cum siti Tantalea excipiebat, pulsus erat frequens, durus, inæqualis, urina saturatissime rubra, magna aderat respirationis difficultas, apertoque ore anxium ægri spiritum ducebant, & crescente inalo strangulationis periculum instabat; deglutitio tantopere impedita, ut potus faucium angustias vix superaret, quin sæpe in nares refunderetur; in faucium isthmo interdum apparebat tumor, interdum autem in externo collo, ubi morbus mitior est, vel oculis cernebatur; vel manibus palpabatur, in iis vero, quorum vita in majori periculo, nullus plane tumor deprehendebatur. Non tantum isthmus ita exurebatur, sed spectabatur simul in ore rubor flammeus, urgebat dolor acutus pulsatorius & punctorius, lingua tumida, obscure rubra canum instar exerebatur, fauces arebant; si ægrotantium os aperias, omnia tenfa videbantur; venæ infarctæ, oculi prominentes, & sanguine suffusi; præterea aderat jacendi difficultas, ac frequens sedendi cupiditas. Ingens præ foribus periculum, cum articuli gelido torpore rigebant, vultus livescebat, vox interceptiebatur; & stridor quasi in gutture & pectore audiebatur; inexorabilis mors instat, deficiente pulsu & voce quasi in caninam mutata, apparente etiam subinde spuma oris: Omnia vero symptomata sunt mitiora in notha angina. In vera, post venæ sectionem, leniorem purgationem, resolventia seu discutientia, & in sanguine viscidiori etiam attenuantia profuere, non neglectis lenissimis astringentibus; si vero conatus discutiendi essent irriti, & dolor pulsatorius quarto vel quinto die suppurationis admoneret, eadem fuit debite promota. Notha purgantibus mercurialibus, & blandioribus diaphoreticis, post venæ sectionem in plethoricis, feliciter intra paucos dies fuit sublata.

Occurrerunt etiam eo tempore quidam alii inflammatorii affectus, quorum sedes an in hepate, an in pleura, an in membrana pulmonum quærenda, dubium, signis vulgo traditis fallacibus; cum e contra curandi eos methodus una eademque observari tuto possit; quæ in stasi sanguinis discutienda consistit; per V. S. in plethoricis, & diaphoretica fixa, non exclusis in phlegmatico sanguineis volatilibus in dosi valde mediocri; externe vero per vini spiritum camphoratum.

Julius naturam suam plane exuerat, ac majori ex parte imbribus, procellosis aeris agitationibus ac frigore squalidus erat; benignior Augustus, non tamen absque pluviis cursum absolvit. Æstiva amœnitas vero denuo in Septembre affulsit.

Mense Julio vagabantur iidem propemodum morbi, qui præcedentibus mensibus stragem ediderant; sed præ reliquis ferociebant catharri, qui difficillime medicamentis compecebantur, ac præprimis admodum rebelles erant illi, qui sedem in artubus, & potissimum in superiori brachii parte fixerant, ac ex dolore gravativo motu partis impedito, imo etiam tumore aliquo, sine inflammationis signis, ex decubitu ferossæ materiæ oriundo cognoscebantur; Unde lympham stagnantem vel motui suo restituere, vel ex corpore, ac præcipue paribus laborantibus evacuare decuit.

Catharralis quoque prosapiæ alii morbi notati, oralgia scilicet & rumores palati; nec non diarrhœæ frequentiores comparuerunt, quas rhabarbarum tostum, c. nuce mosch. & bolus Thockavienfis ac caryophyllata compefuerunt.

Obvenere etiam quædam melancholicæ fœminæ 30. ætatis annum supergressæ, mæstæ, alta suspiria ducentes, taciturnæ, a communi hominum consortio se subtrahentes, & ad nescio quem strepitum expavescentes, ac mirabilibus suspitionum procellis jactatæ, levique causa in epilepsiam hystericam devolutæ. Cum vero dyscrasia humorum, ac impeditior eorundem motus in vena portæ, ac excretionis menstruæ mora adesset, post venæ sectionem, vomitoria, pedilavia, sanguinis attenuatio procurata fuit per volatilia, sudorifera, martialia &c.

Mense Augusto nonnulli laborabant febri, quam veteres dixerunt biliosam (quæ subinde in lypriam abit,) cum gravitate & angustia in scrobiculo cordis, conjuncta, non raro cum nausea incipiens; aderat horripilatio non nimia, sed frequenter recurrens, capitis turbatio, & sanguineo-cholericis etiam dolor. Exacerbabatur quotidie horis matutinis, subsequis vel vomitu vel sedibus; quæ si deessent, æstus gravior, fauces aridæ, & sub finem deliria comatosæ, semper fere funestum minabantur exitum; hypochondria tendebantur & acerbissimis puncturis infestabantur. Juscula tenuissima, nitrosa, theriaca, optimo cum successu adhibita; locum etiam habebant acida temperatiora, decoctum hordei &c.

Nonnulli etiam patiebantur febrem, quam synocham Scholæ Medicorum antiquæ, alii causum nominant; scilicet plethorici hæmorrhagiis vel venæ sectioni assueti, ante solis ortum horrore quodam corripiebantur, subsequente æstu valde gravi, respiratione anhelosa & suspiriosa, lipothimia ac ἐπιδρωσιν; dolores capitis lancinatorii, ac tinnitus aurium, ut & vertigines indivulsi comites erant; tensiones dorsi & artuum non minori molestia afficiebant, sitis premebat maxima, ejus defectus non semper malus, in junioribus circa diem septimum hæmorrhagia narium largior morbum solvebat, in paulo annosioribus die 14. copiosis cessabat sudoribus;

ribus; calamitosa autem horum fors, si soporosi supervenirent affectus. Eximius usus V. S. in principio hujus febris, modo illa non ortum trahat a nimis laboribus, aut quod neonuptis aliquando accidit, abusu veneris; Cæterum bezoardica & diaphoretica, analeptica & diaphoretica in usum venerunt.

Speciata insuper fuere aliæ febrium species, affodes, elodes syn-

copales.

Mense Septembri ophthalmia frequentius occurrit; cui interdum venæ sectio, purgantia fere omnibus aliquod auxilium attulerunt, diaphoretica apprimè juvarunt.

Diarrhœæ satis erant frequentes, neque tamen nisi ad medium mensis durabant, ac locum deinceps cedebant redeuntibus febribus continuus, cum doloribus capitis, nuchæ, faucium, orificii ventriculi, lassitudine ulcerosa &c. quæ bezoardicis fixis & temperatis optime curabantur.

Plurimæ fœminæ de mensium perturbatione & suppressione conquerebantur, quæ cum ab ingurgitatione ciborum insalubrium proveniat, emetica, in quibus malum nondum egerat radices, cum salutari effectu data sunt; reliquis vero lenioribus purgantibus, ac incidentibus, & aperientibus subvenendum erat.

Nec nulli erant, quos tum vexabat dysenteria; de qua prolixum discursum Excellentiss. Dn. D. Helwichii in ipso tractatu legere licet.

Initia mensis Octobris æstiva amœnitate ablandiebantur, & a novilunio ad primum Cynthiæ quadrantem demulcebat sudum, quod reliquis hujus mensis diebus, ventis, nebulis, ac pluviis sæpe obscurabatur, donec luna denuo nasceretur mense Novembri, ubi iterum benignior aeris temperies, sed ad breve tempus; nam primus lunæ aspectus ad plenilunium usque rigido frigore horrescebat, quod quidem iterum minuebatur, ac insigniter remittebat, sed ut tanto major vaporum copia ex terra humida ascenderet, ac crassiores inde nascerentur nebulæ, sæpe propter admixtiones sulphureas, tetrum spirantes odorem, ac nubes huc illuc agitæ, donec in pluviam fatiscerent. Sub exordium Decembris tempestas varia, ac inconstans erat; circa medium mensis, & anno in finem vergente intensius frigus dominabatur.

In Octobri, præter febres tertianas, etiam quartanæ occurrebant: horis pomeridianis homines melancholici temperamenti, ac segnioris naturæ, qui jam ætatis provectioris erant, adoriebantur, aut etiam febres male curatas, aut diarrhœas ab Empiricis suppressas sequebantur in cujusvis temperamenti & ætatis hominibus, ne infantibus quidem & pueris exceptis. Præter vomitoria in robustionibus, aliis vero lenissima evacuantia, aperientia in primis data; quorum usu cum impetus febris quodammodo fractus esset, correx Peruvianus (ad quem ab initio nonnulli malo consilio confugiunt) plerumque subjugavit.

Ferax quoque erat Autumnus febrium lentarum & hefticarum, quæ partim quartanis male curatis, partim hæmorrhagiis, per adstringentia interna & frigida externa cohibitis, aliisve morbis succedebant; quæ, causam earum per resolventia, mundificantia & balsamica tollendo, & excedentem corporis calorem debite temperando, exturbatis acerbis recrementis per absorbentia lenia diaphoretica, & diuretica, in primis nitrosa, nec non corpora vix ossibus hærentia commode restaurando, curatæ fuerunt.

Eodem mense Variolæ infantibus erant infestæ, quas apthæ ætatis pertinacissima comitabatur. Adultos febres continuæ cum levi rigore, æstu mitiori, dolore capitis & pleuræ, lumborum & artuum infestabant, sub finem vero in remittentes mutabantur, ac diarrhœis quasi criticis, non tamen sine omnibus torminibus, finiebantur.

Fœminis solito frequentius hæmorrhagiæ uteri erant molestæ. Longe autem communissima erant apostemata ac ulcera, quæ non tantum callosa, varicosa, & sinuosa, ac cum carie ossium conjuncta, aut quæ circa articulos erant, aut partes glandulosas, membranosas obsidebant, Chirurgis crucem figebant; sed alia benigniora in iis etiam corporibus, quæ cacochymicis humoribus non adeo turgabant, aut ex cachexia languebant, difficulter curabantur. Nam & symptomata, singulis autumnis, plura eaque graviora, curam alio tempore facilem, plerumque reddunt difficiliorem.

In Decembri tumores circa latus sinistrum (quos antiscorbutica, resolventia, & distentionem ac flacciditatem fibrarum respicientia juvant) in hypochondriacis, ac minime raro in mulieribus hystericiis spectati; molles ii & fungosi, in non paucis fere universam sinistri abdominis partem obsidebant, fere sub costis nothis incipiunt, & quando supini jacent ægri, lineam albam aut transcendunt, aut proxime attingunt, & vacuum spatium inter costas & spinam illi implent; tactu interprete non obscure constabat, quod tumefactus lien supra mesentium, intestina, ventriculi partem, ac in mulieribus supra uterum emineat. Phlegmatici & plegmatico-melancholici, inter 20. & 30. ætatis annum, catharro correpti, quotiescumque prioribus quinque diebus ex bronchiis rejectio non rite procedebat, in febrem incidebant catharratem, seu continuam periodicam quotidianam veterem; scilicet post quartam pomeridianam, horrore & frigore levi tentantur fere per horam unam, succedit calor acris, & ferme per noctem durat; lingua est albo & lento humore abducta; non urget magnopere sitis, pulsus est frequens, non adeo magnus; urinæ colorem aurantium æmulantur, ac post brevem moram parietibus vitri inducunt cutem ex albo rubentem; lassitudo artuum gravis est; torquet & anorexia ac agrypnia, cum cephalalgia gravativa, aurium susurro, ut & tussi, quæ tamen nec patientes nec Medicum terrere debent, aliquid tamen monstri alunt pleuritides & deliria; periculum autem maximum denunciant angina & apthæ, si quando cum ea complicantur. In qua medicamenta facultate resolvendi mucum, & salia diuretica commodo tempore exhibita votis ægrotorum satisfecerunt.

Nephriticæ passiones etiam, fere in sanguineis, & hæmorrhagiis antea assuetis, observatæ, siue renum inflammationes, quas non solum dolor & ardor vehemens comitatur, sed & dysuria, fibrosæ excretiones, arenosæ cum sanguine aliquo, subsequæ ordinario lithogenesi. In quo affectu in primis decoctum Forestii, & pulvis famigeratissimi nostri quondam Præsidis Volckmeri laudantur.

Nec minus podagrici dolores illo tempore satis erant communes; quibus in paroxysmo, horis matutinis, lenia diapnoica, cum nervinis, sine sudore coactis; pomeridiano aperientia, ac sub noctem pulveres nitrosi, cinnabarini &c. exhibita; externe camphorata omnibus præferri merita fuerant.

Constitutio Epidemica Uratislaviensis Anno 1700.

IN Januario frigus usque ad lunam πανσέληνον satis erat remissum, quod nec nerveas fibras spasmodice corrugare, nec glandularum subcutaneorum meatus constringere, aut poros cutis coarctare aptum; reliquis vero ejusdem mensis diebus usque ad interlunium nebulæ corporis infestæ, aerque humidus, & feri copiam accumulare hujusque inter glandulas laxiores stagnationi ansam præbere, tonumque relaxare, ac enervare potis erat.

Februario jam gratum solis jubar illustrabat, jam pluviis & nivibus exposita torporem corpora ægre declinare poterant; frigus vero per aliquot dierum intervalla quodammodo adurebat, cum luna tota nocte luceret. Usque ad medium fere Martii perpetuæ frigidi & tepidi aeris vicissitudines notabantur, quas ad finem mensis usque turbida ventis ac pluviis molesta tempestas excipiebat.

Præter morbos superiori Anno enumeratos Variolæ grassabantur, & quidem multo frequentius distinctæ quam confluentes. Primis ab invasione diebus, seu tempore ebullitionis, nunquam non febris acuta aderat; cujus exacerbationes satis incertæ, nisi quod tertio die recurrentes aliquibus tertianæ febris suspicionem moverent: præcedebant fere lassitudo & gravitas corporis, pandiculationes & oscitationes, dorsi lumborumque dolores, pulsus ad spinam dorsi, & sensus pruritus ac punctio in cute, sed horror & rigor, præsertim recurrens, rarius vulgo; frequenter vomitus a primo morbi insultu fatigabant, iique interdum immanes, aut si hi abessent, præcordiales anxietates gravissimæ cum inani vomendi conatu conjunctæ ægris negotium faceiebant, alvi fluxus rariores observati; in pluribus alvus sine damno ad aliquot dies adstricta; in paucissimis etiam utina suppressa; vix visi qui sæpe se ad reddendam utinam urgeri conquerebantur. Urina varia erat, quorundam flammea, & intense rubra, nonnullorum turbida, & opaca, qualis jumentorum esse solet, quæ post eruptionem variolarum interdum clarius reddebatur; interdum vero per aliquot dies a protrusione adhuc turbida exercebatur; aliorum autem pallida, in uno alterove cruenta; nares frequenter sanguinem stillabant. Propensio in sudorem ingens; nonnulli, præprimis qui erant temperamenti phlegmatici, dormituriabant, alii de turbulentis conquerebantur insomniis, ac sæpe expavescebant, ac altos subinde in illis tollebant clamores; capitis dolores jam gravativi, jam punctorii, cum temporum pulsationibus molesti; facies tumebat, atque maxillæ rubebant, oculi prurientes, rubentes ac splendentes, quinimo aqua suffusi; palpebræ ac nares dolore pruriginoso vexabantur; anhelitus difficultas; vox rauca, tussis sicca, cordis palpitantes & tandem etiam deliquia non raro observabantur; in aliquibus habitu corporis densiori præditis etiam saliva in majori quantitate rejiciebatur; pars magna ægrotorum corpus varie jactitabat; in genere musculoso subinde motitationes; minime etiam raro teneriores invaserunt motus convulsivi, iique vel particulares in labiis, oculi, vel magis universales, in multis deliria. Ordinatio die quarto prorumperebat, in quibusdam tardius vel citius, subruptæ pustulæ tenuissimarum acicularum puncta æquantes, sensim dein subeunte humore agebantur in altum, & evadebant fastigiata & distincta, quæ multo erant tutiores, si in basi essent rubræ, supra autem albæ, eminentes & molles, quam illæ quæ in latum exporrigebantur; mali ominis erant, quanquam non adeo frequentes, lividæ, violaceæ; certi vero lethi prænunciæ, quæ macula nigra in medio deformabantur. In quibusdam cacochymicis corporibus notatæ fuerunt in interstitiis variolarum petechiæ, aliæque maculæ, nonnunquam etiam vesiculæ aqueæ, cum funesti ut plurimum eventus prælagio. Nonnulli etiam post eruptionem nihilominus febris, difficultate spirandi, anxietate, cruciatibus insignibus circa lumbos vexabantur; atque hi non erant extra periculum constituti; evasere nihilominus plerique, modo abessent inexpugnabiles vigilæ, phrenitis, crebra deliquia, palpitantes cordis, motus convulsivi; utina nigra, vel hæmorrhagiæ enormes, alvi profluvium. In aliquibus admissio frigore, alioque incommodo regimine, retrocedebant, non sine summo discrimine vitæ. Circa octavum diem in facie intervalla pustularum prius alba rubere incipiebant, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extendebantur palpebræ, & ut vesica inflata, haud raro oculos clandeabant; proxime dein intumescabant manus, digitique distendebantur. Calamitosum, si pustulæ subito iterum conciderent. Tandem pus fundebant satis coctum, quod sensim exsiccabatur, variolæque circa diem 14. decidebant. Variolis exsiccatis, majores tumores & abscessus subinde in artubus observati, pus acerrimum plorantes, & nisi in tempore occurreretur, venas exedentes, carnes consumentes, ac ipsa ossa vitiantes, membrisque omne robur adimenes. Oniis calidioribus remediis, si motus & agitatio sanguinis jam satis magna in corporibus calidioribus deprehenderetur, ut & V. S. ac purgatione, victus refrigerans, & moderatissime calidus aer fuit commendatus; in effervescentia justo minori lenis & blanda diaphoresis cardiacis moderatis, matre perlar. coral. & diaphor. C. C. lap. bezoar. utroque, emulsionibus, ægris phlegmaticis etiam calidiora, Tinct. bez. Ess. myrrh. scordii &c. exhibita: appetente exulcerationis tempore, & pustulis non debite se attollentibus, pulveres bezoardici tantillo myrrhæ, & croci grano uno alterove remixti, suppetias tulere exoptatas: plane maturæ & pure acriori turgentibus quibusdam non male apertæ: dum exarescerent, pulveribus supra dictis lapides cancr. additi: In macularum vestigiis certo tutoque sape Neapolitanus balsamicus profuit.

Variae morborum spasmodicorum species eodem tempore, ac convulsionum non unum genus visum. In spasmo cynico topica non tantum in principio nervorum, sed & bono cum successu musculis in latere opposito applicata. Satis communis erat in fœminis hystericiis ac spleneticis illud deliquium, quo omnium sensuum ac motus exercitio privabantur & concidebant, quod vulgo audit epilepsia uterina, & curabatur methodo a Practicis præscripta. E contrario interdum corpus variis motibus concussum, sensusque maximam partem fuisse integros, notatum fuit, ita ut omnium, quæ circumstantes egerant, recordarentur, finito paroxysmo.

Erat etiam hisce diebus odontalgia non paucis molesta, quemadmodum etiam aliis anni temporibus esse solet, quando aer frigidus, tumidus, & pluviosus existit, quanquam & plurimis aliis a causis eadem alias oriebatur. Unde etiam varia opponenda sunt remedia.

In Aprili terra blando tepebat calore, quæ aliquando etiam cali.

calidis fovebatur pluviis, de cætero fere semper grato solis jubare illustrabatur.

In Majo major aeris inconstantia erat, visus post nubila phœbus, ac post phœbum fulgur, & nonnunquam tonitrua audita.

Ineunte Junio calor solis temperatus refocillabat, qui etiam in precedente mense non tamen absque intermixtis pluviis recreabat; circa finem vero turbida fuit tempestas, ac frequentes imbres.

Sub initium hujus trimestris febres petechiales quadantenus remittebant, ac in quotidianas, tertianas, aliquando etiam utut paulo rarius, quartanas degenerabant.

Passim vero tum temporis erysipelate infestabantur, præprimis sanguinei, & sanguineo cholericæ, rarius sanguineo phlegmatici, & tanto magis, si consuetæ sanguinis evacuationes ad tempus suppressæ, aut patientes terroribus, aliisve animi pathematibus concussi fuissent: Præcedit fere horripilatio, sequitur vero calor præternaturalis totius, æquabilis & fere vaporosus, cum aliqua tamen acredine & morificatione conjunctus, ac cætera adfunt, quæ alias in inflammationibus observantur, rubor, dolor, febris, aliqua partis intumescencia. Cura sine V. S. & purgatione absolvi potest, solis diaphoreticis, & externe discutientibus.

Purpura alba solito frequentius hisce diebus infantes, pueros ac feminas, & in primis puerperas cholericæ sanguineas &c. corripiebat. Ultimas quidem omni tempore post lochia suppressa invadere suevit; at vero si hæc causa absit, nec iracundia gravior, ac illa quidem fere suppressa præcesserit, aliis anni partibus non æque multis infesta est: Typus morbi sequens est: Initio quidem mediocri corripuntur horripilatione, quam excipit æstus non adeo vehemens; magis molesta est angustia præcordiorum, quam dolor capitis, qui non acutus, sed fere turbulentus existit; adest etiam faucium dolor & ardor; somnus propemodum omnis cessat, & paucae sunt quæ sub initium morbi, per unam alteramve noctem somno non interrupto fruuntur; alvus plerumque officio non satisfacit; pulsus celer est & quasi oppressus; urina cruda ineunte morbo, sub exitum satis copiosum deponit sedimentum, appropinquante die quarto, quamquam interdum etiam citius illud fiat; in artubus, collo, pectore, elewantur & extuberant. pori cutis cum robore, instar cutis anserinæ, ac sensim oriuntur numerosissimæ pustulæ magnitudinis exiguæ, pelluentes, aquea quadam humiditate gravidæ, quæ in siccioribus satis mature fere intra 24. horas exsiccantur; In humidioribus & junioribus aliquanto diutius, erosa cute, aliquid humoris extillant, non sine aliquo corporis pruritu & ardore, qui ab initio vix observabatur. Conveniunt nitrosa & salina aliquoties per diem exhibita, & præmissis mane diaphoreticis & bezoardicis fixioribus, aut etiam decoctis ex fumaria, sambuco cum sero lactis caprini paratis.

Satis etiam communis erat fluor albus uterinus in feminis quibuslibet ultra pubertatem annis, frequentius tamen paulo provectionibus ætate; cujus mali non ita facilis est cura, quippe in qua & viscerum chyli secretioni, & feri depurationi inservientium, & lymphæ ratio habenda; ut nempe abundantia feri excrementitii ac viscosi ex corpore eliminetur, materiæ fluxum hunc constituentis proventus impediatur, & uterus corroboretur, in primis per nodulos ex stomachicis, uterinis ac purgantibus, & diuterica, succinata, terebenthina &c. per diaphoretica, & lignorum decocta salivatio generosum illud remedium est, quo etiam inveterati fluxus debellari possunt &c.

Qui isto tempore in ætate puerili fuerant immunes ab exanthematibus, sub finem Veris, achoribus & tinea infestabantur; ubi optime conducunt, quæ alias in scabie profunt: non sine fundamento Nicotiana laudatur, at camphoratorum usus noxius, & tantum excitant dolorem, ac si carbonem vivi capitis impositi essent.

In Julio terra per totum mensis cursum benigno solis calore animabatur, ac simul calidis fovebatur pluviis, subinde tamen etiam tonitrua audiebantur. Per Augustum eadem gratæ inter phœbum & nubila vices durabant. Nec alia aeris in Septembri constitutio, nisi quod frigidior aura post benignum solis calorem allaberetur corpori ac aliquam ei afferret molestiam.

Hoc tempore grassabantur febres continuæ intermittentes, cum dolore hypochondrii dextri, pleuritides spuria, in infantilibus corporibus excretio miliaris notabatur. Multos cholere, diarrhœa ac dysenteria fatigabant. Multi catarrhis obnoxii debebant, ac pertinacissimis tussibus concutiebantur.

Vidimus etiam in ætate motus quosdam febriles, qui nullum typum observabant, neque statis exacerbabantur periodis. Mirabilis in istis vicissitudo est, eaque satis crebra: qui hac hora ex angustia cordis genit & trepidat, de fatigue summa conqueritur, post unius alteriusve horæ spatium, erecti animi est, & frontis exporrectæ. Propemodum autem febriles ejusmodi exandescencias experiantur homines scorbuticis maculis, modo rubicundis, modo lividis deformes. Hæc quando numerosiores in corpore comparent, fere abest ejusmodi ebullitio; sed quando pauciores adfunt præprimis in loco minus consueto, tum ejusmodi alterationes sentiuntur, præfens quoque est manifesta coloris macularum mutatio. Non carent hæc inordinatæ febres suis symptomatibus; nam & anxietates gravissimæ præcordia premunt, languor totius corporis & ossifraga omnium membrorum lassitudo invadit, ac interdum alii graves imperus ac tumultus corpus affligunt; partes autem maculis obsideri solitas dolor tensivus, gravativus, imo & rigor occupat, adest vertigo, non raro æstuantem calorem sequuntur horripilationes; pulsus fere magnus est, interdum aliquo modo inæqualis & parvus; urina fere crassa est, & statim, postquam reddita est, conturbatur, ac deponit corpora rotunda, instar arenularum & superior substantia nihilominus crassa manet, & quasi pinguedine quadam vitri parietibus adhæret; vix post sumpta cathartica, ut alias fieri solet, clarescit, sed turbida manet. Prodest excretionem macularum promoveri, aut materiam earum subigere & corrigere, cum antifebrilia sola non sufficiunt.

Vicissim eodem tempore excruciantur aliqui dolore artuum, statis horis, singulis diebus per aliquot septimanas redeuntibus, sine ullo febris signo. In cortice Peruviano inventum est remedium.

Viri quidam & mulieres fervido cælo de tormentis pruritibus, interdum ad lypothymiam usque, interdum certis tantum in partibus, præsertim ano & pudendis fuerunt conquesti. Quadam gravidæ cum aliquibus ex anthematis tortorem hunc per multas septimanas sustinuerunt, Qui non tam ab humoribus acris, quam a vermium

morfu excitatus fuisse videtur, præsertim quod remedia anthelmintica præ cæteris conduxerint, ut topica amara in vino decocta &c.

Cælo sereno & calenti frequentissime erant sternutationes, & jungebantur hæc etiam morbis tum grassantibus. Præter hydragoga, suos sudorificis hic constat honos; eximie vero præ cæteris juvant frictions & ligaturæ extremorum, ut V. S. nec non spiritus retentio.

Octobris initia benigno calore grata, reliqui autem mensis hujus dies turbidiores, & propter pluviæ ac frigus inamceniores erant. In Novembri temperatus erat aer, usque ad plenilunium; postea autem nebulosus ac pluviosus, mense ad finem vergente, inconstans ingruerat frigus, ut plurimum tamen satis remissum. Decembris inter nebulas, ventos & pluviæ transactus. Multi sub hac aeris constitutione tussi infestabantur. Regnabant etiam febres cum mordaci calore, doloribus hypochondriorum, dorsi, siti immodica, exanthematibus serosis, purpura, pleuritide, ictero, & diarrhœa, singultuque conjunctæ; & bezoardicis fixis & volatilibus, intermixtis anodynis, oppugnata fuerunt. Jungebantur etiam paralyses linguæ, & insultus apoplectici, sine evidenti periculo. Circa solstitium hybernium etiam asthma convulsivum, aliquando parotides supervenerunt.

Parturientes in autumno experiebantur dolores & spasmodicas vellicationes ac contorsiones in diversis locis, quas ex fructuum ingurgitatione ortas, suspicio fuit, iisdem autem Essent. carm. D. Mich. D. Wedel. &c. obviam ibatur.

Creber affectus erat inflatio ventriculi, interdum satis enormis, quam ructus, difficultas deglutiendi comitabantur per evacuantia, & carminantia non nimium calida facile curabilis.

Alii lienteria corripiebantur, & egregie stomachicis sublevabantur, præprimis ex mentha & absinthio paratis, nisi quod aliquando eveniebat, cum ictero, hydrope, febribus tertianis lentis eadem complicaretur. Quidam cæliaco laborabant fluxu, atque iisdem remediis sanabantur. Exemplum etiam asthmatis stomachalis offerebantur, five cruditates in status resolutæ diaphragma comprimerent, five ventriculus a contentis suis in spasmus concitatus, contiguum sibi diaphragma simul afficeret; imo unum alterumve datum fuit exemplum febris anhelosæ & astmaticæ, quam describit Sylvius l. i. prax. c. 30. Cura in eumetis, ubi circumstantiæ permittunt, vomitorio expediri potest.

Consilium Medicorum hoc tempore a Chirurgis non minus requisitum fuit, quomodo in ulceribus sinuosis inveteratis interne oris & oblongis, exterius vero callosis, rite sese gerere deberent. Hæc enim ulcera tum aliis temporibus Uratislaviæ, tum maxime in Autumno Chirurgis crucem figunt. Ubi torum in primis ductum discindere, callosam cavitatem septicis tollere, consolidationem balsamicis promovere &c. consultum fuit.

Omni quidem etiam tempore gummata Gallica observantur, maximopere tamen circa autumnum sæviunt, quæ post sanguinis depurationem, eorundem par emplastrum diachyl. c. Gum. & mercur. &c. putrefactione, per causticum apertione, unguento basilico, mundificatione, in primis curata fuerunt.

Constitutio Epidemica Uratislaviensis Anni 1701.

IN Januario variæ erant ratione frigoris vicissitudines; modo enim aer liquefcere & quodammodo diffuere, ac in ampliora spatia sese diffundere videbatur; modo autem frigore conspissatus in angustum cogeatur; finem vero mensis imponebant nebula illæ infalubritatem fomites. Februarius tum his, tum etiam nivibus, & variis ventorum mutationibus horridus erat, nonnumquam tamen quodammodo placidus & æquabilis aeris fluxus observabatur. Sub initium Martii frigidiuscula aura subito cum blandiori aere commutabatur; nec tamen mensis ad finem sine nivibus, grandine, variis ventorum tumultibus decurrebat, sic tamen, ut blandus solis calor in his aeris varietatibus nonnunquam Silesiæ incolas exhilararet.

Mense Januario febres continuæ periodicæ, variis stipatæ symptomatibus præprimis autem cardialgia, vomitu, spasmis, hypochondriacis &c. non paucis erant molestæ. Grassabatur etiam pleuritis spuria; erant quos erysipelas capitis in periculum vitæ conjiciebat. Lumbago quoque iis, qui Baccho & Venere delectabantur, molestiam creabat. Nec minus febres petechiales satis erant frequentes, quæ etiam ad domesticos incaute cum ægris conversantes, præprimis si hi essent meticulosiores, per contagium propagabantur. Tractati fuerunt hi morbi non sine felici successu, methodo superius adumbrata.

Catarrhi, tussis ferinæ &c. etiam grassatæ sunt; in quibus hoc tempore opiata minime profuerunt.

Mense Aprili admodum inclemens erat aeris constitutio, & miris ventorum, frigoris, grandinum, nebularum, nivium, pluviarum vicissitudinibus, etsi ad teporem nonnumquam inclinaret, ingrata. Nec in Majo Veris dabatur frui deliciis, sed sub turbido & nebulis obducto ac pluvio cælo major mensis pars agebatur, eoque gravior erat blandus in Junio solis calor, qui tamen & ipse pluviis & tonitru subinde turbabatur.

Hoc tempore omnis generis febres grassabantur, præprimis crucem figebat illa, quæ typum talem observabat: primo die horror satis gravis homines catarrho obnoxios & crassiori victui assuetos, aerisque injuriis crebrius expositos, aut ad tabem pronos invadebat, horrorem sequebatur calor valde inæqualis, pulsus autem fere debilis erat; æstus per horas modo pauciores septem, novem, modo plures, v. gr. 12. 14. &c. perseverabat, post quem aliquibus sudores effluebant quibus manantibus, utut febris remitteret, plane tamen non cessabat. Erant qui post calorem nondum sopitum, eodem die denuo horrore & frigore concuterentur, ac illis jam dicto die vomitus erant molesti; iis præprimis horis, quibus febris intendebatur, die secundo perseverante adhuc calore, denuo propemodum eadem hora, qua primo, miseris opprimebat alius horror, aliudque frigus, & tandem etiam calor, qui sensim angebatur, sed tamen longe adhuc aberat a ferocia ejus, qui primo die ægros exurebat, sed neque tot horis, quam illic continuabat; tertio die eadem, quæ primo, ludebatur fabula; quarta iterum secundo respondebat, verbo: semper uno die febris erat gravior & quasi composita ex tertiana & quotidiana, altero autem erat levior, typum unius quotidianæ referens. Solvebatur intra 14. aut 20. dies per diarrhœam, mutabatur etiam in tertianam duplicem, in aliquibus scabies succedebat per totum corpus diffusa. Cedunt etiam hæc febres adhibita ordinaria inethodo curandi superius adumbrata. Lenia evacuantia eximie profuerunt secundo aut

aut quarto die, imo & aliis diebus paribus, etiam repetitis vicibus exhibita. Omnia symptomata erant leviora, si illis diebus, quibus unus tantum affligit paroxysmus, sub declinationem blanda dabantur alexipharmaca. Ante paroxysmos præcipitantia cum salibus alchalinis & nitro recte etiam morbo huic opponuntur, omissa venæ sectione.

Præter has febres occurrebant etiam, quæ itidem tertio quoque die ut priores ingravescabant, sed absque rigore & horrore stata observantes tempora, nisi quod rigore *ἀπ᾽ αὐτῶν ἡ περιληψία* inordinate & erraticæ, non una cum paroxysmo invaderent. Non mali videbantur esse moris ab initio, sed procedente morbo fere in pejus ruebant, ac criticis præsertim diebus excandescabant; aderat morbus ventriculi, aliaque symptomata maligna, in his lethargus, in aliis vigilæ cum deliriis conjunctæ; impedirus erat urinæ fluxus eo tempore, quo rigeant. Satis erant contumaces, nec nullos interimebant. In cura nihil peculiare observatum, nisi quod e re fuerit, superato rigore, ad æqualem sanguinis distributionem obtinendam diaphoretica & alexipharmaca propinare.

Cæteræ febres fere omnes conjunctæ erant cum ontalgia, quæ certe & ægris & Medicis faceffit negotium. Omissis emeticis, purgantibus, & V. S. fuerunt interne exhibita, quæ alias in viscerum & meningum inflammationibus præscribi consueverunt; externe vero potissimum linimenta spirituosæ, & hæc quidem camphorata & crocata sæpius applicata: aliquod etiam in pediluvio solatium, si dolor ille, quod tum temporis observatum, solitarie absque febre affligat.

Primiparæ habitiores lautioris conditionis, imo & aliæ puerperæ partus doloribus defunctæ, hisce diebus fere omnes conquerebantur de dolore compressivo satis vehementi in dorso, quem nec mulierculæ suis remediis domesticis, nec Medici selectis etiam pharmacis depellere poterant. Acerbiores erant cruciatus earum, quæ iussulis consummatis, ut vocant, lapsas reponere vires gestiebant, præprimis si infantes essent debiliores, & in uberibus sollicitandis negligentiores. Nihil æque his profuit, quam victus tenuior, & evacuatio lactis ex mammis liberalior, evidenti certe argumento, dolorem hunc non aliunde pendere, quam ex vasorum lacteorum, ipsiusque ductus thoracici chylosam materiam pro lactis generatione advehentium repletionem ac nimia distensione.

Præcipue autem hoc tempore communes de vertigine, tinnitu aurium comitata, querelæ audiebantur. Occurrebant satis multi, quibus caput & visus objecta circumagi videbantur. Nec nulli erant, quorum oculis tenebræ, aut intra tenebras splendida quædam observabantur, & caput in turbinis modum circumduci videbatur. Hoc autem malo vexabantur, qui in otio viventes liberalius subinde se vino invitarent, aut qui antea hæmorrhagiam narium, vel fluxum hæmorrhoidalem experti his evacuationibus per tempus aliquod caruerant; aut qui alias catharsi fuerunt assueti eandemque omiserant. In cura V. S. in primis, frictions etiam, ligaturæ & pediluvia fuerunt adhibita; post V. S. purgantia, raro emetica in phlethoricis data; inter sudorifera tinctura bez. D. M. omnium minime expectationi satisfecit, ut & spirituosæ aromatica, aliaque plura. Aliquanto major virtus fuit in Succin. Spec. de hyacinth. maxima autem inter usitatiora in cinnabari nativa.

Præterea multorum infantum corpora hisce diebus motibus convulsivis concutiebantur, quorum non pauci a parentibus suis per mortem avellebantur; nec infrequens in illis erat Ramula.

Sub illud tempus, quo fraga & ribium bacca passim apponebantur, & avide, ut fit, ingerebantur, alii diarrhœa corripiebantur, alii autem cholera, præprimis si vinum in glacie refrigeratum ingurgitarent. Cholericis non tantum sursum & deorsum magno cum impetu humores biliosos egerebant, sed & ingenti siti torquebantur, & assidua corporis jecligatione fatigabantur; mens eorum percellabatur, aderant vigilæ & partium extremarum refrigerationes; quæ symptomata, nisi statim ab initio blanda data abstergentia aut levissima evacuantia ac præcipitantia, cum diaphoreticis & discutientibus, ipsa mors excipiebat.

Varii oculorum affectus tunc etiam occurrebant. Nonnulli laborabant epiphora, & tenuis humor calidus & mordax, lacrymarum specie in oculos irruerat. Ex his aliqui in febres intermittentes lapsi non modo molestiæ levamen ex febre superveniente non senserunt, sed & dolorem augeri, eo quod forte acerrimum remaneret, dissipatis humidis & aquosis particulis, crebro conquesti sunt. Alios acres & falsi humores cum rubore & palpebrarum exulceratione, gravi afficiebant tædio. Inflammationes quoque oculorum aliæ aliis erant pertinaciores. Interdum oculi erant satis squalidi, & vasa supra modum extumescabant, & tamen totum malum remediis debitis facile tollebat. Nonnunquam vero inflammatio multo minor erat, & tamen, quicquid etiam ageretur, frustra tentabatur. Erat autem hoc in casu cum ophthalmia dolor capitis diuturnus indissolubili nexu conjunctus, qui satis ostendit, in consortium mali meninges & intimas cerebri partes trahi, quod etiam subinde in aliis fieri morbis patet ex Cl. Baglivi scripto de Fibra motr. Visus autem eorum, qui ita affecti erant, in dies magis obscurabatur, nec in minimo cæcitatis securatur periculo versabantur. Id creberrima docuit experientia, alvi profluvium, sive sponte natura motum, sive pharmacis excitatum, ophthalmicis esse admodum utile.

Porro sæviebant maximopere brachiorum dolores, qui omnem remedium applicationem eludebant.

Mulieres etiam sanguinæ constitutionis, quæ paulo liberalius vinum bibunt, dolebant hypochondrium dextrum. Spirandi aderat difficultas sine tæssi, quæ in horas increbrescebat; accedebat nonnunquam febricula, quæ dolorem, modo si esset mediocris, ne ad claviculam aut ilia pertingeret, solvebat; de quo ipso dolore loqui videtur Hippocrates l. 6. aph. 40. Nihil æque profuit, quam primo quovis tempore sanguinem liberaliter ex venis in pede detrudere, id quod argumento est, aut hepar phlogosi in hoc dolore corripere, aut sanguinem in trunco venæ portæ vicinisque ramis stagnare. Difficilior est cura, si dolor hic sit conjunctus cum tussicula inani, ex hoc enim non vane colligi potest, etiam diaphragma in societatem doloris rapi, id quod fit, cum gibba hepatis pars inflammatur, utpote quæ propius diaphragma attingit. Si paulo gravior sit inflammatio, ne digitorum quidem pulsus ægrotantes ferre possunt, jactantur plurimum, lingua arida & scabra est ob ingens in sanguine incendium.

Mensis Julius erat amœnissimus, nam & gratum solis jubar exhibebat, ac tepidis aliquando pluviis terra refocillabatur. Major æstus erat in principio Augusti, & crebra audiebantur tonitrua; eoque gratiores erant, quæ sublequebantur pluvie. Etesia quoque grate spirantes nimium temperabant fervorem. Nec minus blanda & grata erat aeris constitutio in Septembri, nisi quod circa novilunium rigidior aer corporibus esset molestus.

Præter morbos æstivales in præcedenti enumeratos, scenam hoc tempore ingrediebantur dejectiones dysentericæ, quas in corporibus cacochymis, tum etiam quando symptomata remittunt, & scybala minus sunt cruenta, nec sedes adeo torminosæ, sed ad legem naturæ accedentes, nec non somnus recurrit, & denuo alimenta appetuntur, adeoque in portu ægri sunt, ex improvviso sequebatur diarrhœa, quæ corpus variis humoribus repletum deplens, nihil sinistri portendebat, sed, etiam si vires aliquo modo deiceret, firmiorem imposterum sanitatem pollicebatur; conf. Hipp. sect. 7. aph. 77.

Post propulsas ejus temporis febres, in diversis hinc inde corporis partibus, præsertim autem in volis manuum & plantis pedum, reconvalescentibus epidermis discedebat, & quasi per squamas abradebatur.

Alias iisdem diebus multi ex egenis cacochymi deformabantur porrigine, præter blandam catharsin, diaphoresin, & diuresin, juxta cum diætâ laudabili, topicis abstergentibus circumspicte adhibitis curata.

In hac ipsa æstate passim etiam audiebantur querelæ de doloribus artuum & infimi ventris: crurum dolor potissimum multis infestus erat: hunc alii tensivum, alii obtusum, alii mordicantem, alii autem pungentem & erodentem in profundo circa os experiebantur, qui in motu corporis graviter efferebatur. Alii dolorem hunc ita describebant, ut dicerent, malleolis sibi quasi crura contundi: Nec minus brachia gravissimis torquebantur doloribus, qui non secus ac a lue venerea oriundi nocturno tempore ingravescabant. Alii per intervalla luctabantur cum doloribus & lancinationibus intestinorum intolerabilibus, qui exhibitis carminantibus & anticolicis remediis magis intendebantur. His autem aliisque variarum partium cruciatibus obnoxii illi erant, qui cibis crassis, salitis, pane non bene a furfuribus purgato, cerevisia crassa, turbida, & sæculenta, aut vino nondum satis bene defæcato, vel nescio quibus mangoniis corrupto utebantur. Hic unice antiscorbutica cum rad. chinæ, salsaparillæ, & lignis exotici decocta aliquo modo ægris erant solatio; quibus ipsis etiam remediis sublecebantur ii, qui de languore, nullo etiam præsentem morbo, lassitudine totius corporis cum aliqua oris siccitate conquesti fuerunt.

Multi in teneriori ætate constituti, circa dies caniculares, etiam si nulla dysenteria aut diarrhœa essent correpti, assidua desidendi cupiditate cum torminibus quibusdam conjuncta vexabantur. Post frustra adhibita enemata, lenia evacuantia, humorem acrem demulcentia, balnea, tandem cum ab ascaridibus malum foveri suspicio esset, majori cum successu anthelmintica enematibus addita, atque per os data fuerunt.

Initia mensis Octobris blando calore grata, sed plerique sequentium dierum ventis, pluviis & variis aeris mutationibus horrida erant. In Novembri modo pluvie decidebant, modo nives; & utut aura subinde esset satis temperata, nonnunquam corpora frigore rigeant; hoc autem in Decembri erat intensius, præprimis circa plenilunium; at paulo post & intercurrentes nebulæ & pluvie solisque jubar violentiam frigoris mitigabant.

Inter varios hujus temporis morbos, non raro occurrebat gonorrhœa virulenta, quæ ab omni tempore Veneris amassos mulctat, autumnio tamen, qui exulcerationibus omnibus minus favet, inclementius sævit.

Porro inter communiores morbos erant febres, quæ nec statum tempus servabant, nec eodem modo semper invadebant, sed modo diebus singulis, diversis tamen horis, modo alternis homines opprimebant; jam diuturno, jam nocturno tempore ingravescabant; hoc die cum horrore notabili aut rigore, alio autem sine sensu frigoris paroxysmus ingruerat; hodie immanis cardialgia molesta erat, cras ventris tormina affligebant; jam hoc symptoma, jam aliud miseros magis fatigabat. In cura placuit Hippocratis consilium lib. de rat. vict. in acut. *inconstantes & erraticos morbos curare non expedit, priusquam constiterint*, seu certum typum & periodum observaverint, quod circa septimum diem hic evenire solebat; nam tum vel in tertianas vel in continuas degenerabant, & methodo convenienti curabantur.

Quartanæ quoque autumnalium morborum numerum augebant, in quarum cura plebejis quibusdam illa non male cessit temeritas, qua febricitantes subito terrore graviter percellunt, si vel sedes, ut fit, vel deinceps sudores copiosi, aut alia quædam evacuatio largior succederet. Nec methodus illa, quæ has per anodyna, præmissis lenibus evacuantibus, febres tollit, inutilis deprehensa est.

Præterea urinæ stillicidia, vel ab humorum ad renes per arterias delatorum acrimonia, aut, quod verisimilius, a renum ulcere oriunda exasperabantur. Trichiasis in quibusdam notabatur, incidentibus & purgantibus lenioribus curatæ tabidi pejus habebant. Graffabantur etiam iterum ischiatici dolores. Multi qui cælo pluvio sub dio laboraverant, aut etiam in aquis ac paludosis locis manuum opera exercuerunt, difficili respiratione & orthopnoea sine conchis vexabantur, quibus non tam expectorantia, quam evacuantia, diuretica & sudorifera conducebant. Magnus etiam inter egenos epilepticorum numerus erat. Aliquos passio iliaca horrendo modo afflixit.

Constitutio Epidemica Berolinensis Anni 1702.

Januarius biduo gelido paucis nivibus, ventoque valido turbido, 3tium remissiorem nivibus aspersis degelantem substitutis, 4tus gelu rigidum redintegravit, sed sequente 5to post gelicidium matutinum in deliquium ac pluvias frequentes nunc ubiores, nunc parciore, 19no tantum & 22do moderato gelu ut & 29no post pruina matutinam sereno exceptis, solutus toto mensis reliquo degeneravit.

Februarius 1mus frigidus præcedentibus paulo serenior, circa vespere in pluviam 2do toto durantem & 3tio serenitate aliquali interpolatam deliit. 4tus serenus ac frigidus. 5tus totus pauca intercedente serenitate pluviosus. 6tus & sequentes (11mo & 17mo mane pruinosi exceptis) ad 18vum usque verna serenitate fere & temperie æquum quatto comparet. Reliqui ad finem usque mensis varii, alii uti 19nus & 20mus ante meridiem sicci & frigidi, circa vespere pluvii

pluvii sereni uti 21mus, alii turbidi & frigidi, uti 22dus, alii uti 23ius cum frigore mane sereni, post turbidi, alii uti 24tus mane udi, a meridie sereni, alii uti 25tus post pluvias rorans mane sicci & turbidi, & alii mane nebulosi, post sereni, a meridie pluvii, ut 26tus, & 27mus succedente procella & 28vo adhuc continuante & admixta nive grandine & gelu, reddita tandem cum meridie serenitate mensem terminante.

Martius frigus cum nive continuatum primo biduo, interspersis de die serenitati nivibus interpolavit, 3tio in pluviam matutinam descendit, recuperata tamen a meridie serenitate, 4to quoque continuante ad vespertinam usque pluviam, 5tus serenus quidem sed algidus, grandines nonnunquam Favonio flante sparsit, quadridui sereni gelidi, & prunosi prodromus, 10. biduum successit, Africo tumultuante turbidum, procellosum, grandinosum ac nimbosum, 12mus serenitatem restituit matutinam nivibus a meridie comitatam atque biduum sequens gelidum & serenum induxit, moxque intercalato 15to remissiori, sereno tamen adhuc, gelu satis hactenus rigidum cælo sereno Borea aspirante, ac succedente huic post Euro, ad 23tium usque serenitate verna cum sequente biduo commendabilem reduxit, 26tum mane turbidum algidum ac ventosum cum triduo succedente turbulento, secutus pluviolis quidem sparsis a prioribus diversis, 30mus 31mo socio mane quidem pruinoso, serenitate tamen commendabili biduo mensem huc finit ac trimestre finit.

Morbi hoc trimestri præter scorbutum endemium febres intermittentes nonnullas arduas quoque & cephalæa ac hemicrania valde molestas continuas, malignas paucas, variolis ac purpura notata, catharrales & pleuriticas sporadicas, epidemici fere nulli fuere, nisi catharros & thusses hæmoptoes, quasdam & pleuritides, ut & arthritides præsertim vagas scorbuticas ob hybernas aeris varias turbas indeque nascentia sanitatis incommoda, satis frequentes iis annumerare velis.

Aprilis primus biduum frigidulum cætera serenum leni gelu cæpit ad tertium meridiem usque nubilum in pluviolas circa vespertinam solutum, cui 4tus compar, 5tus noctu pluvius, de die procellosus ac nimbosus, 6tus nivibus sereno cælo mixtis variis & inconstans successit. Huic congener 7timus, octavus nocte a nivibus facta frigidulus & potissimam partem turbidus, post noctem gelidam, nonum frigidum & serenum, post quæ nocturnas denuo nives biduum degelascens ac pluviosum induxit. Sequentes, præter 12mum sic satis serenum, vesperti tamen adhuc specade rorantem, eique similem 23ium & 24tum totum serenum omnes ad finem usque mensis genio illius conformes, varii, turbidi, frigidi, nivosi, nimbofi, quandoque & procellosi fuerunt.

Maji primus verna serenitate commendabilis, frigidulus tamen adhuc Euro noto flante, triduum sequens turbidum paucis aspersis pluviolis udum ac horridum adduxit, succedente verna amœnitare integrum mensem reliquum, paucis 11mo nimirum mane turbido a meridie specade grato 17mo vento, 23tio procella 25. pluvia vento mista 27. grandine ac imbre, ut & 31mo seu postremo paululum ventoso exceptis durante.

Iunii primus ultimo Maji compar, a biduo sereno ac temperato exceptus, 4tum obscurum in vespertinam & noctem pluviam deficientem, cum subsequente biduo sibi non absimili successorem habuit, quos biduum aliud serenum ac temperatum corripuit; successit huic 9nus totus turbidus in pluviam vespertinam desinens, quem temperatus ac siccus 11mus atque 12mus sudo æstivo insignis secutus. Huic biduum rursus obscurum ac frigidum in pluviam tandem fatiscens successit, eique quadriduum sudum ac æstivo ardore fere molestum, subsequente 19no tonitru temperatum, 20mum pluvia nocturna quandoque & diurna fecundum, triduum versus serenum ac temperatum secutum in pluviolam vesperti 23tio solutum, quod 24to imber nocturnus, tandemque, 27mum mane obscurum a meridie serenum, & 29num frigidulum sed serenum, si exceperis, reliqui vario cælo aliquando & nimbofo rarius sereno inamœni, mensi tristem addidere colophonem.

Morbos hoc trimestre epidemios præter morbillos & paucas variolas nullos aluit: Sporadici fuerunt febres varii generis, intermittentes tertianæ nonnullæ, & continuæ ardentes cephalalgia & cardialgia infestæ, catarrhales tussi & asthmate molestæ, quandoque & angina, oculorum & gutturis ac tonsillarum inflammationibus; His hæmorrhagiæ narium, hæmoptoes, arthritides universales, & vagæ quoque scorbuticæ, cachexiæ & cacoehymia passionibus hypocondriacis & hysteris, pleuritide, imo & paralyfi & apoplexia nonnunquam stipatæ accessere.

Julii dies quinque priores æstivo calore insignes, 3tius præsertim fervore æstuoso molestus; Quibus biduum successit ventosum ac subinde pluviosum, huic 8vus obscurus ac frigidulus, ut & 9nus sudo & temperato calore amœnus, 10mus post pluvias nocturnas cum septem subsequentibus sudo ac æstu genium hujus mensis exprimentibus 16to sub vespertinam, ac 18vo a meridie, 19no, mane pluvio a meridie tonitru addidit. Sequens triduum sudo pluvias miscuit, succedente quadriduo imbroso. Unde ad finem usque mensis sereni & æstivo sudo grati successere dies.

Augusti primus sudo æstuoso gravis, vesperti tonitru leve cum pluvia moderata, sequenti vero triduo post pluviam matutinam modicam temperiem amœnam substituit. Quæ triduo alio ob temperatum sudum commendabili succedente, ac octavo ante & post meridiem lene stillicidium intercalante a biduo pluvioso excepta. Cui aliud rursus biduum vere æstivum ac serenum successit, atque huic 13tius mane specade rorans, 14tus præter tonitru breve imbre comitatum cætera serenus, 15tus mane serenus, circa vesperta tonitru horrendum procellosum ac nimbosum tulit, 16tus mane serenus post fufas a meridie pluvias frigidior, 17mus serenus ac temperatus, 18vus a pluvia matutina septem subsequentes dies serenos, ac nonnunquam satis æstuosos, si 25tam excluderis mane pluviolis madentem, adduxit, 27. cæteroquin serenus pluviam vespertinam in noctem usque intempellam protraxit, 28vum frigidulum, licet serenum, 29num totum pluvium & imbrosum ac subfrigidum, 30mum pluviolis, quandoque rorantem; tandemque 31mum & postremum mensis siccum quidem & serenum, sed frigidum pariter successores habuit.

Septembris primordium 1. & 2da serena & amœna temperie acceptum circa vespertinam in tonitru horrendum & imbrem degeneravit; a 3tio ad 24tum vario, quandoque subfrigido, quandoque æstivo calore, plerumque sudo pluviis ac specade interpolato, temperato-

que æthere continuavit, 25to ventosiori paulo & pluvio biduum successit procellosum & nimbosum, atque huic aliud sedatius, sed ad vespertinam usque pluviosum; inde serenitas grata comitata temperie 31mum simulque mensem & trimestre tritium absolvit.

Morbos æstiva ætheris cum temperie cambiens subinde inremperies præcedentis æstatis frequens æstus præter endemios pene scorbutum, illique affinem veneream lue, epidemios genuit varias febres rari intermittentes, quam continuas, aliasque arduas paroxysmis interpolatas, quasdam plane inordinatas nullum typum fervantes, catharrales nonnullas, malignas quoque exanthematibus variis, miliaribus præsertim semet prodentes, pleuriticas insuper, alia cephalæa, cardialgia, colica, hæmoptoe, defluxionibus in buccam, gulam, dentes, ut & inflammationibus oculorum indeque ophthalmiis, gutturis tussibus porro variis, quibusdam etiam ex illarum numero, quas convulsivas Willisius appellat: Præterea epilepsias præsertim infantum, arthritides tam universales quam particulares, unius lateris, ischiadicæ, vagas scorbuticas satis frequentes, omnium tamen frequentissimas ob fructuum immaturorum ingluviem intemperantem, & immoderatum aliarum illecebrarum gulæ usum, choleras, diarrhæas, lienterias & dysenterias copiosissimas, easque satis vehementes; pertinaces, periculosas ac sæpe numero lethales.

October post pluviam 1mo matutinam, triduo sereno ac grata temperie amœno æstu successit, triduum nimbosum subinde grandinosum, tandem & pluviis, nivibus, pruina vacuum ac frigidum. Illi rursus quadriduum, autumnalis tempotis ratione satis temperatum ac gratum, 14tus mane ad meridiem usque nebulosus, inde serenus fuit, 15tus serenus ac temperatus a meridie paucas sparsit pluvias. A 16to ad 20mum æstivo fere calore serenum & amœnum quadriduum, a 20mo, 28vo sereno, ac temperato excepto, obscuri ac frigiduli, interspersi 23tio, 24to, 26to, utut rarius pluviis ad 31. adeoque extremum usque mensis, dies secuti mensem terminarunt.

November a siccitate ac frigore aliquali auspiciatus, ad serenitatem ac rigorem satis validum sed ephemerum tranfuit triduum obscurum, ac specade subinde udum inducens. Quod quadriduum a siccitate ac temperie ad aliqualem algorem, mox & gelu satis rigidum pergens, secutum. Cui 9nus nivem copiosam aspersit, perseverante 10mo adhuc gelu atque post densam 11mo nebulam; & subsequenter serenitatem, ad 14tum usque paulo mitiorem in persecadem a meridie fatiscentem continuante, 15tus præcedenti fere similis specade pariter udus, 16tus ad vespertinam usque siccus, postea pluviosus 17mum procellosum & nimbosum ascivit, 18vus a pluvia modica matutina in serenitatem, 19no adhuc ad vespertinam usque pluviam tranfuit succedente 20mo sereno ac temperato, in turbidum temperatum tamen adhuc nunc siccum, ut 21mo & 23tio, nunc pluviis & nivibus quibusdam, ut 22do 24to & 25to mutato cælo, succedente biduo paulo gelidior & nebuloso, aspersa tandem quoque nive, alioque rursus biduo pluvioso totæ ad vespertinam usque 29ni a pluvia inclarescentem, sicque 30mo æthere sic satis sereno & frigidulo mensem simul claudentem.

December subfrigido, verna tamen fere temperie præter morem accepto biduo orsus 3tium mane pluvium, cætera turbidum sed siccum, posteaque triduum temperatum attulit, sub vesperta 6ti nive parca aspersum, 7timus a gelu nocturno serenus triduum sibi quandantenus excepta serenitate nivibus & nubilis interpolata conforme adduxit, 11mo obscuro in pluvias deliquescenti, ac 12mo sereno post specades substituenti, biduum turbidum ac algidum successit, mox post 15tum mane pluviosum, postea triduum, a nive ac gelu moderato & æthere sereno in horridum mutatum substituit; sed 19no ac 20mo rursus post gelicidium & nivem cælo sereno remittente, 21mo magis specade rorante a serenitate aeris 22do in gelu satis rigidum abiit; rursusque 23tio post gelicidium matutinum in pluvias 24to a procella; aere turbido sicco, tamen ad vespertinam in pluvias, 25tum totum durante fatiscentem, 27mo nivem noctu diuque spargit, 28vum moderatum gelu & circa vespertinam nix pauca excepit, 29nus tota die gelu rigidus fuit, 30mus a gelu in nivem, a nive in gelicidium, de gelicidio in pluviam toto fere 31mo durantem, sicque æthere nimbofo hunc mensem simulque trimestre ultimum, adeoque annum hunc 1702. dum finientem desinit.

Morbi hoc ultimo trimestri occurrerunt satis frequentes, febres intermittentes variæ, continuæ, hæque sæpius intermittentibus sociatæ, simulque ardentes, malignæ quoque exanthematibus variis generis conspiciæ; præterea catarrhales, pleuritide nonnunquam comitatæ, erysipelatodes, aliæque diversis & periculosis nonnunquam symptomatibus, alia inter paralyfi linguæ, aliarumque partium, inflammatione gutturis, rheumatismo, cardialgia, cephalæa periodica nonnunquam; hemicrania, hæmorrhagia narium vehementi & periculosa comitatæ. Præterque uteri quoque hæmorrhagiæ graves & pertinaces solitariae aut aliis morbis sociatæ, diarrhææ, & dysenteria malignitatis nonnunquam participes excessum autumnalium reliquiarum: Colicæ & hystericae passionibus scorbuto sæpius complicatæ, tandem & epilepsia cum primis infantum, nonnunquam & adultorum hemiplegia & apoplexia vehementes & ut plurimum lethales.

Constitutio Epidemica AUGUSTANA. Ann. 1701. 1702, 1703. 1704. & 1705.

LUCÆ SCHROCKII.

Licet initium Anni 1701. frigidum comparuisse &c. &c. &c. In hisce quoque deprehensum fuisse animadverto.

Qualem anni præcedentis exitus habuit aeris constitutionem, talis per biduum etiam primum anni 1703. continuavit; & quamvis zephyrus prædominium porro obtineret, ac tolerabiliorem utunque temperiem redderet, sæpius tamen ab iis diversis ventis excipiebatur, eurusque inprimis ante solis in Aquarium ingressum, a die 18. Januarii usque ad d. 26. frigore intento molestus erat, multis subinde interea nebulis, & nive, paucioribus serenis diebus observatis, a quo dein tempore inconstans admodum aeris ventorumque, austro tamen prævalente, alternatio, usque dum sol in Piscium signo versaretur, ubi post nivofum boream zephyrus remperatorem ut plurimum & pluviosam auram redderet; quæ post æquinoctium vernale variis mutationibus, præsertim frigidis humidisque obnoxia, vernali amœnitati multum obstitit, ac tardiorum plantarum vegetationem effecit:

effecit: Quæ eo felicior postea successit, cum grata temperies fertilitatem admodum promoveret. Interea morbi, præter tussis in hyeme non insolitas, & omnibus fere aliis morbis se complicantes, multas inducias concedebant; Arthriticis tamen doloribus obnoxii novas invasiones contumacioreque patiebantur, nec non febres quotidianæ, & non intermittente calore suo, continuas sæpe in principio æmulantes, pauciores etiam tertianæ (post sumptum vel purgans, vel vomitorium, quod solum quandoque febrilem fomitem expellebat) arcano duplicato ubi biliosa impuritas, unicornu fossili ubi acidæ particula, chinachina vero dum viscidior pituita prævalebat, utraq; facile curabiles, in primis mensibus deprehendebantur; in pueris potissimum, vermium suspicionem ob visum prægressum, colorem faciei luridum, ventris morificationes, deliria nocturna &c. Sæpe præsentibus, & præter medicamenta recensita, cinnabaris nativæ, terræ signatæ, mithridatii &c. usum salutarem ideo expertis. Subinde quoque continuæ catarrhales notatæ fuerunt, majori vehementia, post horrores, magno calore circa vespæram increscente, nec non cephalalgia & virium languore periodum suam decurrentes, sed continuato blandorum diaphoreticorum & alexipharmacorum usui cedentes. Intermittentes illæ præsertim tertianæ, in æstate se in plures utriusque sexus, omniumque ætatum diffundebant; imo in autumnum usque passim se exerebant; nec deerant in diebus canicularibus, calore non admodum molestis, sed per primum decendium in primis frigidiusculis & humidis, postea serenis & calidis, circa finem autem pluviosis, quos malignæ, pustulis crystallinis stipatæ, & nisi alexipharmacis mox atque sedulo obviam ipsis iretur, lethales invaderent.

Post caniculares varia aeris temperies, zephyrique & euri alternatio, illo autem circa d. 8. Septembris prævalente, plurima pluvia & horridiuscula aura per aliquot dies infesta erant; cui fortasse dysenteria tum ingruens non male adscribenda fuerat; quanquam & metum ex turbis bellicis, quæ urbem ubique cingebant, & ultimam incolis interfectionem minitabantur, incussum, quin & cerevisiæ recenter coctæ nec satis defæcatæ potum contulisse suum symbolum, sit credibile; quibus tonum ventriculi atque intestinorum labefactari, succosque naturales visciditatem & acorem contrahere, non est dubium. Quamvis illa raro graviore insultu noceret, atque ex chyli acrioris vellicatione potius inducta videretur, cum sine pravio vel notabili calore aliisve symptomatibus, præter tormina tolerabilia & stomachi gravitatem, mox in principio cruentæ dejectiones contingerent; facile etiam, post rhabarbari tosti (quod solum quandoque curæ sufficiebat) & moderatum stypticorum, vel traumaticorum, catechu, tormentillæ &c. cum pauculo opii accessu, usum recederet: in nonnullis, ubi stomachus cruditatibus oneratus indicabatur, unicum lene vomitorium, quale vel unicum tartari emetici granum suppeditabat, opem tulisse observatum fuit. Præter hunc cruentum fluxum, postea diarrhœa quoque frequenter ingruerat, eadem fere methodo curata. In Autumno insuper morbilli frequentissimi, & solitis symptomatibus febrili nempe, quandoque ad delirium usque intensa sanguinis effervescencia, tussi, oculorum inflammatione stipati, ceterum sine magno discrimine (ita ut non pauci etiam sine decubitu, & pharmacis easdem paterentur) suum decursum intra breve tempus, octiduum ut plurimum, sub pulveris Pannonici, antimoni diaphoretici &c. usu feliciter absolverant, adultiores etiam ac juvenilem ætatem frequenter pari, sed intensiori insultu tractaverant.

Æquinoctium autumnale cum zephyro austrinam ut plurimum constitutionem adducebat, usque ad Novembris initium, ubi eurus crebrior serenos ac nebulosos dies aliquandiu interponebat; quem post medium Novembrem excipiens autem plures serenos dies quoque producebat. Tandem vero December multas nebulas & magnos zephyri impetus, cum vario aeris, nebuloso tamen potissimum ac nubuloso statu adferebat; post solstitium autem hyemale eurus horridiorem auram ac frigus intensum pariebat, sicque cum anni fine præsentiam hyemis ostendebat. Interea febres malignæ superius indicatæ in plures se diffundebant, multosque trucidabant, præcipue cum urbs diuturna quasi e longinquo obsidione cincta, vario infortunio quin & postea hostili insultu (ubi cives insueta continua per aliquot dies sub Jove frigido & humido in excubiis statione plurimum defatigabantur) atque fatali præcipue igne gravissimo premeretur, ac subsequa infelici deditione multivaria torqueretur ac enervaretur: quanta vero ab externa hac aeris & fati iniquitate sanguini labes fuerit impressa, vix opus erit pluribus exprimere: Omnes maligna febri decumbentes, atque ut pyrobolorum periculum evaderent, in tutiorem urbis partem deportati, quantum scio, perierunt; infantes etiam morbilli eandem ob causam ignis metui subducti, diuturniori postea tussi & hæcticæ discrimine salutem hanc suam redemerunt.

In Anno 1704. hyemali frigori continuando eurus multum perrexit, usque dum post solis in signum Aquarii ingressum zephyrus, pluvis crebrioribus, cum nive tamen & serenitate alternantibus, gravidus, temperatiorem auram produceret; quæ equidem temperies ita continuavit, ut vernalis constitutio deinde citius, quam pluribus aliis præcedentibus annis, compareret, atque cum aeris ac ventorum non adeo ingrata mutatione diu, usque in mensem Junium perduraret: quamvis circa solstitium æstivum pluvias frequentiores essent, major tamen serenitas, silentibus ut plurimum ventis, cum ineunte Julio redibat; quæ ipsa continuans, caniculares dies admodum calidos, grato tamen pluviarum interventu subinde mitigatos efficeret; usque dum occidente Sirio, a d. 19. Augusti ad finem usque ejusdem mensis, Solis nunquam a nubibus interrupti radii fervorem intenderent; sed cum d. 2. Septembris acrior insurgens zephyrus frigidiusculum ac pluviosum aerem per quintiduum produxisset, & succedens ipsi eurus quatrimum serenitate ornasset, zephyrus tamen mox iterum dominio potitus, frigidus ac pluviosus dies (serenis tamen quandoque intercurrentibus) reproduxit. Interea febrium punctularium malignitas (horre, virium lapsu appetitu prostrato capitisque ac dorso dolore prinio se prodens, in nonnullis anaritie oris, anxietate præcordiorum, fluxu alvi feroso, bilioso, quandoque sanguinolento, tussi &c. concurrente) magnam circa anni principium incolarum stragem dare continuavit, ut quinque primis mensibus ultra mille ducentos homines, (quos inter equidem plures quam centum & quinquaginta milites Galli fuerant) tum aliis morbis, tum hac febri potissimum demortuos numerare licuerit, cum alias per integrum annum tota urbs non videbat. Ubi quidem tantæ cladis causam non tam morbi atrociam, quam ægrotorum in prima morbi invasione ab ipsis parum æstimati negligentiam, atque ob prægressas ac indies renascen-

tes, quin majores subinde ab infensissimo inquilino hoste pertinenscenda calamitas, vitalium succorum enervationem ac depravationem accusare possum. Quæ ipsæ etiam miseriæ aliis morbis, iætero in primis, verno tempore multos invadenti, anam suppeditare, bilemque justo viscidiorum, atque ita ad obstructions excitandas pronomem reddere potuerunt; prout non minus eodem ex fonte tertianas ac quotidianas febres frequenter tum, & reliquis etiam anni partibus se exerentes profluxisse credibile est: Unde etiam haud differentibus remediis ut plurimum, & quidem facile tolli potuerunt; quæ inter arcanum duplicatum non saltem vi qua pollet incidendi & aperiendi, sed quoque correctas hac ratione biliosas impuritates in multis per alvum educendi, egregie profuisse expertus sum. Cæterum mense Junio dysenteria in scenam prodire, & usque in Octobrem observari, in Augusto in primis plures invadere cœperunt, ut non facile domus, quæ immunis ab ea foret, inveniretur; atque licet malignitate carere viderentur, plurimos tamen, minoris æque ac provectioris ætatis homines trucidarunt, ut defunctorum numeros, qui mense Junio & Julio nonnihil decrescere inceperat, in Augusto & Septembri admodum augetur, quod equidem non morbi truculentia, sed incauto in cura regimini adscribendum arbitror; cum variis domesticis, ut vocant, præter rationem propinatis remediis unice confidens incauta plebecula, vel etiam multivarie dietam negligendo, aut justo tardius Medici opem implorando, vehementer peccaverit; neque tamen negari potest, aliquot ægrotantes brevi tempore, deglutito ex. gr. cochleari spiritus vini cum pulvere nucis moschatæ, morbi primordia eluisse; ubi nempe non tam dysenteria, quam simplicior diarrhœa, a ventriculo cruditatibus labefactio, adesset; prout etiam non paucos sumpto mox rhabarbaro nonnihil tosto, vel sibi relicto, immunes esse factos scio. Quod etiam rhabarbarum in principio curæ, vel durante morbo, ubi stomachus gravari sentiretur, profuit. Radice Ipecacoanæ non fui usus, neque ejusdem vi emetica opus habui; aliquibus vero, quibus vomendi conatus erat molestus, cum convulsivi quid adesse ostenderet, præter externa calefacientia spirituosâ, idem rhabarbarum in pauca quantitate ad gr. xij. xx. cum corallii rubris, vel terra sig. &c. mixtum, felici cum successu propinavi. Reliquum curæ per absorbentia, & acridinem humorum temperantia potissimum fuit peractum; ubi præter dictam terram sigillatam, coralia, flores ferri, crystallus in primis montana egregiam opem attulit, quibus ubi nimia dejectiones molestæ erant, adstringentia ex catechu, radice tormentillæ &c. in pulvere, electuario, pilulis, tinctura, dosi non nimis larga, sed sæpius repetita, & quando dolores admodum urgebant, laudanum cydoniatum, extractum opii, vel theriacæ cælestis moderate addita, profuerunt: potum eadem radix tormentillæ, caro cydoniorum sicca, cum pauculo cinnamomo & saccharo in aqua cocta, convenientem præbuit; neque vinum Neccarinum, aut Tirolense antiquum rubrum noxam attulit, cum raro febrilis calor jungeretur. Undenam vero origo hujus mali sit deducenda, anceps hæreo. Fructum horreorum immoderatum esum multis nocuisse non dubito; cerevisiæ haud probe defæcatæ potum plurimos in hunc morbum præcipitasse, eo magis est credibile, cum non paucos jam convalescentes, vel cum malo adhuc confluentes, unico etiam hanstu cerevisiæ in recidivam lethalem incidisse, aut doloribus auctis, gangræna intestinorum obiisse noverim; contagium insuper non raro ægrotorum numerum auxisse, successiva in una eademque domo invasio suadere possit; bellicæ vix tolerabiles adversitates, cum fœtoribus ex varia militis Galli spurcitie, & excrementis equinis stramini semiputrefacto inmixtis, quorum copiam insignis equorum multitudo indies publice in plateis, nec non in ædibus cumulaverat, quid efficere valerint, neminem fugere potest; intensus ille aeris calor, spirituum & sanguinis vigorem minuendo, quantum obesse queat, in me ipso sum expertus, qui nullo in cibo potuve errore commissio, ob continuas tamen per integros dies Sirio urente, ægrotorum visitationes, & sudorum indelargiores effusiones, defatigatus, post biduanam levem diarrhœam, eundem cruentum fluxum pati coactus fui: qui licet magnopere me non affligeret, vires tamen mox adeo debilitaverat, ut diuturniori earum recollectione opus habuerim, ad roscidas nempe & balsamicas lymphæ particulas restituendas; ac lenius per vasa circulantes vitales humores ad naturalem motum reducendos, cum lymphæ depauperationem & crassitiem ex variis signis colligere licuerit, unde salinæ aciores in ea particula concentratæ per tubulos minimos intestinales segnius moveri, spiculique suis pungendo nocere potuerunt. Erant quibus inconsutæ muscarum multitudini causam adscribere placuit, quarum nempe excrementis cibis potusve contaminatus turbas hæc in corpore concitaverit, quod suis domesticis ut persuaderet curiosior aliquis paterfamilias, carnem spurcitie tali imbutam cani devorandam dederat, qui ipse mox fœdo isto morbo correptus fuerat. Neque tamen alii etiam morbi per æstatem & autumnum aberant: Ut Variolæ pueris æque ac adolescentibus magis molestas quam periculosas, adultiores etiam non paucis in exigua copia & fere sine morbi sensu invadentes, febres insuper petechiales, nec non puerorum verminosas, & cum uterinis malis lociatis M. Julio observatas taceam, M. Augusto arthritidis vaga masculinum præsertim sexum satis obstinata, multos etiam angina notha prompte, remediis cedens, excrucieverant. In adulto autem Septembri, nec non Octobris initio febres continuæ pustulosæ plurimos in adulta æque ac puerili ætate constitutos cum præcordiorum angustia, inquietudine, deliriis, angina spuria, pustulis albicantibus universam corporis peripheriam occupantibus, rarius inferiorem saltem abdominis partem occupantibus, invaserunt, in cuticulæ tandem desquamationem, prævio tædio pruritu, abeuntes. Quas (præter iæterum, martiatis remediis, acidulis præsertim & essentia Martis D. Ludovici haud ægre cedentem) tertianæ & quotidianæ irregularibus paroxysmis Medicorum excentes patientiam, exceperant; ibi alexipharmacis temperatis, hic pro diversa morbi natura, biliosam tamen intemperiem ut plurimum ostendente, arcano duplicato & cortice Peruviano officium suum egregie præstantibus.

Reliquum anni, sub moderato aeris & ventorum alternantium statu, tranquillius fuit peractum, morbis epidemicis cessantibus, ac reliquis etiam, quos sporadicos vocamus, rarius occurrentibus; cum cæli non tantum clementia, sed etiam ob hostes ex urbe profugos, totaque vicinia expulso, civium animi novo vigore animalis, morbosas dispositiones feliciter averterent.

Cum zephyrus, Anno 1705. illucescente, moderatis nivibus terram conspersisset, eurus succedens, die duodecimo frigus hyemata induxit, aeremque per biduum serenavit, mox tamen iterum nubibus textit;

quibus circa finem primi mensis denuo discutit, d. 8. Februarii; post nebulas, cum zephyro crebriores nives deciderunt; & aliis, quandoque ventis, euro noto in primis, austro, & zephyro borea interpolatus zephyrus diversas aeri temperies impressit, donec circa finem mensis eurus serenitati favens nivium liquationem successive promoveret? Quæ serenitas ad vernale usque æquinoctium continuavit rarius nebulis, & semel nive interrupta, frigore autem comitata.

Post æquinoctium variæ subinde ventorum mutationes, & frequentiores pluviae vernalem gratiam retardarunt, atque Aprilem potissimum (cujus dies decimus nonus vespere, alta, sed paulo post rursus liquata nive, sine Cereris & Pomonæ noxa, terram oneraverat,) nec non Majum valde inamœnum atque frigidiusculum reddiderant, sicque morbos corporibus humanis dispositiones, & tertianas præcipue febres procrearunt; quæ licet jam in Januario sparsim comparerent, in Martio tamen, & Aprili & Majo plures invadere cœperunt, gravi cephalalgia & præcordiorum pressione, rarius præcedaneo horrore molestæ, sed post cholagogi aut emetici usum, chinchinatis medicamentis ut plurimum non difficulter superari potuerunt; quod observare etiam licuit, cum circa finem Maji vires sumendo, plurimos in urbe, quin & vicino agro invaderent, post horrorem magno atque sæpe ad deliria usque intenso calore ægros torquentes. In Martio quoque pleuritides veræ, non admodum vehementes & exquisitæ, blandioribusque diaphoreticis & pectoralibus, sine venæ sectione, interdum etiam absque suppuratione, curabiles; circa Aprilis autem finem apoplexiæ lethales passim observatæ fuerunt. Febris porro scarlatina in Aprili, Majo & Junio in plurimos variæ ætatis, sexus & conditionis homines, quin totas etiam in familias sese diffudit, post exiguum, aut nullum horrorem sensum, faciem primo inflans & rubore suffundens, postea universam cutem maculis vel tuberculis rubris, crebrioribus, latioribus, interdum magis, quandoque minus, quam in morbillis rubentibus, interdum quoque totam cutem unica quasi macula tingens, ad duas trefve potissimum dies persistens, quin diutius quandoque & per octiduum durans, modo in squamulas abiens, modo insensibiliter discussa. Nullum equidem vidi qui periculose ex ea ægrotaret; nonnullis tamen, ob majorem sanguinis effervescentiam, diaphoreticis temperatioribus, antimonio diaphor. terra sigillata unicorru fossili &c. succurrere opus fuit; aliquibus libero se exposuisse aeri, & sine medicamentorum usu, nunquam decubuisse haud nocuit. Quo in morbo licet Clariss. Th. Sydenham in obser. med. circa morb. acut. historiam sect. 6. cap. 2. omnem medicamentorum usum intermitat, in libello tamen, qui ejus nomen præ se fert, & Processus integros in morbis curandis ab eo conscriptos exhibet, atque Londini typis prodit, medicamenta supra memoratis similia non improbari deprehenditur; cujus eo lubentius mentionem facio, cum Libellus iste in Ephemeridum nostrar. Dec. 2. Ann. 10. Appendice recusum censuram acerbiorem cujusdam Anonymi subierit, qui anno 1693. Londini eundem denuo impressum publicare voluit, nostrum ineptæ mole inutilem, nescio quo jure vocans, cum tamen idem omnino cum Anonymi specimine sit, atque juxta exemplar (cujus viginti circiter tantum Londini primo fuerunt impressa) ab Exc. D. D. Mic. Fausto, Argentoratensi, jam Medico Francofurtensi ad Mœnum dexterrimo, Acad. N. Curioso, cum ex Anglia redux Norimbergam transiret, beato nostro Præsidi, incomparabili D. Volckamer, tunc temporis in edenda prædicta appendice occupato, communicatum, ingenue recusum fuerat, ut ita quo pacto non irrepsisse, sed accessisse ephemeridibus nostris dicendus sit, Lector benevolus inde cognoscere valeat.

Mensis Junius multam ventorum omnium vicissitudinem ostendere pergens, serenitate quidem ut plurimum gaudens, crebriori tamen frigore inamœnus comparuit; elapso autem primo octiduo, constanter zephyrus, post pluviarum frequentiam, temperatiorem auram reddidit, quam ante solstitium æstivum, calores, circa finem mensis remissiores facti, insequabantur; cum interea serenos dies pluviosi sæpius interpolarent, ideoque tolerabili sæpius temperiei ac teluris fecunditati faverent; usque dum una cum Sirii ortu calores ingravescerent, & usque post ejus occasum continuarent, multaque terræ siccitatem adferrent; nisi quod sextiduum ante occasum caniculæ deciduis cum tonitru & fulgure pluvias eadem resocillarent, quas eo uberiore postea per Septembrem zephyrus adduxerat, post intensiores illos calores temperiem admodum humidam & frigore horridiusculam reddiderat, simulque catarrhis glandulosas in primis & muculosas colli exterioris partes obnoxias fecerat, temperatiori tamen aeris regimini non difficulter cedentibus.

Post æstivum æquinoctium continuante ventorum varietate, serenos dies plures usque ad Novembris initium vidimus, quos dein multa hyemis indicia sunt secuta, & juxta cum aura frigida, nubibus & nebulis aer turbidus, atque modo in pluvias, modo nives resolutus, humidam admodum constitutionem effecerat, usque dum tandem post hyemale solstitium, prævalente cæteris ventis Austro, quæ ab ea denominatur austrina temperies succederet. Interea lymphæ viscidæ & salsæ (ab humida aeris post magnos æstivos calores intemperie probabiliter coacervatæ) stagnationes non deerant; Odontalgia præcipue, sed tolerabilis; in pluribus ob conjunctam cephalalgiam magis molestæ; quin & tussis humidæ contumacioris, nec facile sine absorbentibus abigendæ feraces. A qua etiam hæctica febris, quæ nonnullis insidiabatur, & non minus medicamentis potissimum acridinem temperantibus haud difficulter cedebant, origine derivare licebat.

EPISTOLA RESPONSORIA SECUNDA

A THOMA SYDENHAM, M. D.

DE LUIS VENEREÆ HISTORIA, ET CURATIONE

AD HENRICUM PAMAN, M. D.

Doctissimo, Amicissimoque Viro

THOMÆ SYDENHAM, M. D.

Magnæ rei medicæ exortum est & lumen, & commodum, Vir Clarissime, ex consummata tua de Morbis Acutis historia, eaque sedula observatione, & fida experientia stabilita, non lucri aut

famæ aucupio scripta, sed sincera fide & mente honesta; Cum tibi amplum satis theatrum sit officium fecisse, & præsentī sæculo quovis modo profuisse. Ipse hætenus celavi penitus quod volui, at fortasse quid jam parem tibi e longinquo subolet. Qui laudat quod facis, urget ut facias quod adhuc laudetur. De morbis Acutis scribere summa difficultas est, utpote quos tam rapida volvit rota, ut nisi opportuno sistratur sufflamine, in præceps ruat vita, nullis in posterum auxiliis, nullis suppætiis redimenda. Tu singula eorum momenta notas, & quid quovis temporis articulo fieri necesse sit. Opus quidem perfectum, & absolutum, cui nihil addi poterat, nisi majus promiseris, De Morbis scilicet Chronicis. Hi inducias ferent, & tutiores examinandi, & judicandi moras.

Sæpe nobis incidit sermo de propudio illo Morbi Venerei, cujus ignominiosam originem Gentes Europæ a se invicem sedulo satagunt propellere, & ut ejus magis adhuc occultentur vestigia, ad ipsos Indos remotissimos amandant. Scortatorum audit flagellum, furiosæ, & indomitæ libidini apertissime respondens pœna, eo fortasse sine tardius remota, ut tanti constet pœnitere. Et humanitatis, & peccati simul sensu tactus videbatur, qui palam optavit impurissimam hanc luem semel tantum curari posse. Cum jam autem ad Agyras, Tonsores, & infimos quosque sciolos ejus sæpe devoluta sit curatio, illi aut fraude, aut imperitia magno eam sumptu, majori etiam molestia tamdiu differunt, & protollunt, ut vitæ plane tadeat inter carnificum tormenta, & longissimas Medicinæ moras protractæ, & fere levius sit ægrotasse, quam sanari. Jus igitur promissi, amice tamen, exigo; præmittas oro, in arrhabonem reliquorum, si quid habes hanc in rem confectum. Humaniter, & sincere explices qua methodo, quibus auxiliis hoc morbo captus se redimat quam queat minimo. Satis est ut æger sub Deo, non etiam pæsus sub Medico vapulet. Hoc gratum pluribus fiet, & ad me aequalis saltem pars gloriæ redibit, utpote cujus precibus desideratissimum hoc opus in lucem dederis.

Tibi omni officio addictissimus.

Ex Ædib. Lambeth.
12. Febr. 1679. 80.

H. PAMAN.

Ornatissimo, Eruditissimoque Viro

HENRICO PAMAN, M. D.

Divi Joannis Cantabrigiensis Socio, Academiæ Oratori Publico,
& in Collegio Greshamensi apud Londinenses in
Medicina Professore.

Quamquam eum, quem de Acutis Morbis, Vir Spectatissime, nuper edidi Tractatum, quæ est tua tam humanitas, quam animi in me propensio, ceu opus undique consummatum de prædicare digneris; usque adeo tamen tenuitatis tum meæ, tum istius opellæ mihi sum conscius, ut me nihil aliud egisse existimem, quam viam præmonstrasse, qua qui ingenio magis valent, dictorum morborum & historiam & curationem queant investigare.

Fungor vice Cois, Acutum

Reddere quæ ferrum valet, exors ipsa secandi.

Et profecto ita multiplex, incerta, & delicata, ut ita dicam, est natura, atque ita ludit in his morbis producendis, ut unus non sit hominis, utut vivacis, varia eorum phaenomena, & curationes iisdem accommodatas graphice depingere. Unum hominem dixi? quid quod vel decem quidem homines per tot sæcula sibi invicem succenturiati, atque iidem tum maxima ingenii vi, tum indefessa industria præditi, tum etiam in praxi quæ numerosas observationes suppeditaret versatissimi, perpulchre hic operam suam collocare possunt? Tantum abest, ut ad artem medicam vel pervenerim ipse, vel me putem pervenisse.

Mecum habito, & novi quam sit mihi curta supellex.

Morbos istos Chronicos quod attinet, quorum historiæ perscribendæ spem tibi feceram, ita penitus animo meo insedit ejus rei studium, ut non tam alia de causa, si bene me novi, vitam mihi prorogari exoptem, quam ut istiusmodi aliquo conamine communi hominum utilitati inserviam. At vero singuli me dies docent, quam sit arduum ceptum id, & quam periculosa plenum aleæ (mihi præ cæteris qui isto ingenii acumine atque solertia, quibus hic est opus, non satis valeo) cum apud Scriptores rei Medicæ (Divinum Hippocratem si demas, atque alios paucissimos numero) vix ulla deprehendi queant vestigia, quibus adjutus per rerum avia spinis & sentibus impedita iter faciam; cum quæ promittunt subsidia Authores & lumina ostentant, magis Ignes Fatui sint, quam veræ faces, & in salebras potius ac præcipitia sequentem agant, quam mentem fideliter & recte dirigant in genuina naturæ methodo indaganda atque invenienda, utpote quorum scripta fere omnia Hypothesibus innituntur, quas peperit lascivientis ingenii & phantasæ luxuria; ipsaque adeo morborum Phaenomena (in quibus eorundem historia vertitur) prout ab iis describuntur, ex eadem Hypotheseon officina prodeunt; quin & ipsa praxis, qua morbos aggrediuntur (quod humani generis pestis est certissima & pernicies) ad hujusmodi postulata componitur, non ad rei veritatem. Usque adeo grassantur, & regnant fere in singulis paginis cerebroforum hominum commenta, jacent interim naturæ judicia. Quibus non obstantibus, si vitam Deus atque otium concesserit, experiar fortassis aliquando quid valeant hæmeri. Impræsentiarum agnoscas in tui obsequia paratissimum, en tibi offero, ceu ejus quod molior operis specimen; Dissertationem hanc, brevem illam quidem de Lue Venerea, & quam solam adhuc prælo adornavi.

Primum autem id attingere volo; me haud paucos convenisse, qui sive præ studio honesto quidem eo, incontinentiores a peccato coercendi metu securæ pœnæ, sive ut castimoniam laudem sibi arrogarent, non dubitabant asserere Luis Venereæ curationem docendam non esse. His ego non assentior, utpote qui existimem nullum fere locum charitati atque operæ mutuae relictum iri, nisi ea quæ sibi sua ipsorum culpa improvidi accersunt mala, humaniorum officiis

farcian-

faciantur. Omnipotentis Dei est fontes castigare, nostrum vero miseris pro virili succurrere, atque agris opem ferre; non autem curiosa causarum indagatione illos acrius urgere, aut censorio vexare fastu. Tradam itaque quæ in hoc morbo observavi atque expertus sum: non quo hominum animos deteriores efficiam, sed ut corpora (quod mihi negotii datum est) reddam saniora.

* *Lues Venerea ex India primum Occidentali An. Dom. 1493.* Europam appulit; cum ante id tempus, ne quidem nominatenus, quantum scire licet, nostro orbi innotuerit. Unde etiam morbus vulgo censetur iis tractibus *Americæ Endemius*, in quos nos prius Colonias deduximus. Mihi vero potius e regione aliqua *Nigritarum Guineæ* conterminorum originem traxisse videtur; cum a plurimis nostratum, iisque fide dignis, qui *Insulas Caribæ* dictas incolunt, didicerim, nancipia recens a *Guineæ* allata, etiam antequam in terram descenderint, tum alia ibidem degentia hoc morbo tentari, nulla copula impura prægressa; ita ut non raro universam aliquam eorum familiam, viros scilicet, mulieres, liberosque male mulctet. Neque ista lues, quæ afflictissimos hosce sæpe sæpius invadit, vel hilum a *Venerea* nobis dicta, quantum ego quidem intelligo, quoad symptomata, *Dolores* scilicet, *Ulcera*, &c. habita nempe diversorum climatum ratione, videtur discipere, licet nomine prorsus abluat, cum *The Yavus* ab illis dicatur. At nec medendi methodus, qua utuntur illi, a nostra abhorret: utrobique enim *Salivatio* ex *Hydrargyro* utramque facit paginam, non obstante eo, quod hic apud nos dicitur de eximia *Gudiaci*, & *Sarsaparillæ* vi, quam in natali solo exerant, quæ ex longo ad nos itinere tantum non exhausta putatur. Probabile itaque mihi videtur, *Hispanos*, qui in Europam primi hunc morbum traduxere, eodem infectos fuisse ex contagio *Nigrorum* emptorum in *Africa*, quorum genti alicui (multi enim sunt populi *Guineæ* confines, apud quos invaluit mos ille barbarus homines Europæis mercibus permutandi) *Endemius* esse potest. Ut ut sit, contagiosa ista lues paulatim serpens, has orbis terrarum partes eo usque inquinavit, ut si ea celeritate grassaretur adhuc, qua primum invasit, intra sæcula aliquot actum esset de genere humano, vel saltem Nosocomiis decætero additum, prorsus impar esset iis rebus gerendis, quibus continetur hominum societas: nisi quod vegetabilium instar in alienum a patrio solum quasi transplantata, Europæo nostro non perinde lætatur, sed languet in dies, & mitioribus phænomenis fatiscit. Novus apud nos hospes cum esset, si quem arripuerat, mox omnem sanguinis massam contaminabat, & diris capitis atque artuum doloribus, tum etiam ulceribus variis in partibus se prodebat. At vero centum retro annis *Gonorrhæa Virulenta* specie se primum ostendebat, ostenditque adhuc, hac sibi porta exitum querens; nullo alio manifesto symptomate, nisi quod in perpaucis ulcusculum in pudendo (vulgo a *Shanker*) primum morbi est indicium; cuius virus cum per gonorrhæam non ejiciatur, sanguinis massam dicto citius pervadit inficitque.

Propagatur autem *Venerea* hæc lues vel per *generationem*, unde misellus infans ab inquinato parentum altero mala ducit stamina vitæ, vel per *contactum mollioris alicujus partis*, quo virulentia, atque inflammatio corpori insinuantur ex occasionibus hoc in loco dicendis. Primo in lactatione v. g. vel *Infans* nutricem per rariores mamillarum poros, vel *Nutrix* infantem per os tenerum inficere potest. Secundo infantes, si nudi cum inquinatis in eodem lecto dormiant. Licet enim adulti, quorum caro jam firmior ætate obduruit, vix nisi intercedente impuro coitu, quamvis simul dormiant, possint infici, infantium tamen laxior caro, & textura rarioris venenum facile excipit, quod non semel observavi infantibus a genitoribus, quibuscum dormiebant, infectis contigisse. Tertio autem, partis mollioris contactus maxime in coitu impuro fit, ac proinde eo pro cæteris modo serpit lues; cum scilicet penis spiribus generationi dicatis turgidus, a *Venereo* sive ulcere, sive etiam pustula in uteri vagina stabulante noxam de facili haurit, quorum alterutro intus latente mulier nihilominus sana videri potest; veneno nempe vel istarum partium illuvie ita detento, ut sepius invadat sanguinem, vel per menstruas purgationes diluto sæpius, & quadantenus exterminato. Contagio hæc carnosam virgæ substantiam, quantum ego judico, primum adurit, quam quidem corrumpens, eidemque primo inflammationem, mox ulcerosam *diastem* sensim inducens, efficit ut sanies, qualem in *Gonorrhæa* cernimus, in urethram lente extillet: quod ut credam, hac ratione promoveor, ipse scilicet vidi virulentam hujusmodi materiam per substantiam glandis porosam exudare, non per urethram ejectam, nullogue ulcere vel glandem occupante, vel præputium. Tandem vero altius penetrans, glandulas *Prostatas* efferato ulcere solet depascere; quod haud raro cernitur in eorum cadaveribus, quos hic morbus e medio sustulit.

Gradibus mox dicendis procedit hic morbus. Æger, (ocysus, aut serius, prout mulier, quacum consuevit, magis, minulve fuerit inquinata, pro ratione etiam temperaturæ *υιόματι* excipiendi magis animum idoneæ) primum dolore genitalium insolito cruciatur cum quadam ratione quasi testiculorum; postea, si recutitus non sit, macula primo morbillum jam erumpentem magnitudine & colore æmulans glandis partem aliquam invadit. Statim ab hujus maculæ exortu liquor quidam lente extillat, seminis instar, qui quotidie a feminis tam colore, quam consistentia recedens, flavescit tandem aliquanto dilutius ovi vitello; & in lue virulentiore intensioreque non modo virefcit, sed & aqueo humori permiscetur sanguine affatim tincto. Pustula jam dicta *ulcus* tandem fit, primo haud ab simile *Aphibis* infantium ora obsidentibus, quod in dies latius & profundius depascatur, supervenientibus orificii callo & duritie. Animadvertendum est autem quod memorata pustula raro gonorrhæam comitem habet in iis, qui aut jam pridem gonorrhæa laborarunt, aut recutiti sunt; utpote quorum glans tum ab aere, cui exposita est, tum a frequenti linteorum attritu indurefcens, noxam non ita facile suscipit. Hujusmodi Verpi igitur glandis ulcere fere non tentantur, sola *Gonorrhæa* dicto modo nascitur. Hanc alia mox symptomata excipiunt, ut primo magnus doloris sensus in pene, quoties erigitur, perinde ac si valida manu transversus fortiter constringeretur, qui noctu præcipue urget, quoties in lecto æger cæpit incallescere: quam quidem constrictionem penis dolorificam morbi hujus in hoc statu existentis signum *πασσύνειν* existimo. Incurvatur etiam veretrum a freno jam contractiore, quod cum in erectione extenditur pro natura sua, acutissimum dolorem affert. Accedit

* *Luis venerea Historia.*

etiam *ardor urinae*, qui plerumque inter mingendum vix percipitur at vero æger jam a mictu cessans per omnem urethræ ductum acriter admodum uritur, maxime qua in glandem desinit. Nonnunquam etiam erosa, atque excoziata urethra jugi puris acrioris fluxu, natura in carne nova vice jam deperditæ justo occupatio laxam quandam & spongiosam substituit; quæ mole quotidie aucta, & sensim indurata *Caruncularum* excrecentiis ita meatum urinarium infert, ut tandem lotio non detur exitus; quæ quidem carunculæ nihilominus ex ulceribus sibi adnatis ichorem quandam evomunt, & tum Medico crucem figunt inter curandum, tum ægro magis ipsa morte timendum malum. Quinimo sæpe accidit, ut sanies, quæ per gonorrhæam depellenda erat, vel a motu violentiori, vel adstringentium usu in scrotum deposita, atrocissimum dolorem, & scroti inflammationem accersat, nunc alterutro, nunc utroque ejus latere in molem ingentem elato; Gonorrhæa interim progreditur tardius, at vero urinae ardor non mitius urget. Atque hæc sunt communiora morbi hujus symptomata, manente hoc ejus statu.

At vero quoties sive morbi diuturnitate, & in dictis partibus mora, contagio sursum fertur, & sensim sanguini labem imprimit, aut materia virulenta indebito adstringentium usu in corpore reventa humores putrescunt, *vera Lues* exoritur, in qua tumores, sive *Bubones* sæpe in inguine comparentes primum ejus gradum constituunt. *Dolores* tum caput, tum artus in articularum interstitiis, humores scilicet, brachia, & talos crudeliter laniant, nullo ordine invadentes, & per intervalla, licet noctu ægrum lectuli calore perfusum rarissime destituant, nec nisi sub auroram libenter evanescant, crustulæ etiam & *porrigines* varias corporis partes deturpant. Flavescunt hæc ferme ad instar favi, quo signo a cæteris omnibus queant internosci. Quandoque superficie latiore varia occupant corporis spatia ad eum modum, quo *Lepa* in Medicorum scriptis depingitur. Quanto autem magis scabies hæc diffunditur, tanto minus æger discutiatur. Universa symptomata pedetentim incrudescunt, dolor præ reliquis, qui tandem eo usque exacerbatur, ut se nequeat miser diutius in lecto continere, sed protinus exiliens, huc illuc in cubiculo cursitet irrequietus ferme, donec illucescat. Adde quod præ doloris vehementia cranium atque ossa tibiæ brachiorumque hinc inde attolluntur in perdura tubera, *Exostoses* dictæ, excrecentiæ ossæ in equorum tibiis (vulgo a *Spavin*) haud ab similia: quæ quidem ossa tuberculis obfessa jugi dolore ac inflammatione tandem cariola redduntur & putrescunt. *Ulcera* etiam *Phagedenica* varias corporis partes depopulantur, quæ fauces ut plurimum primo agredientia, sensim per palatum in nasi cartilaginem propagantur, quam mox absument, ita ut is jam fulcro destitutus plane concidat. Crescentibus in dies ulceribus, & dolore aucto, æger partim indefinente carnificina enectus, partim ulceribus confectus & putredine, vitam trahit cruciatu, fœtore, earie, opprobrio molestissimam, & quavis morte longo intervallo miseriozem, donec tandem, pereuntibus per vices membris, lacerum cadaver, & jam superis grave, humo condatur.

Intrinsicam hujus morbi naturam, essentialem quam vocant, nisi quatenus ea existit, quæ jam depinximus, symptomatibus elucescat, non mihi magis perspectam esse arbitror, quam est essentia sive plantæ cujuslibet, sive animalis: Quicquid vero de ea sit, certo mihi constat, humorem hunc committentem inflammationis haud mediocris participationem esse, unde hæc tot malorum Ilias: constat etiam dictum humorem evacuandum esse, idque iis mediis, quorum efficaciam experientia, Medicorum magistra, suffragatur. Cum nondum inveniatur immediatum aliquod *Specificum*, cujus ope sine evacuatione prægressa lues debellari queat. Neque enim vel *Mercurius*, vel *Ligna Exsiccantia* dicta, *Specificorum* titulo sunt donanda, nisi exemplis in medium allatis probare quis possit, vel *Mercurium* absque salivatione, vel lignorum decoctum, nullo subsequente sudore, luis *Veneræ* curationem quandoque absolvisse. Utque experientia didici, sudorifica vulgaria haud minus profecisse in hoc morbo, quam lignorum decoctum, ita nullus dubito, quin si reperiri possit aliud quid, sive in regno vegetabili, sive animali, quod in excitanda salivatione pares cum *Mercurio* vires haberet, pariter etiam ad sanandam luem valeretur. Quandoquidem autem hic morbus adhuc intra gonorrhææ limites subsistens, longe ab eadem distat, cum jam omnem sanguinis massam contaminaverit, & *Veneræ* luis nomen præcise mereatur: ita etiam evacuatio, qua gonorrhææ materia ejicitur, alia prorsus est, atque illa, qua lues jam formata eliminanda est.

* *Gonorrhæam* itaque quod attinet, de qua primo agemus, in remediis *Catharticis*, quantum hucusque usu comperimus, curationis omnis cardo vertitur, quorum auxilio vel educitur humor peccans, vel procuratur diversio succorum corporis naturalium, qui aliter hosti in pabulum cederent. Quamvis autem tum ratio, tum experientia mihi dictant hunc morbum quolibet demum cathartico sæpe diuque exhibito sanatum iri, ea tamen cæteris *σπασμωδία* mihi videntur, quæ bilem, maxime vero quæ ichorem serosum fortiter e sanguine expurgant & subducunt. Ac proinde sola *Jalapæ radice* pauperibus aliquoties subveni, quorum tenuitati, & rebus domi angustis consulendum erat. Cum vero & morbus conspicuam secum trahat inflammationem, & medicamenta purgantia, quibus expugnandus is est, calida etiam sint, *Dieta refrigerans* omnino est imperanda a carceribus, quod dicitur, ad metas.

Sic itaque soleo præscribere. *℞. mass. Pilul. cochiar. maj. ℥iij. Extract. Rudii ℥j. resin. Jalap. & diagryd. an. ℥ss. cum s. q. Opobalsami f. Pil. e singulis Drachm. vj.* Quatuor ex his singulis auroris deglutienda sunt hora quarta vel quinta (ita ut æger superdormiat) ad dies 12. vel 14. vel etiam plures, donec sc. urinae ardor, & materiæ seminiformis color flavus admodum imminuantur; quæ cum pro voto successerint, satis esse autumo, si æger interjecto semper die uno, eadem repetat ad septimanas adhuc duas, quo tempore elapso, sufficit, ut bis in septimana sumantur pilulæ, donec humor ex urethra stillare solitus prorsus evanescat, quod ut plurimum non nisi post multos dies contingit. Quamvis enim vulgo affirmetur, quod ejusmodi ichor, qui ardore urinae, & flavo materiæ extillant colore disparentibus, mane præsertim, in summitate colis digitis compressi ad guttulam unam alteramve cernitur, a debilitate tantum, & a laxitate partium ob diutinam virosi fomitis in eis moramoriatur; miseri tamen experiuntur magno suo malo reliquias has esse contagii non penitus deleri; quod licet quadantenus subactum ex levissima quaque occasione (a potu scilicet nimio, aut exercitio quolibet vehementiori, aut simili alia) novas excitat tragedias, gonorrhæa postliminio

* *Gonorrhæa virulenta Cursatio.*

recru-

recrudescente, si nempe æger catharleos molestiam defugerit, nondum extirpato radicitus morbo.

Si post huiusmodi purgationem gonorrhœa nondum cedat, ex usu erit loco pilularum, maxime in iis, qui difficilior purgantur, potentius aliquod medicamentum subinde intercalare, cuiusmodi est potio sequens, quæ semel tantum hausta magis aliquando fecit ad sistendam gonorrhœam, quam leniora cathartica sæpenumero ingesta. 2℥. Tamarind. 3℥. fol. sen. 3ij. Rhei 3℥. Coq. s. q. aq. Colaturæ 3ij. dissol. Manna, & syr. Rosar. solut. an. 3j. syr. de spina Cervin. & Electuar. e succo Rosar. an. 3ij. M. s. f. potio. Vel curatione tardius procedente detur Turbith. minerale ad gr. viij. tantum bis vel ter, idque interposito debito temporis spatio, ne forte oboriatur ptyalismus, quod quidem remedium in eradicanda gonorrhœa pervicaciori facile primas fert. Vel bis in septimana pil. sequentes exhiberi poterunt. 2℥. pil. ex duobus 3℥. Mercur. dulc. 3j. cum s. q. Opobalsami f. pil. iv. sumendæ summo mane.

Est autem ubi æger a catharsi dicto modo repetita usque adeo abhorret, ut ne conspectum quidem, vel odorem solum remedium ferre queat. Est etiam ubi corpus ex ιδιουσυνκρᾶσις quadam pertinaciter purgantibus refragatur, ut debita peccantis humoris quantitas nequeat educi; atque ita dum impensius in hoc laboratur nullo cum fructu, lues tandem obrepit, quæ eos sæpissime ægros adoritur, quorum corpora cathartica fortius obsistunt: cum ita se res habeat, Enematis agendum est, quibus injectis utrique indicationi, humoris scilicet tum expurgandi, tum ab affecta parte derivandi satis fieri potest. Quin etiam hæc methodus expeditior est nonnumquam præmemorata ista, at non æque tuta, me iudice, cum prior illa licet diuturnitate molestior, minus tamen habeat periculi, ne qua contagiosi fomitis particula in visceribus hæreat, novos datura tumultus. Hoc vero incommodum facillime evitatur, sic cathartica per os assumpta diebus ab usu clysterum liberis, mutuam iis operam commodent.

Hac itaque via incedo, Pilulas jam prædictas, aut alias ejusmodi duabus tribusve auroris continuis exhibendas curo; postea Enema sequens mane, & hora quinta pomeridiana quotidie injiciendum, donec penitus cessaverint symptomata; nisi quod semel aut bis in hebdomade cathartici impero, misso die isto clystere. 2℥. Electu. e succo Rosar. 3vj. Terebintb. Venet. vitello ovi solut. 3℥. dissolvantur in aq. Hordei 1℔j. Colaturæ adde El. Diacatbol. 3ij. m. f. Enema. Singulis etiam noctibus Opobalsami vel Balsami e Mecha gut. xxv. sacchari frustulo exceptas concedo, sub lecti ingressu, quod quidem medicamentum, cum Terebintbina quoddam genus sit liquidum ac purum, iisdem quibus illa facultatibus pollet, & ulcerosæ genitalium diathesi apprimè succurrit; hujus itaque defectu Terebintbina Cypria ad quantitatem avellanæ dictis temporibus devoranda substitui possit.

Procedente curatione, quacumque ea demum methodo tentetur, ægro cibis omnibus sale conditis, vel alias dyspeptis (quales sunt carnes bovinæ, porcine, pisces, caseus, radices, olera) & fructibus horariis quibuscumque interdico, quibus substituo carnem vervecinam, vitulinam, pullorum, cuniculorum, & cætera εὐπεπτα. Volo etiam ut vel his parcissime utatur, tantum ut ægri vires non labascant. Potus, vino in genere abdicato, ut & liquore omni si ve spirituoso, si ve aclescente, Hydrogala esto, ex tribus aquæ coctæ partibus & lactis una, nisi quod in prandio & cœnacerevisia tenuis in parva quantitate possit indulgeri. Ad contemperandam insuper inflammationem, & mitigandum ardorem urinæ, refrigerantem aliquam Emulsionem ad sequentis normam compono, in purgationum interstitio frequenter potandam. 2℥. Sem. Melon. & Pepon. an. 3℥. sem. Papav. albi 3ij. Amygdal. dul. excoctat. n. viij. contund. simul in mortario marmoreo, sensim affundendo aq. Hord. 1℔j. Colaturæ adde sacchari Crystallini q. s. m. f. s. a. Emulsio.

In temperamento admodum sanguineo, & affectu pertinaciori, post mensem catharsi datum, aut circiter, ut plurimum sanguinis Uncias octo vel novem e brachio dextro detrahendas suadeo, ut maturius celebretur venæ sectio auctor non sum, ne hac προφασει contagium penitus inferatur. Injections in urethram non magni facio, utpote quæ si ve acrimonia sua mordaci, si ve stipticitate non raro magis officere soleant, quam prodesse; verumtamen sub morbi exitu Aqua Rosacea in pauca quantitate potest injici.

Hac methodo, quæ mihi semper pro voto cessit in gonorrhœa sananda, meliorem nondum comperi; maxime in iis qui facile purgantur. In iis enim qui purgantur ægrius, curatio, licet nunquam falax, tamen non nisi post longum temporis spatium perficitur. In his itaque sanguis iterum mittendus, & acuenda sunt cathartica, tum etiam repetenda sæpius, atque in eorum usu diutius est perseverandum, aut clysteres modo jam signato usurpandi. Etenim Catharsis hic ad instar omnium est. Atque in hoc affectu, si in alio quopiam, vere asseritur, quod qui mundificat bene, bene sanat: modo ab Aquis Mineralibus sibi temperet, quas certo mihi constat morbi reliquias e corpore eliminandas vi astringente & plus satis sanativa arctius constringere, & quasi clavo figere trabali; unde quod sæpius observavi, Scroti tumores enascebantur quoties in morbi principio, vel statu, pejoraque adhuc symptomata ut Caruncule, si quando sub ejus exitu potarentur. Quod quidem ego sidenter assero, quantumlibet ex more hodie recepto aquæ minerales in dicto casu haud raro præscribantur.

Neque sum nescius, quantum se venditent Præticorum nonnulli in hujus symptomatis curatione, qua brevioris temporis spatio, qua remediis magni nominis & tituli absolvenda; interim observatione plus satis frequenti certo deprehendi, materiam, quæ eliminanda fuit, astringentium vi in corpore detentam maximum ægris dedisse malum, ex quo persæpe sanguinis massam de novo subiens ipsam demum luem parit. Nec majore cum fructu, licet periculo minore decoctum Lignorum exsiccantium usurpatum comperi; quo scilicet, sub prætextu Specificorum, tum universum ægri corpus, tum præ cæteris affecta pars jam pridem nimis incalescentia ulterius adhuc inflammabatur; nonnumquam etiam Gonorrhœa quæ paulo ante evanuerat, quod me observasse memini, denuo in conspectum prodit.

Animadvertendum est autem, quod si ægri glans præputio undequaque contegatur, atque ejusdem ora præ inflammatione usque adeo tumida, dura, ac callosa reddatur, ut nullo modo queat reduci; laterem lavat quisque gonorrhœam remediis purgantibus, fortissimis licet, & quotidie ad nauseam repetitis, aggreditur, nisi

eodem tempore id agatur, ut pars ita affecta ad statum sibi naturalem redeat, sublatis & duritie & tumore, unde gonorrhœa novus utique fomes subministratur. Quod quidem ego admolior Fotu sequente. 2℥. Rad. Althææ, & liliorum an. 3℥. fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamemel. & Melilot. an. M. j. sem. lini & Fœnugræci an. 3℥. Coq. s. q. aq. font. ut f. Fotus, parti affectæ admoveendus per horæ unius spatium bis vel ter in die. Peracta fomentatione partem affectam Oleo e semine lini recenter extracto perungendam curo, deinde Emplastrum e Mucilaginis alutæ agnæ inductum labiis præputii tumidis circumponendum. Quod si Ulcus vel in ipsius præputii labiis, vel in subjecta glande hærens sua callositate facit, ut illud non nisi ægre possit retrahi, præter fotum jam dictum sequens etiam Linimentum præscribo. 2℥. Unguent. Basilici 3vi. e Nicotiana 3ij. Præcipitat. ac. acq. Ros. lor. & optime lævigat. 3℥. m. f. Linimentum, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post Fotus præscripti usum.

Ubi vero si ve quod justo maturius gonorrhœa sistatur, si ve ab exercitio vehementiori, aut alia quacumque de causa, scrotum jam morbi sedes ab eadem in tumorem insigniorem attollitur, prædictum Fotum bis in die parti affectæ admoveo, modo non imminuantur & dolor & tumor Cataplasmate vulgo noto ex Oxycrato & farina Fabarum. Hæc dum foras peraguntur, non desino remediis & cathartica, & refrigerantibus, quæ modo præscripsimus, intro sumptis, tum e iam diætâ supra dictâ hostem urgere; neque mihi religio est quovis hujusce mali tempore sanguinis 3ix. vel x. e brachio isto detrahere quod testiculo tumefacto respondet, si tumoris magnitudo & vehementia doloris id mihi suadeant. Atque hæc hætenus de Gonorrhœa.

* Cum vero eo usque invaluerit morbus, ut jam Venerea Lues, vel Lues confirmata præcise dici inereatur, alia omnino porta querenda est, & duriori huic nodo cuneus itidem durior est adhibendus: quandoquidem nullum adhuc experimentum, quod sciam, adferri possit extirpati hujusce morbi, nisi per Salivationem ab Hydrargyro excitatam: quicquid tam doctorum nonnulli, quam indoctorum de aliis sanandi modis satis temere & audacter effutiverint. Cum itaque Salivatio omnem hic numerum absolvat, id tantum mihi incumbit, ut quæ in ea excitanda, tum etiam regenda, & ratio (qualis qualis ea demum fuerit) & observatio rationi suffragata mihi dictaverint, edisseram.

In principio autem ne conjectura quidem assequi possum, quid sibi velint crebra ista monita, quibus de corpore remediis Cathartica & Digerentibus, balneo puta & cæteris id genus, rite præparando, ita serio cavetur; Ut de venæ sectione jam taceam, cui nonnulli hic loci primas deferunt. Cum enim, si veritati sit litandum, eo res redigatur, ut Veneno salivatio procuranda sit, (neque enim adhuc innotescit salubre aliquod medicamentum, quo possit excludi, neque æger sine ejus ope in tuto collocari potest) queritur utrum corpori constantibus adhuc viribus, vegeto & valenti, ac proinde frangendis inimicis conatibus haud impari; an eidem missione sanguinis & tenui diætâ jam debilitato rectius committatur venenum. Haud dubie satius esse duxerit æquus rerum æstimator nihil agere, quam ita importune satagendo nocere. Quid quod experientia testatur, nullis evacuationibus, aut alio modo infirmatos salivationis impetum multo melius sustinere, quam eos, quorum quasi ante prælium incisi sunt nervi?

Misso itaque damno omni huiusmodi præludio, statim atque accersor, Unguentum præscribo ex Axungie Porcinæ 3ij. & Mercurii crudi 3i. Neque oleum aliquod e calidioribus, neque aliud quid admisceo: cum deterius fiat unguentum, si quod adjecta ista frænâ injiciant, & nihilo efficacius, si nihil prorsus agant: Et fortasse additamenta ejusmodi sub nomine Correctivorum, idem hic præstant (si quid tamen præstant) quod Cathartica adjuncta judice experientia, solent præstare; tormina nempe excitant, & catharsim reddunt laboriosiore, a lucta scilicet inter antidotum & catharticum, cujus vis omnis purgans in eo posita est quod naturæ hominis inimicetur. Verum ut tertia parte dicti Unguenti brachia, crura, & tibiae ad tres noctes continuas (primam qua accersor includendo) manibus suis æger perungat injungo; ita tamen, ut neque axillas, neque inguina attingat uspiam, & abdomen pannone laneo tenuiore circumposito & posterius confuto, a linimenti contactu diligenter muniat. Post tertiam inunctionem gingivæ ut plurimum intumescunt, & Ptyalismus suboritur. Si vero intra tres dies post ultimam inunctionem idem haud procedat, tum gr. viij. Turbith. Mineral. in Conserv. ros. rubr. exhibeantur ægro; qui post singulas vomitiones aut sedesumat haustum liquoris possertici calide. Cum expuere inceperit, id jam medico negotii tantum est, ut gradum salivationis scrupulose expendat, ne invocatis tenere suppetiis, salivationem eo usque evehar, ut æger de vita periclitetur. Ubi jam ptyalismus statum debitum fuerit adeptus (in quo expuuntur ut plurimum libræ quatuor spatio nycthemeri) vel symptomata, etiam si parcius expuat æger, evanuerint (quod plerumque contingit post quartam diem a statu salivationis) & indusium & tori lintea aliis, quæ a quo ultimo lavabantur, usurpata aliquandiu fuere, sunt permutanda: cum priora ista unguento infecta salivationem & magis quam erat opus intendere, & longius protrahere, quam ægro expediat, apta nata sint. Quod si forte prius elanguescat salivatio quam symptomata penitus disparuerint, extimulanda subinde est Mercurio dulci ad 3j. pro dosi exhibitio.

Nonnumquam accidit, præsertim in corporibus εὐμεταβλητοῖς, quod post unam vel alteram inunctionem (nempe simul achydrargyro sanguis affici inceperit) natura illico per intestina hunc hostem expellere satagat, unde non solum dejectiones mucosæ & tormina ventris, ut in iis qui dysenteria laborant, eveniunt, verum etiam curatio morbi impeditur, utpote qui salivationi tantummodo cedere soleat. In hoc casu a Mercurio si ve extra applicito, si ve intra assumpto, prorsus abstinendum, donec hæc symptomata penitus evanuerint; atque porro dictus alvi fluxus (qui plerumque accidit, antequam salivatio bene assurgat) sistendus est usu laudani liquidi, ita dosin augendo atque repetendo prout urget symptoma; aut Disacordii sesquidrachma, aliquoties, prout opus fuerit, devorata. Diarrhœa tandem cohibita, salivatio debito modo procedere solet, quæ antea vix appareret.

Convalescente de cæteris ægro, nisi quod os adhuc exulceretur

(qui

* Lues confirmata Curatio.

(qui genuinus est ptyalismus fructus) salivatio quæ jam indies imminuitur, nec purgatione, nec alio modo quocunque sistenda est: fieri enim potest ut etiam post consopitum dolorem, atque exsiccata ulcera aliquid de morbi fomite adhuc in corpore delitescat; bella denuo moturum, nisi sibi permittatur putatio illa moderata, quæ postquam redintegrata sanitate homo se auræ liberiori aliquandiu exposuerit, desitura est. Periculosum itaque esse arbitror ptyalismum jam abiturientis & mox evanituri reliquias *Catharsi* deducere, vel *Lignorum decocto* exsiccare velle; a qua praxi, quæ vulgo obtinet specie vel Mercurii e corpore eliminandi, vel corrigendæ ejus malignitatis, nascuntur sine dubio frequentes istæ *Recidivæ*, quæ miseris accidunt, sanitatem tandem aliquando post tantum impensarum, tot exantlatos labores, tantum tædii devoratum anhelantibus, ad quam etiam certo pervenissent, si salivatio non nisi suo tempore determinaretur. Longe itaque consultius esset, ptyalismum promovere *Mercurio dulci* semel in hebdomade exhibito, etiam postquam omnino convaluerit, & jam sub dio versetur (quod & ego per menses aliquot fieri aliquando jussi) quam eundem præmaturnius inhibere.

Quantumlibet autem a catharsi in salivationis declinatione ob jam dictas causas abhorream, fieri tamen potest ut in ejusdem statu ea nec prætermitti possit, nec debeat, quoties scilicet re male gesta eoque fuerit evecta salivatio, ut jam ægri vitæ metuatur: quo in casu non tutum modo est, sed & necessarium etiam cathartico ingesto ptyalismum ad eum gradum deprimeret, ut cum ægri *Uropia* procedat, qui deinde suo juri relinquendus.

Si quis jam quærat, an nuda salivatione contenti esse debeamus, nec cathartici, nec aliis remediis solemnibus in usum, post eam peractam, revocatis? Respondeo, præter jam dicta, quibus & ratio adslipulatur, & experientia, me velle doceri, quam ob causam magis sit necessarium purgare post salivationem, quam salivationem excitare post catharsin, cum remedia purgantia (*Scammoniata* maxime & id genus acria) malignitatis quidpiam in corpore relinquunt, quod naturæ tamen committimus, cujus vi tandem subjungatur istud, quicquid est veneni, eo scilicet, qui purgatus, fuit, ad regimen consuetum, exercitium, & liberiores aeris usum se recipiente. Atque id porro libenter scire velim, qua demum arte freti Mercurii reliquias per catharsin expellere conamur, cum genuinam illam ac prope unicam methodum (per salivationem scilicet) qua natura id efficere solet ac debet, non solum negligamus, sed etiam impediamus? Hujusmodi autem hallucinationes minimis istis rationis scintillis imputandæ sunt, quibus nos miseri mortales tantum præditi, ad veritatem in profundo demersam non penetrantes, quamlibet ejus umbram & speciem amplectimur, pro Junone, quod ajunt, captantes nubem; mox colloquia miscentes, præjudicia male fundata ita penitus nobis invicem infigamus, ut tandem phantasmata nostra & delirantium insomnia pro principiis Apodicticis haberi velimus; cujus specimen, ni fallor, præ manibus nobis est.

Quamvis autem in plerisque curatio modo jam dicto absolvatur, viz. *Inunctione* per tres noctes continuas, & exhibito *Turbith. Minerali*, ptyalismo haud rite procedente, *Mercurio* item *dulci* ad vices aliquot, eodem jussu citius satisciente; serio tamen animadvertendum est, in quibusdam reperiri idiosyncrasiam sive temperamentum quoddam peculiare, tam salivationis respectu, quam purgationis (atque eadem plerumque in iisdem, ut qui ægre etiam ad ptyalismum perducuntur) ita ut in nonnullis methodus laudata vix gingivarum exulcerationem queat efficere, multo minus salivationem eam procurare, quæ malo eradicando par sit. In hujusmodi ægris Medico summopere cavendum est, ne animo nimium obstinato salivationem importunius urgeat, recalcitrante natura; atque ab isto evacuationis genere prorsus abhorrente; quod qui minus intellexere, ægros haud paucos letho dederunt: Etenim in corporibus ita factis, quotiescumque medicamenta, sive externa illa fuerint, sive interna, pertinaciter ingeminaveris, loco salivationis perfectæ nil præter ventris tormina, & dejectiones dysentericas obtinebis, natura per hanc portam hydrargyri vires amoliente; vel dolores ventriculi & ægri tudines, sudores frigidos, horrendaque alia symptomata accerses, ita ut æger tantum non agat animam, forte etiam mox eam evomat. In his licet Medico concedi possit, ut postquam ad dies quatuor vel quinque a postrema inunctione salivationem frustra præstolatus fuerit, inunctionem jam sæpe dictam, & *Turbith. Minerale* denuo repetat (interjectis inter singulas inunctionum vices diebus aliquot) religiose tamen cavere debet, ne cum tanto conamine salivationem incassum sollicitaverit, eam per vim invitæ naturæ extorquere pergat. Hic itaque modus, quantum ego judicio valeo, Medico tenendus est, ut ubi primum vel ægri tudo ventriculi, vel ventris tormina succedant, statim sibi temperet a remediis adhibendis donec ea penitus evanuerint symptomata; pluribus enim & fortioribus remediis ad cogendum *πύσιν* salivationem accumulatis, *Dysenteria* certo certius tormina ventris, & ventriculi ægri tudinem mors excipiet. Cum ex adverso si leniter festinet, & moras trahat, *Mercurii dulcis* \mathfrak{Hj} . semel aut bis in septimana exhibendo, vel per se, vel cum \mathfrak{Zj} . *Discoordinii*, si æger in diarrhæam propensior sit, tandem aliquando cum bonis ægri rebus optata potietur arena. Quantumvis enim ptyalismus ad plenum nunquam assurgat, æger tamen copiosius quam pro more solito expuet; & fetor justæ salivationis comes neque immunitiorem hanc destituet; unde evincitur sanguinem & humores eam sive putrefactionem sive alterationem, quæcumque ea demum sit, attigisse, quæ vel parit salivationem, vel cum ea nascitur. Atque hac methodo universa hujus morbi symptomata tandem expugnabis, concessio utique debito temporis spatio.

Observandum est autem, quod licet salivatio remedia alia, quæliacumque ea fuerint, in extirpanda *Lue confirmata* longe exuperet, *Gonorrhæam* tamen cum lue concurrentem neutiquam valet sanare; nec sistetur illa, hac jam penitus devicta; unde recte colligitur nullam vim specificam mercurio inesse, qua Venerea lues immediate debellari possit; quamlibet *Specificum mediatum* forte dici mereatur, in quantum mediante ptyalismo morbum expellat, pari ferme *καταχρησας* (quod alias subinnui) atque scalpellum chirurgicum laterali morbo specificum queat appellari. Sed ut ad rem redeam. Quoties *Lues* & *Gonorrhæa* una stabulantur, vel ante salivationem, vel ea jam peracta, *Gonorrhææ* curatio tentanda est, quod & rutilius fit, me iudice; & facilius etiam post finitam salivationem, cum luem habens comitem gonorrhæa ægrius dometur;

quæ vero a prægressa salivatione quadamtenus subacta fuit, minori negotio expugnari solet. At vero cathartici religiose abstinentum est quousque vel minimæ salivationis reliquæ supersint; Quamobrem *Turbith. Minerali* semel aut bis in hebdomade exhibito securius rem commitemus, quam aliis purgantibus quibuslibet, cujus vi promovebitur aliquantulum ptyalismus, dum interim materia gonorrhæam committens paulatim excernatur.

Porro observandum est, si tumor ossi alicui, *Exstosis* vulgo dictus, infideat, qui etiam tandiu permanferit, ut os jam carie afficiatur, incassum prorsus erit sive salivatione sive alia aliqua methodo curationem aggredi, nisi etiam huic morbo obviam eatur; ac proinde os ope *Cauterici* denudandum, & quamprimum idem, quod ajunt, *exfoliandum*, usu scilicet remedium quæ intentionem hanc implere solent.

In *Ore exulcerato*, quod salivationem passis ita familiare, si vel æger dolori ferendo par non sit, vel eo usque illud exorietur ut sanguine diffuset, idem nocte dieque vel *aqua Rosarum Damascenarum*, vel *lacte aqua permisto*, vel *hordei radic. Althææ*, & *semin. Cydoniorum decocto* sæpissime proluendum est. Unicum hoc symptoma memorabile, quod scio, salivationi accidit, saltem quoties ea more debito administratur; & sane si dolor & *oris exulceratio* arte aliqua protelari potuerit, haud multo esset molestior morbi hujus curatio, quam est aliorum aliquot longe minus famigeratorum.

Dietam quod spectat & reliquum ægri regimen, eadem prorsus in *Salivatione*, saltem donec ad finem jam fere vergat, ac in *Catharsi* imperanda cenfeo: Cumque ei qui medicamentum aliquod purgans assumpsit, id tantum incumbat, ut se in cubiculo a vi frigoris defendat, & cibis *ἀπέντροις* moderate vescatur nondum mihi constat, quò nomine vel lecto semper addicatur, qui ptyalismum subit, vel a victu modico arceatur, qui scilicet naturæ cum veneno conficiant vires animæque addat; unde etiam natura tanto oneri succumbente, haud pauci, spiritibus, atque omni vitæ robore, diaphoresi, purgationibus, & jejuniis supervacuis (præter vulnus ab *Hydrargyro* inditum) tandem penitus exhaustis, misere confecti sunt. Per hæc etiam morbo jam pulso, æger ea spirituum copia, qua erat opus ad redintegrandam sanitatem, destitutus, præ imbecillitate concidit; aut si forte *Libitinam* valeat effingere, tot tantisque cruciatibus vitam redimit, ut tanti non sit vivere. De quibus Poeta & Neotericis haud inelegerant:

Graviora morbis patimur remedia;

Nec vita tanti est, vivere ut possis, mori.

Hic autem in promptu est istam objectionem diluere, qua fit ut nonnulli hoc morbo, (scilicet in statu ejus modo dicto) male mulctati in *Galliam* commigrare cogantur ut ab eo liberentur: Cujus rei hanc esse rationem, quantum judicare possum, existimo. Hujusmodi ægris, æconomia illorum corporum everfa ac viribus prostratis, apud nos aer crassus ac humidus refarciendis minus idoneus est, cum iste *Gallia*, utpote qui salubrior ac magis serenus, spiritus corporis & vires deperditas instaurare aptus sit: Non quod prædicti ibidem degentes, utut docti quidem, methodum qua hic morbus devinci possit, melius calleant, quam nos hic in *Anglia*. Sed ut ad dietam revertar.

Existimo itaque (& experientia mecum facit) quod præter jusculum avenaceum, panatellam, lac cerevisiatum, & cerevisiam tenuem tepescant, &c. juscula insuper e carne vitulina, pullorum, atque alia ejusmodi in mediocri quantitate ægro & possint concedi, & debeant; atque ut, ubi primum eoque subsederit gingivarum tumor ut deptes conferere valeat, cuniculorum, pullorum, agnorum carnes, atque ejusmodi teneriores, at parca manu, sint indulgendæ; ut vel in lecto se contineat, vel ad ignem sedeat, prout hoc vel illud magis allubescat animo: Cum enim *Ptyalismo* expugnetur hic morbus, non *Diaphoresi*, harelolando non sum, quorsum æger, nulla urgente necessitate, nimio calore mactetur.

Dicta methodus uti expeditior est, cum neque tot dies corpori ante salivationem præparando inutiliter infumendos, nec frequentes istas purgationes, aut decocta solemnia post salivationem, ægris imponat; ita certissimus sum eandem longe faciliorem esse, minus itidem periculosam, & minus recidivæ obnoxiam; quod experimento suo dicet quisquis in altera praxi versatus, ad hanc se demum conferet. Mihi saltem ex animi sententia successit in quamplurimis ægris; quorum nonnulli salivationis tedium & laborem plus semel irritato conatu exantlaverant, recidivam semper denuo passi, ex occasionibus, & propter causas, quas supra memoravimus.

Non est autem, Vir Candidissime, cur tuam fidem verborum ambagibus anxie sollicitem, qui jamdudum de probitate mea persuasissimus exiguæ æstimationi etiam nostræ favere dignaris. Plura itaque de hoc morbo non addo, cum mihi neutiquam placeat, nec placebit umquam, longis verborum ambagibus & sermonibus *ἀπρόσδιοντος* nucleum involvere, quo rei caput, seu *Nili* fons, ægrius innotescat. Quantulicumque autem sit hoc opusculum sive pretii, sive molis, id ut boni consulas rogo: cum illud eo præcipue fine elaboraverim, ut & in bonum publicum cederet, & quo in te essem animo palam testarer: quantumlibet autem magni te faciam, major tamen adhuc tibi honos debetur & a me; & ab iis quibus summa illa tua eruditio, morum suavitas, animique candor, cæteræque virtutes laudè dignissimæ ita clare elucescunt. Haud equidem tibi assentor; quoties profiteor me tuam amicitiam, ex quo me primum ea condecorabas, inter illa, quæ mihi comparavi, pretiosissima luculentissimaque semper habuisse. Inter alia enim in brevi vitæ curriculo a me observata eximium est istud, (quod etiam filio meo commendatissimum esse volo) hominum sc. probitate cæterisque virtutibus præcellentium consuetudinem semper mihi commodo vertisse atque emolumento; atque ex adverso pravorum amicitiam (nisi ea potius combinatio, sive etiam conjunctio dicenda sit, quæ in virtute non fundatur) quamvis nec dicto, nec vultu quidem me læserint unquam, tamen nescio quo pacto, tandem aliquando aut mihi, aut rebus meis mali, aut damni quippiam affricasse. Vale, Vir Humanissime, & amare perge

Tui semper observantissimum

THOM. STDENHAM.

Innumerī prope Authores scripsere de Lue venerea, quam paucis explicat Clariss. noster Author. Longum nimis foret illorum vel partem aliquam hic recensere, pro pleniori fœdi ejusce morbi, ac ipsius curæ, illustratione. Sufficiat itaque Doctissimi alius Angli perbreve, sed vere accuratam, eodem in argumento Dissertationem addere, cujus est sequens inscriptio.

GUALTERI HARRIS, M. D.

Celeberrimi Medicorum Londinensium Collegii, Socii,

DE LUE VENEREA

Ejusque Origine, Natura & Curatione.

D I S S E R T A T I O.

HIC morbus tam gravis & acerbus est; tam late serpit, & perniciem suam undique spargit; tantis cruciatibus miseros plerumque opprimit; & pristina sanitas tam difficulter restituitur, ut ab annectendo quædam eo spectantia non potuerim prorsus abstinere. Primordia hujus mali quæ pudendis solis labem inurunt, contemptui & ludicro habeant, si ita placet, ganeones & bellinotri, & petulantibus facetiis, tanquam nugæ & crepundia, ea excipiant; sed quandocunque aut prima illa inquinamenta aut succedentia, in sanguinem denuo transferentur, atque per totum corpus virus distribuetur, pœnas insipientiæ debitas illi abunde persolvent.

De origine hujus morbi ambigitur, an ab omni ævo, post homines natos, extiterit, an superiori fere sæculo in Europam ex India Occidentali fuerit advecta. Multa sunt testimonia, aut saltem suspiciones non contemnendæ, de antiquitate hujus luis, quanquam tot fere Regna non ita pridem contra ejus natales probrosos decertarunt, alterum in alterum illud opprobrium rejiciens, quot urbes olim Homerum sibi gloriose vendicarunt. Certe nomen ejus legitimum usque ad nostra hæc sæcula in tenebris latuit. Nec forma & figura hujus monstri a prioribus Medicis satis clare & distincte sunt descripta, neque ante novam suam denominationem nisi confuse admodum cognita. Hoc autem procul dubio scimus, plurima olim apud nos nosocomia leprosis recipiendis fuisse extructa; & multum fallor, si unica & singulis domus apud nos etiamnum maneat, leprosis vulgo recipiendis peculiariter dicata. Porro Venerei contagii eadem semper causa tyrannidem exercuit, nempe vaga & promiscua scortatio: nullisque sæculis defuerunt meretrices infames, quæ corpore prostituto vilem quæstum facerent: *posita vero causa ponitur etiam effectus*, quemadmodum & *sublata semper tollitur*. Quibuscunque enim in regionibus, quibuscunque demum locis prostibula ista, ac corruptelæ juventutis vulgares prorsus exulant; legumque asperitas scortationem omnem coercent, deest etiam una cum impuris scortis lues hæc Venerea. Ubicunque vero lupanaria palam permittuntur, remisso magistratu aut dissimulante; vel ubicunque meretriculæ latebras aliquas fœdas secure nanciscuntur; eadem lues cum horrida malorum turba, cumque omni suo miseriorum famulatio, longe lateque dominatur. Atque, ut mihi quidem videtur, in utero impuro meretricum vulgarium, quæ plurimis viris, quantumlibet sanis, sese prostant & commiscant, certo & naturaliter prognitur lues, perinde atque in nido ex ovis nascuntur volucres. Et quoniam corruptio optimi est omnium semper pessima, cur non ex feminis prolifici, & in tantis naturæ usus destinati, corruptione prava & incongrua venenata illa lues possit *quævis* propagari? Et nullus dubito, paucissimos uspiam esse scortatores; qui, quantumvis pœnas meritis aliquandiu effugerint, non serius aut citius in laqueos illos inciderint, qui non turpi & funesto illo veneno fuerint *partem* aliquando contaminati.

Sane lues hæc perniciofa est Supremi Judicis tremendum quoddam flagellum, instar ensis illius stricti capitis Damoclis interepulandum impendentis, omnibus scortatoribus semper interminans, quod sapientes ab impiis amplexibus facile deterrebit, quodque insipientes severissimis flagris aliquando cædet. Quis enim mulierosus certus esse potest, meretriculam qualemcunque sibi uni, ut videtur stipendia facientem, non aliis pluribus fuisse prius aut denuo fore provulgatam, atque ideo obnoxiam venereo inquinamento, utcunque ista mendaciis suis, perjuriisque usitatis, pudorem aliquem comminiscatur?

Neapolitanus hic morbus vulgo nuncupatus est, & ab obsidione Neapolitana primum ejus contagium originem traduxisse ut plurimum creditur, anno scilicet post Christum millesimo, quadringentesimo, nonagesimo tertio; cum Neapolim castris suis circumdaret Carolus Octavus, Gallorum Rex. Sed cum rumor popularium tanta sit incertitudo, ut sapientes vix quicquam pro certo pronuncient, quod non manifestis & sibi notis testimoniis confirmatur; cum aliorum morborum primus exortus in tenebris æque permaneat; cum ita constitutum sit rebus humanis, ut in singulis sæculis quædam continuo pereant, oblivioni tradantur, & alia quædam rursum emergant & suscitentur, cum virus Venereum in omnes fere regiones totius orbis, quantum nobis innotescit, ab oriente ad occidentem, a septentrione ad meridiem, jamdiu spargatur, & usquequaque diffundatur; cum denique Medici aliquot gravissimi luem istam infamem ante obsidionem illam Neapolitanam contagio suo virulento Europam jamdudum invasisse constanter affirmant, sane difficile est aliquid certi & indubitati in re ita obscura stabilire & decernere; quanquam antiquam luis profapiam admodum aperte indicare videatur antiqua, ac permanens causæ existentia, nempe scortatio illicita, vaga, & promiscua, primordiis forte rerum humanarum, aut saltem effræni hominum libidini, ac corruptelæ meretriciæ cœva.

Sed ut hanc rem paulo altius perscrutemur, Hippocrates, cujus autoritas apud omnes doctos plurimum valet, libro tertio de morbis epidemicis plurima horrenda symptomata enumerat, quæ ad formam Venereorum quam proxime accedunt: ut, *pustulas magnas, & pustulas corpore universo erumpentes, maximeque caput impetentes, ulcera fœdissima circa pubem & pudenda, inflammationes Erysipelatodes malignas & depascentes, diarrhœas & cibi fastidia, tabes multas, aut autrophias, nunc sine febre, nunc cum febre contingentes; carnum, nervorum, & ossium mutilationes ex decedentia magnas, a carie præcedente, prolapsus partium abscessibus corruptarum, & denudationes femoris inguini, ubi, aut pedis totius, prolapsus brachii, aut cubiti totius, &* Sydenham Opera Medica.

omnium miserrimas carnum jacturas, cum pubem pudendaque malum affecerit; ichores ulcerum & abscessuum puri absimiles, & pure omni deteriores, capillorum defluvia, fluxiones ad pudenda multas, dolores gravissimos cum vigiliis, ulcera oris serpentina, & tubercula tam interna, quam externa circa inguina, aut bubones, tubercula faucium, ulcerationes pudendorum, & similia, quæ quidem breviter tradit, & more suo conciso. An vero hæc omnia a peste vera, an a pestifera hac lue oriantur, in utramque partem ut differant, par est doctis liberum relinquere.

Quicquid vero de turpibus luis natalibus sit statuendum, certe dolendum est maxime, curationem tantæ ægritudinis, omnes corporis partes, tam internas, quam externas, a capite ad calcem, polluentis, e manibus Medicorum doctorum & peritorum ita profugisse, atque Chirurgis, nec non tonsoribus imperitis, ignarisque quibuslibet vulgo concedi. Quis enim tam fatuus & insulsus, quis tam illiteratus ardelio, qui non Medicaster in hoc morbo circumforaneus facile evadat, sine instituto, sine sumptu, & sine arte; qui non curationem luis, aut saltem gonorrhœæ infallibilem perfrecta fronte polliceatur? Quales autem hi sunt Medici? Sartores ut plurimum & fabri, similesque artifices, propinatores inertes & decoctores, qui in officiniis suis fidem prius labefactaverant. Quam infelix igitur & misera est infectorum conditio, qui duplices sustinent pœnas, damnanturque tum atrocissimi morbi cruciatibus, tum rudis agyrtæ ignorantia periculosa! Quasi levissimi quilibet affectus peritiam medicam jure efflagitarent, morbus vero minime anceps, medullisque penitus infixus, cuivis illiterato possit tuto demandari!

Ut autem summum discrimen lue infectorum manifestius appareat, considerandum est, hunc morbum frequenter esse Proteiformem, & post primam ejus subjugationem, sæpe novas postea induere facies. Illud equidem facile adducor ut credam, propterea quod tot tabidos, & atrophia confectos, pulmonibus fere intactis, nec nisi secundario læsis, viderim perire. Et nisi ex acuto aliquo morbo illos contigerit extingui, marcore & atrophia vix intellecta, tandem contabescere semper observavi. His lac asininum, pectoralia, narcotica, & similia, primam venenatam causam nihil respicientia, ad supremum usque diem frustra exhibentur. Chirurgi salivatione absoluta, & mercede laborum accepta, integram sanitatem audacter promittebant; atque denuo ægrotantes, longe diversis symptomatibus quam prius affecti, nequitiam somniant de reliquiis fomitis venenati, aliquandiu consopiti, & intus delitescents, sed sub nova forma revirescentis. Interim Medicus quantumlibet peritus, nihil causæ Venereæ facile suspicabitur, atque ægrotus partim ex verecundia, partim præteritæ curationis securus, de pristinis rebus oblivioni jam traditis nullam mentionem facit. Heu quanto igitur discrimine versantur hujusmodi ægrotantes, cum nec ipsi decausa ægritudinis primaria ne verbum müssent, cumque Medici contra morbum incognitum, Andabatarum more, cæcutientes militent! Certe Authores nonnulli, magis emunctæ naris, veritatem horum suboluerunt, cum ita prudenter illi consulerent, quoties aut dolor ischiaticus, aut rheumaticus, aut alius valde pertinax, remediis propriis & usitatis nequaquam cederet, ut ad diætam sudorificam, e ligno sancto, fassapatilla, & consimilibus, tanquam ad sacram anchoram confugeremus.

Ex his luis reliquiis soretis, & aliquandiu abditis, non solummodo pendet valetudinaria, & misella parentum, æque ac aliorum scortatorum conditio; sed & hinc morbi aliquot puerorum tralatiitii, & ferme immedicabiles, & quos nominare minime convenit, ne nati insontes, viri tandem facti, contumeliam, mœstitiam, atque animi perturbationem aliquam exinde immerito patiantur. Quamlibet enim majus est revera dedecus a vitiorum suorum, quam natalium, turpitudine & infamia, tamen novi viros eximios & fortes, clara & illustri stirpe, sed illegitime prognatos, qui præter modum dolore opprimebantur, quoties de natalibus suis spuris mentionem aliquam factam ex susurris clanculariis in communi hominum consortio illi suspicarentur. Atque in ea re major est Turcarum justitia & sapientia, apud quos nemo parentum culpam in filios inique transfert, & nulla est ignominia natis ex partu illegitimo proditisse.

Porro statuendum est luem Veneream esse morbum venenatum, & maxime deleterium. Et quanquam non ita repente interficiat, ut ictus & morsus animalium venenatorum, tamen temporis aliquo spatio, modo longiore, modo brevior, vitam infectis certissime adimit, nisi remediis propriis & salutaribus sanitati pristinae tempessive restituantur. Paucis igitur agamus de veneni hujus, cæterorumque natura, & breviuscula comparatione. Inter alias notas sunt signa venenorum, insignis faciei totiusque corporis pallor, & extremorum perfrigeratio, quæ in Venereis sunt maxime conspicua. In venenis assumptis, natura materiam venenatam omni vi expellere nititur in superficiem corporis & partes externas, unde maculæ variae, papulæ, & exanthemata oriuntur. Similiter in lue Venerea prodeunt maculæ, interdum parvæ, lentiginum instar, interdum latiores, eæque modo rubræ, modo flavescentes; & primum circa frontem ac tempora, deinde caput reliquum, tandemque per totum corpus diffusæ: nec solummodo maculæ, sed & pustulæ & tubercula in cute erumpunt. Veneris per os assumptis, calidis dico & erodentibus, magnum exoritur incendium in faucibus, & ventriculo, atque intestina doloribus aut torminibus exquisitis cruciantur. Lue infecti faucium inflammatione, & paulatim exulceratione, semper corripuntur; ventriculus illorum sensim prosteritur; & quanquam artus dolorum sævitiam & arrociatatem ut plurimum ferunt, tamen plus semel novi, aut intestina, aut hypochondria eisdem diris cruciatibus affecta, iisque tempore vespertino recrudescuntibus, quos artus ut plurimum & magis regulariter sustinent. Denique venena propria & peculiaris medicaamenta, sive antidota, ut rite expellantur, requirunt. Lues, nisi propriis & quasi specificis antidotis pernices ejus virulenta depellatur, vulgaria omnia pharmaca, & methodus omnes quantumlibet doctas, solet aspernari.

Sed natura hujus veneni est alia atque alia, tum secundum regiones magis ad septentrionem aut meridiem positas, tum secundum temperamentorum varietates. Etenim in Hispania & Lusitania de hoc morbo (sæpe tam mitis iste est illic) vulgo colloquuntur, quemadmodum nostri solent de liene & scorbuto. Siquidem illorum Medici ad febricitantes matronas nobilissimas ac virtute præditas accersiti, soleant quærunt, an lue Venerea laborent, sicut nostri de

Catamenii, quamquam & verecunde interrogant. Et in illis regionibus, ubi veneni aliqua portio indefinenter perspirat, infecti multi sese totam vitam hoc morbo comite satis placide traducere nonnumquam posse, saepe confitentur. Apud nos vero longe aliter se res habet, & hæc laps ferocem & immanem tyrannidem exercet. Nullus hic symptomatum & cruciatuum finis, nisi aspera aliqua, aut diuturna mitior, medicatio interponatur, donec aut dolores contorquendo, aut ulcera depascendo, aut ichor venenatus ossa corrumpendo, miseris finem imponent, & lacerum putridumque cadaver tandem abjiciatur, pabulum sane ingratum, & vix vermibus acceptum.

Quin etiam juxta temperamentorum diversitatem venenum hoc dissimiles vires apud nos obtinet. Temperies melancholica, & biliosa ejus exterminationem ægrius sustinent, quam sanguinea, & phlegmatica. Multo facilius restituuntur juvenes, quam ætate provecsti. Idemque est dicendum de scabie, herpete, & nonnullis aliis morbis varia temperamenta affligentibus. Et sicut temperamentorum differentia efficit, ut cathartica longe dispares effectus obtineant, hoc corpore mitissimis medicamentis facile purgato, illo fortissimis ægre cedenti; utque idem dejectorium medicamentum eodem pondere diversis hominibus exhibitum, in uno celerem ac violentam, in alio tardam ac mitem, & in alio nullam omnino operationem concitaverit: ita & de venenis dicendum est, quod illa citius aut ferius interimere soleant, non modo ex propria & innata vi perniciosa, sed secundum fortiolem aut debiliolem repugnantiam naturæ ejus, qui venenum accepit. Nam opinio ista vulgaris ficta est & falsa, quæ *Indos*, ab iisque *Italos*, ita artem veneficam statuit calluisse, ut in statutum diem, aut tempus prædeterminatum, siue fuerit septimana, siue mensis, siue annus, venenatos omnes certo conficere possint. Natura enim tam unius quam alterius, quemadmodum dictum est de catharticiis, veneno magis se opponit, & lethale virus reprimat, aut frustratur.

Sunt qui luem arbitrantur, fractis & attritis senio viribus, tyrannidem suam ferme omnem jam deposuisse, & ad interitum suum cum senectate demum vergere. Eademque apud plures doctos sententia jandiu obtinuit, quandoquidem blanditiis verborum tam literati, quam aulici spe vana ducti nonnumquam se accommodant, & gratiam lenociniis solent sibi conciliare. Qui vero sic sentiunt, nosocomia hodierna paulisper adeant, aut Chirurgos probos ac exercitatores consulant; videant ulcera multiplicia, cancrofa, & depascencia, tophos & gummata, ossium caries, & carniū putrilagines; videant tabes, lipothymias, cachexias, denique totam Pandoræ pyxidem ibidem apertam; exaudiant etiam horrendas miserorum execrationes, gemitus acerbos, & ululatus permolestos; tandemque dicant, an Venus egregia illa mansuetudine mancipia sua hodierna excipiat, diducientque pariter, utrum Mars an Venus plures ex numero viventium tollat; uter denique istorum amasiorum exitium pejus & frequentius cultoribus suis inferat.

Quod ad therapejam attinet luis, alii salivatione curationem moluntur: alii sine hydrargyro, & nescio quibus ineptis arcanis, eandem audacter pollicentur; alii denique emeticis, & catharticiis mercurialibus, & diætâ sudorifera intercalata, similibusque, venenum illud penitus subigere annuntiantur.

Medici ferme omnes, totumque Chirurgorum sodalitiū, uno consensu, salivatione tanquam brevissima, & maxime efficaci methodo, luis curationem aggrediuntur. Nec denegandum est cuiquam in arte medica mediocriter versato, salivationem esse omnium methodorum, quas hætenus excogitavit peritia medica, maxime expeditam, atque efficacem, ad virus illud Venereum valde obtundendum, & malignitatem ejus perniciosam abunde frangendam, si minus ea valeat non raro ad venenum istud penitus delendum. Certe in his regionibus borealibus, frigoris prædominio obnoxiiis, ubi labe Venerea tanta immanitate sævit, salivatio præ aliis adhuc notis inducias maxime veloces, pernicipi dilationem, & symptomatum omnium vehementium cessationem obtinet celerrimam; nec non in quibusdam infectis, & potissimum in junioribus, curationem perfectam aliquando complet. Sed si consideretur horrenda illa, terribilis, & nonnumquam intolerabilis medicatio, tantis cruciatibus & periculis extremis stipata, saltem exoptanda est; & omnium votis exposcenda, alia aliqua jucundior methodus, tutior illa minusque molesta.

Potentissimum, & efficacissimum salivandi genus est id, quod per inunctionem Mercurialem excitatur, & quod solum, tanquam *dignum nodo cuneum* Sydenhamius noster præclarissimus laudat. Sed refert scire, attentèque contemplari, in quot vitæ discrimina salivatio ista conjicit infectos; quot ex ea solent vulgo interire, quam horrendas capitis, fauciumque efficit intumescencias, suffocationem repentinam frequenter minitantes, & vix fræno manus peritissimæ recte gubernandas. Norunt quidem alyptæ quam periculosas diarrhoeas, dysenterias, lipothymias, in temperamentis maxime Mercurio repugnantibus, ista crebro producit, sed aliam vix exercent artem, vix quærent alyptæ, nisi quam in tyrociniis a Magistris suis didicerunt. Tanta vero est in hoc salivationis genere humorum fusio, tanta succorum omnium corporis sæpe exantlatio, ut nil mirum sit, si spiritus vitales una dissipentur; & maxime si in hac terra, aliter felicissima, ubi melancholia tantum obtinet imperium, complures ex tam rapida fluidorum profusione succumbant ac pereant. Quam fugax scilicet voluptas acerbissimas sustinet sapenumero pœnas. Quanta cura & industria sirenum illarum veneficarum blanditiarum sunt ab omnibus fugiendæ, quicunque aut sanum corporis temperamentum conservare volunt, aut vitam longævam jucunda lenique senectute finiendam cupiunt.

Porro si facultates hydrargyri tanta copia in corpus intromissi, ac sanguinis motu circulari omnes corporis partes pervadentis, velut in salivatione vulgari contingit; si illius vires naturæ humanæ tam noxias, ac inimicas; si virus ejusdem nervis & cerebro peculiariter adversum, attestante id paralyti, & tremoribus frequentibus; si onus & tormina, quæ ventriculo & intestinis vulgo infert; si pallidissimum plumbeumque colorem, quem vultui imperit; si denique quod a veteribus omnibus medicis hydrargyrum in catalogo venenorum annumeretur, diligenter perpendamus: sane Medico probo incumbit, quando duobus venenis tam morbi quam remedii una convenientibus sit necessario occurrendum, de antidoto aliqua propria, salutari, & excellenti, sollicitum esse. Et si tela ad hunc morbum rite expugnandum magis apta & idonea un-

quam reperiantur, e Medicorum pharetra magis magisque denuo instructa, potius quam ex aliorum quorumcunque sive armamentario, sive officina, ni plurimum fallor, certo extrahentur.

Et quicquid delirum vulgus; aliique nonnumquam saniore iudicio præditi, contra sentiant, sane nescio, an quisquam omnium morborum qui miseros mortales solent excruciare, iudicium acerrimum, Medici periti & exercitati, potius quam agyrtæ aut indocti aliqujus artificis, requirat ac mereatur, quam lues ista immanis, & venenata.

Quamquam vero salivatio omnibus aliis methodis ubique palman præripuit, tamen notatu dignum est, quod *Julius Palmarius*, Medicus Parisiensis clarissimus, & eruditissimus copiosius disseruit, qui Magni illius *Fernelli* fuit discipulus, & qui librum de morbis contagiosis tum doctè tum eleganter scripsit. Ille salivatione, quantumlibet tunc populari, quantumlibet nunc vulgo usitata, *vix centesimum quemque* lue correptum, perfecte sanari tradit; sed recidivo illos morbo, ex scintillis aliquandiu consopitis recrudescente, nonnumquam citius, nonnumquam post plures annos affici, & languere. Atque alii, inquit, *decies, alii duodecies* suo tempore *Salivationem frustra sunt experti*, tanta interim cum doloris acerbitate, malorumque miserrimorum acervo, ut forti viro multo satius sit semel mori, quam vitam morte pejorem sic proferre.

Ego itaque hæc animo diu multumque evolvens, nunquam complecti potui, quamobrem *Fernelli*, *Palmarii*, aliorumque Medicorum doctissimorum methodi tutiores ac jucundiores tam paucos sectatores consecutæ sint, & praxi hodierna ita proscribantur, nisi ob has potissimum rationes.

1. Medici illi præclarissimi odio adversus hydrargyrum nimis acriter flagrant, propter noxas illas gravissimas quas sæpius infert corpori. Et *Fernellus*, primus omnium Medicorum, curationem luis sine quocunque Mercurialium usu interno, & forte nimis temere suscipiebat, & palam pollicebatur; Amuletis suis selectis ac saluberrimis, diætâ sudorificæ, victui tenui & frugi, & catharsi intercalatæ solummodo confisus. Et certe propter aulum ac tentamen tantum, tanque salubre generi humano, si forte minus felix fuisset successus, omni laude dignissimus est egregius ille Medicus, quamquam in pestifero hoc morbo usus illius medicamenti periculosi, quod a Plinio vocatur *Venenum omnium verum*, summe necessarius nobis hætenus videtur. Nam *malum ovum malo corvo* apprime convenit. *Palmarius* autem hydrargyrosi vulgari insensus fuit, tum ob pernicipem ejus, tum propter extremos cruciatu doloresque asperros, quos inuncti sustinere necessario damnantur; tum denique, quia proposita sua curatio per guajacum & amuletum, aut per alexipharmaca sua hydrargyro conjuncta, tutior fuit, & longe salubrior inunctione vulgari, sputantium vires exhaurienti. Quocirca alias luem extirpandi methodos tutiores, ac magis salutares, nec non jucundiores, licet nonnumquam paulo cunctabundas, fuisse proponebat.

2. Chirurgi uno ore salivationi præ aliis curandi modis favere videntur, aut quia præmiis donantur majoribus, isto modo valetudini prospicientes, summa cum assiduitate, infectumque sub imperio quodam despotico vitæ ac mortis clanculum in conclavi, remotis aliis plerumque arbitris, præterquam nutrice, tandiu tenentes; aut quia durante tyrociniis nullam aliam æque certam lue medendi artem illi hætenus didicerunt; aut quia aliam discere vix unquam volunt.

3. Quoniam Chirurgi technis suis hanc medicinæ partem, quantum in illis fuit, tanquam sibi jure propriam ubique arripuerunt; & Medici, siue ob molestias tam sædæ curationis, siue aliis negotiis impediti, illam provinciam quasi derelictam nimis neglexerunt, ac vilipenderunt.

4. Quia curationes temporaneæ & palliativæ in hoc morbo, ut in aliis nonnullis, magis placent, ægrisque gratificantur, quam eradicativæ, quæ magis operosæ sunt, & exercitatione non parva egent. Quam ob rationem induciæ multorum dolorum gravissimorum Narcoticis derepente comparatæ, & ægrotantibus sæpe magis placent, & Medicis nonnumquam præferuntur, quam quæcunque alia, permanentibus interim aliquandiu doloribus, salutatis medicatio. His adde, salivationem symptomata omnia Venerea ita ut plurimum tollere, ut nulla recidivæ suspicio impræsentiarum restet, aut præmii procrastinandi ratio convalescentibus amplius appareat.

Quod ad impostores illos imperitos, turpissimos lucriones, ac nebulones vulgares attinet, qui sine Mercurio, sine regimine, sine quacunque molestia, & nescio quibus *Arcanis* insulsis, curationem brevissimam, nec non infallibilem, omnibus lue infectis cum insigui impudentia publice pollicentur, argumento sunt Bacillino quam Medico digniores, & fascibus Magistratum aut collistrigio, prout veteratores perfidi, sunt potius castigandi, quam disceptationibus, aut ullis rationum momentis accipieudis.

Denique tertium lue Venereæ medendi genus, quod posthabita salivatione solenni per inunctionem instituta, & spretis deceptorum insciorum fallaciis, cathartico aut emetico Mercurialium vi & efficacia, cum diætâ e lignis & radicibus exsiccantibus, ac regimine debito, conjunctorum nititur, fusorem orationis copiam plane requirit. Sed ne tot impostores & agyrtæ dolis & insidiis suis hinc ansam aliquam avidè arripiant, vela dicendorum contraham, & pauca haud prorsus inutilia jam dictis adjiciam.

Et 1. Notandum est, ligna exsiccantia, gummi, corticem; & lignum guajaci, lignum sassafras, atque radices sassa-parillæ & chinæ, tantum fere emolumenti naturæ humanæ conferre, & debilitatæ suppetias salutes præbere, quantum damni & nocuenti hydrargyrum corpori infligit. Sunt hæc salubria quædam hujus morbi venenati, licet imperfecta, pariter atque Mercurii ipsius alexipharmaca, quandoquidem & citra Mercurii auxilium opera & oleum nostrum sine fructu perdi solent. Et quamquam illa ex se nunquam apud nos scopum attingunt, hydrargyro prætermisso, venenumque Venereum nequeunt penitus delere & extinguere, tamen robur nativum erigunt & fovent, palloremque huic morbo congenitum, in vividum ac sanum colorem certo certius mutant.

2. Notandum est cathartica deleteria dicta huic morbo expugnando, qui vires corporis validissimas ipse infringit, & robur summum facile comminuit, quandoque minus convenire, quam mitiora & blandiora medicamenta. Et quoties fortior & validior requiritur catharsis, illa longe tutius obtinenda est, in debilibus scilicet naturis, senna, rhabarbaro, agarico, jalappa, epithymo, polypodio, manna, hermodactylis, aut eorum quibusdam, additis etiam

ten stimulis, sale mirabili, cathartico amaro, polychresto, prunellæ, aut crystallis tartari; his, inquam, sæpe securius & commodius alvus movetur; neque plura eorum identidem repetita ita corpori imbellium nocent, quemadmodum scammonium, colocynthis, & helleborus, quæ aut ventriculum conturbant, aut intestina corradunt, gravibusque torsionibus excruciant, aut visceribus omnibus, partibusque principibus, maligna sua qualitate sunt infensa.

3. Quancquam mercurialia, & hydrargyrosis, in omnibus temperamenti lue inquinatis indiscriminatum vulgo usurpentur, tamen notandum est, corpora crassa, obesa, phlegmatica, & frigida, ab illis maxime omnium lædi, & constat injurias insignes quas hydrargyrosis talibus facit, vix unquam postea deleri, adeo ut non minus discriminis a medicamento quam ab ipso morbo illis contigerit. Atqui sanguinea, biliosa, & præfervido calore redundantia corpora, incommodo minore hydrargyri usum paulo copiosorem sustinent, quam aut prius nuncupata, aut melancholica temperamenta. Etenim calida & sicca viscerum intemperies, contrariis quibus pollet facultatibus hydrargyrum, corrigitur, emendatur, & nonnunquam insigniter juvatur, atque bilis ferocientis acrimonia plurimum demulcet.

4. Quotiescunque lue jam pridem infecti, qui ptyalismum prius subierunt, aut qui aliis modis ad tempus tantummodo sunt restituti, morbo recidivo e latibulis erumpente, aut novam formam sortito, turbas novas commovente; quoties, inquam, illi in atrophiam, neque a pulmonibus tabidis, neque a lumbricis pendentes, inciderint, quancquam diarrhœa admodum violenta exhauriantur, a Narcoticis quibuscunque abhorrendum est Medico, & restringentibus interdendum. Nam malignitate veneni Venerei intus delitescens sic imminuta, & per sentinam corporis deposita, propria Antivenerea optato eventu non diu frustrabuntur, & corpusculum strigofum deleteria lue pene confectum, præter expectationem rursum pinguescet.

5. Cum virus Venereum sit bene retusum ac fractum, omnisque symptomatum ferocia refrenata, at fomes venenatus haud penitus extinctus sub cineribus delitescat, novos postea tumultus fucitaturus: quemadmodum & in aliis nunquam casibus, ubi symptomata anomala doloresque vagi infirmos detinent, medicamenta nervina, arthritica, amara, & antiscorbutica salubria, aliquandiu usurpata, catharticis blandis identidem intercalatis, reliquias veneni istius infra tui tuto profligabunt, integramque tandem sanitatem præ aliis restituere valebunt. Siquidem talia corruptelæ humorum deleteriæ contraria, sanitati tuendæ, amissæque recuperandæ, vitæ producendæ, flammis vitalibus tenuioribus confirmandis, apprime conducunt.

6. Infantes a nutricibus lactantibus infecti, quancquam maculis, pustulis, ulceribusque scatent, quancquam & nocturnis illis doloribus erunt excruciat, facillime omnium restituntur. Farina farfaparillæ fere insipida, saltem nullo gustu ingrato, aut fastidioso prædita, panatellis aut pulcibus suis, ut par est, commista, addito etiam, ventriculi gratia, fantali citrini polline, nulla pariter nausea donati, catharticique debitis intercalatis, tenerrimæ ætati, ut læte nonnunquam observavi, salutem perfectam reddidit. Quod vero infanuli a contaminata nutrice infecti, tanquam a peste quadam, sint ante inceptam curationem quamprimum amovendi, non opus est ut admoneamus.

Denique 7. infectis, cum curatio modis mitioribus magisque benignis ac salutaribus, quam salivatione illa acerba & excrucianti instituitur, non est iis persistendum ad certum quendam ac determinatum dierum numerum, sed nunc brevius, nunc diutius, pro ratione veneni, naturæque reluctantis, remediis immorandum, quousque sub regimine debito venenum penitus subigatur, & symptomata omnia prorsus evanescant.

Antequam finiam, nequeo tacite prætermittere errorem popularem insulsum, at valde perniciosum, qui longe lateque inauspicato increbuit. Nimirum didicit, aut forte audivit ignarum vulgus, si quisquam infectus cum sana muliere mutuis amplexibus se commiscuerit, a labe omni Venerea se confestim fore tutos & immunes. Quot innocuæ virgines inter alias ex hoc stupido errore perierunt. Sed cum sanguinem pervaserit virus pestilens, & viscera afflatu illo impuro imbuantur, credat etiam plebecula insipiens pari ratione, se clavam Herculi, quod ajunt, & fulmen Jovi, extorquere posse, & se montes excelsos, virtute cujusdam incantamenti, posse radicibus avellere, & alioversum transferre.

Ut vero finem faciam, nonnullis videri possum nimis acriter perstrinxisse morbum Venere clementi prognatum, Dea scilicet illa amabili, cui tam Principes summi, quam vulgus infimum, vota sua nimis frequenter faciunt, & cujus illecebræ pectora fere omnium æstu quodam impotenti facile percellunt. Acrius, inquam, hujus morbi sævitiam perstrinxisse videar, quam plurimi medicastris, qui eundem in postremis habere solent, ac pro nihilo, ut ajunt, ducunt; ut scilicet artis cujusdam exquisitæ, quam alicubi didicerunt, ostentationem gloriose faciant; atqui ut revera crumenas incautorum aliquando emungant, ut familiares suos opprimant, omniaque ad quæstum commodumque proprium inique referant. At vero longe præstat medico probò, liberalibusque disciplinis instituto, verum dicere, quam quæstu quovis duci, communique utilitati quam suæ consulare. Modici rerum status, modo res sint bene partæ, nemini pœniteat: Nam pauca nonnunquam desiderium explent, permulta animi rarissime satiant. Paucitas rerum commode beneque vivendo necessariorum facile suppletur, virisque bonis rarius deest. Sed in superfluis accumulandis nullus vulgo finis gravissimarum solitudinum, nullum molestiarum maximarum tedium rapinarum terminus; quasi dira illa execratio, aut fascinatio, avaros injustosque semper comitaretur, ut in opulencia inopes, in abundantia egeni vitam prorsus inquietam traducere damnarentur. Præcipiti cursu breviuscula labitur vita. Nec magna pompa impedimentorum necessaria est, ut amœna sit profectio, neque requiritur tanta viatici copia, ut breve iter conficiatur. Præclare illis actum puto, quibus in bene agendo deponitur vita. Nec sapientibus lugendam esse corporis mortem, quam animæ immortalitas consequitur. Etenim tum demum nos vere victuros constat, cum e vita hac excefferimus. Quid eo olim eximie dixerit Philosophus, (pectore spe tumido, consolationis pleno, animoque futuris gaudiis admodum aspirante) in senectam vergens, & Senectutem ornatissime landans? Si in hoc, inquit, erro, quod animas hominum immortales esse credam, lubenter erro: nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo.

Sydenham Opera Medica.

M Iraberis fortasse, Clarissime Vir, quisnam importunus interpellator graviora tua inturbet negotia: sed veniam, confido, dabis, postquam intellexeris ea potissimum de causa hanc tibi molestiam creari, ut grati animi sensa exprimat venerabundus Tui cultor. Quippe tantos ex elaboratissimis tuis circa Morbos acutos commentariis, agnosco me accepisse fructus, ut ad grates auctori persolvendas me prorsus obligatum teneam. Tam accurate singulas annorum, aerisque quas tractandas suscepisti, Constitutiones, cæpto antehac inaudito, observasti; tam genuinas, facileque obvias, pro singulis, qui in illis occurrebant, affectionibus sanandis, indicationes excogitasti; tantoque ingenii nitore totum opus exornasti, ut merito tantam sagacitatem, tam indefesso labori junctam, suspiciamus: unde & ægrotos, & Medicos tibi æternum devincis.

Quancquam vero cuncta, quæ pertractas, accurate adeo absolvisti, ut pronum sit de singulis in laudes tuas erumpere; præ cæteris tamen haud mihi temperare possum, quin impense tibi gratuler methodum tuam circa Variolarum curationem; cujus ope, quin feralis ille hætenus affectus terrificam suam exuat larvam, interque facillime curabiles (nisi malignitas, vel quiddam valde insolitum accesserit) se sistat, nullus ambigerem, si per nutriculas (turbam raro non inimicissimam hominum saluti) liceret, quæ calido suo regimine, & medicamentis omnia usque adeo pessundant, totque ubivis in sepulchrum ante tempus præcipitant, ut merito Tu, Doctissime Vir, humani generis Vindex audire merearis, qui ægrotis misere, cumque extremo vitæ discrimine palantibus, te ducem fidissimum præbes, ut in salutis viam, si ductum tuum sequi volent, redeant. Ut de me loquar, quancquam mei fidere ratiociniis aliquatenus reformidarim, diu tamen credidi, Variolarum eruptionem, sicut non ipsum esse morbum, sed febris crisis, sic par reliquis crisis desiderare regimen, in quibus omnium Medicorum effatis sancitur, totum negotium naturæ committendum, si cuncta recte procedant; id quod plerumque in isto affectu cernitur, nisi plus justo prius exagritus fuerit sanguis. Postquam vero, perlecto aureo tuo libro, senseram tandem panicos esse, qui me aliosque tandiu detinuerunt, timores, aususque fueram juxta tui præcepta (reclamantibus licet quandoque non solum vulgo, sed etiam Medicis) ægros regere, tantum inde emolumentum iis, ubi in obtemperantes incidi, obvenisse comperi, ut, quicquid alii senserint, me felicissimum reputem, cujus in manus tantus devenit thesaurus. Porro & ubi ad Variolis confluentibus laborantes (quod tamen haud admodum sæpe contigit) accitus fuero, non dubitavi, quancquam animam jam agere viderentur, ad paregorica, tua fretus autoritate, confugere, idque successu haud pœnitendo, imo vero stupendo. Tam multum equidem hac in parte præstitisse mihi videris, ut nil superesse, quod vel aliorum, vel etiam Tui industriam exerceat, facile crederem, nisi nuperrime a doctissimo Viro, amicoque meo integerrimo, D. Kendrickio, (qui humanitatem tuam plurimum celebrat) audivissem, te innuisse novas quasdam (quas & ad praxin rite exercendam perutiles fore non possum non augurari, utpote a te factas) circa idem subjectum tibi occurrisse Observationes, quas nisi publico impertias, & in Tui famam, & in humanum genus injurius eris. Proinde (si quid apud te ignoti valeant preces) haud graveris, obsecro, Celeberrime Vir, eas in lucem emittere.

Sed ne hic subsistam: Nempe ab eodem accepi, rariora quedam tibi observata fuisse circa Affectus, Hystericos dictos; qui sane sicut doctissimorum Medicorum, ab omni memoria, exercuerunt, imo lassaverunt ingenia, sic (proh nimis sæpe) & medicandi traditas methodos eludunt; documentaque dant, quam parum tutum sit, in Philosophicis, nostre rationi nimium fidere, nisi iis in rebus, quarum certitudinem a sensuum testimonio petere valeamus. Plurimum, Dignissime Vir, ulterius & a presenti sæculo, & posteris, haud dubie mereberis, si & quæ circa hanc materiam meditatus es, propalare dignatus fueris. Hoc saltem a te mihi impetrare liceat, ut equi bonique consulas, quod, non mei solum, sed publici etiam causa, ignotus tibi licet, petere non erubuerim; utque me inter innumeros eos habeas, qui tibi se quam maxime devotos profitentur.

Devotissimum

Vigornæ,
17. Novembr. 1681.

GUILIELMUM COLE

Speculatissimo, Doctissimoque Viro

GUILIELMO COLE, M. D.

S I usque adeo Philautiæ indulgerem. Ornatissime Vir, ut eas, quæ ad me nihil attinent, laudes mihi arriperem, ægre admodum me ab aliquali animi elatione continere valeam, laudatus tantopere a laudato viro, qui eruditissimis suis lucubrationibus orbi literario, mihi vero nec de facie, quod sciam, innotescit. At vero quod me tanto, licet immerentem, honore dignatus fueris, id demum humanitati tuæ acceptum refero; cum maximos quosque & præstantissimo viros ita natura comparaverit, ut non tantum leviter errantibus, ut fit, æquiores sint, sed etiam in mediocrium studiis deprædicandis, data vel qualibet ansa, ingenio suo candori morem lubentes gerant.

F 2

Cujus

Cujus quod & in ipso me, & meis istis conatibus, utut tenuibus, publico tamen commodo destinatis, præclarum edideris specimen, gratus agnosco.

Ea quod spectat, quæ a me præstolaris, sive jam editis de *Variolis* observationibus addenda, sive etiam de *Passione Hysterica* de novo tradenda, ita habet. Horum primum idcirco aggressus sum, ut quæ olim deficere viderentur, ex iis quæ experientia jam annosior mihi suggererat, possem sarcire. Alterum vero ideo in me recipiendum duxi, tum quoniam *Affectus Hystericos* omnium, post febres, morborum frequentissimos occurrere, tum quia emolumenti aliquid e levidensibus meis observationibus capi posse existimarem. Neque tamen diffiteor, aliam quandam, præter hanc publicum juvandi spem, mihi causam subfuisse, ut otium scilicet bene locarem, & tedium brumalium noctium honestius fallerem; cum jam ingravescente ætate non amplius Congerrones foras quæram. At quicquid id fuerit, quod me primum instigaverit, me non ita atque speraveram, incæptis ac votis meis parem esse sentio, cum continua illa cogitationum series, qua mens obstinatius defigenda est, mihi jam a multis annis *ποδαρπῶντι* nunquam non officiat, maxime vero, jam appetente senectâ. Cum itaque tam opportune appulerint humanissimæ tuæ literæ, brevi responsionis limite expediam eorum summam, quæ prius fufius deducenda meditabar.

Sumpto itaque a *Variolis* exordio, illud prælibandum censeo, quod scilicet ea febrium intermittentium species, quæ primum anno 1677. uti alibi diximus, caput extulit, atque etiam nunc regnat, anno videlicet, quo hæc conscribo, 1681. hæc febres, inquam, pro more epidemicorum omnium, iis maxime tempestatibus grassabantur, quæ cum earum indole magis faciebant, per annos istos omnes, quibus vigeant; aliena autem tempestate appetente, iis protinus epidemicis cedebant, quibus illa magis favebat. Exempli gratia, ingruente hyeme, nunquam non *Tussi*, & *Febribus Peripneumoniacis* ab illa pendentibus locum dabant, ut & *Variolis*. Redeunte autem Vere dicta febris postliminio reversa est. Ita anno 1680. postquam febris hæc per Autumnum omnia fuerat depopulata, *Variolæ* brumali tempore eam excipiebant, ubique locorum grassantes. Anno autem vertente, 1681. scil. febres intermittentes denuo recrudescebant, haud usquequaque epidemicæ, fractis jam & succis earum viribus; unde etiam *Variolæ* hic illic sparsæ, una cum illis subpululabant. Æstate vero jam ingressa *Variolæ* increbrescere quotidie, tandemque *ἐπιδημικότητα* factæ stragem haud vulgarem edebant.

Hoc anno, scil. 1681. luce meridiana, quod ajunt, clarius mihi constabat, quod jam olim ratio suadere videbatur, ægrum sc. lectulo noctes atque dies continuos non prius addicendum esse, quam *Variolarum* examen omne in conspectum se dederit: Etenim tum Veris, tum etiam Æstatis temperie ficiore diutius, quam post eorum, qui nunc sunt homines, memoriam invalescente (adeo ut omnis ferme ubique locorum herba exaruerit) sanguinem fere omnis illa humiditas, quam aer alias solebat suppeditare, desituebat: ex quo *Variolas* jam grassantes major quam pro morbi indole inflammatio accedebat, cæteraque exinde nata symptomata præter modum sæviebant. Atque hanc ob causam, si quid ego judico, *Maculæ Purpureæ* plenam exanthematum eruptionem haud raro præveniebant, & quæ eas extrudebat vehementior inflammatio, debitam sanguinis crasin inturbans atque disperdens, etiam ante justam materiæ morbificæ expulsionem, præmaturam mortem accersebat. Id vero maxime factorum sævitiam promovebat, quod jam exanthemata ob supra dictam causam ita facillime confluerent, vel ipsa aeris intemperie id mali sponte sua procurante, quod alias fere solent scoli & medicastri, regimine & cardiacis calidioribus in ipso morbi limine inauspicato imperatis atque admotis. Etenim (quod diligenter animadvertendum est) post omnium vel exquisitissimas observationes, rei cardo in hoc vertitur, ut in variolosis saluti spes omnis in *Exanthematum paucitate* reponatur; discrimen in eorundem *multitudine*: & prout plura sunt hæc, vel pauciora, aut moritur, aut vivit æger. Interea fatendum est, & *sanguinis mictum*, & *maculas purpureas*, quæ ita certe mortem prænunciant, quandoque accidere, vix ullo adhuc comparente *Variolarum* indicio, vel etiam paucissimis pustulis erumpentibus; hæc vero ut *Variolas* denso agmine confluentes ut plurimum comitantur, ita aliquando tam præpropere invadunt, ut ægrum ante plenam eruptionem e medio tollant, sicut jam præmonuimus.

In proclivi est autem, ut mihi videtur, rationem reddere, quare æger plus minusve periclitetur pro majore minoreve exanthematum numero; cum enim qualibet pustula *Phlegmone* primo sit, licet sub exigua mole, mox in *Apostema* evadat, fieri non potest, quin *Febris secundaria* a *Pure* jam in fieri pendens, magis minusve exacerbetur, pro puris excoquendi quantitate jam in morbi statu; quod in mitissimo confluentium genere, die a primo morbi insultu *undecimo*, in mediocri *decimo quarto*, in crudissima vero & ægrius domabili specie, *decimo septimo* fieri consuevit. Quemadmodum enim (quod est notandum) *Confluentium Variolarum* genus *Distinctum* quod dicitur, ratione periculi imminentis, in tantum superat, quantum ab ipsa *Peste* superatur, ita etiam supra dictæ tres confluentium species aliæ aliis præsentius discrimen adferunt. Quod insuper tam in ætate, quam in sexu locum habet; cum nemini non sit notissimum, adolescentem in ipso juventutis flore multo magis periclitari ab hoc morbo, quam vel scæminam vel impubem. Sed hæc obiter.

Neque sane mirabitur tam ingens discrimen a majori pustularum numero pendere, qui secum reputaverit, quod si cujuslibet sive humeros, sive brachia, sive aliam quamlibet partem *Phlegmone* (vulgo a Boyle) forte invaserit, idem tempore maturatioris, quæ jam pus fit, febricitavit; cum sc. sanguis a purulentis particulis, per venas ex lege circulationis in ejus massam resorptis, incitatus, fabriculæ fomitem subministret. Quanto magis Medicus ubi primis morbi diebus ægrum invisens, faciem ad instar pulveris e limatura acicularum undique respersam contemplabitur, mortem prædicet uno aliquo e diebus jam memoratis involutarum; idque præ indomita vi febris succedaneæ, quam, pro ratione quantitatis puris ex innumeris istis apostematibus in sanguinem rejecti, deservire posse est. Quæ quidem hominis funesta ruina aliquot diebus antequam ingruat, facile prævideri potest, utur belle se habere æger, & sibi videatur, & astantibus etiam in hujus morbi historia minus exercitatis.

Quocirca si non aliunde periclitetur æger (purpureis maculis & sanguinis mictu jam sepositis) quam ex pustularum frequentia, serio mihi perpendendum est, quibus potissimum de causis ita densæ protrudun-

tur, & si tuto fieri potest, iisdem omni ope coercendis incumbendum. Quod quidem rei caput est, & in quo præcipue ægro suppetias ferre queam; cum periculosa plenum sit alex, quicquid moliamur, jam constituto in hac specie morbo; nec si tandem mortem æger evaserit, id tam meæ debetur solertiæ, quam vel insigni narium hæmorrhagiæ, vel fortuitæ alicui, quæ morbo accidebat, mutationi. Profusissima autem illa crebrarum pustularum eruptio, si quid ego conjicere possum, a præcipiti nimis materiæ variolosæ assimilatione ortum ducit; quæ quidem præcipitatio maxime videtur contingere, vel quod ægri natura medicamenti ad instar *Cardiaci*, calore & spiritu plus satis urgeat, vel quod ipse æger, sive præmature se lectulo includendo, sive adhibitis cardiacis calidioribus, aut liquore quovis spirituosissimo, fermentum plus debito exaltaverit; quibus omnibus modis disponitur sanguis ad excipiendas & intimius admittendas morbi impressiones, ipsaque natura, seu furis agitata, præ exuberanti materiæ variolosæ copia & plenitudine, omnem fere succorum & carniū molem in exanthemata evomere satagit.

Nulla vero magis *προφασει* promovetur immodica materiæ variolosæ assimilatio, quam si æger intempestive se lecto addicat, viz. ante diem sextum a prima invasione, vel quartum inclusive ab eruptione, quo tempore jam omnis pustularum cohors in conspectu est, nec sunt plures expectandæ.

Et licet inmoderatus lecti calor etiam post elapsos dies istos phrenesi, vigiliis, aliisque symptomatibus accersendis nonnihil conferat, ea tamen ejusmodi sunt, quæ a medicamentis cum judicio propinatis vinci possint; cum ingens illud vitæ periculum, quod die undecimo instat, ab innumeris istis pustulis prognatum, omnem medicam opem respuat & aspernetur.

Hic itaque serio monendum est, ægrum nullo pacto se lectulo interdiu debere committere, si sibi cavere velit a nimio pustularum confluxu, nisi sexto die jam advesperascente, unde se plurimum usque refocillari sentiat: a quo tempore vix se continebit a jugi in lecto decubitu, si insignior fuerit pustularum *συνδρομή*, tum ob acriorem jam pustularum molestiam, tum quod ab ipso sessionis habitu in animi deliquium sit propensior; quod cum sæpenumero animadverterim, in mentem mihi venit, ex communi hujus morbi lege naturam ipsam quasi digito mihi monstrasse, quo primum morbi tempore æger lectulo continuo adjudicandus est.

Sed ut non solum dicti Problematis veritatem adstruam, quod tanti est momenti ad minuendum a *Variolis* impendens periculum, verum etiam, ut in iisdem a carceribus, ut ita dicam, ad metam pertractandis, rationem nostram quasi manu ducam, non abs re fuerit, opinor, quoddam quasi schema totius morbi animo depingere, & diligenter expendere, quæ sit ejus natura, ac qualis methodus; quo demum ex certo sensu hominum, fidissimis observationibus utentium, non ex opinione incerto phantasiæ fundo innixa, rem clare judicare valeamus.

In primis itaque ejus essentia (quantum nos rerum essentias conjectura assequi valeamus) in peculiari quadam sanguinis *inflammatione* comprehendi videtur, in qua natura primis aliquot diebus id negotii habet, ut particulas inflamas præparet, subigatque, quo facilius in corporis ambitum eliminentur; quo tempore, mota seditione, & perturbato jam sanguinis statu, febris ut accedat omnino necesse est: quinimo incensæ ac jam furentes particule, per omnem circulantis sanguinis ditionem tumultuantes, ventriculi ægritudines, dolores capitis lancinantes, & quæcumque alia symptomata præcedunt expulsionem, necessario excitant, prout has vel illas partes motu agitatae appellant. At cum jam victrix natura rebelles particulas in corporis habitum propulsaverit, ut prius in sanguine, ita deinceps in carne mole id quod superest tragædiæ peragitur. Et sicuti natura non alia quidem methodo quam accensa febre materiam in sanguine peccantem novit amoliri; ita etiam non nisi facto apostemate massam carneam a re qualibet extranea liberat: ut si forte sentis aut quippiam ejusmodi carni inhæserit, partes circumjacentes mox apostemate obsidentur, nisi id, quicquid est molesti, protinus extrahatur. Hæc itaque particule in carnibus demum stabulantes, primum *Phlegmonas* haud ita spectabiles excitant, in quibus latitant; quæ quidem augescentes in horas, atque efferatiores & inflammatiores reditæ, tandem in *pus* & vomicas desinunt; quo quidem tempore fieri non potest, quin aliquid ex illa apostematum colluvie, in massam sanguinis, per venas circulari motu reducti, resorbeat; quod si sanies ista nimia copia sanguini ingeratur, non tantum febrem accersit, cui ægri vires plaue sunt impares, sed etiam omnem ejus massam putredine, seu veneno quodam, inquinat. Sed neque hoc mali caput est: quin etiam ab intensiore febris calore, prostremis hisce diebus a nimia puris vi excitato, *Ptyalismus* qui *Variolis* confluentibus comes indivisus esse debet, præpropere sistitur, unde ægro spiritus continuo intercluditur. Quod si dicta materia purulenta parcius sanguini infundatur, insurgens naturæ robor secundariæ hujus febris impetum nullo negotio reprimit, & abscessulis in dies magisque exarescentibus, æger brevi convalescit.

Si vera sit hæc & justa hujus morbi historia, cæcus sit oportet qui non videat, omnem ejusdem in utramque partem eventum, a curationis fundamento recte aut secus primis in diebus facto, pendere. Nam si calidiorum, & præcipue jugi lectuli usu, calentes hæc ac spirituosæ particule acuantur, necesse est ut assimilandi facultas (qua jamdiu plus satis pollent) adhuc intendatur & augeat.

Adde quod sanguis & reliqui humores his modis excalescenti, fortiori particularum impressioni promptius cedunt, unde plures, quam res postulabat, emergunt pustulæ, & æger nulla necessitate cogente in vitæ discrimen conjicitur. Quando oppositum huic regimen, & modice frigidiusculum, atque aeris usus liberior, non tantum fevidarum ac ferocientium particularum vim retundit, sed etiam condensat obfirmatque humores, quo se validius spiritibus morbificis opponant, atque eorundem sustineant impetum, unde non major materiæ variolosæ copia conflatur, quam pro genuina morbi indole.

Sed nec unico hoc incommodo, quod scil. nimia materiæ morbificæ quantitas assimiletur, & superexaltet fermentum morbi, mulctatur is, qui iusto citius ad lectum damnatur: at ex eodem fonte sæpissime profiunt tum mictus sanguineus, tum etiam maculæ purpureæ, æstivo maxime tempore, atque in juvenia adhuc florentibus. Utraque hæc symptomata, nisi fallor ego, ortum ducunt ab æstu & furore, in quem agitur sanguis a ferventibus & spirituosissimis particulis, a qui-

a quibus exagitatione atque insigniter attenuatus, vasorum claustra diffringit, nunc in mictu sanguineo, quoties in renes irruit, nunc purpureis in maculis, quoties per arteriarum extremitates in musculos & cutem terminatas, percolatur, unde toridem quasi *sphaceli* oboriuntur iis in partibus, in quibus extravasatus sanguis coagulatur. Atque ut præcaveri facile poterant duo hæc symptomata primis morbi diebus, quibus plerumque emicant, regimine & diæta in frigidum vergentibus, ita ubi jam actu comparuerint, pariter operam ludet, qui iisdem mederi conabitur, ægrum lecto includendo & cardiaca exhibendo, ac luderet anicula, quæ nimiam aquæ in olla ebullitionem, igni fomitum subministrando, sufflaminare sagat.

Sed ut verum fateamur, utut offendantur Dogmatici & hujus rei ignari, ac proinde iniqui iudices, non solum male tutum fuerit, ægrum primis diebus lectulo jugiter affigi, verum enimvero est, ubi æger libero aeri omnino est exponendus, si æstas scilicet fuerit, atque æger ætatis florem nondum prætergressus, aut liquoribus spirituosus assuetus, præsertim si morbus nimis computationi originem debeat. His, inquam, in casibus, præcipitem nimis pustularum eruptionem haud æquidem arbitror satis coeeri posse, tum a lectulo abstinendo, tum etiam a cardiacis; at sanguis etiam sine horum subsidio, spirituum præservidorum & morbo congenerum largo penitus auctus, magno cum impetu, ut explodatur quasi necesse habet; atque insuper tanta humorum congeries in exanthemata facesset, ut præ nimia puris copia in sanguinem regurgitantis sub fine morbi, æger quasi obrutus, fato omnino succumbat.

Quamvis haud raro fermentum immodice exaltatum tantam colluviei variolosæ vini conficiat, ut æger incipiente adhuc morbo e medio tollatur; cum scilicet materia morbum committens, tum præ nimia sui copia, tum præ motu inordinato ac confuso in sanguinis massa excitato, se nequit extricare & foras educere, cujus loco mictus sanguineus & purpureæ maculæ tragœdiæ catastrophe fiunt. Quod etiam & in morbillis, & in febre, scarlatina dicta, sæpiusculè occurrit, ubi scilicet intempestiva opera in iisdem ad eruptionem vehementius sollicitandis infeliciter collocatur.

Neque sanguinis missio, quantum mihi videtur, licet mature celebrata, ita efficaciter præproperam materiæ variolosæ assimilationem cohibere valet, ac sanguinis temperatio ab aere intromisso, maxime si statim ab emissio sanguine æger lectulo committatur, & cardiacis calidioribus mactetur; his etenim modis, sanguis propensior redditur excipiendis adventitii caloris impressionibus, quam ante venæ sectionem fuerat. Et sancte assero, insignissimum fere omnium, quos mihi unquam videre contigit, e confluentium genere morbum, & qui ægram undecimo die jugulaverit, juveniculæ supervenisse, ubi primum a rheumatismo usitata illa methodo copiosæ & iteratæ venæ sectionis fuerat liberata. Atque hinc mihi primum innotuit, phlebotomiam non perinde, atque ego prius arbitrabar, Variolis intra justos limites coercendis conducere: Tametsi sæpenumero observaverim, reiteratam catharsin sanguine nondum inquinato, subsequentes Variolas laudabiles & distinctas ut plurimum reddidisse.

Neque vero me fallit permulta esse, quæ contra sententiam hanc nostram, qua ægrum interdiu lecto eximimus, possint objici; eaque haud exigui tum apud hominum vulgus momenti, tum etiam apud minus hac in palæstra exercitatos, quos Iudices appellare solet vulgus medicorum, ut eorum autoritate male fundata theorematum statumini, utpote quæ magis, & quasi ad amussim horum captui quadrent, quam quæ ab ingeniis penetrantioribus mature sunt excogitata; unde sequitur, ut cum pars hominum longe maxima exteriori tantum rerum cortici contemplando apta nata sit, paucissimi autem veritati in profundo latitanti inde extrahendæ pares sint, scioli isti *ἡ πολλὰν* suffragio adjuti primas facile ferant, hi autem perspicaciores calumniantium maledicentia excipiantur, *πολλοὶ γὰρ κερδοσκοφοῦσι, παῦροι δὲ τὴν Βάκχον*. Qui tamen æquo id animo ferunt, veritate freti, & saniorum, paucorum licet, consensu. Primo itaque objicietur, quod lecto abesse primis morbi diebus pustularum eruptioni officiet, & ex consequenti ægritudinem, aliaque symptomata ab impedita eruptione pendentia, in longum ducet. Hoc verum esse minime nego, cum experientia fere quotidiana ei suffragetur. Quærendum est autem, ubi gravius periculum, vel in sufflaminanda paulisper materia variolosæ, atque ea de causa ægritudinem a non eruptione pendentem aliquantisper protrahendo; vex altera parte nimis urgendo morbi fermentum, & tam insignem materiæ variolosæ quantitatem assimilando, ut æger ad orci fauces sistatur a febre secunda, die morbi undecimo. Si rem recte expendamus, liquebit, opinor, paucissimos ideo fato defunctos, quod exanthemata serius ocyus non efflorescerent, nisi forte ex iis aliquot, quorum sanguis præ nimia excalefactione, motu inordinato, quasi cæstro quodam, percitus, materiæ morbificæ leniter excernendæ otium non concedebat; quod a meis partibus militat, non pugnat mecum. Neque enim extimescendum est, quin, si nihil prorsus agamus, materia variolosæ (ut ut primis hisce diebus hinc illinc transvolans, quamcunque occupaverit partem, fatiget, unde vehementiora illa symptomata, vomitiones enormes, dolores variis in partibus, &c. enascuntur) tandem tamen a victrice natura debellabitur, & incorporis habitum extrudetur, præsertim cum ægri alvus hucusque ut plurimum adstricta, pustularum eruptionem, feram licet, certam tamen fore spondeat. At e contrario quot quantique letho patent aditus, quoties pustulæ intempestive & nimio opere exiguntur? Longum foret omnes percurrere: præcipuos jam indigitavimus. Sunt autem hi, 1. Nimium auctus exanthematum numerus, cui ex æquo respondet febris ultimis diebus succedentis majus minusve discrimen, 2. Mictus sanguineus & maculæ purpureæ, quorum utrumque ab extravasato sanguine oritur, qui plus justo attenuatus & quasi præ æstu ferociens, disruptis vasorum repagulis, qua data porta ruit, 3. Ut supra dictum est, debita eruptionis suppressio totalis, a nimis sedulo in præcipitanda eruptione conamine, quo non magis scopus medico propositus attingitur, quam si quis id agens, ut densa hominum turba spatiosis ædibus inclusa, seriatim & servato ordine inde exiret, machina charactæa pyrio pulvere referta ac in medio disposita usque adeo omnes percelleret, ut singulis ad portam omni ope contententibus, proindeque constipato agmine in ejus faucibus hærente, exitus universis, quasi cuneo facto, præcluderetur.

Jam si quis roget, quorsum debita materiæ variolosæ separatio non periude primis hisce diebus promoveri possit, si æger moderato

Sydenham Opera Medica.

lectuli calore foveatur, ac si ab eodem arceatur; sciscitabor ego x-adverso, an non testetur experientia quemlibet lecto inclusum tempore brumali, stragulis modice contestum, foco non accenso, magis percalescere, quam si idem probe vestitus in eodem cubiculo extra lectum verferetur. Quod si de differentia notabili satis constet, tunc erit quærendum, quænam ex his methodis magis apta sit ad reprimendam exuberantem fermenti variolosæ agitationem; ad quam metam, si quid nostra mediocritas judicando valet, a Medico, incipiente morbo, præcipue collimandum est, & prout ab eadem plus minusve in aberraverit, ita cum malis bonisve ægri rebus medicinam fecerit.

Incautioribus id vero præsertim hac in re imposuit, quod se animadvertent ægrum suapte sponte in sudores proclivem, qui cum jugiter manarent, quoties lecto contineretur æger, æstus febriles haud parum minuebant, secus ac in iis, qui non sudabant. Primum autem perpendamus, quam ob causam febris coercendæ ita impensam navem operam, cum sit illa solemnitas naturæ machina, qui tum in præparanda, tum in eliminanda materia quavis inimica in sanguine latenti, præcipue utitur. Quis autem non videt, quod dum ita sedulo sudorem provocemus ad mitigandum febrem, eadem opera, ceu fructum præcociem, humorem crudum & inconcoctum extrudentes, atque iis ipsis sudoribus immaniori postmodum febris ansam præbeamus; cum hoc modo serum sanguinis (quo tum ipse sanguis, tum etiam recens natæ fervidæ istæ & variolosæ particulæ diluuntur) foras propellitur; his interim particulis vires fumentibus, & ferociam, eo quod jam liberæ sint a colluvie serosa, quam sudores exhauserant. Verbo dicam, febris aliorumque symptomatum alleviatio a provocato sudore, & pustulis exinde præmature exactis, quamplurimis male cessit, qui eam ob causam, vitam cum morte die undecimo commutarunt.

Observandum est autem, me ægro primis morbi diebus lecto interdici ex hypothesi tantum Variolarum e confluentium genere subsecuturum: Namque distinctum genus quod attinet, modo certo prævideri possit, ut nulla ægro impetatur necessitas se in lecto jugiter continere, ita illum ab eodem nullus abigo; cum exanthematum paucitas, siue hanc, siue illam viam incedentem in tuto collocet.

Nihilominus non usque adeo mihi assentor, ut ea, quæ jam tradidi, ex autoritate judicii mei (quod scio quam sit exiguum) credenda autumem. Et profecto, ita parum firmas, & nullius fere ponderis hominum quorumcunque opiniones semper duxi, ut proprias eadem ubique pro suspectis habuerim, quoties cum aliorum sententiis pugnant: quod & hic etiam mihi usu veniret, nisi phænomena practica quasi uno ore rationis judicio suffragarentur. Seclusis enim practicis observationibus, id quod vel mihi, vel alii cuilibet pro ratione habetur, nihil fortassis erit aliud, quam rationis umbra aut phantasma, hoc est, mera opinio. Et quoties inter homines fuerim, certior inde redeo, quam sit periculosum, vel acutissimo ingenio præditis, cerebrum in qualibet siue arte, siue scientia indaganda agitari perpetim & quasi concalescere, nisi factum ipsum veri ac falsi iudicem ac sequestum constituent; quodque istiusmodi magni opinatores, ut cum Cicerone loquar, in controversiis pure speculativis, gradibus vel spatiis infinitis, quantum cuiquam possit innotescere, a veritatis scopo aberrant. Cum qui ad illa tantum applicuerit animum, quæ praxis certo determinare queat, si quid forte fuerit hallucinatus, nullo negotio aberrare liberabitur, ad hanc ceu ad Lydium lapidem probatis, quas animo conceperat, rerum ideis. Non in hoc nostro negotio, an non mihi licet observare a quo maxime regimine adhibito, mitius aut sævius Variolarum genus producat, atque adeo conformem rei evidentiæ sententiam animo procudere? Quod si alii idem fecerint, satis habeo. Iniquissimum est autem, cum ne semel quidem per omnem vitam fuerint experti, quantum ægro profut noceatve jam sæpe memorata e lecto interdiu immunitas, me tanquam fallarium convitiis proscindere. Quod si jam olim vera, licet inopinabilia, sentientes calumniandi libido obtinuisse, fano quicquam tentasset quo invento homines juvari possint. Et nemo quorsum ego has mihi facerem molestias, nisi repetita sæpe & fere quotidiana experientia, hanc methodum vulgari ista longe tutiorem esse inclamaret? Non sum usque adeo delirus atque inops mentis, ut famam mihi quæram ab exagitata atque explosa eorum opinione, qui, si plausum venarer, omni obsequio mihi ambiendi erant; neque malitiam tam deploratam cuiquam videri possim, ut hominibus, etiam sæculis aliquanto multis post mea fata nascituris, ex mea, si quæ erit illa, autoritate insidias struam, & vel mortuus, quod horreo referens, perinde ac vivus, illos occidam. Utut sit, hac ego methodo meos ipsius liberos, sanguine & propinquitate conjunctissimos quosque, & quotquot se mihi libere permiserunt, omnino curavi. Si quid deliquerim, in eo a me erratum est, quod obstinatæ contra sentientium pertinaciæ, ne durus ac præfractus haberer, aliquoties cessi, atque hac de re eorum fidem appello, quibus maxime familiaribus usus sum. Sed hoc ad infelicitatis meæ cumulum accessit, quod aliquoties, etiam ubi astantes, ea quæ suaseram omnia per integrum morbicursum fuerant aspernati, ægri tamen satum (etiam si a calore quem promovebant amici & curatrices, me ad ravim usque reclamante, extincti) mihi crimini dabatur. Qua de causa accedente insuperabili *ἡ πολλὰν* præjudicio, bene mecum agi putarem, si nunquam deinceps ad Variolis laborantes accerserem.

Haud equidem inficias eo, Variolas, quocunque demum modo tractentur, nonnunquam tamen insigniter confluxuras, unde etiam nunquam vacant periculo, quicquid suppetiarum afferatur; id autem assero (quod mihi satis esse debet) diuturna atque iterata sæpe sæpius experientia innixus, eum in longe minori discrimine versari, qui a primo morbi insultu lecto interdiu, & carnibus omnino abstinent; nec nisi potum tenuiorem sibi indulgit, quam qui statim lecto adjudicatus, medicamenta etiam cardiaca assumpsit. Hæc etiam methodus, quod supra etiam innuimus, ut plurimum densam nimis exanthematum segetem cohibebit, & ex consequenti etiam immodicam febris secundariæ effervescentiam, quæ non solum suo Marte perimit, sed etiam salivam (de qua in hujus morbi historia fufe egimus) præponere incrassando, ægro perniciem ultimis morbi diebus minatur. Quid quod hoc pacto tum sanguinis mictus, tum maculæ purpureæ præcaveri possint; quæ duo symptomata primis morbi diebus invadunt, idque per sæpe nullo adhuc manifesto eruptionis indicio: quod etiam in morbillis, scarlatina febre, atque acutis aliis ab intentione inflammationis gradu ortis, fieri assolet. Mitto jam jucundissimum

istud refrigerium, quo se æger perfundi animadvertit ab aeris appulso liberiore, quoties a lecto calente dimittitur; quod etiam singuli, quibus id per me licuit (maximas agentes gratias, quasi vita & spiritu receptis, ac aura postliminio vefcerentur) pleno ore agnovērunt.

Unde mihi subit cogitare, quanto sæpius fucum nobis facit illa, quam talem esse opinamur, ratio, quam sensus iste certissimo nobis cognitus; quodque in morborum curatione, plus dandum est ægrorum appetitionibus & desideriis impensioribus (modo perquam enormia non fuerint & quæ vitam ipso facto extinguant) quam magis dubiis ac fallacibus medicæ artis regulis. Exempli gratia. Febre ardente laborans, tenuioris potus refrigerium liberaliori manu concessum iri vehementer efflagitur; Artis etiam theorematum hypothesi alicui innixa, quæ sibi alium scopum proponit, quocum pugnat liquoris frigentis indulgentia, appetitui adversantur, & huius loco medicamentum cardiacum imperant. Idem æger alimenti omne genus, dempto potu tenui, maximopere fastidit; hic ars, maxime illa quam profitentur curatrices & amici adstantes, omnino comedendum esse acriter contendit. Alter post diuturnum ab eadem causa languorem, absurdi aliquid, & quod forte nocere posse videatur, obnixæ petit; Ars iterum molesta se opponit; & mortem intentat morem non gerenti; nisi forte ipsius artifex sanum illum prudentissimi Hippocratis aphorismum probe concocerit, *Gibus & potus paulo deterior, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus* (hoc est minus gratis) *est anteposendus*. In his omnibus naturæ, ut videtur, oberrationibus, quilibet in praxi medica vel mediocriter versatus, modo animum diligenter adverterit, facile concedet ægros haud paucos, ubi primum spreto Medici distamine, genio suo obsecundaverint, se melius habuisse. Neque hoc sane mirabitur, qui secum reputaverit, sapientissimum rerum omnium Conditorum Statoremque universa tam exquisito ordine absolvisse, ut sicuti omnia naturæ mala ad concinendam totius operis harmoniam egregie conspirent; ita eorum singula divino quodam artificio, propriæ essentia quasi intertexto, donantur, quo subiectum eadem mala a se amoliantur; quod in morborum quamplurimum acutorum exitu naturali satis cernitur (*Acutos dico, qui ut plurimum Deum habent Authorem, sicut Chronici ipsos nos*) uti etiam in propensionibus istis quæ tales comitantur morbos, & ad ægrum ab illa perniciæ liberandum viam struunt, quam ars affert, quoties in fatuos cadit. Atque in hoc sane bene cum hominibus agitur; quorum genus universum aliter se perquam male habuisset, tum cum ars medica intra breves *Hellados* cancellos tota staret, quæ quidem eam fere ad terrarum orbem proportionem habet, quam habet ignobilis aliqua villa ad nostram hanc *Britanniam*. Et quid vel impræsentiarum de tot tantarum regionum incolis fiet, cum omnis *Asia*, *Africa* omnis, atque annis etiam *America* (demptis aliquot nuperis *Colonis* haud ita populosis) atque insuper magna *Europæ* pars, arte medica prorsus destituantur? Attamen ut eleganter Comicus, viros rationis ac virtutum usu præstantes, ab eorum grege, qui formam humanam vitam ad instar brutorum *ἀλόγων* acta conspurcant, distinguens, *ὦς χεῖρον* inquit, *ἐς ἀνθρώπους, ἢ ἀνθρώπους*; ita etiam ars medica, si revera ars fuerit, & non solum nomine tenus, maximum est donorum omnium, quæ hanc vitam respiciunt, tantoque cæteris omnibus præferendum, quanto ipsa vita iis, quibus in illa gaudemus, præcellit.

Sed ut ad rem redeam: Quantuncumque conducatur plerumque ægro ut primis morbi diebus lecto non addicatur, est tamen (quod observandum) ubi etiam ante eruptionem omnino addici debeat. Exempli gratia, *Infans* de symptomatibus dentitionem comitantibus jam securus, derepente *Spasmo* corripitur: in hoc casu cogitandum est mihi, convulsionem istam fortassis a naturæ conatu quo *Variolas*, *Scarlatinam* *Febrem*, aut *Morbillos* in corporis habitum protrudere satagit, pendere, licet hucusque lateant sub cutis tegmine. Ut itaque tam periculoso symptomati eamus obviam, *Emplastro Epispastico* nuchæ mox applicito, lecto quamprimum committendus est; exhibitio insuper medicamine aliquo *Cardiaco*, cui etiam *Paregorici* pauxillum admiscendum, quo & potentius morbi causam eliminet, atque etiam tumultum a quo oritur paroxysmus consopiat: Verbi gratia, puero trienni, *gutta v. Laudani liquidum Aquæ Epidemicæ cochleari uno* (aut quid simile) sunt propinandæ. Et profecto suspicor admodum, ne dicam certus sum, millenos aliquot infantes, & nonnullos etiam ætate provectiores, idcirco letho fuisse datos, quod non satis animadvertierint Medici huiuscemodi convulsiones nihil aliud fuisse, quam morborum jam dictorum prænuncios: cum enim Præctici paulo incautiores, paroxysmos hosce revera symptomaticos pro affectibus essentialibus habeant, enematis sæpe repetitis & aliis evacuationibus eos aggressi, Variolarum eruptioni officiant, ac proinde permanentiores etiam reddunt paroxysmos istos, quos tanto molimine opprimere student, quique alias, ubi primum pustulæ eruperint, sua sponte certo certius evanescerent. Hic autem, fausto lætoque omine (quod alibi diximus) Variolæ, quæ cum spasmo teneriores pueros invadunt, raro insigniter confluent, unde æger longe tutius lecto conceditur primis hisce diebus. Licet observaverim Variolas, quoties *Affectus Comatosos* a tergo insequuntur, admodum continere; quo in casu ipsemet veficatorium, & paregoricum, quale supra descripsi, potius adhiberem, quam ut ægro iugem lecti usum ante eruptionem permitterem. Quinimo animadverti ejusmodi *Convulsiones* quandoque (oppido tamen raro) *Intermittentium Februm Paroxysmos* præcedere; *Affectus vero Comatosos* cum dictis paroxysmis una invadentes & non nisi cum iisdem terminantes, tam in infantibus, quam adultis persæpe vidi, quorum similiter nulla in curatione ratio habenda est, sola autem febris, utpote morbus primarius & essentialis, omni ope est expugnanda. Si enim comatosi hisce affectibus febrem comitantibus curandis præcipue incumbemus, ac proinde venæ sectione, catharsi, atque enematis repetitis, sopori vincendo operam navarem, febrem inde magis accenderem, & ex consequenti eo usque augerem comam (quod mihi erat tollendum) ut æger tandem ab eo æternum conspiretur; quando si in febre debellanda totis viribus contendam, symptomata omnia ab eadem pendentia nullo negotio una facessent. Quod serio notari velim, cum in hac re tam crebro tamque fataliter errari soleat. De hoc vero alio in loco fusius dixi.

Aliquod etiam (quod proxime tradam) quantumlibet ægro conferat ut lecto interdum abstat, nihilominus non potest id solatii eidem indulgeri, *ægritudine* sc. *vehementiori*, *intensiori Febre*, *Vomitu*

enormi, *Vertigine*, *Artuum dolore* quasi rheumatismo laboret, & similibus contra indicantibus: quæ quidem symptomata omnino sæviora si fuerint, maxime in sanguineis & ætate florentibus ingentem materiæ variolosæ copiam intus natam, & discrimen haud vulgare, a pustulis exitum certatim quærentibus, ac mox valde confluentibus, præfagiunt. Cum itaque frænum fermento ita exorbitanti omni ope injiciendum sit; attamen hinc quidem illud continuo lectulo calore adjutum ferociet magis, illinc vero præ nimia ægritudine eodem abstinere nequeat ægrotans, nisi suppetias afferamus; has ob causas omnino necesse erit, rebus sic stantibus, *sanguinem* primum e brachii venis educere, & post aliquot horas *Emeticum* eradicativum ex infusione *Crocii Metallorum* exhibere, quod non solum materiam, a quo oritur ægritudo ista insolentior foras propellit, sed etiam ægrum ita refocillat, ut jam quasi sanus lectulo abesse queat. Neque huic soli methodo innitendum est ad infringendas fermenti vires, sed quo magis æger in tuto collocari possit, præter evacuationes jam memoratas percommodum erit *Vitrioli Spiritum* potui tenuiori, quoties eum haurit, liberalius immiscere, etiam usque ad plenam pustularum eruptionem. Non obstantibus tamen hisce evacuationibus, tum etiam usu potus refrigerantis, æger nihilominus non nisi nocturno tempore lectulo permittendus est, si quidem fieri potest, quoniam hæc universa longe minus ad inhibendam præproperam materiæ variolosæ assimilationem faciunt, quam una sanguinis contemperatio a novo aere per pulmones subinde recipiatur: quæ quidem sola mirum in modum ægritudinem symptomaticam, de qua supra, sublevari confestim, quod a me non uno experimento comprobatum est. Hæc autem methodus paulo insolentior non nisi in ætate florentibus, quorum quidem sanguis sive a Venere, sive a Baccho incaluit, atque in aliis (infantes tenellulos semper excipio) quos una cum Variolis vehentiora atque enormia ista symptomata jam dicta adoriuntur, necessario requiritur. Ubi sanguis non usque adeo accenditur, neque ita urget symptomatum violentia, uti materiæ variolosæ præmature assimilandæ longe minor est suspicio; ita ex consequenti & evacuationes præmemoratae, & vitrioli spiritus omitti possunt.

Longior in his fui, quia sat scio curationis exitum, sive lætum, sive funestum, ab ea potissimum, si non insolidum, ratione pendere, qua æger primis morbi diebus tractatur. Jam vero omni pustularum acie quasi in campum eduçta (quod *die* ab invasione *Sexia*, quarto autem inclusive ab eruptione prima fieri jam diximus) haud amplius interruptendus est ægro lecti usus per reliquum morbi decursum: qui quidem ut ante hunc diem concedi non debeat, ita ut diutius differatur, vix patitur ægri status, modo confluentibus Variolis laboret. Hoc autem est genus (quod notari velim) de quo hætenus verba fecimus. Quæ enim & pauca & distincta emergunt exanthemata, parum habent momenti sive in hanc, sive in alteram partem, si vel mediocriter in arte valeat is qui medetur. Quamquam etiam in genere hoc, utut suoapte ingenio omni periculo vacet, haud pauci (quod serio dolendum est) Libitinæ cesserint, quoties scilicet malo suo fato in eos inciderint, qui in promovendo calore spem omnem ponentes, cum morbo ad jugulandum ægrum, licet inscii, conspirabant.

Tempore ab hoc pustulæ augescere & corporis superficiem undique concalescere incipiunt, at caput in primis, unde æger, nisi fuerit infans, ad somnum difficilior est, & inquietudine vexatur: Quod proximo loco in hoc morbo diligenter expendendum esse arbitror; prout enim sedatior fuerit sanguis, ita debitum augmentum & magnitudinem acquirunt pustulæ, atque ex adverso, pro ratione orgasmis, quo tumultuatur dictus sanguis, pustulæ marcescent, intercepto ulteriori progressu; unde non solum peccantis materiæ eliminatio sufflamatur, sed insuper singularum phlegmonum æconomia & genuina crasis inturbatur; indeque vel non omnino debito tempore ad separationem pertingunt, vel ichor demum fit puris vice, & loco flavi liquoris favum colore referentis, nigricans aliquis humor, vel succus alius non naturalis, & a genuinis Variolarum pustulis alienus, egeritur. Quapropter medicamenta *Paregorica* æque indicari in variolis confluentibus mihi videntur, ac indicatur quodvis remedium in quovis morbo; cum hic quasi *Specificæ* sint, perinde ac cortex Peruvianus in febribus intermittentibus: quamvis haud ignorem paregorica non virtute aliqua præcise specificæ operari, sed isti solum indicationi respondendo, qua sanguini & spiritus consopendis, & in ordinem redigendis operam damus. Atque hic quidem sanguinis & spirituum motus inordinator (Variolarum confluentium in adultis comes individuum) anodynorum usum præ cæteris deposcit, necdum ei satis innotescit huiusce morbi genius, qui ista vigiliis tantum deberi existimat. Sicuti enim fieri quandoque potest, ut etiam non dormiens bene compositis ac sedatis fruatur spiritibus, (quod ab assumpto Laudano persæpe accidit) ita etiam nonnunquam fit, ut spiritus vehementius agitati laudabili pustularum eruptioni officiant, etiam ubi æger multum dormiat, quod observatione dignum.

Ut de genere anodynorum jam loquar. Tametsi ego a multis annis *Laudanum liquidum* satis auspiciato exhibuerim, quoties huic indicationi satisfaciendum erat, nihilominus *Syrupum de Meconio* ipse præferendum censeo, licet enim utrumque ad eundem scopum dirigatur, tamen Laudanum paulo magis calefacere mihi videtur, syrupus autem minus. Dosin quod spectat syrupi, ea non solum ægri ætati est adaptanda, sed & symptomatum gradui, & quæ homini, qui sedatos habet spiritus & probe compositos, nimia forte erit, alteri, cujus spiritus ferociunt magis, vix sufficiet. Exempli gratia, ponamus in genere sex drachmas plerisque convenire, jam in variolosis, quoties id remedii indicatur, vix intra *Unciam*, si quid præstare velimus, est subsistendum; quæ quidem quantitas singulis vicibus morbo decurrente imperanda est. De adultis agimus impræsentiarum, etenim si infantibus propinetur, dosin pro ratione ætatis erit minuenda. Et sane paregorica non perinde indicantur in infantibus variolosis, ac in adultioribus, cum illi in somnos perdurante morbo proniores sint. Quamvis & in his quoties a morbo periclitantur magis, a paregorico abstinere multum extimescerem. At, quod dicere animus mihi erat, difficile est admodum paregoricorum dosin, quocumque in casu ista indicantur, certo determinare. Etenim sive in quocumque *Spirituum motu inordinatori*, sive in *vomitum enormi & alvi fluxu*, sive etiam in *dolore atrociori* (in quibus affectibus tribus præfertim usum paregoricorum indicari alibi docui) ea methodo sunt exhibenda, ut si prima dosin metam non attingat, alia atque

atque alia debito tempore assumatur, donec tandem medicamentum Medici votis responderit, non tam ad ingestam anodynæ quantitatem, quam ad effectum, quod in ægro producendum erat, respectu habito, quod ubi primum successerit, nec citius, Paregorici usum ita copioso ac frequenti cessandum est: interposito tamen semper inter singulas doses spatium aliquo, ut pernoscere valeamus, utrum dosis ultima id, quod quærimus præstiterit, antequam nova ingeratur. At ubi semel finem propositum obtinuerimus, doses anodynæ in morbi progressu exhibendi, jam minor pro re nata definienda erit.

Exempla haud pauca in promptu mihi sunt, quibus eis, quæ hæcenus tradidi, fidem astruam, at unicum impræsentiarum adducam. Aprilis 13. anno 1681. quædam e nostra vicinia, nomine *Crosse*, ad me accedens atque flens obnixè petiit, ut filium ejus decennem adirem, qui a die quarto male habens, Variolis, ut ipsa metuebat, jam laborabat. Ego a podagra, quæ me tunc temporis excruciebat, detentus, Pharmacopolam, quo uti soleo, rogavi ut ægrum inviseret, ac mihi de ejus statu referret: rediens ille mihi narravit, pueri matrem e nescio cujus mulierculæ consilio, *pulverem Comitissæ* & alia calidiora remedia filio propinasse, quin & stragula adjecerat matris indulgentia, sub quibus quasi defossus latebat æger, ut horum pondere sudores (ad quos ceu ad sacram anchoram in hoc morbo foeminae confugiunt) exprimeret; ad hæc magnam *Posseti* calentis vim, *floribus Calendulæ* & *cornu Cervi incollis*, ægro infuderat; unde adaucto febris calore, tantam spiritibus confusionem induxerat, ut præter modum deliraret æger, totis adstantium viribus vix lectulo affixus, ac incondita quædam, furentium ad instar, submurmurans. Nondum ramen in lucem prodibant exanthemata, vel saltem obscuræ, sed densæ agmine cutim impetebant, inhibita plane eruptione ab hac methodo violentiore, quæ ad eam sollicitandam destinabatur. Jubeo ut eo lecto eximatur quanto ocyus, neque eundem nisi noctu ingrediatur ante elapsam *sexum diem*: dein ut syrupi de Meconio unciam dimidiam statim sumat, quo ne hilum proficiente post horæ spatium eandem dosin repetat, at nullo cum fructu; quippe quod sanguis tam immani furebat orgasmo, ut non nisi uncis duabus cum dimidia (spatio tamen inter singulas semiuncias interjecto, quo liqueret quid postrema dosis præstiterat) intro assumptis frænari posset; quo facto, unciam dimidiam tantum singulis noctibus hauriendam præscripsi usque ad finem morbi: quæ quidem illam spirituum requiem, quam crebrior exhibitio paraverat, tueri jam partam valebat. Unde etiam convaleuit æger.

Hic minime reticendum est, quod in quantacunque demum dosi & quantumlibet repetita exhibeatur primis hujus morbi diebus Narcoticum, modo sanguinis æstus atque enormis spirituum agitatio magnopere ferociant, vix scopum attingere poterit id, nisi æger a lectulo eximatur: Calor enim lecti calorem morbi ulterius auget atque incendit; proindeque vim ita magnam Narcotici exhibere necesse erit, cui forte natura impar fuerit. Quod etiam usu venit, etsi haud tanto vitæ discrimine, quando cortex Indicus exhibetur in febre intermittente, ægro per ejus usum in lecto se continente. Et hoc, ni fallor, in causâ fuit, quod curatio hujusce febris nonnunquam protelata fuerit, quæ alias citius absoluta esset, & quandoque etiam si febris remittens tantummodo, & non interstincta erat, eadem adeo intendebatur, ut mortem ipsam æger haud effugerit.

Missis autem casibus extraordinariis, in quibus nullo non morbi tempore indicari potest hoc remedium, ego ista primum nocte exhibendum suaferim, qua lecto jam in totum addicitur, *sexta* nempe a prima invasione, a quo tempore usque ad *diem decimum septimum* omni vespere est propinandum, vel saltem donec æger *ἔω βέλων* quod ajunt, fuerit constitutus. Sexto enim die caro phlogosi quasi corripitur; unde caput ab humoribus exinde concalescentis turbari incipit, & vacillare.

Curandum est autem sedulo, ut anodynum temporius sumatur hic, quam in aliis morbis: quoniam quidam calor, & inquietudinis quasi paroxysmus variolosus sub vespere semper affligit; & quandoque accidit, quod, nisi maturius exhibeatur sub ultimis morbi diebus, æger, repente paulo hebetior factus, mox incalescat, post de ægritudine queratur, quæ brevi in ipsa morte terminatur; attonitis haud parum amicis, qui paulo ante magnam de ægro, ceu convalescente, spem foverant. Cui tanto malo occurrere fortean poterat anodyno confestim ingesto. His itaque diebus, *undecimo* vero præ cæteris, paregoricum temporius propinandum impero, etiam hora quinta sextave pomeridiana, utque in promptu sit, si quando forte ægritudo ex improvviso invaserit. Quinimo persuasissimus sum, nonnullos ex mihi notis ideo fato functos, quod dicto medicamento, re jam postulante, destituerentur; cujus ope, si adfuisset, adhuc inter vivos numerari potuissent. Atque hoc in loco maxime, si in quo unquam alio, *Occasus præceptus est*.

Quapropter cum tam ingens discrimen impendat, si Narcoticum vel sat cito non fuerit propinatum, vel si e diverso ita præmature, ut ejusdem vis paregorica, & spirituum sedatrix exoleverit, quam illud repetendum veniat, idcirco cum res in lubrico sit, tutissimum omnino est anodynum statis horis, tam mane, quam sero exhibere, ultimis sc. & periculosis morbi diebus. Neque hoc tempore syrupi dicti uncia semper sufficit, cum ea quantitas nihil præstet magis in intensiori sanguinis inflammatione, & spirituum animalium exorbitantia insigniore, quam uncia dimidia in morbo mitiore. Quinimo iterata experientia me edocuit, *Sesquiunciam* in juvenibus, & sanguineo temperamento præditis pro singula dosi, violentiæ symptomatum, quæ tunc ingruunt, & in quibus præcavendis totum sumus, frangendæ parem tantum esse; quodque hæc ipsa dosis in talibus subjectis, atque iis temporibus, mane & sero, non tuto tantum, sed cum magno etiam ægrorum commodo, repeti possit, donec illi convalescant.

Neque vero hoc reticebo, quod in ultimis diebus Variolarum egregie confluentium quandoque necesse habui etiam ter in spatio diei naturalis, i. e. octava quaque hora, Narcoticum exhibere; quando scilicet, vel ob violentum spirituum orgasmum, vel ob eorundem confusionem ægritudinem aliqualem inducentem, longiora ab usu ejus intervalla haud concederentur. Hoc autem notandum, quod si tam frequens diacodii exhibitio ægro nauseam crearet (quod in dictis sæpe accidit) hoc in casu *Laudanum liquidum* propinandum; cujus gutt. xvj. idem valent, ac *ʒj. syr. de Meconio*, nempe si eodem modo præparetur, quem in *Libro de Morbis acutis*, & in *Cap. de Dysenteria* ibidem descripsi.

Objicient, sat scio, illi, quibus hæc minus placent, materiam *Sydenham Opera Medica*.

peccantem a Narcotico toties, & in tam larga dosi repetito, fixam iri, & ptyalismum retundi. Quibus respondeo, omnino fatendum esse salivationem aliquatenus imminui, nunquam tamen ita penitus cessare, ut non longissimis ab assumpto anodyno intervallis, atque ejus vi jam fatiscente, nonnihil recrudescat, immo vero gemino hoc commodo stipetur. Primo quod æger, viribus a Narcotico instauratis, pituitam validius expectorare valeat. Dein quod saliva, quæ excreatur, licet parcius sit, rectius tamen excocta est, quam si anodynum non fuerit exhibitum. Proximo loco, ptyalismus defectus hic partialis plusquam compensatur faciei manuumque tumore, qui ex repetito paregorici usu, & certior est & major in iis diebus, quibus hæc partes solent intumescere: facies scil. ab octavo die usque ad undecimum, (quo tempore fere incipit subsidere) manus vero ab undecimo, usque dum pustulæ eas obsidentes maturuerint. Atque fidenter assero, neminem in hoc morbo probe versatum posse negare utriuslibet horum tumorum absentiam, quo tempore se debent ostendere, pejoris esse ominis, quam ptyalismum interceptum. Me quod attinet, longe tutius esse autumo, ptyalismum compescendi discrimen subire, quam a Narcotico abstinere: quod ita impense morbus hic efflagitat, ut in eo rudis sit oportet, & parum observationi deditus, qui ægros suos subsidio tanto defraudat.

Non vero ita capienda sunt, quæ hæcenus differui, ac si ego quotidianum diacodii usum, vel ea quæ convenit dosi, in tenellulis infantibus, qui Variolis confluentibus laborant, suaderem, nisi morbus periculuni grave intenter, idque duabus de causis; primo, quia usque adeo non calant infantes, atque illi, quorum vitæ fax plenius accensa jam luculentius ardet; dein quod Narcoticorum jugiter assumptorum vim non ita bene ferat ætas inoliior, & magis infirma. Adde quod sponte sua somno fere perpetuo morbi tædia fallunt infantes. Nihilominus quoties, vel phrenesi illi corripuntur, vel pustulæ mali moris sunt, anodyna omnino indicantur, horum enim utrunque sanguinis atque spirituum animalium motum inturbatum plus satis evincit.

Duo hæc, quæ adeo prolixè tractavimus, nempe ista methodus, qua inhiberi debet præpropria materiæ variolosæ primis in diebus assimilatio, tum & altera, qua motus spirituum inordinatus ab externarum partium inflammatione excitatus, est præcavendus, duo sunt quasi cardines, in quibus omnis hujus morbi curatio vertitur, quandoquidem quæ ex eo oriuntur mala, quod utrique huic discrimini non satis occurreretur, funesta illa symptomata invitant, quibus Variolarum tragœdia absolvitur. Quocirca cum præcipuè hæc fuerint indicationes curativæ, ubi iis modo jam tradito fecero factis, nihil amplius mihi restat agendum, in quantum scil. Medicus sum, non vero formularum medicarum Præscriptor. Quas ego duas, sive artes, sive dotes, sive etiam provincias appellare libeat, toto cælo a se invicem distare arbitror.

Unum adjicio, si *Epispastico* opus fuerit, id peramplum, & satis acre ægri nuchæ applicandum; quod ita opportuno tempore fieri debet, ut neque præmature appositum vim epispasticam ante diem undecimum, in quo de summa rerum agitur, amiserit; neque in eum ipsum diem rejiciatur, quo jam tardius adveniens, illo temporis articulo obesse possit, præ calore, & æstu, quem sanguini imprimit, cum febre secundaria vix pari marte tunc decertanti. Opportunissime itaque applicabitur epispasticum nocte illa, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico, quod tunc erat exhibendum. Apposito per id temporis vesicatorio, dolor, quem ejusdem morsus afferet, desinet ante diem illum, quo æger vel agonizaturus, & materiæ peccanti eo ipso tempore dabitur exitus, quo eo est opus ad vincenda mala ista, quæ illum diem præstolantur. Hoc enim primum tempore, quod in hujus morbi historia fusc deduxi, facies, quæ hæcenus inturgescebat, jam detumescere incipit, & salivatio, quæ hucusque pleno amne fluebat, decrescere, condensato jam, & non nisi ægre excreto, qui eam excitabat, humore. Ut vero mittamus epispasticum illud tum faciei detumescentiæ, tum etiam imminutæ salivationi quadanteus substitui, febrî insuper secundariæ perdomandæ aliquatenus conducit, quæ nunc temporis invalescit, sanguine quasi obruto, & penitus infecto puris copia a toridem abscessulis refopta; adeo ut in omnibus fere, quos unquam tractavi, Variolis laborantes, observaverim, pulsus in carpo salientem ægre percipi posse hoc tempore, utut facile se pridie hujus diei, & postridie etiam, digito exploratori se proderet.

Sed inter ea, quæ a capite sive derivant, sive revellunt, nihil æque mihi videtur operari ac *Allium* pedum plantis applicitum. Quod allium revera attrahat, manifestum est a vesiculis, quas sæpe excitat; & a dolore illo non ferendo, quem nonnunquam, licet raro, affert, etiam non excitatis vesiculis, humores scil. in partes illas invitando; unde dolor tam vehemens quandoque exortus est, ut cataplasmate e mica panis similaginei in lacte cocti eundem sedare necesse habuerim. In adultis itaque qui variolis confluentibus laborant, allium incisum, & linteum involutum plantis pedum admove-re soleo, a die octavo, in quo primum facies intumescit, donec jam morbus periculo omni vacet, singulis diebus renovandum.

Neque interim istud mihi prætereundum est, ægrum scil. a carnibus, durante morbo, arcendum omnino esse, & cerevisiam lupulatam eamque tenuissimam tantum pro potu concedendam. Jusculis avenaceis, pomis coctis, & jam dicta cerevisia commodissime interea vitam tolerabit. At vero instante jam maturatione, ubi particulæ purulentæ in sanguinis massam regurgitantes eandem tabo suo inquinaverint, utile erit cochlearia vini aliquot, singulis auroris, & noctibus ægro indulgere. Stragula quod attinet, & lodices quibus æger in lecto est contegendus, neque plura sint illa, neque pauciora, quam quibus sanus utebatur. Quin & liberum ei sit, quoties voluerit, se ab hac in illam lecti partem transferre, quo præpediri possint sudores isti symptomatici, quos ægro nocere satis opinor, evici. Eodem pacto etiam præcavebitur effractor exanthematum phlogosis excitata a nimio calore, quem carnes contrahunt, quoties æger semper eodem in loco, ceu palo defixus, jacet. De hoc autem alias prolixius differui.

Casum nuperrimum, ceu specimen integræ hujus praxeos, subnectam. Hac ipsa hyeme me accersebat foemina nobilis, Domina *Dacres*, ut quendam suum nepotem, Dominum *Thomam Gheut*, temperamento perquam sanguineo, & ætate florentem Medicus curarem. Pridie coeperat febricitare vehementer; colluviem biliosam in magna copia per vomitum rejiciebat; dorsum plurimum dolebat. His malis solatium quærens & levamen, lectum petebat, & tum stragulis

acervatim injectis, tum calidis assumptis liquoribus sudores per diem integrum omni ope sollicitabat, sed frustra, cum tanta ad vomendum proclivitas, & alvi fluxus, licet modicus, omnem sudorificorum vim eluderent; Oleum interea febris igni affuderat, quo illa multum increverat. Ego jam Variolas brevi exoriturus suspicabar, easque insigniter confluxuras, tum ob ætatis vigorem, tum etiam, quod sanguinem multum excalescebat irritum ardoris extorquendi conatu, (quo quidem, si modo æstate ægrotaverat, & nictum sanguineum, & maculas purpureas certo advocaverat) tum vero maxime, quod semper observaverim in juvenibus immani vomitione, ægritudine, & dolore præter solitum vexatis, Variolas in sequentes ultra modum confluxisse. Meum itaque esse ratus, ut nullum non lapidem moverem, quo præproperam materiæ variolose assimilationem obstruerem, a lecto illum arcebam, nisi statis prius horis somni. Die sequenti (tertius is erat) Variolis nondum comparentibus, sanguinis uncias octo e dextro brachio mane extrahi curabam: optimus erat ille floridusque, cum adhuc spirituosum tantum *μιασμα* exceperat, nondum vero putredinem illam, quam conciliat longior morbi mora, & in eorum sanguine ut plurimum conspicitur, qui nuper ab hoc morbo convalescerent. Hora quinta post meridiem dei ejusdem, infusionis croci metallorum unciam unam exhibui, ex qua satis commode vomebat, & ægritudine levatus, longe melius habere visus est, jam haud invitum a lecto abstinent, a quo prius ægerrime se divelli patiebatur, ægritudine, & vertigine mactatus. Die quarto mane accedens, exanthemata, quibus præcavendis tanta fueram molitus, eo numero prodeuntia conspexi, ut ab insigniori, quem minitabantur, confluxu, ægri vitæ metuendum esset. Diligenter itaque cavebam, ne lecto interdiu committeretur; consulebam etiam, ut cerevisiam tenuem spiritu vitrioli instillato acidulatam potaret. In his ad sextum usque diem perseverabat; quibus diebus licet non ægrotaret, sed aura liberius vescens multum reficeretur, tamen alvo subinde laxiore fuit. Jam sub meridie non valebat ulterius, quod hic fieri assolet, se a lecto abstinere; decubuit itaque ad finem morbi, me non reluctante, cum nunc erpuissent pustulæ omnes, quæ, non obstante meo omni conamine, plus satis confluebant. Quamvis enim pauciora erant exanthemata iis, quæ in nonnullis observavi ab hoc morbo extinctis; plura erant tamen, quam plerisque eorum, qui sanantur, solent prodire. Hac primum nocte syrupi de Meconio unciam unam in Aq. flor. Paralyf. propinabam, singulis deinceps noctibus repetendam; suadebam etiam, ut non aliis stragulis, quam quibus sanus assueverat, reteretur: ut jusculis avenaceis, & hordeaceis, nonnunquam etiam pomis cocto vesceretur; Cerevisiam etiam tenuem hauriret. Die octavo allium incisum, & panno lineo inclusum pedum plantis applicandum curavi, & renovandum quotidie, donec extra aleam consisteret. Post hæc pro augescendum pustularum genio omnia cedebant, usque ad decimum diem, quo tempore mane cum invisens, licet mediocriter se haberet, febris tamen secundariæ quendam quasi prodromum deprehendi, cum jactatione aliquali. Mox itaque procellam veritus imminuentem, paregoricum supra laudatum exhibui, a qua tranquilla omnia, & pacata; eadem nocte syrupi de Meconio sesquiunciam præscripsi. Sequentie aurora, diei sc. undecimi, cum post exolefcentem vim anodynæ, quod hesternæ nocte sumpserat, jam de novo esset irrequitior, diacodii iterum sesquiunciam extemplo ingessi; vesperi item tantundem, atque eandem dosin mane, & fero ut assumeret quotidie consulebam, donec omnino convalesceret. Parit æger: neque aliquod nos deinde symptoma exterruit, nisi quod urina ei quandoque supprimeretur, (malum junioribus hoc in morbo familiare) quam tamen genubus innixus in lecto reddebat, ptyalismum quod spectat, quantumvis salivæ copia frequenti anodynorum in tam larga dosi repetitione aliquantulum interciperetur, tamen longiore ab eorum usu intervallo pituitam concoctam excreabat, ac facies manusque debito tempore pro votis intumescabant. Die decimo octavo e lecto surgebat, & tunc primum jusculum e pullorum carnibus indulgebam, a quo per gradus indies ad victum consuetum redibat. Die vicesimo primo sanguis mittebatur e brachio dextro ad uncias octo, qui pleuriticorum sanguinem æmulabatur, & puris fere instar erat. Denique ad quatuor vices, spatium interposito, purgatus fuit.

Hic subinnuam, quod quoties in his pagellis dies ab invasione v. g. sextum, undecimum, &c. nominaverim, non ita accipi id velim, quasi Variolæ confluentes tertio nunquam non die erumperent; cum satis sciam quandoque ita accidere, etiam in iis, quæ vel maxime confluunt, ut pustulæ non nisi post aliquod a die tertio temporis spatium se exerant. Eruptio autem ut plurimum in diem tertium ab invasione incidit, & ut plurimum, qui (ex gr.) die lunæ confluentibus Variolis primum laborare incipit, die Mercurii sequenti postularum primitias in cute summa deprehendit, & Jovis dies ab illo die lunæ secundus, undecimus ille erit, periculi plenissimus, nisi interposuerit se Medicus.

Atque hic iterum repeto Theoremata hæc omnia ad *Confluentes* tantum Variolas referri debere, quæ in genere distincto nullum prorsus usum habent, nec ab illo exposcuntur. Et tam sibi, quam aliis imponunt, qui attollunt cristas, quoties eos sanaverint, quibus exanthemata numero pauca, eaque interstincta efflorescebant. Si tentare libeat, quantum in arte valeant, in Variolis confluentibus vires experiantur; maxime quoties, vel florentes ætate, vel eos qui immodica vini ingurgitatione nimium incaluerint, hic morbus invaserit. Ne in levioribus exercitati, ita toto cælo aberrant, ut se eos servasse existiment, quos ipsi adstantes non occiderint.

Verum dissertatiunculam hancce non prius finiam, quam ubi retulero quæ mihi, dum hæc scriberem, suo ore narravit Amicissimus Dominus Carolus Goodall, M.D. Collegii Medicorum Socius, atque impræsentiarum Cenfor: quod mihi ideo faciendum duxi, quo melius iis fidem conciliem, quæ cum hic, tum alibi, & de petechiis, & de miætu sanguineo affirmavi: utrumque nempe hoc symptoma quoties acutis morbis accedit, atrociori sanguinis inflammationi omnino deberi, ac proinde refrigerantia indicare remedia. Casus se ita habuit.

Juvenis annorum quasi 27. habitu corporis extenuato, & calido temperamento præditus, febre violenta, & continua correptus est mense Junio, Anno 1681. Lingua erat sicca, & scabra, sitis vehemens, pulsus celer, dolor regionem cordis scrobiculo vicinam discruciat, dorsum vero in primis, (in quo jugiter deserviebat) sanguinem subinde meiebat, tum & petechiæ coloris subfusci collum, pectus, & car-

pos dense insidebant. Die sexto accersitus Medicus, & ægrum de vita periclitari a nimia urina sanguinolentæ excretionem comperiens, Indicationes curativas ad sanguinem refrigerandum increassandumque, cum etiam ad vasorum oscula; quæ in renibus relaxata debiscebant, obruanda dirigendas censebat.

Premiis itaque tum venæ sectione, tum bolo lenitivo, ægrum, ut a lecto, quantum fieri potuit, se abstineret, serio monuit, cum a continuo lectuli calore nictum sanguinis promoveri non dubitaret: suadebat etiam ut in culcitra corio tecta æger potius dormiret, supinus non nisi rarissime jaceret, lac aqua permistum, ut potaret, panatella, oryza lacti incocta, pomis coctis, sive solis, sive aquæ fontane intritis, & saccharo edulcoratis vesceretur. Medicamenta ordinabat sequentia.

℥℥. Fl. ros. rubr. ℥vj. cort. inter. Querc. ℥℥. Sem. Plantag. parum contus. ℥ij. Aq. Font. ℔ij. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem; infundatur in vase clauso calore leni per quatuor, vel sex horas. Colat. add. aq. Cinnam. hord. ℥ij. Sacch. albi. q. s. ut f. Tincturæ gusti grata, de qua sæpius bibat die noctueque.

Enema e lacte cum Syrupio Violaceo injiciebatur hora a meridie secunda: & hora somni sequens Haustus propinabatur.

℥℥. Aq. fl. Paralyf. Plantag. Cinnam. hord. an. ℥℥. Aceti stillat. ℥ij. Syr. de meconio ℥vj. M.

Die septimo, symptomatibus vix se remittentibus, Enema jam descriptum singulis diebus injiciendum curabat, tum etiam Emulsionem, Haustumque ad hunc modum præscribebat.

℥℥. Sem. Cichor. Endiv. Lactuc. Portulac. ann. ℥ij. Sem. Cydon. Papav. alb. an. ℥ij. Amygd. dulc. excort. n. jv. contundantur simul in Mortar. marmor. sensim affundendo Aq. Hord. ℔ij. colat. add. sacchar. Crystall. q. s. f. Emulsio, de qua bibat coch. xij. quarta quaque hora.

℥℥. Aq. fl. Paralyf. Nymph. germin. Querc. Plantag. an. ℥℥. Aceti stillat. Aq. Cinnam. hord. an. ℥ij. confect. de Hyacinth. ℥℥. Syr. di meconio ℥j. M. f. Haustus hora somni sumendus.

Die octavo, cum adhuc instaret febris, sanguis urinae immixtus copiosus exiret, & petechiæ in prememoratis partibus numerosæ comparerent, omnia hæc symptomata a sanguinis calore, tenuitate, & acrimonia, oriri conjectans, sanguinem secunda vice detraxit, liberaliorem cerevisiæ tenuis usum, cui vitrioli spiritus ad gratum acorem prius instillabatur, concessit: quam cum fastidiret æger, possetum e succo limonium, & lacte ei indulgit, uti etiam limonium pulpa in taleolas divisam, & saccharo involutam. Addebat & sequentia.

℥℥. Conf. Lujul. Cynorrhod. an. ℥℥. confect. de Hyacinth. ℥ij. Diascord. ℥ij. corall. rub. præparat. sing. Dracon. Bol. Armen. an. ℥j. Syr. e Symphyt. & Pilosell. q. s. ut f. Opiata, de qua capiat quant. Avellana sexta quaque hora, superbibendo haustum ferè lactis succo limonium facti, & sacch. alb. edulcorati, vel decocti Vulnerarii Spiritu Vitrioli acidulati.

Haustus hesternæ nocte præscriptus repetatur, cum Syr. de Mecon. ℥x.

Nono die petechiæ paulatim evanescebant, urina minus sanguine scatebat, quique inerat sanguis, facilius separabatur, & matulae fundum libentius petebat: hortabatur itaque ægrum ut in remediorum horum usu perseveraret, & diebus aliquot elapsis sequentia adjiciebat, ad eundem scopum collimantia.

℥℥. Conf. Ros. rub. per setaceum traject. & Vitriolat. ℥iv. balsam. Lucatell. ℥ij. Bol. Armen. Sang. Dracon. Spec. Electuar. Diacoral. an. ℥j. Syr. e Coral. q. s. ut f. Elect. de quo cap. quant. Nuc. Moschat. bis de die, superbibendo haustum Emulsionis sequentis.

℥℥. Sem. Lactuc. Portulac. an. ℥ij. Cydon. ℥ij. papav. alb. ℥℥. Amygd. dulc. excort. n. v. contund. in mort. marmor. sensim affundendo Aq. Plantag. ℔ij. Cinnam. Hord. ℥ij. Colat. ad Sacch. q. s.

His remediis, favente numine, æger intra septimanas tres a febre, & horrendis illis quæ memoravimus symptomatibus liberatus, petechiis abolitis, atque urina tum colorem naturalem, tum consistentiam recipientem, paulatim ad sanitatem, & vires pristinas rediit.

Quamvis autem symptomata ista jam dicta febre continuæ accrescerent, non vero illi morbo, de quo nos supra egimus; cum tamen quoties utrumlibet ea comitantur, a vehementi inflammatione, & sanguinis nimia attenuatione, unde sanguis per oscula vasorum quasi vi exigitur, semper ortum ducant; nullus subito quin par methodus in tanta causarum paritate omnino sit adhibenda, quantum se fert utriusque morbi genius. Quamobrem virum optimum rogabam, ut mihi per illum liceret hanc ejus curationem hic subnectere. Quam quidem si quis vel mihi infensissimus, (cum tamen alienos mores e propriis æstimans, nullum inimicum habere sperem) præstiterat; tamen veritate victus, præclarissimam eam fuisse omnium, quas unquam novi, curationum, lubens faterer: cum jandiu compertum habeam quam sit fatale feblicitantibus sanguinem cum urina excernere. Cum vero idem amicitia mihi sit conjunctissimus, quanto cum animi prolubrio, & veritati & viri amantissimi famæ mihi litandum erat? Hic enim ille est, qui cum pauci admodum me vel minimum quid in re medica sive indaganda sive etiam excolenda profecisse asserere auderent, maledicorum torrenti se medium objicere sustinuit, atque me parizelo, ac fide tutabatur, quo parentem filius. Quantumlibet autem beneficio tam insigni devinctus, nunquam tamen nisi eas, quas commervit laudes, prædicarem, cum perinde fere sit improbum, sive opprobrio, sive laudatione indignos afficere, quandoquidem utrinque a veritate discedatur. Nemo itaque mihi vitio vertat, si virum hunc ego nemini, inter eos qui mihi hæcenus innotuere, probitate secundum fidenter affirmaverim, cum in tot annorum spatio, quibus eo familiariter usus sim, nec dicto quandam lædere, quantum minus facto, sibi permiserit. Quantum vero in ea quam profitetur arte præcellat, inodo Deus vitam ei concesserit, brevi satis elucescet; cum eruditioni haud vulgari, quas omnes omnes medicinæ tam antiquæ, quam modernæ tractus perlustraverit, exquisitissimam in subtilioribus praxeos minutiis indagandis solertiam (sine qua nemo unquam medicinam merita cum laude faciet) catus attulerit. Unde etiam ægrorum suorum votis, bonus felixque cum primis respondet.

Hæc demum sunt quæ ipse de hoc morbo sentio, quæ non mihi suggestit phantasiæ imaginatricis temeritas, sed phænomena practica edocuerunt. Neque sane capio, qui fieri possit, ut fallatur is, qui cogitationes suas omnes mera ac nuda ejus sive artis sive facultatis praxi limitat, & determinat, quam sibi perdiscendam & cum laude exercendam proposuit; aut e contra qui possit fieri, ut non tam in ipso se, quam

quam in aliis decipiendis omnes vitæ annos prodigat ille, qui in iis excogitandis operam disperdit, quæ cum praxi nihil prorsus habent commune. Et sicuti haudquaquam factus probusve *navis ad Clavum Gubernator* fuerit ille, qui non tam ad breviam, & saxa submarina agnoscenda evitandaque, quam ad causas fluxusque maris speculandas animum advertit (quod quidem cum Philosopho sit dignissimum, ab eo tamen perquam est alienum, cui id tantum negotii datum est ut navis non submergatur) ita neque Medicus, cui non alia quam curandorum morborum provincia decernitur, quantumlibet ingenio cæterisque animi dotibus valeat, in arte vere medica proficiet, qui non tam in occulta, & tortuosa illa methodo, qua natura in nobis parit alitque (a qua etiam eorundem historia pendet) indaganda, atque in remediis eidem adaptandis omnes animi vires intendat, quam in curiosis & *παρέρχους* speculationibus cerebrum fatiget, ad homines orco eripiendos (quod spondet medicina) ne hilum facientibus. Quæ quidem prævaricatio non solum in causa est, quod genus humanum commodis illis & emolumentis privetur, quibus a plurimorum ingenio animique dotibus augeri potuisset, sed etiam efficit tandem, ut quæ medica appellatur, revera confabulandi garrindique potius sit ars, quam mendi. Atque eo tandem eventum est, ægris vivendum moriendumve sit, prout Philosophus, vel conjectando scopum attigerit, vel ab eodem aberraverit, quod in lubrico semper est atque ancipiti, cum primi isti speculationum repertores, non minus quam eorum mancipia, & servum pecus, de cerebrosis istis commentis bello quasi internecino invicem digladiantur, attamen nemo fortasse omnium ipsam veritatem assequatur. Quamvis enim, si mentem serio applicuerimus, quid de facto agat natura, & quibus in operatione sua utatur organis, deprehendere valeamus; modus tamen, quo illa operatur, mortales, aut ego fallor, semper latebit. Neque hoc mirum est, cum longe (immo supra omnem humanum caput longe) credibilius sit nos misellos homunciones ab illustri vitæ lucisque regione exulantes, methodum, qua in fabricanda machina usus est sapientissimus Artifex, capere nullatenus posse; quam fabrum ferrarium rudem prorsus, & imperitum nescire quo pacto concinnetur automaton horarum index, cuius structura, & motus exquisitissimam artis elegantiam præ se ferunt. Sicut de facto constat, cerebrum omnis tam sensus, quam motus fontem esse, tum etiam & cogitationum, & memoriæ officinam; & tamen non est possibile a diligentissima ejus inspectione contemplationeve mentem usque adeo illuminari, ut intelligere possit, quo pacto substantia ita crassa, & quasi pulpa quædam, neque operis, ut videtur, usque adeo affabre elaborati, usui ita nobili & facultatibus tam præcellentibus queat sufficere; neque exinde assignare quis potest, qua ratione ex naturæ ejus vi, & structura partium, sive hæc sive altera ista facultas necessario fuerit exerenda.

Atque hæc de Variolis confluentibus: Quibus si adduntur quæ in historia morborum acutorum de hoc affectu tradidi, summam habes eorum quæ mihi hæcenus innoruerunt, eaque omnia diligentissime, quod a me fieri potuit, trutinata atque expensa.

Accingo me jam (quoniam tu id postulas, Vir Eruditissime) ad ea exponenda, quæ de *Affectibus Hystericis* hæcenus observatione comperi. Quas quidem, perobscuram & difficilem, præ cæteris qui homines vexant, morbis, diagnosin habere, tum etiam ægrius curationem admittere, lubens fateor. Attamen ut potero morem tibi geram, ea, quæ Epistolæ convenit, brevitate; quam sane a me exigit valetudo infirmior, & quasi vacillans, hac præferam anni tempestate, qua mihi verendum est, ne si pertinacius cogitationibus indulsero, podagræ mox paroxysmum accersam. Paucis itaque expediam, quæ hic habeo dicenda, methodo, qua uti soleo, insistent; brevem scilicet morbi historiam tradens secundum vera naturæ phænomena; tum etiam medendi rationem subnectens quæ mihi optime cessit; quamque non tam librorum lectio, quam experientia propria, magistra haudquaquam infida, jam olim suggestit.

Hic morbus, si recte calculum pono, chronicorum omnium frequentissime occurrit; & sicuti febres cum appendicibus suis duas partes tertias, ad chronicos morbos simul sumptos si comparentur, complectitur, ita affectus hystericus (vel isti saltem qui eo nomine insigniuntur) ad reliquæ partis tertiæ dimidium assurgunt, hoc est, chronicorum pars media sunt. Fæminarum enim paucissimæ (qui sexus adultorum dimidia est pars) ab omni horum affectuum specie prorsus liberæ sunt, si istas excipias, quæ laboribus assuetæ dure vitæ tolerant. Quinimo non pauci ex iis viris qui vitam degentes sedentariam chartis solent impalescere, eodem morbo tentantur. Et quamlibet omnis retro antiquitas symptomata illa affectibus hystericis adnascantia utero semper vitio verterit, si tamen *Affectiones Hypochondriacas* vulgo dictas, quas splenis aut viscerum nescio quorum obstructioni imputamus, cum mulierum hystericarum symptomatibus conferamus, vix ovum ovo similis, quam sunt utrobique phænomena, deprehendemus. Neque tamen reticendum est, fæminas multo crebrius hoc morbi genere corripiri quam solent viros, non quod se uterus magis male habeat, quam alia quævis corporis regio, sed ob causas infra explicandas.

Sed nec spectabilior est hujus morbi frequentia, quam varietas illa multiformis qua se ostendit, & nullos fere non æmulatur ex iis affectibus, quibus atteruntur miseri mortales. Quamcunque enim corporis partem infederit, symptomata, qualia ei competunt parti, statim producit: Et nisi Medicus tam sagaci quadam solertia & *δυσίπντι*, quam in arte peritia valeat, fraus ei fiet, atque ista symptomata a morbo aliquo essentiali hujus, vel illius partis, non vero ab affectione hystERICA, pendere arbitrabitur.

Quandoque v. gr. *Capitis* arcem occupans, *Apoplexiam* facit, quæ similiter *Hemiplegia* solvitur, eam omnino referens apoplexiam, qua tum ætate, tum mole corporis grandiores siderantur, & quæ ex eo nascitur, quod, Cerebri cortice pituitæ copia referto ac scatente spirituum animalium meatus, ac semitæ intercludantur: a qua quidem causa, quæ fæminis hystericis accidit apoplexia, oriri nullatenus videtur, cum easdem haud infrequens adoriatur confestim a partu, magna sanguinis vi simul ejecta, & vel partui laboriosiori, vel vehementiori alicui animi commotioni debeatur.

Quandoque *Spasmos* horrendos gignit, *Epilepsia* perfimiles, ventre & præcordiis guttur versus intumescens, & nixus ita fortes edente ægra, ut licet alias mediocrium tantum fuerit virium, jam omni adstantium ope vix retineri queat, incondita interim atque inarticulata quædam vociferans, & pectus feriens. Fæminæ, qui-

bus hæc species, quæ *uteri Strangulatus* vulgo audit, familiarior est, temperamento sunt ut plurimum plusquam solet sanguineo, & habitu corporis ad viragines accedente.

Nonnunquam *exteriorem Capitis partem* occupat, pericranium inrer craniumque, dolorem vix rolerabilem adferens, in quadam tantum particula, quæ transverso pollice contegi possit, jugiter defixum. Dolorem hunc etiam comitantur vomitiones enormes. Hæc species *Clavus Hystericus* mihi est, istas præ cæteris fatigans, quæ *Chlorosi* laborant.

Nonnunquam in *partes incidens vitales*, ita vehementem *Cordis palitationem* excitat, ut quæ eam patitur fœmina pro indubitato habeat, sonitum cordis in costas arietantis etiam ab adstantibus omnino debere percipi. Hæc species eas maxime infestat, quæ extenuato sunt corpore, & crasi minus firma, quæque extabescentium penè formam præ se ferunt; tum etiam Juvenculas *Febre Alba* patlescentes.

Nonnunquam *Pulmones* obsidet, unde æger creberrime tussit, & fere sine intermissione, nihil prorsus expectorans: & quantumlibet hæc tussis species non ita valido nisu rhoracem concutiat, atque illa quæ convulsiva dicitur, explosiones tamen longe frequentiores sunt, æger præterea non ita sensu valet. Hæc autem *Tussis Hystericæ* species oppido rara est, & fæminas pituita scatentes præ cæteris exagitat.

Nonnunquam in *Colon*, & regionem *Scrobiculo Cordis* subtensam impetum faciens dolorem vix ferendum infligit, *Iliacæ Passioni* haud absimilem; ubi ægra immodice vomit, colluviem quandam viridem, bili, quam *Porraceam* appellant, fere parem, nunc etiam insoliti alicujus coloris, rejiciens. Sæpe etiam postquam ægra ad multos dies jam dicto dolore (qui vel Stoicorum *ἀπάθειαν* expugnaret) & continuo vomitionis conatu tantum non fuerit enecta, tandem *Ictero* intensiore omnem corporis superficiem ad instar croci tingente, solvitur paroxysmus. Ægra interea diris mentis angoribus pressa, omnem recuperandæ sanitatis spem prorsus abjicit: quæ quidem animi dejectio, & quasi *desperatio* quædam, non magis, quantum ego observavi, ab hac hystericorum affectuum specie sejungitur, quam sive dolor, sive vomitus præmemorati. Atque hoc genus in istis præcipue locum habet, quæ corporis habitu laxiore crudoque sunt, tum & in iis, quæ infantes grandiusculos, cum ingenti sui & naturalium vitæ flaminum dispendio, sunt enixæ.

Quandoque hoc malum in alterutrum ex *Renibus* incursans, atrocissimo quem illic parit dolore, *Paroxysmum Nephriticum* omnino mentitur, idque non solum doloris genere locoque quo sævit, sed & adscitis vomitionibus immanioribus, tum etiam nonnunquam ex eo, quod dolor per uretherum ductus propagetur; ita ut ægre admodum dignosci queat, utrum hæc symptomata ab incluso calculo, an vero ab effectu aliquo hystericæ enascantur, nisi forte casus aliquis acerbior ægræ animum paulo antequam corripere discrucians, aut materiæ viridis per vomitum rejectio, symptomata ista affectioni potius hystericæ quam calculosæ tribuenda esse docuerint. Sed neque *Vesica* ab hoc pseudosymptomate atque ementito affectu immunis est; cum non rante ipsa ab eo doleat, sed & urina suprimatur, perinde ac si calculus eam obstrueret, qui tamen nullus est. Rarissime autem cernitur postrema hæc species vesicam attingens, quæ vero renum calculum imitatur, non ita raro. Utraque eas solet invadere fæminas, quarum vires repetitis sæpe paroxysmis hystericis jam fractæ sunt, & sanitas corporis detrita.

Nunc in *Ventriculum* decumbens, continuas *Vomitiones* excitat; nunc etiam *Diarrhæam*, quoties scilicet in intestina effunditur: at neurum horum symptomatum sequitur dolor, licet in utroque persæpe compareat dictus ille succus viridis. Utraque hæc species iis familiaris est, quas frequentiores paroxysmi hystericæ debilitaverunt.

Atque ut hic morbus omnes ferme partes *Internas* infestat, ita etiam nonnunquam, & *Exteriores* carnemque musculosam occupat, *maxillas* scilicet *humeros*, *manus*, *crura*, *tibias*, nunc dolorem adducens, nunc tumorem; in quo genere is, qui tibias distendit, tumor præ reliquis conspicuus est. Cum enim in hydropicorum tumoribus duo hæc semper observari possint, ut tumor scilicet sub vesperam se majorem exhibeat, tum etiam ut pastæ instar madentis, vestigium digiti fortius impressi formamque referat: jam in hoc altero, tumor matutino tempore protuberantior est, nec digito cedit prementis, aut vestigium ullum manet. Plerumque etiam tibiæ alterutram tantum inflat: de cætero sive magnitudinem spectes, sive etiam superficiem hydropicorum tumores ita ad amussim æmulatur, ut ægre se haud facile ad ea quæ insedit sententia, dimoveri patiantur.

Sed neque ipsi *Dentes* (quod vix credas) ab hujusce morbi insultu se possunt defendere; licet neque vel minima cavitas, neque humoris alicujus defluxus, saltem qui percipi queat, doloris sive ansam præbuerit, sive vehiculum; qui nihilominus nec mitior est, nec contractior, aut expugnatio faciliior. Isti vero tum dolores, tum tumores, quibus afficiuntur, partes exteriores, quas supra memoravimus, eas præcipue fæminas adoriuntur, quæ, longa paroxysmorum hystericorum serie, ac impetu violento tantum non exanimatæ, vitam ducunt vix vitalem.

Inter omnia vero morbi hujus tormenta, nullum se tam crebro ingerit quam *dolor in Dorso*; quem certo certius persentiscunt, quotquot vel levissime hoc affectu tanguntur. Quinimo id habent effectum commune dolores prædicti, quod illa cui inhæserant regio, etiam post eorum discessum, tenera sit, & quasi fustibus probe fuerit dedolata, tactum refugiat; quæ quidem teneritudo sensum evanescit.

Hoc interim observatu dignissimum est, quod non raro notabilis quædam *externarum partium refrigeratio* symptomatibus his omnibus viam quasi sternit, & plerumque non nisi paroxysmo finito dispellitur: quam quidem refrigerationem haud semel isti fere, qua rigeur cadavera, parem comperi, pulsu nihilominus recte se habente.

Addo, quod hystericæ fere omnes, quotquot ego hæcenus tractavi, de *spirituum* dejectione sive *subsidentia* (ut cum illis loquar) conqueruntur; pulmonis regionem indigantes, quoties locum, in quo hæc spirituum contractio, seu subsidentia sentitur, volunt designare.

Demum mulieres affectione hystERICA laborantes, nunc in *risum* effundi, nunc in *lacrymas* pariter immodicas solvi, nulla *προσπάσει* manifesta sive illum, sive has extorquente, nemini non est notum.

Inter omnia vero, quæ in hoc morbo comparent phænomena, illud maxime proprium est, atque ab eo fere inseparabile, quod scilicet ægre *urinam* subinde reddant plane *limpidam* ad instar aquæ e rupibus scaturientis, idque satis copiose, quod quidem ego sigillatim per-

contando, in omnibus fere didici signum esse pathognomicum eorum affectuum, quos in fœminis *Hystericos*, in maribus *Hypochondriacos* appellando censemus. Atque in masculis nonnumquam observavi, quod mox ab excreto lotio coloris citrini (immo vero proximo temporis momento) violentiori aliquo animi motu derepente percussis, statim urinam, crystallum claritate æmulantem, magna copia, & impetu diu continuato ejecerint, eo usque se male habentes, donec urina pristinum colorem induerit, & paroxysmus simul evanuerit.

Quin & omnibus tam hystericis, quam hypochondriacis, quibus scilicet jam malum inolevit, id accidit, ut *flatus* quandoque *nidosos* e ventriculo emittant; quoties aliquid comederint, licet moderate tantum, & pro ratione appetitus, tum etiam aliquando *acidum* eructent, acetum sapore referens, quoties in eos ascenderit; læsa nempe utrobique concoctione, & succis proinde a naturali statu interverfis.

Neque hoc tantum nomine infelices sunt, quod corpus ita male affectum, & quasi conquassatum adinstar ædium ruinas undequaque minitantum, tantum non corruat, & fatiscat, cum magis adhuc animo agrotent, quam corpore. Cum enim desperatio plane insanibilis de hujusce morbi natura sit, indignantur admodum quoties aliquis, vel minimam de sanitate recuperanda spem injecerit; facile interim credentes omnia scilicet quæcumque in homines cadere possunt incommoda, quæque adeo fert rerum natura, perpessuros, tristissima quæque sibi comminantes, atque timorem, iram, zelotypiam, suspiciones, & si quæ atrociora sunt animi pathemata, vel ex levissima, vel etiam nulla data ansa, arripientes, & sinu foventes irrequieto anxioque; ab omni interim gaudio, spe, lætitia abhorrentes, quæ si forte occurrant, quando hæc raræ aves sunt, velocissime avolant, animum interim haud minus vehementer exagitantia, quam solent inæstiora illa *πᾶσι*, ita ut nullibi mediocritatem servant, in una levitate constantes; nunc amant præter modum, mox odio eisdem sine causa prosequuntur: nunc hoc illudve sibi agendum proponunt, mox a proposito resiliunt, & quod cum eo pugnat, aggrediuntur: sed neque hoc peragunt, ita animi pendentes, ut nunquam liceat quietam mentem consistere. Quodque de superstitiosis asserit Orator Romanus, nostris hisce melancholicis pulchre quadrat. *Perfugium videtur omnium laborum, & solitudinum esse somnus, ac ex eo ipso plurimæ curæ, metusque nascuntur*; cum funera tantum in somniis, & denatorum amicorum umbræ repræsentantur. Ita tam animo quam corpore excarnificantur, quasi hæc vita omnis ignis esset expurgatorius, in quo scelera alio in statu perpetrata jam luerent atque explerent. Neque hoc tantum maniacis accidit, & furiosis, quos dicimus, sed etiam illis, qui, si hos animi impetus excipias, prudentia ac judicio valent, quique & meditationum profunditate, & sapientia orationis longe eos superant, quorum mentes his cogitationum aculeis nunquam fuerint excitatæ. Ita ut non sine ratione observaverit Aristoteles, melancholicos cæteris ingenio præstare.

At vero tam horrendus animi status, qualem supra delineavimus, non aliis competit, quam iis, qui diu multumque cum hoc morbo conflictati, tandemque subjugati quasi victas manus dant; maxime si res adversæ, animi mœrores, solitudinesve, nimia in literarum studio assiduitas, atque animi contentio cum prava corporis diathesi conspirantes, oleum camino adjecerint.

Dies me deficeret, si omnia quæ affectus hystericos gravant symptomata enumerare velim; tam diversa atque ab invicem contraria specie variantia, quam nec Proteus lusiit umquam, nec colorata spectatur Chamæleon. Proinde recte mihi videtur rationem subduxisse *Democritus* (quantumlibet in morbi causa hallucinaretur) ubi in Epistola ad Hippocratem missa diserte asserit: *Sexcentarum ærumnarum, innumerarumque calamitatum auctorem esse uterum*. Neque tantum multifaria sunt ista, sed nec regula aliqua aut typo uniformi se contineri patiuntur, quod in aliis hominum affectibus tamen usu venit, sed quasi farrago sunt quædam *καυομένων* incomposita atque inordinata, unde perarduum est hujus morbi historiam describere.

Causæ autem hujus morbi *Procatarticae* seu externæ, vel sunt vehementiores corporis motus, vel etiam multo sæpius, violenta quædam animi commotio a repentino aliquo, sive iræ, sive doloris, sive etiam timoris, & similium pathematum insultu. Quoties itaque me consulunt fœminæ de hoc illove corporis affectu, cujus ratio e vulgaribus morborum dignoscendorum axiomatibus nequeat reddi, numquam non diligenter ab eis exquiro, An non eo de quo conqueruntur malo, tum præcipue fatigantur, cum tristitia, ærumna, aut alia aliqua perturbatio eas male habeat; quod si annuerint, jam satis superque mihi constat morbum in hac, de qua agimus, Tribu censendum; præsertim vero si diagnosin id clarius illustret, quod scilicet certis aliquot temporibus urinam limpidam, & crystalli æmulam, eamque copiosam simul excernant. His vero animi motibus, qui usitatioris sunt hujus morbi *προφάσεις*, accedunt vel stomachi vacuitas ab inedia pertinaciori, vel nimix humorum evacuationes, sive a sanguine intemperanter effuso, sive ab emetico, aut cathartico, cui impares erant ægræ vires.

Jam vero ab hac totius morbi imagine, secundum vulgatissima ejus *καυομένων* depicta, proximo loco ejus *Causæ efficientes internæ* sive *προηγμένα* mihi veniunt pensitandæ, quantum eas, ex omnibus quas descripsimus circumstantiis simul junctis, exspicari valeam.

Pendent ergo affectiones istæ, quas in fœminis hystericis, in maribus hypochondriacis insignire libet, quantum ego judico, a spirituum animalium *ἀνάξις*, unde factio impetu in hanc illamve partem plus quam pro rata densi nimique feruntur, spasmosuti & dolorem excitantes ubi in partes sensu exquisito præditas irruunt, atque organorum, tum ejus in quod se ingerunt, tum istius a quo abscedunt, functiones pervertentes; cum utrumque ab hac tam iniqua partitione, quæ naturæ economiæ penitus adversatur, haud parum detrimenti capiat.

Cujus quidem *ἀνάξις* origo atque *causa antecedens* est debilior dictorum spirituum crasis, sive nativa ea fuerit, sive etiam adventitia, unde quavis *προφάσει* dissipatu faciles sunt, & eorundem systema nullo fere negotio dirimitur. Quemadmodum enim *Homo* quidam exterior conspicitur ex partibus sensui obviis compaginatus, ita proculdubio & interior est quidam homo e debita spirituum serie, & quasi fabrica constans, solo rationis lumine contemplandus. Hic vero cum temperie corporis intimius conjunctus, & quasi unitus, tanto ægrius faciliusve de statu suo dejicitur, quanto major est mi-

norve ea, quam a natura sortimur, principiorum constituentium firmitas. Quamobrem fœminas longe plures quam masculos hic morbus aggreditur, quoniam videlicet istas natura magis delicatulo rarioreque corporis habitu (ceu vitæ molliori, & hominum deliciis destinatas) blanda donavit; mares autem toroso corporis robore, utpote qui laboribus exantlandis in tellure colenda, & repastinanda, & feris, quibus alantur, capiendis, aliisque similibus, apti nati sint.

Dictam autem spirituum *ἀνάξις* hujus morbi causam esse, phænomena jam descripta satis probant; quorum præcipua tantum attingam, a notissimo illo affectu hystérico, qui *Uter Strangulatus* vulgo dicitur, initium faciens. Hic jam spiritus, factio quasi agmine in ventre inferiore, catervatim magnoque impetu in fauces irruentes, spasmos excitant per omnem quam transeunt regionem, ventrem instantes ad instar globi prægrandis, qui tamen nihil aliud est quam partium spasmio tentatarum convolutio, & quasi conglobatio quædam, quæ non nisi magna vi reprimi potest, & coerceri. Partes interim externæ massaque carneæ a spiritibus, jam alio raptis, magna ex parte destitutæ, eo usque frigescunt persæpe, non in hac sola affectus hystericus specie, sed in aliis omnibus, (quod prius adnotatum) ut cadavera non frigeant magis. Pulsus interim qualis sanarum est, nec ægra ab hoc frigore de vita periclitatur, nisi illud ab evacuatione aliqua enormiori præcedente originem ducat.

Idem etiam dici potest de violentiori isto affectu hystérico, qui externa facie *Colicam biliosam*, vel etiam *Passionem Iliacam* æmulatur; in quo ægra dolore vix tolerando in regione cordis scrobiculo circumposita, una cum immani materiæ herbam colore referentis evomitione, discruciat. Quæ quidem symptomata haud aliunde nasci existimo, quam a vehementi spirituum dense conglomeratorum in dictas partes impulsu, unde & spasmus, & dolor, & earum totalis facultatum subversio.

Neque ex eo quod ista, quæ in hoc affectu sive per os, sive per sedem egeruntur, colore quandoque viridi tingantur, statim conficitur morbum hunc in humoribus residere, aut atrocissimum illum dolorem ab humoris alicujus acrimonia partem, cui inhæret dilaniantis, produci; quem idcirco pro minera morbi habeamus, ac proinde remediis tam *ἀντα* quam *κατὰ* catharticus radicitus extirpandum censeamus. Etenim de facto constat, ægritudinem illam, quæ laborant navigantes (a spirituum animalium agitatione ortam, in fluctuanti ac irrequieto mari) colluviem coloris plane herbacei ex hominum vel sanissimorum ventriculo exantlare, ubi primum in mare longius sunt provecti, quibus tamen ante semihoram ultimo elapsam non inerat bilis hæc, quam porraceam appellare libet. Annon & infantes in paroxysmis convulsivis, in quibus spirituum animalium maxime res agitur, tam per superiora, quam per inferiora materiam ejusdem plane coloris ejiciunt? Quibus addendum est id, quod experientia ferme quotidiana docet, scilicet quantumlibet ejusmodi, sive fœminas, sive infantes iterata catharsi exhauserimus, attamen color jam dictus in eis, quæ vel per vomitum, vel per sedem exeunt, usque visetur. Quin etiam a pharmacis tam emeticis quam catharticis frequentius propinatis uberior materiæ viridis nascitur seges, cum ab utroque genere spirituum *ἀνάξις* provehatur: quæ vel nescio quomodo, istarum partium fermentum destruit ac pervertit, vel in ventriculum intestinaque vi spasmorum succum aliquem alienæ indolis intorquet, qui humores ejusmodi coloribus inficere potis est. *Chymie* sectatores, licet nondum ita bene cum illis sit, ut quæ in organis suis *πολυτέχνως* medicamenta elaboraverint, majus aliquid in morbis debellandis præstent, quam quæ contendantur in mortario, vel in olla decoquantur; tamen curiosorum *πειραγία* eousque gratificari norunt, ut duos liquores aque limpidos clarosque ostendentes, ex iisdem invicem commixtis saturatum colorem aliquem, quasi præstigiantes, possint exhibere. Et profecto, ita lubrica est & evanida colorum speculatio, ut nihil certi ex illis, de corporum in quibus apparent natura, queat deprehendi. Neque magis sequitur ea quæ colore viridi sunt, acria esse omnia, quam omnia quæ sunt acria, viridi esse colore. Re itaque undique perpensa, satis liquet dolorem immanissimum, qui hac colica hystérica laborantes pene exanimat, tum etiam materiæ viridis rejectionem, a spiritibus nimio impetu in partes sub cordis scrobiculo positas incurfantibus, atque easdem spasmio contrahentibus omnino excitari.

Huic etiam spirituum enormitati tribuendum est symptoma istud, quod superius *Clavi Hystericus* nomine indigitavi, in quo spiritus ab omni corporis ambitu in certo pericranii quasi punctulo concentrantur, dolorem haud minus perterebrantem, quam si clavus ferreus in caput vi adigeretur, accercentes, una cum insigni materiæ viridis evomitione. Quæ quidem spirituum ab universo corpore quasi in punctum contractio non multum abludit ab ista radiorum Solis collectione, quæ fit ope vitri incensorii: utque hi vi unita exurunt, ita & isti ob eandem rationem dolorem infligunt, membranas quasi discerpentes lacerantesque, junctis viribus.

Deinde ab hac inordinata spirituum agitatione sanguinem perturbante, exoritur symptoma illud, tam hystericis, quam hypochondriacis haud insolens, ut supra notavimus, quod nempe sæpenuerum *urinam* reddant *claram* limpidamque simul, & copiosam: cum enim sanguinis æconomia subinde interpellatur, quod importatur serum satis diu retinere nequit æger, sed illud prius dimittit, quam istis particulis salinis, quarum ope color ad citrinum traduci debuerat, imprægnari potuerit. Cujus rei quotidianum habemus experimentum in eis, qui, cum plus satis liquoris, maxime tenuioris atque attenuantis, ingurgitaverint, lotium mox limpidissimum excernunt. Quo in casu sanguis ab ea feri quantitate, cui retinendo prorsus impar est, plane devictus, illud omnino limpidum amittit, nec dum a corporis succis infectum, ob moram justo brevioris.

Tertius jam agitur annus, a quo Nobilis quidam me sibi Medicum volebat, qui *Colicam Hypochondriacam* pati mihi videbatur, ad *Passionem Iliacam* fere accedentem, doloreque, & vomitu enormiori; quo morbo diu multumque fuerat vexatus, & tantum non fractus.

Per omnem morbi decursum sedulus animadverti, quod ubi pessime se habuerit, urina limpidi, & exors coloris semper fuerit, quando vero paulo melius, ad citrinum vergeret illa. Hunc die quodam adiens, urinam conspexi, quam tribus vicibus excreverat, in matulis totidem reservatam, citrino colore præditam: lætus ipse hilarisque cibum ex *ἀπίπτω*, aliquem jam assumere meditabatur, invitante, quod mihi dicebat, appetitu: in quo temporis articulo superveniens quidam eousque bilem commovebat, ut extemplo ægrotans, matulam

rolam deposceret, quam urina limpidissima crystallum colore æmulante, fere implevit.

Fortè etiam a spiritibus sanguinem ita molestantibus pender *Ptylismus* ille hysteris familiaris, cum ad multas septimanas salivam expuant tenuem, perinde ac si unguento ex *Mercurio* fuerint delibutæ: durante enim hoc turbido sanguinis stato, in quo excretionibus ad naturæ methodum exigendis impar is est, serum motum hunc inversum forte sibi vendicans non jam in renes pro lege naturæ exoneratur, sed per arteriarum extremitates in glandulas deponitur, & per *ductus salivales* salivæ forma prodit. Idem dici potest de nocturnis istis sudoribus, quibus fœminæ hystericæ nonnumquam profunduntur, qui non ab alia causa fluunt, quam a seri sanguinis diathesi, qua in corporis habitum gestit effundi, ob modo memoratam sanguinis *ἀραιαν*.

Frigus quod attinet, quo toties algent partes externæ in affectibus hysteris, luce clarius est, illud ex eo accidere, quod spiritus suam in illis stationem deferentes, se nimio opere in hancillamve partem inferant: Nec est dubitandum, quin tam *Fletus*, quam *Cachinnus*, quem tollunt haud raro hystericæ, etiam nulla data ansa, a spiritibus animalibus procuretur, organa, quæ his functionibus animalibus inserviunt, magna vi pulantibus.

Obiter dicam, mares etiam, quamvis rarius id eveniat, fletui ex nulla *πρὸς* quandoque obnoxios reperiri. Accersebar aliquando ad virum tam ingenio, quam genere nobilem, qui nonnisi paucis diebus a febre convalescerat, alterius Medici consilio usus, qui & sanguinem detraxerat, & pharmacum catharticum ter exhibuerat, tum etiam carnibus illi interdixerat. Hunc ubi vestitum conspexerim, & de rebus quibuslibet cum iudicio differentem audierim, rogabam quorsum me conveniret; respondit familiaris quidam ejus, modo expectarem paulisper, res ipsa loqueretur; confidens itaque, & sermones cum ægro trahens, mox observavi labrum inferius pendulum protrudi cum motitatione crebra (uti solent infantes morosiores fletum adornare) & exinde ægrum in tantas solvi lacrymas, quantas vix alias vidi umquam, cum gemitu ac suspiriis tantum non convulsivis. Qui tamen repentinus torrens non ita multo post detumuit prorsus. Hinc ego affectionem a spiritu *ἀραια*, (partim a morbi diuturnitate, partim ab evacuationibus, quas *δυσπεία* necessario exigebat, orta) pendere existimabam: partim etiam ab exinanitione, & abstinentia a carnibus, quam etiam ad dies aliquot posteaquam convalescerat, imperaverat Medicus, quo eum a recidiva præstaret securiorem. Hinc eum pronunciai extra omnem febris aleam jam constitutum; symptomaque prædictum inanitioni tantum deberi, ac proinde suadebam, ut pullum gallinaceum assum in prandium juberet parari, & simul vinum modice hauriret; quo facto, & carnibus deinceps moderate vescens, numquam deinceps fletum hunc convulsivum passus est.

Ut tandem finiam, (cætera enim, quæ in hoc morbo spectantur phænomena, jam missa facio) ab hac ipsa spirituum inordinatione nascitur perturbatio illa, & varians subinde tam animi, quam corporis intemperies, quæ tum in hysteris, tum hypochondriacis dominatur: cum enim utrisque desit ea spirituum firmitas, quæ in robustioribus, atque iis, quorum facultates jugi spirituum vegetorum subsidio actuantur, semper invenitur, impressiones rerum minus gratarum nequeunt perferre, sed vel ira vel dolore subito perciti, perinde sunt irritabiles, atque isti, quorum *ὑπεμονικὸν* mollius, & debilius vel natura primo procudit, aut longior ægritudine sive series, sive mora tandem reddidit. Etenim animi robur, & constantia, quandiu hoc corporis luto is incrustatur, a firmitudine spirituum eidem famulantium maxime pendet, qui quidem supremum in scala materiæ gradum constituunt, in ipso *ἑνὶ* immaterialis confinio positi: Cumque animi compages, si fas est ita dicere, longe, magis assabra sit & delicata, quam est corporis structura, utpote quæ in harmonia facultatum præstantissimarum, & pene divinarum consistat, si hujus *οὐσίας* quoquomodo fuerit interrupta conturbataque, major inde consequetur ruina, quanto præcellentius erat & magis exquisitum opificium, dum integrum perstaret. Et hic quidem miserorum quos depinximus, animoque fractorum status est; cui malo non citius remedium adferet pertinax aliquod vel insolentissimi Stoici decretum, quam *ἁπλοῦς* præcaverit is, qui firmiter statuerit, se nullo modo permissurum, ut dentes dolore pertententur.

Satis itaque jam constat, opinor, omnem hunc morbum ad spiritus animales non rite dispositos referri debere; nec a semine aut sanguine menstruo corruptis (quod asserunt nonnulli Authores) & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec a succorum nescio qua perversa depravatione, sive etiam humorum acrimie congestione, ut alii volunt, sed ab iis quas modo assignavimus causis. Quod enim morbi fomes in materia non delitescat, unica hac instantia satis elucescet. Fœmina v. gr. quæ rectissima semper valetudine uti solet, modo delicatula sit illa, & teneriore corporis habitu, si forte errore aliquo, sive emetico, sive cathartico quovis fortiore nimium fuerit debilitata exhaustaque, certo certius symptomate aliquo, ex iis, quibus hic morbus stipatur, mulsetabitur; quod tamen ejusmodi vomitio, vel catharsis amoliretur magis quam invitaret, si morbi minera in humore contineretur. Idem dici potest de immodico sanguinis dispendio, sive phlebotomia si fuerit extractus, sive in puerperio copiosius manaverit, uti & de exinanitione, & justo longiore a carnibus abstinentia, quæ omnia ad effectus hysteris præcavendos potius facerent, quam ad eosdem accerfendos, si illorum fomes in materia aliqua involveretur: cum e diverso non alia causa ita constanter pariat hujusmodi affectus, ac solent dictæ evacuationes.

Quamvis autem satis pateat originarium hujus morbi fontem in humoribus nullatenus stabulari, fatendum est tamen (quod reseat) spirituum *ἀραιαν* illam, cui morbus debetur, humores putridos in corpore coacervandos gignere, cum tam illarum partium functio, quæ vehementiori spirituum impulsu distenduntur, quam earum, quæ illis privantur, omnino pervertatur. Cumque harum pleræque *Organa* sint quasi *separatoria*, excipiendis cruoris recrementis designata, si earum functiones quovis modo lædantur, fieri non potest, quin ingens fæculentiæ colluvies accumuletur; quæ quidem eliminata fuisset, totaque proinde sanguinis massa depuratio facta, modo singula organa munus suum explevisent, cui nullo modo defuissent, si debita spirituum œconomia universa invigorasset. Huic ego causæ adjudico *Cachexias* insigniores, *ἀνορεξίαν* sive *Appetitus prostrationem*; in Juvenulis *Chlorosin*, sive *Febrim albam* (quam quidem speciem esse *Affectus hysteris* nullus dubito) aliamque

omnem malorum lernam, in qua immerguntur misellæ, quotquot hoc morbo diu elanguerunt, quæ omnia a succis putrescentibus in sanguine coeque, atque exinde in organa varia depluentibus succrescunt. Hujus farinæ est *Hydrops testium* in fœminis, quæ jam diutius affectu hysterico laboraverint, natus a succis depravatis e sanguinis massa in organa rejectis; unde perversis eorumdem facultatibus, primo steriles fiunt mulieres, & destruitur prorsus œconomia partium, indeque serum & sanies gignuntur, quæ non tantum *Nodulos ovaque testium* interficiunt, sed etiam in tunicarum interstitia se insinuantia, testes in molem ingentem elevant, quod in earum dissectionibus cernitur, quæ hoc morbo pereunt. Diathesis interim hysterica horum aliorumque humorum similium causa est primaria, quamlibet ejusdem cum illa profapia non fuerint.

Quemadmodum in *Febre quartana*, qua vel pancreatica valens quispiam corripitur, si modo duos tresve dies in locis paludosis ac lacustribus egerit, primo, spirituosum quoddam *μικρὸν* morbi hujus sanguini imprimitur, quod diuturnius inhærens, læsa tandem naturæ œconomia, omnes corporis succos inquinat, aliena prorsus indole eos imbuens, unde æger (maxime si ætate grandior fuerit ac in senium jam vergat) cachexiis aliisque malis obnoxius redditur, quæ febribus intermittentibus diu affligentibus superveniunt. Quæ tamen febres non sunt profligandæ remediis, quibus rectissime expurgantur hujusmodi humores, sed *Specificis* iis, quæ abigendis istis febribus immediate dicantur.

Ex omnibus, quæ nos hactenus congeessimus, abunde mihi constare videtur, præcipuam in hoc morbo indicationem curativam eam esse, quæ sanguinis (qui spirituum fons, & origo est) corroboracionem indigitat; quo facto spiritus invigorati eum servare possint tenorem, qui & totius corporis, & singularum partium œconomia competit. Cum vero hæc spirituum *ἀραια* (quod supra fieri posse concessimus) mora longiore humores vitiaverit, e re fuerit eosdem jam corruptos, & *Phlebotomia*, & *Catharsis* prius immuere, modo ægræ vires permiserint, quam ad sanguinem corroborandum nos accingamus; quem quidem scopum vix assequi poterimus, quamdiu fæculenta humorum colluvies se mediam, quasi obiceni, interposuerit. Quandoquidem autem *Dolores atrociore*, *Vomitiones*, & *Diarrhœa* enormes ita nonnumquam effervescent, ut inducias non ferant usquequo primariæ illi fortificandi sanguinis intentioni possit satisfieri, quandoque ab effectis consopientis (missa aliquantisper causa) curationis tela necessario ordianda est, exhibito scilicet medicamine *Anodyno*: dein spiritibus, quorum crasis infirmior morbi causa est, rectificandis opera danda est, quo ejusmodi symptomatibus deinceps occurratur. Cumque experientia doceat permulta esse, quæ fœtoris exhalatione repellendis spiritibus seditionem molientibus, & in loco suo continendis apta nata sint, (quæ idcirco *Hysterica* audiunt) neque illa sunt negligenda, quoties dictis intentionibus implendis operam navamus.

Ad hanc ego metam collimans, venam in brachio secari jubeo, dein ut purgetur ægra tribus quatuorve auroris continuis. Per hos dies, in quibus *Venæ sectio* & *Catharsis* celebrantur, ita plane nihil emolumenti capere ægra, ut in pejus ruere sibi videatur, cum dictæ evacuationes tumultu concitato *ἀραιαν* promoveant, qua de re ægram diligenter præmoneo, ne animum despondeat, suadente morbi genio: utut fuerit, vitiosi isti humores, quos a morbo diuturniore coaggregatos supponimus, quadantenus sunt detrahendi, antequam primariæ intentioni percommode satisfacere queamus.

Post has evacuationes, ad sanguinem confortandum & proinde etiam spiritus ex eo prognatos, *Remedium* aliquod martiale seu *Chalibeatum* ad dies triginta præscribo assumendum, quo non aliud certius hic votis respondit. Etenim massæ sanguinæ, jam effictæ & languescenti, volatile quoddam fermentum, seu calcaria, subdit, a quo excitantur & quasi eriguntur spiritus antea jacentes & suo powdere pressi. Cujus rei indicium est vel apertissimum, quod quoties *Chalybs* in *Chlorosi* propinatur, pulsus derepente major fit & celerior, exteriora corporis incallescere, facies non amplius pallida & mortuis concolor, sed vivida cerni & sanguine purpurata: Attamen hic notandum, quod non semper venæ sectio & cathartica chalybis usui sint præmittenda, cum viribus admodum imbecillis & diuturnitate morbi attritis fractisque omitti ea possint ac debeant, & cum chalybe statim iucipiendum; quod diligenter advertendum.

Commodissima vero, aut ego fallor, in *substantia* exhibetur; atque ut nec observavi umquam ipse, nec fando accepi, eum ita sumptum cuivis uocuisse, ita certiore me fecit experientia multiplex, nudam chalybis substantiam & felicius & brevioris temporis spatio curationem absolvere, quam si is quovis ex iis, qui vulgo feruntur, modo fuerit præparatus. Cum tam in hoc, quam in aliis melioris notæ remediis, id quandoque præstiterit chymicorum officiosa sedulitas, non tantum ut *δραστικώτερα* non sint, sed etiam a perversa eorumdem diligentia & opera plusquam otiosa, magis evilescant. Audivi etiam (quod si modo verum sit, assertionem hanc nostram fortiter sustinebit) ipsam mineram, prout a terræ visceribus effoditur, crudam efficacius in morbis subjugandis operari, quam ferrum ignem jam passum, & fusione depuratum: cujus rei fides tamen penes Authorem sit, me nondum experto, siccine se res habeat, an vero aliter. Id certo scio, nullum remedium præclarum atque *ἐξαιρετικόν* uspiam gentium fuisse procusum, quod non a natura præcipuas vires acceperit: unde *Θεὸν χεῖρας*, non vero hominum præcellentiora quævis medicamenta antiquitas grata compellavit. Quod vero nativa quidpiam bonitate præstans & efficacia, mirandos edat effectus, quacumque demum forma ingeratur, testes hic adduco *Parillud* nobile, papaveris lacrymam sive *Opium*, & *Corticem Peruvianum*. Neque etiam tantum in medicamentis præparandis medica cernitur peritia, quam in iis seligendis appropriandisque, quæ natura, suo igne elaborata atque evecta, liberali manu porrigit. Id tantum nobis agendum restat, ut medicamenta in eam formam reducantur, qua vel eorumdem substantia, vel saltem vis & efficacia melius corporibus nostris impertiri queat: cui muneri obeundo facultates nacti sumus plusquam pares. Post chalybis substantiam, ejusdem *Syrupus* lubentius & præ cæteris utor. Fit autem e ferri aut chalybis limatura, in vino Rhenano in frigido infusa, usque dum vinum satis imprægnatum fuerit, quo facto liquor colatus cum sacchari quantitate sufficienti in syrupi consistentiam excoquendus est.

Nec mihi solemne est toto illo spatio, quo ægra chalybeata sumit, catharticum aliquod statis intervallis exhibere. Cum tam in gene-

genere hysterico, quam hypochondriaco, chalybis vires a cathartico interdicti atque infringi mihi videantur. Quando enim id mihi palmarium sit, ut spiritus in ordinem redigam, atque eorum systema redintegrem firmemque, quod toto vix octiduo refarciveram chalybis ope, cathartico vel lenissimo exhibito die unica rursus demolior; atque ita diruta extruendo, atque a me extructa subruendo, & ægros & operam ludo, vanus & infelix Ardelio. Qui quidem mos cum etiam in usu aquarum mineralium obtineat, quæ ferri mineræ sunt participes, haud mihi dubium est, easdem exinde minus efficaces reddi. Non sum nescius quosdam fuisse sanatos cathartico non tantum intercalatis, sed etiam quotidie cum chalybe propinatis, quod tamen non tam Medici prudentiam, quam chalybis virtutem *επεργετικῶν* mihi comprobatur, cum, si ea omittantur, breviori temporis spatio curatio succedat.

Neque sane video in aliis affectibus multis præter jam dictum, quid emolumenti, five potius quid non incommodi tam repetita cathartico exhibito ægris adferre queat. Quamvis enim haud negandum sit, quin intestina ex impuritatibus liberent ea, & pariter e massa sanguinea humores noxios in ea stabulantes aliquantulum extrahant, e contra tamen haud minus certum est, quod frequenter repetita in corporibus imbecillis (maxime vero in ætatibus tenebris) plurimum efficiant; cum ex hac *πρὸς αἵμα* ingens humorum colluvies in viscera eliciatur, atque iis in partibus deposita fermentationes præternaturales invitet, ex quibus deinceps *Tumores* in infimo ventre oriuntur, tanto magis indies mole augescentes, quanto sæpius æger purgetur. Atque id demum accidit, ut istæ partes præ imbecillitate & caloris nativi (jam sub humorum onere quasi obruti) defectu, *tabe* facile afficiantur ac putrescant. Quandoque etiam, æconomia viscerum ob causas jam dictas penitus everfa, *Glandule* præternaturales, *Strumæ* soboles, & id genus similia mesenterio accrescunt, & ad mortem viam sternunt. His rationibus adductus tutissimum esse iudico in *Infantibus* post evacuationes universales, easque perpaucas, eo indicationem curativam dirigere, ut confortentur sanguis & viscera. Quod *Vinum Hispanicum* vel solum, vel *Herbis corroborantibus* alteratum efficere potest, modo mane & sero cochlearia aliquot (pro ratione ætatis ægri) satis diu exhibeantur. Cum vero quæ exteriùs admoventur, tenera infantium corpora facile penetrent, proindeque sanguinem ipsum qualicumque virtute sua penitus afficiant, e re erit in *Tumoribus* qui ventrem eorum occupant, five *Scrophulis*, five *Rachitidi veræ* originem illi debeant. *Linimentis* uti, quæ sanguinem ac viscera corroborandi ac pariter labem aliquam morbificam iis inductam delendi vi pollent. Ut 24. *Fol. Absint. vulg. Centuar. min. Marrub. alb. Chamædr. Chamæpit. Scordii, Calaminth. vulg. Parthenii, Saxifrag. pratens. Hyperic. Virgæ Aur. Serpill. Menth. Salviæ, Rutæ, Card. benedict. Puleg. Abretan. Chamomel. Tanacet. Lilior. Convall.* (omnium rec. collectorum & incisorum) an. m. j. *Axungia* porcine *Biv. sevi ovini*, & *Vini Claretii* an. *Bij.* Macerentur in olla fictili super cineres calidos per horas 12. Deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea coeantur, ut fiat *Unguentum*; quo venter ac *Hypochondria* illiniantur mane & sero per 30. vel 40. dies continuas, uti etiam *Axillæ utraque*. Quoad *Rachitidem* autem hoc notandum, quod in tumoribus istis qui ventres infantium post longas *Intermittentes Febres* olim infestarunt, veræ rachitidi non multum abludentes, repetita catharsis omnino videretur indicari, cum ante usum *Corticis Peruviani* istæ febres in diuturnitatem longam se extenderent, ac proinde sedimentum deponerent, huiusmodi tumorum causam, quæ ideo non nisi purgatione repetita abigi poterat. Attamen in *Rachitide veræ* cathartica locum non habent, nisi ut semel vel bis ad plurimum æger purgandus antequam usum alterantium aggrediatur. Per totum autem tempus quo partes illiniantur, intus assumat vel vinum modo dictum; vel, si fieri possit, pro potu omni bibat cerevisiam, in qua quantitas sufficiens herbarum prædictarum, vel earum saltem aliquam multarum, una in dolio inclusa fuerit. Denique hoc, quod innui, diligenter advertendum volo, cum non paucos infantes aut pueros a cathartico sæpe repetitis (quæ forte ventris tumor inviterat) interemptos fuisse satis sciam. Sed hæc obiter.

Si quis objecerit, *limaturam Chalybis*, nisi æger subinde fuerit expurgatus, in visceribus hærentem, ei, qui illam devoraverit, nocere posse; respondeo primum me nihil unquam tale in quoquam deprehendisse: deinde longe verisimilius esse, eandem muco & excrementitiis partium humoribus involutam una cum istis tandem omnem elabi, quam medicamentis purgantibus exagitatam, quæ adstrictiones insolitas, & viscerum torsiones contractionesque afferunt, qua quidem compressione, chalybis particulæ viscerum tunicis impactæ in iisdem penitus desigi possunt.

Interea dum chalybs administratur (ad confortandum sc. sanguinem & spiritus animales) remedia vulgo dicta *Hysterica* in usum quasi obiter revocanda sunt, idque eo modo atque ea forma, quæ maxime conveniunt ægris; quæ quidem si in forma solida fuerint deglutitæ a minus fastidiosius, potentius longe spiritus in officio & loco suo retinebunt, quam si in liquida hauriantur, hoc est, five decocta, five infusa. Ipsa enim substantia ventriculum diutius sapore suo afficit, & corpus inficit penitus.

In summa, indicationibus, quas supra attigi, universis satisfactorius, paucula hæc & vulgaria præscribere soleo; quæ licet nihil magnifici præ se ferant, ut plurimum tamen id præstant, quod volo.

Mittatur sanguis e brachio dextro ad 3vij.

24. *Galban. in tinctura Castor. solut. & colat. 3ij. Tacamahac. 3ij. f. Emplastr. Umbilico admoventum.*

Sequenti mane aggrediatur usum sequentium Pilularum.

24. *Pilul. Coch. maj. 3ij. Castor. pulv. gr. ij. Balsam. Peruv. gutt. iv. f. Pilule n. iv. Cap. hora quinta matutina superbibendo. Repetatur per duas vel tres alias vices, idque singulis vel alternis auroris pro ratione virium, aut operationis.*

24. *Aq. Ceras. nigr. Rutæ, & Brion. comp. an. 3ij. Castor. in nodulo ligat. & in vitro suspend. 3℥. Sacchar. Crystall. q. s. f. Julapium, de quo capiat cochlearia iv. vel v. in omni languore, instillando prime dosi, modo paroxysmus urgeat, spir. C. C. gutt. xx.*

Post pilulas purgantes modo supra descripto sumptas, utatur, & sequentibus.

24. *Limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. extracti Absynth. f. Pilule n. ij. sumat summo mane, repetanturque hora quinta pomeridiana, per dies xxx. superbibendo haustum Vini Absynthitis.*

Vel pro usu quotidiano. 24. *Limatur. Chalyb. & extract. Absynth. an. 3iv. m. asservetur pro usu. Capiat iisdem temporibus gr. xvj. vel 3j. in pilulas tres redact.*

Vel si forma boli magis ardeat, 24. *Conserv. Absint. Roman. & conserv. flaved. Aurantior. an. 3j. Angelic. condit. Nucis moschat. condit. & Theriac. Andromach. an. 3℥. Zinzib. condit. 3ij. cum s. q. syr. Aurantior. f. Electuarium. 24. Electuarii præscripti. 3℥. Limaturæ Chalybis probe triti gr. viij. cum s. q. syr. Aurantior. f. bolus, sumendus mane, & hora quinta pomeridiana, superbibendo haustum Vini Absynthitis.*

24. *Myrrh. elect. & Galban. an. 3℥. Castor. gr. xv. cum s. q. Balsami Peruv. f. Pilule, e singulis Drachmis xij. sumat iij. singulis noctibus, superbibendo Aq. Brion. comp. Cochlear. iij. vel iv. per totum decursum hujus processus.*

Sin autem pilulæ ultimo præscriptæ ventrem moverint, quod in corporibus quæ facillime purgantur præ *Gummis* quæ insunt quodque sit, tum sequentes substituantur.

24. *Castor. 3j. sal. Juccini volatil. 3℥. cum s. q. extract. Rutæ f. Pilule exiguae numero xxx. cap. iij. singulis noctibus.*

Hic autem observandum, quod *Chalybeata* in quacunque forma aut dosi exhibeantur, scæminis quandoque magnas tum animi, tum corporis perturbationes inducant, idque non solum primis diebus (quod fere omnibus solemne est) sed etiam per totum tempus quo illis utuntur; in hoc casu non statim chalybis usus dictis temporibus interrumpendus, sed, quo melius eundem ferre potuerint, *laudanum* aqua aliqua hysterica mistum singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

At ubi symptomata mitiora sunt, & res sine ferro introsumpto transigi posse videtur, (in minore scilicet morbo) satis habeo sanguinem mittere, atque alvum solvere ad dies tres quatuorve, ut supra diximus: Dein *Pilulas Hystericas* alternantes præmemoratas mane & sero per x. dies capiendas imperare. Quæ quidem methodus in affectu leviori raro a scopo aberrat. Imo pilulæ istæ solæ, vel omittis phlebotomia & catharsi, sæpe magnos effectus edunt.

Serio interim animadvertendum est, nonnullas scæminas *Idiosyncrasia* quadam, ab *Hystericiis* illis medicamentis (quæ plerisque hujus morbi symptomatibus levamen afferunt & solatium) ita penitus abhorre, ut non solum non juventur, sed etiam insigniter ab eorum usu lædantur. In his itaque omnino sunt omittenda ista: *Φύσις γὰρ ἀντιπαρτεῖται*, ut divinus senex, *καὶ τὰ ταῦτα*. *Invita Minerva* nihil quicquam molendum.

Quæ quidem *Idiosyncrasia* adeo insignis ac frequens est, quod respectu ad eam non habito ægræ in discrimen vitæ conjici possint; idque non solum quoad hysterica, sed quoad multa remedia alia: cujus impræsentiarum instantiam unicam adferam. Scæminæ nonnullæ *Variolis* laborantes *Syrupi* e *Meconio* usum ferre non possunt, utpote a quo vertigines, vomitiones, & id genus symptomata ad effectus hystericos pertinentia, accersantur, quibus tamen *Laudanum liquidum* apprimere conveniat. Quod & dum hæc scriberem in adolescentula nobili observavi, cui *Variolis* laboranti cum sexta ac septima nocte syrupum dictum exhibuissem, symptomata prius memorata singula exhibitione, ei ingruiebant, neque pustularum inflammatio debito modo procedebat; sed cum impofterum *Laudano* uteretur, a symptomatibus dictis prorsus immunis erat, faciei tumore ac pustulis indies augescentibus, & quod non minus læti ominis erat, *anxietas* ista, cum *inquietudine* quadam tam mentis, quam corporis, (quæ quasi *paroxysmus Variolarum* solet esse) prorsus tolleretur, quoties paregoricum hoc propinabatur, ægra mox vires atque animum exinde recipiente. Hoc obiter.

Atque ita *hysterici Affectus* quoad plurimum sanantur, ut & pleræque mulierum, quas appellant, *obstructiones*, at præ cæteris *Chlorosis* seu *pallidi virginum colores*, uti etiam *mensium suppressiones* qualescunque. Attamen si sanguis usque adeo effœtus fuerit, tantæque proinde spirituum *ἀταξία*, ut chalybs præscripta methodo usurpatus malo vincendo par non sit, adeundæ *Aquæ minerales* aliquæ ferri mineræ saturæ, quales sunt nostræ *Tunbrigienfes*, aut aliæ nuper repertæ. Harum enim virtus chalybeata, tum ob insignem quantitatem qua hauriuntur, tum etiam ob eandem cum natura convenientiam intimius sanguini permiscetur, & potentius morbos expugnat, quam ferrum quocunque demum artificio nobilitatum, ut volunt Cinifiones imprudentiores.

Hoc autem præ cæteris inter bibendum observandum, si ægritudo quævis ad symptomata affectionis hysterice referenda accidat, hoc in casu per diem unum alterumve æger aquis abstat, donec symptoma illud transitum aquarum alias impediturum, penitus abeat. Etenim tametsi hæc aquæ humoribus agitandis ac proinde spiritibus confusio inducendæ minus aptæ natæ sint, quam cathartica vel lenissima ex officinis deprompta, aliquantulum tamen idem præstant, quatenus sc. diuretica sunt; ut taceam quod sæpe etiam ventrem movent. Quod si ipsæ aquæ humores ac spiritus exagitando turbandoque aditum sibi met ipsis præcludant quo minus facile transiant, videant illi quam importune agunt, qui medicamenta purgativa per harum usum imperant, semel aut bis in septimana assumenda, vel, quod adhuc ineptius, ipsis aquis immiscenda præcipiant. Unde fit tam in his, quam in aliis aquis mineralibus, ut non solum non promptius, sed & plane tardius ac difficilior eadem operentur.

Hic mihi non reticendum, quod tametsi his aquis ferrum inesse in principiis solutis nonnullis videatur (quod idem plane est ac si ferrum liquidum supponamus) nullus tamen dubito quin eadem nonnisi simplices aquæ extent virtute mineræ, per quam transeunt imprægnatæ ac infectæ. Quod cuipiam liquido constabit, si aquæ communis congiis aliquot satis magnam vim clavorum veterum ex calceis equinis extractorum infuderit. Sentiet scilicet aquam hanc, cui pulvis *Gallarum*, *fol. Tea*, vel similia fuerint immista, eodem plane calore infici, ac si aqua esset fontis mineralis. Neque sane diversos effectus hæc aquæ five artificiales, five inartificiales (utrum enim mavult quis appellet) epotæ edent, modo tempore æstivo, atque aere salubri assumantur.

Sed utut hoc sit, si ob contumaciam ejus hic affectus ferreis aquis minus cedat, adeundæ sunt *aquæ calidæ Sulphureæ*, quales sunt nostræ *Bathonienses*; atque æger, postquam tribus auroris continuas eas intus assumpserit, sequenti die *Balneum* ingrediatur, & postero die iterum eas bibat; idem faciendo alternatim per duos menses integros. Etenim tam in his, quam aliis, cujuscunque demum gene-

generis sint, hoc sedulo notandum, quod in earum usu eoque ægro persistendum, donec non tantum levamen aliquale sentiat, sed, quo minus symptomata omnia brevi postliminio revertant, donec omnino convalescat.

Theriaca Andromachi, vel sola, si crebro diuque usurpetur, magnum est in hoc morbo remedium. Neque vero in hoc solo, sed in aliis quamplurimis a coloris & concoctionis sive digestionis defectu ortis, omnium forte potentissimum, quæ hætenus nobis innotuere, utut a plerisque fastidiatur, quod & pervulgata sit, & a tot jam sæculis cognita.

Vina Hispanica Gentiana, Angelica, Absynthio, Centaury, Corticum Aurantiorum flavedine, aliisque corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot cochlearia ter in die potentur, admodum conferunt, modo ægra tenui non fuerit biliosoque corporis habitu. Profecto vel *Vini Hispanici simplicis* liberalior haustus hora somni aliquot noctibus, meo suasu propinatus hysteris nonnullis perquam salutaris fuit, cum ex eo robustior universi corporis habitus redderetur, ipsæque adeo fœminæ & cachecticis vividæ simul ac vegetæ fierent.

Ad hæc *Peruvianus Cortex* eximias mirandasque vires in sanguine & spiritibus confortandis invigorandisque habere nonnunquam deprehenditur; cuius *Scrupulum unum mane & sero*, ad septimanas aliquot deglutitum, sanam firmamque corporis crasin (tam Viris *Hypochondriacis*, quam *Hysteris* fœminis diu multumque ægrotantibus, dejectaque jam quasi corporis æconomia) restituisse, ipse observavi. In nullo autem hysterorum affectuum genere felicius succedit, quam in illo, quo *Spasmi* afficiuntur fœminæ, nixus edentes fortissimos & pluraquam muliebres, pectora simul ferientes. Interim tamen confitendum est, quod hoc medicamentum non ita certo crebroque huic malo succurrat, ac *Febribus Intermittentibus*. Quamvis vero (ut id obiter dicam) in harum curatione egregia præstet, ne dicam miracula, dictus cortex, atque eodem tum ipsi nos libenter utamur, tum uxoribus liberisque usurpandum imperemus, quoties res postulet; sunt tamen, quibus haud minus jam displicet, quod tam certo subitoque morbos expugnet, quam olim displicebat, quod non nisi nuper his terrarum oris innotuerat. Quo quidem facto tum optimi quique viri, tum etiam præstantissima quæque ac *Spasmodica* remedia semper fere urgentur. Veruntamen ad hanc notam, seu Lydium lapidem, indolem nostram licet adductam experiri, atque exinde dignoscere, hominesne boni simus, an vero probo; pro gradu sc. quo vel exultamus, vel dolemus, ac ringimus, quoties publica res hominum communi aliquo beneficio, ac Numinis favore augetur.

Si quæ vero ex remediis supra recensitis minus convenient, quod temperamento bilioso ac tenui præditis sæpe accidit, tunc *Dieta Lactea* possit usurpari. Etenim mulieres aliquot (quod prima statim fronte mirabitur quis) cum affectibus hysteris diu conflictatæ, etiam iis, qui omnes Medicorum conatus spreverant eluserantque, tandem lacte solo aliquandiu vefcentes convalere. Atque illæ quidem maxime, quæ ea specie laborabant, quam egocolicam hystericam appello, quæ non nisi a Narcoticis potuit deliniri; quibus itaque per intervalla repetendis multum assueverant hæ fœminæ, dolore recrudescere ut primum emarcuerit anodynus virtus. Id verò in hac curandi methodo præcipue mirandum, quod cum lac frigidum tantum crudumque alimentum præbeat, spiritus nihilominus ejus usu corroborentur invigorenturque. Nec tamen hoc a ratione abhorre illis videbitur, qui secum reputaverint, lac, cum simplex omnino nutrimentum suppeditet, naturæ minus in coquendo negotium facessere, secus ac solent cibi ac liquores magis compositi; quodque perfectissimam illam concoctionem æqualis sanguinis spirituumque crasis necessario sequatur. Illud etiam est animadvertendum, quod non nuda spirituum debilitas per se considerata, sed eorundem debilitas ad sanguinis statum comparatum, & *crasis*, quam patiuntur, causa sit. Fieri enim potest, ut infanti spiritus satis firmi robustique sint pro sanguinis ratione, qui tamen debitam ad sanguinem adulti hominis proportionem non teneant. Jam vero cum ex jugi lactis usu & Diata, quantumvis illa sit cruda atque invalida, sanguis mollior & tenerior evadat, si spiritus ab eo nati sanguinis pares tantum sint, satis bene se res habet. Non omnibus tamen contingit, quantumlibet a lacte alies juvari potuerint, ea incommoda superare posse, quæ primis fere diebus apportat, quod nempe tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis in statu conservandis sustentandisque minus sufficiat.

At vero nihil ex omnibus quæ mihi hætenus innotuere, adeo impense sanguinem spiritusque fovet firmatque, ac diu multumque singulis fere diebus equo vehi. Cum enim in hac gymnasticæ specie impetus ferme omnis in ventrem inferiorem fiat, in quo vasa excretoria (quotquot facultatis, in sanguinis massa stabulantibus, educendis a natura instituntur) sita sunt; Quæ tanta functionum pervasio, aliave organorum naturalis impotentia vel fingi potest, cui tot succussionum millia eodem die ingeminata, idque sub dio, opem non attulerint? Cujus calidum innatum usque adeo deferbuerit, ut hoc motu non excitetur, & denuo effervescat? Quæ vero sive præternaturalis substantia, sive succus depravatus in aliquo harum partium sinu recondi potest, qui non hoc corporis exercitio, vel in statu naturæ consentaneum perducatur, vel quaquaversum dissipetur elimineturque? Quid quod sanguis perpetuo hoc motu indefinenter exagitat ac permixtus quasi renovatur ac vigescit? Quæ quidem methodus, licet fœminis vitæ desidi atque imbelli assuetis, minus accommoda sit, utpote quæ a motu, maxime in principio, possint lædi, viris tamen est aptissima, & sanitatem præ cæteris conciliat.

Nostrorum quidem in *Sacris Antistes*, Vir prudentia atque eruditione celeberrimus, postquam diu studiis intemperantius incuberat, omnesque animi, qui permagnus ei est atque excelsus, nervos seriis cogitationibus nimio opere intenderat, tandem in *Affectum Hypochondriacum* incidit, quo diutius lacescente, omnia corporis fermenta erant vitata, concoctionesque penitus subversæ. Medicamentorum chalybeatorum tedium plus semel devoraverat: aquas minerales fere omnes, cum catharsi sæpe repetita, fuerat expertus: Uti etiam antiscorbuticorum omnium generum, pulveresque testaceos quamplurimos, sanguinis edulcorationem promittentes. Ita partim morbo, partim medicatione per tot annos continuata, tantum non fractus, *Diarrhœa Colliquativa* (quæ in *Tabe*, aliisque morbis chronicis, ubi omnes omnino digestionis sunt: prostrata, mortem anteire solet)

demum corripiebatur. Ubi me tandem consuleret, statim mecum reputavi pharmacis nullum amplius locum relinqui, cum tot tantæque nullo cum fructu jam deglutiverit. Suadebam itaque ob causas supra memoratas, ut statim se equo vehendum curandumque traderet; modico primum itinere, quale ferre possit valetudo ita infirma, ut, nisi judicio valuisset rerum interiora altius penetrante, nec ad tentandum quidem illud exercitii genus potuisset adduci. Rogabam autem, ut quotidie in eo persisteret, donec ex animi sententia convalesceret; majora in die spatia gradatim conficiens, donec tandem ad tot millia ascenderet, quot uno die percurrunt prudentiores ac moderati viatores; qui iter longiusculum negotii alicujus gratia susceperunt: Nullo interim sive ad cibos, sive potum, sive etiam aeris temperiem respectu habito, sed ad instar itinerantis omnia, prout fors dederit, exciperet. Ne longior sint, hanc ille viam incessit, productis gradatim iterum spatiis, donec tandem ad vicesimum, imo ad tricesimum usque lapidem quotidie vectaretur: cumque se longe melius habere post pauculos dies experiretur, ipso rei eventu pene mirabili animatus in eodem cursu ad menses aliquando multos perseverabat, quo temporis spatio plura milliarum millia, quod ipse mihi narrabat, emensus est, donec tandem non convaluerit modo, sed satis validum etiam vegetumque corporis habitum fuerit indeptus.

Neque magis *Hypochondriacis* prodest hoc exercitii genus, quam *Tabidis Phthisicisque*, quorum nonnulli mihi sanguine juncti multum terrarum equo vectore peragrantes, ex meo consilio, sanitati sunt restituti; cum certo sciam me vel medicamentis quantivis pretii, aut alia methodo, quæcunque demum ea fuerit, nihil magis iisdem proficere potuisse, quam si multis verbis hortatus fueram, ut recte valerent. Neque in levioribus tantum malis, crebra tussi & macie stipatis, id remedium obtinuit, sed & in *Tabe* tantum non deplorata, ubi *nocturnis sudoribus* jam etiam accesserat *Diarrhœa* ista superius dicta, quæ phthisi confectis mortis præsentia solet esset, atque adeo ut plurimum ultima rerum linea. Verbo dicam. Quantumcunque exitialis *Phthisis* & sit & audiat, utpote qua intereunt duo fere trientes eorum, quos *morbi Chronici* jugulant, hoc tamen sancte assero, quod neque *Mercurius* in *Lue Venerea*, neque *Cortex Peruvianus* in *Intermittentibus* efficaciores extant, quam in *Phthisi* curanda *Exercitium* jam laudatum; modo æger curet, ut lintamina lecti probe fuerint arefacta, atque etiam ut satis longa itinera emetiatur. Attamen hoc notandum, quod vitæ *æquæ* prætergressis multo diutius in hoc exercitio persistendum, quam infra istam ætatem positis. Atque hoc multiplici experientia, quæ vix me fefellit unquam, didici: Et licet equo vehi phthisicis præcipue conferat, tamen & itinera curru facta mirandos sane effectus quandoque ediderunt.

Sed ut ad propositum revertar. Hæc est generalis hujusce morbi curandi ratio, qua causæ originariæ, quæ est debilius sanguinis crasis, occurratur; ac proinde extra paroxysmum tantum locum habet. Quoties vero *Paroxysmus* invaserit, adjuncto quolibet ex prædictis symptomate, si tale, aut tantum sit malum, ut inducias ferre nolit, donec, sanguine & spiritibus corroboratis, quasi per ambages sanari possit, confestim ad remedia *Hysterica* ista confugiendum est, quæ odore viroso ac gravi spiritus, ut dixi, exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant, sive intra corpus sumantur, sive naribus admoveantur odoranda, sive exterius applicentur: cujusmodi sunt *Assa fetida, Galbanum, Castoreum, Spiritus salis Armoniaci*, & quicquid est denique quod odorem tetrum admodum ingratumque spirat.

Hic enim quod res est dicam. Quæcunque fœtent, ea omnia intentioni huic apprimè inserviunt, sive natura, sive etiam ars ea putido odore donavit. Atque, ni fallor, *Spiritus C. C. Sanguinis humani, Urine, Ossium*, ac similia, inde præcipuas suas vires acquirunt, quod dum vi ignis præparentur, empyreuma contrahunt tetrum ac male olens, quasi essentia eorum intimius annexum. Quod pariter cernitur in fumis a corio, pennis, & id genus animalium partibus, cum exuruntur, exhalantibus. Etenim id habent commune singulæ animalium substantiæ, ut inter exurendum fumum emittant olidum & olfactui ingratum: qui si importuno igne affatim eliciatur, ac organis excipitur condensatus, is in liquores istos abit ac convertitur, qui *Spirituum Volatilium* nomine insigniuntur, quique facultates eas facile reportant, quæ subiectis suis haud primitus inerant; utpote qui *Ignis* solummodo *Creature* existunt, & singuli eorum eandem plane virtutem cum cæteris nanciscuntur, ex quacunque demum substantia (modo *Animalis* ea sit) procudantur extrahanturque.

Proximo loco animadvertendum est, quod si paroxysmum comitet *Dolor* aliquis intolerabilis in quacunque demum parte, aut *Vomitio* enormior, aut etiam *Diarrhœa*, tunc præter hysterica jam laudata, *Laudanum* in usum revocari debet, quod solum vires habet his symptomatibus cohibendis prorsus pares.

At vero in iis doloribus sedandis, qui vomitiones excitant, cavendum est sedulo, ne illi sive Laudano, sive alio paregorico mitigentur, non præmissis debitis evacuationibus, nisi patientiam fere humanam omnem vicerint. Primum, quia tanta nonnunquam sanguinis & humorum copia est aggesta (maxime in fœminis sanguineo, & maculis propiore habitu præditis) quanta Narcotici vel efficacissimi, ejusque sæpius repetiti, operationem valeat suffragari. Unde in talibus sanguis e brachii venis necessario est extrahendus, & catharticum eis propinandum est, antequam ad Laudani usum accedamus; his enim rite peractis, quod prius vel in maxima dosi exhibitum, nihil proficiebat, jam in dosi mediocri scopum attinget. Deinde quia multiplici experientia edocti sumus, quod quoties ægra paulatim Laudano assueverit, non præmissa evacuatione debita, necesse habuit ob dolorem mox ab evanescente remedii virtute denuo revertentem, paregoricum rursus ingerere, idque quotidie annos aliquot continuos, dosi subinde per gradus aucta, ita ut nullo modo jam a Laudano abstinere queat, licet omnes ab illo digestionis vitientur, & functiones naturales debilitentur. Quamvis non sentiam Laudani usum sive cerebro, sive nervis, sive facultatibus animalibus immediate nocere. Judico itaque ego, quod expertus loquor, evacuantia anodynus debere præmitti: v. gr. viraginis & fœminis in quibus sanguis prædominatur, vena secanda est, & alvus subducenda, præsertim si non jam a longo tempore paroxysmo fuerint correptæ. Si vero fœminæ debiliores, & quæ temperamenti a prioribus illis plane diversi sunt, hujusmodi paroxysmo & dolore affligantur, atque eodem subinde

haud

haud ita pridem laboraverint, sufficere eorum ventriculos congio uno, plus minus, lactis cerevisiati hausto, & mox per vomitum reiecto detergere; dein largam dosim imperare sive *Tberiacæ Andromachi*, sive *Electuarii Orvietani*, & cochlearia aliquot liquoris aliquis spirituosus & gustui non ingrati cum paucis Laudani liquidi guttulis superbibenda.

Quod si ægra jam pridem vomuerit, antequam accerferetur Medicus, & metus sit ne si emeticis ulterius sollicitetur, in furorem agantur spiritus, & ægræ vires nimium deiciantur, hoc in casu *Laudanum* sine mora propinari debet, eo dosi modo, numeroque, quæ symptomatis magnitudinem ac durationem non tantum exæquare possit, sed & vincere.

Duo autem hic præceteris diligenter sunt notanda. Primo, quod cum semel post evacuationes iustas & necessarias, Laudano uti cœperimus, ea dosi, atque illa toties repetita, sumendum est istud pharmacum, donec symptoma omnino fuerit debellatum, interiecto tantum spatulo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus, quam alteram repetamus. Sed de hoc fufius alibi egimus. Deinceps dum Laudano morbum aggredimur, nihil prorsus movendum est, nihil evacuandum, cum vel mitissimum illud enema e lacte saccharato possit destruere, quicquid reparaverat paregoricum, & tam dolorem quam vomitionem postliminio revocare.

Ut vero dolores, quod jam innuimus, supra memorati importuni sint in anodyno efflagitando, tamen vomitiones enormes & dosim ejusdem longe maximam & sæpissime repetitam indicant, cum ab inverso motu ventriculi peristaltico (quo in eo contenta versus inferiora erant protrudenda) remedium paregoricum prius eliminetur per oesophagum, quam opis aliquid afferre queat, nisi post singulas vomitiones Narcoticum de novo toties quoties iteretur, idque in forma potissimum solida; aut si in liquida detur, vehiculum ita parum esse debet, ut ventriculum imbuat tantum, & præ materiæ inopia ab illo sursum evehi nequeat, verbi gratia *Guttæ aliquot in cochleari uno Aq. Cinamoni fortioris*, aut similis. Monenda interim est ægra, ut statim ab assumpto Laudano conquiescat, ac caput præsertim quantum fieri potest immotum teneat; quando vel levissimus capitis motus præceteris omnibus vomitionem provocet, unde medicamenti modo deglutiti iactura fit. Quinimo etiam cessante & quasi perdomita vomitione, expedit anodyno ad pauculos dies mane & sero exhibito, seu injecto fræno, recidivam præcavere. Quod itidem post dolorem hystericum Narcotico sedatum, aut diarrhœam, omnino observari debet.

Atque ira demum methodo jam tradita & *Dolori & Vomitioni* symptomaticis mederi in promptu est, a quibus cum aliorum persæpe morborum speciem præse ferant, Medicis facilius imponitur, quam ab aliis quibuslibet symptomatibus, quotquot manum medicam deposcunt; de quo pauca subjungam verbi gratia in ista hysterica affectionis specie jam descripta, quæ *Paroxysmum Nephriticum* imitatur, quis non videt quanta sit paritas morbi utriusque & similitudo, tum quod pars eadem utrobique doleat, tum quod in utroque affectu vomituriant ægræ, cum tamen a causis ita ab invicem variantibus pendeant, & tam impari methodo debeant sanari, ut quod in hoc lædat, in illo juvet, & e contra? Si enim sive *Calculus*, sive *Arenula* renum substantiam atterentes, dolorem inferant, atque ex partium consensu vomitionem, nihil æque conducet ac prælargæ & frequens causæ antecedentis per phlebotomiam revulsio, tum ut dilatentur laxenturque meatus, per quos calculus excludendus est, enematis emollientibus sæpenumero repetitis, aliisque ejus generis remediis internis: Quibus medicamenta diuretica, & lithontripica addenda sunt. Jam si dicta symptomata a calculo nullatenus oriantur, sed a spiritibus animalibus nimia copia renes impetentibus (quo in casu paregorica tantum indicantur, nec vel enema e mitioribus, post primas evacuationes, sine periculo injicitur) in quanto vitæ discrimine versetur infelix ista, de cujus jam corio luditur, non opus est dicere. Idem potest affirmari de affectu illo hysterico, qui *Colicam Biliofam*, vel *Iliacam Passionem* simulat. Hic ubi pro concessio habeatur affectum istum (licet indolis omnino sit diversæ, imo contrariæ) colicam biliofam esse, & ab humore aeri in viscera per arteriarum mesentericarum oscula excreto nasci (in quem errorem dolor intolerabilis, & viridis color, qui in materia cernitur tam per os quam per sedem expulsa, Medicum incautiorum & cogitationibus minus assuetum haud ægre perducant) quæ methodus tam comoda, quam ut in contemperanda, remedium refrigerantium atque Acrassantium ope, humorum acrimonia operam locemus? Atque, quo humores e visceribus exterminantur, præter enemata quotidiana, ut cathartica frequenter propinemus; inter cætera vero etiam Mercurium dulcem diagrydiatis permixtum ad pleniorum materiæ morbosæ eradicationem? Quam male autem cum ægris agatur, quantumque eis periculum immineat, dum huic methodo insistamus, si affectus qui colica biliosa censetur, re ipsa hysterica tantum fuerit, aut hypochondriacus, nemini non liquet: cum clamet experientia, quo post primas evacuationes universales (quæ humorum putrescentium, quos peperit *αταξία* jam sæpe dicta, quique anodynus obstaculo esse possint, saburra amolientia dicantur) nihil jam restat nisi ut tumultuantes spiritus consopiamus, donec tandem symptomata evanuerint, atque iis cessantibus opportune chalybeata imperemus, vel si quod aliud est remedium quod sanguinem accedendo atque invigorando morbum radicitus extirpet. Meum non est plurimas atque ingentes illas calamitates enumerare, quas scæminis contigisse ipse novi, ubi colica hæc hysterica a bile ortum ducere existimaretur. Veruntamen affirmo evacuationes sæpe repetitas, quæ quidem in colica biliosa omnino indicantur, dolorem vomitionemque non solum non compescere, sed irritare magis, spirituum sc. perturbationem, quæ vera horum symptomatum causa est, promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metathesi derepente in cerebrum facta, desinit in *Spasmus*, a quibus ægra brevi e medio tollitur; idque vel maxime, ubi post alias evacuationes diutius repetitas, suadente colore viridi eorum, quæ per os & ventriculo excernuntur, emeticum fuerit propinatum. Verbo dicam: Si quid ego observando didici, in primis cavendum est, ne symptomata scæminis hysterici familiaria ab aliis quos sæpe æmulantur morbis, diagnosi errante putentur oriri.

Hic non est reticendum, quod præter errores jam recensitos, a quibus scæminæ affectibus hysterici obnoxia de vita periclitantur, permultæ insuper errore non minus funesto dictis affectibus mulctan-

tur ea tempestate, qua hic morbus, licet sua natura non sit lethalis, tamen vi malorum *επιγινόμενων* ac subsequantium haud paucas e medio tollat. Exempli gratia: Scæmina teneriori atque infirmo corporis habitu infantem parit, cui omnia feliciter & secundum naturam cedunt: Obstetrix, sive rudis & imperita, sive iactabunda, & quam præclare suo illa munere functa sit palam ostentans, suadet ut puerpera paucis a partu diebus surgat, & se a lecto aliquandiu abstinere. Hæc morem gerens, statim a primo corporis motu *Affectione Hysterica* corripitur, & pro ratione qua morbus inausciscit, *Lochia* primum imminuuntur, deinde sistuntur penitus; quorum suppressionem præmaturam longa symptomatum series excipit: quæ, nisi permagna tam diligentia quam in medendo peritia intercedat, ægram brevi perimunt. Nonnunquam enim *Phrenesi* laborant ex hac occasione, quæ indies efferatior redditur *Spasmus* primum, dein mortem affert. Si vero mortem evadant, mitius aliquantulum insaniunt, quandoque ad ultimum vitæ terminum. Nonnunquam post lochiorum suppressionem in *Febrem* incidunt, quæ vel in earum, quæ tum grassantur, Epidemicarum castra transit, vel ab ea sola pendet origine. Adde quod iidem affectus hysterici, quibus lochiorum suppressio in primis debetur, jam magis sæviunt, tanquam ex se denuo nati. Diu est a quo mihi subit in mentem, quod ex iis quæ moriuntur puerperis, vix decima quæque, ut moleste computemus, vel ex eo perit quod vires partui necessariæ eam defecerint, vel ex doloribus partum laboriosiores comitantibus; at eo maxime nomine, quod debito citius lecto exurgat, excitatis a motu illo paroxysmis hystericiis, a quibus cum sistantur lochia, mox ingens ineluctabilem symptomatum turba ingruit. Quamobrem istis quæ me audiunt ubique Author sum, ut ad diem saltem *Decimum* usque in lecto se contineant, si modo natura paulo debiliores sint, præcipue si *Vaporibus*, qui vulgo dicuntur, jam pridem fuerint tentatæ. Præterquam enim quod ista, qua in lecto fruuntur, quies, a malis jam toties commemoratis eas immunes præstet, non interruptus lecti calor spiritus pariter reficit tum a pariendi doloribus, tum ab evacuationibus in hoc casu sollemnibus exhaustos fractosque; quinimo & naturæ suppetias fert, atque omnes, quas gestationis tempore mulier congesterat, cruditates digerit & amolitur.

Verum, si ab admissio hoc errore quodvis e dictis symptomatibus supervenerit, indicationes curativæ eo dirigendæ sunt, ut spiritus ab hoc motu jam irrequieti redditi sedentur, & ut *Lochia* rursus fluant, quandoquidem reorum suppressio horum symptomatum causa sit proxima atque immediata. Neque tamen huic methodo pertinacius insistendum, sed exhibitis aliquandiu remediis quæ in hoc casu cum successu usurpari solent, si votis ea non respondeant, ab iis temperandum est; cum neque fortiora hic locum habeant, neque in mitiorum usu perseverare debeamus, propter attritas & fere prostratas puerperarum ita affectarum vires. Exempli gratia, ubi primum lochia jam suppressi constat, e re fuerit scæminam e vestigio lecto addicere, mox *Emplastrum Hystericum* umbilico admove, atque quamprimum *Electuarium* sequens propinandum imperare. Ut *Conserv. absinth. Roman. & ruta an. ʒi. trochisc. e myrrha ʒij. castor. croci Angl. sal. volatil. salis Armoniaci, & assæ fœtidæ an. ʒss. cum s. q. syr. de ʒ. radicibus, f. Electuar. Cap. ad magnitudinem nucis moschat. majoris tertia quaque hora, superbibendo seq. Julapii cochl. iv. vel v. 2ʒ. aq. ruta, bryon. comp. an. ʒiij. sacchari Cand. q. s. ms. f. Julap. Atque hæc, si statim a primo suppressionis indicio exhibeantur, hoc malum plerumque devincunt. Sin autem dictis remediis eousque continuatis donec tota quantitas assumpta fuerit, lochia adhuc supprimantur, hoc in casu *Laudanum*, una saltem vice tentandum. Hic *Laudanum*, quantumlibet suapte indole adstringat, cum tamen spirituum perturbationem, a qua solemnis lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimum juvare, & *Emmenagogis* nihil proficientibus, lochiorum fluxum postliminio revocare possit. Commodissime vero Narcotica una cum *Hystericiis* & *Emmenagogis* propinantur; v. gr. *Laudani liquidi guttæ xiv. in Aqua Bryonice composita*, vel *Laudani in forma solida granum unum semis cum scrupulo dimidio Assæ fœtidæ in Pilulas duas redactum*. Sedulo interim animadvertendum est, quod si telo hoc semel misso scopum non attingamus, nec sequantur lochia, *Opium* nullo modo est repetendum, ut in aliis casibus fieri solet ac debet: Etenim si reiteretur hic paregoricum, lochia ita potenter sistet, ut ea nulla deinceps arte provocari queant. Verum enim vero si & hoc minus succedat (interiecto aliquo temporis spatio, quo certiores simus quid istud præstiterit) ad medicamenta iterum *Εμμεναγωγὰ* hystericiis permixta redeundum est, & dein ad *Enematis ex Lacte saccharato* injectionem. Verum quod de *Opio* supra, hic de *Enematis* dicendum est; nisi enim primo injectum lochia educat, nihil prorsus a pluribus est sperandum: cum unum humores leniter sollicitando, ut fluant lochia efficere possit; plura vero eadem alio divertant. His itaque peractis, (quæ tamen leviter tangenda sunt) tutissimum est, & prudentis Medici officium, temporis *συμμυχαίαν* præstolari; cum singulo quoque die curationis negotium magis magisque extra aleam ponatur, & si ægra *Vigessimum diem* superaverit, jam fere in vado est. Etenim cum a morbo, quisquis is fuerit, jam diuturniori scæmina aliquantisper respiraverit, viresque quadantenus receperit, eam methodam valebit ferre, quæ aptissima videbitur isto malo averruncando, quod a lochiorum suppressione accreverat: quando remedia obstinatius ingesta, primis ne hilum promoventibus, tum etiam spirituum perturbationem, a qua morbus oritur, augere possint, quod sedulo advertendum velim.*

Nuper Matrona, tam natalibus, quam moribus honestis ac probis, me sibi Medicum volebat: huic ex modo dicta occasione statim a partu paroxysmis hystericiis affectæ, lochia penitus defecerant. Conabar medicamentis supra memoratis eadem proritare, at frustra, affectione hysterica vehementiore omnem opem medicam respuente. Unde, dum ita demum eam salvam fore præviderem, si nihil prorsus molirer, rem omnem tempori, Medicorum facile principi ac coryphæo, committendam censui. Hoc meum consilium ad diem usque decimum quartum optime illi cessit; quotidie enim illam invisens, nullo die eam in pejore loco, quam pridie fuerat, deprehendi. Post hunc mulierculæ adstantes, quas hætenus a noxa illi sub officii specie inferenda ægre arcueram, maritum impellebant, ut sine mora sanguinem e pede uxori extrahi curaret; quo facto, paroxysmi hysterici adeo invalescebant, ut intra paucas horas spasmi accederent, & non ita diu postea, ærummarum requies, mors.

Et si fas mihi sit libere quæ sentio effari, jandiu in ea hæresi fui ut arbitrarer me, non tantum in dictis puerperarum morbis, sed etiam in acutis omnibus, ubi curationem ab hac illave, qua uti placet, methodo certo infecuraturam polliceri nequeam, & viri & Medici boni probique pulchre defungi munere, quoties nihil omnino tento, modo ægrum invifens, illum non se pejus habere hoc die quam heri habuit, comperiam, nec cras habiturum, quam hodie conjectura assequi possum. Cum si in ægro curando ea methodo incedam, de cujus efficacia nondum mihi certo constet, tam ab experimento quod ex eo capturus sum, quam ab ipso morbo is periclitabitur: neque ita facile geminum discrimen effugiet, ac simplex erat evasurus. Quamvis enim impræsentiarum nullum vel incipientis convalescentiæ signum manifestum se prodat, certissimus tamen sum, morbi acuti cujuslibet naturam non ferre, ut quis eossemper laboret: ac proinde dies quilibet res ægri magis magisque in tuto collocat, vel saltem Medico animum præbet, ex qua opportunius ac cærtius morbum feriat confodiatque, quam in præcedentibus liceret. Quod quidem uti de acutorum plerisque, vere affirmatur, ita præcipue de puerperarum morbis, quibus error vel leviusculus fatalis esse possit; & in quibus ita parum valeamus naturalem illam evacuationem regere, a cujus suppressione mala, de quibus diximus, proveniunt.

Cum vero *Affectus Hysterici* non semper primariæ causæ, spirituum nempe debilitati nativæ, sed adventitiæ aliquando originem suam debeant, hujusmodi itaque causam, antequam finiam, hic recensere libet, quæ frequentissime *Vaporum*, quos appellant, pararia existit. Atque ea est *Fluxus mensum immodicus*, sive in *Puerperio*, sive extra idem invadat. Quoad primam speciem, ea primis diebus post partum laboriosiore maxime infestat, & longa symptomatum hystericorum caterva stipatur. Et sicuti in primis hisce diebus solum ingruit ac urget, ita etiam brevi se proripere solet. Etenim si victus paulo incrassans instituitur, facile abigitur; cui & sequens porus addi poterit.

Assumatur *aq. plantag. & vini rubri an. ℥ij. Coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur s. q. sacchari albi. Cujus, cum frigescat, capiat ℥ss. bis vel ter in die.* Interim *Julapium* aliquod *Hystericum*, ut satis nite, subinde propinetur, & *nodulus* seq. naribus admoveatur. *℥. Galban. & Assæ fetid. an. ℥ij. Castor. ℥ss. sal. succini volatilis ℥ss. mf. f. nodulus.* Vel *℥. spir. salis Armoniac. ℥ij. quem sæpius olfaciat.*

Quod vero ad hujusmodi *extra Puerperium fluxum* attinet, licet idem omni tempore fœminis accidere soleat, eas tamen paulo ante tempus illud quo sponte sua omnino menses cessaturi, sæpiissime invadit; circa ætatis scilicet annum 45. si modo temporis fluere inceperant, circa autem 50. si serius in vita prius prorumpébant. His, uti dictum, paulo ante totalem eorundem discessum (instar candelæ jam fere absumptæ deslagratæque, quæ subito flammam edit insigniorem, mox penitus disparituram) cum magno impetu affarim excidunt, & ob copiam sanguinis ingentem qui continuo excernitur, in paroxysmos hystericos fere continuos miseras dejiciunt. Hic licet *Hysterica* tam interna, quam externa obiter usurpanda (fortiora devitando ne fluxum ulterius ea provocent) omnis tamen curationis cardo in menstruis cohibendis vertitur, quæ hunc in modum quam primum sistenda.

Mittatur sanguis e brachio ad ℥viij. Seq. mane exhibeatur *potio purgativa communis*, quæ repetenda est tertia quaque die per duas alias vices; & singulis noctibus per totum morbi decursum sumat *Paregoricum ex syr. de meconio ℥j.*

℥. *Conserv. rosar. siccat. ℥ij. trochisc. de terra Lemn. ℥iv. Cort. granator. & Coral. rubr. præp. an. ℥ij. lapid. hematit. sang. dracon. & bol. Armen. an. ℥j. cum s. q. syr. e Coral. simpl. f. Electuar. de sumat ad magnitud. nuc. Moschat. maj. mane & quinta pomerid. superbibendo seq. Julapii Cochli. vj.*

℥. *Aq. germin. quercus & plantag. an. ℥iv. aq. Cinnamom. bord. & syr. de rosis siccis an. ℥j. spir. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

℥. *Fol. Plantag. & urticæ an. q. s. contundantur simul in mortario marmor. & succus exprimat, qui postea clarificetur. Cap. cochli. vj. frigide ter vel quater in die.* Post primam purgationem applicetur *Emplaste. seq. regionis lumborum. ℥. Emplast. Diapalm. & ad Herniam an. part. equal. mis. extendatur super Alutam, & f. Emplast.*

Dicæta refrigerans incrassansque imperanda, nisi quod e re erit semel vel bis in die vini clareti haustulum ægræ indulgere, quot etsi minus conveniat in quantum ebullitionem ciere aptum natum sit, ad vires tamen refocillandas concedi possit. Atque hæc quidem methodus ut fœminis hoc modo affectis apprime proficua sit, ita eadem iis, quibus *Abortus* periculum imminet, non minus confert. Atqui cathartica & fucci hic omittantur.

Est & alia, etsi minus frequens, affectuum hystericorum causa. Nempe post partum laboriosiore *Uteri procidentia*, magnam hujusmodi malorum Iliadam secum trahens, quæ tamen cito ac facile hoc modo sanatur. ℥. *Cort. quercus ℥ij. aq. font. ℥iv. ad ℥ij. sub finem addendo Cort. granator. contus. ℥j. rosar. rubr. flor. granator. an. M. ij. deinde adde Vini rubri ℥ss. Colatura sit pro Fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur mane horis duabus antequam e lecto assurgat, & nocte post decubitus donec symptomata penitus evanuerint.* Sed de his plus satis.

Habes tandem, Humanissime Vir, eorum summam quæ a me in hujusce morbi sive historia, sive curatione hætenus fuerint observata. Restat, ut si quid forte peccaverim, ista minus quam oportuit accurate describens, veniam a te petam; tum ut opellam hanc, eo animo exaratam ut gratias tibi referrem, quod alia nostra conamina, qualia qualia illa fuerint, tuo calculo probare haud dedigneris, æqui bonique consulas. Quæ quidem gratulatio mihi ita raro obvenit, ut vel nihil prorsus ab hominibus sum promeritus, vel candidi ingenuique isti, quos ea mentis præstantia natura effinxit, ut grati esse norint, perpauci sunt; Vix totidem, quot *Thebarum porte, vel divitis ostia Nili.* Quo non obstante pergo adhuc, imo & pergam, in ediscenda promovendaque quoad potero methodo curandorum morborum, atque iis, qui me minus in praxi valent (si qui sunt ejusmodi) instruendis. Famæ meæ interim arbitrium penes alios sit. Æqua enim lance & scrupulose expendens, hominesne juvare præstet, aut ab iisdem celebrari, prius illud præponderare comperio, & maximi sane momenti esse ad animi tranquillitatem; Famam vero populique halitum pluma levior aut bulla, atque umbra insomni magis evanidum. Quod si opes ejusmodi nominis celebritate partæ

majus aliquod pondus habere videantur, fruantur illis per me licet, qui jam corraferint. Meminerint tamen mechanicorum nonnullos, artes vel sordidissimas exercentium, uberiores quotidie quæstum facere, & majorem auri argentique vim posteris legare; neque tamen in hoc brutis animalibus superiores evadere, qui sibi suisque pro sua indole prospiciunt; & si recta ex animi arbitrio & virtute, nata excipiamus (quorum non est capax brutorum natura) hos plane exæquant belluæ, imo & alios qui non eum sibi vitæ scopum proponunt, ut profint quamplurimis. Commendatum me habebas, rogo, Viro sagaci & eruditissimo D. Kendrick, tibi, mihi, que amicissimo; utpote cui debeam quod tuum in me ita propensum animum resciverim, eamque, quæ me complecteris, amicitiam, eo internuncio, didicerim. Conabor quantum in me est, mutuas officiorum vices reddere, & par pari referre, utpote qui sim jure meritoque, Vir dignissime,

Londini,
Jan. 20. 1681. $\frac{1}{2}$

Tibi Devotissimus, Tuique
semper Studiosissimus

THOMAS SYDENHAM.

DE variolis hætenus Clarissimus noster Auctor, in variis hujusce Operis locis, ac præcipue in primis ultimæ hujus Dissertationis paginis, accuratissime pro more scripsit, ejusque morbi contagium inter homines tum juniores, tum etiam adultos & senes, ita subinde se spargens, ut ejus necessitatem, si ita loqui liceat, vix ex centenis paucissimi evadant, abunde explicuit, curamque, tam atroci quandoque morbo aptissimam exhibuit. Verum in eodem argumento aliquid se nobis offert infrequentius ac minus familiare; contagium scilicet Variolicum armenta quandoque invadens, de quo docte ac pereleganter commentatus est Clarissimus Ramazzini, postque eum Clariss. Dnus Herment, Medicus in Galliis Regius, ac Peritiss. Dnus Drouin Legionis Prætorianæ, ibidem Chirurgus Primarius, in id a Rege Christianissimo deputati. Horum autem ultimorum Schedas hic omittimus, unica Clarissimi Ramazzini Dissertatione, quam jam exhibemus contenti. Illa autem sic inscribitur, & hæc est.

D E

CONTAGIOSA EPIDEMIA,

Quæ in Patavino Agro, & tota fere Veneta ditione
in Boves irrepsit.

D I S S E R T A T I O

H A B I T A

I N P A T A V I N O L Y C E O

A BERNARDINO RAMAZZINI

Præticæ Medicinæ Professore Primario.
Die IX. Novembris MDCCXI.

SI veri speciem præfert quod vulgo dici consuevit, & apud sapientes quoque receptum, consuetudinem vim quandam legis obtinere, ut qui illam violarit, si non plesti, landari tamen haudquaquam mereatur, qualem mihi legem ipsemet imposuerim, modo quamvis sero nimis agnosco. Etenim cum annus iste secundi sexennii, ex quo in hoc celeberrimo lyceo præticam medicinam profiteor, sit complementum, ac quotannis in solemnibus studiorum Instauracione, ut diu feriatam juventutem ad studia capeffenda allicerem, oratione aliqua proludere consueverim, nunc mihi jam effœtis corporis atque animi viribus, quando ætas prædatrix omnis secum aufert, magnum onus incumbere video, si consuetudini meæ nondum interruptæ obsecundare velim, ac vestram expectationem non omnino fallere. Audendum tamen ratus, in unum coactis, qui supersunt spiritibus, ita me comparaveram, ut quod antea præstiteram, hoc anno quoque pro viribus præstarem. Post aliquot igitur meditationes, argumentum non incuriosum, ut reor, nactus fueram, circa quod ingenii mei vires exercebam, cum præsens hæc autumnalis constitutio præter modum insolens, atque ominosa, Opus quod moliebar, & ab umbilicum pene deduxeram, mihi e manibus excussit, & aliud argumentum a Medicis amœnitatibus longe diversum suscipere coegit, vestra tamen attentione A. O. non indignum. Nemo non novit, quam inopinate, quam violenter bubulum genus dira contagio pervaserit flammæ ad instar, quæ ope nulla humana consopiri, nedum restingui potuerit. Hæc primum quidem in Vicentino Agro subobscurè observari cœpit, mox in Patavinum transgressa, aperte se prodidit, ac longe lateque effusa, usque ad ipsa urbis pomeria, tam magnam ac horrendam boum stragem edidit, ut tum rura, tum civitatem mœrore, ac metu compleret. Mœret rusticana plebs, imo stupet attonita, dum ampla bovia vacua, ac deserta intuetur, dum quotidie fere timulos adspicit, in quibus sepulta sunt fortunæ suæ pignora, propriis natis forsitan etiam chariora, dum bobus extinctis, equos ad frumenti sationem parum aptos cogitur sufficere.

Quid labor, aut benefacta juvant, quid vomere terras
Invertisse graves?

Sic miserandam agricolarum sortem deslere libet cum Poetarum Principe, qui tertio Georgicorum huic non absimilem bonæ cladem carmine descripsit. Mœrorem dissimulare nequeunt cives, & nobiles viri, dum prædia sua, & villas, præcipuo ornatu, & patrimonio orbatas intelligunt, atque etiam vident. Tristatur, ac dolet plebs urbana, dum annonæ, rerumque omnium, quæ ad victum spectant, caritatem brevi secuturam prænoscit. Nemo est igitur, quæcumque sit ejus conditio, qui damnum aliquod non sentiat, & graviora quoque non

non timeat. De hac igitur tam portentosa boum clade hodierna hac mea Dissertatione, seu potius prælectione, quam hoc anno ad tractatum de febribus, ac præsertim de febre maligna ac pestilenti, sum habiturus, verba facere constitui, hujus morbi indolem, casus peruestigando, quibus remediis illi obviam sit eundum.

Nec obtrudat quisquam, in hoc tam celebri lyceo, ab hac exedra, quæ ordinis sui primatum obtinet, indecorum esse pro Hippocratica doctrina M. Varronis, Palladii, Columellæ, Vegetii, aliorumque Veterinariæ artis scriptorum documenta tradere; regram enim ego, magnum Hippocratem, cui nullius rei scientia vilis habita est, non puduisse de boum morbis verba facere, in Libro enim de Articulis, rationem adfert, cur bobus tam facile contingant femorum luxationes. Præterea si congruentia, quæ omnibus in rebus momentum habet non leve, hic quoque suam meretur animadversionem, tractatio de hac boum epidemia nostri muneris est, Illustrissimi, & Spectatissimi Professores. Vobis quæso succurrat, quoniam in loco nos simus, & professorium munus exerceamus? Nonne in lyceo, cui a Majoribus nostris bovis nomen est inditum? neque inauspicato, quando bos iste suis mugitibus, hoc est doctrinæ robore totum literarium orbem implevit, ut nulla pars sit tam longe diffita, quæ ad illius celebritatem non reboet, ac ubi non colatur magis illius nomen, quam olim Serapis in Ægypto. Si ergo sub signo bovis militamus, si bos iste nos pascit, quis erit tam vecors, seu tam malignæ indolis, qui indecorum putet, provinciam hanc suscipere, quam detrudere velle impium, & nefas esset; eoque magis, quo ab Excellentissimo Magistratu, qui sanitatis tutelæ Venetiis præsidet, ac postremo ab ipso Serenissimo Principe demandatum est celeberrimo hujus civitatis Medicorum Collegio, serio exquirere, quænam sit hujus morbi conditio, quæ causa, & quibus præsidii ferocienti in dies malo possit occurrere.

Affectionis genus, quod bubulo generi bellum ad internecionem usque videtur induxisse, ex frigore, rigore, horripilatione, mox ex calore acri, & vehementi per universum corpus diffuso cum pulsus frequentia, febrem esse satis liquet, malignam vero, exitialem, pestilentialem etiam, si mavis, esse aperte testantur, quæ illam comitantur symptomata; qualia sunt, magna anxietas, & gravis anhelitus, etiam cum stertore, & in principio febris, stupor & species quædam veterni, continuus ex ore, & naribus graveolentis materiæ descensus, fetidissima alvi proluvies, interdum etiam cruenta, anorexia, & abolita penitus ruminatio, pustulæ quinta vel sexta die per totum corpus erumpentes, ac tubercula variolarum speciem referentia, communis tandem omnium eodem modo circa quintam, & septimam interitus, cum boves paucissimi evadant, iique forte potius quadam, quam remedium dynami. Hæc quidem ex se patent, quid vero intus patiantur miserandi boves, cum jacent anxii, ac stertentes, ac dum stant immoti, capite usque ad terram demisso, conjectare equidem possumus; sed ex mutis animantibus, quæ per nutus nihil significare possunt, nil certi rescire possumus, quod forsitan in causa est, ut difficilior sit curatio. Causam igitur hujusce malignæ febris pro viribus perscrutemur.

Omnibus epidemiis, si a sporadicis affectibus differre debent, id peculiare inest, quod communem causam habeant, sive ab aeris vitio, sive a corruptis alimentis, aut ab aliquo contagioso fomite prodigata fuerit, qui ab uno corpore in aliud transmigrat, illique eandem labem communicet. Dissimulare quidem non licet, tempestatum hujusce anni non adeo legitimam fuisse temperiem, juxta illarum naturam, Æstatis præsertim, quæ Veris speciem præferre visa est non admodum latrante Syrio, nec cicadis arbuta rumpentibus. Annus tamen in universum non insalubris fuit, neque multum in quæstu Medicis, ac Pharmacopolis: nec solum in hac civitate, sed in aliis quoque, & in transpadana regione, ut per literas accepi, ut parum verax visus fuerit Hippocrates, quod cum ætas veri similis est, autumnales morbos expectare oporteat. Nulla in aere a Meteorologicis portenta visa sunt, nulla in herbis, & frugibus apparere rubiginis signa, quemadmodum anno elapso, quocarbunculari morbo laborarunt fruges, nec tamen noxam ullam persensere armenta, & pecudes, in fructibus tum æstivis, tum autumnalibus, qui omnes serotini fuere, nullæ deprehensæ sunt notæ, quas nebularum uredo inusserit.

Cælum equidem non consului, ut viderem, num ex aliquo maligno astrorum influxu, pestilentia bubuli gregis causam divinaretur, ut ex Saturni cum Marte syzigia, in Tauri signo, quemadmodum olim Marsilius Ficinus, in Consilio quodam Thufco sermone edito, ut ab omnibus intelligeretur, pestis quæ anno 1478. totam Etruriam, ac præcipue Florentiam, depopulata est, causam retulit in conjunctione Martis cum Saturno in signo humano (quasi Asterismo) in hac inferiora virtus ab inditis nominibus esset petenda, ut si forte hujusmodi conjunctio observaretur in signo Arietis, aut Piscium, posset aliquis ovilis generis, aut marini populi excidium prædicere. Sed postquam, cum juvenis essem, Pici Mirandulani libros adversus Astrologos legi, judicariam a studiis meis valere jussi. Aerem itaque, & pascua, ab hoc crimine quod hujus morbi in causa fuerint absolvere fas erit. Quis enim unquam sibi persuadeat, campos, & prata, talem ab aere humorem combibisse, qui solis bobus tam dirum esset venenum, cæteris vero animantibus, quæ easdem herbas pascunt, esse omnino innoxius? Aliam igitur causam communisci oportebit, quam nonnisi a contagioso fomite licebit deducere, cujus rei non simplices conjecturas, sed argumentum habemus appodicticum.

Jam satis constat, & in acta publica relatum, ex boum turmis, quos e Dalmatia & conterminis regionibus, mercatores in hæc loca solent adducere, bovem unum a cæteris secessisse, qui a bubulco repertus, & perductus in latifundium Illustrissimi, & Reverendissimi Comitis Trojani Borromæi, Canonici Patavini, pro hospitio, eadem labe qua erat infectus, hospites suos sedavit; illo enim paucos post dies mortuo, paulatim eodem morbi genere omnes misere periere, uno tantum superstiti, cui in collo factum fuerat setaceum. Casus iste totam viciniam perterrefecit, sed nulla juvit diligentia, ut domus suas, & casas a flamma nimis vicina præservarent. Istæ itaque contagio paulatim serpens, totam Patavini agri amplitudinem brevi pervasit, quin postremo Padum transgressa, Æmilie populis idem minatur excidium.

Quoniam autem morborum seminii ea est indoles, ut facile suboleat, & in immensum se propaget, si in subjectum proprium, &

muniatum, ut vocant, incidat, cujus rei amplissimum specimen habemus in lue gallica; quæ ex Indiis occidentalibus, a paucis navigantibus ad nos delata, Italiam primo, mox universam Europam, sedissima, & ineluctabili labe citissime inquinavit; Non est quod miremur, si per aporias, & effluvia, quæ ad modum atmospheræ expirant a bobus ægris, ab extinctis, & stabulis, a pascuis, quæ ipsi met boves pascendo infecerint, promptius autem & facilius ab ipsis Bubsequis, & illorum vestibus, (pesti enim volupe est, in lana molli cubare) non est, inquam, quod miremur, si hæc contagio tam longe lateque se se effuderit. Ubi igitur hæc aura venenata subtilissima bovem aliquem antea sanum afflarit, spiritibus vitalibus, & serofolati se confocians, dum in Orbem agitur, naturalem sanguinis consistentiam lædit, & viscerum fermenta corrumpit; quare naturales viscerum functiones paulatim vitari, & debitas excretiones coerceri necessum est, quod paulatim fieri fas est credere, non enim subito ac bos aliquis venenum istud hauserit, vel quoquomodo illud suscepit, non illico, inquam, virulentiam persentit; ut qui a cane rabido commorari fuerint, ad longum tempus sibi sani videntur, at postea ex improvviso, ad aquæ conspectum palam faciunt, quam dirum venenum intus gestarent. Naturalem sanguinis consistentiam ab hoc contagioso fomite lædi paulo ante diximus; suppono etenim, imo pro certo habeo, venenum istud esse de illorum genere, quæ sanguinem potius figant, & coagulent, quam dissolvant; id primum attestantur symptomata, quæ febrem comitantur, nempe anxietas, gravis anhelitus, stertor, & stupiditas, ocularis quoque inspectio, dum a laniis boves extincti dissecantur, qui licet adhuc calentes parum aut nihil sanguinis effundunt. Bos præterea piger ac tardus ex sua natura est, & carnes habet duras, & graves ad stateram, ut ait Hippocrates, data nimirum paritate molis ad carnes cæterorum animalium, idcirco illius sanguinem talem esse oportet. Taurinum sanguinem inter venena recensuit Dioscorides, eo quod epotus ad coagulationem in stomacho sit facilis; Prænotius autem propter flatulentiam; Themistoclem sanguine taurino calido epoto sibi mortem conscivisse, ex Plutarcho, in ejusdem vita habemus. Mirum itaque non est si venenatus hic fomes, in hujus animantis genere sanguinem ex sua natura crassum coagularit. Hanc cruoris concretionem in malignis febribus observarunt Scriptores, uti Petrus Salius, qui refert in quadam ex maligna febre extincta repertum fuisse in arteria magna sanguinem ita concretum, ut prebenso illius sanguinis altero principio, totus sanguis coalescens, ita integer eductus fuerit, perinde ac gladius e vagina extrahi solet. Idem quoque aliquando in pestilentis accidere testatur Richardus Louver in tractatu de corde: Nisi autem talis esset in hac epidemia sanguinis conditio, non protraheretur ad tot dies febris; ubi enim sanguis est nimis dissolutus, & vis deleteria humorum corruptioni prævalet, febrilis calor est adeo mitis, ut ægri interdum se febrile non putent, sed citissime intra unam vel alteram diem occumbant. Postquam igitur fermentificus, & pestifer hic fomes per venas, & arterias tanquam per cuniculos totum corpus peragravit, tunc, tanquam hostis ex insidiis erumpens feritatem suam patefacit, febrem malignam excitando, quæ intra quintam, aut septimam, laniam suam absolvit, indiscriminatum boves, aratores, tauros, vaccas, juvencos, vitulos jugulando.

Hujus autem pestis primam originem, num bos ille peregrinus eam aliunde suscepit, vel in ipso primum genita fuerit, exquirere ad rem nostram parum refert. Necesse est enim quemadmodum in libro de contagione tradit Fracastorius, ac pariter Joseph Aromatarius, in libro de rabie contagiosa, quod ad aliud animal tandem sit deveniendum, in quo productum fuerit morbosum seminum. Extra enim controversiam est non solum in brutis, sed etiam hominibus per varios corruptionis gradus, generari posse venena, ac talis naturæ humores, qui ad alia corpora symbolica, & analogia facile transeant: sic qui tabe pulmonari laborant, consanguineos suos facile inficiunt, si cum illis consuetudinem habeat; lippitudinem contagiosam esse vetus est observatio.

Dum spectant oculi læsos leduntur & ipsi.

Multaque corporibus transiione nocent.

In boum cadaveribus, quotquot lanionum secespitæ subiecta fuerint coram Excellentissimis Anatomis professoribus D. Molinetto, & Viscardo, id singulare in omnibus repertum est, in omaso nempe, corpus quoddam durum, & compactum, ventriculi parietibus fortiter adhærens, magnæ molis, & intolerandæ graveolentiæ; in aliis vero partibus repertæ sunt hydatides, in cerebro, pulmonibus, sicuti etiam ingentes vesicæ solo flatu plenæ, quæ dissectæ diram mephitim exhalarent, ulcera in radice linguæ, & ad illius latera vesiculæ sero plenæ. Illud vero corpus durum, & compactum ad instar calcis, quod in omaso observatur; primum productum esse contagiosi miasmatis, pro certo habeo, dum tacite sævitiem suam exercens stomachicum fermentum labefactat, & corrumpit; non enim est credibile post febrem excitatam consilari hoc corpus intra paucos dies, dum boves ubi primum febrile cæperint, quodcumque alimentum adversantur, nec quidquam, nisi liquidum per os infundi potest: cætera vero, quæ memoravimus, malignæ febris producta esse, facile crediderim, sed omnium phaenomenorum exactam rationem adferre velle non patitur unius horæ ambitus; ampla enim materia suppeteret ad integrum tractatum conscribendum.

Verum ne amplius vos morer, A. O. ad ea properabo, quæ sunt dicenda, conjectando nempe, quem finem habitura sit hæc contagio, & num aliquid gravius portendat, ac quod magis refert, quid agendum. Quoad primum in hac epidemia, idem quod in cæteris evenire solet, secuturum existimo, nimirum quod post tot tentamina, tot experimenta, ac præsertim post observatam methodum, quam morborum medicatrix natura servat in iis bobus sanandis, quos maligna febris non sustulerit, felicius curatio possit institui, ac forsitan hujus veneni v. rum, & specificum remedium reperiri, quo malignum istud miasma penitus extirpari possit. Levamen quoque aliquod expectare licet ab adventante hyeme, ac a ventis aquilonaribus, qui tanquam aeris scopæ australes flatus pessimæ semper indolis procul abigant, quales venti per totum Octobris mensem dominatum obtinuerunt. Memoratu dignum est, quod de ventorum potestate supra humana corpora refert Vitruvius. *In insula Lesbo* (inquit ille) *Oppidum Mitylene magnificenter est ædificatum, & eleganter, sed positum non prudenter. In qua Civitate Ausser cum flat, homines ægrotant, quando Corus, tussunt, cum Septentrio, omnes in salubritatem restituntur.* Quantum sævierit pestis Octobris mense, austro, & euronoto flantibus,

bus, satis vulgatum est, cum plures dies adeo nefasti fuerint, ut neque quotidianis hecatombis, interdum etiam geminatis, furialis hæc, & execranda febris mitior fieri, nedum placari potuerit. Scio equidem, calori, & frigori morbos pestiferos non admodum auscultare, cum alias fuerit observatum, in summo æstu, & summo frigore pariter sævisse hominum pestem: artamen cum feralis hic morbus, qui celeris est motus, ortum habuerit æstivo tempore, incrementum, atque etiam suam acmen autumnali, sperare licet, quod hyemali tempore finem, & sui desitionem, ope divina sit habiturus.

Num autem hic epidemicus bovini populi morbus longum in tempus perseverans, humanis corporibus labem aliquam affricare valeat, ut nonnulli suspicantur, non alienum est disquirere. Si in morbis malignis, qui ratioecinia nostra persæpe eludunt, quidquam ponderis habent rationum momenta, sperare licet homines intactos & illæfos relicturum esse; etenim si trium mensium spatio lues ista alia ruminantia, & cornigera non attigit, quamvis inter ea magnus sit symbolismus, nec equos, sues, ac alias sylvestres feras hæctenus quidquam læsit, non apparet ratio, cur homines, qui ab istis animantibus tam longe distant, debeat afficere.

Non sum nescius inter futuræ pestilentie signa, quæ plurima sunt, recenseri solere non boum solummodo, sed aliorum quoque animantium stragem, qualis ea fuit, quæ Ægyptum insulam depopulata est, de qua Ovidius:

Strage canum primo, volucremque aviumque boumque,
ac ea, quam memorat Livius, quæ in Sicilia Romanum exercitum, & Carthaginensem pene delevit, de qua Silius Italicus:

Vim primi sensere canes, mox nubibus atris

Fluxit deficiens, penna labente, volucris.

Cui aliam non ab similem refert Dionysius Halicarnassæus, quæ primo equorum, boumque armenta invasit, mox pecudes, & alia quadrupedia aggressa est, deinde Pastores, & Colonos attigit, & totum Romanum agrum pervagata, Urbem invasit. Ast illorum temporum pestilentie non in solis bobus, sed in omnibus animantibus, ut ipsis etiam maris piscibus non parceret, (qualis ea fuit, quam Lucretius carmine descripsit) sævitiam suam exercuere, ut quæ ab aeris vitio ortum duxissent, de quo non habemus quod suspicemur; in solis enim bobus, & facilius in iis, qui habitiores, & pinguiores essent, quam in gracilibus, hæc lues alimentum invenit, quo rabiem suam pasceret. Magna tamen cautione utendum est in tumultu cadaveribus, terra alte defossa, quemadmodum publica edicta præscribunt, si quid enim timendum, præcipue a nimia cadaverum copia, ex quibus minus apte humatis, ac postea putrefactis, redeunte Vere, pravi halitus aerem inquinare possint. Bonum autem esset, in loco inculto, seu in pratis, quæ arationi non sunt subjecta, cadavera humare. Ubi enim de morbo contagioso agitur, nunquam satis cavemus, dum cavemus. Quoniam autem, solutis in liquamen cadaveribus, necesse erit terram subsidere, censerem, bonum esse, novam terram superingerere, in illam conjiciendo graminis, aliarumque herbarum semina. Refert Petrus Forestus Delphis apud Batavos, peste jam sopita, & cœmeterio Templi verusti cadaveribus oppleto, habitam consultationem inter Medicos, num calce, aut lapidibus illud cœmeterium esset obruendum, ac decretum fuisse ut anulta terra superinduceretur, atque in eam varia herbarum semina conicerentur, *ut crescente gramine, & clausis spiraculis, lues minus denovo suppullaret.*

Silentio tamen præterire non licet, observatam aliquando pestem in solis bobus, ac postea secutam hominum pestilentiam; interdum etiam hominum pestem in boves terminasse. Primum exemplum habemus ex Livio, qui scribit pestem magnam in boves ingruisse, sequenti anno ad homines vertisse. Secundum vero apud Ripamontium Chronistam Mediolanensem, qui in Libro de Peste, quæ anno trigesimo exacti nuper sæculi cispadanam, & transpadanam regionem pestifime mulctavit, pestilentie hominum, pestem boum subsecutam refert. Hisce tamen duobus monumentis totidem habemus, quæ opponamus nec longe petenda. Primum a celeberrimo Fracastorio, qui in Opere doctissimo de contagione scriptum reliquit, anno decimo quarto supra sæculi millesimum diram pestem in solos boves irrepsisse, quæ in tractu Forojulienfi primum nata, exinde usque ad Euganeos, postmodum in Veronensem agrum, aliasque Venetæ Ditionis regiones delata, magnam boum cladem ediderit eodem ferme modo, ac iisdem symptomatibus, ut hæc nostra illius soboles videatur. Alterum monumentum suggerunt nobis manuscripti artis lanionum, quibus non est deneganda fides, quales libri in hac civitate asservantur, in quibus ad posterorum memoriam ab Antonio Faccio scriptum legitur, anno nonagesimo nono ejusdem sæculi, quo vixit Fracastorius, adeo gravem in boves pestem grassatam, ut publicis Augustissimi Senatus Veneri edictis vetitum fuerit, ne caro bubula, caseus recens, butyrum, lac sub capitali pœna in hac civitate divendi possent, sed solis carnibus vervecinis vesci liceret; attamen iis annis nihil sinistri, præter rei familiaris damnum hominibus obtigisse, certo scimus. Habemus igitur unde spes nostras alamus.

Utrum autem, grassante hac epidemia, carnis bubulæ sanæ creditæ adeo tutus sit usus, ut noxam ullam humanis corporibus non possit inferre, abs re non erit disquirere. Res equidem suspitione non vacat; etenim, etiamsi bos antequam ad lanienam ducatur, fuerit observatus vegetus, atque hilaris, ac postea in illo jugulato, & excoxiato, nullæ in visceribus deprehendantur corruptionis notæ, quæ in cæteris, qui ex hoc morbo intereunt deprehenduntur, attamen certi non sumus, quod bos ille contagiosum fomitem non gestaret, quod aliis etiam communicare posset; credibile est enim paucos apud nos esse boves, qui afflatum hunc malignum non persenserint, licet sani degant; morbo enim semini ea est subdola malitia, ut hominum iudicia non raro fallat; persæpe enim evenit, ut qui illud in se continet, & secum circumfert, læsionem nullam sentiat, nec forsitan sensurus sit, in alium tamen ejusdem speciei possit facile transferre. Hujus rei exemplum habemus in gallico morbo; non raro enim contingit, ut aliquis a muliere infecta luem suscipiat, nec quidquam sentiat, & uxori postea eam communicet, sic ut illa paucos post dies gonorrhœa, vel bubone corripiatur; ex quo fit, quod non leves rixæ, & jurgia iter conjuges oriantur, & uxor pudicitie suæ conscia virum maledictis incessat, quod ab illo tam fœda labe inquinata fuerit; ille autem, qui se perfecte sanum agnoscit nec quidquam de infectione suspicatur, de conjugis fide non parum dubitet. Quæ de re legendus Paulus Zachias, Mercurialis, Gaspar a Rejes. Circa

Sydenham Opera Medica.

esum carnis bubulæ memoratu dignum est quod refert Theodoricus Skenkii in Hist. humor. gen. cap. 2. his verbis: *Olim decertatum Venetiis, & Patavii inter lanios, & incolas, quod illi ex Hungaria boves advectos, emptos & maculatos in macello venditassent, quos tamen cives lue quadam infectos fuisse noverant, cum fluxu alvi cruento tentati plurimi periissent, translato nimirum ab uno ad alterum contagio.* Hæc de re consulti Medici Patavini, in ea fuere sententia, carnes hujusmodi esui adhibitas innoxias esse, eo quod esset contagium particulare, & specificum, ac omnis malitia fuisset emendata ac discussa a prævia agitatione gymnastica, antequam boves maculentur. Contrariam opinionem sustinuisse Medicos Venetos tradit Christophorus Fridericus Garammannus in Opere suo eruditissimo de mortuorum miraculis, eo quia carnes hujusmodi essent contagiosæ, & cadaverosæ. Fabius Paulinus Medicus Utinensis controversiam hanc dirimere aggressus est, suam enim sententiam dixit, nimirum si necessitas urgeat in cibum carnes vocare, sale aut aceto prius probe esse macerandas, visceraque cum aliis interranis esse abjicienda, cum in iis causæ morbificæ focus & nidus existat. Qualis cautio num sufficiat, & omnem dubitationem tollat, liberum cuique esto iudicium.

Quid ergo agendum in tam exitiali morbo, qui bubuli generis extinctionem videtur interminari? In id unum incumbendum esse, persuasum habeo; ut per universalia alexipharmaca (quando particulare, & specificum hujus veneni remedium non habemus) miasma istud pestiferum extingatur, aut saltem enervetur, ut natura roborata illud ad cutis ambitum ablegat, atque extrudat, quando per ulcera, pustulas, & tubercula in iis bobus, qui evasere, sponte excitata ipsamet natura, nobis indigitavit, qua via sit incendum. Crediderim itaque in curatione hujus malignæ febris, ea methodo procedendum, quæ a bonis Medicis servatur in curanda variolosa puerorum febre, distinguendo tempus ebullitionis a tempore expulsionis; tempore nimirum ebullitionis erit caute utendum remediis calidioribus, ne intendatur calor febrilis, & plus æquo effervescat massa sanguinea, cui facile succedit perturbata coctio, quam natura restrix intendit; qua in re non leviter peccatum esse censeo, cum hujus febris initio ad calidiora cardiaca ventum fuerit, & præcipue ad vina meraciora cum multa theriaca; quare præposterum remedium usum, stragem longe majorem edidisse censeo, quam febrem ipsam. Non desunt medicæ praxis docti Scriptores, qui in variolosis constitutionibus in principio febris præcipitantibus utendum esse volunt. Dum hæc sub prælo essent, apud amicum ea legi, quæ Illustrissimus D. Joannes Maria Lancisius Clementis XI. P. O. M. Archiater meritissimus, ac intimus Cubicularius perdoctus, & erudite, ut solet in omnibus, de hoc morbo consultus, scripsit; nam inter varia monita, hoc habet, quod cardiacis acida sint maritanda. In febris itaque principio moderate agendum per alexipharmaca, in progressu vero morbi, & despumationis, & expulsionis signis liberalius bezoardicis utendum.

Ut autem ad remediorum materiam descendamus, quando id unum est, quod expeditur, & a nobis exigitur, nequaquam vero nuda verba. Quod præsidia externa, sanguinis missio visa est improspere cessasse, idcirco cœpta est omitti; nihil tamen sævitie suæ remisit morbus; imo truculentior factus est. Equidem in omnibus epidemiis suspecta est phlebotomia, sicuti purgatio, unde Celsus: *Sanguinem non facile mittere, alvum non facile ducere;* in febre tamen variolosa passim mittitur sanguis, in pueris bimis, aut trimis per cucurbitulas scarificatas, & quibusdam in locis etiam per venam sectam, in principio tamen febris. In hac itaque boum febre, non salubrem tantum, sed necessariam fore venæ sectionem crediderim, ad farcinam minuendam, ut mitior fiat ebullitio totius massæ sanguineæ, & per sua vasa circulatio. Cum enim, ut diximus, bovis cruor ex sua natura sit valde crassus, & ad faciliem concretionem pronus, atque venenum istud de illorum sit genere, quæ massam sanguineam coagulandi vim habent, quo precor remedio laboranti bovi, & anhelanti ob sanguinis concreciones in vasis sanguifluis in pulmone, in corde, quam per ipsam sanguis missionem promptius, & facilius poterit succurri? Animadversione dignum est, quod lues ista, boves robustos, & valde obesos facilius corripiat, macilentos vero, qui vix ossibus hæreant, prætergrediatur; propterea in hac febre quæ non ab similibus est iis, quæ appellantur inflammatorias (quales sunt, quæ in pleuritide, peripneumonia, angina observantur) sanguinem in fervorem actum, & alioquin ad coagulationem aptum, detrahare, salutare consilium erit. Clamitet autem ad ravini usque contra hanc operationem, quisquis velit; non enim video (si tamen per analogismum in curanda hac febre licet procedere, ut in curatione febris pestilentis quæ homines corripit) ego, inquam, non video, cur miseranda hæc animalia, dum februnt, & oculis lacrymantibus, opeem aliquam quodammodo implorant, hoc magno remedio debeat destitui; morbi enim magnitudo, plethorica dispositio, ob pascuæ hoc anno solito uberiora, phlebotomiam manifeste exposcunt, in principio tamen febris; dum vires validæ permittunt, quam doctiores Medici in febre pestilenti, uti Sennertus, Septalius, Antonius Ponce, Sancta Crux, Fracastorius, & alii gravissimi Scriptores admittunt. Certe vires horum animalium, in ipso etiam vigore morbi satis validas esse observavi, e stabulis enim educti, & per campos circumducti experiundi causa, num herbam aliquam velint pascere, robuste incedunt, & suæ libertati relictæ, ad stabula prompte recurrunt. Circa porro venarum delectum, non adeo laborandum; ubi enim ad vasorum plenitudinem tollendam mittitur sanguis, parum refert, an ab hac, vel illa vena mittatur.

Inustiones quoque lato ferro candenti faciendæ in collo utrinque, sublata enim eschæra, apparebunt ulcera, quæ vesicantium loco esse poterunt; aures quoque rotundo ferro perforandæ, indita postea radice hellebori, ut veterinarii Scriptores suadent, similiter sub mento perforanda pæalaria, injecto postea funiculo, quem setaceum vocant, indiget enim natura aliquo emissario, per quod venenum istud exantlet; nulli enim comperti sunt evasisse boves, nisi per pustulas in cute excitatas, multum crassæ, ac fœtidæ materie fundentes, nec bovem ullum, qui sic purgatus, recidivam passum fuisse adhuc accipi; nam ex Hippocratis oraculo in sexto Epidemicorum: *Quidquid suppuratur non revertitur; ipsa enim maturatio, & judicatio simul, & abscessus.* Observatione dignum est, quod refert laudatus Fracastorius, ait enim, eos boves, quibus lues a faucibus ad artus descendebat, & inde ad pedes, sanatos fuisse, quibus autem hæc permutatio non fiebat, ut plurimum interiisse. Linguam, & palatum, ace-

G

to,

to, & sale colluere sæpius oportebit, frictiones pluries in die faciendæ ad faciliorem perspirationem obtinendum, ac ut cutis paratior sit ad recipienda rejectamenta nervorum & arteriarum in glandulas. Cum persæpe in faucibus generentur tumores & crustæ, ut fit in variolis, ut nihil per os possit infundi, compertum est baculum salignum viridem butyro inunctum, longitudinis ulnæ, & amplius per os inditum, valde contulisse ad impedimentum illud tollendum.

Quoad præsidia interna, hæc e triplici regno erunt petenda. E vegetabili plantas multas habemus cardiacas, quarum magna est suppelles; Decoctio itaque in aqua fieri poterit ex foliis scordii, cardui benedicti, dictami Cretici, centauri, radicibus gentianæ, tormentillæ, scorzonæ, & similibus, quibus addi poterunt cicoracea ad illarum calorem temperandum, quæ decoctio, bis, vel ter in die per os infundi poterit ad duas, vel tres libras. Cum vero febris ad statum pervenerit, decoctio ista ex prædictis plantis debet esse saturatior ad expulsionem promovendam. Camphora quoque magnum anripestilentielle, accensa, & in aquam coniecta, potionem efficiet aptam ad pestiferum miasma perdomandum, & diaphoresim promovendam. Pulveres quoque ex iisdem plantis parati, & in aqua cardiaca dissoluti, exhiberi poterunt.

Ut autem præter universalia alexipharmaca, quæ pro malignæ febris curatione a vegetabilium classe abunde suppetunt, aliquod singulare proponamus, placet expendere, num solemne illud antipyreticum, h. e. cortex Peruvianus, vulgo China Chinæ, ad malignam hanc febrem expugnandam salutare remedium esse possit. Equidem hoc præsidii genus in febribus periodicis miranda præstat, ac præsertim in tertianis intermittentibus malignis, quæ in ipso impetu accessione, ægros interdum necant, quarum febrium in constitutionibus meis epidemicis Mutinensibus mentionem habui; hoc enim febrifugum, fermentum illud malignum, five penitus restinguit, five ita enervat, ut periculum illud tollatur, ne æger in ipso febris accessu intereat; at in febribus continuis, & inflammatoriis, perraro ex corticis Peruviani usu, febrem solutam observavi; si tamen habenda fides Richardi Mortoni rationibus, & experimentis, qui in quacunque febre venenum quoddam spiritibus vitalibus hostile agnoscit, cur in hoc bovini generis morbo experiri non licebit huius febrifugi virtutem? Istæ enim boum febris continua, & acuta, a febribus continuis ab aliqua inflammatione conparatis, quæ homines corripunt, nullatenus differt; licet Joseph Aromatarius ex Antiquorum doctrina differentiam aliquam statuatur inter febres brutorum, & febres hominum, ut brutorum febris *κράντος*, hominum vero *πυρετός* vocitetur. Possent itaque unciz tres pulveris Chinæ Chinæ (quando huius remedii largior dosis esse cæpit, quam olim) infundi in libris decem vel duodecim aquæ cardiacæ, seu vino non admodum generoso, quæ infusio inservire poterit pro quatuor, vel quinque dosibus, bis illam in die exhibendo, in febris tamen principio, & cum primum bos ægrotare cæperit.

Sua quoque remedia suppeditabit regnum animale; cornu cervi primas tenebit, infusio itaque ac decoctio, & quæ ex eo parantur remedia erunt ex usu. Pulvis viperinus, qui febrilem calorem non adeo intendit, bis in die exhiberi poterit ad drachmam unam, in aqua cordiali tepida pariter dissolutus; efficacior tamen esset vipera una, vel altera in aqua cordiali decocta: febris enim intra paucos dies cursum suum absolvit. Quoniam autem inter cætera symptomata, gravi anhelitu, & stertore boves premuntur, sperma cæti tanquam remedium aptum ad dissolvendas sanguinis concreciones, & in asthma usurpari solitum, præscribi poterit ad drachmas duas in vino tepido dissolutum. Mineralia quoque, ut quæ non tam facile a calore nativo, & digestiva facultate alterantur, ut vegetabilia, & animalia, sed integris viribus corpus pervadunt, symbolum suum conferent. Antimonium diaphoreticum, paratu facile, & exiguæ impensæ, quod nihil aliud est, quam antimonii crudi in pulverem contriti, cum æquis partibus nitri, in crucibulo, vel mortario æneo per carbonem ignitum, aut bacillum ferreum candentem, conflagratio ter, vel quater repetita, addita semper novæ conflagrationi æquali portione salis nitri, erit proficuum remedium ad obtinendam illam, quæ expetitur, expulsionem diri veneni ab intimis ad extima. Quoniam vero repertos ajunt esse lumbricos, & ascarides in intestinis, quod per facile est credere, cum etiam in pestilentiis hominum observari soleat verminatio, non solum in ventriculo, & intestinis, sed etiam in aliis partibus, quod in scrutinio Pestis tradit Pater Athanasius Kircher e S. J. & animatam putredinem appellat, ad remedia anthelmintica erit confugiendum; Mercurii infusio, ad libram semis super cineres calidos, in aliqua ex prædictis aquis optimum erit remedium, cæteris quæ decantantur præferendum; quando enim inter helminthicos scriptores disputari solet, num acida, an dulcia ad vermes necandos sint usurpanda, Mercurium, licet insipidum, id valenter præstare, & frequenter in usu esse, pro certo habemus. Idem quoque efficiet Mutinensis agri petroleum; præter enim id, quod vermes enecat, putrescentiam quoque corrigit, & diaphoresicos erit stimulus. Nostrates rustici, cum vitulos habent verninantes, quod facile deprehendunt ex odore, quem vituli expirant, cum lacte exhibent istud petroleum, ad guttas aliquot per os infundendum.

Quoad alimentum, potiones parari poterunt, ex farina hordei, tritici, panis contriti ad iustar ptisanæ. Pro potu laudatur scæni puri, odorati, mense Maji collecti, in aqua maceratio, quod potionis genus hisce animalibus gratum esse observavi. Externorum quoque habenda est ratio. In hoc calido boves detinendi, & custo-

diendi stragulis cooperti, cavendo quantum licet ab aere frigido; quotidie stabulum suffumigando ex baccis juniperi, galbano, & similibus.

Atque hæc quidem ad therapejam, modo pauca quædam documenta pro huius meæ prælectionis coronide, in prophylaxeos gratiam lubet proponere, quando longe præstantius est præservare, quam curare, sicuti satius est tempestatem prævidere, ac illam effugere, quam ab ipsa evadere. Cum igitur boves ab agris post labores in stabulum ad hyemandum jam sint deducti, ut milites ad castra hyberna, magna diligentia studendum erit ut ea loca, in quibus boves sani degere debeant, munda sint, quantum fieri potest, ac sæpe suffumiganda, quæcunque animalia, ut sues, oves etiam ab illis arcendo. Solent rustici, ut stabula hyeme sint calidiora, fimum, & excrementa boum in iis cumulare, sed satius si quotidie alvinas fæces alio adportent. Consilium salubre erit parietum crustas abradere, eo modo, quo Judæi ex legis edicto jubebantur cubiculorum, in quibus leprosus aliquis habitasset, parietes crusta denudare, & flore calcis obducere, solum autem in hoc casu muros eradere sufficit; timere enim licet, ne recentis calcis odor hyemali tempore bobus inibi conclusis possit officere. In id quoque erit incumbendum, ut pura, & munda sint illorum alimenta, cavendo, ne fœnum, paleæ, & alia, a pluviis, & illuvionibus fuerint inquinata; parcius quoque erunt alendi, ne plus æquo pinguescant; non enim hoc anno polysarcia, sed sanitas procuranda, æstate quidem, quo tempore, in frugum tritura, aratione, & plaustrorum vectura exercentur, ac multum est quod diffatur, plenius sunt alendi; at hyeme, hoc anno præcipue, quo suspecta est saginatio, & macies tutior visa est, moderata diæta in iis nutriendis erit utendum.

Frictiones pluries in die adhibendæ, non solum manu, sed strigilibus quoque, multum enim conferent ad sanguinem in sua fluiditate continendum, simulque ad superfluitatem exhauriendam, si præsertim frictiones sint validæ: habet enim hoc præsidii genus varias facultates, modo implendi, modo extenuandi. Celsus ex Hippocrate scripsit: *Frictione, si vehemens sit, durari corpus, si lenis, molliori, si multa, minui, si modica, implevi*. Si nimis pinguescant, quandoquidem hoc anno copiosa erit bubuli generis annona, posset etiam institui phlebotomia, sed diæta si fuerit conveniens, venæ sectionis, atque etiam purgationis erit vicaria. Postremo cum ex observatione boum, qui in hac tempestate evaserint, satis constet, naturam per crustas, & ulcera excitata in corporis ambitu, & multam saniei expurgationem, morbosum illud miasma, luem hanc expugnasse, sanum consilium foret emissarium aliquod in bobus sanis aperire, per quod si qua sint vestigia morborum feminii, illa sensim extrudantur. Aureum documentum habemus ex Hippocrate in 6. Epid. ad rem nostram accommodandum, hisce verbis: *Decubitus quidem, in quibus facta tollit, hæc ante facta prohibet*. Locus quidem subobscurus est, uti sunt Hippocratis oracula, sed illum egregie explicat Vallesius. Ait enim, decubitus a natura factos, qui sunt aliorum morborum medela, eosdem morbos antevertere, & præservare, si tales decubitus arte procurentur, non simpliciter tamen, quemcumque decubitum sed illum, qui facta tollit. Non inutile igitur foret sanis bobus, palearia sub mento candenti ferro perforare, atque funiculo indito, apertum illud diu servare, ut per illud paulatim egerantur impuritates illæ, quæ huius contagiosi fomitis sunt soboles, & in capite potissimum acervari solent.

Sed cur ingenii mei tenuitatem frustror, ac divexo, ut morbi huius naturam, & causas explorem, ac medicinæ præcepta ad veterinariam traducam? Jandudum veram, & immediatam huius ferini morbi causam agnovit, ac patefecit Purpurati Principis, ad huius urbis incolumitatem cælitus demissi admiranda pietas & sollicitudo: nullam aliam scilicet esse causam, quam Deum iustissimum criminum vindicem, nobis iratum; sicuti etiam idem unicum & verum aperuit antidotum, decretis ad plures dies supplicationibus ad cælestem iram placandam. Magna sane frequentia clausis ubique officinis, ad excelsam huius urbis Basilicam concursus est, ut nunquam alias tantus in unum populi conventus fuerit observatus, nec tanta erga Superos reverentia, ac pietas. Neque vero fervor huiusmodi postea refrigit, uti aliquando fieri consuevit, sed perstitit, magno ad alia celebriora urbis Tempia populi confluxu, quin cæteris civitatibus, quæ eodem malo premuntur, exemplo fuit, ut ad divinam opem implorandam publicis precibus confugerent. Hæc tam subito mutata rerum facies & recens nata hic, & alibi pietas, quam graviorum malorum metus expressit, in mentem revocant magnam illam Romanæ urbis consternationem, quam Livius huius Civitatis immortale Decus, tam egregie descripsit, quando nimirum Annibal, fufis, ac deletis Romanis exercitibus, ex improvviso Romam petiit, ac illam tam arcta obsidione preffit, ut trepidantis civitatis clamores audiret; subito enim terrore perculsus Romanus populus, ad Tempia, & Aras Deorum turmatim concurrebat, ut victimas mactaret, & pro publica salute vota conciperet; visabantur mulieres sparsis crinibus effusæ in lacrymas, cum parvis liberis ad Tempia convolantes, ac ibi ad Simulacra Deorum armillas, annulos, aurea monilia appendere, ferreas scilicet Pœnorum catenas, & asperrima vincula metuentes. Hanc eandem consternationem eleganti carmine descripsit Silius Italicus. Lubet hic carmina huius Poetæ vere aurea ad rem nostram apponere.

Tanta adeo, cum res trepidæ, reverentia Divum

Nascitur, & rare fumant felicitibus aræ.

Num hisce temporibus congruant hi duo versus, Vobis A. O. iudicandum relinquam.

T H O M Æ
S Y D E N H A M, M. D.
T R A C T A T U S
D E P O D A G R A
E T H Y D R O P E.

Non fingendum, aut excogitandum, sed inveniendum, quid Natura faciat,
aut ferat. *Bacon.*

Doctissimo Viro

T H O M Æ S H O R T, M. D.

Coll. Med. Lond. Soc.



N tibi, Humanissime Vir, Tractatulum de Podagra & Hydropo, loco spissioris voluminis quod animo destinaveram; Historiam intelligo Morborum Chronicorum, eorum maxime, circa quos mea Praxis potissimum versata est. Cum vero omnem cogitandi vim atque omnes nervos his rebus plus satis intendendo, atrociorum podagrae paroxysmum mihi accersiverim, quam quo alias, ut puto, fueram multatus, res ipsa monebat, ut has lucubrationes vel invitum ponerem, & mihi tandem ipse consulerem, hos tantum morbos duos quadantenus expedivisse contentus. Quoties enim ad hæc studia me recipiebam, toties & podagra recurrebat. Hoc itaque operis, quale demum id est, accipere digneris; quod Tibi duabus potissimum de causis dicandum censeo. Primum, quod earum, quas jam olim in publicum dedi, Observationum, a quibusdam despectarum, utilitatem aliquam, non tantum me coram atque in os, sed etiam coram aliis agnoscere atque asserere nullus dubitaveris. Deinde quod ex aliqua consuetudine quam mutuam habuimus, Consilia in commune pro Aegrorum commodis conferentes, Ego tuum genium deprehenderim ad Praxim Medicam apprimè factum: quandoque tametsi doctrina omnis generis inclarescas, Te tamen natura ad eas potius subtilitates determinaverit, quæ e praxi nascuntur, quam ad inanes speculationes: quæ duo haud minori intervallo a se invicem distant, quam Sapientum res seriæ ac maximi momenti a puerulorum ludo ac crepundiis determinantur: Et fortasse (nisi me fallit observatio mea) perraro in eodem subjecto conveniunt. Quæ tua sagacitas juncta opportunitati, quam tibi suppeditavit ingens medicandorum copia ad Experimenta stabilienda, Te ad Artis nostræ fastigium evertis: Et morum comitas versus omnes haud vulgaris existimationem, quam nactus es, facile tuebitur. Si quæ hic disserui, neque tibi cui ista inscribo, nec paucis illis, ac spectatæ probitatis viris, quos amicos habeo, vitio dari possint, haud multum alios morabor, qui nulla alia de causa mihi insensibilissimi sunt, nisi quod aliter tam de ipsis morbis, quam de eorum Curationibus sentiam, atque illi sentiant. Quod ut ita non fieret penes me nullo modo fuit, quando sic a natura factus atque dispositus sim, ut quod temporis alii libris legendis, id ego omne meditationi impendere soleam, neque tam quæram, an alii eadem mecum asserant, quam utrum quæ ego trado cum veritate consentiant: utpote qui rumores & vulgi plausum haud magni faciam. Et sane quid tanti est, si officio Civis boni strenue perfunderis, & publico commodo etiam cum privato damno inserviens, nullam tamen exinde gloriam reportem? Cum si rem recte perpendam, consilere existimationi meæ, qui jam senex sim, brevi perinde erit ac si Non-enti consuluissem. Quid enim mihi post obitum prodesse queat, ut octo Elementa Alphabetica in istum ordinem redacta, ut nomen meum componant, eorum linguis jactentur, qui non magis aliquam mei Ideam animo possint effingere, quam ego jam queam concipere, qualesnam tandem illi futuri sunt, qui omnes & mortuos prioris sæculi ignorabunt, & aliis tum dialectis tum moribus utentur, pro rerum humanarum omnium inconstantia ac vicissitudine. At quorsum ego de aliorum judicio sollicitus sim? Si meo aliquo conatu in promovenda & morborum & eorundem Curationum scientia aliquantulum promeritus fuerim, haud diu ista laude fruar: Atque e diverso, si cui minus placuerint mea scripta, vix puto me alia additurum; cum non pariat ratio sanitatis meæ, ut mundo ulteriores, rem medicam tractando, molestias faceßam. Et profecto vel in hoc Tractatulo, quem jam ego, cum manus tremula calamus regere nequiret, operam mihi commodatam ab Amicissimo viro D. Joanne Drake, Baccalaureo in Medicina ex Aede Christi apud Cantabrigenses, gratus agnoscere debeo: Quem quidem virum & nativum morum Candor & vitæ Integritas amicam perquam exoptabilem, Animi vero dotes tam a natura subministratæ, quam studio excultæ Humano generi utilem admodum reddent & beneficium, ubi eam Artem exercere placuerit, quam ita probe callet. De cætero rogandus es, Vir Spectatissime, ut huic meo in te officio, si permolestior fuerim, veniam concedas: quod tamen non aliunde nasci existimes velim, quam ex illo honore & obsequio, quibus te merito, atque ex animo prosequitur

Tibi addictissimus

Tuique observantissimus

Londini,
Maji 21. 1683.

THOM. SYDENHAM.

Sydenham Opera Medica.

D E P O D A G R A

Procul dubio æstimabunt homines, vel morbi, de quo agimus, naturam *δυσνόητον*, ac fere incomprehensibilem esse, vel me, quem jam ab annis triginta quatuor vexavit, ingenii tardissimi ac prorsus hebetis, cum meæ tam de ipso morbo, quam de ejus curatione observationes ita parum votis respondeant. Ut tamen res habeat; ego bona saltem fide tradam, quæ hætenus rescivi omnia, difficultates, salebrasque, sive rationem morbi ipsius, sive curationis methodum spectantes, tempori, duci veritatis, evincendas complanandasque relinquens.

Podagra eos plerumque senes invadit, qui postquam meliores vitæ dies mollius ac delicatius transegerint, epulis lautioribus, vino, aliisque liquoribus spirituosius liberalius indulgentes, tandem ob pigritiam ætatis ingravescentis semper comitem, ea corporis exercitia penitus omisere, quibus juvenes assueverant. Ad hæc, isti, qui huic morbo sunt obnoxii, crania habent grandiuscula, habitu corporis ut plurimum sunt pleniori, humido & laxo; & constitutionem habent omnes luxuriantem virosamque, ditissima atque optima vitæ stamina.

Non quod podagra eos solum adoriatur, qui crasso & corpulento habitu donantur, cum aliquando etiam, etsi rarius, graciles & macilentos invadat; neque quod hic morbus in omnibus senium præstoletur: quandoque enim etiam ætate florentes corripit, quoties scilicet infelicia morbi semina a parentibus, quasi ex traduce acceperint; vel si hoc non fuerit, immodicæ Veneri præmaturius indulerint, aut exercitiis omnino valedixerint, quibus prius etiam vehementioribus utebantur; edaciores insuper fuerint & liquores spirituosos immoderatus hauserint, postea derepente ad liquores tenues & refrigerantes se contulerint.

Si quem non nisi jam senio confectum primum adoriatur, nunquam postea vel tam statas habet periodos, vel tam immaniter lævit, quam si juniorem occupaverit; tum quod vita ut plurimum elabatur antequam morbus naturalibus symptomatibus stipatus ad *ἀκμὴν* pervenerit, tum etiam quia calore nativo & vigore corporis imminutus, nec ita jugiter, nec vehementer in articulos displodi potest. At si quem maturus laceßat, quamvis nec sedem adhuc figat, nec eum ita male tractet, sed incerta periodo pro data ansa ingruat, leviter ad paucos dies torquens, & nulla methodos invadens recedensque, sensim tamen castra metatur, legem sibi ponens, typumque præformans, tam quoad paroxysmi durationem: ad hæc ferocius quam primo insultu debacchatur.

De hoc morbo dum ita regulam typumque servat, libet primo disserere, postea de ejusdem phænomenis anomalis atque incertioribus, quoties scilicet vel præpostero inidoneorum medicamentorum usu, de statu suo dejectus fuit, vel ob subjecti debilitatem & languorem, ad propria & genuina symptomata nequit assurgere. Quoties itaque Regularis est Podagra, hoc fere modo ægrum aggreditur. Januario exeunte, aut incipiente Februario derepente & nulla fere præsentione antecedente ingruit, nisi quod ventriculi cruditate atque *ἀνέμῳ* ad septimanas aliquot æger laboraverit; corporis insuper intumescens quasi ventosa & gravitate, quæ indies augetur, donec tandem detonet paroxysmus; quem paucis diebus præit torpor & quasi flatuum descensus per femorum carnes, cum affectione *πρὸς τοὺς ὀστέους*, tum etiam pridie paroxysmi appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur; hora vero secunda post mediam noctem excitatur a dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, suram, aut talum: Hic dolor eum refert qui ossium dislocationem committitur, cum sensu quasi aquæ tantum non frigidæ partis affectæ membranæ affusæ. Mox sequitur rigor cum horrore, & febricitatione aliquali. Dolor autem hic primo remissior gradatim intenditur, (& pari passu rigor atque horror recedunt) idque in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem officulorum tarfi & metatarfi, quorum ligamenta obsidet, perbelle accommodans, nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram & coarctationem exprimens: adhæc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec linteorum super incumbendum pondus, nec cubiculi a fortiori ambulatione concussionem ferre valeat. Atque hinc fit ut nox non tantum in cruciatu transigatur; sed etiam cum irrequieta partis affectæ hac istac rotatione, & mutatione situs quasi perpetua. Neque minor est totius corporis jactatio incessans, quæ semper paroxysmum, maxime vero accedentem, comitatur, quam torti membri agitatio & dolor. Hinc etiam mille conamina, situs tum ipsius corporis, tum membri affecti mutatione assidua, doloris sedationem incassum exambiunt: quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam, (decurso scilicet nycthemeri spatio a primo impulsu paroxysmi) quo tempore æger post materiæ peccantis modicam digestionem & distillationem aliqualem, subito a dolore respirat, licet hanc liberationem isti membri affecti posituræ, qua postremo usus erat, im-

merito acceptam referat. Jam leni madore perfusus somno concedit, a quo evigilans, dolore multum immutato, partem affectam tumore recenter occupatam cernit; cum solum antehac (quod in omnibus podagricorum paroxysmis solemne est) insignior intumescencia venarum membro vexato intertextarum se in conspectum dederat. Sequente die, forte etiam ad biduum triduumve, si materia podagræ generandæ apta fuerit copiosior, dolet nonnihil pars affecta, idque vehementius die jam advesperascente, levatur autem sub Galli cantu. Intra paucos dies, alter pes eodem dolore torquetur, quo is, qui prior doluit, vel si prior iste jam dolere desierit, debilitas quæ eum infirmaverat, mox evanescit, tam viribus quam integra sanitate isti pedi statim restitutus perinde ac nunquam laboraverat, si modo dolor pedem nuper tentatum ferocius lancinet. Nihilominus easdem hic excitat trægédias, quas prius in altero pede, tam quoad doloris vehementiam, quam durationem. Quandoque etiam primis morbi diebus cum materia peccans adeo exuberat, ut ei capiendæ pes unus impar sit, utrosque simul pari vehementia fatigat: sed ut plurimum pedes successive, uti diximus, aggreditur. Postquam utrunque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servant, quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur. Atque ex serie horum *Paroxysmorum* (sit verbo venia) constat paroxysmus qui dicitur podagræ, diuturnior breviorque pro ægri ætate. Neque enim censendum est, quoties quis cum hoc morbo ad menses duos vel tres fuerit confictatus, unum illum paroxysmum fuisse, sed seriem potius & catenam paroxysmorum, quorum posterior quilibet priore & mitior fuit & contractior, donec tandem materia peccante prorsus absumpta æger pristinam obtinuerit sanitatem: quod in vegetioribus, & iis quos podagræ rarius invist, diebus sæpe quatuordecim fit; in senioribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus; iis vero qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fractiores jam sunt, non prius valedit, quam ætas jam adultior eam fugaverit. Ad quatuordecim primos dies urina colorator est, quæ post separationem sedimentum rubrum & quasi arenulis refertum deponit; nec æger ut plurimum nisi tertiam potulentorum quæ assumpsit partem per vesicam reddit. Alvus item ad dictos primos fere dies constipata est. Appetitus prostrator, rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maxime inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur. Morbo jam discusso, ægri tum *ἄγεια*, tum appetitus redeunt pro rata doloris quo sæviebat paroxysmus nuper elapsus, & in eadem proportionem servata vel acceleratur vel differtur sequens paroxysmus. Nam si hic ultimus ægrum pessime multaverit, sequens paroxysmus non nisi anno ad idem punctum revertente denuo accedet.

Atque hoc se habet modo podagræ regularis phænomenis genuinis propriisque se ostendens. Cum vero vel ab indebita medicatione turbatur, vel ob diuturniorem morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi formitem pervertitur, neque par est natura eidem, methodo consueta, eliminando, phænomena multum sunt diversa jam descriptis. Nam cum hæcenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, (qui peccantis materiæ sedes sunt genuina, quæ cum alias quælibet partes occupat, certissimum est vel morbi methodum inversam esse, vel corporis vigorem paulatim non imminutum) jam itaque manus, carpos, cubitus, genua aliasque regiones occupat, ea jam, sicut pedes olim solebat, discrucians. Quandoque enim unum pluresve digitos distorquens fasciculo *radicum Palinace* similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemque concreciones circa articulorum ligamenta tophaceas generans, quæ articulorum cuticulam ipsamque cutem destruens, nudos *tophos*, *cretam* vel *oculos Cancro-rum* æmulantes, acicula eruendos exhibet conspectui. Nonnunquam materia morbum committens cubitis impacta tumorem subalbam excitat fere ad ovi magnitudinem, quæ sensim inflammatur cum rubore. Est ubi femur occupans sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensum, sine dolore tamen notabili; at genu exinde petens id acrius urget, motum omnem inhibens, ut quasi clavo transacto lectulo affixum ne latum pilum a loco in quo est se queat dimovere. Et quando vel propter totius corporis inquietudinem huic morbo ita familiarem, vel urgente necessario aliquo vitæ officio, æger aliorum opera est movendus, omni cautela opus est ne forte vel minima motus contrarietas dolorem accersat, qui eo tantum nomine potest tolerari, quod confestim evanescat. Quæ quidem corporis latitudo ita caute & delicate peragenda, haud exigua pars est ærumnarum, quibus podagra oneratur: Dolor enim vehementior non per omnem paroxysmum extenditur, si modo pars affecta omnino quiescat.

Cum podagra antehac non nisi exeunte hyeme solet invadere, post duos tresve menses pro more recessura; jam per annum integrum vexat ægrum, demptis duobus vel tribus mensibus calidioribus atque æstivis. Et quod insuper est observandum, quemadmodum *Paroxysmus* major sive *Generalis* jam protractior quam olim fuerat, invenitur, ita etiam *Paroxysmi* isti *particulares*, ex quibus generalior componitur, singuli diutius sæviunt: cum enim antehac particulares isti non ultra unum alterumve diem excruciant, jam ubicunque sedem figant, maxime si pedes vel genua occupaverint, non ante diem decimum quartum castra movent: Primo ad hæc, aut secundo post appulsum die, æger præter dolorem, aliqualem etiam ægritudinem patitur, atque simul omnimodam appetitus prostrationem.

Postremo, cum antequam malum usque adeo inruduerat, æger non solum longioribus frueretur paroxysmorum intervallis, sed etiam durante ista intermissione recte valeret tam artubus quam reliquo corpore, facultatibus singulis naturalibus officio suo debite fungentibus; jam artus habet fere undequaque contractos atque impeditos, ita ut quamlibet stare possit, forte etiam aliquantisper procedere, gressu tamen ita claudicante ac permolesto prorepat, ut etiam cum ambulet quiescere videatur: & si ultra vires ambulare perfiterit quo pedibus rectius valeat, quanto magis ipsos ambulando confirmat, & dolori excipiendi minus obnoxios reddit, tanto morbi fomes, nunquam per hoc omne intervallum perfecte dissipatus, visceribus periculosius imminet, cum in pedes ita libere nequeat effundi; qui hoc morbi tempore vix unquam doloris sunt expertes, sed sensatione aliqua plus minusve molesta perpetuo tentantur.

Quin etiam multis aliis symptomatibus infestatur æger, ut ve-

narum hæmorrhoidalium dolore, ructu nidoroso cibi jam manducati & in ventriculo putrescentis gustum referente, quoties vel aliquid e dysceptis assumpserit, vel eam tantum cibi quantitatem quæ sano competit. Appetitus languet uti & totum corpus præ inopia spirituum. Denique ideo tantum vivit ut calamitosus sit & miser, non ut vitæ dulcedine vel minimum fruatur. Urina, quam prius coloratiorem, maxime in paroxysmis & in pauca quantitate solebat reddere, jam illam tam colore imitatur, quam copia quæ in *Diabete* excernitur. Dorsum aliæque parres moleste pruriunt maxime sub horam somni.

Id etiam in hoc morbo, quoties jam confirmator est, incommodi accidit, quod ab oscitatione, in primis vero matutina, ligamenta ossium metatarsi vehementer convelluntur, cum sensu quasi coarctationis vel compressionis fortissimæ a manu valida. Quandoque etiam nulla oscitatione præcedente, æger jam se sonino committens ictum quasi clavæ metatarsum confringentis derepente perferit, unde cum ejulatu experscitur. Tendines musculorum quæ tibias suffulciunt, subinde spasmo corripuntur ita acri & violento, ut dolor quem excitat, si vel tantisper duraret, omnem humanam patientiam deiceret vinceretque.

Post multos dirosque cruciatus & carnificinam diuturniorem, ceu pignus missionis quam mors jam in propinquo stans mox est datura, paroxysmi subsequentes ægrum quoad dolorem clementius tractant, (naturæ partim ab onere materiæ peccantis oppressæ, partim ob senium, eandem in corporis extremitates jugiter ac strenue relegare non amplius valente) ac loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoque etiam propensio ad diarrhæam superveniunt. Hæc symptomata, dum vigent, artuum dolorem leniunt, quæ pariter evanescunt, quoties articulos dolor fatigat: atque ira nunc dolore, nunc ægritudine quasi alternatim laceffente, paroxysmus longas moras nescit. Animadvertendum est enim, quod ubi quis ad multos annos podagræ laboraverit, dolor singulis paroxysmis gradatim imminuit, tandemque ægritudine potius conficitur, quam dolore. Quem enim in his pariter dolor, quamlibet sint productiores, vix ad decimam partem ejus assurgit doloris, quem pati solebat, cum viribus esset magis integris. Nihilominus hæc ipsa morbi inclementia pensabatur ut plurimum longiore interapedine, quæ paroxysmo intercedebat, tum sanitate, quæ interea satis commoda utebatur. Namque hoc in morbo dolor amarissimum est naturæ pharmacum, qui quo vehementior est, eo citius præterlabitur paroxysmus, atque insuper & longior erit intermissio & magis perfecta, & vice versa.

Neque tamen dolor, claudicatio, atque impeditus partium affectarum motus, ægritudo, aliæque symptomata jam descripta, hujusce morbi trægédiam absolvunt: *Calculus* insuper *Renum* in quam plurimis parit hic affectus, tum ex eo quod æger diu supinus recumbat, tum etiam quod ferientur organa secretoria a debitis sibi functionibus; sive etiam quod calculus ejusdem materiæ morbificæ in genere portio quædam sit, quam ego item non dijudico. Quæcumque vero sit hujus mali origo, nonnunquam ægri animum mœlissima interpellit contemplatio, calculi an podagræ immitior sit. Quandoque etiam calculus lotii per meatus urinarios in vesicam transitum impediens, ægrum de medio tollit, lentas podagræ moras haud amplius expectantem.

Nec satis est ægrum ita miseris modis dilaniari, ut nec sui jam fuerit compos, alienæ opis prorsus indigens, sed & hic accedit miseriarum cumulus, quod durante paroxysmo, animum etiam ceu contagio afflatus, eoque corpori compatitur, ut haud facile sit dictu utro horum æger calamitosius doleat. Non enim rectius podagræ, quam iracundiæ, paroxysmus omnis dici potest; cum mens & ratio usque adeo ab infirmato corpore enerventur, ut vel levissimo affectuum motu impellantur & vacillent: unde non magis ipsi quam aliis gravis est. Quid quod & cæteris quoque passionibus est obnoxius, timori videlicet, sollicitudinique, atque aliis id genus? A quibus pariter torquetur, donec morbo evanescente, animus quoque pristina tranquillitate recepta una convalescat.

Tandem æger (ut funestissimi hujus morbi catastrophem semel expediam) visceribus a materiæ peccantis incubatu complexuque ita læsis, ut secretionis organa non amplius suo munere fungi queant, unde & sanguis quasi limo & sæculentiis refertus stagnat, & materia peccans non jam, ut olim solebat, in corporis extremitates disploditur atque rejicitur, tandem inquam *ὁ τοῦ ἀδῶντος* vitam afflictissimam & jam diu non vitalem cum morte ærumnarum requie feliciter commutat.

At vero (quod mihi aliisque, licet tam fortunæ quam ingenii dotibus mediocriter instructis, hoc morbo laborantibus solatio esse possit) ita vixerunt atque ita tandem mortem obierunt magni Reges, Dynastæ, Exercituum Classiumque Duces, Philosophi, alique his similes haud pauci. Verbo dicam, Articularis hicce morbus) quod vix de quovis alio affirmaveris) divites plures interemit, quam pauperes, plures sapientes, quam fatuos, natura quasi digito monstrante, quam parum iniqua sit omnium parens & arbitra, quam partibus non studeat; cum eos, quibus alicubi defuit, alio aliquo bonorum genere cumulatus ditare soleat; profusorem vero erga alios munificentiam æqua malorum parte admixta diluat & contemperet. Adeo ut ubique gentium rata sit lex atque inviolabilis, nulum hominem vel ex omni parte beatum, vel per omnia miserum ac calamitosum posse inveniri, singulos autem utramque experiri sortem. Quæ boni atque mali contemperatio, fragilitati nostræ & mortalitati ita propria, nobis fortasse apprimè conducit.

Podagra foeminas perraro infestat, easque non nisi jam vetulas, & viragines seu corpore masculorum habitum æmulantes. Graciliores quæ vel in adolescentia, vel constanti ætate symptomata patiuntur podagram mentientia, ea ipsa vel affectibus hystericis, vel rheumatismo quo jam olim laborarunt, & cujus fomes non satis initio fuerat eliminatus, accepta referunt.

Neque pueros, neque juvenibus minores podagræ vera atque genuina vexatos hæcenus observavi: Nonnulli tamen mihi noti sunt, qui priusquam eam ætatem attigissent, leviculam aliquam quasi velicationem præferant; quorum nempe patres etiam tunc hoc morbo tenerentur cum iis generandis operam darent. Atque hic explicit morbi hujus historia.

Omnes animi nervos variis hujusce morbi phænomenis contemplandis acriter intendens, illum *Ἀπὸ τῆς* seu labefactæ, tam in partibus, quam succis, corporis universis concoctioni ortum debere existi-

existimo. In istis enim, qui huic morbo sunt obnoxii, cum jam vel ætate fuerint confecti, vel effrænata morum licentia senectutem præmaturius accersiverint, spiritus animales per totum corpus deficiunt, immodico functionum in juventutis calore vegetissimarum exercitio consumpti; verbi gratia, præproprio nimioque Veneris usu, insanis improbiis laboribus, quibus ardentem atque indefesse voluptatibus inserviunt, & his similibus. Accessit etiam sive ab annis, sive ab inertia, exercitiorum corporis, quibus olim assueverant, intermissio vel cessatio repentina (quorum usu tum sanguis invigoratur, tum partium tonus firmior & constantior solebat reddi) unde jam corpus flaccescit, & concoctiones non amplius recte promoventur, e contra vero, succorum corporis recrementa, quæ talium exercitiorum ope exercebantur, dehinc in vasis, seu morbi seminum, reconduntur. Nonnunquam & studium seu meditatio de re quapiam seria ac diuturna malum auxit, quo scilicet spiritus defæciatores & magis volatiles a concoctionum penso quod debuerant absolvere, nimium avocantur. Adde quod huic morbo obnoxii non solum ciborum in genere fere sunt appetentiores, sed & eorum maxime qui difficillime ventriculo cedunt, quos cum haud parcius devorent, quam tum solerent cum exercitiis uterentur, non jam iis digerendis pares sunt. Neque tamen dicta voracitas & liberalior ciborum ingestio ita frequenter (licet id haud raro contigerit) podagræ viam stravit, ac vesana & immoderatio vini compotatio; unde fermenta coctionibus variis dicata penitus prosternuntur, præcipitantur ipsæ coctiones, & spiritus naturales ab halituum adventitiorum copia subjugantur, dispergunturque. Jam vero cum uno eodemque tempore & spirituum (qui coctionis instrumenta sunt) vigor imminuatur, atque insuper ingens humorum colluvies sanguinem opprimat, omnino necesse est, ut singulæ coctiones haud rite peragantur, dum ita obruuntur singula viscera, unde Spiritus jandiu fatiscientes nunc etiam suffocantur. Nam si a sola spirituum debilitate penderet hic morbus, infantes, scæminas, atque eos, quos ægritudo diuturnior maceravit, pariter invaderet; cum fere virosissimos quosque adoriatur, & robustissimis naturæ principis præditos; quos tamen non aggreditur, donec caloris & spirituum naturalium defectum sive declinationem, humorum quoque congestio excipiat, a quibus simul junctis concoctiones vitiatæ pervertuntur.

Porro ut causarum, quas enumeravimus, singulæ indigestionem promoverant, ita earum pleræque laxitati habitus & musculorum corporis procurandæ nonnihil contulerant, unde porta crudis indigestisque humoribus intromittendis panditur, quoties isti ad exteriora protruduntur. Quoties enim in sanguine diutius stabulantes tam mole, quam prava diathesi macti fuerint, tandem calore putrescentem acquirunt; & cum non amplius a natura regi possint, prorumpunt in speciem, & in articulos depluunt, calore atque acredine dolores exquisitissimos in ligamentis membranisque ossa contegentibus excitantes, quæ vel a senio, vel luxu atque intemperantia labefactata laxataque facile humoribus impetum facientibus locum concedunt. Hic vero humorum podagram generantium prolapsus, qui paroxysmum constituit, serius ocysve contingit, prout ansa hujusmodi humoribus in motum ciendis data fuerit.

Jam vero *curationem* quod spectat; (ut primo quæ sunt omittenda subinnuam) licet, si humores respiciamus atque indigestionem, unde isti trahunt originem, prima fronte videri possit indicationes curativas in primis ad humores jam factos evacuandos, dein ad coctiones roborandas, (unde aliorum humorum succrescentium aggestio possit præcaveri) collimare debere, quandoquidem hæc sunt indicationes magis generales, quibus in plerisque aliis morbis humoralibus satisfaciendum est: in podagra nihilominus naturæ quasi prærogativa est materiam peccantem suo modo exterminare, & in articulos deponere, per insensibilem transpirationem diffundam. Namque haud plures tribus proponuntur modi, quibus causam podagræ continentem ejicere valeamus, venæ sectio scilicet catharsis, ac diaphoresis per sudorem: nulla vero ex his methodus scopum attinget unquam.

Imprimis venæ sectio, quantumvis magna polliceatur tum in humoribus, qui in procinctu stant, & quasi descensum meditantes, tum in istis, qui jam articulos obfederunt, evacuandis; manifesto tamen pugnat cum indicatione illa, quam causa antecedens, quæ est indigestio a spirituum (quos sanguinis detractio magis immittit opprimique) depravatione ac defectu orta, sibi vendicat. Non est itaque adhibenda phlebotomia, vel ad præcavendum paroxysmum, qui timetur, vel ad istum, qui jam adest, mitigandum, in iis nempe, qui ætate jam sunt provectiores. Quamvis enim qui educitur sanguis pleuritico et rheumatismo laborantium sanguinem ut plurimum referat; attamen venæ sectio haud minus insigniter in hoc morbo officere ægro, quam in duobus prædictis prodesse cernitur. Etenim si sanguis in intermissione, quantumlibet diu post paroxysmum, fuerit extractus, periculum est, ne a sanguinis & humorum agitatione novus succrescat paroxysmus, qui & priore diuturnior futurus est, & symptomatibus enormibus stipandus, sanguinis robore, & vigore, quibus adjutoribus morbi fomitem strenue ac constanter excutere debuerat, exinde retusis. Atque hoc incommodi toties etiam accersitur, quoties ineunte paroxysmo vena pertunditur. Si mox a paroxysmo feriat venæ, ingens periculum est, ne natura, dum sanguis adhuc languidior est, & nondum pristinas vires a morbo succisas redintegraverit, ejusmodi vulnere importune inflicto usque adeo infirmetur & succumbat, ut hydropi aditus aperiatur. Veruntamen si æger adhuc juvenis fuerit, & ab immodica potatione excalesfactus, sanguis initio paroxysmi potest detrahi; sin autem in paroxysmis subsequentibus phlebotomia jugiter utatur, podagra quam citissime etiam in juvenibus inveterascet, & intra paucos annos latius imperium seu potius tyrannidem propagabit, quam alias in multis extendere valuisset.

Deinde, catharsin quod attinet, sive *ἄνω* sive *κάτω* animadvertendum est, quod cum naturæ lex sit inviolabilis, atque ipsi hujusce morbi essentia intertexta innexaque, morbi fomitem semper in articulos rejici debere; nihil prorsus aliud præstabit remedia sive emetica, sive cathartica proprie dicta, nisi ut materia peccans, quam natura in corporis extremitates protruserat, in sanguinis massam denuo revocetur: unde accidit, ut quæ in articulos eliminari debuerat, in aliquod e visceribus forte irruat, atque ita æger, qui in nullo prius discrimine versabatur, jam de vita periclitetur. Quod iis fatale esse haud raro observatur, qui medicamentis purgantibus vel ad podagram præcavendam, vel (quod adhuc pejus est) ad leniendum pa-

Sydenham Opera Medica.

roxysmum assueverant. Etenim cum natura a methodo sibi familiari exturbata fuerit, qua, utpote securissima optimaque, materiam morbificam in articulos ablegat, dum humores intro versus intestina sollicitentur, loco doloris in juncturis, quem vel nullum habent, vel certe perexiguam, ventriculi ægritudine, alvi torminibus, li-
pothymia, & longo anomalorum symptomatum agmine miseri quasi enecantur.

Ego certe persuasissimus sum, a jugi & sæpe iterata experientia edoctus, catharsin omnem tam per lenientia, quam per fortiora medicamenta, qualia pro more articulis expurgandis destinantur, plurimum nocere; sive in paroxysmo ad minuendam materiam peccantem, sive in fine ad dissipandas morbi reliquias, sive in perfecta intermissione, & recta valetudine, ut venturo paroxysmo occurratur, purgatio in usum revocetur. Etenim tam mei ipsius, quam aliorum periculo compertissimum habeo, catharsin quovis horum temporum administratam, ita parum votis respondisse, ut malum, quod debuerat averruncare atque avertere, accerseret. Primum itaque purgatio sævientem adhuc paroxysmo adhibita, naturæ, in materia morbifica separanda & in articulos deponenda occupatæ, negotium facessens, magnam spirituum *ἀσθένειαν* nonnunquam excitavit; unde non tantum paroxysmus magis invalescebat, sed & æger in vitæ discrimine haud obscure conjiciebatur. Deinde cathartica in fine paroxysmi usurpata, cum morbi reliquias amoliri debuerint, id tantum egere, ut recens paroxysmus de novo suppullularet, haud mitior priori isto; atque ita æger spe falsa lactatus ea sibi fabricat mala, quæ non fuerat perpeffus, nisi humores denuo in rabiem agerentur. Quod genus incommodi ipsamet plus semel expertus sum, artis medicæ opem præpostere implorans ad exturbandas, ut mihi videbatur, reliquias morbi. Postremo quod purgationem attinet, certis intervallis & integra sanitate repetendam, ut paroxysmo eatur obviam atque ei aditus præcludatur; etli, quod est fatendum, non ita præsens periculum est, ne nova accessio invitetur, atque fuit in casu jam dicto, cum æger nondum *ἔξω βέλος* omnino fuerit; tamen etiam hoc tempore paroxysmum parit, idque ob causas supra memoratas, quo malo si forte ægrum non statim multaverit, nullatenus tamen eum a morbo liberat, quantumlibet constanter, & debitis intervallis cathartica hæc illave assumpserit. Quinimo nonnullos novi huic morbo obnoxios, qui catharsi non solum Vere, & Autumno, sed & singulis mensibus, immo & septimanis continuis, celebrata, sanitati litabant, neque tamen horum quisquam podagram effugit: quæ exhinc crudelius plerumque, & immanioribus symptomatibus eos impetebat, quam si ab omni medicatione sibi temperassent. Licet enim jam dicta purgatio causæ continentis partem aliquam possit educere, cum tamen concoctioni roborandæ (a quo tantum abest, ut eam debilitet, recenti vulnere naturam subruens ac dejiciens) ne hilum conferat, uni tantummodo causæ opponitur, & morbi curationi impares prorsus habet vires.

Ad hæc annotandum est, ab eodem illo spirituum defectu, quo coctiones in iis vitiantur, qui podagra solent laborare, eorundem spirituum animalium *ὀυσαν* minus firmam vegetamque reddi, unde mox dejicitur & inturbatur a quavis causa, quæ vel animum vel corpus paulo violentius concutit exagitatque, ac proinde jam fugax ac dissipabilis est admodum, prout iis, qui affectioni vel hypochondriacæ, vel hysteriæ obnoxii vivunt, sæpe accidit. A qua etiam spirituum ad *ἀταξίαν* propensione fit, ut podagra, vel levissimam quamlibet evacuationem fere subsequatur. Dissoluto enim corporis tono, quem spirituum firmitas, dum in vigore suo persistunt, rite compactum vegetumque servat, materia peccans quasi disruptis repagulis jam sui juris est, atque ab hac plaga corpori inflicta paroxysmus statim exoritur.

At vero hæc ipsa methodus utut perniciofa ac nocens, nihilominus Empiricis quibusdam, qui catharticum quò utebantur medicamentum astute omnes celarunt, haud mediocrem existimationem conciliavit. Observandum est enim, quod purgatione currente, æger vel non omnino vel remisse admodum dolet; & si catharsis ad plures dies produci queat, nullo superveniente paroxysmo recenti, æger confestim ab eo, quo jam tenetur, convalescet: verum enimvero pœnas impostum pendet dirissimas ab *ἀταξίᾳ* in quam dicta humorum exagitatio naturam præcipitem egit.

Denique materiæ peccantis per sudores evacuatio licet prædictis evacuationibus minus officiat, liquido tamen officere cernitur. Quamvis enim morbi fomitem non retrahat in viscera, sed e contra in corporis habitum propellat, attamen his saltem nominibus obest. Primo quidem, quod extra paroxysmum humores adhuc crudos, & nondum ita subactos, ut rite separari debeant, quasi vi quadam protrudit in artus, atque eo pacto constantem paroxysmum ante diem, & vel invita natura sollicitat. Deinde quod sudoris provocatio in ipso paroxysmo materiam morbificam nimis violenter in affectum membrum impingat adigatque, dolorem simul adducens haud tolerandum, & si major sit materiæ peccantis copia, quam ut pars affecta eam queat admittere, illam mox in artus alios deturbat, unde organismus interea, atque ingens tam sanguinis quam cæterorum humorum ebullitio sive exæstuat; si vero corpus colluvie feroræ podagræ generandæ apta admodum scateat, metuendum est, ne apoplexia ingruat. Quamobrem in hoc affectu, perinde ac in cæteris omnibus, in quibus sudores artis ope sollicitantur ad eliminandam materiam morbificam, non vero naturæ ductu profluunt, periculosissimum est eosdem nimis violenter atque ultra eum coctionis gradum, ad quem humores evacuandi sua sponte pervenerint, elicere. Et celeberrimus iste Hippocratis Aphorismus, *Cocta, non cruda sunt medicanda*, tam in sudoribus provocandis, quàm in subducenda alvo locum habet. Quod quidem liquido constat ex sudore illo, quo paroxysmus febrium intermittentium claudi solet, qui, si modicus fuerit, materiæ febrilis a præcedente paroxysmo concoctæ quantitati apte respondens, ægrum insigniter juvat levatque; si vero ultra naturæ modum sudatio promoveatur, ex eo quod æger lectulo jugiter affigatur, jam febris continua subnascitur, & recens focus succenditur, cum iste qui prius efflagrabat, fuerat extinguendus. Pari ratione in podagra etiam lenis ille mador, qui ut plurimum mane sua sponte oritur post minorum paroxysmorum, e quibus majorem paroxysmum constare docui, singulos, tam dolorem, quam inquietudinem quibuscum æger tota nocte conflictabatur, mitigat; e contra vero, si quando levis hicce mador, & suapte natura fugax, diutius & vehementius proritetur, quam fert proportio materiæ peccantis jam ab ultimo paroxysmo concoctæ, morbus inde exacerbat. Tum ita-

G 2

que

que in hoc, quam in aliis morbis quibuscunque, quos mihi videre contigit, dempta sola peste, sudores prolicere non tam Medici, quam naturæ provincia est: cum nullo modo assequi possimus, quanta materiæ pars ejusmodi separationi obeundæ jamjam est parata, nec per consequens, quem in provocando sudore modum tenere debeamus.

Ex jam dictis cum satis liqueat, non solum podagræ curationem a medicamentis evacuantibus incassum peti, sed & eadem *ποδαγρίωσι* noxam adferre, restat ut exquiramus, adquem alium scopum curativæ indicationes sunt dirigendæ. Ego quidem ex accurata *φαινομένων* prædictorum omnium penitratione, & diligenti examine colligo, duabus potissimum causis in hujusce morbi curatione obviam iri debere. Prima est causa antecedens, sive humorum indigestio a caloris, & spiritum naturalium defectu orta. Altera est causa continens, sive eorundem humorum calor, & exæstuatio, ubi jam tunc putredinem, tum etiam acridinem nacti sunt a mora in corpore, quam oportuerat, diuturniore, quæ mora ab inconcoctione supra memorata pendet. Hæ causæ ita toto cælo, quod ajunt, a se invicem discrepant, ut, quæ huic profunt remedia, alteri obstant; unde hic affectus ita curatu perdifficilis est. Etenim dum medicamentis calefacientibus indigestionem vincere satagimus, periculum est, ne ex altera parte humorum calor intendatur: atque e diverso, dum sive diætâ, sive remediis refrigerantibus calorem, & acridinem humorum committigare volumus, *ἀπεψία* accersimus, labefactato scilicet calore naturali. At vero hic causam continentem non eam tantum intelligo, quæ jam actu articulos obsidens paroxysmum format, sed eam insuper, quæ adhuc in sanguine delitescens separationi hæcenus est inepta. Per raro enim materia morbifica omnis a paroxysmo diuturno, & crudeli, ita plene egeritur, ut nullæ prorsus in corpore reliquæ sint, eodem jam elapso. Ac proinde utriusque hujus causæ tam extra paroxysmum, quam eo vigente ratio habenda est. Quandoquidem vero materiæ continentis eliminatio naturæ omnino opus est, sua ipsius methodo peragendum; cumque nihil interea temporis, ad humores calidos acresque leniendos, absque damno digestionibus illato, possit tentari, nisi ut exulent ac evitentur victus medicamentaque calidiora, a quibus inflammantur humores: maxima certe & præcipua curandi intentio in eo verti debet, ut coctioni, indigestionibus sublatis, consulatur, de qua jam agam: ita tamen ut in Dissertationis serie ea etiam attingam remedia, prout ansa data fuerit, quæ ad leniendum humorum calorem, & acridinem retundendam facere possunt.

Quæcunque igitur naturæ opem ferunt in muneribus suis rite fungendis, sive ventriculorum confortandorum alimentis recte coquat, sive sanguinem ad debitam chyli in illum investiti assimilationem, sive partes solidas corroborando, quo melius succos earundem nutritioni atque augmento destinatos in propriam substantiam convertant, quæcunque denique varia excretionis organa atque emunctoria corporis in eo statu conservant, ut singularum partium tecretamenta debito tempore atque ordine valeant emendare, hæc & hujusmodi omnia huic intentioni adimplendæ conferunt ac proprie *Digestiva* appellantur, sive pharmaca ea fuerint, sive ratio victus, sive exercitatio, sive alia ex istis quolibet, quæ *sex res non naturales* indigitantur.

Hujusmodi medicamenta sunt in genere, quæ moderate excalefaciunt, & vel amarificant, vel linguam leniter feriunt, utpote quæ ventriculo sunt pergrata, sanguini medentur, & cæteras partes fovent confortantque, qualia sunt, verbi gratia, radices angelicæ, enulæ, folia absinthii, centaurii minoris, chamædryos, chamæpityos, &c. addi possunt etiam antiscorbutica vulgo dicta, ut radices raphani rusticani, folia cochleariæ hortensis, nasturtii aquatici, &c. Cum autem herbarum istarum acres ac pungentes, utut stomacho arrideant atque eidem conferant in coctione juvanda, morbi tamen fomiti jamdiu formato aculeos subdant, & augeant calorem, parcius usurpandæ veniunt, præ aliis istis quæ miti calore atque amaritudine, & ventriculorum corroborant, & sanguinis massam vegetiorem reddunt ac magis vitalem.

Eorum species aliquot affabre permixtæ humoribus concoquendis rectius, ut mihi videtur, quam simplex quodlibet ex earum tribu desumptum ministrant. Quamlibet enim quoties specifica medicamenti cujuslibet virtute opus est nobis, regula tenet, *Quo simplicius, eo melius*; tamen cum id habemus propositi, ut huic illive indicationi satisfaciendo agrum sanemus, singula ingredientia symbolum pro morbo curando quasi conferunt, atque in hoc casu, quanto major est simplicium numerus, tanto potentius medicamentum operabitur. E prædictis itaque, & reliqua ejusdem farina materia medica, variorum remedium formulæ ad hunc scopum tendentes concinnari possunt. Ego formam electuarii ad exemplum Theriacæ Andromachi cæteris præfero, seu viribus præstantissimam, eo quod mutua simplicium confermentatio omnium virtutem adaugeat, quasi *aliquid Tertium* progignens, quod in ita conjunctis majorum est virium in pari quantitate, quam in eorum quolibet. Verum tam delectum ejusmodi ingredientium, quam formulas, quibus exhibenda sunt prudenti Medico lubens relinquo: cum nunquam mei officii esse duxerim Receptulas, ut vocant, conscribere, at potius veras indicationes notare, ad quas curationes sunt dirigendæ: Quod cum minus observetur, exhinc, ut alibi dixi, Empiricis ansa data est, ut se artis medicæ Principes faciant.

Veruntamen Tyronum gratia, remedium, quo ego uti soleo, in medium proferam, quod ad hunc modum componitur. *℞. Rad. Angelic. Calam. Arom. Imperator. Enul. campan. Fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. Chamædr. Chamæpyt. Scord. Calaminth. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. Hyperic. Virg. aur. Serpil. Mentha. Salvia. Ruta. Card. Ben. Puleg. Abrotan. Flor. Chamem. Tanacet. Lil. Corval. Croci Anglican. Sem. Thlaspi. Cochlear. hortens. Carui, Bacc. Junip. singulorum quantitatem sufficientem. Legantur singula Herbarum, Flores, & Radices quo tempore viribus pollent maximis. Siccentur ac in Papyraceis sacculis asserventur, dum in pulverem tenuissimum redigantur. Singulorum Unciæ sex simul probe mixtæ excipiantur s. q. mellis opt. despumati, & Vini Canarini, & in Electuarium debite consistentiæ conficiantur s. a. Sumat Drachmas duas mane & sero, vel hujus defectu, sequenti utatur. *℞. Conf. Cochlear. hortens. ℥i℥. Absinth. Roman. & Flavæ. Aurantior. an. ℥j. Angelic. condit. Nuc. Moscat. condit. an. ℥℥. Theriac. Androm. ℥iij. Pulv. Ari comp. ℥ij. cum s. q. Syrupi Aurantiorum fiat Electuarium. Capiat Drachmas duas bis in die, superbibendo sequent. Aquæ coclear. v. vel vj. *℞. Rad. Raphan. rust. incis. ℥iij. Co-***

chlear. hortens. manip. xij. Nasturt. aquatic. Becabung. Salvi. Menth. ana manip. iv. Cortic. Aurantior. no. vj. Nuc. Moschat. contus. no. ij. Cerevisiæ Brunsvvic. ℔xij. Destillantur organis communibus, donec solummodo libris sex Aquæ eliciantur pro usu.

E medicamentis vulgo cognitis Theriacæ Andromachi concoctionibus roborandis præ cæteris confert; cum tamen plures in se species contineat, quæ plus satis calefaciunt, atque insuper oppio abundet, Electuarium supra dictum commodius parari potest e vegetabilibus præcipuis excalefacientibus, & corroborantibus. Curandum est interim ut ea simplicia eligantur, quæ ad ægri gustum magis faciant, cum enim diu admodum, scilicet ad omnem fere ætatem, in ejus usu perseverandum sit, omnino convenit, ut palato minus sit ingratum. Inter simplicia *Cortex Peruvianus* primas obtinet, cum sanguinem corroborat vegetumque reddat, ejus grana aliquot mane, & sero assumantur.

At sane uti in hoc affectu, de quo jam agimus, ita & in aliis chronicis plerisque, hæc & huic similia remedia quæ sanguinem corroborant, vegetumque reddunt (si modo eorundem calor, propter causas postea adferendas, in spiritibus vinosis non consistat) præ cæteris juvant; quandoquidem singuli hujus generis morbi ad unam eandemque causam universalem, humorum scilicet *Indigestionem*, si recte conjicio, referri debeant.

Nihil est autem, ex quo hoc certius evinci poterit ac probari, quam si ob oculos ponamus differentiam, qua inter morbos, *Acutos & Chronicos* intercedit; quam ob causam æquus Lector boni consulet, si paulisper ab eo, quod jam præ manibus est, negotio digrediar. Prout itaque morbi *Acuti* si fere habentur, qui cito vel perimunt, vel ad concoctionem perducuntur; ita *Chronici* appellantur isti, qui vel non omnino, vel tarde admodum, & longa temporis mora ad eandem concoctionem pertingunt. Atque hoc quidem tam ipsa rei natura, quam verba quibus illa exprimitur, aperte loquuntur; at verò causa hujus differentiæ, quæ inter hæc duo morborum genera deprehenditur, altius latet, haud ita facile eruenda: cujus indagationi si aliquantisper immoremur, operæ, ut puto, vix nos pœnitebit, cum harum rerum notitia clara ac distincta, ad inveniendas veras indicationes horum morborum curationis accommodas, magnum momentum adferre queat.

Sive interiora terræ viscera, si ita loqui fas est, varias subeant mutationes, unde a vaporum inde exhalantium interventu aer inquinetur, quod mihi maxime probatur: sive inficiatur atmosphæra omnis, ab alteratione quam eidem inducit peculiaris aliqua corporum cælestium quorumlibet conjunctio: res ita se habet, ut ad hoc illudve tempus aer particulis reficiatur, quæ humani corporis œconomix adversentur, uti etiam alio tempore istiusmodi particulis imprægnatur, quæ cum corporibus speciei alicujus brutorum minus conveniunt. His jam temporibus, quoties nos hujusmodi noxia, & naturæ inimica *μείσματα* in nudum sanguinem inspiratione attrahimus, & in illos morbos epidemicos incidimus, quos illa parere apta nata sunt, natura *Febrim* accersit, solemnem nempe sibi machinam ad sanguinem a materia aliqua hostili, & contraria intus stabulante vindicandum. Et tales morbi *Epidemici* vulgo audiunt, & ideo acuti sunt & breves, quia motum habent ita celerem & violentum. At vero præter hos morbos a causa externa excitatos, sunt & alii perinde acuti, ab hac vel illa peculiari sanguinis inflammatione nati, quæ non a causa aliqua generaliori ab aere pendente, sed a particulari particularium corporum anomalia vel intemperie producuntur. Quod quidem febrium genus ego *Intercurrens*, & sporadicum idcirco vocito, quod annis fere quibuslibet occurrant.

At vero morbi *Chronici* genium habent longe ab his diversum; quamvis enim aer minus salubris hujus vel illius generis ad hos morbos generandos multum conferat, non tamen acrius ita immediate originem debent suam, sed ut plurimum communi omnium horum parenti humorum sc. *Indigestioni*. Ubi enim quis naturæ principia jam habuerit infirmata ac prostrata, sive a senectâ, sive a magnis & continuis circa *Sex res non naturales* erroribus, præcipue in cibo potuque, vel si organa secretoria eo usque fuerint debilitata, ut jam functionibus suis ad defæcandum sanguinem, & ejus superfluitates eliminandas destinatis, prorsus fuerint imparia: his in casibus uberiori humorum proventus jam coagmentato, quam cui dirigendo hominis vires sufficiant, dicti humores mora diuturniore varias fermentationes ac putrefactiones patiuntur, tandemque in *speciem* erumpunt, & varias morborum species edunt pro depravationum varietate. Et prout hi succi depravati variam habent indolem, ita varie in hanc illamve partem dilabentur, quæ eisdem excipiendis aptissima est; atque ibi sensim longam illam symptomatum seriem explicant, quæ partim a talium succorum natura, partim ab *ἀνάξη* istis partibus illata, solent exoriri: quæ duo simul juncta istam naturæ *ἀνόμελιν* constituunt, quæ morbi alicujus nomine insignitur.

Jam quod ejusmodi impotentia naturæ ad coquendos humores plethorumque morborum chronicorum causa sit præcipua, facile liquebit, si animadvertamus senes, quorum coctiones sunt lævæ, & spiritus, earum instrumenta, absumpti a repetitis vitæ longioris functionibus, hisce affectibus magis esse obnoxios, quam sunt juniores, quorum vitæ flamma magis accensa recrementa ista coacervata dissipat, & quorum organa secretoria jugi isto caloris naturalis subsidio instruuntur, ut functionibus in totius sanguinis massa deputanda peragendis nequaquam deficiant, nisi insuper premantur, & quasi suffocentur a nimia humorum copia. Adhæc talem humorum indigestionem plurium morborum chronicorum causam esse ex eo constat, quod hyems ad istiusmodi morbos gignendos longe magis faciat quam æstas. Licet nonnulli ex his morbis non actu exerantur, nisi sub brumæ exitum; attamen iste humorum proventus, a quo illi pendunt, per omnem hyemem decursum succrescens, auctior factus est ab ejus tempestatibus frigore, & effæcto languore naturam debilitante, quo minus valeat in administranda corporis œconomia. Unde fit, ut qui in æstate satis bene habent, raro tamen hyeme eos morbos effugiant, ad quos magis sunt proclives, *Podagram*, verbi gratia, *Asthma*, *Tusses* &c. Atque hinc etiam ratio deducenda est, quare peregrinatio in regiones magis australes ita efficaciter eos morbos expugnet, quorum curatio in frigidioribus incassum tentabitur. Eorum, quæ de generali morborum chronicorum causa jam dixi, veritas magis adhuc patebit ab ingenti, & quasi stupendo ac incredibili emolumento, quod ii qui morbis chronicis plerisque, præcipue vero *Phthisi*, laborant, ab equitatione percipiunt, quod genus exercitii digestionem singulas invigorat.

gorat firmatque, dum a continua corporis succussione calor naturalis reaccenditur, & organa secretioni destinata in munere depurandi sanguinis rite fugendo promoventur: unde necesse est, ut sequatur digestionum deperditarum quasi renovatio quædam, & e consequenti totius corporis crasis optima.

Quo circa e rationibus jam allegatis satis elucescit, quod non in podagra tantum, sed & in aliis quoque chronicis morbis, ubi nullum symptoma manifestum contra indicat. *Herbas* ejusmodi *excofacientes* magnum omnino commodum adferre, cum sanguini æstatis calorem vel media hyeme concilient: quamvis si æstivo tempore earum usus assuescamus, melius præcavebunt mala ista, quæ adversa tempestas solet apportare. Et profecto si ad hyemis usque appulsus deferantur, quo tempore ingens humorum saburra accumulatur, periculum est ne sero nimis ad hoc asylum confugiamus, & quod dici solet, *Μετὰ πόλεμον συμμαχίη*. Quamvis autem, ut supra fusi-
us differui, podagra id sibi habeat peculiare, ut non tantum non juvetur, sed & lædatur a cathartics; tamen in aliis chronicis ple-
risque, & venæ sectio quoties opus fuerit repetita, & purgatio ante
sunt imperanda, quam remediis corroborantibus & digestivis hic a
me laudatis opera danda est: ubi vero se æger his addixerit, in iis
perseverandum est, nullis intercalatis evacuationibus. Etenim hoc
est firmiter retinendum, quod quoties cujuscumque morbi curatio re-
mediis corroborantibus innititur, evacuationes, qualescunque eæ
fuerint, officiant prorsus. Denique non is sum, qui asseram, medi-
camenta digestiva jam memorata cæteris quibuscunque præstare:
ait vero dico eum, qui remedium ad hanc intentionem satisfaciend-
dam potentissimum invenire potuerit, longe majora in sanandis mor-
bis chronicis præstare posse, quam ipse se posse existimaverit.

Istud vero iis omnibus quæ de podagra sananda dicturus sum, præ-
mittendum est, maximopere præ cæteris observandum, nempe quod
Digestiva remedia quæcunque, sive medicamentorum apparatu, sive
diætâ, sive exercitatione ea constant, haud obiter instituenda sint,
verum constanter atque omni adhibita diligentia assidue usurpanda.
Cum enim in hoc morbo, uti etiam in chronicorum quamplurimis
causa ejus in habitum, & novam quasi naturam transiverit, nemo
sanus existimaverit leviculam aliquam ac momentaneam alterationem
sanguini atque humoribus a quolibet sive remedii sive victus gene-
re superinductam, curationis scopum posse attingere; at vero corpo-
ris habitus omnis alio traducendus est, atque homo integer deinceps
quasi nova incende refingendus. Neque enim hic ita se reshabet at-
que in morbo acuto aliquo, ubi is qui modo athletice ac pancratice
valebat, de repente febre correptus, ab optimo sanitatis statu in mor-
bum periculosissimum, quasi rupto ponte, præceps ruit. Podagræ dis-
par admodum ratio: ubi quis per multos annos continuos comessatio-
nibus, computationibusque intemperantius indulgendo, solita exerci-
tia intermittendo, desidia atque pigritia intabescendo, vel etiam ni-
mio studio atque irremissa animi intentione, aliisque vitæ erroribus,
id egit tandem quasi dedita opera, ut varia corporis fermenta perva-
rantur, atque opprimantur spiritus animales (qui coctionis instru-
menta sunt primaria;) unde humores præter naturales coacervati
erumpunt tandem, cum jam ad summum gradum exaltati fuerint, ac
stragem edunt; carnibus denique emollitis & effœminatis articulis,
unde humores illabentes promptius excipiunt. Atque ita demum alia
quasi natura sensim superinducitur, pristina & naturali corporis œcono-
mia eversa funditus & deleta. Cum isti paroxysmi, qui hominum
incautorum ac minus perspicacium oculos animosque soli fere perstrin-
gunt, & occupant, nihil prorsus aliud sint quam series & ordo sym-
ptomatum ab illa methodo pendentium, qua uti solet natura in ma-
teria morborum committente foras pellenda. Quamobrem operam
laudabit quisquis hoc illove sive medicamento, sive etiam regimine
subinde in usum revocato, hunc morbum protelare satagit. Cum vero
hic habitus tum in digestionum omnium labefactione, tum & in
amissione firmitudinis naturalis partium singularum præcipue fundetur
ac constet, utrique malo occurrendum est; & tam coctionum robur,
quam firmitudo partium pedetentim reduci debet ac restaurari, pro
modulo sc. pristina ac consuetæ corporis œconomix. Quantumlibet
vero istud plene perfecteque fieri non posse videatur, non eo solum
nomine, quod habitus quicumque non nisi ægerime in sibi contra-
rios transmutantur, sed etiam quod ætas senilis, quæ huic morbo ut
plurimum comes est & socia, vehementer refragatur: tamen quan-
tum vires aunice sinent, tentanda est curatio, & prout æger prop-
ius ad hanc metam accedet, vel recedet longius, podagræ tyran-
nidem magis minusve effugiet.

Atque porro animadvertendum est, quod remedia *πεπτικά* vel
digestiva, sive partem medicam ea spectant, sive diæteticam, in pa-
roxysmorum præcipue intervallis in usum revocanda sunt; idque
quam longissime fieri potest a paroxysmo infecuturo. Neque enim
sine magna temporis mora, & pertinaci remediorum usu concoctio-
num omnium corroboratio, fermentorum corporis jam imminuto-
rum restauratio, tantaque firmitas, quantum expetunt tum sanguis,
tum viscera, senio adversante possunt acquiri.

Quantumlibet vero profunt hæc aliaque ejusmodi remedia, attamen
hisce solis hæc corroborandi intentio satisfieri nequit; sed & ea-
rum etiam rerum habenda est ratio, quæ ad artem proprie medicam
non spectant. Et certissime voto frustrabitur is, qui in hoc aliove
morbo chronico omnem curationem medicamentis solis absolvi posse
autumat. Primum itaque ea in *Cibo Potuque* mediocritas est obser-
vanda, ut neque plus alimenti ingeratur, quam ventriculus conco-
quere valeat, ac proinde morbo fomes subministratur: neque e contra,
nimia abstinentia partes ea proportionem defraudentur, qua ea-
rundem robur & vigor debuerat sustineri, unde etiam magis debili-
tentur; quorum utrumque ex æquo nocet, prout tam in me ipso,
quam in aliis haud semel expertus sum. Ad hæc, ciborum qualitatem
quod spectat, licet *Εὐπεπτα* per se considerata *δυσώπιστα* præferenda
sint, attamen ægri palato est consulendum: quandoquidem observan-
dum est, quod sæpenumero id quod ventriculus vehementer appetit,
licet difficilius coquatur, citius tamen a natura vincitur, quam
quod facilius concoctionis habetur, si ventriculo nauseam creet: at
vero quæ *δυσώπιστα* habentur, idcirco parcius sunt comedenda. Unica
etiam ciborum specie singulis passibus vescendum arbitror, cum varia
carnium genera simul ingesta plus ventriculo molestiæ facessunt,
quam unicum, quod omnia ista quantitate exæquat. De cæteris,
dempta carne, pro libitu comedat, modo nec acria, nec sale con-
dita sint, nec aromatis; quæ licet coctionem non lædant, nocent
tamen quatenus morbi fomitem exagitant.

Sydenham Opera Medica.

Tempora quod attinet, prandere tantum expedit; cum enim lectus
humoribus digerendis proprie dicetur, id temporis in cibis concoquen-
dis non est infundendum. Non cœnent itaque, qui podagræ sunt ob-
noxii; haustum tamen cerevisiæ alicujus tenuioris liberaliorem sibi
indulgeant: quandoquidem etiam renum calculo generando proclives
fere sint tales; cujus concretio a liquore ejusmodi hoc tempore hau-
sto multum impeditur, refrigeratis sc. ab eo renibus prolutisque.

Γαλακτοπασία, seu diætâ e solo lacte sive crudo, sive cocto, exu-
lantibus cæteris omnibus, nisi quod panis aliquid semel forte in die
adiciatur, ab annis retro viginti obtinuit. Profuit hæc quamplurimis
præ cæteris hujusce morbi præsidii, quandiu ne latum ungum ab
ea discesserint. Quamprimum vero ad sanorum diætâ, utut lenem
mitemque, sese receperit, qui huic insueverat, podagra confestim re-
versa ægrum pejus longe quam antehac vexavit: labefactatis enim hac
methodo naturæ principiis, æger jam morbo pellendo magis impar
redditur, unde & periculosius infestat, & diuturnius. Qui igitur
huic se methodo tradere cogitat, primum serio secum perpendat,
num valeat per omnem vitam in eadem persistere: quod tamen for-
tassis penes eum non erit, utut propositi tenax fuerit: Non enim
nobilem quandam, qui postquam per annum integrum solo lacte vi-
sitaverat, non tantum sine offensione, sed & cum summa voluptate;
(quo tempore quotidie semel aut pluries deiecerat) sistente derepente
alvo, ac mutata corporis temperie, manente vero adhuc animi pro-
pensione, & ventriculo tandem ad lac nauseante, abstinere coactus
est. Nonnulli vero hypochondriaci, crasso corporis habitu, vel qui
alias liquoribus spirituosius diu multumque assuevere, lactis usum nul-
latenus ferre possunt. Interea emolumentum illud perbreve ac fugax,
quod ex hac diætâ percipiunt illi, quibus cum lacte convenit, hinc
oritur, videlicet quod non tantum diætâ sit simplicissima (unde
nullus dubito, quin jusculum avenaceum, modo ventriculus illud fer-
rat, idem præstare possit,) sed etiam sanguinem dulciorem, mitiorem-
que reddat, particulas in eo aciores contemperando: atque insuper,
quod ego palmarium judico, cum lac alimenti genus sit adultis pro-
fus impar, istam humorum turgescientiam sive viscositatem reprimat,
qui podagræ ortum debet, eo nomine paucos istos quibus congruit,
tamdiu a podagrâ immunis præstat, quamdiu eo solo vescuntur, nec
juvat ulterius. Cum enim podagræ causæ originali ac primariæ, nem-
pe, concoctionum ac fermentorum debilitati omnino contrarietur,
longe magis hæc ratione obest, quam altera prodest. Quod cum mi-
nus perspectum fuerit, nonnulli incautiores in errores permagnos,
& plane exitiales inciderunt, dum morbi causæ continenti, hu-
morum sc. calori & acedini, obviam ire satagentes, concoctiones
pessunderunt, & functiones naturales prostraverunt omnes.

Liquores quod spectat, ii, me judice, optimi sunt, qui neque ad
vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem deprimuntur,
cujusmodi sunt cerevisiæ tenuis *Londinensis*, sive lupulata, sive non
lupulata; cum extrema ab utraque parte noceant. Primum de vino,
licet proverbio jactetur: Vinum potans podagrâ laborabis, & vinum
non potans laborabis podagrâ; extra controversiam tamen est, & va-
riis *παραπειράσεων* experimentis confirmatissimum, *Vinum* de facto
officere. Licet enim prodesse credatur juvandis coctionibus, quarum
vitia causam podagræ antecedentem jamdudum statui; ratione tamen
causæ continentis omnino obesse censendum est, humores sc. fomi-
tem morbi, jam in procinctu stantes accedendo exagitandoque. Sed
neque damus, vinum pro potu ordinario usurpatum coctiones pro-
movere, at potius subvertere dicimus, nisi in diu vino assuetis.
Quamvis enim calorem aliqualem in transitu impertiat, certissimum
est tamen, fermenta corporis ab eo subjugari, & avocari spiritus na-
turales atque fugari; unde est, si bene conjicio, quod bibaces, atque
nepotes isti male feriati, *Podagra*, *Paralyti*, *Hydrope*, aliisque mor-
bis frigidis fere perimuntur. Adde quod jugis & immodica vini in-
gurgitatio corpus ad instar corporum fœminarum emollit laxatque; cum
liquores temperati partium omnium tonum roborent ac firmant: un-
de qui liquoribus tenuioribus semper assuevere, podagram fere ne-
sciunt. Notandum est insuper, quod huic morbo maxime obnoxii viri
sunt, qui licet in minutam habeant concoctionem naturalem, tamen
ex quadam sanguinis luxuria plus satis nutriunt & incrementum
sumunt ex materia quadam indigesta loco substantiæ sanioris & rite
compactæ. Hanc sanguinis luxuriam *Οινόπασια* adauget magis, ac pro-
inde tum novam materiæ saburram accumulât, tum etiam fomitem
jandiu repositum quasi subdita face actu in morbum provocat. Huic
accedat strui, quod cum podagricorum sanguis isti qui e pleuritico-
rum, aliorumque morbis inflammatoriis laborantium pertusis venis
extrahitur, persimilis sit, insanorum esset sanguinem jam *οργισμένα*
ulterius spirituosius liquoribus, ceu ignem oleo, proritare. Neque
tutius ex adverso liquores nimium refrigerantes in usum revocantur,
cum hi concoctiones prorsus deieciendo, & extinguendo calorem na-
turalem, majorem adhuc noxam inferant; non dolorem scil. ut vi-
num, sed ipsam adeo mortem: prout experientia docet in iis, qui
ad senium usque vino liberalius indulgentes, aquam aut tenuiores
liquores derepente cum vino, & non ita diu post vitam cum mor-
te commutarunt.

Hic itaque podagræ obnoxiiis in potum modus statuatur, ut iis utan-
tur liquoribus, qui neque vel in maxima copia assumpti inebriare
possunt, neque frigore suo ventriculum lædere. Hujusmodi est, ut
dixi, cerevisiæ tenuis nostras, & in aliis regionibus confici poterit ex
multa aqua cum paucis vino permixta. Aquam puram crudamque,
& periculosam existimo, & expertus sum meo damno. Attamen
satis commode ab ineunte ætate potatur aqua; qua hodieque
longe major hominum pars sitim levat: inopia sua feliciores sunt
illi, quam nos nostra copia & luxu. Testes appello ingens mor-
borum agmen, quo corpora nostra hoc nomine discruciantur, po-
dagram sc. calculum, apoplexiam, paralytin, & cum vim ani-
mis illatam, qua a nativa rectitudine transversum aguntur, dum ad-
ventitii talium liquorum spiritus, cum spiritibus animalibus cogi-
tationi formandæ inservientibus complicati, mentem nimium vola-
tilisando perturbant, vana ac futilia loco rerum solidarum atque
alicujus momenti subingerentes: atque ita demum ingeniose lepi-
dos ac dicaces, pro sapientibus nos reddentes: inter quos eadem
ferme differentia intercedit, atque est inter substantiam, & prorsus
nihil. Sed de his satis.

Jam vero quamvis sufficiat ei, qui podagra mitius ac tantum per
intervalla laborat, vel cerevisiæ tenui uti, vel vino dilutiori, cum
is morbi gradus tanti non sit, ut severiori regimini se subjiciat;
attamen cum universa corporis substantia in podagram quasi de-
genera-

generaverit, minus quam exoptet in profligando morbo promovebit, qui non a liquore fermentato quocunque, quantumvis leni & tenui, in totum abstinere: cum hi omnes spiritus pungentes, & aliquem acedinis gradum in se contineant: & quod pejus est, quatenus fermento imbuti (perinde ac flores cerevisiæ liquoribus inditi vim suam fermentationi toti massæ communicant) humores fermentationi perpetuæ addicunt. Potus itaque *Dieteticus* ex ingredientibus vulgo notis, & huic usui dicatis pro tali potu ordinario præscribendus est: modo non sit iusto fortior, quo haud multo minus periculose accendentur humores, quam ipso vino; nec e contra aquosior iusto, naturales functiones nimia refrigeratione prosternens. Huiusmodi potus si rite paretur selectis ingredientibus istis quæ ægro minus sunt ingrata, licet ad septimanam unam alteramve non sine aliquali fastidio ita jugiter assumatur, postea tamen perinde gratus & acceptus est, ac sunt alii liquores quibus quis maxime assueverit. Atque ab hoc potus genere non tantum non imminuetur appetitus, sed & augebitur: magis insuper naturalis, & genuinus evadet, quam cum liquoribus fermentatis uti soletur. Hoc insuper commodi accedet, quod qui huiusmodi potum dieteticum loco ordinarii hauriunt, liberius in cætero victu sibi possint indulgere, quam cum cerevisiam biberent, aut vinum: cum errores in victu, (quos omnes penitus evitare pene supra humanam fortem est) hoc pacto aliquatenus corrigantur compensenturque. Quod vero omnium primum est, æger hoc modo sibi a calculo præcavebit, qui podagræ fere individuus est comes; cum liquores acres ac attenuantes quilibet, uti ad calculum jam factum proritandum, ita ad eundem generandum etiam faciunt. Liquor sequens, utpote qui gustu ac colore jucundo est, mihi maxime arridet. *℞. Sarsaparil. ℥vj. Lign. Sassafr. Chinæ, & ras. c. c. ℥ij. Glycyrrhiz. ℥j. Coq. in Aq. fontan. Cong. duobus per horæ dimidium: deinde stent clausa super cineres calidos per horas 12. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cum primum ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi ℥℞. Post duas horas coletur, & postea depuretur per residuam, & liquor clarus reponatur in lagenis vitreis probe clausis ad usum.*

Hic liquor tum primum commodissime in usum trahetur, ubi quis a paroxysmo convaleuit; atque in eo perseverandum tam in ipsis paroxysmis, quam in eorum intervallis per reliquum vitæ cursum. Neque enim satisfactum est scæviente adhuc morbo novis rebus studere, cum in ejusmodi *ἀναξία* & motu inordinato natura vix ferre queat, ut liquores fermentati, qui vegetiores sunt ac magis spirituosi, cum alio inerti ac spiritibus destituto commutentur. Eodem etiam tempore & *Electuarium* prædictum usurpabitur, quod pariter deinceps tam in paroxysmorum insultibus, quam extra eos quotidie est devorandum. Hujus calor potus dietetici aquositatem quadantenus pensabit, sanguini, & visceribus debitum caloris gradum concilians, sine ista agitatione, quæ excitari solet ab æstu liquorum fermentatorum.

Si quis obijciat, eam vitam vix vitalem esse, in qua omnimoda tum a vino, tum ab aliis liquoribus fermentatis abstinentia observatur; respondeo perpendendum esse, an non longe miserius sit ac minus tolerabile diris inveterascentis podagræ cruciatibus (nam in mitiori morbo non hoc postulo) quotidie excarnificari, quam huic soli liquori se adstringere, cujus usu continuato in cæteris esculentis ferme omnibus animo obsequi licet, ut jam non repetam, quod & hic potus (uti cætera omnia) dulcescet consuetudine. Certe qui hunc morbum expertus est, modo homo, non bipes fuerit pecus, nihil ambiget, in quam partem debeat concedere.

Quo non obstante, si æger vel a longo ac nimio usu liquorum inebriantium, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino, vel quovis alio liquore fermentato nequeat concoquere, non vacat certe periculo eundem protinus ac de repente a vino depellere, qui quidem error haud paucis lethalis fuit. Prorsus itaque, si me audit, apoxema dieteticum supra præscriptum abdicet, vel, si eodem uti statuerit, ei sensim assuescat, haustum vini in passibus ad tempus aliquod sibi indulgens, quasi remedii loco potius, quam diætæ, donec decoctum illud familiarius evaserit. *Vinum* autem *Hispanicum* hic loci tam Rhenano, quam Gallico omnino præferendum est, quæ posteriora, licet ventriculo pergrata sint, tamen exacerbandis humoribus, & augendo morbi fomiti apta nata sunt. Adde, quod cum æque fere cruda sint, & vix magis concocta quam est nostrum pomaceum, non perinde cardiaca sunt atque calida, ac res postulat. Atque hæc de cibo potuque *πὸ δαγερσόντων* dicta sunt.

Est & aliud, quod tametsi parvi pendatur, magni tamen momenti est tam in dirigendo morbi fomite, paroxysmo adhuc vigente, quam ad prohibendam ejusdem materiæ generationem extra paroxysmum, nempe ut æger, maxime hyemis tempore, mature lectum petat. Etenim post venæ sectionem & catharsin nihil æque naturæ vires subruit ac noctu vigilare: quod quidem valetudinariorum quilibet expertus affirmabit, si serio animadverterit, quanto alacrior vegetiorque exurgit; quoties se lecto temporis commiserit, quam vero enervis est ac languidus, quoties ad multam noctem vigilaverit. Et quamvis res eodem recidere videatur, an citius serviusque lectum repetat, modo per tot horas eidem indulgeat, verbi gratia, an *hora nona* cubitum eat, & *quinta* surgat, vel *undecima* cubitum eat, & surgat *septima*; multum tamen interest, idque ob hanc, ut existimo, potissimum rationem. Interdiu sc. spiritus dissipantur; sive in corporis exercitio, sive animi, qui in minus recte valentibus ita sunt infirmi ac debiles, ut vesperti somni subsidio maturius opus habeant; & cum noctis appulsus œconomiz corporis quasi relaxationem quandam adferat, quæ diurno tempore a solis influxu vegeta conservatur, lecti calor, bruma præsertim, solis vicem ut gerat, necesse est. Mane vero spiritibus tam a prægressæ noctis quiete, quam a lectuli calore refocillatis invigoratisque, præterquam quod dies superveniens firmitatem ac robur corporis tono conciliet, diluculo surgere hoc tempore, licet horam unam alteramve a somno matutino detrahat, non ita altum vulnus naturæ infligit, ac vigilæ vespertinæ ad horam unam vel alteram protrahat. Quamobrem istis qui podagræ sunt obnoxii, author ego sim, hyeme præcipue, ut lecto mature admodum se committant, & diluculo exurgant, quantumvis somnus iusto brevior suadeat, ut diutius cubantes eundem adhuc venentur. Cum somnus qui ita diluculo capitur secuturæ noctis somno tantundem detrahat; atque ita tandem naturæ vi illata, spretoque sapienti ejus instituto, noctem pro die quis habeat, diem perversus pro nocte.

Quinimo *animi tranquillitas* omni ope stabilienda est: cum perturbationes omnes, si repagula semel effringant, ad solvendam spirituum, qui sunt digestionum instrumenta, systasin, ac proinde ad podagræ incrementum multum faciant. Prudenter itaque secum meditetur æger mortalitatis suæ conditionem, nec se earum, quæ eam sequuntur, molestiarum exortem stultus opinetur: sive enim sui ipsius, sive aliorum culpa hanc animi ægritudinem pariat, non poterit unquam mundo leges dare, qui nemini hætenus, quantumlibet demum potens aut sapiens fuerit, semper morem gessit, neque ita cuiquam semper ex animi voto cedebant res omnes, ac vana mens sponderat, at derepente inter rerum apparatus animam agens humanæ fragilitatis specimen tandem edit, immerito se brevi vitæ fructu spolians. Idem etiam incommodi sequitur nimiam animi ad studia & res serias applicationem. Cum enim huic morbo præ cæteris quibuslibet melancholia vulgo dicta comes semper adhæreat, qui ei sunt obnoxii, spiritus animales diu multumque cogitando, etiam non adhibito artificiali librorum adminiculo, fatigare solent atque obruere, hoc ipsum ita valde ac nimio opere agentes, ut corporis œconomia integra amplius conservari nequeat: Quam ob causam ut mihi videtur, hic morbus perpaucos insipientes (me excipiat qui volet) occupavit unquam.

Cæteris vero omnibus, quæ ad impediendum humorum indigestionem (quam ego primariam podagræ causam constitui) & ad sanguinem idcirco corroborandum, ac firmitudinem partibus conciliandam faciunt, *Exercitium* corporis facile palmam præripit. Animadvertendum est autem, uti supra monui, quod cum in hoc morbo, etiam magis quam in chronicorum quovis, totius corporis habitus immutari debeat, exercitatio corporis nisi quotidiana fuerit, nihil juvabit, huiusmodi enim exercitatio per vices intermissa, uti nihil fere conferet ad immutandum habitum corporis ab inertia atque indulgentia jam languescens, & effœminati, ita fortassis & nocere possit, paroxysmum accerendo, ubi quis jamdiu ab ea desueverat. Hoc vero exercitium vehemens non sit oportet, tale vero quale senibus competit, qui podagræ subjecta sunt magis usitata. Motus enim corporis iusto vehementior nimium dissipat, & e consequenti concoctiones lædit; quando exercitatio moderata ac perseverans eisdem firmit. Quantumlibet hoc durum videatur homini, qui præter senium, & corporis ad motum ineptitudinem, & socordiam huic præsertim malo quasi connaturalem, dolore insuper mactatur; tamen si hoc omittatur, nihil ex hætenus inventis quicquam proficiet. Utque paroxysmorum intervalla sine jugi corporis exercitio magna esse non possint, ita etiam ad calculi generationem talis erit proclivior; qui quidem plus habet, & periculi & cruciatus, quam ipsa podagra.

His adde, (quod magnum pondus habere debet) materiam *tophaceam* a longa requie admodum auctam iri in articulis corporis, maxime vero digitorum, ita ut tandem omni motu priventur. Ut enim fidenter asserant nonnulli, horum tophorum materiam nil aliud esse, quam sanguinis *Tartarum* ad articulos transmissum, facile tamen constabit cuilibet rem paulo attentius perpendenti, quod dum magna vis materiæ incoctæ podagram facientis in articulos quosdam depluit, & partes vicinas diutius tumidas reddit, ut partium harum virtus assimilativa sufflaminetur, partim a suffocante obstructione, quam in eis parit iners hic humor, dicta materia generetur, quæ a calore doloreque articuli in huiusmodi substantiam cogitur, atque indes augetur, tum carnem, tum cutim articuli in propriam naturam vertens; quæ jam nuda jacet, acicula, ad instar *Cretæ*, *Ocul. Cancr.* aut similis alicujus rei, extrahenda. Jam vero hoc malum ab exercitio quotidiano præcavetur, a quo oritur debita humorum podagram generantium, qui unam aliquam partem libenter occupant, diffusio per omne corpus. Unde fit; uti ipsemet expertus sum, quod exercitatio longa & quotidiana non tantum non officit generationi tophorum, sed etiam tophos veteres, & induratos solvit, modo non eo usque invaluerint, ut cutim extimam in suam substantiam mutaverint.

Exercitii genus quod spectat, *Equitatio*, quoties nec grandior ætas, nec calculus intercedunt, reliquis longe præferenda est. Et sane diu multumque mecum reputavi, quod si cui innotesceret medicamentum, quod & celare vellet, æque efficax in hoc morbo, ut in chronicis plerisque, ac est equitatio constans, & assidua, opes ille exinde amplissimas facile accumulare posset. Hac si uti non liceat, vectio frequens in curru fere eodem redit. Atque in hoc saltem podagra laborantibus plerisque bene est, quod opes quæ luxuriæ, unde pullulavit morbus, irritamenta erant, facultates curru habendi subministrant, quo hac saltem exercitationis specie fruuntur, cum altera frui nequeant.

Observandum est autem, quod exercitatio in ære salubri longe ea præstantior est, quæ in minus salubri peragitur: ruri scilicet potius quam in urbe, ubi aer vaporibus a variorum artificum officinis exhalantibus est repletus, & ædificiorum densitate conspissatus, qualis est in *Londino* hoc nostro, urbe, quantum certo scimus, omnium quæ in toto terrarum orbe sunt, spatiosissima. Quantum vero intersit, an quis ruri, an in urbe se exerceat, podagricorum quivis statim perlentescet.

Quod *Venerem* attinet, is qui tam podagra, quam senectæ laborat (quandoquidem jam jam ea spirituum copia destitutus est, quæ concoctiones promoveri debuerant, & per consequens absque hac clade adventitia articulos, & reliquas partes adjacentes plus satis laxatas habet, & debilitatas) æque improvidus meo iudicio foret, si ejus lenociniis indulgeret, atque ille qui cum longum iter emetiendum suscepit, viaticum omne prius abliguriret, quam se viæ committeret. Quinimo præter malum quod sibi accersit, languidiora ævi jam fatiscens desideria non cohibens, maximo illo privilegio fruendi jubilæi, quod speciali atque eximio naturæ munere senibus conceditur, se abdicat; qui jam in ultima vitæ scena ab earum libidinum impetu, quæ, ceu tot rabidæ feræ, eos per juventam omnem diu noctuque quasi laniabant, tandem aliquando sunt emancipati: cum horum appetituum expletio nullo modo longum illud malorum agmen, quod eam vel comitabatur vel insequabatur, pensaret unquam. Atque hæc de regimine.

Quamvis autem huiusmodi regulæ tam diætæ, quam cæterum regimen spectantes, si ab homine podagræ obnoxio religiose observentur, cum ab enormioribus morbi insultibus præservare queant, atque istam sanguini, & partibus solidis firmitatem conciliare, quæ ab illa malorum iliade, unde morbus non solum supra humanæ patientiæ

tiar vires, sed & funestus tandem redditur, eundem immunem præstare possit; non tamen efficient ut non post quædam intervalla, maxime exeunte hyeme, podagra quandoque tentetur. Licet enim æstivo tempore dum tonus vigorque sanguinis a solis calore excitatus fuerit, & in statu conservatur, & pariter debitâ humorum per poros eliminatio pro voto successit, omnino oportet ut coctiones longe melius quam hyeme celebratæ fuerint; tamen cum appetente bruma, & sanguinis robur fuerit imminutum, & perspiratio percussis poros impeditior, necesse est ut ingens materiæ indigestæ colluvies sit accumulata, quæ tandem diuturna mora in speciem prurum pet, propriis se exerens symptomatibus, & paroxysmum inducens, quamprimum vel ab humorum motu ab accessu solis propiore, vini potatione, exercitio vehementiori, aut alia causa evidenti quacunque ansa detur.

Ex jam dictis liquet eum qui hujusce morbi curationem molitur, id negotii sibi dari debere credere, ut totius corporis habitum immutet, atque illud ad pristinam constitutionem refingat, quantum per ætatem, & reliquas circumstantias fieri possit: quod in paroxysmorum interstitiis, non in ipsis paroxysmis annitendum est. Cum enim morbi fomes non solum generatus, sed & in articulos jam ablegatus fuerit, fero nimis vel ejusdem mutationem, vel eliminationem per alias vias conabimur: cum non alia methodo foras ejiciendus sit, quam ea quam natura præmonstrat, cui soli permittendus omnino est. Quod & in febrium intermittentium paroxysmis usu venit, quas ob eandem causam remediis non oppugnamus nisi æstu prius consopito. Nec absurdus quis in extinguendis harum febrium, calore scilicet, siti, inquietudine, aliisque symptomatibus, anxie operam locaverit, quam existimaverit alius se podagram sanare, cum in podagræ symptomatibus tantum coercendis laboret; cum tantum hoc tempore a curatione morbi abscedat, ut eandem aliquatenus impediatur, ac remoretur. Quanto enim magis ægri dolores lenit, tanto magis humorum concoctioni adversatur; quantoque claudicationem ardet, tanto materiæ morbificæ expulsiōni officit. Adde, quod quanto paroxysmi furor ac acies retunditur, non solum tanto diutius affliget, sed & brevius erit spatium interjacens, & minus etiam liberum ab omni gradu symptomatum, quibus hic morbus funestatur. Quod nemo iaciabitur, qui diligenter trutinaverit, quæ supra in hujusce morbi historia edisserui.

Quamobrem licet nihil magni in *Paroxysmo* tentandum sit, nisi quod istis symptomatibus occurrendum est, quæ falsa medendi methodus quandoque parturit; tamen cum omnes uno ore fateantur morbum huncce ab humorum copia, & exuberanti plenitudine nasci, ægro fortasse conducet a carnibus per aliquot dies, ubi primum a morbo corripitur, abstinere, & harum loco simplici jusculo avenaceo uti, aut alio pari alimento; cujusmodi diætæ tenuis materiæ morbificæ imminuendæ multum conferet, & naturæ opportunitatem subministrabit; qua eandem ocys digerat. Cum vero ingens sit corporum aliorum ab aliis discrimen, quibusdam abstinentiam a carne non ferentibus, statim verò ab ea spirituum animalium ἀπαξ, animi deliquio, aliisque symptomatibus, qualia scemini hysterica affectione laborantibus acciderent solent, correptis; istos non tantum juvabit, sed & lædet, si diutius a carnibus abstineant, quam ventriculus earum usum aversetur: quod ut plurimum non excedit primum aut secundum diem eorum paroxysmorum particularium, qui omnes simul juncti integrum paroxysmum, ut supra innui, constituunt. At vero si tardius siue ocys quis carne vescatur, serio cavendum est, ne urgente morbo majore copia utatur, quam quæ ad naturam sustentandam necessaria sit, nec timore cura opus est in assignanda victus qualitate. Namque ut semper in paroxysmorum intervallis; ita præcipue paroxysmo jam præsentē, æger summopere curare debet, ne quid vel in quantitate, vel qualitate siue potus, siue ciborum peccetur. Neque in hoc solo, sed in alio omni regimine, de quo fufius egi, in intervallis observando; cautela haud vulgaris adhibenda est. Et licet tam dolor, quam magna ad motum inhabilitas, exercitio, quod ego præ cæteris omnibus laudavi, contra indicare videantur, tamen & hic labor exaltandus omnino est. Quamlibet enim in paroxysmi initio ægro impossibile videatur ut lationem in curram, multo minus ejus motum ferre queat, attamen si id tentaverit, non ita diu post sentiet se minus a tali motu dolere quam cum se in cathedra domi contineret. Id insuper accedit emolumenti, si ad horas aliquot tam mane, quam post meridiem in curru vectus fuerit, quod cum domi toto die federet, noctem fere insomnem ageret, jam dolorem somno ad multam noctem fugare poterit, cum exercitatio permodica podagra laborantem eousque delasset, ut in somnum dilabatur. Adde quod eadem exercitatio calculum, quem vita defes ac iners ut plurimum accersit, quadantenus præcavebit. Quod vero maximi momenti est, e jugi ac pertinaci exercitio occurreret totali artuum ad motum impotentia, quæ haud paucis accidit post paroxysmum unum alterumve diuturniorem, contractis siue poplitum, siue calcaneorum tendinibus: dum enim in cruciatu longiore quieti indulserint (maxime crura nolentes extendere quoties dolor genu occupaverit) tandem crurum ac pedum motu per reliquum vitæ tempus orbatu sunt, tam in paroxysmorum interstitiis, quam in ipsis paroxysmis, quos non ita tamen effugiunt. Quinimo in iis senibus, quorum concoctiones admodum vitiatæ sunt, & qui a morbo per multos annos affligente ipsam corporis substantiam quasi in podagram habent conversam, nihil minus sperandum est, quam ut morbus sine exercitio ad digestionem perducatur unquam; cum enim morbus naturam viribus superet, sæpe moriuntur a languore atque ægritudine, quæ fomitis morbofi copia concoctionem respuentis apportat, & ab hac materia inconcoctili, quæ nullo modo potest assimilari, tanquam a veneno enecantur.

Attamen non obstantibus iis quæ de exercitii utilitate in podagræ paroxysmis dicta sunt, si tamen æger præ nimia paroxysmi atrocitate primo statim insultu quasi prostratus fuerit, (quod istis fere usu venit in quibus podagra jam *axile* suam attigit, nec adhuc a multorum annorum decursu mitigata est) hoc in casu si æger cubiculo includendus est, e re erit, ut etiam lectulo ad primos dies aliquot, donec scilicet doloris vehementia remiserit, idem includatur: etenim lectulus exercitii defectum aliquatenus supplebit; cum ejus usus continuus materiam morbificam potentius digerat paucis diebus quam excubatio aliqua multis, maxime incipiente morbo, si modo æger absque lipothymia aliisque malis symptomatibus a carnibus abstinere queat, solo jusculo avenaceo, cerevisia tenui & cæteris ejusmodi contentus. Veruntamen haud omittendum est, quod si

podagra jam inveterata fuerit, atque æger ad animi deliquia, ventris tormina, diarrhœam, aliaque his similia symptomata propendeat, vix libitinam evitabit ab aliquo paroxysmorum jugulatus, si non exercitio utatur, idque in aere liberiore, ac perflabili loco; quod diligenter animadvertendum cenfeo, quando magnus podagricorum numerus iis symptomatibus jam perierit, quibus hac in cubiculo, & præsertim in lecto incarcerationio eosdem obnoxios fecerat, qui non ita mature fato concessissent, si molestiam vestationis per majorem diem partem devorare voluissent. Licet enim qui unico artuum dolore fatigatur, se cubiculo possit includere; tamen qui loco doloris acerbissimi, ægritudine, aliisque symptomatibus prædictis laborat; talis idem imitando, se in vitæ disorimen conjiciet. Et quidem bene nobiscum agitur quod quoties dolor ita vehemens est, ut æger motum tolerare non valeat, neque eo admodum opus habeat, ipso dolore, quod amarissimum est naturæ remedium, ægro de vita prospiciente.

Jam vero quod attinet podagræ *Symptomata*, iis occurrendum est, a quibus æger in *Paroxysmo* de vita periclitatur. Horum maxime familiare est ventriculi debilitas ac languor, cum ventris torminibus tanquam a flatu, quod iis accidit, qui vel jam a multis annis podagræ obnoxii vixerunt, vel iis qui licet non ita diu eadem laborantes, hoc tamen mali invitarunt præpropere, liquores spirituosos cum tenuioribus, & multum refrigerantibus, derepente commutantes; vel *Emplastra repellentia*, aliaque medicamenta refrigerantia partibus affectis ad leniendum dolorem admoventes; unde morbi causa materialis, quæ in artus debuerat deponi, in viscera rejicitur. Multa egomet expertus sum in postremorum annorum paroxysmis ad nitigandum hoc symptoma, nihil vero æque votis respondit ac *Vini Canariensis* haustulus subinde deglutitus, languore, atque ægritudine urgentibus: neque vel vinum Gallicum rubrum, vel theriaca Andromachi, neque aliud quodlibet e cardiacis mihi hætenus notis pares habet vires. Sed neque vinum hocce, nec cardiacorum aliud quodlibet ægrum, si exercitio non utatur, omnino servare posse existimandum est.

Sin autem gravius aliquid symptoma inducias haud ferens, ex retrocessu materiæ podagricæ subito ingruat, & mortem ægri minuetur, neque vino, neque exercitio supra laudatis fidendum; verum hoc in casu, modo non caput, at partes vel naturales vel vitales ejusmodi malum impetat, ad *Laudanum* statim confugiendum; nempe *Laudani liquidi gutt. xx. haustulo aq. Epidemicæ immista propinentur*, & in lecto ad quietem æger se componat.

Quod si materia podagram committens, quia non jam in artus fuerit eliminata, *Diarrhœam* induxerit, modo ea paroxysmi singularis crisis non fuerit, & laudano jam laudato, & exercitio omniūmodi (hoc enim in primis ad diarrhœæ curationem obeundum est) non obstante, alvus nihilominus diutius fluat, ægritudine, torminibus ventris, &c. accedentibus; unicum, quod scio, remedium est, ut *Sudor* provocetur methodo & medicamentis huic usui destinatis: quod si fiat ad biduum, triduumve mane & vesperi, per duas tresve horas continuas, sistetur ut plurimum diarrhœa, & morbi fomes magna vi in artus detonabit. Hac ego methodo aliquot retro annis meæ vitæ consului, postquam me in hoc malum a potatione aquæ frigida pro ordinario potu imprudens conjeceram; idque posteaquam cardiacorum & adstringentium varii generis opem frustra imploraveram.

Est & aliud symptoma non perinde crebrum, quod tamen aliquoties ipse vidi, metastasis scilicet materiæ peccantis in pulmonum lobos; quoties nempe tussis brumalis a frigore tempore paroxysmi suscepto materiam sensim in pulmones allicit, artubus interim, ob translationem materiæ morbificæ in aliam regionem, vel omnino, vel tantum non, tam a dolore, quam a tumore liberatis. Uno hoc in casu intentio curativa non ad ipsam podagram dirigenda est, at vero hoc symptoma pari modo tractandum est, quo peripneumonia absoluta; venæ sectione scilicet repetita, cum diætæ & remediis refrigerantibus ac inflaccantibus, cum sanguis, in hoc symptomate præcipue, extractus pleuritico sanguinem prorsus referat. Purgandus est insuper æger inter venæ sectiones portionibus lenientibus, quibus hæc colluvies in pulmones illapsa possit amandari. Sudoris autem provocatio, quam vim cunque habeat in morbi fomite super artus deturbando, hic tamen non tantum non prodest, sed & obest, materiam, pulmonibus impactam indurando; unde generantur *abscessuli*, & tandem ægri mors certissima subsequitur.

Hic porro notandum, quod *Podagrici* fere omnes, postquam cum hoc morbo diu conflixerit, *calculi renum* sint obnoxii, proindeque vel statu vel declinatione sæpius, paroxysmi generalis nephritico dolore laborare soleant; idque cum magno ægrorum non tantum cruciatu, sed & virium dispendio, cum jam plus satis attrita fractaque ea fuerint. Hoc in casu posthabitis quibuscvis aliis remediis, *liquoris possessici*, cui *rad. Althææ* ℥ii. *incotta fuerint*, *Congium unum* quam citissime devoretur, & sequens *Enema* injiciatur.

℥℥. *Rad. Althææ*, & *liligr. an. ℥i. fol. malvæ, parietar. branch. Ursin. & flor. Chamæmel. an. m. j. sem. lin. & fœnug. an. ℥℞. Coq. f. q. aq. ad ℔. i℞. Colatura dissolv. sacchar. Culinaris, & syr. dialthææ an. ℥ij. Mf. f. Enema.* Quam primum per vomitionem æger totum reddiderit, quod per os ingestum fuerit, ut etiam enema rejecerit, *Laudani liquidi* satis magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel *pil. Matthæi*, gr. xv.

Remedia *Externa* si quis quærat ad leniendum podagræ dolorem accommodata, nulla mihi hætenus cognita sunt (licet plurima tum in me ipso, tum in aliis expertus fuerim) præter mere refrigerantia, & repellentia, quorum usum jam supra docui periculo haud vacare. Et fidenter assero, multa & longa observatione suffultus, maximam partem eorum qui podagra perisse putantur, non tam ipso morbo, quam sublesta atque indebita medicatione fuisse peremptos. Si quis autem remedium externorum, quæ pro anodynus indubitate habentur, virtutem probare velit, non fucum sibi faciat, eadem sub declinatione paroxysmi particularis (quo tempore dolor jam sponte sua cessurus est) applicando: quin potius sub initio paroxysmi ista usurpet: & statim edocebitur quam ficulneum sit illud auxilium, quam vana spes; cum hæc epithemata nocere quandoque possint, prodesse nunquam. Qua de causa egomet jam a multis annis nulla remedia externa adhibui. Pulticula ex pane similagineo cum croco in lacte cocto, addito postea oleo rosaceo in pauca quantitate, mihi olim præ cæteris profuit, quæ tamen in paroxysmi initio nihil prorsus juva-

juvabat. Si igitur dolor admodum sæviat, æger rectius sibi consulat se in lecto continendo, donec is aliquantisper remiserit, quam anodynus utatur, attamen haud abs re fuerit *Laudani* pauxillum vesperi fumere, si dolor patientiam multum vincat; aliter melius omittetur.

At vero cum in externis huiusmodi remediis jam sim, omnino aliquid mihi dicendum est de musco quodam Indico, *Moxam* vocant, nuper magni nominis in podagræ curatione, si nempe pars affecta eadem accensa leviter ustuletur. Quamlibet hoc remedii genus *Indis Orientalibus* acceptum referatur, atque *Europæis* universim omnibus pro incognito habeatur, attamen constabit antiquioris id esse ævi etiam apud nos, illi, qui *Hippocratis* effata jam ante annos bis mille literis tradita voluerit consulere. In præstantissimo illo de *Affectionibus* libro, *Secl. quinta*, pag. mihi 524. de *Ischiade* agens hæc habet, *εἰ δὲ ἐν τῇ ποδῇ, &c. i. e. Quod si in uno aliquo loco firmiter constiterit dolor, neque medicamentis expellatur, quocunque loco dolor forte extiterit, eum lino crudo inurito.* Et paulo post de *Podagra* verba faciens: *συμπερα δὲ τὴν ταύτην, &c. i. e. Huic eademque articulo morbo conferunt, & longus quidem hic morbus est & gravis, minime tamen letalis.* Quod si in digitis dolor remaneat, *venas in digito paulo supra articulum inurito; usque autem per lino crudum fiat.* Opinor, neminem posse existimare, eam esse differentiam specificam inter flammam vel a lino, vel ab hoc musco Indico excitatam, ut hæc illa in sanatione podagræ plus valeat, non magis quam reputaverit ignem e *Roboris* segmentis accensum majus aliquid præstare posse illo, qui *Fraxini* ligno alitur. Hæc partis affectæ ustulario aliquid pollicetur (quod & efficere quandoque possit) ad doloris committigationem, evocata scilicet fomitis morbifici parte subtilissima ac maxime spirituosâ, in articulum jam deposita. Attamen beneficium ab hoc remedio partum, cum indigestionem, quæ podagræ causa est antecedens, nullo modo attingat, fugax esse oportet ac breve. Neque opus est, ut dicam, illud in podagris tantum incipientibus locum habere: quando enim sive a morbi diuturnitate, sive ab importuno atque indebito medicamentorum usu, podagra, ut subinde fit, ad partes internas fuerit conversa, ac proinde ægitudine, torminibus ventris, atque longo huiusmodi symptomatum agmine, potius quam dolore ægrum multaverit, nemo sanus igne utendum esse arbitrabitur.

En vobis omnia, quæ mihi hætenus comperta sunt in hujus morbi curatione. Si quis objiciat multa esse remedia *Specificæ* ad podagram, ego me ea nescire lubens fateor: & vereor ne promissores isti perinde sint ignari ac sum ego. Et sane dolendum est, medicinam artem nobilissimam huiusmodi magis, quæ, sive ab incitia, sive a pravitate scriptorum, credulis obijciuntur, usque adeo deturpari; cum in omni fere morborum genere huiusmodi aliquid a nugivendulis tanquam *Θεὸν χεῖρας* decantetur pleno ore. Et, quod est magis mirandum, quod non tantum in morbis typo indutis huiusmodi deliramenta obtineant, sed & in nimine formatis, qui ab organorum læsione aliqua, aut *προσόδου* externa producuntur, viris etiam cætera cordatis imponant. Atque hoc satis evincunt *Specificæ in Contusionibus* vulgo prædicata, qualia sunt *Sperma Ceti*, *Tegula Hybernica* &c. quæ omnia id tantum præstant, ut methodum, qua tractari debuerat hic affectus, divertant: prout illi satis constabit qui experiri voluerit, quando tutius atque ocyus sanabitur is, qui *Vene sectionibus* ac *Purgationibus* utetur *alternatis*, usque dum bene habuerit, neglectis prorsus levidensibus istis, quæ pro more post sanguinem semel eductum sæpe exhibentur, atque etiam ea sudorum sollicitatione, quæ pari passu cum eorum usu solet procedere, a qua partium jamdiu ad inflammationem propensarum excalefactione æger sine causa in vitæ periculum adducitur.

Quod si nihil proficientibus his quæ attuli omnibus, adhuc minus sagax videar, & minus copiosus in medicamentis eruendis enumerandisque; Univerſa illa proponam quæ *Lucianus* in *Τραγοποδᾶγρᾳ* jam plenius collegit, e quibus tam externa, quam interna qui volet, eligat: qui forſan haud minus efficacia sentiet, quam sunt eorum plurima quæ a nonnullis deprædicantur. Apud hunc *Podagre* persona ita istos alloquitur, qui secreta quædam remedia se habere jactabant, quibus is morbus possit expugnari.

Τίς τὴν ἀνικητὸν, &c. i. e.

Quis invictam me dominam dolorum

Ignorat podagram in terra mortalium?

Quam neque *Thuris* vapor placat,

Neque effusus sanguis aras ad incensas:

Non templum divitiarum undique suspensis ornatum donariis.

Quam neque *Apollo* medicamentis expugnare valet,

Omnium Medicus in cælo Deorum;

Non filius *Apollinis* doctissimus *Æsculapius*.

Postquam enim enatum est primum hominibus genus,

Conantur omnes meam elidere potentiam,

Miscete semper medicamentorum artificia!

Alius aliam in me experitur artem.

Terunt *Plantagines*, & *Apia* mihi,

Et folia *Lactucarum*, & silvestrem *Portulacam*,

Alii *Marrubium*, *alii* *Potamogetonem*;

Alii *Urticas* terunt, *alii* *Symphytum*;

Alii *Lentes* afferunt ex palustribus lectas;

Alii *Pastinacæ* coctam, *alii* folia *Persicorum*,

Hyoscyamum, *Papaver*, *Cephas* agrestes, *Mali Punici* *Cortices*,

Psyllium, *Thus*, radicem *Ellebori*, *Nitrum*,

Fœnum græcum cum vino, *Gyrium*, *Collamphacum*,

Cyparissinam *Gallam*, *Pollen* *hordeaceum*.

Brassicæ decoctæ folia, *Gypsum* ex *Garo*,

Stercora *Montane* *Capræ*, *humanum* *olerum*,

Farinas *Fabarum*, *florem* *Asii* *lapidis*;

Coquunt *Rubetas*, *Mares* *araneos*, *Lacertas*, *Feles*.

Ranas, *Hyenas*, *Tragelaphos*, *Vulpeculas*.

Quale Metallum non exploratum est mortalibus?

Quis non succus? Qualis non arborum lacryma?

Animalium quorumvis ossa, nervi, pelles,

Adeps, sanguis, medulla, stercus, lac.

Bibunt alii numero quaternum pharmacum:

Alii octono: sed septeno plures.

Alius vero bibens *Hieram* purgatur:

Alius incantamentis impostorum deluditur:

Judeus alium stultum excantat nactus:

Alius vero remedium petit ab *Hirundinis* nido.

Ego autem his omnibus plorare impero,

Et facientibus hæc atque irritantibus me

Soleo occurrere multo iracundior.

Iis vero qui cogitant nihil adversum mihi,

Benignam adhibeo mentem, facilisque fio.

Nullus dubito prudenissimos quosque eorum, qui cum hoc morbo diu confligere, de omnimoda curatione desperantes, *Choro* qui illius *Dramatis* catastrophem facit, suffragaturos:

Ἥτιον ὁ παῖς, &c. i. e.

Lenem, O ubique gentium celebrata afferas (nobis) dolorem, o

Podagra,

Levem, facilem, non acutum, brevem, haud severientem,

Tolerabilem, facile desinentem, parum validum, ambulationes

non impedientem.

Multi sunt morbi miserorum:

Sed exercitia dolorum, & consuetudo

Podagricos soletur.

Ideoque æquo animo, o *Complices*, obliviscimini

Dolorum. Si ea, quæ placent, non sunt.

Tamen etiam præter spem accidentibus viam invenire solet *Deus*.

Quivis sustineat *Podagra* laborantium

Deludi & *derideri*:

Talis enim hujus morbi natura est.

Ut semel finiam, Methodus quam hic trado *παρρησιάζων* prædictorum examini innitur; quamque ego secutus tam in ipso me, quam in aliis, morbi levamen percepi. Therapeja *Radicalis* & usquequaque perfecta, qua quis etiam a diathesi ad hunc morbum foret liberatus, adhuc in *Democriti* puteo latet, atque in naturæ sinu reconditur, nescio quando, aut a quibus in lucem extrahenda. Spero nihilominus me hoc scripto humano generi commodi aliquid contulisse, si istos scopulos fideliter indigitaverim, ad quos tum ipsemet, tum alii plurimi naufragium fecimus; atque insuper optimam quæ hætenus innotescit, methodum præmonstraverim. Non his majora promitto; quamvis a longa cogitationum serie, quas huic rei impendere tantum non sum coactus, inducar credere, ejusmodi remedium quandoque inventum iri. Quod si unquam acciderit, incitiam suam dogmaticis exprobrabit, atque exinde liquebit, quam insigniter tam in dignoscendis morborum essentiis, quam in medicamentis quibus eos aggrediuntur, hallucinentur. Cujus rei exemplum satis luculentum habemus in repetitione summi illius ad *Febres intermittentes* specifici, *Corticis Peruviani*. Per quot jam sæcula homines quique solertissimi ingenia exercuerant in investigandis harum febrium causis, quibus praxin quilibet aptavit Theoria a se excogitata optime respondentem? Quomodo vero hæc medicationes theorematibus valebant defendere, ex iis constat, quorum adhuc recens est memoria, in quibus varias intermittentium species in variis humoribus in corpore redundantibus collocantes, curationem ad humorum istorum alterationem atque evacuationem dirigere solebant. At quam inauspicato id egerunt eorum in his conaminum frustratio, præcipue vero hujus *Corticis* usus felicior, palam faciunt: cujus ope nos nunc temporis tum humores huiusmodi omnes, tum etiam dietam & regimen quodcumque susque deque habentes, ac nihil nisi methodum pulveri exhibendo debiram observantes; scopum recta attingimus; vix ab illo aberrantes unquam nisi ægrum, lecto sine ulla necessitate addicimus, dum in ejus usu est: Tanta tamen est hujus remedii vis, ut non obstante eo incommodi, quod scilicet febris a lecti calore plus quam erat opus intendatur, ægrum nihilominus ad sanitatem ut plurimum reducat. Interea donec hæc podagræ curatio radicalis comperta fuerit, quod Medicos omnes, me præ cæteris, optare fas est; hanc meam qualemcumque opellam boni consulite. Quod si minus eveniat, hominum mores ita probe perfectos habeo, ut non multum fallar; & officii mei rationem ita calleo, ut animo neutiquam cadam. Et si sævissimi isti cruciatus, impotentia ad motum, cæteraque corporis mala, quæ ego per maximam vitæ partem sum perpeſsus, (una cum damno rei familiaris quod sustinui, a medicina facienda toties adversa valetudine avocatus) aliis quietem & ἀναλγησιαν possint comparare; erit unde me fructum aliquem miseriarum hujus generis, quas in hac vita toleravi, in aliam migrans percepisse existimabo.

EX paucis hisce, *Clarissimi* nostri Auctoris paginis, satis manifestum est, quid de *Podagra* in genere ejusque cura legitima, quæ in solis palliativis posita est, sentiendum veniat. Verum specialius quid circa hunc morbum, aliasque omnes affectiones de ejusdem naturæ participantes, reperitur in *Clarissimi* *Musgrave* Tractatibus de *Arthritide Symptomata*, & *Anomala*, quos propterea pro pleniori ejusce ægitudinis cognitione hic inferere propositum nobis fuit; sed quandoquidem grandior illorum moles, longiorem Auctoris nostri textui interruptionem procreasset, magis e re visum fuit eos in Voluminis hujus prope finem rejicere, ubi æque commode a docto Lectore perlegi poterunt, ac si ipso hoc loco exhiberentur.

THOMÆ SYDENHAM, M.D.

TRACTATUS

DE HYDROPE.

Omnia hominum ætas, sexus omnis ab *Hydope* nonnunquam infestatur. Fœminæ tamen huic morbo magis sunt obnoxie quam viri; verum hos ætate præsertim ingravescente adoritur, illas ubi jam parere desierint: Steriles autem quandoque etiam juniores occupat. Foveæ a digitorum impressione in furarum parte inferiore, sub noctem in primis conspicuæ, mane vero evanescentes, primum hujusce mali indicium dant, quod non perinde certum est hydropis ingruentis signum in fœminis atque est in maribus; cum & prægnantes, & aliæ quibus catamenia quavis de causa sistuntur, haud raro idem patiantur. Neque tamen in viris ejusmodi tumor hydropem certo indicat; etenim cum senex quispiam, habitu corporis paulo pleniori præditus, *Asthmate* jam a multis annis laborans, ab eodem repente, idque hyemis tempore, fuerit liberatus, mox ingens tumor musculorum tibiæ occupabit, hydropicorum tumores æmulans, qui hyeme etiam magis quam æstate, tempestate magis pluvia quam serena,

na, patiter invaleſcet; & tamen ſine quovis incommodo inſigniori, eundem ad Libitinam uſque comitabitur. Quo non obſtante, ſi generaliter loquamur, ſuræ & tibię intumeſcentes, etiam in viris, pro ſigno ſupervenientis hydropis habendæ ſunt; maxime ſi ita affecti ſpiritum ægrius ducant: qui quidem tumor tam copia, quam mole auctior in dies redditur, donec pedibus majorem aquarum vim jam reſpuentibus, crura tentantur, ac poſtea abdomen ipſum; quod quidem ſero e ſanguine jugiter decidente repletum, paulatim ad ultimum capacitatis ſuæ limen diſtenditur; adeo ut ſæpe multos aquæ congios intus contineat, quæ in umbilicum, qua data porta, ruentes, quandoque exomphalon conſtituunt.

Tria interim hunc morbum ſtipant ſymptomata, *Dyſpnœa*, *Urine paucitas*, & *ſitis intenſa*. Spirandi difficultas oritur ab aqua diaphragma comprimente, unde naturalis ejus motus ſuſtaminatur. Urina ideo parce redditur, quia ſanguinis ſerum, quod per duclum urinarioſ ex lege naturæ excerni debuerat, jam in cavitatem abdominis deponitur, & in cæteras partes eidem excipiendæ aptas natas. Siſis eſt a putredine colluviei ſeroſæ, quæ a mora in corpore longiore & calorem & acredinem contrahit, unde æger & febre quadantenus ſemper laborat, & memorata ſiti.

Pro rata qua æger in partibus quas morbus obſidet, mole augeatur, in reliquis magis magisque indies emaciatur, & gracileſcit, tandemque cum tanta aquarum viſ intra abdominis ambitum coerceri ulterius nequeat, impetu in viſcera nobiliora & vitalem arcem facta, cataclyſmo quaſi ſubmerſus perit.

Cauſa huiusce morbi in genere ſanguinis debilitas eſt, unde alimento, quod forinſecus importatur, in ſubſtantiam ſuam convertendo non jam par, idem in extremitates & pendulas corporis partes explodere neceſſe habet, mox in abdomen etiam, in quo, quandiu in exigua quantitate hinc inde diſpergitur, natura eidem continendo veſiculas quaſdam fabricat, donec tandem, modum jam ſuperans, uno peritonæo ſimul clauditur.

Sanguini autem debilitando operam ut plurimum commodabant vel nimia ejus per venæ ſectionem aut alio quovis modo evacuatione, vel morbus aliquis diuturnior, vel perditus ille liquores ſpirituosos ingurgitandi mos, unde & naturalia corporis fermenta deſtruuntur, & diſſipantur ſpiritus. Hinc eſt, quod bibaciſſimi quique helluones ſæpius cum hoc morbo, frigido licet, quam cæteri conſiſtentur. E contra etiam aquæ potatio in iis qui generoſis liquoribus diu aſſueverant, ſanguini eandem noxam inferit.

In feminis vero, quod notandum eſt, alia quædam & ab his longe diverſa hydropis cauſa reperitur, incluſa nempe in teſticulorum alterutro ſaburra ſeu obſtructio, quæ ſenſim ejuſdem craſin ſubvertit; unde in diſto teſticulo reſpoſita primum morbi minera, tunica ejuſdem mirum in modum diſtenditur; qua jam tantum non crepante, natura humori excipiendæ veſiculas quaſdam ſuggerit, quarum tandem ſive una aliqua, ſive etiam pluribus diſruptis, & in abdominis cavitatem ſe exonerantibus, eadem occurrunt ſymptomata, quæ in hydropē, quam ſupra depinximus. Sed de hoc genere jam olim egi.

Sunt & aliæ duæ ſpecies tumorum abdominis hydropem mentientes, ſcæminis utræque familiares. Prima eſt carniū in partibus intra abdomen excreſcentia præternaturalis, quæ ventrem in molem haud minus conſpicuam attollit, quam ſolet incluſa aqua. Altera ſpecies flatibus ortum debet, qui non tumorem tantum, ſed & alia ingravitationis ſigna pariunt. Hæc viduas ut plurimum exercet, vel etiam mulieres, quæ non niſi proveſtiores ætate nupſerant: atque hæ tam ſuo ipſarum, quam obſetricum judicio, quarum oracula hac ipſa de re conſultare, motum infantis jam a tempore conſueti uſque ad legitimum tempus pariendi perſentiſcentes, quin & ad eundem modum, quo gravidæ ſolent, ſubinde ægrotantes, ſororiantibus inſuper mammillis, & lacte extillantibus, de ſciſis haud raro cæteriſque ad excipiendum infantem neceſſariis ſibi proſpexerunt, donec tandem venter pari quo increverat gradu, ſenſim detumefcens, ſpem vanam eluſerit. Neutra vero harum ad eum, de quo agimus, morbum eſt referenda.

Indicationes curativæ veræ ac genuinæ, utpote a prædictis phænomenis naturaliter quaſi exortæ, vel ad aquarum in abdomine cæteriſque partibus contentarum evacuationem, vel ad inſtaurandum ſanguinis robur, quo novus earundem proventus præcaveri poſſit, omnino dirigendæ ſunt.

Seri evacuationem quod ſpectat, magni refert, ut diligenter obſervemus in omnibus hydropicis ea cathartica, quæ vel ſegnius vel minus potenter operantur, officere magis quam prodeſſe: cum enim medicamenta purgantia ad unum omnia naturæ ſint inimica, quo nomine catharſeos munere ſanguinem aliquatenus debilitant læduntque; unde niſi corpus celeriter pervadant & citiſſime expellantur, camerinam eam moventia quam ſecum abducere nequeunt, & ſanguinem tumultuoſe exagitantia, tumorem magis adaugent: quod plus ſatis liquet in eorum pedibus, quibus alvus leniter ac blande ſolicitatur. Quamobrem ut cum bonis ægri rebus purgatio inſtituatur, ſcire oportet, utrum ægri corpus facile, an vero difficulter atque ægre catharticiſ cedat, cum in hoc cardine curationis omnis, ſive nullo, ſive non niſi magno labore peragendæ negotium vertatur.

Quoties itaque *Hydragogis* utendum eſt, ſolicite ad facilitatem vel difficultatem, qua ægri corpus catharſin ferre ſolebat, reſpicere omnino convenit; quod non alia via ulla certiſ dignoſci poſeſt, quam ex diligenti inſpectione, quomodo alia purgantia remedia alio tempore aliquo uſurpata, opus deſtinatum peregerint. Cum enim in corporibus idioſyncraſia quædam inveniatur, quoad facilem difficilemve catharticoſum operationem, ægrum ſæpiſſime in vitæ diſcrimen conſciat, qui ſenſibile corporis temperamentum, modum ſibi ac normam ſtatuert: quando non ita raro uſu veniat, ut qui habitu ſunt ferme athletico mediocribus catharticiſ facile pareant; cum qui contrario plane habitu ſunt præditi, vel fortiffimis ægre cedant. Et profeſto jam dicta cautio de ægri corporis ad purgantia ferenda ineptitudine non hydragogis tantum præſcribendis, ſed in aliis quibilibet catharticiſ locum habere debet. Etenim ſæpenumero obſervavi hypercatharſes a potionibus etiam lenientibus adductas, ex eo quod ægrum. Medicus non interrogaverit, prout oportuit, utrumne corpus facili, an vero difficulter expurgaretur. Attamen cum hydrops, quod ſuperius dixi, præ cæteris morbis quibilibet catharſin & validiſſimam poſtulet & maxime celerem: cumque in

hoc morbo purgatio per *ἐπικράσιν* quæ in nonnullis aliis prodeſt, nullatenus admitti debeat, (cum huius generis catharſis non tantum non imminuat tumorem, ſed & adaugeat:) Hanc inquam ob cauſam, expurgatio paulo fortior & nimia, juſto debiliſ eſt præferenda, præcipue cum *Laudano* non deſtituatur, certiſſimo ad hypercatharſin iſtiusmodi ſubito domandam fræno.

Ad hæc in *Catharticiſ* omnibus hydropicorum ſanationi dicatis, id diligenter eſt obſervandum, ut aquæ ex maxima celeritate exhauriantur, quam ægri vires ferre queant, utpote qui ſingulis diebus expurgari debeat: niſi quod ſive ob nimiam debilitatem corporis, ſive propter catharticiſ præcedentis operationem plus ſatis violentam dies unus aut alter nonnunquam intercalari poſſit. Etenim ſi non niſi poſt longa intervalla repetatur purgatio, quantumlibet copioſa catharſis præceſſerit, aquis denuo aſſatim colligendis auſam præbebimus; atque ex hac induciarum occasione, quaſi victoria jam parta uti neſcientes, tandem loco pulſi, re infecta turpiter fugabimur. Adde quod periculum eſt, ne aquarum inter viſcera mora diuturnior eadem putredine quadam ſua inquinet ac inficiat. Atque inſuper, quod parvi ducendum non eſt, iſtæ aquæ a prægreſſis catharticiſ ita in motum concitæ ad noxam inferendam jam propenſiores ſunt, quam ubi quieſcerent. Tam ab hac itaque cauſam, quam ob alias ſupra memoratas, huic intentioni, quæ colluviem ſeroſam intus clauſam reſpicit, quam velociſſime ſatis faciendum eſt; neque ab ea niſi urgente neceſſitate eſt abſtendum aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omnino demum exantlata fuerit.

Hoc porro notandum venit, quod cum e praxi conſtet hydragoga fere omnia, genio quodam ſibi peculiari, ſi ſola exhibeantur, iis qui ægre purgantur, parum admodum votis reſpondere, quin & largiorem eorundem doſin, non tam catharſin, quam ſanguinis tumultum promovere. (unde qui imminui debuerat tumor, jam auctior cernitur;) Hæc itaque non alium obtinent uſum, in huiusmodi corporibus, ut lenioribus catharticiſ ſtimulum addant. Quo non obſtante in iis, qui purgati ſunt faciles, hydragoga iſta & celeriter, & cum magno effectu operantur.

Quocirca in iſtis, qui catharſi prompte cedunt, *Syrupus de Spina Cervina*, etiam ſolus, aquas ſat copioſe elicit. Quod quidem remedium in his aquas fere ſolas, eaſque in magna quantitate educit, nec ſanguinem perturbans, nec urinam reddens coloratiorem proreliquorum purgantium more: Id tantum habet incommodi ſyrupus ille, quod inter operandum ingentem ſitim provocet. Quod ſi idem vel in ſumma doſi aliis propinetur, qui ægre expurgantur, neque multæ ſequentur dejectiones, neque eæ multa aqua, ut debuerant, reſertæ.

Equidem probe memini, (cum tunc primum ad hydropem curandam invitaret) me annis ab hinc 27. aut circiter ad Matronam quandam piam & honeſtam, nomine *Saltmarſb*, *Westmonaſterii* commorantem, fuiſſe accerſitum; cujus abdomen hydrops, quo atrociorum nondum vidi, in molem magnitudinis vix credendæ evexerat: huic ego ſyrupi prædicti unciam unam ante prandium, qui tunc mos obtinuit, exhibui: credi vix poteſt quam magnam aquarum vim per ſedem deturbavit, idque nullo excitato tumultu, abſque ulla virium ægræ jaſtura: Quod mihi animos addidit, ut eundem quotidie repeterem, niſi quod diem unum alterumve intercalari paterer, ſi quando paulo infirmior videretur. Atque ita aquis ſenſim educiſ, venter indies detumuit, ipſaque proſus convaluit. Ego fiducia plane juvenili atque hominis inexperti, credebam me ejuſmodi medicamen poſſidere, quo hydropes quoscuque poſſem debellare: verum huiusmodi erroris intra paucas ſeptimanas admonebar. Cum enim non ita diu poſt ad aliam ſcæminam eodem morbo laborantem, qui febris quartanæ diuturniori ſupervenerat, medicinam facturus accederem, eundem ſyrupum propinavi, quo ſæpius repetito, & doſi gradatim aucto, morbum laceſſebam; at cum aquarum evacuationem fruſtra tentarem, catharſi non procedente, tumore autem ventris magis aucto, miſſum me fecit ægra: atque alterius medici ope, qui remedia efficaciſiora adhibuit, ſi bene memini, ſanitatem recepit.

Ubi igitur conſtiterit, ægrum eo eſſe corporis habitu ut cathartica leniora nec celeriter, nec cum bona euphoria opus ſuum peragant, fortiora tentanda. Quo in caſu, ut modo innui, notandum eſt, quod licet hydragogorum pauca, ſi ſola exhibeantur, votis reſpondeant, lenioribus tamen calcaris vice permixta, efficaciſſima omnino ſunt. In huiusmodi corporibus, exempli gratia, ſequentem potionem cum ſucceſſu ſæpenumero præſcripſi. *℞. Tamarind. ℥ſſ. Fol. Sen. ℥ii. Coq. in q. ſ. Aq. fontan. ad ℥iiij. in Colatur. diſſolv. Mann. & Syr. de Spin. Cervin. ℥ſſ. Eleſt. e ſucc. Roſar. ℥ij. m. f. Potio.* Quæ tamen potio non niſi robuſtioribus exhibenda eſt, quibus alvum ſolvit, ubi cætera id præſtare nequiverint; quod multiplici experientia ipſius probavi. Vel *℞. Vini alb. ℥iiij. Zalap. ſubtiliſſ. pul. ℥j. Zinzib. pul. ℥ſſ. Syr. de Spin. Cervin. ℥j. m. f. potio, ſumenda ſummo mane, repetendaque ſingulis, vel alternis diebus pro ratione virium.*

Sequitur alia medicamenti formula, mihi haud infrequens, quo illi ſatis commode utentur, qui a repetito aliorum purgantium uſu abhorrent; quando ægrum calefaciat inter purgandum, tum etiam corroboret, *exg. ℞. Rad. Jalap. contuſ. Hermodactyl. an. ℥ſſ. Scammon. crud. ℥iiij. fol. Senn. ℥ij. Glycyrhiz. raf. ſem. Anif. Carni an. ℥ſſ. Summit. Abſinth. Fol. Salv. an. m. j. Inſunde frigid. in ℥iiij. Aq. vitæ vulgaris, & coletur tantummodo uſus tempore. Cap. cochlear j. hora ſonni, & ji. mane ſequenti.* Augendo vel minuendo doſin pro ratione operationis.

Reſtant vero medicamenta duo, me iudice, palmaria, & in iis qui non niſi ægre purgantur, cæteriſ quæ vel ſupra enumeravi, vel adhuc comperta habeo *δρακικάρεια*, *Elaterium* intelligo, & *Inſuſionem Croci Metallorum*. *Elaterium* ſive *Fæcula Cucumeris agreſtris* potenter in permodka quantitate vires ſuas exerit in turbanda alvo, & ſcæcis cum ſeroſis & aquoſis humoribus copioſe egerendis, adeo ut ejus grana duo plerique, in genere loquendo, corporibus doſis aptiſſima ſint. Ego permiscere ſoleo *Pil. ex Duobus ℥j.* quas in pilulas tres exiguas formandas, ac mane ſumendas impero.

Inſuſionem Croci quod ſpectat, ejus *℥iſſ.* (vel purgati difficillimis *℥ij.*) mane exhibita, & quotidie pro ægri viribus reiterata, quamlibet prima facie haud aliud promittat, quam colluviem in ventriculo ſtabulantem egerere, tandem tamen efficiet, ut abdomen ab aquarum ſuper-incumbentium onere liberetur. Præterquam enim quod ceſſante vomitione, in catharſin *πρὸ κατὰ* ſolet deſinere, neceſſe eſt omnino, ut cum tanta fuerit agitatio concuſſioque tam ventriculi quam viſce-

viscerum, a tam insigni aquarum corrivatione quasi circumseptorum, earundem evacuatio, per ductus communi naturæ lege haud satis patentes, conatum ita vehementem insequatur. Veruntamen si prædictum vomitorium inferiorem ventrem haud efficaciter expurgaverit, tam *Electuarium de Succo Rosarum*, quam *Syrupum de Spina cervina* soleo post tertiam aut quartam dosin meræ infusionis croci metallorum quandoque, licet rarius, adjicere. Ex. gr. 24. *Aq. Card. Ben.* ʒiij. *Infus. Croc. Metallor.* ʒiʒ. *Syr. de Spin. cervin.* ʒʒ. *Elect. de Succ. Rosar.* ʒij. m. f. *Potio.*

Quod vero dentur ejusmodi cæci meatus, per quod aquæ ex abdominis cavitate ad intestina transferantur, de facto liquet; cum quotidie observemus hydragoga tantam aquarum in abdomine inclusarum vim per secessum educere, perinde ac si primitus in ipsis intestinis continerentur. Cui tam duro modo cum parem cuneum haud facile inveniamus, in mentem mihi venit celebre illud dictum medici omnium sæculorum iudicio sapientissimi optimique, *Hippocratis* scilicet, qui in libro de prisca medicina hæc habet. λέγουσι δὲ τινες καὶ ἰατροὶ, καὶ σοφισταὶ, ὡς ἔχει ἐνὶ δυνάτει ἰατρικῇ ὁδόν, ὅτις μὴ οἶδεν ὁ, τί ἐστὶν ἀνθρώπος, καὶ ὅπως ἐγγίγνεται πρῶτον, καὶ ὅπως συνειργάν. ἐγὼ δὲ τῶντων μὲν ὅσα τινὲς ἐρῶσαι σοφιστῶν, ἢ ἰατρῶν, ἢ γέγραπται ἐστὶ φύσις, ἥσων νομίζω τῇ ἰατρικῇ τεχνῇ προσήκειν ἢ τῇ γραφικῇ. i.e. *Medici quidam & Sophistæ dicunt, quod impossibile est cum medicinam cognoscere, qui non novit quid sit Homo, & quomodo primum factus & compactus sit. Ego vero ea quæ ab aliquo Sophista aut Medico de Natura dicta, aut scripta sunt, minus censeo ad Artem Medicam spectare quam ad Pictoriam.*

Attamen (ne vel divinus hic Author erroris ullatenus infimuletur, vel ex hoc loco Empirici ignorantia suæ patrocinium quarant) aperte dicam, me quantum attentissima cogitatione, eaque ad praxin (quæ medicinam profitentium lapis Lydius haberi debet) relata assidue valeam, utcumque existimare, quod necesse omnino sit, ut Medicus structuram humani corporis probe calleat, quo rectius veras ideas & naturæ, & causarum quorundam morborum animo concipere ac formare queat. Neque enim fieri potest, ut qui renum fabricam ignorat, ductuumque exinde ad vesicam tendentium, conjicere possit, unde oriantur symptomata illa, quæ a calculo vel in pelvim, vel in ureteres altius impacto pendent. Nec minus Chirurgum oportet eandem humani corporis structuram perdiscere, quo melius inter operandum ab iis vasis, sive aliis partibus absteineat, quæ, si violentur, ægro exitium afferant. Sed nec ossa dislocata ad situm naturalem recte poterit reducere, nisi eam ossium compagem, *Skeleton* dictam, curiose inspexerit, atque animo comprehenderit.

Hujusmodi itaque humani corporis notitia omnino necessaria est; quam qui non habet, cum quibusdam morbis *Andabatarum*, quod ajunt, more pugnabit, aut sine nautica pyxide tentabit mare. Porro hæc scientia & cito & facile acquiritur, cum id præ cæteris difficilioribus habeat compendii, quod αὐτοψία in cadaveribus vel humanis vel animalium quorumlibet perdiscatur, idque nullo fere negotio, etiam ab iis qui mente ac iudicio minus valent. Veruntamen in acutis quibuslibet, quod genus plus quam duas tertias morborum partes comprehendit, atque porro in chronicis plerisque, omnino fatendum est τὴν ὁδὸν inesse, sive specificam proprietatem aliquam, quam nulla unquam contemplatio a speculatione corporis humani deducta, queat indagare, atque in lucem protrahere. Quamobrem ne ita homines in cadaverum dissectione præcipuam locarent operam, tanquam exinde potius quam ex φαινόμενων naturalium, ut & *Juvantium & Lædentium* diligenti observatione, promoveri possit ars medica; id opinor, ut maxime caveri in loco prædicto voluit divinus ille senex, non autem generalem fabricæ humani corporis notitiam carpere ac fugillare.

Et profecto virum tantum tamque sapientem nullo modo potuit latere, humanam omnem investigationem ultra generalem ejusmodi notitiam pertinere non posse. Licet enim diligenti in secandis cadaveribus inquisitione ac scrutinio, majora organa, quibus natura in perageendis operationibus suis utitur, in conspectum veniant, vastaque itidem nonnulla, per quæ succi ab his ad illas corporis partes transmittuntur; quæ tamen hujus motus sit origo & causa primaria, oculi docere nequeunt. Nec microscopium quodvis vel exquisitissime elaboratum exiles istos meatus, per quos chylus, ex. gr. ex intestinis in vasa chyliifera transcoletur, vel per quos ductus sanguis per arterias derivatus in venarum oscula reducendus transmittatur, potest detegere. Quinimo sunt & alii fere innumeri, iique magis adhuc affabre concinnati, meatus ac pori in hac miranda hominis compage, quos nemo hominum ne per omnium quidem vidit; cum rudis & indocta, (sit verbo venia) cognitio nostra in rerum cortice omnis ferme versetur, ac ad τὸ ὅτι sive quod res hoc modo se habeat, fere tantum assurgens, τὸ δὲ τί, sive rerum causas nullatenus attingat. Utur se res habeat, haud difficili investigatione scire possumus, quantum nobis dirigendis (prout fert rei natura) sufficit in eorum curatione morborum qui hujusmodi peritiam, quod supra dixi, sibi vendicant: maxime vero quantum nos impellat ad Divinum Artificem summa animi demissione adorandum, dum stupendum ejus artificium contemplantur in iis, quorum ratio nobis innotescit, tum illud longe excellentissimum in cæteris, ad quæ prorsus cæcutimus.

Et sicuti *Hippocrates* eos reprehendit, qui huic in humanis corporibus speculandis curiositati & ἀσέβειᾳ plus dant quam observationibus practicis, ac proinde quam ipsius naturæ iudicio; ita pari jure prudens vir quispiam in hoc nostro sæculo eos culpæ possit, qui existimant, artem medicam nulla re alia magis promoveri posse, quam novis *Chymicorum* inventis. Quanquam enim ingrati prorsus animi esset non libenter agnoscere id emolumenti, quod chymia acceptum debemus, eo quod utilia nonnulla medicamenta, & indicationibus satis faciendis perquam accommodata (inter quæ vel ipsum *Emeticum*, de quo jam agimus, haud infimum locum tener) nobis suppeditaverit; atque eam ob causam, si intra phariacopææ limites contineatur, ars est satis quidem laudabilis: attamen nec illi culpa, aut saltem errore vacant, qui cetebrum sibi eousque excalefaciunt ac torquent, ut tandem arbitrentur, artem medicam in hoc præsertim deficere, quod remediis magnis atque efficacibus a sola *Chymicorum* præparatione atque opera nobis subministrandis, indigeat. Cum ei, qui rem recte perpenderit, satis liqueat, præcipuum medicinæ faciendæ defectum non in eo verti, quod nesciamus quo pacto huic aut illi intentioni satisfacere debeamus, sed quod non satis sciamus, quænam sit illa, cui satisfaciendum est. Cum vel rudissi-

mus quispiam pharmacopola servulus intra dimidium horæ quadrantem certum me faciat, quo medicamento vomitionem, purgationem, vel sudores provocabo, vel refrigerabo æstuantem; at vero in palestra medica probe exercitatus sit oporteret, qui pari certitudine me docere queat, ubi hoc vel illud remediorum genus in usum revocare debeam per omnem morborum ac curationum circuitum.

Et quidem certissimus sum nihil æque ad iudicium hac in re rite formandum conferre atque observationem exactissimam φαινόμενων naturalium & morborum, & pariter eorum, quæ in praxi cernuntur a *Juvantibus & Lædentibus* derivata, post ea sive remedia usurpata, sive etiam medendi methodum istam, quibus morbos depellere satagimus. Hæc si diligenter inter se & collata fuerint, mihi ostendent & morbi naturam, & insuper undenam curativæ indicationes desumenda sint longe melius certiusque, quam si ad speculationem naturæ hujus aut illius principii corporis concreti tanquam ac *Cynosuram* cursum dirigam. Etenim vel exquisitissimæ hujus generis dissertationes nihil aliud sunt quam metaphora belle deducta exornataque: quæ etiam ad eorum instar omnium, quæ in scena imaginationis, non vero in ipsa rerum natura fundamentum habent, dies delebit ac proteret; cum *Naturæ indicia* rerum veritati superstructa, non nisi cum ipsa natura interciderint.

Quamvis autem *Hypotheses* speculationibus philosophicis innixæ futiles sint prorsus, cum nemo hominum scientia intuitiva præditus sit, qua fretus principia queat subternere, quibus mox superstruat, attamen si *Hypotheses* ab ipsis rebus factis fluant, ex eis tantum observationibus natæ, quas phænomena practica & naturalia suggerunt, stabiles manent & inconcussæ: ita ut licet praxis medica, si scribendi ordinem respicias, ex hypothesibus orta videatur, nihilominus ipsæ hypotheses, si modo solidæ fuerint ac genuinæ, praxi quadantenus originem debeant. Exempli gratia, in *Affectione Hysterica* non ideo calybeatis utor, cæterisque sanguinem invigorantibus; nec ideo ab evacuantibus me tempero (nisi scilicet in statis quibusdam circumstantiis) & remedia potius paregorica impero, quia primum pro concessio habui hunc morbum a debilitatis fractisque spiritibus animalibus pendere: verum cum φαινόμενων practicoorum constans observatio me docuisset cathartica exhibita morbi symptomata semper auxisse, his vero contraria eadem symptomata conspire solere, ex hac, aliisque φαινόμενων naturalium observationibus hypothesin meam desumpsi, ita ut Philosophus Empirico hic famularetur. Quod si ab hypothesi cœpisssem, ea plane ratione insanirem atque ille, qui tabulata tignaue domus superiora prius velit erigere quam fundamentum jecerit: quod quidem istis tantum convenit, qui in aere *Castella*, quod ajunt, solent extruere: his enim certo quodam privilegio ab alterutra extremitate licet ordiri.

Sed ut ad rem redeam. Quicumque demum sint meatus isti, per quos aqua ex abdominis cavitate in intestina deducitur, certissimus sum vomitionem a dicto emetico excitatam eandem potenter evacuare, idque non solum deorsum per sedem, sed & rursus per ipsum ventriculum atque os in vomendi actu. Etenim post duas vel tres evomendi vices, aquæ non tam medicamenti vi secretoria elici videntur, quam ruptis quasi repagulis & claustris refferatis, pleno alveo effundi: quod satis constat ex earundem eruptione atque impetu sæpe facto inter ipsa vomendi spatia, sive intervalla.

Menfe Augusto postremum elapso, paupercula quædam annos habens 55. aut circiter, opem meam imploravit. Febre intermittente diu laboraverat, dein carcere fuerat inclusa fere per triennium, a frigore multum passa erat, ventret denique ad tantam molem increverat, ut ei parem nunquam hæctenus viderim: Ego ʒiʒ. *Infusionis Croci Metallorum* singulis diebus ad triduum exhibui, mox alternis diebus pro virium ægræ ratione, usque dum doses omnino sex hauserat. Primis aliquot vomendi vicibus urina penitus supprimebatur, quam postea quandoque per intervalla reddebat, sed raro admodum: quo frequentius emeticum repetebat, eo majorem aquæ copiam solebat rejicere, idque sub finem tam per os quam per sedem. Verum post tertiam dosin tumor subsidere atque imminui cœpit, & post quatuordecim dies filo, quo crassitiem corporis inflati jussu meo fuerat dimensa, iudice ac teste, jam tribus pedibus gracilior comparuit, atque aliquot aquæ congios, supputatione ex iis quæ mihi ipsa narravit facta, ἀνω καὶ κάτω egefferat. Ita ut quæ prius in lecto non nisi erecta dormiebat, ne decumbens ab aquarum pondere suffocaretur, jam capite in pulvinar reclinato secunda jaceret, & de latere in latius pro arbitrio se movere potuerit. Cum vero dicta emetica operandi violentia *Vapores*, quos dicunt, ad eum gradum excitarent, ut iisdem diutius morbum laceffere tutum non foret, & tamen tam ex residua adhuc ventris mole, quam aquarum rotatione, quam toties percipiebat, quoties se in alterutrum latus convertibat, & vestigiis insuper rei cujuslibet prementis in tibiis etiam nunc manentibus, plus satis liqueret multum aquæ adhuc in corpore restare: ob causam jam dictam, reliquam curationem purgantibus proprie dictis cogebar absolvere. Posthac igitur vel potio nem purgantem supra dictam, vel aliud quoddam hydragogum præscripsi; idque vel rarius vel sæpius prout vires ejus ferrent, aut vapores minus infestarent. Etenim & catharsis per inferiora affectus hystericos aliquatenus invitabat, licet non ita graves & violentos ac solebant emetica. Atque in hac methodo persistebam, donec prorsus convalescere videretur. Quæ dum fierent, hæc mihi præcipue observanda occurrebant. Primo, quod iis diebus, quibus a purgatione feriabatur, nonnunquam magnam aquarum vim per sedem excernebat, atque etiam sub finem per meatus urinarios, vel ad congii mensuram; quamlibet non ultra ʒiʒ. vel ʒi.ij. potus pro singulis diebus concederem: ita ut portæ omnes, atque canales undecunque patere viderentur. Secundo notatu dignum erat, quod curatione fere absoluta si quando vapores a catharticis commoti tumultuarentur, venter, maxime versus superiora, intumescere, tanquam novo aquarum proventu denuo repletus foret, quod tamen fieri non posse sciebam, cum ita parce bibisset; ac proinde tumorem illum a flatibus, quos peperit ἀπ᾽ αἵμα ista a catharticis provocata, tantum oriri: quod meum iudicium eventus comprobavit. Licet enim vel congium aquæ eo die quo purgabatur ejecisset, mox tamen cœpit intumescere, nec remittebat tumor ille, ad guttur usque assurgens, & dyspnœa affligens, donec corpus a purgantium molestia liberatum, statum naturalem ac quietem reciperet; quo facto & tumor & cætera symptomata derepente evanescere, donec a succedente catharsi de novo irritarentur.

Denique & hoc animadvertendum erat, quod cum præfata femina annum agens quinquagesimum quintum, fluxum menstruum jam ab annis aliquot non fuerat passa, attamen menses magno quasi flumine erumpebant denuo; qui sanguinis fluxus debilitati & evacuationibus prægressis additus ingens affectuum hystericorum agmen adducebat, dolorem scilicet in dorso & circa regionem splenis vehementem, cephalalgiam, & tussim ferinam. Adhuc tametsi post tam insignem aquarum quantitatem per os, sedem, & urinas eliminatam omnino credibile esset non multum in corpore restare, attamen venter haud minus protuberabat, quam nulla adhuc evacuatione tentata solebat. Quamobrem ad hos motus sedandos, qui etiam ad septimanam a postrema purgatione negotium facessabant, coactus sum ad quatuor noctes continuas *Diacodii* ʒiʒ. propinare; quæ etiam dosis erat repetenda, nisi somnus intra horas tres insequeretur. Quo tandem pacata sunt omnia, & tumor disparuit.

Hoc interim observari velim, quod si leviculo aliquo ventris tumore tentetur æger, non ita prompte educuntur aquæ per infusionem croci metallorum, ac in ascite grandiore, ubi ingens aquarum copia aggregata fuerit: etenim vel ipsa aquarum moles, dum emetici operatione agitur, ac concutitur, ad earundem evacuationem mire conferet: atque eam ob causam, nisi venter in tumorem insignem attollatur, omnino convenit, ut tota res evacuationibus per inferiora committatur.

Est aliud medicamentum satis vulgare ac simplex, quod hydropem pari ratione, qua illud, de quo modo egimus, expugnat: Nempe manipuli iij. *Corticis interioris Sambuci* a ligno derasi in lb. ij. aquæ & lactis simul mistorum, ad lb. i. incoquantur: Decocti huius altera medietas mane, altera sero quotidie assumatur, donec æger convalescat. Hoc remedium & vomitionem ciet & catharsin, pariter ac crocus metallorum; ac proinde eodem modo morbum depellit, non vi aliqua specifica: quocirca si neutram harum operationum præstet, vel si mediocriter ac parce, ne hilum prodest quidem: ubi vero alterutram producit efficaciter, maxime vero si utramque, mire ad hunc morbum debellandum confert.

At sane, quod serio animadvertendum est, haud raro accidit, ut aqua non solum in crura, ac tibiae deturbetur; sed etiam in ipsam abdominis cavitatem depluat, quæ tamen medicamentis catharticis, sive *αῖω* sive *κατῶ* ducentibus, omnino elicienda non est. Verbi gratia, quoties huiusmodi tumor vel phthisim diuturnam excipit, vel a viscerum alicujus labe ac putredine nascitur; vel a sanguinis tono, si ita loqui fas est, non tantum relaxato, sed & deperdito, ac spiritibus penitus exhaustis, vel a longa fistularum in partibus carnis mora, quæ copiosam saniem egresserant; vel a nimia debilitate, atque evacuatione tam humorum, quam spirituum, quas advocavit sive salivatio, sive sudatio, sive etiam purgatio justo intensior, & diata tenuis quæ in luis veneræ curatione, etiam magis quam res postulabat, fuerant adhibita. In his atque aliis morbis ad hunc modum factis, æger non tantum non juvabitur a catharsi, sed, imminuto adhuc amplius sanguinis tono, augebitur malum. Quamobrem rebus ita stantibus, omnis curationis cardo in sanguine, ac visceribus omni ope corroborandis, firmandisque omnino vertetur. Inter cetera huius ordinis, præter remedia confortativa infra enumeranda, ego certissimo experimento edoctus sum, aeris mutationem, & in aere libero exercitium, quale quale demum æger ferre potuerit, huic indicationi apprime respondisse; spiritibus sc. quasi nova vita hoc pacto afflatis, atque organis excretoriis ad pensum sibi debitum denuo revocatis.

Est etiam ubi absque omni istiusmodi προπάσει, intentioni isti quæ aquas evacuandas respicit, nec catharticis, nec emeticis satisfaciendum est: quoties enim vel æger constitutione est infirmiore, vel femina vaporibus, atque ataxiis spirituum animalium admodum obnoxia: fieri non potest, ut catharticis, & multo minus; ut emeticis res geratur. Hic itaque aquarum evacuatio *Diureticis* committenda est. E quorum familia, licet quamplurima in Medicorum scriptis magni sint nominis, efficacissima tamen (ne dicam sola) mihi videntur ea, quæ e *Salibus Lixivialibus* fiunt: neque quicquam refert, e quorum vegetabilium genere cineres petantur. Quandoquidem vero vix aliud vegetabile *Genista* sit parabilis, & in hoc morbo bene audiat, ego ut plurimum cinerum ejus lb. i. in vini *Rhenani* lb. iij. frigidi infundi jubeo, addendo foliorum *Absinthii vulgaris* pugillum unum, alterumve. Liquoris per filtrationem colati ʒ. iv. mane, hora quinta pomeridiana, & sero, ægro jugiter hauriendis impero, usque dum tumor evanuerit. Quo solo remedio hydropes pro deploratis habitos curatos vidi in iis, quorum crasis debilior purgantibus ferendis non fuit.

Aquis autem, (ut ad secundam intentionem properemus) quæ sunt proxima causa morbi, jam penitus evacuatis, non nisi ad dimidiam curationis partem ut plurimum perventum est, nisi sanguinis etiam debilitati, quæ prima morbi origo fuit, occurratur longo & assiduo medicamentorum *Calefacientium* & *Corroborantium* usu, unde novus aquarum proventus præcaveri possit. Quamvis enim in junioribus sæpe contingat, ut aquis rite expurgatis sine alio quovis præsidio convalescant, cum eorum calor naturalis jam ab aquarum onere ac pressura liberatus, dictorum remediorum vices supplere valeat; tamen in ætate provecioribus, aut iis, qui alias minus sano corporis habitu sunt præditi, omnino necesse est, ut statim ab aquarum educatione jam absoluta, ad eorum simplicium usum, quæ sanguinem excalefaciunt, invigorantque, protinus confugiant. Inter quæ ea, quæ ego jam superius in *Podagra* curanda laudavi, sive ipsa remedia spectent, sive *sex res non naturales*, præter illa, quæ jam dicentur, locum habere possint: (nisi quod *Vinum*, a quo in *podagra* prorsus est abstinendum, non tantum non noceat hydropicis, sed & prosit admodum, si pro potu ordinario usurpetur) Cum hi duo morbi id habeant commune, quod eadem remedia corroborantia utriusque causæ originali adveniant. Fatendum est interim, quod cum tam ex manifestis phænomenis, quam a juvantibus & lædentibus edocti simus tum hoc, tum alios plures morbos *Chronicos* sanguinis debilitati, atque *indigestioni* ortum debere, nec ulterius progredi valeamus, adhuc in extimo morborum cortice hæremus; nec in essentialibus eorumdem differentias, & específicas humorum depravationes ab istiusmodi indigestionibus prognatas, (quæ quidem *απὸ τῆς* communis omnium stirps est) quimus penetrare: Uti neque varias illas specificationes, quæ in morbis acutis ab una eademque causa, sanguinis nempe *inflammatione*, fluunt, ullatenus callemus. Quocir-

ca tam in his, quam in chronicis morbis, cum *Specificis* careamus, curationem non ad essentialiam morborum naturam, sed ad causam eorundem magis generalem dirigere cogimur; Curandi methodum subinde variantes, vel pro indicio naturæ spontaneo, quo in morborum eliminatione illa utitur; vel experientia, cui potissimum medicationis generi quilibet morbus facillime concedat, distantis, solum secuti.

Porro ad hanc, de qua jam agimus, intentionem implendam, nempe ut sanguis corroboretur, sive aquarum evacuatio per hoc diureticum, sive per catharsin, vel etiam vomitionem procuretur, ut supra, omnino necesse est, ut æger, quantum res ferat, *Vinum* potare teneatur, dum curando est, (modo ne prius incipiat *οἰσμός* seu, quam meatus quadantenus reclusi fuerint, & porta aquis data) vel saltem loco vini cerevisiam aliquam e generosioribus; cum liquores tenues ac refrigerantes quilibet, utut ægri palato arrideant, qui fere semper in hoc morbo siticulosus est, eum magis phlegmaticum reddant, & aquis obstetricentur: raro itaque, aut nunquam hi sunt concedendi. Atque e diverso liquores generosi, modo non sint spiritus per distillationem elicti, usque adeo sanitatem promoven, ut vel soli aliquando amissam revocaverint; utique in morbi initio, nondum multa aqua distento abdomine; præsertim si herbis calefacientibus, & confortantibus fuerint imprægnati. In pauperibus, verbi gratia, *Cerevisia fortis*, in qua quantitas sufficiens *Rad. Rapan. Rustic. fol. Absynth. vulgaris, Cochlear. hortens. Salvie, Centaurii minimi summitatum Genistæ* inclusa fuerit, meo consilio usurpata pro potu ordinario, sola fuit instar omnium. Pro ditioribus vinum Canarium eisdem herbis amaris potest similiter imprægnari, cujus haustulus bis terve de die inter medicamenta supra memorata deglutendus est. Vel si id palato minus allubescat, *Vinum Absynthites* vice ejus substituat, de quo æger sumere possit cochlearia ix. post *Electuarii Digestivi* (in *Tract. de Podagra* descript.) ʒij. horis medicinalibus, i. e. mane, quarta pomeridiana, & nocte, devorandas. *Electuarium* hoc huic intentioni faciendo satis, corroborantia quilibet medicamenta longo post se intervallo linquit alia. Hic vero magni momenti est, quod æger parce admodum bibat liquores istos, qui minus generosi sunt, quandoquidem omnes, qualescumque demum sint, aquis nonnihil incrementi dant, adeo ut vel omnimoda abstinentia a potu nonnullis inducatur: atque ob eam causam, si liquoribus istis quandoque indulgendum sit, æger tamen admodum parce eos bibat; Veruntamen cum sitis magna huic affectui se comitem adjungere soleat, quam insuper a potu tenuiori abstinentia adaugeat, e re erit, ut æger sæpiusculum aqua frigida *Spiritu Vitrioli* acidulata os colluat, aut *Tamarindos* in ore subinde teneat, aut *Limonem* manducet; neutrum vero deglutens præ eorum frigiditate quæ morbo minus convenit.

Verum inter *Corroborantia, Chalybs* in hydropis incipientis curatione haud infimum locum sibi vendicat, sanguinem videlicet invigorando, calefaciendoque. Quam ob causam & *Allium* hic adeo conducit, cum eo solo, missis evacuantibus, hydropem ex aliorum præscripto, non meo, depulsum noverim.

Est enim observandum, eum hydropem, qui vel pedes tantum inflavit, vel etiam ventrem, sed modice, non statim curationem per emetica & cathartica sibi deposcere; sed huiusmodi liquoribus præfatis calefacientibus & corroborantibus haud raro cedere. At vero præ ceteris serio animadvertendum est, quod quoties hunc morbum solis corroborantibus, vel etiam lixivialibus aggredimur, æger nullo modo expurgandus est, sive mitiori, sive fortiori quocumque pharmaco, tantisper dum sanguinis corroboracioni navatur opera: everter enim catharticum quicquid corroborans substruxerit; quod vel invitum agnoscat oportet, qui observaverit tumorem, qui ab usu corroborantium jam imminui ceperat, mox a purgatione augeri. Etenim tametsi cum intentioni isti aquas educendi satisfacere cupiamus, haud abs re fuerit, etiam corroborantia subinde exhibere; tamen cum tota res in isto solum cardine vertitur, ut sanguis corroboretur, omnino necesse est, ut a catharticis ablineamus.

Notandum est autem ægrum non semper sanari, quamvis utrique indicationi satisfecerimus, i. e. tum aquæ in abdomine congestæ omnino educatæ fuerint, tum etiam calefacientia & corroborantia postea ad præcavendum novum aquarum proventum fuerint exhibita. Etenim non raro contingit, ut *Ascites* ad multos annos perdurans, diuturna aquarum in viscera incubatione eorum substantiam perverterit, & quasi semicoxerit; & tam ipsa viscera quam partes vicinas corrumperit penitus, glandulas præternaturales & vesiculas sanie turgidas generans; & omnia intra abdominis cavitatem contenta in putrilagine quasi quandam convertens: prout in eorum cadaveribus, qui ab ascite inveterato sunt interempti, sectio patefecit. Morbus ad hunc gradum jam proventus, artis subsidia, quantum video, contemnit. Nihilominus Medici est, cum certo scire nequeat, quantum adhuc noxæ visceribus illatum fuerit, curationem omni ope moliri remediis tam evacuantibus quam corroborantibus: & neque animo ipsis cadere, neque ægro ut cadat author esse debet. Cui rei ob hanc potissimum causam danda est opera, quoniam in permultis affectibus, morbi fomite jam penitus exantlato, natura, quæ noctes atque dies nostris rebus invigilat, consulitque, sponte sua mirum in modum machinatur, quo ægrum a pernicioso morbi reliquiis munit ac tueatur. Quamobrem omnis ascites quantumlibet inveteratus, & quantumlibet funestam cladem visceribus intulerit, haud alio modo tractari potest, quam si nunc primum occæperit.

Topica sive remedia *Externa*, quantum ego observare potui, nihil egregium in hoc morbo præstiterunt unquam. Ea minus saltem nocuere, quæ in forma sive cataplasmatum, sive linimenti, abdomini ad tumorem discutendum fuerint applicata: Neque tamen video, quo pacto aquæ possint discuti. Verum & alia sunt a nonnullis remedium loco præscripta, quæ ita non profunt, ut etiam obsint plurimum: Huiusmodi sunt *Unguenta Cathartica* fortioribus confecta, atque abdomini adhibita; *Vesicatoria* item cruribus & ribis superimposita, ubi cutis in magnam molem fuerit protensa, ad aquas sc. hoc pacto educendas. Utrumque hoc genus medicationis est periculosum; cum a primo vis simplicium cathartica ita penitus nonnunquam musculis ac membranis impingatur, ut excitetur hypercatharsis, nulla remedium ope unquam sistenda. *Vesicatoria* autem locis prædictis, ab Empiricis applicari solita, calorem naturalem jam ferme aquis obrutum, deficientibus item spiritibus animalibus, omnino extin-

extinguunt, & *Gangrenam* (plus satis in hoc casu familiarem) sapen-
mero invitant. Etenim vulnus vel levissimum in hydropicorum car-
nibus, maxime in membro pendente, sanatu difficillimum est :
quoniam ipsa carniū substantia his in partibus usque adeo irrigua
est & scatens latice, ut data quacunque porta, continuo cursu pro-
rumpat humor, a quo vulneris conglutinatio impeditur. Neque aut
feliciori cum eventu, aut minore discrimine administrantur, me ju-
dice, sive *Paractensis*, sive *Acupunctura* a nonnullis celebrata,
quam vesicatoria.

Ut tandem finiam, quamvis hic morbus ubi jam in verum *Asci-*
ren evaserit, pro deplorato semper habitus fuerit; attamen constab-
bit, quod si dicto modo tractetur, æque certo potest subjugari (mo-
do viscera a corruptione sint libera) ac alii permulti, qui non ita
funesti vulgo æstimantur.

At si quis forte arguerit hæc remedia, utpote simplicissima &
plane inartificialia, ego potiori jure ejus nequitiam arguam & im-
probos mores; si dum fingatur alios hujusmodi simplicibus medi-
camentis juvari, se, uxorem, vel liberos suos, si quando agrotave-
rint, vel vilissimis ad sanitatem reduci exoptet. Adde, quod fucum
sibi facit Morio, *Equitans in arundine longa*: etenim artis medicæ
pompa & dignitas non tam in formularum concinnitate & elegan-
tia, quam in morborum curatione cernitur.

Atque hæc sunt, quæ de his duobus morbis dicenda habui: &
nisi fallor alios haud attingam unquam. Verum ista quod spectat,
quæ hæcenus in publicum dedi, si quis ea semel tantum perlegere
dignetur, est quod doleam, me huic eam perdendi temporis anxiā
præbuisse. Quod si eadem sæpius relegere voluerit, & alta mente
reponere, nullus dubito, quin eum fructum ex iis capiat, qui vo-
ro & magnis laboribus, quos ego in istis observationibus faciendis
componendisque locavi, aliquatenus respondeat. Quæ quidem quam
bona fide fuerint traditæ, haud aliter sciet, quam si in earum pra-
xi fuerit versatus, ac perinde in observando diligens ac curiosus ex-
plorator atque ego prius fueram. At si in paucis iis quæ scripsi,
naturam, me quasi manu ducentem, omnino secutus fuerim, nul-
lius unquam hominis, quantuscunque is demum sit, opinionibus
me addicens, pro certo habeo sapientes, quotquot sunt, veniam mi-
hi saltem duros, quos & latere non potest, duo esse hominum
genera, qui profectum omnem in arte medica ex æquo prohibent,
sufflamantque. Primum ii sunt, qui nullum prorsus symbolum
ad eam, quam profitentur, artem excolendam ipsi conferentes, il-
lis succensent, qui vel minimum conferre videantur: defectus inte-
rim suos atque socordiam, reverentiæ, quam antiquioribus, a qui-
bus ne latum unguem discedere audent, deberi contendunt, specie
prætexentes. Quorsum vero reliquas artes omnes, quæ homines mi-
nus tangunt juvantque, magna incrementa sumpsisse fateamur, etiam
sine ulla priscorum hominum injuria, solam autem medicam undi-
que perfectam existimemus? An non certioris istius quæ nunc obti-
net, navigandi artis repertoires, eum *Pyxidis Nauticæ* usum, qui
ita feliciter cessit, tentare potuerint, nisi primos ac rudiores illos,
qui non nisi ad stellarum conspectum, & littorum anfractus cur-
sum suum dirigebant, prius contempserint? Aut accuratior illa ac
magis perfecta, sive construendarum navium, sive earundem in pu-
gna regendarum, ars, qua hodie præ cæteris pollent Europæ magis
Occidentales incolæ, istos sugillat Naupegos, qui classes eas fabri-
cabant, quæ olim *Ætlii* depræliabantur? Aut *Augustum* & *Marcum*
Antonium, tanti belli duces & classium rectores, ignominia afficit?
Ad hæc innumera fere sunt exempla rerum a nuperis hominibus in-
ventarum, quæ antiquioris sæculi inventis longe antecellunt: qua-
rum omnium repertoires haud potiori jure priscorum memoriæ vim
inferre censendi sunt, quam is filius patris famam lædere putandus
est, qui rem familiarem a patre acceptam, industria ac solertia sua
auctiorem ac cumulatiorem reddiderit. Est & aliud hominum genus,
qui præ animi levitate, ingenii ac sapientiæ haud vulgaris ti-
tulum affectantes, *Speculationes* ad morborum curationem ne hilum
facientes, moleste ingerunt; Medici non tam viam præmonstran-
tes, quam ignibus suis fatuis devios in errorem agentes. His natu-
ra eum ingenii modum largita est, quo de illa doctæ nugari queant;
at prudentiam non dedit, qua intelligant se eam haud aliter scire
posse, nisi experientia indice, atque ejus peplum revelanti: quan-
do abjectior humanæ naturæ conditio ad scientiam *Intuitivam* nul-
latenus assurgens intra angustos cognitionis, quam a quinque sensi-
bus haurire potest, limites coarctetur. Unde nihilominus vir *Pru-*
dens, quantum fert fors humana, quis potest evadere; *Philosophus*
vero, saltem pro angustiori hujus nominis majestate, nemo mortali-
um evadet unquam. Medici autem *Philosophia* omnis in expiscan-
dis morborum historiis, iisque remediis adhibendis, quæ *experientia*
indice ac magistra, eosdem valent depellere, tota stat; observata
tamen, ut alibi dixi, medendi methodo, quam recta ratio (non
speculationum commentis, sed trito & naturali cogitandi modo in-
nixa) ei dictaverit.

Postscriptum.

Lector mihi veniam concedat, si unum haud parvi tam in di-
gnoscentis, quam curandis febribus momenti hic adjiciam, quod
nisi memoriæ mihi exciderat, loco magis suo dicendum fuerat. Ob-
servavi, quod singulis annis ab hyeme ingruenti usque ad ver adul-
tum, *Febris* quædam invadit, quæ tam quoad symptomata quam
curationem a *Stationaria*, sive febre epidemica constitutionis gene-
ralis, quæ tum obtinet, plane discrepat, proindeque in febrium,
quas *Intercurrentes* appello, classem recensenda est. Frigiditati aeris
una cum crassitie ac humiditate ejusdem illa originem suam debere
videtur: Hinc enim pori cutis occluduntur, & sanguis ob impedi-
tam transpirationem colluvie serosa oneratur, quæ tandem inimica
facta, ac diuturniore mora putrescens, facile a suscepto frigore, vel
a levi aliqua occasione febrem accendit. Si materia morborum com-
mittens copiosa admodum fuerit, ea febris emergit, quam sub ti-
tulo *Peripneumoniæ nothæ Libro de morbis Acutis Sectione sexta, Ca-*
pite quarto descripsi. Sin autem humor iste minus scateat, ea solum-
modo symptomata producit, quæ jam sum descripturus. Æger per
diem unum vel alterum post primum febris insultum nunc incale-
scit, nunc friget: de dolore capitis atque artuum cum inquietudine
quadam rotius corporis conqueritur: Lingua alba apparet: pulsus
sanorum pulsui non admodum absimilis: utina turbida est & inten-
se rubet: sanguis ei detractus pleuriticorum sanguinem æmulatur:
tussis ferme adest; sed respirationis difficultas, thoracis coarctatio
& dolor capitis inter tussendum quasi idem dissiliret, dictæ tussi,
(sicut in *Peripneumonia nothæ* solent) se non adjungunt, proinde-
que cum nothis insignioribus peripneumoniacis hæc febris haud sti-
puletur, licet a dicto morbo non nisi gradu diffideat, *Febrim Hy-*
emalem indigitare lubet.

Hic morbus, etsi primo ejus insultu symptomata solummodo a
frigore suscepto orta præ se ferat, si tamen male tractetur, lon-
gam ineluctabilem malorum catenam post se trahit, quæ tandem
mortem ipsam accersunt. Etenim cum æger lectulo incarceratus
fuerit, & cardiacis nescio quibus ad sudorem eliciendum, ac pro-
inde ad febrem solvendam (quod tamen raro perficitur) mulctatus,
delirium, lethargus, pulsus languidus & inordinatus, lingua arida,
maculæ rubentes, & quandoque ad livorem aliquantulum acceden-
tes sæpe sæpius hanc febrem comitantur. Hæc atque ejusmodi sym-
ptomata, etsi nonnullis pro *malignitate*, ut loqui amant, impo-
nant, revera tamen rei male gestæ sunt adscribenda. Cum enim
hæc febris suapte natura plus satis inflammatione polleat, sanguis
adhuc ulterius cardiacorum, & jugi lectuli usu incenditur: unde
spiritus in confusionem, ac motus inordinatos inconditosque adi-
guntur, atque materia morbifica in cerebrum impulsæ in pessum
ruunt omnia.

In hac febre pessenda hunc mihi scopum propono, ut exundan-
tem scilicet illam pituitæ colluviem ob hyemis analogiam conge-
llam venæ sectione revellam, & repetita catharsis subducam. Hæc
ut fiant, ubi primum accersor, sanguinem e brachio dextro ad \mathfrak{z} ix-
vel x. mitti jubeo. Die sequenti blandam illam potionem purgati-
vam, mihi in praxi familiarem exhibeo. Ut \mathfrak{z} l. *Thamarind.* \mathfrak{z} ss.
fol. Jennæ \mathfrak{z} ij. *rhæbarb.* \mathfrak{z} ij. *Coq. s. q. aq. ad* \mathfrak{z} iiij. *Colatura dissol-*
ve manne & syr. rosar. sol. an. \mathfrak{z} j. *m. s. f. potio, sumenda mane.*
Hanc potionem per duas alias vices repeto die uno inter singulas
purgationes interposito, modo symptomata omnia citius non dispa-
ruerint: Et noctibus insequentibus paregoricum ex syr. de meconio
 \mathfrak{z} j. propino. Diebus a purgatione vacuis, modo tussis adsit, *Deco-*
ctum Peccorale, & *Eclegma ex oleo amygdalarum dulcium, syr. Ca-*
pill. Veneris & violarum subinde assumenda præcipio. Atque ad ni-
mium sanguinis fervorem reprimendum, si febris magnopere æstuet,
Emulsionem ex seminibus frigidis præscribo; ut *Jalapium seq.* \mathfrak{z} l. *Aq.*
Nymph. Portulac. & lactuc. Portulac. & lactuc. an. \mathfrak{z} iiij. *syr. de Limon.*
 \mathfrak{z} l. *syr. viol.* \mathfrak{z} j. *M. f. Julap. de quo bibat ad libitum.* Interim ut æger
a lecto interdum sibi temperet, injungo, ut & a carnis esu: post pri-
mam vero, vel secundam purgationem haustulum jusculi tenuis ex
pullo gallinaceo facti subinde assumendum concedo. Verum hoc
notaandum, si symptomata quævis graviora, ut respirationis diffi-
cultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, malum hoc ad pe-
ripneumoniam notham propius accedere indiget, hoc in casu tam
venæ sectio, quam catharsis eousque debitis intervallis sunt iteran-
dæ, donec symptomata omnia penitus evanuerint, & æger eo mo-
do quem capite dicto descripsimus, sedulo tractandus. At non nisi
perquam raro febris, de qua jam agimus, ad eam sævitiam assur-
git, ut post unicam phlebotomiam, & tres purgationes pluribus
evacuationibus indigeat.

Sed de hoc satis, quod tamen mihi neutiquam reticendum vide-
batur, quo minus errante diagnosi febris hæc *hyemalis* pro *Statio-*
naria, sive febre epidemica generalis cujusvis constitutionis habeat-
ur, cum ingentem hominum vim ob hanc rem vel neglectam,
vel ignoratam periisse certo sciam.

III

S C H E D U L A M O N I T O R I A
D E
N O V Æ F E B R I S I N G R E S S U
P E R

T H O M A M S Y D E N H A M , M . D .

A C C E D U N T E J U S D E M
D E F E B R E P U T R I D A V A R I O L I S
confluentibus superveniente ,

E T

D E M I C T U S A N G U I N E O
a Calculo renibus impacto

D I S S E R T A T I O N E S .

V I R O

Tam Virtute, quam Eruditione undique consummato.

C A R O L O G O O D A L L , M D .

Coll. Med. Lond. Soc.



Um ea, quæ de Febre presenti hujusce Constitutionis super observaram, in publicum edere statuerem, Tibi, præ cæteris, Vir Ornatissime, opellam hanc meam dicendam esse censui; idque ob duas potissimum rationes mihi faciendum videbatur. Primum quod cum amicissimus mihi sis, comes indivulsus lateri semper hæstisti, meque tuo jurasti patrocinio contra omnes quotquot se mihi uspiam objecerant. Quod non tam mei ipsius gratia præstabas, quam ex incocto generoso pectori honesto, hoc est, ex magno proboque animo, qui tibi Author fuit, ut veritate a te cognita compertæque assentiri haud dubitares, etiam cum omnes fere omnium, qui rem Medicam tractabant, linguæ in me unum exaceruerentur. Quibus tamen non est quod irascar, (nec irascor sane) quandoquidem cum tot nequam Medicastri cerebrosa sua somnia & figmenta vendicantes, quo famam suilatiùs spargerent, toties mundo imposuerint, fas omnino erat, ut Viri ingenio & judicio præditi, non statim & sine examine ea admitterent, quæ ego jam recepto Praxeos mori plurimum adversantia in medium protuleram. Quo non obstante cum nihilo tibi minus debeam, mearum partium esse duxi, gratum animi mei in te affectum omnibus testatum facere; quando vix alia virtus naturam humanam ad profectus ultimas metas evectam, hac deceat magis. Nam sicuti Reges eos quibus favent, titulis & honorum insignibus illustrare, atque aliis spectabiliores reddere satagunt; ita natura quoties hunc vel illum humili turba ac grege hominum eximere voluerit, gratitudinem, seu excelsioris genii notam ac characterem solet imprimere. Altera Ratio cur hæc tibi potissimum inscribam, hæc est: quod sc. pro familiari illa & quasi quotidiana consuetudine, quam jam per multos annos invicem habuimus, Tibi in primis, plusquam cuiquam mortalium, notum esse oporteat, quanto cum labore Notitias illas, quantulascunque, tam Historiæ quam curationis morborum, de quibus palam disse-ruim, indeptus fuerim. Quæ omnia non simul & semel evulgavi, sed interposito annorum aliquot intervallo, prout in aliqualem earundem cognitionem pervenire tandem potuerim. Istas vero Observationes meas ita mancas & imperfectas esse judico, ut me magis earum pudeat, quam ut ullam exinde laudem mihi queram. Utut se res habent, illud saltem in mei excusationem potest adferri, quod licet 30. annorum, & quod excurrit, spatium, quibus ego non indiligenter in morborum observatione versabar, sufficere posse videatur ad majorem, quam in eorum cognitione ego feci, profectum faciendum; attamen haud temere affirmo, quod licet hoc temporis spatium plus quam sufficiat ad cerebrum Theorematis & Commentis fictitiis, ex Authorum libris collectis, (quæ omnia non magis ad morborum curationem faciunt, quam pingendi Ars ad Artem navigandi) plane obruendum, attamen ne quadruplicatus quidem horum annorum numerus, etiam in homine occupationibus medicis distractissimo, satis erit ad eundem in omni Medice Artis, quaquaparet, circuitu rite perficiendum. Ego saltem pro meo modulo omnem quam potui operam istuc contuli, ut Observationes quam accuratissimas colligerem, quas sine mora prælo mandandas curavi, ut si quid utile haberent, id statim Publico cederet. Quam in re cum meo munere, pro virili, defunctus jam mihi videar, acquiescit animus meus, nihil porro sollicitus, quo in loco ab aliis habeantur mea scripta. Hoc tantum addo, quod sicuti si quis ea neglexerit, mihi nihilum nocuerit; ita qui semel tantum perlegerit, haud multum exinde proficiet. Sed ut hæc missa faciam, obsecro te, Humanissime Vir, ut Tractatulum hunc æqui bonique consulas, quo testatum esse volui, quanto te honore prosequor; quod pariter faciunt etiam ii omnes, quibus longe minus quam mihi perspecta est virtus tua. Neque jure merito existimare quis potest, me qui tui nullatenus indigeo, tibi assentari, cum palam profitear; Quod sicuti in ea quam exerces Arte, nemini secundus sis (ut modeste loquar,) ita morum integritate, honestateque undique absolutissima, omnes fere, quorum ego consuetudine unquam usus fuerim, superes. Diu vivas post mea fata, & in Jatrice palmam feras; non tam ad nummos posterorum usui corradendos (quæ quidem ratio, si cum sequente conferatur, animam fere brutorum redolet) quam ut seculo tandem aliquando detegas, quibus modis ista in morbis persanandis difficultates, sub quibus Ars Medica hætenus gemit & succumbit, vinci queant. Quod dum moliris, istis quæ ego primis jeci lamentis, si modo liber, possis su-

perstruere. Ita tamen, ut errata in quæ ego forte inciderim, pro more humano, in meis Observationibus siue Historiam, siue Curationem hujus illiusve morbi attinentibus, ubi ab annosa & repetita experientia melius fueris edoctus, libere ac palam arguas. Neque hoc pacto defuncti ejus memoriam lades, qui in vita cum esset, nihil prius habuit, quam ut Ars Medica a quocunque ædum promoveretur, non tameruditis de morborum natura commentationibus, (quibus ad nauseam & fastidium usque jandiu explemur) quam certa fidaque eorundem curandorum Methodo. Vale Vir Optime, & amare perge

Tibi semper addictissimum

THOM. SIDENHAM.

Excellenti & in re Medica Admirabili Viro

D. THOMÆ SIDENHAM, M. D.

O Qui capacem nobilis artifex
Eludis Orcum, quo tamen ibimus
Cuncti, quot humane Parentes
Et decimæ tulit ordo Lunæ;
Præsens fugacem sistere Spiritum,
Præsens maligno tollere de toro
Mortale Corpus, & propinquum
Exequiis remove Morbum.
Quem Nos honorem, quas statuas Tibi
Ponemus, O qui non alium parem
In arte Phœbus, se remoto,
Aut oriens videt aut recumbens?
Quo Febris audax cumque movet pedem,
Te Mater omnis, Te lacrymabilis
Accurrit Uxor, ne caducum
Orba virum puerosque ploret:
Seu Confluentes forte timet notas
Decora Virgo; Tu faciem eripis
Periclitantem protegisque
Perniciem juvenum futuram.
Atqui odit artes & Tua pocula
Hæres profusus, quem simul extulit
Ad spem implicatus vel Febrili
Igne Pater, vel Hydropis Undæ.
Mire paratam, Te Medico, Senex
Protelat Urnam, non sine gloria
Phœbi Tuæque, qui fugasti
Pollicitum sibi magna morbum,
Sic Te scientem non faciunt Libri
Et Dogma pulchrum; sed Sapientia
Enata rebus, mensque facti
Experiens, animusque felix.
Non Mille Plantæ & multa domi Vitæ,
Ignesque Centum aut Hypothesis placent
Prosunt Medenti vel coercent
Sæva Luis mala, sæva Febris;
Ni pectus adsit consilii potens;
Ni plena rugis Experientia
Ususque naturam secutus,
Quid faceret moneant in aurem.
Hæc Praxis olim grande decus Sacre
Adduxit Arti; Sic Veterum stetit
Secura fama; sic prævit
Hippocrates, meruitque Cælum.
At non eandem sorte pari viam
Pressit Galenus; Non Arabes Virum
Æque secuti; non Falerna
Usque madens Paracelsus urva.
Primus relicte Tu genium asseris
Fidemque normæ. En Diva Tibi Salus
Applaudit & ridens Juventus,
Vitaque non metuens Sepulchri,
Ex quo vagantem scripta manu Tua
Correxit Orbem Pagina nobilis:
Longum illa Morbosus, Tibique
Perpetuum patefecit ævum.
Jam si quæ restant, Eja frequentibus
Concede votis; Nos Juvenissimum

*Vulgus Medentum, Nos avata
Qualibet excipiemus aure.
Forte & futuro tempore quispiam
Poeta, Musis charior, atheri
Te sidus addet, Te salubre
Sidus, & in Crisibus benignum,
Me destinantem talia Chymica
Cura reposcunt: Me Medicus labor
Et Spes locata non vacare
Pieris patiuntur undis.*

ED. HANNES.
Ex Aede Christi, OX.

SCHEDULA MONITORIA

DE NOVÆ FEBRIS INGRESSU.

Tamet si ingravescent jam ætas, & a diuturnis morbis pene confecta, missionem a cogitandi penso, meditationeque intensiori vel eo nomine sibi jure postulare videatur; attamen non mihi tempero, quin vel propriæ sanitatis dispendio, alienam curare satagam: populares scilicet meos admonere de subingressu novæ cuiusdam constitutionis, a qua pendet febris nova species a nuper grassantibus multum abludens.

Memoria recolendum est, quod in autumnno, Anno 1677. febres intermittentes se primum exerebant, quæ quotannis increbrescentes, & επιδημικότεραι factæ, donec ad suum statum sive *anulū* pervenerint, postmodum sensim decredebant, & postremis hujus constitutionis annis ita raræ apparebant, ut pro morbo epidemico vix, ac ne vix quidem haberi potuerint. Qua de re pariter animadvertendum est, posteriores duos constitutionis jam exeuntis annos hyeme rigidissima fuisse infestatos; penultimum maxime, nempe annum 1683. in quo ita enormi bruma intemperies desavebat, ut nemo quisquam vivitum illi parem, vel intensissimo eo frigoris gradu, vel prælongo temporis tractu, viderit unquam. Quippe quo Thamesis, nobilis fluvius, ita prævalido gelu compaginabatur, ut currum circumcursantium rotas, officinas ad platearum modum mercibus refertas, ac numerosissimam hominum frequentiam, solidi instar pavimenti, facile sustentaret. Subsequens annus 1684. licet nec intenso frigoris gradu, nec pervicaci duratione, præcedentem exæquaret, non tamen multum ei utrobique cessit. At cum primum exolveretur gelu anno 1685. mense Februario, exorta est febris ista, de qua jam agere institui; quam quidem ego novam febri speciem esse arbitror, atque febri, quæ per octennium ultimo prægressum invaluit, esse prorsus dissimilem.

An hujusce constitutionis mutatio mutationi manifestarum aeris qualitatū, quæ per binas has hyemes successit, tribuenda sit, ego non satis scio; cum pro comperto habeam alterationes quoad sensibiles annorum qualitates, utrinque dispares, morborum epidemiorum species non protulisse; & certam annorum seriem, quantumlibet annus unus ab alio, externa facie & temperamento discrepaverit, nihilominus omnes in eadem febrium stationariorum specie producenda convenisse. Quod cum serio animadverterim, opinari mihi subiit, prout a me alias dictum fuit, constitutionis mutationem a secreta aliqua abditaque alteratione in terræ visceribus atmosphæram omnem pervadente, vel a corporum cœlestium influxu aliquo maxime pendere. Tamen hic est notandum, quod valedicente nobis olim febre depuratoria, siccissimum ac vehemens gelu ab initio hyemis 1664. omnia constrinxerat, nec quicquam remisit, donec mensis Martius adoleret; quo quidem tempore, quamprimum fatisciente gelu terra solveretur, mox febris pestilentialis, postmodum ipsa pestis grassari cœperunt. Utut vero hoc se habeat, febris, quam nunc tractamus, jam dicto tempore primum se ostendit, nempe Februario mense 1684. & tam præcedente anno, quam eo, qui jam agitur, per omnes Angliæ regiones latius vagata est; longe magis & επιδημικότερος aliis in locis, quam hic Londini desavens.

Ubi primum ad hanc febrem vocarer, omnino existimabam, illam non ex eo genere febrium fuisse, quas ego stationarias appello; sed potius ex intercurrentium familia, quæ singulis fere annis promiscue adoriuntur. Non aliud sc. morbi genus esse rebar quam peripneumoniam illam notham, quam Libro de Morbis Acutis olim delineaveram. Una hac intercedente discriminis nota, quod in hac febre subinde non comparebant symptomata in peripneumonia magis pathognomonica, qualia sunt tussis vehementior, cephalalgia inter tussendum sævissima, & quasi caput distringens, vertigo a motu quolibet, & dyspnœa ingens, quæ omnia peripneumoniam notham fere comitabantur. Cum itaque Librarius novam Tractatum meorum editionem eo tempore sollicitaret, visum est conjecturam tunc meam, in qua me hallucinatum fuisse, jam sentio, in forma postscripti publico dare, in quem quidem errorem me induxit ingens consensus, quo febris hæc cum dicta illa peripneumonica luculenter conveniebat: quæ nulla non hyeme subinde occurrit. At cum æstate superveniente, quæ febres illas peripneumonias solebat fugare, hæc nihilominus perseveraret, statim erroris mei communitus, febrem hanc ad novam constitutionem redigendam omnino censui.

Symptomata diligenti quantum potui indagine comprehensa, hæc fere sunt, & olim fuere: æger per vices calore & frigore tantatur; sæpenumero & caput, & artus dolorem queritur; pulsus sanorum pulsui non absimilis est; sanguis e venis educus pleuriticorum sanguinem haud raro æmulatur; æger ut plurimum laborat tussi, quæ quidem quanto ab hyeme longius invadit morbus, tanto citius, una cum aliis symptomatibus peripneumoniam mitem & boni moris comitantibus, recedit. Dolor collum, & fauces (hic vero levior quam in angina) sub primum morbi insultum quandoque occupat. Febris tametsi prorsus continua sit, sæpe tamen exacerbationes molestissimas ingruente nocte apportat, non aliter ac si duplex foret tertiana, sive quotidiana. Æger jugem in lecto decubitu quantumlibet levissime stragulis coopertus sit, non sine magno suo periculo experitur; febre enim exinde in cerebrum versa vel in comam, vel in phrenesin facile incidit. Et, ut verum fatear, ita proclivis est in hoc morbo ad phrenesin lapsus, ut persæpe sua sponte, nulla ejusmodi data ansa, illico subrepat. At non eo exandescentiæ & furoris ascendit phrenitis in hac febre, atque illa, qua variolis atque aliis

febris correpti laborant; quinimo æger potius tranquille delirat, incongrua subinde effutens. Ab intempestivo cardiacorum usu, & regimine paulo calidiori petechiæ sæpius efflorescunt, & in junioribus calido temperamento præditis, maculæ etiam purpureæ, certissimum summi inflammationis indicium, tam in hoc, quam in alio quovis morborum acutorum genere. Quandoque eruptiones miliares, quas vocant, in superficiem corporis se dispergunt, morbillis haud multum absimiles, nisi quod rubent magis, & quando recedunt, squamulas istas furfuraceas, quæ in morbillis cernuntur, haud relinquant: licet hæc sponte sua nonnunquam ingruant, sæpius tamen lecti calore & cardiacis extorquentur. Lingua ægri pro ratione imperati regiminis, vel humida est, vel sicca. Ubi inaruerit, fusci est coloris in medio; quam partem undique cingit fimbria inalbescens. Ubi vero humida est lingua, omni ex parte alba est, pellicula item scabra & alba vestita. Nam si æger ab adhibito regimine plus justo incalescat, lingua fere est fusca & arida; sin minus, humida est, & alba. Idem de sudore dicendum est, qui pro ratione diversi regiminis præfati dimanat. Nam si calidius tractetur æger, ferme viscosus effluit, e capitis præsertim regione. Quantumvis autem sudor copiose, & undequaque erumpat, parum tamen ex eo levaminis sentit æger; unde liquet ejusmodi sudores symptomaticos tantum esse, criticos non esse. Primis morbi diebus sudoris ex arte provocatio, materiam morbificam si non in caput, saltem in artus solebat deponere. At ubi jam caput febris occupavit, & phrenesis seniel invaluit, nulla restant febri indicia, nisi quod pulsus nunc citatior est, nunc tardior; tandem vero, cum ex re male gesta spiritus in confusionem omnimodam adigantur, pulsus inordinatus cum subsultu membrorum subingredietur, quem non ita diu post mors excipit.

Curacionem quod spectat, ista peripneumoniarum signa quæ hanc febrem comitabantur Februario illo anni postremi, quo primum emergebat, statim ab hyemis exitu fidem, ut dixi, mihi fecere, eam prorsus in peripneumonicarum familia censendam esse. Ac proinde me statim contuli ad usum methodi istius, quam olim laudaveram in curacione peripneumoniarum nothar, & austario supra memorato. Quæ quidem methodus satis feliciter cessit, tum mihi, in paucis illis, quibus medicandis per adversam valetudinem meam vix sufficiebam, tum etiam aliis, qui, me authore, eandem experiri haud aspernabantur. Quicquid vero id demum fuerit, quod hanc mihi methodum suaderet, jam mihi satis compertum est, quando & morbi phænomena, & ultimi anni qui binas rigidissimas hyemes excepit, perpendo temperiem (hyeme præsertim, si modo hyems dici possit, quæ nullum frigus notabile secum adduxit) mihi, inquam, constat, hanc febrem nihil esse aliud, quam simplicem sanguinis inflammationem; ac proinde indicationes curativas ad dictam inflammationem debitæ remediis & methodo reprimendam, omnino dirigendas esse.

Hunc itaque ductum sequens, primo loco sanguinem e brachio dextero ad 3x. educi volo. Neque sane febris hæc (utut sanguis emissus pleuriticorum sæpissime sanguinem æmulatur) reiteratam phlebotomiam facile tolerat. Sin autem respirationis difficultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, &c. malum hoc ad peripneumoniam notham propius accedere indigent; hoc in casu tam venæ sectio, quam catharsis eousque sunt iterandæ, donec symptomata omnia penitus evanuerint; prout Capite de Peripneumonia tradidi. Atque hoc diligenter animadvertendum volo. Vesperis *E-pispasticum* seu vesicatorium nuchæ appono. Sequentæ aurora, lenitivam hanc potiorē exhibeo.

2℥. Tamarind. 3℔.

Fol. jenn. 3ij.

Rhabarb. 3℔.

Coq. s. q. aq. ad 3ij.

in Colat. dissolv. Mann. & syr. Rosar. solutiv. an. 3j. Mf. F. Potio, sumenda summo mane.

Quod quidem catharticum etiam alternis diebus repetendum præscribo, donec tertiam vicem expleverit. Hora somni post catharsin toties, quoties paregoricum hoc vel simile injungo.

2℥. Aq. Paralyseos 3ij.

Syr. de Meconio 3j.

Succi Limon. recent. extracti coh. ij.

Mf. F. Haustus.

Id scil. caveas, ne forte ab agitatione & tumultu, quem in febricitantium sanguine & humoribus purgantia sæpe excitant, æger ex spirituum animalium confusione, comatosus fiat. Quod quidem symptoma medicamentum hypnoticum, quantumlibet contra facere videatur, procul amolitur. Qua de causa ego in febre comatosa anni 1673. catharticum propinare non ausus, in clysterum usu subsistebam, certo sciens remedia purgantia eo tempore usurpata, illico comata adduxisse. Quod fortean aliter evenire potuisset, si paregoricum usurpatum fuisse post talem catharsin mihi in mentem venisset. Ubi vero purgatio celebrata non fuerit, hypnoticum hora somni nullatenus est concedendum; ne scil. cathartici postmodum deglutendi operationem ac vim (quod fieri solet quantumvis sero assumatur illud) sufflammet, vel si non insolidum retundat, efficaciam tamen imminuat. In hac aut alia quavis febre epidemica, statutum mihi est alvum non turbare in principio statuve morbi, nisi venæ sectione præmissa. Quæ quidem praxeos regula susque deque habita aut violata quam plurimos orco addixit, infantes maxime, prout alias in cautelam monui.

Observandum est autem, quod licet ut plurimum evacuationes omnes præfate in hujus febri curacione usurpari debeant; sæpe tamen æger, maxime si juvenis aut infans fuerit, posteductum sanguinem una catharsi defuisset, statim convalescit, nec pluribus satigandus est, febre primo purgantis remedii impetu expugnata. E contra vero nonnunquam opus est ut alvus ad plures, quam supra diximus, vices sollicitetur. Quandoque enim, licet id raro eveniat, agro e febre jam dicta methodo liberato, recrudescencia materiæ febrilis post dies aliquot morbum postliminio reducere videtur, quem tamen purgatio quarta vice repetita mox eliminat. Tamen in hac methodo nova hæc febris raro accidit nisi ab aphthis quæ sub exitu febri præcedenti supervenere, & quæ jam ad statum auctæ eam denuo revocant. Quæ quidem febris symptomatica tantum est, & singultum per intervalla redeuntem sæpenumero post se trahit, qui etiam sublata febre per dies aliquot perseverat; at pro ratione redintegratarum ægri virium sponte tandem evanescit. Quod est diligenter animad-

vertendum, quandoquidem ex singultu sub finem hujusce febris accedente nihil ægro periculi est, nisi officiose nimis & inutiliter multa ingerantur remedia: quod si fiat, mors pro Medico est. Veruntamen tam apthæ quam singultus, vel horum utervis, si non sponte facessat, sed in longum tempus decurrat, facile fugantur usu *Pul. Corticis Peruviani*; nempe $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Corticis cum syr. Papaver. Rhæad. q. f.* in forma electuarii, vel pilularum redacta, eaque methodo assumpta, quam olim tradebam epistola ad D. D. Brady, superbibendo haustum lactis deslorati. Quod remedii genus experimento deprehendi certius in hoc casu scopum attingere, quam aliud quodvis etiam e celebratissimis; modo non frustrentur ejus vires (quod fieri assolet) ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus a purgatione liberis sequentia vel his similia nonnunquam præferibo.

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Conserv. Lujulæ & Cynosbati an. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.*

Conserv. Berberum. \mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}.

Cremoris Tartar. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.

Cum f. q. syr. e Limonibus F. Electuarium, de quo capiat ad magnitud. Nucis Moschat. ter in die superbibendo seq. Julap. cochl. vj.

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Aq. Portulac. Lactuc. Paralyf. un. \mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}.*

Syr. de Limon. \mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}.

Syr. Violar. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.

Mf. F. Julapium. vel:

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Aq. Font. \mathfrak{lb}\mathfrak{j}. *Aq. Rosarum. Succ. Limon. Sachar. albiss. an. \mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}.**

*Coq. lento igne dum despumaverint cap. \mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}. *ad libitum.**

Verum in his omnibus spiritum vitrioli, etsi summe refrigerantem, semper devito, utpote qui, cum egregie stypticus sit, minus convenit morbis omnibus, quorum curatio purgationi innititur; ut in hoc loco mineralem hujus spiritus naturam haud memorem.

Sæpenumero hic accidit, maxime febre jam ad finem vergente, ut æger dum hac methodo tractatur, nocte subinde sudore sponte prorumpente diffuat: a quoadmodum mitigantur universa morbi symptomata. Quo non obstante, cum hujusmodi diaphoresi fidendum non sit, supra dicta methodus nullo pacto est intermittenda, quandoquidem si æger ad longius temporis spatium istis sudoribus indulgeat, febris, quam purgationes præcedentes quadantenus subjugaverunt, de novo vires resumet. Si enim diaphoresis ista protrahatur ultra tempus illud quo particulæ febriles coctione debita præparatæ prorsus diffantur, qui post insequuntur sudores, non ad aliud faciunt quam ad inflammationem de novo accendendam. Quamobrem licet sudores isti qui sponte manabant, critici fortasse fuerint, quoad materiæ febrilis ejus quæ expulsionem jam parata est, eliminationem, alii tamen qui post illos eliciunt, symptomatice tantum esse possunt, atque adeo officere magis, quam prodesse. Verbo dicam: Hujusmodi sudoribus noctu sponte sua prodeuntibus, opportune favet lecti per noctem lenis calor; quare stragula nec plura, nec densiora illis quibus sanus assueverat, ægro aggerantur; nec exhibeantur medicamenta quævis excalescentia: lectulo tantum indulgeat æger aliquantulum solito diutius mane subsequente: & postea pergat in supra descripta medendi methodo.

Diæta ex pulticula avenacea est, vel jusculo hordeaceo, cum pomo subinde ad ignem cocto, atque etiam post secundam purgationem jusculo tenui ex pullo gallinaceo. Pro potu ordinario cerevisiam tenuem nullatenus tepesactam injungo, ut & decoctum album (quod appellant) ex $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. C. C. ubi in aq. communis $\mathfrak{lb}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$. cocti, & postea sacchar. albiss. edulcoratum.

Post catharsin bis celebratam nulla suadet necessitas, ut alio loco adnotavi, pullorum carnibus aut similibus eupeptis ægro interdicerem, cum hæc per purgationem medicatio ea indulgeat, quæ non poterant concedi, si alii viæ insisteretur. Atque porro post ultimam purgationem modo febris aliquantulum deslaverit, & intermittens typum nondum prorsus induerit, Vini Canarini cochl. tria vel quatuor mane & sero, ut & post prandium, per dies aliquot propinentur, quo & vires citius instaurentur, & febriles avertantur accessus.

Cum autem hæc febris species præ cæteris, quas mihi unquam videre contigit, cerebrum petere quasi apta nata sit, nec sine ingenti tum molimine, tum ægri periculo, inde queat deturbari; ægros meos sollicito moneo, ne se nudos lectulo, nisi noctu tantum committant: quod si usque adeo debilitati a morbo fuerint, ut erecto corpore sedere nequeant, permitto ut vel super lectum ipsum, vel super grabatum, vestiti jaceant, capite paululum elevato; nec sino ut focus sit luculentior in cubiculo, quam cui æger tunc cum sanus erat, assueverat.

Atque ut hoc regimen omnino tenendum est ab initio in singulis hac febre correptis (si feminas, in primis puerperii diebus decumbentes excipias) ita necessario est imperandum, ubi ad ægrum quem ob regimen iusto calidius, phrenesis, petechiæ, aut purpureæ maculæ obfederunt, aut alia quævis efflata inflammationis indicia, accersitur Medicus. Hoc enim in statu, quantumlibet sanguinis detrahatur, quantumvis leviter tegatur corpus, quicumque denum liquores refrigerantes ingerantur, non prius sedabitur febris, quam æger se lectulo interdiu abstinuerit: cum calor circumambientis aeris inter stragula conclusi, sanguinem plus satis exagitet, & procumbentis corporis situs vehementiori impetu eundem in caput impingat. At hic ubi phrenesis ob methodum imperitiorem semel invaluit, nec subito deleri potest, nec tutum est repetita ultra limites præscriptos vel phlebotomia vel purgatione, ejusdem curationem aggredi, tandem vero suo tempore suæque sponte, ope dicti regiminis recedet. Ad quam tamen amovendam nihil perinde confert, atque ægri caput radi: quod itaque semper præcipio, nullum emplastrum admovent, sed pileolum tantum quod ablatum rasura capillitium spissitudine quadantenus compenset, aut saltem caput a frigore externo muniat. Hac methodo cerebrum refrigeratur admodum, & recreatur, ita ut sensim calidas impressiones phrenesin excitantes queat vincere.

Et quæ de phrenitide hic dicuntur, de comate etiam huic febri supervenienti dicta sunt, in quo ut in dicta phrenitide materia febrilis in caput sursum fertur, ac proinde si linguæ albedinem excipias, nulla adunt febris signa, at æger apyrexia prorsus frui videtur. In hoc pariter affectu ac in alio, cathartica, sudorifica, vesti-

Sydenham Opera Medica.

catoria atque id genus alia non tantum nullo cum fructu, sed ne quidem sine maximo periculo usurpantur; istiusmodi enim evacuationes mortem sapius quam symptomatis hujus curationem adsciscunt. Quamobrem post evacuationes generales per venæ sectionem & purgationem factas, quantumlibet hoc symptoma astantes perterrefaciat, tota res naturæ & tempori committenda est, licet enim stupore æger diu laborarit, post aliquam multos tamen dies pristinam sanitatem recuperabit, modo lecto non perpetim affigatur, sed de eo eximatur in dies, & supra grabatum vel etiam lectum vestitus decumbat. Interim autem abradatur caput, & sub affectus finem vini Canarini cochl. tria vel quatuor bis in die exhibeantur. Sed de hoc fulius egi in *Sectione quinta & capite secundo, lib. de Morbis Acutis*, ubi de comate quodam insigni febrem constitutionis illius comitante, disserui.

Quoad febrem autem haud deterrendus est Medicus a faciendis prædictis evacuationibus, si forte membrorum subsultum vel motum convulsivum in ægri corpore persentiscat, dum pulsus tangitur; quandoquidem in quibusdam generis nervosi affectibus tam venæ sectio quam purgatio, etiam sapius repetita non tantum non nocent, sed & necessario sunt adhibendæ. Cujus rei experimentum a me factum in medium profero, nempe in quadam convulsione specie, quæ *Chorea Sancti Viti* vulgo appellatur; quo morbo haud pauciores quinque laborantes & vidi, & sanavi ipsemet, & venæ sectionibus & purgationibus, per intervalla celebratis. De quo morbi genere cum & mihi opportune occurrat, & eorum quæ jam assero, veritati luculenter altipuletur, pauca dicere non gravabor. *Chorea Sancti Viti* convulsione est species, quæ ut plurimum pueros puellave a decimo ætatis anno, ad pubertatem usque invadit; primo se prodit claudicatione quadam vel potius instabilitate alterutris cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; postea in manu ejusdem lateris cernitur, quam hoc morbo affectus; vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nullo pacto potest continere in eodem situ vel horæ momento, sed in alium situm, aliumque locum convulsione quadam distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Si vas aliquod potu repletum in manus porrigatur, antequam illud ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar exhibebit; cum enim poculum recta linea ori admove nequeat, deducta a spasmo manu, huc illuc aliquandiu verset, donec tandem forte fortuna illud labris propius opponens, liquorem derepente in os injicit, atque avidè haurit, tanquam misellus id tantum ageret, ut dedita opera spectantibus risum moveret. Cum affectus iste ab humore aliquo in nervos irruente, quorum irritatione istiusmodi motus præternaturales producuntur, pendere mihi videretur; indicationes curativas primum ad humores illos tam venæ sectione, quam purgatione minuendos, dein ad corroborandum genus nervosum omnino dirigendas censebam. Quem in finem hac utor methodo. Sanguinem ex ægri brachio ad $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$. plus vel minus pro ratione ætatis, educi jubeo. Die sequenti vel dimidiam partem, vel quiddam amplius (pro ratione vel ætatis, vel etiam majoris minorisve corporis ad subeundam catharsin aptitudine) potionis purgantis communis supra descriptæ ex *Tamarind. Fol. Senn. &c.* exhibeo. Vesperis haustum seq. propino.

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Aq. Cerasor. Nigr. \mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}.*

Aq. Epilept. Langii. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.

Theriac. Androm. vel. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.

Laudani liquid. gutt. viij.

F. Haust.

Potionem istam cathartica ad tres vices alternis diebus repetendam præscribo, & haustum paregoricum iisdem noctibus. Postea sanguinem rursus extrahi curo, dein ut ad catharsin, uti prius, æger revertatur. Atque ita alternatim sanguinem mitto, & subduco album, donec ægro vena ter quaterve fuerit incisa, & post singulas venæ sectiones, toties fuerit purgatus, quoties vires ferre posse viderentur: eo tamen temporis spatii inter alternas evacuationes diligenter observato, ut nihil inde periculi ægro imminet. Diebus a purgatione vacuis sequentia præscribo.

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Conserv. Absynth. Rom. & flavedinis Aurantiorum an. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.*

Conserv. Anthos. \mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}.

Theriac. Androm. veteris, & Nuc. Moschat. condit. an. \mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}.

Zinzib. condit. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.

Syr. e succ. Citri q. f. f. Elect. de quo cap. ad magnitud. Nucis Moschat. mane & hora quinta vespertina, superbibendo Vini sequentis cochl. v.

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Rad. Pæonia. Emul. Campan. Imperator. & Angelicæ an. \mathfrak{z}\mathfrak{j}.*

Fol. Rutæ, Salviæ, Betonicæ, Chamædr. Marrubii albi & Summitat. Centaur. minor. an. m. i. Baccar. juniper. \mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}.

Cort. duorum Aurantior. Incidantur & infundantur frigida in Vini Canarini \mathfrak{lb}\mathfrak{v}\mathfrak{j}. Coloretur tantummodo tempore usus.

$\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. *Aq. Ruxæ \mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}.*

Aq. Epilept. Langii & Bryon. compos. an. \mathfrak{z}\mathfrak{i}.

Syr. Pæoniæ \mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}.

Mf. f. Julap. cap. cochl. iv.

Sing. noctibus cubitum iturus, instillando C. C. gutt. viij.

Applicetur plantis pedum emplastrum a Caranna.

Quanto magis convalescit æger, tanto minus pedem ducit; tanto pariter & diutius, & constantius manum in eodem situ continens, & scyphum ori magis directæ via admoveat: quæ certissima sunt indicia quantum profecerit in sanitate redintegranda. Ad quam quidem consummatius perficiendam, licet author non sim, ut plus ter quaterve ut plurimum sanguinem emittat æger, attamen remedia cathartica & alterantia eousque in usum sunt revocanda, donec rectissime tandem valeat. Et quoniam qui hoc morbo semel laboravit facile recidivam pati possit, e re fore existimo, ut pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, vel ea ipsa tempestate anni sequentis, vel paulo antequam morbus primo invasit. Sane haud multum abest quin huic methodo epilepsiam Adultorum cedere posse autumem, modo remedia præscripta ætati eorum rite adæquantur; tamen cum non nisi perquam raro hic morbus mihi occurrerit, non adhuc idem sum expertus. Sed de hoc obiter. In feminis affectionibus hysteriis obnoxiiis

H

quan-

quandoque accidit, quod ubi curatio evacuationibus dictis commissa fuit, febris post venæ sectionem & purgationes istiusmodi iteratas etiamnum duret procurratque. In hoc casu febris, quæ jam urget spiritum, commotioni ab evacuationibus excitatæ durationem ejus plane debet, ac proinde jam aliis omnibus posthabitis indicationes curativæ, modo signa peripneumoniarum & inflammationes circa partes vitales absint, ad quietem spiritibus inducendam, & eorum organum sedandum omnino sunt dirigendæ. Quem in finem singulis noctibus paregoricum, quod vigilis debellandis par sit, exhibeatur, atque etiam medicamenta *Hysterica* proprie dicta bis vel ter in die injungantur, qualia sunt pilulæ ex *Galbano*, *Assa foetida*, *Castoreo* & similibus, & julapia ejusdem indolis in cap. de affect. *Hyster.* descripta. Insuper ad vires instaurandas & vapores, quos dicunt, suppressendos concedatur ægræ talibus victitare, tam quoad cibum, quam potum, qualia appetitui maxime conveniunt.

Jam diximus, febrem hanc tum anno ultimum elapso, tum maxime hoc ipso qui nunc currit, exacerbationem quandam sub noctem quotidie adducere, paroxysmo febris intermittens non abfimilem. Quamobrem Medici illi qui usu didicerant omnes illas febres, quæ vel minimum intermittebant, (sæpe etiam quæ ne intermittebant quidem) per illam annorum seriem ab *An. 1677.* ad initium *An. 1685.* a cortice Peruviano certissime fugari, eodem remedio hanc etiam febrem adoriebantur. Quod quidem licet judicio rationis suffragante tentarent, non tamen æque feliciter illis cessit, atque prioribus istis annis plerumque cesserat. Mihi enim quantum potui diligenter perquirenti comperit fuit, etiam magnam corticis quantitatem exhibitam, rarissime ægrum a morbo liberasse. Idque ita perraro, ut quoties restitueretur æger pristinae sanitati, ego id magis fortunato alicui morbi eventui, quam corticis viribus tribuendum arbitrarer: ita penitus cortex descivit ab illa sanandi vi & certitudine, qua prædictis illis annis pollebat. Febrem istam intelligo, qua cum nobis impræsentiarum res est, quæ quotidianam aliquatenus imitatur. Ubi vero tertianæ genuinæ, vel alternis diebus invadentis, typus repetitur, cortex Peruvianus perinde hodie atque olim ægris opitulatur. Unde liquido constat, hanc febrem ab istis constitutionis prioris toto cœlo distare; cum ne hilum quidem corticis usu hic proficiamus; cumque hæc e vino & cardiis, aliisque calidis exasperetur magis; quibus omnibus cum corticis usu olim satis conveniebat, quin & cum ipsa febre.

Porro notandum est, quod grassante hac febre, per æstatem omnem, maxime illam anni jam currentis, morbis sæpe non tam pathognomonicis febris signis, calore scil. inquietudine, &c. quam *ventris Torminibus*, nunc siccis, nunc dejectionibus, se ostendebat. Cum nihilominus sub hac larva hujusce tempestatis febris delitesceret, in qua exhalationes sanguinis inflammatoriarum, non pro more solito, in externum corporis habitum protrudebantur, sed introrsum per arterias mesentericas in viscera inferioris ventris, sive intestina, & nonnunquam etiam per arteriarum cœliacarum ramos in ventriculum deponabantur, quæ quidem exhalationes vomituritionem excitare solent præcipue statim ab ingestione sive potus sive nutrimenti cujusvis solidioris. Quamvis autem hæc febris sub dictorum symptomatum specie & forma delitescat, omnino tamen genuina illa methodo, quam supra dedimus, expugnanda est, perinde ac si usitata hujus febris facie compareret, idque tam ratione venæ sectionis, quam repetitæ catharseos. Nisi quod hic animadvertendum sit, quod quoties febris eo usque ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, *Pilule Cochlearum Majores* (quæ ad *3j.* exhibitæ nunquam non per viscera sibi exitum parant) loco potionis leniter purgantibus substitui possint. Devorentur vero pilulæ hora quarta matutina, ita ut æger superdormiat.

Tum etiam hypnoticum dosi paulo largiore est concedendum *verb. gratia Laudani solidi Londinensis gr. jss.* cum simili quantitate *Mastiches* in duas pilulas redacta eadem nocte deglutiantur; vel etiam *Laudani liquidi gutt. 18.* vel *20.* in *3j.* *Aq. Cinamom. Hordea.* aut alio quovis vehiculo generosiore; quo ventriculus hujus tum viribus corroboratus, tum minori quantitate non irritatus, ad medicamentum rejectionem minus insurgat. At si quovis modo potio purgans, & diacodium in ventriculo queant retineri, dictis pilulis, & laudano omnino præferantur; cum officio suo fungantur, corpore minus quam ex pilulis excalescat.

Cum autem de torminibus ventris mentionem fecerim, monendi hic mihi sunt populares mei, quanto cum periculo, prout frequentiori observatione didici, *Aque Minerales* in ventris torminibus quibuslibet, vel diarrhœa, vel vomitione, vel affectu alio quocunque, quem a febre oriri vel suspicari possumus, præscribi soleant. Quandoquidem in tam subtili & spirituosiori morbi genere ac febris extat, ejusmodi medicamenta mineralia ita omnia conturbant, ut loco eorum symptomatum, quæ febrem ex more usitato comitantur, accidentia prorsus anomala adducant; nec quicquam interea ad febris extirpationem conferant, quod me diu sæpeque observasse memini.

Illud interim omnino observandum est, utpote quod ad quamplurimos ab orci faucibus liberandos pertineat, quod non obstantibus iis quæ supra jam tradidimus, quotiescunque prædicta ventris tormina ad *Dysenteriam* usque confirmatam (in qua præter illa tormina materia quædam mucosa una cum sanguine per sedem excernitur) promoventur; hic mihi periculosissimum esse constat morbum aggredi protrahere illa methodo, quæ evacuandos primum, dein contemperandos acres istos humores, esse docet (ut de remediis astringentibus, varii generis, & variante forma intro assumptis, tum & clysteribus nunc abstergentibus, nunc consolidantibus subinde injectis nihil dicam,) cum experientia didicerim dysenteriam & certissime & celerrime curari, si missis ambagibus, fluxus laudano confestim sistatur. Ita enim atrox & vehemens est hicce morbus, ut, si dysenteria jam confirmata adhuc purgare fatagas, perquam metuendum sit, ne dysenteria sumptis inde viribus in præceps lata, ægrum præ incredibili fermento, quocunque te postea vetteris, diutius excruciet, vel etiam vita spoliatur. Advocatus itaque, guttas circa *xxij.* laudani liquidi in *Aq. epidemica* vel *aq. mirabili*, vel alia simili protinus exhibeo, bis intra horas *24.* repetendas; vel etiam hoc sæpius stans intervallis, si nempe dosis jam præscripta, mane ac sero tantum usurpata, tam torminibus ventris, quam dejectionibus cruentis, rite compescendis par non fuerit. Dejectionibus paululum incrassatis, vel jam magis consistentibus (quod primum sanitatis mox recuperandæ indicium est) & fugatis symptomatibus,

tutissimum arbitror, ut æger aliquantisper in usu prædicti remedii mane & sero capiendi perseveret, guttulis aliquot indies demptis, donec eo amplius non fuerit opus. Animadvertendum autem est diligenter, quod ægrum diutius ab usu paregorici lectulo affigendum curo, cum situs quilibet paulo erectior cerebrum facile conturbet, nisi æger somnos post in lecto satis longos captaverit. Dietam quod attinet; si æger vino prius assueverat, Canariense concedo, probe tamen aqua dilutum, in qua panis crustulum fuerat decoctum; & quam frigidam in hunc usum in lagena asservandam jubeo, ut in promptu sit ubi vinum est contemperandum. Decoctum album, e cornu cervi usum in aqua fontana; hic etiam assatim epotum prodest. Pro victu jusculum hordeaceum, vel e pullorum carnibus elixis; ovum sine testa coctum, vel aliud quodvis ex esu peritis in primis dies sufficiet. Deinceps veto tum ad liquores magis generosos, tum ad alimentum uberius solidiusque paulatim ascendendum, ne scilicet nimia vacuitas sive exinanitio, vel morbum a quo convalescerat, vel alia symptomata, quæ exinanitio solet parere, denuo reducat. Veruntamen hoc est adnotandum, quod licet in constitutione jam regnante, laudanum solitarium suo Marte dysenterias subjugabat; in illis tamen annis, in quibus dysenteriarum epidemica grassantur, & cæteris prælucent morbis, non abs re fuerit illas primum evacuationes, quas in capite de dysenteria olim descripsi, in usum revocare.

Et sicuti in radicata illa dysenteria modo dicta, ita etiam in hoc qui sequitur casu, fieri non potest, ut curatio methodo illa quæ febrim unde primitus ortum duxit, debetur, illico possit expediri. Verbi gratia. Nonnunquam usu venit, ut qui rigore atque horrore corripitur, calore & frigore per vices alternantibus, quæ sunt haud mendacia febris jam imminens indicia, derepente viscerum torminibus, a materiæ febrilis irruptione ac insultu gravissime discrucietur. Æger cum venam ferire, & alvum repurgare deberet, ad normam supra scriptam, ad medicamenta nescio quæ calefacientia, tam intro assumenda, quam extra applicanda se confert: eo scil. animo ut flatum, quos hujus mali fontem esse auguratur, his mediis discutiat, donec tandem augescente dolore & visceribus diuturniori mora quasi impaccio, motus intestinorum peristalticus, quo ex naturæ ordine omnia deorsum propellere debent, inverti occipit, & inclusa omnia sursum tendunt, unde æger savissimo cruciatu torquetur, & provocatur ad vomitionem, malo jam in iliaca passione desinente. Hic in medendi ratione, quam febris quæ hujusce symptomatis causa erat antecedens, sibi postulabat, ulterius procedere nequit Medicus, quam ut sanguinem ex ægri brachio semel extrahendum præcipiat: etenim quot & qualiacunque demum cathartica propinaveris, ea statim emetica fieri, atque ita sursum inversum viscerum motum magis promovere solent; cum ut plurimum vix fortissima quidem medicamenta purgantia vel minima eorum pars intestina permeare valeant, ac sedem petere. Rebus sic stantibus, consultissimum esse arbitror brachii venam primum pertundere; mox interjecta hora una alterave, clysterem aliquem ex iis, qui potentius operantur, injicere, ego sumum nicotianæ sive tabacci, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissime insufflatum, Enema omnium, quæ mihi innotescunt, hæcenus efficacissimum esse duco. Qui etiam post moram aliquam reiterari potest, nisi prior immixtus, soluta alvo, meatus deorsum versus referaverit. Huic autem remedio symptomate haud cedente omnino necesse est, ut catharticum paulo fortius ac *δρασικότερον* in usum veniat, utut difficile fuerit exinde viam facere: Ut,

24. Pil. ex duobus gr. xxv.

Mercurii dulc. ʒi. cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. num. iv. cap. e cochl. uno Syr. violar.

nullum insuper liquorem assumendo, ne minus retineantur. Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, hac methodo procedendum.

Laudani liq. gut. xxv.

Aque Cinnam. fortis ʒss.

insillatæ statim propinentur; & interjectis aliquot horis idem paregoricum repetatur. Cum vero horum usu vomituritio ac ventris dolores remiserint, tunc catharticum prius dictum iterum exhibeatur. Hoc enim tempore idem sub laudani tutela assumptum retinebitur, ac suo tandem defungetur munere. Verum si *Anæsthorum* virtute ac vi jam penitus infractis, vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore resistente; in hoc casu, ex dejectionibus per inferiora spe omni impræsentiarum abjecta, ad usum paregorici supra descripti revertendum, idemque eousque repetendum quarta vel sexta quaque hora, donec intestinis quies omnimoda inducatur, ac proinde motus eorum naturalis deorsum versus restituitur: quo quidem tempore catharticum, quod hæcenus ob contrarium intestinorum motum in corpore sisteretur, jam operationem suam per sedes exeret, quantumlibet ex tam repetito narcoticorum usu plane contrarium effectum iri videatur. Quod & ipse, dum hæc scriberem, in generoso quodam ileo savissimo laborante expertus sum; cui tamen postea ex nimis longa tam humorum morbum committentium, quam acrium catharticonum retentione, *Aphræ* supervenere, sed quæ satis facile debellarentur usu corticis Peruviani supra descripto; ut & os sæpe colluendo cum sequente gargarismate.

24. Succu Pomorum agrestium 1ʒss.

Syr. de Rubo Ideo ʒj.

At cum jam ductus isti pro naturæ lege denuo pateant, ægto liberum est, ut ad dies aliquot ferietur a purgatione, donec scilicet tumultus nuper in visceribus excitatus, omnino resederit; quod temporis spatium humorum calori & acrimoniæ diluendis contemperandisque satis commode impertiri potest. Quo facto catharsi alternis diebus, ut supra, repetendæ vacare debet, si vel minima adhuc restent febris vestigia. Sed de hoc satis.

Si infans hac febre laboret, gargarisma, tum hirudines duæ utrinque pone aures applicentur.

Dein emplastrum epispasticum posteriori cervici admoveatur, Cum cerevisia in qua rhabarbarum fuerit infusum purgetur.

Si post catharsin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum Cort. Peruv.* (in cap. de *Febre Intermitte*nti, pro infantibus descriptum) exhibeatur.

Hoc in loco insuper est animadvertendum, quod licet *Infantes* huic febris generi aque cum adultis obnoxii sint, ac proinde pari cum illis methodo curandi, nisi quod pro ratione ætatis, minor sanguinis quantitas est detrahenda, ac catharsis tum eorum ætatuæ ac com-

commodanda, tum etiam forte rarius celebranda (sæpe enim & infantum & juniorum morbus a primo vel secundo saltem cathartico prædominabitur) nihilominus serio advertendum est, an quæ hoc modo tractatur febris pro certo hujusce constitutionis fuerit, non vero alterius speciei, quod diligenter perquiri debet in febribus iis, quæ infantes corripunt, in omnibus quibuscunque annorum constitutionibus. Vulgo enim notissimum est infantes a doloribus ex dentitione ortis, sæpius in febres agi, quæ haud ita facile ab alterius generis febribus internoscuntur. In harum ego curatione diu multumque angebar, nec nisi nuperis his annis, certo mihi persuadere potui, quemlibet ex illis qui meæ curæ concrediti, ad sanitatem restituti fuerunt, tam arte, quam casu convaluisse, donec tandem de felici successu remedii haud ita celebris, imo ob tritum ejus usum plane contempti, frequenter admonitus illud ipse quoque præscriberem, quod etiamnum præ cæteris, quæ mihi innotescunt, medicamentis optime votis hic respondet. Ejusmodi verum est. Guttæ duæ, tres vel quatuor spiritus C. C. proratione ætatis, in cochleari uno vel altero aq. cerasor. nigr. vel Julapii alterius appropinati, exhibeantur quarta quaque hora ad vices quatuor vel sex.

Est & symptomata aliud infantibus permolestum longe diversum & a febribus variorum annorum constitutionum, & ab illa proxime memorata. Est vero hæc species infantes diu affligens, qua infestati sine insigni aliquo calore languent, cum appetitus dejectione; & tam artus, quam corporis truncus ubique emaciantur. Simplicissima qua hic utor methodo, talis est. Rhei electi taleolatim incisi ʒij. in lagenam vitream duarum librarum cerevisiæ tenuis capacem, subere mox probe obturandam, immitti curo, (vel in alio quolibet liquore, quo pro potu ordinario uti solet infans) quam cerevisiam ita medicatam infanti tam noctu, quam interdiu, & cum & sine cibo propinandam injungo. Epoto hoc liquore, duas alias libras rhabbaro eidem superaffundi jubeo; quibus pariter exhaustis, alias adhuc duas pro tertia vice substituo; quo facto & rheum vires suas amittit, & infans morbo ut plurimum liberatur. Ne tamen cerevisia primum affusa rhei vi cathartica saturatius imprægnata, jussu vehementius alvum cieat, cautius agimus, si libra una epota alteram statim adjiciamus: post vero, recentem cerevisiam non affundemus, nisi exhausta ea omni quæ prius fuerat lagenæ inclusa.

Sed ut ad febrem, de qua nunc agimus, constitutionis scilicet jam currentis, revertamur, hoc sedulo observandum est, quod in hoc febris genere (perinde ac in rheumatismo & aliis morbis quamplurimis, quorum curatio solis evacuationibus absolvitur) si dictis evacuationibus pertinaciter insistamus, usquedum symptomata omnia prorsus ablegaverimus, sæpius ægro non nisi morte medebimur. Neque enim ita insolens est, ut symptomata quædam leviora, & quasi effectæ febris reliquæ aliquantisper etiam expirante jam morbo, perdurent; a quibus tamen nullum ægro recidivæ periculum est, quæque sua sponte pari passu quo sanitas redit, abscedent. Quid quod jam recitata symptomata haud raro nihil aliud sunt quam reiteratarum evacuationum, quibus Medicus morbi curationem tentavit, vera progenies? si huic saltem addamus in causæ partem, exinanitionem illam, quam ægri a consuetis cibis potuque abstinentia superinduxit: quæ omnia cum in corpora jam a morbis infirmata & pene confecta vim fecerint, vapores, quos dicunt, haud aliter elevantur, quam in foeminis, atque eandem plane ob rationem, ob debilitatum sc. & quasi dissectum fractumque spiritum animalium systema. Quapropter post factas, quæ tollendo morbo sufficere queant, evacuationes, prudentis Medici est, ab importuna earundem ordinatione sibi temperare, & paulisper attendere quid tempus, Medicorum sæpe felicissimus optimusque, ad leviculorum istorum symptomatum depulsionem conferre possit, quæ quidem sæpenumero, prout multoties repetita observatione comperi, a paregorico duabus vel tribus noctibus assumpto, sine alio quovis apparatu, sub morbi hujusmodi exitu devincuntur.

Methodus jam laudata cæteris, quas expertus sum omnibus, in hujusce febris curatione facile antecellit. Si quando vero febrem non prorsus tollat, id saltem agit ut intermittere cogatur; ac proinde Peruvianum cortici, qui hic nunquam non triumphat, consociendam tradit. Cum autem catharsis isthic imperata curationi hujus febris obesse nonnullis forte videatur, pro comperto affirmo, nihil ita certo atque ita potenter ægrum refrigerare atque catharsin, post venæ sectionem (quæ ubique præmittenda est) celebratam. Tamen enim medicamentum purgans eo ipso quo sumitur die, atque adeo inter operandum majorem impræsentiarum & in sanguine & in reliquis humoribus, quam qui ante fuit, tumultum excitet, & proinde febrem intendat; id tamen noxæ emolumento mox inde subsecuturo plus satis pensatur. Testatur enim experientia, catharsin, modo posteductum sanguinem tentetur, quibuslibet aliis remediis feliciter certiusque febrem perdomare; tum quatenus scdam illam humorum illuviem e corpore exigar, a quibus ut a causa antecedente febris accendebatur; vel si non antea peccabant ii, jam saltem concalescenti, & a febris ardore quasi cocti & constipati, ad ejusdem moram diuturniorem multum faciunt; tum etiam quatenus anodyno viam sternit, quod tutius longe certiusque officio suo fungitur, quam si humores peccantes, qui paregorici vires aliter potuissent infringere, purgatione non fuerint eliminati.

At e contra sicuti methodus illa quæ materiam febrilem per poros cutis eliminare satagit, minus habet certitudinis, ita plus habet & fastidii, & moræ, utpote qua morbus sæpius ad septimanas aliquot producit. Cum æger hoc modo primum in ipso sepulchri margine (si forte libitini evitet tandem) constituitur, & per longum illum febris decursus, denso remediorum agmine infestetur, quibus ea expugnantur symptomata quæ imperita morbi tractatio advexit; dum regimine & medicamentis calidissimis tentatur curatio ejusmodi affectus, qui pro genio suo, utraque horum frigidissima omnino deposcit. Atque ita dum male sani homines artis falso dictæ regulis se manciant; etiam spreto sensum illis reclamantium iudicio, morbum ex sua natura brevem facilemque in diuturnum, & difficilem erudite convertunt, omnia tumultu & metu conturbantes, & fluctus, quod ajunt, excitantes in simpulo. Quo facto non is magis opus erat, quam est nauclero, ut dum in mari libero navim possit agere, eandem inter cautes & brevia inferat; unde licet majoris peritæ gubernationis famæ comparandæ opportunitatem nanciscatur, servato in tanta desperatione navigio, viri prudentis saltem nomen amittet.

Sydenham Opera Medica.

Has itaque ob causas, & prudenti, ut spero, fiducia affirmare lubet, quod dicta methodus curationis per venæ sectionem & purgationem expediendæ, plus alia quavis præstabit in febribus quamplurimarum specierum expugnandis. Licet enim diaphoresis, proprie loquendo, naturæ ipsius sit methodus, qua materiam febrilem foras protrudit, & præ cæteris maxime genuina sit, & accommodatissima, quoties natura suo relicta arbitrio dictam materiam primum digerat, dein rite coctam per corporis habitum blande expellat, (quem felicem naturæ eventum febres per sudores abigentis cum Medici practici sæpe animadvertissent, hinc ansam arripiebant *Δογματικώτεροι* fidenter statuendi, febres universas hac tantum methodo, non vero alia quavis, profligari posse ac debere.) Quo tamen dato & concessio, ars nihilominus, quantumcunque naturæ imitationem præ se ferat, id saltem sibi privilegii arrogare nequit, ut febribus per sudores certo exigendis par sit. Primo enim nescit ars quo pacto materia peccans ad expulsionem subeundam rite præparanda sit; nec si hoc sciat, certa ulla habet indicia, quibus de hujusmodi debita præparatione possit moneri; unde etiam & tempusciendo sudori opportunissimum ignorari necesse est. Temerariam vero sudoris, nondum peracta coctione, provocationem longe periculosissimam esse, nemo opinor nisi pertinax negaverit; cum materiam crudam in cerebrum impingens, oleum camino addat. Atque, prout alias etiam innui, saluberrimum illud Hippocratis monitum, *Cocta, non cruda, sunt medicanda*, non tam catharsin, quam diaphoresin ex arte sollicitandam spectare videtur. Etenim neminem in ægris tractandis vel mediocriter versatum fugere potest, quam multi indies male mulsentur a vetulis & imperitis medicastis, præpostero hoc sudorificorum abusu: his enim more receptum est, ut si quis de rigore, & capitis atque ossium dolore (quæ ut plurimum febris mox invasuræ præludia sunt) conqueratur, extemplo illum lecto adjudicent, & sudoribus quoquo modo extorquendis toti incumbant. A quo importuno molimine tantum abest ut præcaveatur febris, quæ forte vel sua sponte, vel eductis aliquot sanguinis uncis potuerant evanescere, ut e contra magis accensa vehementius exardescat, & in morbum jam radicatum confirmatumque abeat. Illud insuper (ut vetulas jam missas faciamus) notissimum est, quod sicut sudores isti qui febre primum ingruente spontanei erumpunt, symptomati omni sunt, nullatenus vero critici; ita etiam qui primis febris diebus diaphoreticorum vi exprimuntur, nihil magis ad morbi curationem plerumque conferunt, quam solent alteri illi symptomati, ita præmature sua sponte manantes, hoc est ut plurimum, ne hilum quidem. Deinde vero sicut ignorat ars opportunitatem illam temporis qua sudores eliciendi fuerint, ita pariter nescia est quandiu in iisdem sollicitandis perseverandum sit. Quod si diaphoresis ultra debitum tempus, quo scilicet materia morbum committens penitus fuerit exacta, protrahatur; humidarum istarum particularum, quibus sanguis diluendus contemperandusque erat, absumptio, febris tum moræ diuturniori, tum incremento ministrabit. Constat itaque quam in lubricos hic vertatur; cum e contra penes Medicum sit alteram illam methodum, qua materia febrilis per phlebotomiam & catharsin eliminatur, pro arbitrio suo moderari. Adde, quod hoc etiam nomine hæc illi alteri anteposenda est; quod scilicet si forte Medicus propositum sibi scopum non attigerit in sanando ægro, saltem eundem in nullum discrimen adducit, quod in diaphoreticorum usu contingit, nisi convalescat. Etenim vel calor lectulo jugiter inclusi, cui præter solitum morem aliquandiu se addixit, (ut cardiaca quæ in hac medendiratione locum semper obtinent, omittamus) naturæ æconomiam confundit, & convulsivos artuum motus, aliaque symptomata prorsus anomala adfert. Quæ sane ideo delineari non possunt, quia sub morbi historiam non cadunt (quod in symptomatibus plerisque ad quemlibet morbum spectantibus usu venit) sed a superaddito tumultu & confusione oriuntur, quibus sæpe opprimitur natura, quoties curationem morbi hac methodo aggredimur. Quæ quidem omnia vulgo malignitati nescio cui solent imputari.

Cujus de *Malignitate* (sive notionem, sive verbum dixeris) opinio in inventio humano generi longe ipsa pyrii pulveris inventionem lethalior fuit. Cum enim ex febres præsertim malignæ dicantur, in quibus intensioris præ cæteris inflammationis gradus conspicitur, hinc Medici se ad usum cardiacorum, & alexipharmacorum nescio quorum contulerunt, quo scilicet percutis poros expellant quod somniant *Venenum* (hoc enim est dicendum, nisi malint verbis ludere, quam illud quod potest intelligi, serio proponere) ex quo factum est ut regimen calidissimum methodumque huic parem iis morbis adaptaverint, quæ frigidissima tum remedia, tum regimen præ cæteris sibi postulabant. Quod quidem satis arguitur tum in variolarum, qui ex calidissimis in rerum natura affectibus est, tum in febrium aliarum curatione. In quem errorem forte inciderunt ex conspectu petechiarum, macularum purpurearum, & cæterorum id genus *παυρομένων*: Quæ tamen omnia in plerisque subjectis, inflammationi, ægri sanguini jamdiu plus satis a febre accenso superinductæ, omnino debentur. Utpote quæ raro sponte sua efflorescunt, præterquam sub adventu pestis ipsius: atque in initio invasionis istarum variolarum confluentium, quæ summæ inflammationis participes sunt. In hoc enim morbi genere maculæ liventes in variis corporis partibus, una cum pustulis primum erumpentibus, comparent, atque æger eodem tempore sanguinis excretionem vel per meatus urinarios, vel cum tussi per pulmones, fatigabitur; cum ita valida exagitatione, atque orgasmo ab inflammatione orto, sanguis ferociat, ut distractis jam repagulis, in cavitates corporis præceps ruat. Et licet maculæ istæ purpureæ in hac febre non a tam intenso sanguinis calore, qualis is est, qui istiusmodi hæmorrhagias excitat, ortum ducant; ab eadem nihilominus inflammatione sed gradu remissiori producantur: & quoties ista sanguinis excretio (unicum in variolis symptoma cui devincendo nondum par est ars medica) non accedit, refrigeranti regimini facile cedunt. Quod si malignitatis præsentiam non tantum e maculis purpureis colligunt, sed ex eo quod observaverint, febris symptomata subinde fuisse mitiora quam quæ ejus naturæ competere viderentur, ægrum tamen magis viribus occisum fuisse, quam proratione temporis a quo cœpit ægrotare; Respondeo omnia hæc exinde tantum procedere, quod natura a primo morbi impetu quasi oppressa, devictaque, non satis valida est, ut symptomata regularia & magnitudini morbi consona exerat, omnia vero phænomena prorsus sunt anomala. Etenim perturbata æconomia animalia & quasi dissecta, febris exinde deprimitur, quæ obtinente genuino naturæ du-

ctu, vigere solet. Cujus rei experimentum haud vulgare occurrisse mihi memini multis abhinc annis, in juvene quodam ad quem accerserbar. Quamvis enim ferme animam agere videretur ille, calor tamen in externis corporis partibus ita ad tactum sentiebatur temperatus, ut fidem mihi derogarent adstantes amici, quoties asferebam eum febre laborare, quæ ob sanguinis oppressionem (cujus mole, exitu negato, quasi strangularetur) se explicare & ostendere palam nequibat: quod si venam inciderent, febrem illico satis violentam statim animadverterent. Aperta vena, & sanguine paulo copiosius educto emicuit febris, qua vehementiorem mihi nondum videre contigit; quæ non nisi tertiæ quartæ demum phlebotomiæ cessit. Sed de his satis.

Quod si rationes a me allatæ tanti non sint, ut certo ac necessario evincant, rem ita se habere atque ego statui; attamen si suffragante experientia deprehendero hancce febrem evacuationibus per diaphoresin factis haud libenter cedere, habeo quod quæro. Neque enim cujuslibet demum ratiocinatio, sed potius experientia docere poterit, quænam febrium species diaphoreticis, quænam vero aliismodi evacuationibus sanari possint ac debeant. Et profecto nemo sapiens cui tam hominum quam rerum natura satis est perspecta, in iis, quæ meræ speculationes sunt, nullo autem certo experimento determinari queunt, in cujusvis mortalis verba, quantumcunque is demum fuerit, facile juraverit: cum idem animadvertisse debeat, *Momenta Rationis* ita prorsus varia, itaque subtilia esse, ut cum aliquis theoriæ quamlibet proposuerit, ita validis rationibus suffultam, ut adstantium, quotquot sunt, omnium assensum extorqueat; hunc mox alius insignioribus forte naturæ dotibus præditus, excipit, qui sententiam istam, quæ ita pulchre stabilita videbatur, convellit, & firmiter argumentorum vi nihil illud esse quam cerebri commentum, cujus nulla prorsus in natura vestigia reperiuntur, palam ostendit. Cujus jam loco is novam quandam substituit hypothesin, majori adhuc verisimilitudinis specie innixam, & magis affabre concinnatam; quod tamen posterius figmentum, pari cum superiori illo fato fungetur, quoties Tertius aliquis se objecerit, qui Secundum istum tantum ingenio vincat, quantum ille sibi præcedentem devicerat. Atque hoc iterabitur toties quoties, donec tandem ad illum proventum fuerit, quæ *ultima humani ingenii potentia* consummaverit. Quam vero difficile sit hunc hominem investigare & a cæteris dignoscere, statim sentiet, quisquis non usque adeo desipit, ut hanc sibi laudem delirus arroget. Quinimo, cum jure merito suspicari liceat, esse naturas in orbibus illustrioribus, per Universi expansum hinc illinc sparsis, pene infinitas, quæ præcellentiori longe intellectus vi pollent, quam nos homunciones, haud satis scimus, an non vel totum hominum genus cerebrum, cogitationum officinam, habeant a natura ita efformatum, ut non tam quid sit absolute verum, quam quid maxime conveniens, ac suis naturis accommodum, excogitare queant. Atque hæc iis qui in medicina facienda potius speculationibus vanis, quam experientiæ solido sensuum testimonio innixæ, fidem adhibent, dicta sunt.

Quod si quis hic regerat; An non igitur de facto experimur hanc febrem methodo huic quam tradis, prorsus contraria persæpe fugari? Respondeo toto, quod ajunt, cælo distare curationem morbi ea methodo cui sola ægri nonnunquam ad sanitatem restitutio astipulatur; & ejusdem curationem, ista praxeos methodo, cui & frequentior ægri restitutio, atque etiam phænomena præctica omnia quæ in eodem curando incidunt, pariter astipulantur. Exempli gratia: in variolis. Multi ex iis qui diro calidiorum & regiminis & remedium usu cruciantur, tamen convalescent; ex adverso autem, & iis pariter feliciter cedit, quorum curatio methodo plane contraria tentatur. Jam quo pacto litæ hanc finiemus; quænam methodus est præferenda? hoc plane modo certissime judicabimus. Nempe si in illo regimine priori exploratum habuero, me quanto magis ægrum excalescio, tanto magis febrem, inquietudinem, delirium cæteraque symptomata intendere ac promovere; e contra vero deprehendere, eundem, ubi moderate refrigeretur, tanto sedatiori temperamento esse, tantoque minus tam a febre, quam ab aliis symptomatibus vexari. Addo quod servata debita illa carnis musculosæ temperie, quæ pustularum tum augmento, tum murationi maxime competit, & grandiores sunt pustulæ & liberalius implentur, quam si æger nimio suffocaretur calore. Posito hoc utroque casu, satis manifestum esse arbitror quam potius praxeos methodum sequi debeamus. Pariter in illa, de qua nunc agimus, febre, si comperiam ægrum quo magis calefit, eo magis non tantum phrenesi, maculis purpureis, petechiis, &c. obnoxium esse; sed & febrem insuper symptomatibus omnium generum irregularibus & anomalis exinde stipari. E contra vero si alium ægrum ea quam jam proponimus methodo tractatum ab his symptomatibus prorsus liberum observaverim, ratio dicat posteriorem hunc praxeos modum, longe alteri præstare, tametsi uterque æger ita diversimode curati ad sanitatem revertantur. Quod si plures hac via quam alia ista mortem effugiant, eo facilius solvitur controversiæ nodus; quæ de re non est meorum partium judicium ferre, ne mihi & meis plus æquo faveam.

Atque hæc de hac febris specie. Quousque illa durabit non hariolor. Neque satis scio an non sit initium aliquod spirituosius ac subtile, & quasi primordium Febris illius *Depuratoria* jam antiquatæ, quam insecta est immanissima illa pestis. Sunt profecto phænomena quædam, quæ me, ut hoc credam, quadantenus inducunt, quandoquidem non tantum febres intermittentes proprie dictæ, præsertim *Quartana* hic illie sparsæ adhuc restant; verum etiam nonnullæ ex his febribus continuis subinde in intermittentiæ castra, maxime autumnus jam pendente commigrant. Ut jam taceam exacerbationes in hac febre supra memoratas, eorum paroxysmorum qui febres intermittentes comitantur, genium aliquo saltem modo referre. Tum etiam quod hoc morbo laborantes ad vomitionem satis sunt propensi. Qua de re tamen nihil prorsus pro comperto venditare animus mihi est, quoniam non jam mihi succurrit, qua facie febris depuratoria se primum extulit, prout libro de morbis acutis, sect. 1. Cap. III. his verbis subindico. *Quanto autem jam tempore prædicta Febris continua invaluerat dicendo novæ sum, cum mihi hætenus satis fuerat ad generalia Febrium Symptomata attendere; utpote qui nondum vel juxta varias Annorum crases, aut ejusdem Anni varia tempora easdem distinguere posse animadverterem.*

Quandoquidem in toto Clariss. Authoris nostri Opere de Febribus in genere, ac de pestilentialibus, contagiosis, aliisque malignis in specie, abunde actum est; ommissa tamen Febre Miliari, quæ inter has ultimas a Clariss. Hamilton recensetur, ejus in hoc argumento Tractatum jam tradimus, & hic est.

DAVIDIS HAMILTON,

Equitis Aurati, Regalis Societatis Londinensis utriusque Socii,
Necnon Magnæ Britannia Reginae Medici Ordinarii,

T R A C T A T U S

D E

FEBRE MILIARI SEU VESICULARI.

Accessit.

Febris Miliaris Historiarum Fasciculus.

A D L E C T O R E M

P R Æ F A T I O.

Tractatui naturali ordine prodromo sequentem addendum censui ea ratione, ut Praxeos speciem, secundum normam mihi usitatam, & a me jam ante propositam, Lectori exhiberem. In quam rem utilius præstandam, præ aliis morbis, Febris Miliaris sive Vesicularis naturam, curandique methodum describendam elegi; quod Medicorum neminem, de hac Febre, tanquam specie diversa, saltem justo volumine, hætenus scripsisse viderim: Cum tamen in quamplurimis, vel in chronicum morbum immutari, vel brevi exitialem fuisse, noverim. Nonnunquam enim id ægrorum, in hujus morbi principio mitiori, de seipsis negligentia, aut diutius elongati impatientia, evenit: Nonnunquam etiam Medicorum fallacibus ejus symptomatibus cæcatorum ignorantia: aut tandem, ubi visitationes necessario continuandas omittunt, intempestivo metu, ne lucri gratia curationem procrastinare videantur. Quamobrem & existimavi operæ impendendæ pretium, si his meis observationibus, ab inspectis ægris diligentissime collectis, Medicis junioribus lumen præberem, & hoc facto Peritos excitarem, suas etiam in lucem proferre. Quo autem ea, quæ in hac Dissertatione dicta sunt, magis adhuc firmantur, clariusque illustrentur; Historiarum huc pertinentium, fusiussque exaratarum, Fasciculum subjiciendum curavi. Et firme credat Lector, me summa ubique veracitate usum fuisse.

De Nomine hujus Morbi, Genere, & Speciebus.

Febris miliaris, a pustulis sive vesiculis, seminis milii speciem quodammodo præ se ferentibus, & præcipue circa partes superiores apparentibus, nomen accepit. Mihi tamen videtur potius nominari debere febris vesicularis. Quia pustulæ sunt vesiculæ, primo sero limbo, deinceps sub albo, perlato colore non absimili, plenæ. Non desunt, qui febres solummodo pestilenciales petechialesque opinantur malignis annumerandas. Censeo tamen & alias, specie diversas, malignarum classi debere referri.

Primo, quascunque febres vel contactu, halituve, vel quavis alia contagione trahantur.

Deinde, & istiusmodi febres quas statim ab initio dolor vehemens, & alicui parti affixus comitatur, viz. capiti, aut intestinorum renumve regioni, aut etiam artubus. Pariter ac si ægrorum cephalalgia, vel dolore colico, aut nephritico, vel podagra, aut rheumatismo, vel etiam doloribus parturientis, tanquam originali morbo, laborasset. Cum tamen istiusmodi febris miliaris symptomata haud iis cessura sint remediis, quæ, ubi morbi ita nominati primarii sunt, valere solent.

Porro, & in quibus spiritus animales subito opprimuntur & deficient; & ubi prædicta symptomata a nulla causa evidenti, sed a veneno quodam latente, pendere videntur: ab Antiquis occultæ qualitatæ, a Neotericis vaporum nomine designato.

Vel demum, ubi ex causa, ut videtur, non absimili, spes salutis subitanea mors excipit. Quæ omnia, ut malignitatem ostendunt, ita & in febre miliari observavi accidisse.

Et notatu dignum est, hanc febrem eadem malignitate ac petechialis apud Indos grassari.

Hæc febris specie duplex est, simplex & composita. Simplicem dico, quoties pustulæ erumpunt nullæ, præter miliares, de qua hic differturus sum. Complexam, cum pustulæ pupillares rubræ, miliaribus sint interspersæ; quæque ubi solitariae sunt, a *Rash*, vulgo appellantur.

Et notandum est, pustulas miliares nonnunquam variolis immisceri, eosque, dum intumescunt variolæ, paulatim exarescere. Verum post exiccatas pupillares superstites manere.

Febris Miliaris Descriptio.

Quo melius febris miliaris historiam præscribam; antecedentia concomitantia, & consequentia enumerare placet.

Antecedunt, constitutio corporis imbecillis, sive ea naturalis est, sive ex evacuationibus supra modum factis, victu nimis parco adventitia: sanguis ferossior: mens imbecillior & timidiuscula, ac facilius læsa ab externis, ut in sceminis & effæminatis viris. Cogitatio multa & intensa, aut mæstitia. Obstructio, vel ulcus in aliqua parte cum dolore conjunctum. Unde dolore colico, aut calculo, aut renum ulcere, Podagra diu affecti, hinc febri magis sunt obnoxii. Calor etiam internus in mulieribus, cum vel sine siti, & præcipue sub tempus puerperii; unde & partus dolores minus solito vehementes sunt, & spiritus sine causa evidente admodum deprimuntur, cum oppressionem pectoris suspiria cogente. Quibus, ut in aliis febribus, hic etiam fere semper accedit frigus externum.

Hanc

Hanc febrem sæpe comitatur dolor, colici, nephritici, pleuritici, rheumatici, vel parturientis æmulus. Nec non oppressio pectoris, cum depressione spirituum. Dolor prædicto post biduum tri-duumve recedente, totius corporis horror, deindeque frigus calor-que alternatim oriuntur. Lenior tamen hic calor est, quam in febre vulgari continua, & naturali propius accedit: Dum vola manus calore magis intenso afficitur, pars convexa mitiori. Pulsus etiam frequens est, sed debilis. Spiritus sæpe maxime deficiunt, & quasi ex magno pondere pectus oppressum edit suspiria. Somnus obrepens subito est interruptus; omnium pene symptomatum maxime inseparabile. Sæpe enim plures dies noctesque sine delirio, aut capitis dolore, insomnes sunt: fere multo diutius quam in aliis febribus. Cujus rei exemplum vidi, præ aliis singulare, in femina quadam illustri, quæ sub cura Doct. *Francisci Bernard*, in hac febre, sine delirio, dolore capitis, per mensem passa est vigilias. Lingua nunc aptha alba obducta est, nunc sanorum similis. Urina, nonnunquam, fere ut aqua communis, pallida; alias, naturalem præ se fert colorem. Quo symptomate decepti juniores Medici, frequenter ad vapores, uti vulgo loquuntur, referunt. Hac febre correpti aliquando ventriculi ægritudinem, præcipue post somnum, patiuntur, & nonnunquam diarrhæam, vel ex sua negligentia, vel ex mala praxi, scilicet, dum calefacientia in paroxysmis hystericiis usitata, sine diaphoreticis, præscripta sunt. Unde, loco placidi naturæ progressus, materiam morbificam per diaphoresim expellentis, rapida fermentatio eandem in intestina deturbat. Alvus nunc astricta, nunc cum ventriculi ægritudine, & intestinorum doloribus, soluta est. Modo multum fitiunt, modo parum. Aliquando manus & lingua, Medico porrectæ, tremunt; & ægri quasi cum tremore loquuntur. Motibus etiam convulsivis, delirio, ac difficili respiratione haud raro promuntur. Quorum symptomatum exacerbationes, febris intermittens paroxysmorum instar, recurrunt. Pectoris cum suspiriis oppressio, vel sine causa evidente spirituum major defectus, vigilæ, & spirituum commotio, a *Hurry in te Head* vulgo dicta, quoties ægri ad somnum se componunt, nec non pulsus frequens & debilis, quibuscunque aliis symptomatibus conjuncta, pustulas miliares erupturas semper prænunciant. Quæque omnia persistere solent, donec pustulæ miliares emineant: deinde a plerisque ægroti liberantur.

Hæ pustulæ, plerumque in pectore, collo, & digitorum interstitiis, interdum etiam in toto corpore sunt perspicuæ; & panlatim indies auctæ, tandem evanescent; cuticula pustularum sedibus subscabra manente. Nonnunquam pruriunt, præcipue in febre miliari complexa; ubi scilicet pustulæ papillares rubræ permixtæ sunt miliaribus. Et observare est, hanc febrem, quo simplicior est, symptomata habere eo leviora, quæque hac ratione, tam incautis Medicis, quam ægris, incutiam frequenter creat. Unde febris hæc vel magis sit periculosa, vel morbus alius sæpe oritur. Ex minori enim cautela, quam primo loco adhiberi oportuit, gravioribus symptomatibus, sc. ventriculi ægritudine, appetitu diminuto, calore interno, oppressione pectoris, spirituum depressione & suspiriis, caloris, & frigoris irregulari recurso, vigiliis, & similibus, aliquando incipit.

In hujus febris declinatione sudore frigido sæpe madent manuum superiora.

An pustulæ miliares certo die apparere soleant, difficillimum est observare: cum prima hujus morbi facies, & de eodem patientis narratio, adeo sint incertæ. Quantum autem assequi possum, eas opinor decimo vel undecimo die, a principio, plerumque pullulare; si modo febris regularem habeat progressum; & circa decimum & octavum, vel ubi materia morbifica abundat, circa primum vel secundum & vicesimum desiccari.

Tempus eruptionis observare, tanta vi primo in iis feminis, quas tertio a partu die advocatus, de horrore vel frigore, & calore subsequente quærentes audivi. Cum enim pustulas miliares in illarum pectore & collo inspectis viderim, eas judicavi a multis diebus febre miliari correptas fuisse. Et scrutinio factò ab usque morbi initio, vel calore præternaturalem, vel partu alicujus dolore, cum vel sine fiti, & cum maxima pectoris oppressione, ac suspiriis, spirituumque defectu, ante partum sensisse comperi. Quæ symptomata, cum ab appropinquante partu pendere putarentur, a partu se bene habituras sperabant. Deinde, partus dolores, etiam si solito sint mitiores, eos tamen, maxima pectoris oppressio cum suspiriis, spirituumque defectus (ab obstetricibus timor & vapores dictus) pulsusque frequens ac debilis subsequuntur, pustulasque miliares prænuntiare solent. Quarum eruptioni in puerperis, ad sudorem in lecto compositis, via sternitur. A primo itaque calore interno, vel dolore ante partum, ad eruptionem a partu, dies undecim frequenter numero. Verum ægrotæ sui status ignorantia & præpostera narratio, Medici prognosim ut plurimum adeo confundit, ut ipsissimum diem vel curiosissimus haud indigitare noverit.

Febris miliaris consequentia, quatenus meæ observationi occurrunt, sunt tumor femorum, tibiarum, pedumque, non semper indolens, extumescencia & abscessus mammarum; depravata memoria, fluxus lochiorum nimius, & urinæ affectus, hypochondriaci aut hysterici æmulus; calor internus, cum debilitate, languore, & diminuto appetitu conjunctus. Horum, inquam, nunc hæc, nunc illa contingunt, quoties febris, vel ex suo malo more, vel Medici mala praxi, infelicem habet exitum.

De Febris Miliaris Causis internis.

Quod ad causas febris miliaris internas attinet, partim a sanguinis, & succi nervosi serositatem nimiam, & quadam acida acrimonia, partim etiam a succi nervosi nimia commotione, pendere videtur. Quæ mea conjectura ex hujus morbi præcedente historia, ex medicamentorum huc pertinentium effectu, & ex cadaveribus hac febre mortuorum dissectis, probabilis videtur.

Sanguinis acrimoniam seu aciditatem arguunt secretionem huic febri peculiares. Urina enim hic magis decolor est, sanorumque similior, emittiturque majori copia, quam in febre ardente, ubi sanguis & succus nervosis particulis sulphureo salinis imprægnantur. Et experimur urinam decolorem copiose effluere, ex usu Oxymellitis scillitici in hydropse incipiente. Ptyalismus etiam in hac febre plerumque copiosior est, quam in ardente. Ideoque hic sitis ut plurimum minor est, & lingua viscofo humore minus obducta. Porro, & pu-

Sydenham Opera Medica.

stulæ miliares, quæ sero plenæ sunt vesiculæ, ab aciditate prædicta secerni videntur: non secus ac a quovis acido affuso, fit lactis serum.

Idem patet a medicamentis juvantibus, testaceis scilicet, ut oculis cancerum & similibus, quæ acida absorbent.

Nec minus ex lædentibus. Omnia enim sapore acida, ut succus limonum, &c. in hac febre nocent.

Serositas sanguinis probatur a calore, qui hic mitior, quam in febre ardente, sentitur. Et quo simplicior est hæc febris, eo mitior est calor. Nam ubi pustulæ rubræ, a *Rash* vulgo dictæ, miliaribus sunt interspersæ, omnia symptomata febrem magis ardentem ostendunt. Et anasarca laborantes, ubi sanguis sero abundat, licet febre aliquando miliari, & symptomatibus nervosis, vix tamen unquam ardente afficiuntur.

Idem probat tempus, quo pustulæ miliares erumpunt. Quæ ob sanguinis serositatem, indeque calorem & motum mitiorem, non tam cito ac papillares & variolæ, ubi sanguis sulphure magis abundat, expelluntur. Quemadmodum simplex aqua, tardius quam vinum aut spiritus vini ebullit. Quam etiam ob causam spiritus animales in hac febre primo commoventur.

Remedia hujus febris curationi adhibita idem ostendunt: nimirum, continuata diaphoresis, & vesicatoria successive apposita. Quæ serositatem sanguinis, & succi nervosi diminuunt, eodem tempore quo eorundem aciditatem edulcorant. Adde, & curatio hujus febris a natura perficitur, sanguinis serum; ex aliqua parte, in generatione pustularum miliarium, eliminando. Neque liquores diluentes & aquosiores, hic adeo multum, ac in febre ardente, profunt, ubi potius pulli gallinacei jusculum copiose bibendum est. Porro, & quæcunque feri diminutionem per diaphoresim impediunt, lædentibus adnumeranda sunt; ut frigus externum, & medicamenta calefacientia sine vi diaphoretica.

Tam aciditatem sanguinis, quam serositatem, cadavera eorum qui hac febre moriuntur, satis perspicue demonstrant. In quibusdam enim partibus sanguis coagulatur, & non secus ac oleum ex effusione spiritus vitrioli nigrescit. Idem tamen sanguis extravasatus linteum valde pallido colore imbuunt. In aliis partibus, adeo serosus est, ut & ipsa vasa sanguinea vere pallescant. Cujus rei instantiam profero, in sequentium historiarum ultima. Et nuperrime vidi non ab similem, in juvene quodam illustri, anno circiter unum & viginti nato, hac febre mortuo, ex omni morbi curatione tempestiva. In cujus abdomine, thorace, & cranio apertis, vasa, quibusdam in partibus, sanguine nigricante & coagulato, distenta erant. Sanguis tamen e vasis diffusus elapsus pallido colore linteum infecit. Et non infrequenter experimur, e vena secta sanguinem rutilantem fluere; a vino nempe generoso copiose ingesto, colore tamen pallido linteum imbuti suam serositatem ostendere. In aliis hujus cadaveris partibus, sanguis serosus videbatur, & pallido colore tinctus, ut & cor ipsum. Plexus etiam choroides, ob copiam sanguineorum vasorum ipsum formantium, semper fere rubicundus, maxime pallescat: tum acidi, tum serosi sanguinis argumentum. Neque dubitandum est, succum nervosum, a sanguine ortum, similem naturam adeptum fuisse.

Intemperiem febrilem in liquore nervoso five spiritibus animalibus primitus accendi, symptomata nervosa primo occurrentia, nempe dolor, spirituum depressio, vigilæ, & similia supra enumerata, probant. Cum interim symptomata, quæ sanguinis fervorem febrilem indicant, uti calor vehemens, pulsus fortis, capitis dolor, sitis, linguæ siccitas, urina rubicunda & parca, &c. omnino defunt. Demum in hac febre juvenia, nempe mens spiritusque ab omni tumultuario motu immunes, idem ostendunt. Hic itaque commotio febrilis, & feri sanguinis metastasis in succum nervosum originari videtur, indeque in sanguinem transferri.

De Symptomatum Causis.

Febris acuta continua, non maligna, ex obstructione glandularum, cutanearum præcipue, indeque sanguineorum vasorum plethora pendere, plerique autumant. Et in febre simplici miliari succo nervoso idem accidere, verisimile est. Nam ut nervi ex obstructione tenduntur, ita ex tensione dolor oritur, hujusce febris symptoma omnium fere primum. Ideoque medicamentis diaphoreticis, plethoram & obstructionem nervorum capillarium minuuntibus, potius quam laudano consopitur. Uti & ex petechiarum aut variolarum eruptione, ægri a dolore, symptomate eorum primario, magis liberantur, quam ab usu laudani.

Succus nervosus, nervorum capillarium obstructione auctus, & in suo motu repulsus, motum irregularem imprimit spiritibus animalibus, & horrore ægrotum afficit.

Calor autem succedit frigori, ex succo nervoso in sanguinem (tandem obstructione referata) copiosius transfuso, motumque sanguinis citiorem generante. Neque tamen hic, ubi sanguis scaturit partibus seroso acidis, quæ motus ejus inhibent, pulsus adeo magnus est, ac in aliis febribus, quæ primo in ipso sanguine, salinis sulphureisque particulis luxuriante, excitantur.

Calor & frigus se mutuo excipiunt, sed irregulariter. Nimirum a serositate sanguinis, succique nervosi ab eo secreti: qui exinde citius a medicamentis, motu corporis, multiloquio, vel animi pathematis, affecti sunt. Ideoque nihil magis conducit ad caloris frigorisque irregularem recursum cohibendum, quam mora in lecto & quietudo.

Pectoris oppressio & suspiria, a liquore nervoso, in nervis pectoris capillaribus stagnante oriuntur. Vesiculis enim seu pustulis miliaribus emissis, ægri ab oppressione liberantur. Certe a sero in asperæ arteriæ extremis ramulis minime pendet. Ita enim produceretur asthma, & pharmacis pectoralibus oppressio allevaretur: quæ tamen hic sunt inutilia, & quæcunque pustularum miliarium eruptioni incommoda.

Oppressionem hanc comitatur spirituum defectus. Neque ob sanguinis serositatem, indeque parciorem in succum nervosum spirituum secretionem. Oritur etiam a succi nervosi serositate, spiritus animales onerante. Serositate enim per diaphoresim diminuta, liberantur spiritus animales, viresque æger recuperare videtur. Non secus ac bajulator, qui deposito onere spiritus statim refuit. Quod non

accidit in spirituum defectu, ex hypercatharsi orto. Et notatu dignum est hac febre miliari laborantium, non secus ac oneribus defessorum, pulsus eundem manere, dum spirituum defectum passi sint, & ab eodem liberentur. Verum ex evacuatione nimia pulsus debilitas spirituum depressioni respondet.

A motu spirituum animalium magis celeri insomnes sunt, sæpeque delirant; & quoties ad somnum se componunt, de quadam sensus interni confusione queruntur.

Quando in vigiliis caput indolens est, a minori impetu sanguinis versus cerebrum pendet. Licet enim motu paulo vegetiore circuit, quam in sanis, remissus tamen quam in aliis febribus, sive intermittentibus, sive continuis, movetur. Quamobrem & sitis hic longe mitior est, quam in febre ardente. Et eandem ob causam urina est magis decolor, sanorumque similior: & majori copia emissa, ex aciditate sanguinis serum separante. Qua de causa frequentius etiam expuere solent.

A ferocitate spirituum animalium muscoli antagonistæ non semper æqualiter contracti retinentur; unde fiunt motus convulsivi. Sin autem a ferocitate prædicta contractio musculorum fuerit debilior, linguæ manuumque solummodo fit tremor.

In hujus febris principio, si ægri similitudine vaporum decepti, e lecto surgant, calidave medicamenta usurpent, sanguinis spirituumque motus exinde augetur: Et loco pustularum miliarium natura ad materiæ morbificæ intempestivam ac deviam secretionem stimulat. Unde producantur symptomata, secundum varias partes in quibus deponitur, variata; febrisque miliaris sub alterius morbi forma delitescit. Si in ventriculo, nauseam & vomitum parit; in intestinis, dolorem & diarrhœam. In quo casu, dolores & diarrhœa, citius leni & continua diaphoresi, quam laudano vel astringentibus recedunt. Et si contigerint solummodo dæ tresve sedes, absque ventris torminibus, spirituumque defectu; quæcunque astringentia & opiata censeo amovenda. Quippe sæpenumero satis est materiæ, tam in sedes, quam in pustulas miliares distribuendæ. Quapropter & de earum eruptione a sedibus nihil metuendum est, idemque experimur, ubicunque materia abundat secernenda: exempli gratia, in variolis ubi nec enema, nec venæ sectio, pustularum eruptionem impedit. Nec quicquam mali accidit a catameniis, toto variolarum cursu lente effluentibus.

Pulsus denique fit debilis, a ferocitate sanguinis succique nervosi, & proinde spirituum animalium paucitate, cordisque laxiore systole.

De Signis in hac Febre Prognosticis.

DE hac febre prognosis ita instituenda est. Si ægrotus sui regimen in principio omiserit, medicusve pharmaca calida diaphoresin minime excitantia præscripserit; licet symptomata ab initio fuerint mitiora, morbus tamen sæpe in pejus ruit, & vel mortem, vel ægritudinis diuturnitatem minatur.

Si ab initio pars aliqua dolet: vel æger indolenter calefceret, aut ei ventriculus ægrotaret, denique calor & frigus alternis vicibus, intervallis tamen inæqualibus recurrerent, spirituumque defectus, & pectoris oppressio cum suspiriis, facili respiratori conjuncta sint, tandemque pustulæ cum leni & perpetua diaphoresi sese ostenderent, res plerunque in vado est.

Delirium, motus convulsivi, convulsio, vel apoplexia, si ex signis hujus febris pathognomonicis, nempe summa pectoris oppressione, cum suspiriis, spirituumque defectu, symptomata comitantia viderentur, & in principio acciderent; facilius Medici diligentia praxique regulari cedunt. In progressu vero, & declinatione, ubi æger imbecillior est, & pustulæ miliares, aut ex impresso frigore, aut forsan a mala praxi delitescunt, in cerebrum, nervosque lethalis fit metastasis, & brevi mors sequitur.

In hac febre, suppressio diarrhœæ subitanea, sive sponte, sive astringentium, sive opiorum ab usu sit, apoplexiam cavere jubet. Præcipue, si iste morbus, ex plethora & partium structura, staret in procinctu.

Citrinus urinæ color, qui subito in pallorem transit, de metuenda metastasi Medicum monet.

In puerperis hac febre correptis, diarrhœa symptoma periculosum est. Non modo enim pustularum eruptionem, sed & fluxum lochiorum impedit.

Respiratio difficilis, vox faucibus hærens, & linguæ tremor, inter periculosa symptomata collocanda sunt. Præcipue, dyspnœa nervosa. Ægri, quo magis somnolenti, eo felicius convalescunt.

Qui mitioris sunt indolis, facilius quam qui feroces & iracundi, liberantur.

Si natura & Medicus, quasi junctis manibus procedant, statim a desiccatis pustulis, ægri vires recuperant. Nisi ex abundantia materiæ morbificæ, reliquiæ super partem aliquam separentur.

In febre scarlatina, si pustulæ miliares colori rubro extincto superveniant, salutem promittunt.

De Febris Miliaris Simplicis Curatione.

EX hujus febris miliaris simplicis natura descripta enatæ indicationes curativæ sunt hujusmodi. Nimirum, sanguinis & succi nervosi aciditatem dulcificare, eorumque ferocitatem diminueri, nec non spiritus animales liberare & restaurare: Et hac methodo obviam eundo periculosis symptomatibus spirituum animalium sanguinisque motum ad æquilibrium restituere. Quo facto, pustulas miliares e materia rite præparata genitas, solito tempore expectare licet.

Ad sanguinis succique nervosi aciditatem (unde coagulationes sanguinis, & feri secretiones proveniunt) edulcorandam; medicamenta, vulgo alcalina dicta, & præcipue testaceæ, sunt eligenda: E quibus sunt oculi cancrorum, margaritæ præparatæ, & similia. Et ad eorum ferocitates simul minuendum, quæ etiam lenem & continuam diaphoresin promovent, maxime omnium profunt: in quorum numero pulvis e chelis cancrorum compositis, lapis Goenensis, & bezoar Orientalis, præcipuum locum obtinent. Horum enim usu, dies aliquot repetito, sanguinis & succi nervosi vitia corriguntur; pulsusque ad fortiores motum restitutus, magisque æquabilem, pustularum miliarium eruptionem accelerat. Equidem, si nulla ratio diaphoreseos habenda esset, neque alicujus indicationis nisi ut sanguis spiritusque animales exaltentur; calidiora cardia-

diaca, uti radicem serpentariæ virginianæ aut similia, vel etiam vinum ipsum tuto & copiose sumere licuerit. Hæc autem & hujusmodi, in hac febre, viz. ad pustulas miliares expellendas, raro locum habent. Nam sanguinis fermentatio vehementior, & materiæ morbificæ contemporanea secretio, non bene conveniunt. Et sæpe calidorum usu, delirium, motus convulsivi, & similia producantur. Omnes itaque secretiones, sive natura, sive arte effectæ, facilius lente procedunt. Id quod a medicamentis testaceis obtinetur; quæ dum calorem foveant mediocrem, simul & edulcorant, & diaphoresin promovent.

Ad ferocitatem muniendam optime etiam respondent vesicatoria: nec non ad coagulationes sale suo volatili impediendas. Nullum itaque aliud remedium spirituum animalium commotionem magis sedat, somnumque conciliat, aut spiritus depressos levare solet, materia enim morbifica ex aliqua parte eorum ope diminuta, naturam reliquam, via sibi consueta, facilius amandare potest: tantum abest ut pustularum eruptionem impediunt. Neque tamen plura una vice vesicatoria, sed alia post alia, applicanda sunt, nisi grande aliquod symptoma exigat. Notandum autem est, postquam ulcus prioris vesicæ siccatum fuerit, quamprimum aliam debere excitari. Cum sæpe observaverim, omnia symptomata statim a siccatis priorum vesicarum ulceribus ingravescere, iterumque ab aliis vesicis excitatis fieri leviora.

Anno 1697. quidam hac febre correpti non modo capitis dolore, sed & tumore affecti sunt: attamen ex vesicatoriis successive appositis, diem imminutis. Ex apposisis pone aures disparuit frontis tumor; temporum & oculorum, ex tertio inter scapulas; & genarum similiter, labiorum, fauciumque, ex aliis super brachiis, femoribus, tibiisque, ut in sequentium historiarum prima fufus ostenditur. Et notetur quod ex minimo temporis intervallo, a prioris vesicæ excitatione ad generationem alterius, & dolor & tumor aucti fuere.

Anno 1701. quorundam in hac febre fauces occupavit dolor, illius qui in angina æmulus. Quo percepto symptomate, licet multi subito mortui sint; eo tamen leni & continua perspiratione domito omnes sub mea curatione evaserunt.

In hac febre, cathartica raro sunt admittenda; nisi grande aliquod symptoma indicaverit. Emollienti vero enemati, ad primas vias mundificandas, sane locus est.

Raro etiam sanguinis emissio permittenda, nisi ex urgente aliquo symptomate, viz. asthma, pleuritide, vel simili indicaretur.

Animi pathemata in hac febre vitanda sunt. Et quæcunque commovent spiritus animales, sive grata sive ingrata fuerint, noxia sunt. Quietudo etiam in lecto imperanda est. Contrario autem in hac febre incipiente regimine, pustularum miliarium materia versus cutem motura, alio repulsa, symptomata periculosa producit. Quibus symptomatibus, si talia adhibeantur medicamenta, qualia ad primum morbum inepta sint, vel mors, vel morbus chronicus, sine ulla postea pustularum eruptione, sequitur. Unde discimus qui sit, ut puerperæ ex hac febre felicius emergant. Ob id nempe, quod in lecto tranquillo animo se continent, lenem & perpetuam diaphoresin sibi conciliant; cibisque potulentis, calefacientium pharmacorum loco, refocillantur. Sæpe enim observare est, eas, quæ in lecto bene se habere visæ sunt, si inde surgant, tanto spirituum defectu correptas fuisse, ut moribundæ videantur, & ex iis nonnullæ subito obierint. Quæ etiam nimis propere lectum renunt, se tantum histerice affectas æstimantes, statim in pejus ruunt.

Hujus rei instantiam jam præ oculis habeo in domina *Shepherd*, in vico vulgo vocato *Bartolomemlane*, habitante, & cui *D. Lancashire* fuit pharmacopœus. Illa pectoris oppressionem cum suspiriis, nec non confusionem interni sensus, cordisque palpitationem passa est, quæ symptomata, & ægra, & astantes, vapores æstimant. Ideoque necessarium esse putabant, ut e lecto resurgat. Simul ac vero induerat vestimenta, tremores & motus convulsivi, prædictis symptomatibus sunt adjuncti. Ego jam ad illam vocatus, ex oppressione pectoris, cum suspiriis, spirituumque defectu, febre miliari laborare ceusui, & in periculo stare, nec sine leni & continua diaphoresi servari posse. Præscripsi itaque in lecto quietudinem, seclusa visitantium turba; vesicatorium inter scapulas applicandum; bolumque sequentem sexta quaque hora cum julapio sumendum.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. Spermat. Ceti, a. ʒj. Croci gr. vj. Paralys. q. s. Mf. f. Bolus.

Qua Methodo adeo late res cessit, ut intra biduum motus convulsivi pene penitus aboliti fuerint. Pustulæque miliares, jam tandem enatæ, altius indies emicuerunt, serumque in iis, usque ad earum exiccationem, videbatur magis incrassari & albescere.

Puerperæ hac febre laborantes, & nimis cito lectum renuentes, nonnunquam ex improvise moriuntur. Uti accidit dominæ *Bariklei*; ad quam licet vocatus essem, tamen ante adventum meum mortua est. Amici illam, nullo morbo, præter vapores vulgo dictos, affici putarunt. Et proinde exurgere, immiscere se colloquiis, & similia, sanæ instar, agere voluerunt. Ego vero, ex dolore femoris, oppressionem pectoris, suspiriis, spirituumque defectu, mihi narratis, ipsam febre miliari periisse ratus sum. Et allata candela, pustulas miliares quamplurimas super pectore adhuc eminentes vidi. Et nullus dubito, quin ex frigore, materiam pustularum in nervos repellente, hæc mulier morte subitanea oppressa fuerit. Id quod etiam quibusdam parturientibus in simili casu acidisse memini. Ideoque, ubi ad parturientes vocatus, febris miliaris signa viderim pathognomonica, moram in lecto, & ut ægra ad partum se componat, impero.

In prædictæ dominæ dissecto cadavere, nil morbosum conspexi præter polypum. Qui ab eadem causa ac ipsa febris, viz. ferocitate acida proveniens, minime mortis causa existimanda est.

Sæpe etiam observare est, eos qui in lecto bene se habere visæ sunt, si exurgerent, tantum spirituum defectum sensisse, ut moribundi viderentur: cujus rei in historia casus *D. Smith*, in area *Bartolomem Close* vocata, exemplum dabimus ideoque cautela, tum a parturientibus, tum puerperis observanda est, ut si pectore oppresso & languore sine causa evidente affectæ fuerint, statim obstetricis ope partum avelli curent, & spretis mulieram argutiunculis in contrarium, ad eliciendam diutinam diaphoresin sese lecto affigant.

De Curatione Febris Miliaris Symptomatum.

Singulis symptomatibus iidem remediis occurrendum censeo, quibus uti maluimus, si solitarie apparuerint: nisi aliquod symptoma contra indicet: quod a periuro Medico perspicendum est.

Capitis vel partis alterius cujuscunque dolor, longe certius leni & continua diaphoresi, quam opiatum consopitur. Quemadmodum in febribus petechialibus variolisque, nullo modo dolores sedari vidimus, donec expellenda materia super cutem emineat. Cum itaque vel partienti, vel dolore quovis laboranti advocatus sim, & spirituum defectum pulsuumque frequentem ac paulo debiliorem viderim; omissis hypnoticis, naturæ morem gero, & statim diaphoresin excitare soleo. Sin autem doloris vehementia opiatorum usum indicaverit, diaphoretica admiscenda impero. Alias autem non sedant dolorem, aut ejus loco aliquid mali afferunt. Et si pleuriticus sit dolor, vel allicubi inflammationem ostendat, venæ sectio raro est omittenda.

Quoties calor & frigus alternis vicibus & irregularibus recurrunt, ut plerumque solent; lenis diaphoresis, ex *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* usu, valde prodest, si modo sine calefacientibus sumptus fuerit. Quod, etiam si a nonnullis parvipendatur remedium, multoties tamen ejus virtutem expertus sum. Hæcque, ex multis aliis, uno exemplo in *D. Bolton*, *D. Shaler* pharmacopœi filia, satis patebit. Illi, secundo die a partu, doluit abdomen prope coxam. Qua in parte lenito dolore, calore deinde & frigore alternis, nec non vigiliis & oppressione pectoris cum suspiriis, & languore, afflicta fuit: tandemque post dies aliquot pustulæ miliares exudarunt. Solo itaque pulveris e chelis cancrorum compositi usu sexta quaque hora, ad continuandam diaphoresin; omniaque pathemata prohibendo, ægramque cibis fovendo potulentis, vinoque pauco Canarino, illamque dies quatuordecim post emissas pustulas lecto alligando, æque feliciter convaluit, ac si non ægrotaffet. Etiam si ante partum calor hæcticus, tussis, difficilisque respiratio, tabem minitarentur. Constat itaque multis hac febre correptis, sanitatem reintegrari longe difficilius, aut ex debita cura in principio omissa, quasi ægra tantum hysterice laboret; aut valde calefacientium abusu, materiam scilicet morbificam, non critice, sed symptomatice expellentium. Et observatu non indignum est, quod hac corrente febre, ut prædictum pulverem, experimenti gratia, omittendo, non solum cessavit diaphoresis, sed symptomata omnia pejora videbantur: ita & illius usum repetendo, quæcunque laudabilia renovari.

A vigiliis levantur, vesicatoriis, & quietudine in lecto, remotis omni strepitu animique pathematis.

Ad delirium maxime prodest antimonium diaphoreticum, per se sumptum. Quod licet a quibusdam Medicis, ut effusa calx æstimentur; sæpe tamen, & semper per se, optato successu, non modo in vigiliis, sed & in delirio præscriptum.

Sæpe etiam pacantur vigilæ, leni & continua diaphoresi. Ad quam efficiendam, si pulveris prædicti usus sit irritus, spiritus cornu cervi, aliis medicamentis præferendus est, & in posseto salviato potius bibendus, quam salvia infuso. Ideo scilicet, quod plus nutrimenti in hac febre magis necessarii, suppeditet.

Opiata, si unquam in hac febre, post vesicatoria adhibenda sunt. Et urgente diarrhœa, vel pustularum eruptione remota, conf. Fracastorii, aut theriaca Androm. locum præcipuum tenet.

Nihil a me expertum est, quod felicius motus convulsivos in hac febre compescit, quam omnes illinire artus succini essentia; illiusque quasi viginti guttas e quovis conveniente liquore sæpe exhibere.

In oppressione pectoris cum suspiriis præcipue asthma convulsivo conjunctis, eadem fere, nempe lenis & continua diaphoresis, spiritus cornu cervi, & vesicatoria, summe sunt utilia.

In spirituum defectu, nihil magis valere expertus sum, quam aquam theriacalem, vel per se, vel in vehiculo cum salis vol. oleosi guttis aliquot, & croci pulvere, præcipue si cordis palpitatio eundem comitetur.

In tremoribus, spiritus animales aptis sunt reficiendi medicamentis, e quibus crocus maxime prodest. Nec non cibis potulentis magisque nutritiis, uti pullorum jure, & similibus.

In convulsione universali, præcipue a materiæ morbificæ versus interiora metastasi orta, cucurbitulis cum emissionem sanguinis usus sum feliciter. Deinde calefacientes spiritusque volatiles ægrotorum ori ingerendos, nec non enemata, imperare soleo. Quæ quidem in convulsionibus, præcipue puerorum, sunt proficua.

Ægritudo cum nausea, pectorisque calor signa sunt aphtharum imminuentium. Quæ mitigantur symptomata diaphoresi continuata, donec lingua aphthis oblecta fuerit. Et observare est, eodem tempore augeri aphthas, pustulasque miliares exarescere. E contra simul ac lingua aphthis nudata fuerit, pustulas miliares elevari. Et nonnunquam febris reliquias, post desiccationem pustularum, in aphthas nutriendas derivari.

Vomitioni occorro, addendo pulveris e chelis cancrorum comp. scrupulo, salis absinthii gr. x. Præcipue si calor febrilis æqualibus intervallis fuerit repetitus. Nisi aliquod symptoma (uti tonsillarum inflammatio, quæ salis lixivialis usu augetur) contra indicet.

In diarrhœa, quam sæpe astringentibus augeri expertus sum, vel eidem suppressæ aliud symptomata pejus succrescere, vesicatorium utiliter præscribo. Ut hujus & diaphoresis conjuncta ope materia terosa ab intestinorum glandulis revellatur, Margaritas etiam, vel per se vel cum aliquo conveniente diaphoretico, scrupuli pondere, sumendas vicibusque aliquot repetendas jubeo.

Vesicatorii efficaciam ad chronicam diarrhœam frequentissime expertus sum. Cujus rei jam præ manibus habeo instantiam in domina *Washia* puerpera, Mercatoris Hispanici in *Gloak lane* habitantis uxore, cui *D. Sherwood* est pharmacopœus. Horrore primo correpta fuit, deinde frigore & calore, incertis spatiis recurrentibus: nec non oppressione pectoris cum suspiriis, spirituumque defectu. Pulsus etiam ei debilis ac frequentissimus. Et passa est vigilas, fere usque ad enatas in lingua aphthas. Sub earum autem eruptionem erat admodum somnolenta; uti & aphtharum tempore infantes sunt. Ægritudine etiam ventriculi premebatur, & diarrhœa, cujus vi improba lochia ei suppressa sunt. Hanc mulierem sequentem methodo multos dies continuata ad sanitatem restitui.

24. Sper. Ceti, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ʒj. Croci gr. v. Syr. Paraly. q. s. Mf. f. Bolus sumendus sexta quaque hora e cochleari julapii communis. Et applicetur vesicatorium inter scapulas. Horum usu emicere pustulæ miliares, & paulatim minuebatur diarrhœa.

Et cum aphthis postea enatis creverunt pustulæ miliares, sine astringentium usu. Hujusmodi quidem medicamenta ægrotæ in promptu habuit, sed neque sumpsit, neque iis opus fuit.

Si theriaca, aliave opiata usurpanda viderentur, opportune id

Sydenham Opera Medica.

fit, post apposita vesicatoria; quæ prave opiatorum effectus inhi-

bent. Hoc etiam potenter efficiunt sudorifica opiatum admixta. E multis hujus rei exemplis, unum dabo in quadam domina *Roberts*. Illa secundo a partu die, dolore colico, sine vomitione aut diarrhœa, sed admodum vehemente & abdomini affixo, correpta fuit. Quapropter coactus sum, laudani liquidi guttas centum, sesquihoræ spatio sumendas, imperare. Attamen paulo postea pulveris e chelis cancr. compositi salisque volatil. oleosi dosim majorem offerendo, multas sudavit horas, dolorque sine ulla superstite querela evanuit. Contra ac in eadem muliere, & in eodem casu, sub cura alterius doctissimi Medici acciderat. Ille enim, dando laudanum sine sudoriferis, dolorem equidem sedavit, diutamen ægra de quadam inquietudine subsequente querebatur. Et liquido mihi constat ex laudano per se sumpto, omnes evacuationes plerumque supprimi. Quod si aliter contingat, forsitan non laudano, sed alio referendum est. Similiter ac si ex sumpto cortice Peruviano, aut vino Clareto, ob materiæ morbificæ congeriem, fibrarumve intestinorum imbecillitatem, vel quandam antipathiam, sequeretur diarrhœa. Neque post sumptum laudanum sudor nonnunquam profluens, & variolarum extumescencia, quicquam redarguunt, Quorum neuter a laudani natura; sed potius a morbi conditione immediate pendet. Nam ut in febribus, durante fermentatione, sanguis velocius movetur, naturaque secretionibus minime vacat; ideoque urinam tennem ægri mejuunt, desinente vero, crassam cum hypostasi turbidamque: pari modo, ubi motus sanguis ex sumpto laudano citatior compescitur, nervi relaxantur, porique aperti fuerint, in febribus sudor, in variolis pus eliminatur facilius. Natura itaque medicamenti non ex aliquo remoto & incerto, sed ex proximo illius effectu definienda est. Laudanum enim in quibusdam alvum movit. Quam observando regulam, Medici de laudani, aliorumque pharmacorum usu vel abusu, rarius disceptantes, magis amice honorificeque convenirent.

Hoc mihi in memoriam revocat effectum laudani memorabilem in femina quadam, ad insigne Solis in vico *Chancery-lane* vulgo dicto habitante. Illa, cum post abortum dolore colico vehementissimo laboraret, laudani magnas sumpsit doses, & per se repetitas. Unde urinæ, sedum, lochiorumque orta suppressio, maximusque tumor ventris brevi expectandam mortem prænuntiavit. Postquam autem inquisitione facta a morbi usque initio, inspectisque præcedentis Medici præscriptis, jam memorata symptomata, a laudani abusu, ut dictum est, provenire cognoverim; Enema injiciendum imperavi. A cujus operatione peracta, omnia, non sine astantium stupore, disparuere symptomata; quippe, non a morbo, sed ab usu laudani, oriunda.

De Febre Miliari composita.

Febbris miliaris composita est, ubi pustulæ miliares, papillis rubris (a *Resb* vulgo dictis) petechiis, variolis, aut morbillis sunt intermixtæ.

Symptomata eadem fere sunt, ac in febre syncho dicta. Spirituum tamen defectu & suspiriis ægroti magis opprimuntur. In vigilas etiam proniores sunt; & eorum urina sanorum est similior.

In febre cum pustulis rubris aliquando pustulæ miliares non tantum illis intermixtæ sunt, verum etiam penitus desiccatis supersunt. In variolis & morbillis pustulæ miliares plerumque præcedunt, & in principio eas comitantur.

In febre miliari composita symptomata sanguinis potius quam nervosi generis vitia præ se ferunt. Ubi nempe pulsus frequens est & fortis, calor intensus, lingua sicca, sitisque haud mediocris. In febre miliari simplice, e contra. Verum defectus spirituum, & oppressiones circa pectus, coacta suspiria symptomata sunt utrique communia.

Quod ad curationem attinet, ubi pustulæ miliares variolas & morbillos comitantur, diaphoretica medicamenta paulo calidiora tutiora sunt, quam in variolis per se existentibus.

Frigus externum, aut regimen quocunque modo frigidum, periculosum est, & mortis causa nonnunquam subitaneæ: tum etiam, cum pleraque symptomata optatum morbi eventum promittunt.

Quamobrem & opiata calida, ut diascordium, & similia, felicius cedunt, quam diacodium vel laudanum quoties variolis pustulæ miliares conjunctæ sunt.

De Morbis quibusdam Febri Miliari supervenientibus.

Præter febri miliari consequentia, de quibus ante mentionem feci, & in sequentibus historiis facturus sum, duo sunt, quæ paulo frequentius eidem superveniunt; nempe artuum inferiorum tumor, & calor hæcticus.

Tumor pedum & tibiarum, nec non femorum inguinisque fit, aliquando sine, verum sæpius cum dolore haud mediocri, tumori præeunte. Iste autem tumor, ex materiæ morbificæ congestis reliquiis, in his febribus non rite curatis, contingit. Cujus rei etiam si plura exempla proferre possim; methodum tamen, qua morbum profligare soleo, hic annexere sufficiat.

Ea autem est: Pilularum catharticarum, cum opio vel aliquo opiato, singulis noctibus sumendarum præscriptio. Opiatum mihi usitatum, est pilula de cynoglossa ad ʒj. Catharticum vero eligo, secundum coindicantia. Verbi gratia in appetitu & digestionem diminutis, pilulas stomachicas ad ʒʒ. In lochiis aut mensibus suppressis, pilulam aleophranginam, aut foetidam. Aliquando etiam resinæ julap. gr. iv. vel v. jubeo addenda. Et nonnunquam decocti amari sine seu haustum bis in die propino. Si cathartica paulo fortiora usurpanda sunt, alternis noctibus adhibeo, & decoctum aliquod stomachicum diebus interpositis sumendum præscribo. Et post plura alia medicamenta frustra sumpta, haud raro feliciter usus sum hac methodo.

Sin autem adsit tumor indolens, catharticis utor sine opiatis. Et si febrem miliarem comitetur tanquam symptoma, sola continuata diaphoresi dissipatur.

Spiritus etiam cochleariæ, tam simplicis, quam cathartici, usus in hoc casu maxime prodest. Simplicis efficaciam expertus sum in Domino *Bellasis*, circa ætatis annum octogesimum, febre vehementi correpto, inæque curæ a Regia majestate commendato. In quo

jam extinctæ febris tumor ab inguine usque ad pedum digitos supervenit, qui, post vesicatoria frustra adhibita, tandem spiritus cochleariæ simplicis usui cessit.

Spiritus autem tam simplicis, quam cathartici, scilicet cum julapio præparari, usum conjunctum, expertus sum felicissimum in D. Lane, quæ aliquo ante annos puerperio cubabat. Hæc dolore vehemente, cum tumore ab inguine ad pedum usque digitos, affecta, duorum Medicorum celebrium curæ submissa fuit; sed id incassum. Eandem itaque sceminam, spiritu cochleariæ simplice, ad 20. vel 30. guttas, e conveniente vehiculo ter in die sumpto, & spiritu cochleariæ cathartico, tertio quoque die deglutito ad guttas 100. nec non pilula *Matthiæ* die purgationis hora somni, penitus curavi.

Calor hæcticus, appetitus diminutio, spiritusque vitalis defectus, locum habent inter ea, quæ febris miliaris superveniunt. Præcipue, si patientes nimis cito de lecto resurgant. Cujus rei vidi quamplurima exempla.

Methodus, qua hic bonis avibus utor, est hujusmodi. Sumantur mane dies per aliquot falis absinth. gr. 10. aut 15. ex aq. spadanæ haustulo; & deinde paulatim ejusdem aquæ ℥ij. nempe, si spiritus maxime defecerint. Alias ex haustu aq. Bathoniensis, superbibendo ejusdem ℥ij. similiter. Ut hoc modo aciditatis, ubicunque in hac febre peccantis, reliquiæ, una cum prædictis aqua & sale, excernantur. Quod si talis absinthii usu caput doleret, præscribo medicamentum aliquod lenitivum, 3. vel 4. quoque die hora somni sumendum. Salsa & acida a cibis amovenda, nimisque corporis animique motus cohibendus. Nam ex ulterutro recidivam sæpe fieri experrus sum. Nec quicquam febris intermittens, e præproprio corticis Peruviani usu, recidivæ, certius occurrit. Cujus rei instantiam, in D. Warrand in *Mykstreet* habitante, & jam fere moribunda, vidi insignem; postquam duo alii Medici non incelebres, pro eadem, re infecta præscriperant. Et nonnunquam lac asinum, cum testaceis pulveribus, & præcipue margaritis, prodesse solet.

Historia Febris Miliaris cum Apoplexia.

Julii 16. 1697. ad Digniss. Virum D. Muscamp, Vicecomitissæ de *Lansborough* Maritum, in platea vulgo dicta *Pallmall* habitantem, evocatus sum. Cui D. *Malthas* erat pharmacopœus; idem qui jam Regius. Annum agebat ægrotus sextum & quinquagesimum. Constitutione erat pituitoso sanguineus, & obesus. Appetitu gaudebat optimo: deditus negotiis & cogitabundus. Ab aliquo retroacto tempore cum asthmate ac nephritico dolore laborasset, calculos nonnullos, usu olei lini ad cochlearia tria singulis noctibus a me præscripto, cum urina emisit. Proxime præcedentibus aliquot hebdomadis, calore interno, deinde & languore, sive spirituum defectu, sine ulla causa evidente, affectus est.

Supra dicto die subito correptus est apoplexia. Ut ex antecedentibus jam memoratis, respiratione cum stertore somni profundi æmulo, sensibusque læsis externis omnibus, certo comperi. Illamque a seroso potius quam grumoso sanguine stagnante oriri, facies ejus minus rubicunda monstrabat: ut clarius patebit ex meis Observationibus, quas de Apoplexia altera a stagnante & extravasato sanguine grumoso, altera a seroso, si vitam DEUS atque otium dederit, posthac in lucem emissurus sum.

Ad serosi sanguinis stagnantis excitandum motum, ac ventriculi & intestinorum onus amovendum, a quo sæpe tentatur caput, sequentem pulverem emeticum præscripsi.

℥℥. *Salis Vitriol.* ℥ij. f. *Pulvis in doses sex dividendus. Sumat singulas ex Aq. Juglandis comp. Cochl. j. superbib. haustum posseti foliis Card. bened. alterati.*

Spiritus etiam falis armoniaci naribus offerendum jussi. Et ut ægrotum, tam a saburræ in ventriculo, quam pulveris emetici reliquiis nascentem sæpe sequente die creantibus, liberarem, pilulas sequentes præscripsi.

℥℥. *Pil. Tard. Querc. ℥j. Resinæ Julapii gr. iv. Syr. e Spin. Cerv. q. f. Ms. f. Pilule, finita Emetici operatione sumende.*

Ad serosum laticem minuendum, sanguinisque adhuc magis accelerandum motum, emplastra præscripti vesicatoria, & mixturam spirituosam sequentem.

℥℥. *Salis vol. oleos. ℥iv. Spirit. Lavend. com. ℥ij. Ms. Sumat. gutt. xx. ex haustu decocti Hordei Syrupi Violaceo edulcorati: Hoc jussi vehiculum, ut, & lente augeam vim Pilularum, & Dysuriæ Dolorique Renum a Vesicatoriis, præveniam. Domum Emplastra subpedalia, ex Empl. Cephal. cum Euphorbio & Picis Burgundicæ ana æ. p. curavi applicanda.*

Die prædicti mensis 17mo ægroti assidentes mihi narrabant, illum statim a peracta vi vomitorii & somnolentia & stertore expergefactum, sensus omnes recuperasse.

Symptomata jam tum apparentia, hujusmodi fuere, vid. Tumor faciei, & totius capitis: quod eo anno in febre miliaris commune erat. Calor etiam febrilis, pulsus frequens, sed debilis; cum defectu spirituum, maximaque pectoris oppressione cum suspiriis scilicet, a malignitate morbi, non nimis evacuationibus. Quippe pulsus, post eas finitas, nihilo quam ante, debiliior fuit. Neque subiit alterationem, quoties de spirituum defectu ægrotus querebatur. Urina tenuitate aquea & satis copiosa; lingua humore albo & viscoso cooperta; sitis immunis, etiam si & insonis fuit. E quibus omnibus symptomatibus & præcipue ex oppressione pectoris cum suspiriis, spirituum defectu, (signis mihi pathognomonicis) febrem hanc esse mihiarem, pustulasque suo tempore expectandas præmonui. Nec quidem apoplexia, si hic non fuisset symptomata, sed primarius morbus, tam cito & perfecte evanesceret.

Ut itaque secundum meam methodum in hoc morbo consuetam, lenem & continuam foverem diaphoresin, irregularibus caloribus frigorisque paroxysmis occurrerem, tandemque lentam pustularem eruptionem efficerem, sequentia præscripsi.

℥℥. *Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥℥. Sumatur 6ta quaque hora e Julapii sequentis Cochl. j. superbib. Cochl. iv. vel v.*

℥℥. *Aq. Lact. alex. ℥vj. fl. Tiliæ ℥iv. Pæon. comp. ℥vi. Margar. pp. ℥j. Sacchari albiss. q. f. Ms. f. Julapium.*

Jussi etiam persistat in usu decocti hord. cum syr. violaceo: Ut & diluendo a dolore nephritico præcaverem, & satis materiæ fovendæ diaphoresi suppeditarem. Verum ne frigido nimis regimine spiritus ægroti deficerent, singulis decocti haustibus mixturæ spirituosæ

antea præscriptæ gutt. xx. addendas curavi. Ne omiserim indicationum, etiam si contrariarum, alicui satisfacisse. In qua re ars medicinalis præcipua consistit.

Ad viscidam materiam linguæ obductam præscripti mucilaginem ex sem. cydon. & psyllii, syr. e rubo idæo edulcoratam; cujus cochl. j. sæpe sumeret sensum deglutiendo.

Die 18vo, caput vi vesicatorii detumuit superius. Urina coloratior aliquando magis, & paucior. Spiritus, sudoris mediocris & mixturæ prædictæ cordialis beneficio, non tam multum defecerunt. Adhuc tamen depressi cogeant suspiria, cum querimoniis de pondere pectori incumbente. Quibus pensitatis, in omnium hæcenus sumptorum repetitione persistere decrevi.

Die 19no, eadem apparere symptomata, quæ antea. Si modo id excipias, quod caput leviter gravari incipit, & alvus, non obstante decocti hordei cum syrupo violarum usu, astricta fuit. Quibus ut prospicerem symptomatibus, renumque dolorem adhuc præcaverem, clysterem sequentem præscrip.

℥℥. *Decoct. commun. pro Clyst. ℥vij. Mell. Mercur. ℥ij. Sacch. rubr. q. f. Ms. f. Enema.*

Die 20mo, ex enematis usu liber erat a capitis gravedine. Ulcere autem e vesicatorio citius quam debuit exsiccato, prædictus tumor, spirituum defectus, pectoris oppressio, nonnihil renovari videbantur, sed sine quovis alio suboriente symptomate. Vesicatoria itaque pone aures applicanda jussi, decocti prædicti duabus libris aq. pæon. comp. ℥iv. addendas, & cum singulis illius haustibus spir. lavend. comp. gutt. xv. sumendas imperavi. Hisque non satis prævalentibus, aq. theriacal. cochl. j. vel ij. adhibenda, & circa quintam vespertinam enema repetendum.

Diebus 21mo, & 22do, & omnia symptomata cum sint mitiora, antea præscripta continuando, & solummodo emplastra subpedalia addenda curavi.

Die 23io, vesicarum ultimo excitatarum ulcera jam fere exsiccata sunt. Caput de novo extumuit, spiritusque magis defecerunt. Quamobrem mandavi, emplastra vesicatoria carpis apponenda, pulveris, julapii, & decocti usum continuandum, repetendumque enema præscriptum.

24to, omnia symptomata laudabilia, excepto urinæ pallore, capitisque gravedine cum quadam somnolentia. Quare cum metastasim metuerim, a prædicta methodo recedens, sequentes pilulas præscripsi.

℥℥. *Pil. Tart. Querc. ℥j. Resinæ Julap. gr. iv. Syr. e Rhab. q. f. Ms. f. Pilule statim sumende. Et cum continuato usu decocti hordei, ut ultimo parati, vesicatoria ampla femoribus internis applicanda jussi.*

Die 25to, urina tingitur aliquanto magis; caput sanatum optime; spiritus rediit, pustulæque miliares super pectore emicuerunt.

Si quis hic catharsim supra memoratam, quasi pustularum eruptioni contrariam, reprehenderet, effectus ipse objicienti respondet. Verum etiam reminisci debet, hujus ægroti habitum fuisse adiposum: Neque ex vomitu & catharsi primo præscriptis, elevatio tumoris in capite impedita fuit, sed materiæ morbificæ copiam minuendo potius accelerabatur.

Cum jam pustulas miliares pullulare viderim, Pulverem e chel. Cancr. comp. 4ta quaque hora e cochleari julap. sequentis sumendum jussi.

℥℥. *Aq. Card. Bened. Melissæ, Cinnamom. Hord. an. ℥ij. Epidem. ℥i℥. Marg. pp. ℥j. Sacch. albiss. q. f. Ms. f. Julap.*

Præscripsi etiam, ut cum decocto hordei apozematis sequentis haustulum sumat.

℥℥. *Rad. Scorzon. ℥j. Cort. Aurant. cond. ℥vj. fol. Melissæ, Galegæ, an. Mj. flor. Card. an. p. j℥. Sem. Card. bened. ℥℥. coq. in Aq. font. q. f. ad ℥℥. Colaturæ adde Aq. Epid. ℥ij. Ms. f. Apozema.*

Et ut per vices sumat aq. theriacal. cochl. ij. Ideo nempe, quod in hac febre, præcipue declinante, dum calent volæ manuum, superiora frigescent.

Die 26to, cum omnia viderim symptomata adhuc leviora, ultimo præscriptorum usum censui continuandum.

Die 27mo, pustulæ miliares numero & magnitudine auctæ sunt. Ideoque julapio ultimo præscripto hoc substitui.

℥℥. *Aq. Melissæ, Cinnamom. Hord. an. ℥v. Scord. Comp. ℥i℥. Epidem. ℥j. Syr. e Cort. Citr. q. f. Ms. f. Julap. de quo sumat haustulum in languoribus.*

Die 28vo, pustulæ visæ sunt adhuc magis elevari, spiritusque nullo modo defecere. Cum tamen dorso manuum frigescerent, ideo novissime præscripta continuari velim.

Die 29no, febris declinare cœpit. Quare julapium continuandum & enema injiciendum jussi.

Die 30mo, symptomata omnia evanuerunt. Quoniam tamen de aciditate quadam in ventriculo questus est; præscripti margarit. pp. ℥j. e julap. seq. cochl. j. sumendum aliquoties in die.

℥℥. *Aq. Lact. alex. Melissæ, Cinnamom. Hord. an. ℥ij. Epid. ℥j. Sacch. perlat. q. f. Ms. f. Julap.*

Deinde ut per biduum triduumve decocto hordei, cum spiritus lavend. comp. guttis aliquot, & julapio, ut persisteret. Demumque aquas strethamenses a ℥iv. ad ℥℥. coctas sumeret, ter iterando. Quibus remediis ab apoplexia, febre, renumque affectu perfecte liberabatur.

Historia Febris Miliaris cum Artuum inferorum Paralyfi.

Circa Decembr. finem, 1705. Vir humanissimus D. D. Garth. atque ego vocati fuimus ad D. *Throgmorton* viduam, Ducissæ *Nortumbriæ* filiam, dies aliquot antequam parturiret; cuique D. *Birch* ut pharmacopola ministravit. Fatigarunt illam vomitio fere perpetua & ægritudo. His etiam astrictio alvi, & inappetentia; tussis, & dyspnœa spirituumque defectus accessere. Quæ omnia ex mœnore ob nuperam mariti mortem contigisse æstimabantur.

Primo loco emplastrum stomacho applicandum, & aquam Strethamensem cum sale absinthii sumendam præscripsimus: nempe ut ventriculi & intestinorum motum restitueremus. Hinc equidem rarior vomitio; at nonnihil nutabant spiritus. Qui tamen, cum ægra postea puerperio cubaret, continuata diaphoresi quodammodo restituti sunt.

Verum circa tertium puerperii diem artus inferni, paralyfi correpti, suam movendi vim amiserunt. Et nocte proxime sequente adeo defecere spiritus, ut pene in syncope incidere. Quare & prædictus Collega meus nocte vocatus, emplastrum vesicat. femoribus quamprimum applicanda, bolumque sequentem sumendum præscripsit.

24. *Salis Volat. Succini gr. viij. Croci gr. iv. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ʒj. Conf. Conf. Alchem. sine odorat. q. s. ut f. Bolus cum Julapio appropriato deglutendus.*

Die proximo mane ægrotæ spiritus haud parum elevati sunt. Verum paralyfin nulla ex parte recessisse vidimus. Sed & mediocrem tumorem, & dolorificum eidem accessisse. Dixi, non infrequenter in febre miliari, paralyticos affectus, ex materia morbifica in artus descendente, suboriri. Deindeque statim ad ægotam accedentes in denudato pectore pustulas conspeximus miliaryes, febremque miliaryem, morbum originalem agnovimus. Unde concordi animo medicamenta diaphoretica aliorum omnium maxime necessaria decrevimus; & Januarii die 5to a nobis sequentia præscripta sunt.

24. *Pulveris e Chel. Cancr. comp. ʒj. Croci ʒss. Conf. sine odorat. q. s. Ms. f. Bolus sexta quaque hora sumendus e Cochbl. i. Julap. sequent. Superbib. Cochbl. iv. vel v.*

24. *Aq. Ceras. nigr. ʒx. Bryon. comp. ʒij. Sacch. albiss. q. s. M. f. Julapium.*

Januar. die 6to, ægrotæ paulo erat vivacior, pectusque illi minus oppressum: Dyspnœam autem ex tussi adhuc passa est, cum vigiliis. Quare & bolo, die præcedente præscripto, addidimus haustum sequentem.

24. *Aq. Puleg. Rutæ an. ʒj. Theriacal. Syr. de Mecon. an. Tinct. Castor. gutt. x. Ms. f. Haustus.*

Die 7mo, spiritus mediocriter refecti, expectoratio facilior, pustularumque miliarium eruptio magis conspicua. Bolum itaque iustum cum julapio repetendum, & haustum vesperi.

Die 8vo, omnia symptomata facta sunt mitiora, excepta paralyfi, & musculorum laryngis hysterica quadam convulsione leviori. Ideoque præter antea præscripta, pilulas e castor. gr. vi. & asse foetidæ gr. xii. sex parandas singulisque noctibus duas sumendas imperavimus.

Die 9no, respiratio longe magis quam antea difficilis, & dolori lateris pleuritico ac vehementiori conjuncta. Metuimus a venæ sectione malum eventum: tunc, ne exinde pustulæ miliaryes retrocessissent. Urgentia autem symptomata prævalebant; & emissi sanguinis sperato fructu, tum ægrotæ, tum nosmet freti sumus. Hoc tamen, non sine decocto pectorali, boloque antea in usu, & spermatidis ceri ʒss. sumptis. Quibus & addidimus emplastrum laterale e pice Burgundica, haustumque vesperi paregoricum, & oleum lini in promptu habendum, sumendumque urgente dyspnœa.

Die 10mo, respirabat paulo liberius, mitiusque latus doluit. Spiritus tamen defecere maxime. Interim miliarium pustularum moles conspicua & multitudo præbebant salutis spem haud mediocrem. Quas diaphoreticis adhuc solvendas pro penso habuimus in primis accurando. Et ad dyspnœam, etiamnum prævalentem, iussimus olei lini cochbl. ij., secunda quaque hora sumenda. Et si alvus inde laxa fuerit, mixturæ sequentis cochbl. aliquot bibenda.

24. *Diascordii ʒij. Aq. Pulegii ʒvi. Epidem. ʒj. Ms.*

Die 11mo, pustulæ miliaryes erant laudabiles, spiritus quodammodo refecti, dolorque aliquanto mitior. Respiratio tamen adhuc difficilis, sedesque paulo molliores. Bolo itaque & apozemati pectorali jam in usu adjecimus decoctum album alternis vicibus sumendum, emplastra vesicatoria brachiis applicanda, & hora somni haustum sequentem.

24. *Aq. Puleg. ʒij. Tinct. Martis gutt. xx. Ol. Amygd. dulc. ʒj. Syr. de Mecon. ʒvi. Ms.*

Die 12mo, pustulæ miliaryes satis conspicuæ; at difficilior respiratio, & diarrhœa, adhuc persistere. Bolum etiam cum julapio, oleum lini, mixturam cum diascordio, & haustum pacificum iterari volumus.

Die 13io subistere sedes, pustulæque miliaryes adhuc optime. Dyspnœa tamen, laterisque dolor, paulo pertinacior. Bolum itaque præscriptum continuandum. Et quod ab oleo lini maxime abhorruerit ægrotæ ol. amygdal. dulc. cochbl. j. tertia quaque hora bibendum. Nec non hyssopi folia cum radicibus helenii decocti pectorali addenda.

Die 14to cum intermittente diaphoresi, febrilem calorem accendi, continuari dyspnœam, & vesicarum ulcera pene exsiccata vidimus. Quare præter antea præscripta repetenda, vesicatorium inter scapulas applicari volumus.

Die 15to spiritus ei longe magis, quam ab aliquot diebus retro actis, fuere depressi. Loco itaque boli hætenus in usu, sequent. substituiimus.

24. *Confect. Raulcens ʒss. Croci, salis Vol. salis Armon. an. gr. vi. Syr. Caryophil. q. s. f. Bolus. Reliquaque ut antea sumenda.*

Die 16to, spiritus aliquanto vivacior, leviorque dyspnœa; dolor tamen lateralis paulo asperior. Ideoque bolum præscriptum priorem, haustumque pacificum cum decocto pectorali repetendum.

Die 17mo, eadem quæ die præcedente iussimus sumenda. Jam enim, & hinc in dies, omnia meliora videbantur. Tandemque membra, hætenus paralytica, vim suam motivam aliquatenus recuperavere. Postquam itaque mannæ ʒij. in decocto pectorali dissolutas sumpsisset, solum præscriptum tibiis applicandum, vini chalybeati usum, & ut Bathoniam adiret.

Historia Febris Miliaris cum Delirio Motibusque Convulsivis.

AUGUSTI 8vo, 1700. vocatus sum ad D. Bullock apud infirmeriam calcei Equini, in vico Cheapside vulgo vocato. Cui pharmacopœus erat D. Wyer in vico vocato Woodstreet. Vicefinum quartum annum agebat, constitutione pituitoso melancholicus, & adhuc cœlebs.

Post itinera quædam rure peracta sensit ægritudinem, cum diminuto appetitu, depressosque spiritus, atque oppressionem pectoris cum suspiriis, per intervalla. Pro remedio vinum nonnunquam, & aquæ cujusdam cordialis aliquantulum bibere solebat, appetitus tandem omnino aboletur. Et pridie quam illum visitavi, vomitu, diarrhœa, & hæmorrhagia narium correptus est. Sumpto autem medicamento quodam interno, & nuchæ appposito vesicatorio ex pharmacopœi præscripto, ista disparuere symptomata.

Cum ego primo ægotum adiverim, horrore quodam laborabat,

cum frigore & calore, se mutuo insequentibus, sed temporibus incertis. Maximam etiam pectoris oppressionem cum suspiriis & languorem spirituum passus est: nec non animi perturbationem, per intervalla ad delirium usque recurrentem. Item manuum & linguæ tremorem, cum motibus convulsivis & vigiliis. Pulsus etiam frequens & debilis; lingua viscositate alba obducta, sed sine siti; & urina sanorum similis.

Ex oppressionem pectoris & languore, hanc febrem in miliaryem, eamque ex inæquali calore ac leni simplicem, terminaturam prænovi. Ideoque carpis emp. vesicatoria, & plantis pedum alia ex cephal. cum euphorbio & pice Burgundica applicanda iussi, & sequentia sumenda ad lenem diaphoresim excitandam.

24. *Pulv. e Chel. Cancr. comp. Lapid. Goensis an. ʒss. Ms. f. Pulvis sexta quaque hora e Cochbl. j. Julap. seq. sumendus, superbib. Cochleari vi.*

24. *Aq. Ceras. nigr. ʒiii. Cinnam. hord. ʒiv. Epidem. ʒi. Sacchar. perluti q. s. Ms. f. Julap.*

Et ut sudor lenis continuo, & facilius emanaret, seq. apozema addendum curavi.

24. *Rad. Gragar. Chelidonia major, an. ʒ. Fol. Fragar. Mij. flor. Paralyseos, p. ij. sen. Cardui Benedict. ʒi. Bulliant. in Aq. font. q. s. ad ʒii. Colaturæ adde Syr. Croci, ʒi. Ms. f. Apozema, de quo sumat Cochbl. x. sepe in die.*

Die 9no, calor, sine subsequente frigore, regularis fuit & cutis humida; spiritusque non multum defecere. Æger tamen de quadam oppressionem pectoris cum suspiriis valde querebatur; & deliria, tremores, motusque convulsivi adhuc persistere. Ideoque pulveris julapii, & apozematis usum suavi continuandum. Et ad viscidam materiam, linguæ & palato obductam, mucilaginem, ex sem. cydoniorum & psyllii cum hordeo coctis, os colluendum præscripsi.

Die 10mo, calor similiter ac die præcedente regularis sine renovato frigore, cutisque humida. Sed motus tendinum convulsivi adhuc majores. Quapropter vesicatoria tibiis internis applicanda iussi: Lapid. Goensis ʒi. cum Pulv. de gutt. ʒss. ex Aq. Lact. alex. Cochbl. j. sexta quaque hora sumendum superbib. Cochbl. x. Et quoniam erat æger nauseabundus, regioni ventriculi apponendum emplastrum sequens.

24. *Empl. Stomach. Magistr. part. ij. Caranne, Taccamch. an. p. vi. Ol. Cinnam. gutt. vi. Ms. f. Empl. Et ut vicibus interpositis bibat haustum julapii cum gutt. xv. mixturæ ex Sp. C. C. ʒss. Tinct. Castor. ʒii. Et in quantum præscripta mucilago vix quicquam in viscidam materiam linguæ adhærentem prævalebat, gargarismatis sequentis usum imperavi.*

24. *Aq. Melis. ʒvi. Epidem. ʒi. Syr. de Althea, Jujubin. & Melis Mercur. an. ʒi. Ms. f. Gargarism. aquam addidi epidem. ne quid mali, etiam si parum deglutiret, accideret.*

Vesperi pleraque conspexi ut antea. Motus quidem convulsivi rarius iterabantur; verum spiritus valde defecerunt, manuumque superiora frigeant, volis interim calore affectis. Idcirco, omisso pulvere de gutteta, bolum sequentem præscripsi.

24. *Conf. Lujula ʒi, Bezaor. Orient. ʒss, Croci gr. vi. Castor. gr. iv. Syr. Paralyf. q. s. Ms. f. Bolus sexta quaque hora sumendus cum julapio antea præscripto.*

Die 11mo mala symptomata fere disparuerunt: ideoque ultima præscripta iussi continuanda. Sed quia apozematis patientem tædebat, in ejus locum substitui aq. lactis & decoct. pectoral. an. ʒii. pro potu ordinario, ut eo melius gustui gratificarem. Nec quicquam jam de diarrhœa, quasi ex decocto accidere possit, metum offerebat.

Vesperi omnia ut antea. Proindeque in usu omnium ultimo præscriptorum persistendum decrevi.

Die 12mo similiter, excepta quadam corporis inquietudine. Ad quam vesicatoria pone aures applicanda iussi, & sequentem haustum statim sumendum.

24. *Aq. Paralys. ʒiii. Croci ʒss. Syr. Paral. ʒss. Ms. f. Haustus.*

Die 13io inquietudini prædictæ jam abolitæ supervenit hæmorrhagia narium. Quare suavi ægro, ut assatim bibendo potum ultimo præscriptum sanguinem dilueret: sed & persisteret in usu boli, julapii, & mucilaginis. Et si de novo accideret hæmorrhagia, sequens sumeretur haustus.

24. *Aq. Spermat. Ranar. ʒiii. Syr. Plantag. ʒi. Ms. f. Haustus.* Sub vesperam hæmorrhagia substitit. Reliqua symptomata, viz. delirium, tremores, motus convulsivi, languores, pectorisque oppressio, in statu eodem fere ac antea fuere: ideoque & ultima præscripta continuavi. Hoc solum addendo, ut apozematis, ex decocto hordei ʒii. syr. viol. ʒii. sumeret cochbl. x. ter in die, tepide.

Die 14to, ægroti conditio pene eadem: nisi quod aliquanto magis delirabat. Immiscui itaque singulis bolis camphoræ grana aliquot: & cætera continuanda iussi.

Die 15to pustulæ miliaryes tandem emissæ spiritus animales elevarunt; attamen tremores motusque convulsivi iidem manebant; & delirium potius videbatur exacerbari. Cum autem id fieri ex eruptione pustularum nimis tarda ac rara existimarem; antimonium diaphoreticum (cujus efficaciam, tum ad pustulas expellendas, tum ad sedanda deliria, expertus sum) sequenti modo præscripsi.

24. *Antimonii Diaphoret. ʒi. Conservæ Lujule ʒss. Syr. Paralyf. q. s. Ms. f. bolus sumendus e cochleari potus pectoralis, superbibendo haustum ejusdem. Post horas quinque bolum cum castoreo & croco sumendum iussi, atque ut alternis vicibus repetantur. Et ut injiciatur gargarismus ope syringæ sæpe in die: quia lingua, antimonii diaphoretici usu, frequenter viscido humore inficitur.*

Vesperi uberius altiusque extabant pustulæ; aliaque symptomata mitiora sunt, delirio solo excepto. Quare & prohibui volatilia, antimonium autem diaphoreticum quinta quaque hora, cum decocto pectorali, repetendum mandavi; & gargarismatis julapiique usum continuandum.

Die 16to, pustulæ erant adhuc crebriores, eæque majores quam quæ primo pullulabant. Longe etiam levius delirium per intervalla. Ideoque censui optimum fore, ut ægrotus persistat in ultimo præscriptorum usu. Quoniam tamen tremores, motusque convulsivi, non obstante pustularum eruptione, ex aliqua parte manebant, vesicatoria brachiis internis applicanda iussi.

Vesperi omnia pene ut tempore matutino, excepto delirio, quod sit adhuc mitius. Ex causâ nempe metastasi, a cetero in brachia. Nam motus convulsivi intensiores fuere: Quare & ultimo præscripta judicavi continuanda.

Die 17mo, pustulæ numerosiores auctioresque erant.

Motus tamen convulsivi reliquaque symptomata prope eadem. Tussis autem ac languor aliquanto graviores. Quare & antea præscriptis addidi aq. theriacal. cochl. j. in spirituum deliquis, & usum seq. apozematis.

2℥. Decoct. Peñoral. ℥ij. Syr. Croci ℥j. Mf. sumat Haustum frequenter.

Vespere tussis spirituumque defectus fuere leviores: ideoque ultimo præscripta continuanda imperavi.

Die 18vo omnia ut die præcedente vidi, eademque remedia curavi repetenda.

Post horas autem aliquot elapsas a meo discessu iterum accersor. Motus enim convulsivi aucti fuerunt ex improvise, spiritusque magis defecerunt. Exinde vero nil metuebam; pustulæ enim copiosissimæ enatæ, motusque aucti convulsivi, delirium mitigarunt. Præscripsi tamen Pulv. de gutt. cum Sem. Pæonia, & haustum ex Aq. Card. bened. ℥iij. Croci, ℥ss. Syr. Caryoph. ℥ij.

Eodem die, paucas post horas, nuncius ad me occurrit, qui aiebat, ægrotum brevi moriturum. Quem cum revisi, laborantem inspexi motibus convulsivis, iisque gravioribus. Sed exinde delirium fuit mitius. Et prædixi illius matri, similes motus repetitos iri, donec a delirio perfecte liberaretur. Et ut prædixi, a proxime sequente paroxysmo omnino evanuit: & tam animi quam membrorum quies restituta fuit. Cavendo tamen ne prædicta symptomata novarentur, sequens apozema (sæpissime in adultis, præcipue autem infantibus expertum) præscripsi.

2℥. Ungule Alcis rasæ ℥j. Sem. Pæon. Visc. Querc. an. ℥iij, Ræs. Cran. Human. ℥ss. Coqu. leniter in Aq. font. q. f. ab ℥ijss. Colaturæ adde Syr. Pæon. comp. ℥iij. mf. f. Apozema Sumat. Cochl. x. requenter. Jussi etiam manuum volas pedumque plantas oleo succini illiniendas; succum rad. paralyf. tempore paroxysmi naribus attrahendum: sumendumque bolum sequentem.

2℥. Conf. Anthos, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ℥j. Castorei gr. vi. Syr. Pæon. comp. q. f. mf. f. bolus sumendus e julapio antea præscripto. Et ne prædicta, si forsan repeterentur, symptomata, tandem in apoplexiam vel convulsionem generalem terminarent, addidi antimonium diaphoreticum, ad pustulas miliares adhuc numerosius altiusque expellendas. Et ad seri sanguinis morifici extrahendas reliquias vesicatoria femoribus applicanda jussi.

Die 19no pustulæ copiosissimæ ad tantam crevere molem, ut latæ unguis medietatem æquarent, ut ægroti verbis utar. Delirio deinde motibusque convulsivis profligatis, manuum duntaxat tremor, corporis debilitas spirituumque aliqualis languor superstites fuere. Boli itaque & antimonii diaphoretici loco jussi pulv. e chel. cancr. comp. ℥j., cum julapio antea præscripto sexta quaque hora sumendum, ad leniter continuandam diaphoresin. Ut languoribus aqua theriacalis usurpetur: in potum ordinarium apozema antepilepticum. Et ad linguam, adhuc quodammodo affectam, gargarisma.

Die 20mo omnia in eodem loco ac in die præcedente stabant. Excipe id tantum, quod pustulæ videbantur paulo minus turgescere. Mandavi itaque ut antimonium diaphoreticum pulvisque e chel. cancr. compositus alternis vicibus sumerentur. Et gargarismatis, & julapii, & apozematis ultimo præscripti in usu persisteret.

Die 21mo pustulæ versus siccitatem declinabant.

Apozema tamen, cum pulv. de lap. goenf. & pulv. de gutt. censui continuandum. Nec non gargarisma cum mucilagine, ad linguam nondum ab immunditie omnino liberam.

Vespere calorem linguæ sensit, & internum, sine sudore. Præscripsi itaque margaritarum pp. ℥j, singulis dosibus pulveris jam in usu addendum. Et ex haustu potus ordinarii spir. C. C. gutt. xx. secunda vel tertia quaque hora sumerentur, donec lenem diaphoresin excitaverint.

Diebus 22do & 23io, cum omnia optata viderim, novissime præscripta decrevi repetenda.

Die 24to, cum internus calor usque persisteret, pulverem jam in usu suavi continuandam. Et in languoribus sal. vol. oleof. cum spir. C. C. ex haustu potus ordinarii sumendum.

Diebus 25to & 26to, reliqua omittendo, solummodo sal. vol. oleof. ex potu ordinario sumend. jussi. Et julapium sequens ad languores, si forte acciderint, in promptu habendum.

2℥. Aq. Ceras. nigr. ℥viii, Scordii compos. Saxon. frigid. an. ℥ij, Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. an. ℥j. Mf. Et sic tandem æger perfecte convaleuit.

Historia Febris Miliaris ex Opii usu desinentis in Apoplexiam.

Augusti 4to, 1697. evocatus sum ad D. Thom. Western, in Vico Tames street dicto, cui D. Lancashire, erat pharmacopæus.

Vir ille habitu obeso gravabatur, & plethora; magno capite, buccinata facie brevique collo præditus. Unde & quocunque morbo antea laboraverat, caput ei semper doluit, & delirabat. Ante dies aliquot lavavit pedes, & cum amicis libere comedit. Postea vero de nausea & ægritudine, cum calore & frigore irregulariter recurrentibus, spirituumque languore & oppressione pectoris cum suspiriis querebatur, nec aqua quædam cordialis, quam sponte sumpsit, ægritudinem levavit.

Cum prædicto die illum viderim, pulsus erat frequens & debilis, nausea & ægritudo nihilo mitiores. Cum calore & frigore, vicibus alternis, sed duratione incertis, spirituum defectus, pectorisque maxima oppressio cum suspiriis. Nec sine quadam perturbatione, quoties somnus irrepere incepit. Quibus omnibus rite perpensis, in primis haustulum sequentem præscripsi.

2℥. Salis Vitriol. Vomit. ℥ijss. Ex Aq. Jugland. comp. sumatur. Et in languoribus bibat julapii sequentis haustum. 2℥. Aq. Mentb., ℥x, Epid. ℥ijss. Sir. Mentb. ℥j. Mf. f. Julapium.

Die 5to nausea & ægritudo minores sunt. Idem vero languor, eadem pectoris oppressio, & ægroti dormituri perturbatio. Pulsus adhuc frequens & debilis. Manuum caluere volæ, minime superiora. Urina sanorum similis; calorque internus sentitur absque siti. Ex quibus symptomatibus novi febrem adesse miliarem. Ut itaque lenem excitarem adiaphoresin, propinque potu illam fovendo symptomatibus prædictis obstitere, sequentia præscripsi.

2℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. gr. xxv. Syr. Caryoph. q. f. Mf.

f. bolus e julapio antea præscripto sumendus sexta quaque hora.

2℥. Decoct. hord. ℥ijss. addendo inter coquendum cocchinellæ ℥j: colaturæ adde Syr. Caryoph. & Viol. an. ℥j. Mf. f. Apozema. Sumat haustum per intervalla.

Vespere omnia vidi emendatiora. Ideoque bolum ad ℥ss, augendum & continuandum præscripsi. Ut persisteret in usu apozematis; & in languoribus, cum salis volat. oleof. gutt. xx, vel aq. theriacal. cochl. ij. At si remissior fuerit diaphoresis, loco salis volat. oleof. spir. C. C. gutt. xx. sumeret. Et quoniam patientis amici eundem narrabant in nullo morbo tandiu a delirio fuisse liberum, hoc itaque præcavendo, vesicatorium nuchæ, & emplastra subpedalia applicanda præscripsi.

Die 6to, mane, cum omnia eadem ac die præcedente viderim, jussi antea præscripta continuanda.

Vespere, quædam in pejorem partem inclinabant. Paucula enim verba locutus est inepte; & cum nausea singultiebat. Præscripsi itaque empl. stomachic. magistral. cum caranna, taccamahacca, & ol. cinnamom., regioni ventriculi applicandum; & possetum salvia & semine anethi alteratum: utpote in singultu a me probatum & expertum, pro potu ordinario.

Die 7mo, minus singultiebat; post duas tresve sedes, a delirio omnino liberabatur; pustulæque miliares super pectore emicuerunt.

Hodie ægroti amici alium Medicum mihi addiderunt collegam. Is sedes, ne pustularum eruptioni obstarent, cohiberi voluit; ideoque astringentia ex diascordio & similibus quamprimum adhiberi. Ego vero, sumendo argumentum a materiæ morbificæ colluvie, nempe tum ad pustulas replendas, tum ad sedes sufficientes, suavi contrarium. Allegavi etiam, exempli loco, sceminam quandam generosam, quæ a diarrhœa, errore quodam suppressa, indeque morbosa materia ex partibus inferioribus in cerebrum irrumpente, paucas post horas obiit. Et in nostro patiente, scilicet obeso habitu, brevique cervice, & ea ratione ad apoplexiam proclivi, multo magis humorum metastasin nos cavere instabam debuisse. Attamen, ut in hac re mediam ineamus viam, assensum haud difficilem præbui, præscripsimus itaque bolum ex margaritar. & corallior. pp. an. gr. xv. salis absinth. gr. vij. syr. caryoph. q. f. Et ut bibat decoctum album, cochinnella concocta, & aq. cinamom. hord. alteratum, instar potus ordinarii. Ut emplastrum ex galbano umbilico applicetur; ut & mucilagine, aq. rosarum extracta, os madescat.

Vespere diarrhœa multo mirior fuit. Sed aliquanto plus delirabat æger; forte a sedibus rarioribus. Neque a singultu omnino abstinent. His animadversis, addidimus antea præscriptis emplastra vesicatoria brachiis internis applicanda. Emplastra etiam subpedalia, & possetum alteratum, ut a me antea præscriptum.

Die 8vo, tertius Medicus ad consultandum vocatus suam opinionem, de sedibus necessario suppressendis, statim proposuit. Dixitque alias impossibile fore (ut ipsius verbis utar) pustulas emitti. E contra Medicorum prior, atque egomet objecimus materiæ morbificæ abundantiam, & delirium, aliaque periculosa symptomata, ex illius metastasi metuenda: Sed frustra. Ille itaque sequentia præscripsit.

2℥. Theriac. Androm. ℥ss, Pulv. e Chel. Cancr. comp. Spec. Confect. de Hyacinth. an. gr. xii, Syr. Cydon. q. f. mf. f. bolus sumendus e julapii seq. cochl. j. superbibendo julapii dimidium quam primum, reliquum post horam vel primam sedem.

2℥. Aq. Cinnam. Hord. Mentb. an. ℥ij. Epidem. ℥j. Syr. e Mecon. ℥ss. Diascordii ℥j. mf. Et emplastra vesicatoria tibiis applicanda. Collega primo vocatus illi assensit de bolo sumendo; sed julapium constanter reprobavit. Nihilominus ambo medicamenta (circa noonam matutinam præscripta) sumpta sunt.

Circa tertiam vel quartam pomeridianam iterum convenimus, intelleximusque patientem statim a suppressis sedibus in apoplexiam incidisse. Quem etiam, pustulis miliaribus in universum deletis, sensibus orbem vidimus. Quare & vesicatoria capiti & carpis quamprimum applicanda jussimus, sternutatorium e flor. lilii conv. insufflandum, & sequentia sumenda.

2℥. Salis Vol. Oleof. Tinct. Castorei sp. Lavend. comp. an. ℥j. mf. Sumat frequenter gutt. xxx. circiter, ex haustulo julapii seq.

2℥. Aq. Meliss. Rutæ an. ℥iij, Pæon. comp. ℥ijss. Spir. Lavend. comp. ℥iij. Tinct. Castor. ℥j. Syr. Pæon. comp. ℥j. mf. f. julapium ut supra sumendum. Sed incassum omnia; nam paucas post horas mortuus est.

Historia Febris Miliaris ex Aere frigido admissa Lethalis.

SEPT. 25. 1700. evocatus sum ad D. Arnold. Cerevisarii Westmonasteriensis uxorem. Cui obstetricis officium præstitit D. Watson: Et pharmacopæi D. Proughton, in Vico vocato Turtlestreet.

Illa, antequam parturiret, dolore colico, (ventriculo, ut aiebat, quasi onusto, & spirituum defectu ingemuit.

Cum die supra dicto primum adiverim, aquæ serosæ, ex membranis factum in utero includentibus, sed jam diruptis, effluxerunt, & infantis caput extra orificium uteri internum hærebat. Nempe ex viæ angustia, capitis mole majori, spirituum defectu, doloreque mitiori, quam qui ad partum sufficeret.

De eodem spirituum defectu, etiam post partum exemptum, adeo querebatur, ut astantes omnes illam putarent brevi morituram. Cum autem hoc symptomata jam idem videretur ac ante partum, idemque pulsus, imminens periculi nil metuens, febrem adesse miliarem palam indicavi, pustulasque prædixi miliares, tandem aliquando exituras. Ut itaque lenem diaphoresin consueta mea methodo excitarem, seq. præscripsi.

2℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Castorei gr. iv. Syr. Paralyf. q. f. mf. f. bolus quamprimum sumendus e coch. j. julapii comunitis.

Die 26to Medicus alter magni nominis de patientis salute consultit. Quam adhuc de spirituum defectu & appresso pectore querebantur audivimus. Ex quo præcipue symptomate prædixi etiam alteri Medico, pustulas miliares suo tempore erupturas.

Ægrotæ pulsus frequens adhuc & debilis; calor universus, & sine alterno frigore; urina sanorum similis; verum a colico dolore (foran alvi bis solutæ beneficio) libera evasit. Ne tamen lochia minuerentur ex diarrhœa, pilulas imperavimus sequentes fumendas.

2℥. Ca.

24. *Castorei* gr. vi. *Assæ Fætid.* gr. xii. *Laud.* Lond. gr. j. *Syr. Atrip.* q. s. *ms. f. Pilul.* n. vi. fumant ii, urgente alvo; & deinceps quarta quaque hora. Sumatur autem e cochl. i, sequentis julapii superbib. haustulum ejusdem.

24. *Aq. Ceras.* nigr. ʒviii. *Cinnam.* *Hord.* ʒiv. *Epidem.* ʒx. *Margar.* pp. ʒi. *Sacchar. albiss.* q. s. *ms. f. Julap.* fumendum, ut supra præscriptum est in languoribus.

Die 27mo ægotam in eodem statu, quo die præcedente, vidimus: excepta leviori quadam cordis palpitatione. Jussimus itaque ut persistat in usu pilularum cum julapio, sumatque gutt. xx. salis volat. oleos. in haustu potus ordinarii, & in languoribus prædictum julapium.

Die 28vo, pustulis miliaribus jam in conspectum eminentibus, spiritus minus defecerunt, mitiora suspiria, minor oppressio. Recte etiam effluebant lochia, & alvus mediocriter soluta fuit. Consuli-mus itaque pilulas sine laudano sexta quaque hora sumendas. Mater vero puerperæ, mortem ex diarrhœa pertimescens, obnixè rogabat sisteret. Et ut videamur ex aliqua parte ad ejus mentem accedere, mandavimus sequentis julapii usum.

24. *Aq. Menth.* ʒii. *Epid.* ʒiʒ. *Confectio.* *Fracast.* ʒi. *Syr. de Mecon.* & *de Menth. an.* ʒʒ. *Ms. f. Julap.* de quo sumat cochl. iv. urgente diarrhœa. Et ut persistat in usu salis vol. oleos. & julapii perlati.

Die 29no, ægotam visitantes, intelleximus admodum timuisse matrem ob diarrhœam, & illi multo largius, quam a nobis concessum est, de julapio præbuisse: Sedesque exinde primo inspissatas fuisse, postea omnino suppressas. Unde & palpitatio, pectorisque oppressio, majores subsecutæ sunt. Quapropter & sequentia censuimus sumenda.

24. *Eroci* ʒʒ. Sumatur e Cochl. j. *Aq. Lactis superbib.* Cochl. v. Sumat, etiam *Tinct. Croci* gutt. xx. ex haustulo *Aq. Lactis* sæpe. Usu etiam croci, ad cordis palpitacionem, fluxum lochiorum, spirituum defectum, pustulasque miliares altius emittendas, respectum habuimus: Demumque persistat in usu pilularum sine laudano, & julapii in languoribus. Et matris importunitati cedentes, præscriptimus etiam julap. cum diacordio in promptu habendum: dicebat enim mater, se id velle. Ægotæ etiam percontanti, an semet in lecto erigere, & ventilabro uti liceat, necne? assensus est alter Medicus. Atque etiam, ut in se collectis cortinis pateat lectus; ignisque extrueretur vel nullus vel duntaxat parvulus. Interim mihi ab illa quærenti, an ex aere frigido, collo vel pectori admissio, quicquam mali sentiret? respondet, semet exinde spirituum defectum pectorisque oppressionem sensisse. Quamobrem illam obnixè rogavi, ut toto illo die calido utatur regimine; eoque potius, quod ille esset dies febris lactæ: ne cessante diaphoresi pustulæ miliares retrocederent. Sed a nostro discessu sibi aerem admisit, pustulæque miliares subito occultabantur. Unde materiæ morbificæ in cerebrum facta est metastasis, statimque ægra sensibus orbata est.

Cum eventus meæ responderet prognosi, seorsim vocatus sum: sed jam nullum vidi præscribendi locum.

Ex hisce duabus historiis clare constat, febrem miliarem, cum symptomatibus mitioribus incipientem, ex nimio errore fatalem sæpe exitum habere.

Historia Febris Miliaris, ubi quoddam Animi Deliquium maxime mirabile supra biduum erat continuatum.

SEPT. 12. 1697. advocatus sum ad D. Hall, ad insigne Leopardi in *Blackman-street*, prope divi Georgii Templum habitantem, nono post partum die. Cui pharmacopæus D. Bynn, & obstetrix D. Critter, in vico *Abchurch-lane* vulgo dicto.

Hæc puerpera annum agebat trigesimum octavum, & sextum jam partum enixa est. Constitutione debilis, tam ex partu semper difficili, quam dolore colico sæpe recurrente. Quemque nuper passa est, cum calore & frigore alternis, & cum oppressione pectoris, spirituumque languore. Quæ symptomata ab amicis tantummodo vapores, ut vulgo vocant, usque ad diem quo infans baptizatus est, communi errore, æstimabantur. Quo die visitantium multitudine adeo fuit obstrepera, ut exinde spiritus ejus, antea debiles intense perturbarentur, & tremore ac motibus convulsivis correpta fuerit: Tantaque corporis inquietudine laboraverit, ut maritus vix potis esset eam in lecto retinere. Donec tandem, die scilicet illum quo advocatus sum præcedente, in convulsionem universalem incidit, & summo languore jacuit quasi pene mortua.

Die supra dicto, cum circa nonam matutinam patientem visitaturus sim, mihi domestici narrabant, maritum ejus meum adventum per nuntium inhibuisse: jussisseque, si forte adsim, neme in cubiculum admittant: putabat enim illam revera animam reddidisse. Et cum, nolentibus illis, ægotam adiverim, illam equidem absque pulsu, absque respiratione (ut per speculum ori & naribus appositum probavi) facieque mortis pallidissima, in lecto immotam & extensam ego & astantes conspeximus.

Nihilominus e facto scrupulosiori de antecedentibus scrutinio conjecturam feci, mortis similitudinem illam a materiæ morbificæ in totum genus nervosum metastasi provenisse. Nam mihi hic in mentem id venit, quod notatu dignum est in pisciculis tubulo vitreo inclusis, & per microscopium inspectis: in quibus, scilicet, conspicua est sanguinis circulatio, etiam si mortui videantur. Prohibui itaque ne per dies aliquot hanc ægotam stragulis denudarent, & non ante septimanam sepeliendam. Et multa contentione obtinui cucurbitulas cum scarificatione, inter scapulas, & femoribus internis applicari permittant, emplastra vesicatoria pone aures & super oarpi apponi, tempora & manuum volas pedumque plantas oleo succini illiniri; succum paralyseos, & ex helleboro, salvia, & floribus betonicæ sternutatorium pulverem, naribus alternis vicibus insufflari; & haustum ex aq. lact. ʒvi., nec non apozema pro D. Bullock præscriptum, si fieri possit, vi in os injici.

Post pene biduum, die scilicet 13tio, circa quartam pomeridianam, missi ad me domestici narrabant, Chirurgum, simul ac hanc puerperam inspexerat, admiratione perculsum interrogasse, accucurbitulas mortuæ applicari vellent. Utcunque tamen eis morem gerens cucurbitulas femoribus apposuit; at non inter scapulas, adeo multum rigebat. Vesicatoria etiam carpi applicarunt. Cæterum die supra dicto, nempe 13tio vesperti, licet ne minimum respiraret, visa est tamen parum calefcere. Jussi itaque cranii humani ʒi., cum aq. rutæ & syr. artemisiæ, si fieri possit, in os immitti.

Die tandem 14to, circa quartam matutinam, mollissime respirare, atque etiam deglutire incepit. Ideoque emplastra vesicatoria inter scapulas applicanda iterum præscripti. Et ut gutt. xx. salis volat. oleos. sumat sine vehiculo. Quo facto, pustulæ miliares demum in conspectum venere. Et in earum incrementum sequentia sumenda consului.

24. *Pul. e Chel. Cancr. comp.* ʒʒ. sumatur quarta quaque hora, e cochl. j. julapii sequentis superbibendo cochl. iiij.

24. *Aq. Cinnam.* *Hord.* ʒiv. *Rutæ* ʒiii. *Pæon. comp.* ʒiʒ. *Sacchar. albiss.* q. s. *Ms. f. Julapium.*

Et ut bibat de apozemate ex ung. alcis pro potu ordinario.

Die 15to loqui, seseque movere valuit; & de dolore ex vesicatoriis edidit querimoniam: Pustulæque miliares super pectus pullularunt copiosissime. Ideoque antea præscripta censui continuanda.

Die 16to pustulæ molem acceperunt adhuc multo majorem, mensque illi redintegrata est. Nec amplius oppressione pectoris, aut languore, sed sola corporis imbecillitate, laboravit. Quapropter & sequentia præscripti.

24. *Pulv. e Chel. Cancr. comp.* gr. xxv. *Aq. Lact. alex.* ʒiʒ. *Epidem.* ʒii. *Ms. f.* haustus sexta quaque hora sumendus.

24. *Rad. Scorzon.* *Hisp.* ʒi. *Cort. Aurant. cond.* ʒvi. *fol. Galeg. Meliss. an.* ʒj. *flor. Card. an.* pi. *Sem. Card. bened.* ʒʒ. *Coqu. in A. font.* q. s. ad ʒiʒ. Addendo colaturæ *Syr. Limon.* ʒi. *Ms. f. Apozema*, de quo sumat haustum ad libitum; & in languoribus aq. theriacalem.

Ægotam adeo bene se habentem abhinc usque addiē 19num omni visitare. Jamque solum stomachica quædam amara præscripti, ad acuendum appetitum, sumeretque post quartam noctem *Sacram Tincturam*, aqualque *Stretthamenses* die sequente. Quo facto, in omnium admirationem perfectè convaluit. Tamen, ut audiui, in nate, durante febre, nimis compressa passa est sphacelationem. Qua Chirurgi ope sanata, alios quinque vixit annos; tandemque, ut mihi ejus maritus retulit, ex dolore colico & convulsione eidem superinducta e vita discessit.

Historia Febris Miliaris in Chronicum Morbum terminantis.

JAN. 14to, 1699. evocatus sum ad D. Berenberg, puerperam, tunc in platea *Walbrook* vulgo vocata habitantem. Cui ut pharmacopæus inserviebat D. Basket. Obstetricis autem officium præstabat D. Taylor, in platea *Pater-noster-Ron*.

Querebatur, dum parturiret, de virium maxima imbecillitate. Et post partum, ut assistentes mihi narrabant, tanta oppressione pectoris, cum spirituum defectu, laboravit, ut ad trahenda suspiria cogèretur. Ex illis tamen symptomatibus nihil præter hystericos vapores, ut vulgo vocant, suspicari sunt. Pridie autem ejus diei, quo me advocarunt, cum mammas ad lactandum infantem denudasset, ad relaxandam alvum super aquæ calefactæ vaporem sedisset, frigori multo semet exposuisset; exinde tandem spirituum angustia, respiratione difficili, asthmatis convulsivi æmula, tussique sicca, adeo depressa fuit, ut illi mortem esse in propinquo existimaverint.

Cum primum illam adiverim, de prædictis affectibus, atque etiam de vigiliis querelas edidit. Pulsus illi erat frequens & debilis, & febrilis calor. Urina tamen pallida, & lochia omnino suppressa.

Ex antecedentibus supra memoratis illam febre miliari laborare censui: attamen in principio mitiori. Quamdiu, scilicet, consueto puerperarum regimine gubernaretur. Postquam autem, eo ipso tempore, ut verosimile est, quo miliarium pustularum eruptio instabat, se irruenti frigori denudaverat; materiæ morbificæ, retrogrado motu pectori interiori impactam, supradictum asthma creasse, conjectare licet. Nam ut in pectore a me inspecto pustulas tunc primo pullulantes, ita & duntaxat paucissimas, cernere potueram.

Statui itaque, mihi consueta methodo, lenem sudorem & continuum excitare. Et ut alia medicamenta, convulsivo asthma, reliquisque symptomatibus, puerperisque comoda adjungerentur. Quamobrem & sequentia præscripti.

24. *Spermatis Ceti* ʒj. *Bezoar. Orient.* *Croci an.* ʒʒ. *Syr. Herder. terrestr.* q. s. *Ms. f.* bolus sumendus e Cochl. j. *Aq. Lactis alex. superbibendo* Cochl. x. His enim lochiis promovendis, asthma levando, excitandis spiritibus, & sudoribus magis liberis consului. Et ut patienti illiusque amicis placerem, qui hanc febrem hysteri-cum affectum æstimarunt, atque etiam lochia feliciter continuarem, pilulas sequentes præscripti.

24. *Castorei* gr. vi. *Assæ fætid.* gr. xii., *Syr. Pæon. comp.* q. s. *ms. f. Pil. no. vi.*

Die 15to optime se habebat. Nam ex quo bolum sumpserat, spiritus fuere eleviores, faciliior respiratio, renovatur effluxus lochiorum, urina coloratior, pustulæque miliares super pectus magis conspicuæ. Bolus itaque die præcedente præscriptum censui repetendum. Addendo *Pulv. de gutt.* grana aliquot, ne asthma convulsivum recurreret. Umbilico etiam emplastrum ex taccamahacca, & emplastra subpedalia applicanda jussi. Et in languoribus sumeret haustum julapii perlati: Nec non aq. theriacalis cochl. ii. alternis vicibus.

Vesperti, ex leni persistente sudore, respiratio adhuc facilis, pustulæ miliares densiores, spiritusque minus defecere. Ideoque, ut in usu bolorum antea præscriptorum persisteret, duxi optimum fore: sumeretque, pro re nata, succi fimi equini in *Aq. Card. Bened. & Puleg.* infusi & expressi. Nimirum, ut lochiorum effluxus, volatilibus fimi particulis, excitaretur.

Die 16to noctem intellexi præcedentem sine ullo symptomate ægotæ transisse. Antequam vero ab illa discessi, respiratione convulsiva iterata, vires subito diminutas sentiit. Præscripti itaque haustum sequentem.

24. *Aq. Lact. alex.* ʒiii. *Epidem.* *Syr. Curioph. an.* ʒii. *Epid. Goens. de gutt. an.* ʒi. *ms. f. Haustus.* Et post horas sex sumat etiam bolum antea præscriptum, pilularumque duas tempore intermedio.

Vesperti sudorem, ex sumpto haustu, universalem dimanasse narrabant. Unde & magis extumescere pustulæ miliares, & asthma diminutum est. Ideoque jussi persisteret in usu ultimo præscriptorum omnium. Et ad statum, qui multum attulerunt molestiæ, saccharo instillarentur olei cort. aurant. gutt. iii., & sumerentur ad libitum.

Die 17mo, cum prædicta symptomata debellari viderentur, antea præscripta continuari consului.

Die 18vo, ex sudore intermisso, renovantur symptomata, cum ventriculi aegritudine, & quadam confusione, quasi delirii prodromo, conjuncta. Quamobrem, ad restituendum sudorem, jussi ut in usu haustus persistat; addendo singulis haustibus bezoar. Orient. grana aliquot. Ut cum posseto salviato. aquam theriacalem large sumeret, & emplastra subpedalia repeterentur.

Vesperis ex sudore copiose renovato iterum evanescere symptomata. Neque exinde quicquam infirmata vires, sed potius auctae fuere. Etiamli quadam rubra, & prurientes, miliaribus interspersae, vi sudoris excreverint. Jussi itaque ut in usu haustus & infusi persisteret.

Die 19no. Pustulae miliares coeperunt exsiccari: & omnia visa sunt versus sanitatem perfectam progredi: solummodo spirituum diminutione excepta. Quapropter & praescripti usum haustus cordialis continuari.

Die 20mo vocatus sum circa quintam matutinam. Quippe quod aegrotam in difficilem respirationem denuo incidisset: Non a pustulis miliaribus recessis; cum haec jam antea penitus exsiccatae fuerint: Sed forsitan a materiae morbificae quibusdam reliquiis, viam quasi quaerentibus qua excerneretur. Nam ex tribus sedibus, sponte ac subito supervenientibus, dyspnoea omnino evanuit, atque aegra quam optime convaluit.

Nihilominus ex illius amicis aliquis alium Medicum advocari vellet. Qui cum adveniret, & pustulas miliares, jam antea, ut dictum est, exsiccatas, nusquam vidit, sed tantummodo rubras; me, quod hanc febrem vocaverim miliarem, irrisit. Dixitque rubras pustulas a solo sudore posse oriri. Proindeque juxta indicationes quas sumpserat claudicantes aliquot dies praescripsit, sed re infecta. Deinde alius Medicus, & post illum tertius, atque quartus vocatus est. Qui omnes ignoti morbi curationem incaute susceperunt, donec in chronicum tandem transiit. Quod si noverint hanc febrem revera fuisse miliarem, & post exsiccatas pustulas miliares crisin perficiendam naturae commississent: nullus dubito, quin morbi latus fuisset exitus. Nam ab illo momento, quo pustulae miliares etiam salubriter exarescere solent, non infrequenter observavi, materiae morbosae reliquias vel per intestina, in hoc casu; vel per vias urinarias, ut in sequenti; vel cum lochiis per uterum, ut in quadam D. King, in Vico Fleet street dicto, sponte & feliciter exterminari.

Historia Febris Miliaris in Morbum Chronicum, tandemque Mortem desinentis.

SEPT. 17mo, 1709. vocatus sum ad D. Bateman, equitis auri uxorem. Haec ante viginti septimanas, in principio puerperii, dolore colico, oppressione pectoris, cum suspiriis spirituumque defectu, nec non pulsu frequente ac debili laboravit. Ex quibus symptomatibus morbum febrem esse miliarem palam praedixi. Et ex usu diaphoreticorum optime se habere sibi suaeque matri visa est. Praedicta enim symptomata parvipenderunt. Aegrotam itaque diutius visitare nolui. Consului tamen ut seipsam per mensem lecto affigeret, in eorum quae praescriberam usu persisteret, & ab infantis lactatione abstineret.

Meo autem consilio obtemperare noluit. Proindeque post quinque septimanas a partu passa est recidivam, cum dolore colico & laterali calore & frigore alternatim recurrentibus, oppressione pectoris, cum suspiriis, spirituumque defectu. Ad lateris dolorem sanguis fuit emissus; unde & auctus languor: & quadam suffocatio, hysterici affectus similis, cum suspiriis illam premebat. Quae symptomata vapores, ut vulgo loquuntur, tam aegra, quam ejus mater aestimarunt. Cum revera a venae sectione, catameniorum tempore, orta sint. Nam lochia, quae a partu ad sextam septimanam usque duraverant, exinde subito suppressa fuere, & deinceps ad illius vitam exitum.

Jamque, quod ante exacerbationem symptomatum magis frigeret, morbum putarunt febrem esse intermittentem: etiamli pustulae miliares hoc tempore fuere conspicuae, Nihilominus sumpsit corticem Peruvianum ex praescriptione pharmacopoei. Ex quo motum materiae, pustulis adhuc magis augendis aptae, in cutis superficiem impeditum, eandemque alio transmissam fuisse, minime dubitandum est. Primo super femur, tibiam, pedemque; quem Chirurgus scarificabat: deinde & super intestina, ubi genuit diarrhoeam: nec non super nervos pulmonum, ramosque asperae arteriae capillares, ubi asthma, cum tussi sputatoria & foetida produxit. Verum ex emissio e pede sero minime remissior fuit dyspnoea.

A Junii 23io, ad 25tum, Medicus praescripsit bolum ex Pul. Chel. Cancr. composito, Rad. Serpent. Virg. & Castoreo; Decoctum album, Suppositorium, Empl. Vesicat. nuchae, & pedibus Cephalicum.

Junii 25to, corticis Peruviani decoctum. Die 26. corticis Peruv. pulverem 28vo, julapium ex Aq. Lact. 3iv. Menthae, Cinnamomi bord. an. 3i. Laud. liq. 3i. Conf. Fracast. 3iii. in Diarrhoeam.

Julii 8vo, Lac Asinum cum Pulvere Margaritarum, & Chelis Cancror. simplice, & Saccharo perlato. Nec non infusum amarum ex Absinthio Romano & Sem. Coriandri; addendo Colaturae, Gummi Ammoniaci Aq. Pocon. comp. & mirabil. an. q. s. dissoluti 3i. & Aq. Ceras. nigr. 3vi.

Die 9no, corticem Peruvianum. 16to, Bolum ex Pulvere & Chel. Cancr. comp. & Theriaca Andromac. Et Decoctum album cum Rad. Tormentillae. 29no, Infusum amarum, & Pilulas ex pulvere millepedum.

Aug. 3tio, Pilulas ex Pulv. Ari comp. Myrrhae & Syr. Balsamico. Et Decoctum ex cortice Sassafras; Sem. Dauci, Baccis Juniperi, Rad. Eryngii condit. & Aq. Calcis q. s. addendo Colaturae Aq. Nephriticam.

Die 17mo in consultatione cum alio Medico, Pilulam Mattheusianam. 19no, Vesicatoria Nuchae & Brachii applicanda. Pilulas ex Galbano, Cum. Ammoniac, Croco, & Opobalsamo. Et Julapium perlatum.

Sept. 6to, Enema ex Decocto albo, Theriaca Androm. & Diascordio. Infusum amarum ex Radicib. Gentianae, Helenii, Absint. & Marubii foliis, Sem. Dauci & Baccar. Junip. in Aq. font. infusis addendo Colaturae Vinum Chalybeatum. Et Bolum ex Diascordio, Terra Japonica, & Ol. Cinnamomi.

Die 13tio, vesicatorium parvum, cum epispastico unguento, ad diu continuandum ulcus, Pilulas ex speciebus Diambrae, Castoreo, Sale Volat. C. C. & Galbano. Et Julapium Hystericum.

Haecenus tres Medici magni nominis, duoque Chirurghi non incelebres aegrotam visitarunt. Et hanc morbi methodique praescribendi historiam, majori ex parte, ab illa illiusque matre, iterum advocatus accepi.

Jam tum difficili respiratione, diarrhoea, & manuum artuumque inferiorum tumore gravata est: Adeo vertiginosa & languida, ut bis uno die ne syncope moreretur metuerint. Pulsus ei valde frequens ac debilis. Et circa meridiem, calore, rubore, & dyspnoea, quotidie affectam fuisse narrabant.

Horum omnium, fere a morbi principio, symptomatum, tres quatuorve causas fuisse arbitror. Quotidianum scilicet e lecto egressum, lactationem, venae sectionem, e sumptis medicamentis in primis corticem Peruvianum. Haec enim omnia pustularum miliarum incremento & durationi certum est obstitisse, & materiam morificam in pulmones, intestina, artusque inferiores transtulisse.

De hoc morbo, quod sit immedicabilis, feci prognosin. Praecipue ob summan aegrotam imbecillitatem; & quod dyspnoea & diarrhoea contraria indicarent.

Triste confessa est, multum poenituisse se, me posterius vocatis Medicis non associatum fuisse: praecipue, quod suam sororem in simili casu a me sanatam meminerit. Jam tamen a me proposita vesicatoria nullibi apponi voluit, etiamli respiratio difficilis & vertigo exigerent. Fontanellas itaque inter scapulas apertendas suasi. Et in ventris tormina, diarrhoeam comitantia, spiritum millepedum, cujus efficaciam saepe expertus sum, ex haustu potus ordinarii, ad gutt. xx. bis in die sumendum praescripsi. Et ut sexta quaque hora bolum ex spermate ceti, pulv. e chel. cancr. comp. & croco, ad menses movendos, lenem diaphoresin excitandam, respirationemque allevandam, deglutiret.

Die 20mo, in reditu meo a Regio apud Vindeforiam Castello visitavi aegrotam, eamque a vertigine omnino liberam conspexi, ejus spiritus haud mediocriter refectionis, ventris tormina consopita, & suppressam diarrhoeam, ut postea mixtura opiata non opus fuerit. Persistentibus autem dyspnoea, ac inferiorum artuum tumore, & universa imbecillitate in dies aucta, post unam atque alteram septimanam obiit.

Historia Febris Miliaris cum largissimo Urinae effluxu circa finem.

Julii 29no, 1705. D. Loyd Lintearius, apud Cynarae insigne in platea Cheapside dicta, cuique D. Basket erat pharmacopoeus, me ad suam filiolum septem annos natam evocavit.

Habitudine erat tenuior, temperie calidior. Spiritus illi vivaces, sed facile dissolubiles. Diebus aliquot praecedentibus, ex calore interno cutis aridior fuit. Pridie hujus diei, cancrum comedit. Ex quo noctu aegrotabat, & calore vehementi sitique correpta est. Quibus etiam spirituum defectus, vomitus, pulsus frequens ac debilis, & urina sanorum similis accessere.

Ex morbis antecedentibus & symptomatibus praenovi hanc febrem fore miliarem. Ideoque lacteo enemate, ad primas ablundas vias injecto, pro meo more decrevi lenem ac continuam diaphoresin excitare, calidaeque interim & siccae temperiei diluentibus favere. Praescripti autem sequentem in modum.

2℥. Pul. e chel. cancr. comp. gran. viii. sumantur e cochl. j. Julapii sequentis, superbibendo cochl. ij. vel iij.

2℥. Aq. ceras. nigr. 3viii. Epidem. 3i. Sacchari albiss. q. s. Ms. f. Julapium.

His addidi emplastra, ex cephalico cum euphorbio, & pice Burgundica subpedalia.

Die 30mo visitanti mihi narrant, aegrotam ex enemate alvum satis dejecisse: Noctemque magis placidam, quam praecedentem, illi contigisse. Non adeo multum ardebat, calore tamen & frigore alternis mitius affecta fuit, vomitioque omnino suppressa. Et jam primum super pectus pustulae miliares in conspectum venere. Praescripti itaque ut persisteret in usu pulveris, & ad diluendam materiam febrilem, sudoremque fovendum, possetum salviatum affatim potaret.

Die 31mo, spiritus minus oppressi sunt, & mediocriter refectionis. Sed ex usu posseti intermisso paulo plus caluit; pulsus frequentior, sed debilis; pustulae tamen miliares aliquanto magis fuere conspicuae. Praescripti itaque pulveris & chel. cancr. comp. gr. viii. totidemque margaritarum praeparatarum alternis vicibus sumenda.

Augusti 1mo pustulae miliares sunt tumidiusculae, calorque internus minor. Externe vero paulo plus caluit, cutisque leni diaphoresi humectabatur. Jussi itaque post subductam alvum ex injecto enemate antea praescripta repetenda.

Aug. 2do spiritus fuere vivaciores, calorque adhuc minor interne. Consulti itaque persisteret in usu margarit. pp. cum julapio quarta quaque hora: Et ad tuendum caput emplastra vesicatoria pone aures applicanda.

Aug. 3tio non adeo equidem externe calebat: verum pustulae miliares aspectum habebant minus laudabilem. Censui itaque pulverem & chelis cancr. compositum in usum revocandum. Quoniam vero puellae mater aegre ferebat medicamenta adeo frequenter sumenda, sequentia praescripsi.

2℥. Aq. ceras. nigr. 3xii. Epidem. 3i. pulv. e chel. cancr. comp. 3i. Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julapium, de quo sumat haustum sexta quaque hora, agitata phiala tempore usus. Et sumeret margar. praep. dosim in omnibus intervallis. Uteretur etiam mucilag. ex sem. Cydon. & Psyll. Syr. e Rubo Idaeo edulcorata. Et empl. subpedalia repeterentur.

Aug. 4to calor erat multo intensior, nec sine quibusdam motibus convulsis. Puella enim, cujus calida erat naturalis temperies, largius de julapio potaverat, quam debuit. Praescripti itaque, julapii loco, margarit. pp. 3ss. sexta quoque hora sumendum, & julapii sequentis cochl. j. superbib. cochl. iij.

2℥. Aq. Lact. alex. 3viii. Epidem. 3i. Syr. e Cort. Citr. q. s. Ms. f. Julap. Et ad feri sanguinis partem actiorem diluendam, ut lactis aquam alexit. sumeret edulcoratam, instar potus ordinarii. Si diaphoresis suppressa fuerit, singulis aquae praedictae haustulis spiritus C. C. gutt. iv. adderentur: Et julapio immisceretur pulveris de gutt. 3i.

Die 5to motus quievit convulsivi, calor fit mitior, spiritus animales vires sumunt, pustulaeque miliares jam in principio declinationis sunt. Quae clare indicant, mala antea memorata symptomata non tam a morbo, quam a julapio, nimia quantitate sumpto, provenisse, Jussi

Iussi itaque ut in novissime præscriptorum usu persisteret. Naturæ enim non imperandum, ut bene monet *Baglivus*, sed illius monitis parendum est.

Die 6to febris adeo declinavit, ut pustulæ miliares desiccare inceperint. Præscripsi tamen, ad febrilem calorem superfluum extinguendum, ut lactis aquam cum margaritis præparatis puella assatim bibat, & cortex Peruvianus in promptu esset, pro re nata sumendus.

Die 7mo summo mane advocor. Tanta enim copia, tamque subito minxit puella, ut de illa, antequam matula afferri potuit, effluerit urina. Unde pertinuit mater, ne diabetes, & deinde mors sequeretur; ut suo nepoti accidisse aiebat. Cum revera partim ex aq. lactis, die præcedente liberalius potata, partim e pustulis miliaribus, tum exsiccatis, eveniret. Quemadmodum in antea descripto casu, & in eodem morbi tempore, materiæ morbificæ reliquæ, ad crisin perficiendam, per alvum abierunt. Quod & hic forsan accidisset, si patientis temperies minus calida, alvus natura laxior, usque margaritarum parior fuisset. Et in simili casu huiusmodi morbi reliquæ per lochia nonnunquam expelluntur ut *D. King*, ad trium regum insigne in *Lugdate hill*, cui pharmacopæus erat *D. Alen*, accidisse memini. Illi enim, statim a pustulis miliaribus penitus exsiccatis, lochia, instar sanguinis super carbones adusti, nigricantia, sine ulla causa evidenti, aut subsequente periculo, per horam integram emanarunt. Et quoties evacuatio neutrius prædicti generis post exsiccationem pustulas contingit, sæpe vel calorem internis partibus hærentem, cum pressura spirituum, deprehendo; vel quavis levi de causa recidivam patiuntur ægri, & nonnunquam mortem subitanam; vel ex materia in artus rejecta, aut erysipelas, aut hydropicus dolensque tumor generatur.

Hæc omnia puellæ matri sigillatim monstravi, quo melius eam a timore liberarem. Nihilque amplius agendum, præter virinum insolationem, vel corticis Peruv. usum, vel pulveris testacei cum lacte asinino; cuius usus ei antea bene cessit. Alium tamen Medicum associari voluit. Eodem vero tempore ipse evocor ad nobiliss. *D. Clarendonæ* Comitum, ut de ejus nepote, honorabil. *D. O'brian*, consulerem. Ideo & alter Medicus sequentia solus præscripsit.

℞. Pulv. de gutt. Lapid. Contray. an. gr. vj. Castor. Salis Vol. C. C. an. gr. ij. Conf. Alchem. sine Mosch. ℞. Syr. Pæon. comp. q. s. M. f. bolus statim sumendus, & sexta quaque hora, solutus in Coch. i. julapii.

℞. Decoct. albi ℞j. Aq. Cinam. bord. ℞j. Sacch. albiss. q. s. M. f. Apozema pro potu ordinario.

℞. Salis vol. Oleos. ℞ii. sumat gutt. vi. frequenter in potu quovis ordinario.

Et applicentur emplastra vesicatoria brachiis internis & inter scapulas.

Hujus præscripti chattulam *D. Basket* pharmacopæus ad me misit. Qua perlecta stupore quodam percussus sum; dixique, cum minime retrocesserint pustulæ miliares, sed regulariter & sine quovis pravo symptomate exsiccarentur, me ex medicamentis calorificis, & a puella calidi temperamenti ac debilitata sumptis, nil melius quam febrem de novo accensam, mortemque minitantem sperare.

Nec me mea fefellerit conjectura. Cum enim circa horam vespertinam puellam visitaverim, ut omnia, secundum præscriptum ultimo memoratum, intellexi facta fuisse: ita & puellam ardore vehementissimo, cum siti ingente, linguaque arida, & respiratione difficili, laborantem vidi. Attamen, absente altero Medico, nihil præscribere mihi visum est.

Die proximo mane nobis, una puellam visitantibus, narratum est, illi pessime transisse noctem, & jam ardebat maxime, sitique valde urgente & dispnoea afflicta fuit. Et mihi interroganti alterum Medicum, qualibus indicationibus satisfecisse proposuerat? Respondet, se me absente, qui solus morbi historiam enarrare potui, pustulas miliares retrogradas æstimavisse. At cum id fieri non posse monstraverim, habita consultatione, concessit Medicus dosin diminueret, & sequentia præscribere.

℞. Lapid. contray. Pulv. de gutt. an. gr. iv. Croci, Castor. an. gr. i. Syr. Pæon. comp. q. s. M. f. Bolus sumendus e Coch. i. Julapii, Sumeretque ad diluendos humores decoctum album pro potu ordinario. Et ne ex alvo adstricta usque boli calor excitaretur, suppositorium præscripsimus ex mele & sale gemmeo.

Die 9no calor fuit remissior, liberiusque respiravit. Præscripsimus itaque enema ex lacte saccharato, bolumque unum.

Die 10mo in statu longe meliori puellam vidimus, symptomatibus, a calidis medicamentis ortis, consopitis omnibus. Attamen ad recuperandas vires, calorisque interni recursum præveniendum, pulverem præscripsimus sequentem, e coch. i. lactis asinini sumendum, superbibendo ℞ss. tepide.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. Margur. pp. an. gr. vj. M. f. Pulvis.

Die 11mo ut adhuc tutius præmuniamus puellam, ne illi febrilis calor novaretur, consulimus. Cort. Peruv. Pulv. ℞ss. e Coch. i. Julapii quarta quaque hora sumendum; & pro re nata, aq. lactis haustulum. Et ad perficiendam valetudinem rus adiret, ubi saniori statu semper gaudebat.

Haud multo post audiivi illam iterum male valere; aliosque advocari Medicos. Id autem minime mihi displicebat: nam sub eorum cura obiit; cum antea, me illam curante solo, Deoque favente, tam bene illi res cesserit, ut e febre mediocri tempore evaserit.

Historia Febris Miliaris in Mammæ Apostema terminantis.

Junii 12. 1699. ad viti admodum honorab. *D. Trevor*. Commun. Placitor. Justiciarii capitalis uxorem, jam defunctam, circa sui puerperii principium, evocatus sum. Cui pharmacopæus erat *D. Gelfs* borp obstetrix, *D. Dodson*.

Cum gracili corpore animum possedit tranquillum; Spiritus tamen nativos debiliores. Ante partum in calorem internum sæpe incidit. Postea dolere dorsum & femora, ut in puerperis solent: Et doloribus remissis, horrore correpta est; quem febrem esse lacteam putarunt mulieres: tertio enim a partu die contigit.

Quoniam tamen spiritus deficere sensit, die prædicto vocatus sum. Cum observaverim symptomata, quadam oppressione pectoris suspiria cogente, summe dejectis spiritibus, capitis dolore, pulsque fre-

quenti ac debili, illam laborare vidi. Urina sanorum similis, palmarum erant calidæ, lochia effluebant, alvumque potius accessit ad laxitatem. Denudato autem pectore, inibi numeravi pustulas tres miliares. E quibus, etiamsi paucissimis, satis aperte constabat, hanc febrem esse miliarem. Mihi autem id affirmanti digniss. *D. Hambden*, aliæque astantes, vix assentiri voluerunt.

Attamen ex numero pustularum adeo parvo materiam ad eas fovendas aptam alio tendere suspicatus sum. Ut itaque earum eruptionem leni & continua diaphoresi promoverem, sequentem haustum sexta quaque hora sumendum præscripsi.

℞. Aq. Lact. ℞iii. Pæon. comp. ℞ss. Pul. e Chel. Cancr. comp. gr. xv. Pulv. de gutt. ℞ss. Syr. Meliss. q. s. M. f. Haustus.

Pulverem e Chel. cancrorum paulo minori quantitate præscripsi, ne motum sanguinis magis accelerem, quam diaphoresi jam excitatæ continuandæ par esset. Ad tuendos nervos, si pustulæ forte retrocessissent, addidi pulv. de gutteta cum aquæ lactis majori dosi diluente.

Præscripsi etiam ad capitis dolorem emplastrum vesicatorium inter scapulas applicandum, & empl. subpedalia. Et pro alimento ut pullorum jus forberet. Quod, ut magis nutritium, in hac febre potius quam in quavis alia, præcipue in natura debilibus, præbere soleo. Quibus & adjunxi seq. Julapium ad libitum sumendum.

℞. Aq. Meliss. ℞viii. Cinnamom. bord. ℞iv. Epidem. ℞i. Sacch. perlato ℞ii. M. f. Julapium.

Die 3tio melius se habuit, ex omni parte. Attamen, ne remitteretur diaphoresis, præscripsi bolum sequentem.

℞. Conf. Anth. ℞ss. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℞ss. Syr. Meliss. q. s. M. f. Bolus sumendus cum Julapio.

Vesperis febris exacerbata est primo contingentibus symptomatibus. Quibus etiam accessit respiratio difficilis: Nec non levior diarrhœa, e lochiis diminutis. Nam excrementitia materia tentabat transitum ab utero ad intestina. Sequentem itaque bolum cum julapio sumendum præscripsi.

℞. Conf. Anth. ℞ss. Theriacæ Andr. ℞i. Pulv. e Chel. Cancr. comp. Croci, an. ℞i. Syr. Melissæ q. s. M. f. Bolus.

Theriacam prætuli diascordio, quod non solum moderetur alvum, sed & plerumque magis faveat sudoribus. Et ommissis aliis adstringentibus, crocum addidi, ut uberiores fluxum lochiorum, sine astrictione glandularum intestinalium, restituerem. Quæcunque enim intestina astringunt, suum etiam utero affectum imprimunt. Quod in primis advertendum est, ne ex uno sanato symptomate aliud generetur.

Veruntamen, ne bolus supra dictus minus sit efficax, seq. julapium præscripsi in promptu habendum.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℞viii. Cinam. bord. ℞iv. Epidem. ℞j. Conf. Fracast. ℞j. Conf. de Hyacinth. sin. od. ℞ss. Syr. de Mentb. ℞i. M. f. Julap. de quo sumat. Coch. iv. post sedes singulas. Et ne quid mali accideret ex opiat, præscripsi vesicatoria carpis applicanda. Quæ etiam in diarrhœa nonnunquam profunt, dum materiam morbificam ad exteriora revellunt.

Die 4to a sumpto bolo theriacali somnum sudoremque secutos fuisse intellexi. Unde & omnia symptomata in meliorem partem inclinarent. Neque astringenti julapii opus erat. Præscripsi itaque bolum cum julapio perlato repetendum. At sine theriaca; quod hic minus calida ad continuandam diaphoresin viderentur sufficere. Et inefficacis medicamenti, majore quantitate quam par est adhiberi, exemplum habemus in salivatione. Hanc enim sæpe, & præcipue in debilibus, mercurii dulcis gr. v. vel x. singulis noctibus sumpta, felicius producit, quam ejusdem medicamenti tripla dosi. Cujus etiam rei testis est *D. Tindal* pharmacopæus. Qui, cum hanc methodum cuidam patienti præscripsissem, multa admiratione dixit, se nil inde expectare: nuperrime enim doses multo majores prædictæ patientis filia, a magni nominis Chirurgus dari, & vel undecim hebdomadas frustra continuari, viderat. Verum mercurius dulcis nimia quantitate sumptus sanguinis motum adeo accelerat, ut materiam, quæ ex mediocri dosi per glandulas salivales secerni solet, vomitione aut sedibus expellat. Et notum est, in melancholicis alvum facilius subduci medicamenti lenitivis, quam catharticis plerisque fortioribus. Et pari modo sudor jam profluens, diaphoreticorum dosin augendo vel nimis frequenter repetendo, sæpe in ardorem definit.

Attamen ne ad continuandum sudorem deesset materia, Apozem. seq. præscripsi.

℞. Rad. Fragar. Chelid. major. an. ℞ss. fol. Meliss. Fragar. Chelid. an. p. ij. Sem. Card. bened. ℞ij. flor. Cordial. an. p. ℞. Coquantur in Aq. font. q. s. Colatura ℞ss. adde Aq. Epidem. ℞ij. M. f. Apozema.

Vesperis rediit exacerbatio, sed multo levius. Bolum itaque theriacalem repetendum præscripsi. Deinde, post horas sex, bolum sine theriaca: Et emplastra subpedalia applicanda.

Die 5to symptomata quæque vidi benigniora, pustulasque miliares ad maturitatem properantes. Præscripsi itaque ut in usu boli sine theriaca, apozematis, & julap. persisteret.

Quoniam tamen dyspnœam renovari posse suspicatus sum, si exacerbationes prædictæ iterentur, donec pustulæ exsiccatae fuerint, alium Medicum in consultationem vocandum monui, quem patientis amici nominarunt. Vespere itaque convenientes symptomata totum illum diem fuisse leviora intelleximus. Jam vero vidimus omnia, nempe diarrhœam, dispnœam, spirituumque defectum exacerbati. Præscripsimus itaque sequentia.

℞. Pul. e Chel. Cancr. comp. Conf. Fracastor. an. ℞ss. , Syr. Caryoph. q. s. M. f. Bolus sumendus ix. Coch. i. julapii sequentis, superbibendo coch. v.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℞x. Puleg. Bryon. comp. an. ℞ii. Margur. pp. ℞ii. Sacch. albiss. q. s. M. f. Julapium.

Die 6to mane, non obstante bolo, patiens sexies sedem petiverat, noxque ei inquiete transiit. Nec jam exacerbatio omnino finita fuit. Iussimus itaque bolum continuandum, & vesicatoria brachiis internis applicanda. Quibus addidimus gargarismum decocto plantaginis cum toto, & seq. enema.

℞. Seri Lact. Vino Hisp. separati ℞x. Elect. e Baccis Laur. ℞j. Sacch. rubr. ℞ii. M. f. Enema.

Attamen interrogatus seorsum a *D. Hedges*, ægrotae matre; Quid ad magnum illum spirituum defectum sit faciendum? Suasi, ut in Aq. Lact. haustulo croci sumeret ℞ss. & post aliquot horas repeteret. Vesperis nobis narratum est, patientem omisissæ bolum cum dia-

diascordio. Sed croci, ut a me præscripti, usu repetito, levioribus symptomatibus diem transegerunt. Nam ex leni sudore pustulæ miliares laudabili modo se extulerunt. A juvantibus itaque indicationem sumentes præscripsimus pulverem sequentem.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥ss, Croci Pulv. gr. vi. Mf. f. Pulvis sexta quaque hora sumendus cum iulapio.

Die 7mo visa est optime se habere. Alvus ei mediocriter soluta fuit; nempe longioribus intervallis, & sine virium iactura. Neque inde pustulæ miliares disparuere. Quamobrem, ut in usu alterno boli sine diascordio, & pulveris ultimo præscripti cum iulapio, persisteret decrevimus.

Vesperis symptomata, cum difficili respiratione & diarrhœa, exacerbata sunt. Quare & præscripsimus bolum cum diascordio, & reliqua ut antea.

Die 8vo etiam si bolum sumpsisset cum diascordio, haud tamen ita bene sudasse aut dormisse, ac post bolum theriacalem a me præscriptum astantes aiebant. Magis enim inquieta fuit & calida, difficilisque adhuc respirabat. Præscripsimus itaque, ut in usu pulveris persisteret.

Vespere videbatur novam pati exacerbationem. Ego vero ultimum nondum penitus finitam esse censei. Loco itaque boli diascordialis theriacalem præscripsimus repetendum.

Die 9no intelleximus, noctem præcedentem fuisse facillimam. Et jam quæque symptomata benigna, pustulæque miliares, & numero & mole auctas vidimus. Præscripsimus itaque in exacerbationis intervallis bolum sine diascordio aut theriaca sumendum. Opiata enim tempore exacerbationis sumpta melius operari, expertum habeo: præcipue si vesicatoria simul applicarentur.

Die 10mo, post noctem valde pacatam, ægotam spirituum summo defectu, madore frigido, & universali, præcipue in manibus, fractam mitati sumus. Præscripsimus itaque croci ℥ss, ex haustulo Aq. Laet. bibendum; & suppositorium ex melle spec. hier. cocto intrudendum. Ut lap. Goenl. ℥j, cum croci g. vj, fumeret sexta quaque hora: haustumque cum croco in languoribus & madore frigido. Nec non apozema pectorale, cum linctu oleoso, ad moderandam tussiculam jam primo ortam, ne pustulis ad siccitatem tendentibus materiæ morbificæ residuum in pulmones irrueret.

Diebus sequentibus nihil præter iulapium perlatum & crocnm, in languoribus sumendum, & diætam nutritiam, præscriptum est. Quibus adeo vires patientis auctæ sunt, ut postea materiæ morbificæ reliquiæ in mammarum glandulas tuto secernerentur. Verum ad ejus imbecillitatem habita ratione, pilula tart. quercet. aliquot vicibus sumpta, materiæ prædictæ maturationem tardare volui. Quo facto, ita bene res cessit sub cura D. Bernard. Chirurgi Regii, ut paulatim, & pene sine dolore, pus generaretur, & paucis post diebus optime convalesceret.

Veruntamen paulo ante proximum puerperium narravit Medico magni nominis se sub præcedente, febre correptam fuisse; & ex calore, quem sensit interno, timere ne similiter recurreret. Quare ille Medicus sanguinis ℥x venæ sectione emittendas consuluit. Qua facta, ut fœtum in utero languidius moveri statim senserit; itaque cum ad partum ventum esset, adeo debilitata fuit, ut antequam illam adire potuerim, in ipso conatu, ad excludendum fœtum (etiam si hic rite positum) necessario, supremum diem obierit.

Historia Febris Miliaris, ex Frigore prope Mortalis.

Sub finem mensis Julii 1706. vocatus sum ad filiam Dom. Smith in area, Bartholomew close vulgo vocata, statim post partum. Cui obstetricis officium præstitit D. Summers, & D. Springet pharmacopœi.

Post partum passa est fluxum lochiorum nimium, cum pectoris oppressione maxima spirituumque defectu: nec non frequenti pulsu ac debili, manibusque superius pene frigidis. Quorum symptomatum, cum nulla causa, sive ad infantem, sive placentam, habita ratione, apparuerit: a quodam febrili calore, ejus spiritus exhalante, & simul frangente vasorum vim retinendi, pendere videbantur, febremque miliarem, latentem monstrare. Sequentia itaque præscripsi.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. gr. iv. Syr. Paralyf. q. f. Mf. f. Bolus in Cochli. j. Julapii perlato communis sumendus, superbib. Cochli. iv. vel v. Id scilicet mihi met ipsi proposui, ut, facta per diaphoresin secretionem mediocri, moderarer uterinam. Nam ut sanguinis fermentatio aut motus violentior secretionem minuit: ita & altera evacuatio alteram. Quem duplicem aphorismum, ex multiplici mea observatione enatum, habeo. Neque adeo tuto vel astringentia præscripsissem, vel opiata. Dum ex nimio lochiorum fluxu, hoc modo diminuto, forsitan & fluxus naturalis defectus sequeretur. Cujus rei effectus quantum metuendi sunt, tam Medici, quam obstetrices bene norunt.

Meæque in hac re conjecturæ sumpti medicamenti operatio dedit suffragium. Nam boli usum, ut spirituum antea depressorum elevatio, ita & lochiorum diminutio secuta est.

Dehinc, etiam si prænoverim, febrem suam naturam brevi patefacturam: ne tamen patientis amici studere me lucro putarent, de illa tacens, consului, ut in usu boli mane, & vesperi persisteret, in lecto maneret, seque ab omnium consortio averteret. Ut tranquillius esset animi, pro cibo fumeret pulli gallinacei brodium, nec non decoctum avenarum excorticarum vinosum; & pro potu ordinario, possetum salviatum; addendo singulis haustibus spiritus cornu cervi guttas aliquot, si diaphoresis remissio contingeret: & in languoribus salis vol. oleosi similiter. Hoc facto, patienti in aliquot dies valedixi.

Deinde redeunti mihi narratum est ab adstantibus, mea mandata diligenter illam observasse, & mediocri usam fuisse valetudine; vaporibus solis (ut locuti sunt) exceptis. Spirituum enim defectum, pectusque oppressum passa est, cum vigiliis & animi perturbatione ex obrepente somno. Calore enim & frigore alternis vicibus, sed inæqualibus intervallis, & præcipue in sudoris intermissione recurrentibus, affecta est. E quibus symptomatibus adhuc certius prævidi, pustulas miliares se tandem exhibituras.

Hujusmodi fere statum febris retinuit usque ad diem Augusti undecimum. Ubi a prandio vocatus sum ad illam, syncope ex im-

proviso correptam: quamque brevi morituram amici æstimarunt. Cum illi adsum, e lecto surrexisse intellexi, & deinde statim in syncopen incidisse: nec ab ea evasisse, donec in lectum redierit. Ego vero pustulas miliares editas fuisse subolens, & ab irruente frigore retrocessisse; eas equidem in denudato pectore deprehendi, sed inter surgendum depressas.

In hoc casu non ad vehementer calida censui confugiendum, ne, nimis sanguinis accelerando motum pustularum uberem provenire, magisque aspectabilem impedirem. Verum istiusmodi potius elegi medicamenta, quæ, cum mitiora sint, felicius excitarent diaphoresin, & emittendo pustulas, depressos spiritus elearent. Sequentem itaque in modum præscripsi.

℞. Con. Acetof. ℥j. Bezoar. Orien. Croci an. ℥ss. Syr. Paralyf. q. f. Mf. f. Bolus sumendus e Cochli. j. Julapii sequentis superbib. haustum ejusdem.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥. x. Angel. comp. ℥ss. Sacch. perlato q. f. Mf. f. Julap. de quo sumat haustulum ut supra, & in languoribus. Repetatque Bolum sexta quaque hora.

℞. Salis Vol. Oleos. ℥ss. sumat. gutt. xx. cum potus ordinarii haustulo aliquoties in die. Et subpedalia Emplastra applicantur.

Die 12mo multo melius se habuit. Spiritus enim nec adeo depressi sunt, neque perturbati; pustulæque magis confertæ, & expansæ, magisque extumescere. Unde eas ex frigore retrocessisse patet. Alias enim tantum progressum, tamque subitaneum fecisse, minime existimandum est. Jussi itaque ut in usu boli, & Julapii persisteret, fumeretque in languoribus Aq. Theriac. tenuioris Cochli. ij.

Die 13tio cum quæque viderim laudabilia, ne sæpe visitando tædium patienti afferrem crearemque sumendorum odium, sequentia, usque ad diem decimum septimum, continuanda jussi.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. gr. iv. Syr. Paralyf. q. f. Mf. f. Bolus sexta quaque hora sumendus cum iulapii perlato haustulo.

℞. Castor. gr. vi. Assæ fœtid. gr. xij. Syr. Paralyf. q. f. Mf. f. pilulæ n. vj. sumat. ij. in Intervallis, ad fluxum Lochiorum continuandum.

Die 17mo pustulis jam exsiccatis, patiens usquequaque recte se habuit. Excepto quodammodo frigido madore, per intervalla, recurrente. Cui ut occurrerem, provideremque ne quid mali a pustulis jam deletis accideret: jussi, ut in usu boli dies decem persisteret. Et si e lecto surgendo defici spiritus sentiret, statim in eundem rediret, bolumque præscriptum fumeret. Quibus obtemperando præceptis, perfecte convaleuit.

Historia Febris Miliaris, cum Delirio maxime furioso.

M. Aji 24. 1699. evocatus sum ad D. Powell, in platea Basinghall. street. vulgo dicta, Ancillam; cui D. Dalton erat pharmacopœus.

Hæc primo capitis dolore, & frigore caloreque alternis, sed mitioribus, rure affecta fuit. Una cum magno spirituum defectu, & pectoris oppressione suspiria cogente. Quæ symptomata, a mensibus obstructis, & exinde vaporibus (ut vulgo loquuntur) provenire, domestici putarunt.

Cum autem indies ingravescerent, primo meæ visitationis prædicto die, illam pulsu frequenti ac debili maximoque languore vidi laborantem, adeoque vehementer delirabat, ut penitus nesciverit responsa dare; vociferabaturque, etiam in vicinorum molestiam. Unde & judicavi, hanc febrem fore miliarem. Sed ex omisso hactenus debito regimine, materiam pustulis generandis aptam, partim inhærere sanguini, & ex parte nervis impelli.

Præscripsi itaque enema, ex Decoct. communis pro Clyst. ℥viij. Mellis Mercur. ℥iij. Sacchar. rubri q. f. injiciendum quamprimum. Vesicatoria etiam carpis applicanda, & ab enematis finita operatione, bolum sequentem sexta quaque hora sumendum.

℞. Conf. Acetof. ℥ss. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Croci gr. iv. Sem. pæon. gr. vj. Syr. Atrippl. q. f. Mf. f. Bolus in Cochli. j. iulap. sequentis sumendus superbib. Cochli. iv.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥viij. Aq. pæon. comp. Syr. Atrippl. an. ℥j. Mf. f. iulapium.

Ad deobstruendos menses pilulas sequentes præscripsi.

℞. Assæ fœtid. gr. x. Castor. gr. v. Syr. Atrippl. q. f. M. f. pilul. vi. capiat ij. sexta quaque hora Bolorum usui interposita.

Et in furorem, si insomnis fuerit, ut addatur bolo circa horam quartam matutinam sumendo, Laudan. Lond. gr. j.

Die 25to pulsus ei, ut antea, frequens ac debilis, persistitque vociferari. Non autem continuo deliravit. Bolum itaque cum laudano amici omiserunt, proinde & ipse bolum sine laudano, cum iulapio, & pilulis, continuando præscripsi.

Vespere paulo melior erat morbi facies ac matutino tempore.

Cæperunt enim sudores jam effluere, pauculæ in pectore pustulæ miliares pullulare. Alvus tamen, enematis antea præscripti vim eluens, adhuc valde stricta fuit. Quamobrem & aliud jussi injiciendum.

℞. Decoct. commun. pro Clyst. ℥viij. Elect. Lenit. ℥j. Conf. Hammech. ℥ss. Sacch. rubri q. f. Mf. f. Enema.

Et ab enematis operatione finita, ut fumeretur bolus sequens.

℞. Conf. Acetof. ℥ss. pulv. Chel. Cancr. comp. ℥j. Syr. Melissæ q. f. Mf. f. Bolus quinta quaque hora sumendus.

His addidi mucilaginem ex semine cydon. & psyllii decocto hordei extractam, & syr. e rubo idæo edulcoratam; sumendam cochleatim, sensimque deglutiendam.

Die 26to ab astantibus intellexi, somni paululum obrepisse patienti post enema rejectum, totamque noctem continuasse diaphoresin. Plures etiam jam exitere pustulæ, & suspiria fuerunt rariora. Præscripsi itaque bolum repetendum.

Vesperis mihi narratum est, ægotam omnia symptomata de novo passam fuisse: Et in vehemente suo furore se adeo in lecto jactasse, ut inde sudores subsisterent. Quos ut restituerem, spirituumque turbulentiam pacificarem, camphoræ usum, (in simili calu sæpe a me expertum) cum emulsione sequente consului.

℞. Sem. Papav. albi ℥ij. Amygd. dulc. excort. n. xv. Contund. cum decoct. Horæ. q. f. affundendo deinde ejusdem decocti ℥viij. Edulcoretur Colatura Saccharo albo pro potu ordinario.

Jussi

Jussi etiam ut julapium repeteret, & bolum cum laudano die sequente mane.

Die 27mo dictum est, patientem a sumpto laudano vix quicquam dormire potuisse. Ex usu autem camphoræ totam noctem perstitit diaphoresis, pustulæque plures extitere. Jussi itaque bolum sine laudano continuandum.

Die 28vo eadem pustulæ miliares visæ sunt incredibili constipari numero. Quæ attamen haud usque adeo profecerunt, quin delirium vociferansque furor recurrebant. Cum itaque Antimon. diaphoretici vim, tam ad pustulas expellendas, quam ad compescendum delirium, sæpe expertus sum: sequentia præscripsi.

℞. Antimon. Diaphor. Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ℥ss. Mf. sumatur ter de die e Coch. j. Julap. sequentis, superbib. Coch. v.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥vj. Meliss. ℥iv. Epidem. ℥ij. Syr. Melissæ ℥j. Mf. f. Julap.

Et ad calorem internum ac sitim, linguamque sordidam ac siccam, præscripsi Decocti Hord. ℔ij. Syr. Viol. ℥ij. edulcoratas pro potu ordinario.

Die 29no post noctem multo quietiorem quam antea, pustulæ sunt adhuc ampliores. Unde & vociferatio, & delirium accepere temperamentum. Lingua tamen manusque aræfactæ sunt. Præscripsi itaque ut bolo addatur Lap. Prun. ℥ss; ut bibat singulis diebus Apozematis ℔ij. & ut Empl. Veficat. Tibiis applicarentur.

Die 30mo omnia symptomata optabilia sunt. Quare ut persisteret in novissime præscriptorum usu ad Junii 12. consului. Tandem, circa Junii 16. præscripsi Pil. Tart. Q. ℥j. secunda vel tertia quaque nocte sumend. ad sextam vicem. Quibus sumptis perfecte, & præter omnium domesticorum, & visitantium expectationem, convaluit.

Historia Febris Miliaris cum læsa memoria.

Aprilis 4to 1701. vocatus sum ad D. Buller in Newington Butis, cui ut pharmacopœus inserviebat D. Hunter.

Ille, dum iter ad Londinum confecit, maximo dorsi dolore, cum ventriculi ægritudine, vomitione & dysuria, correptus est. Quæ symptomata sibi visa sunt simpliciter nephritica. Et medicamenta quædam huc referentia frustra sumpsit. Prædicto die ad eum accessi. Et quoniam antecedentia narrando, spirituum defectum, & suspiria tacuisset, sequentem præscripsi haustum emeticum.

℞. Salis Vitrioli Vomitiv. ℥ij. Divide in Doses sex. Sumantur singula ex Aq. Juglund. comp. Coch. j. superbibendo haustum possenti fol. Card. bened. alterati. Et Vomitione finita, ut sumeret Pil. Stomach. cum Gum. ℥ij. ad Humoribus, & Vomitorii eliminandas reliquias, & ad mundificandas vias Urinarias, ut die sequente mane bibat Aquæ Strebamens. ℔ij.

Die 5to cessabant vomitus, & ægritudo, libereque tam per urinam, quam per sedem, aqua cathartica effluxit. Dorsi tamen perstitit dolor, etiam si mitiori gradu. Caloreque ac frigore, vicibus alternis, sed inæqualibus, captus est. Pulsus etiam illi erat frequens ac debilis, Spirituumque penuria, & pectoris oppressione suspiria provocante, vexabatur. Unde conjecturam feci, hanc febrem miliarem esse futuram & sequentia præscripsi.

℞. Lapid. Goens. Pulv. de gutt. an. ℥ss. Mf. f. Pulvis e Julapii perlatis haustulo sexta quaque hora sumendus.

Die 6to Languor, & suspiria leviora sunt. Cum vero dorsi dolor potius ingravesceret, præter pulverem antea præscriptum, monui enemata ex decocto communi, & melle mercuriali injiciendum. Eoque rejecto, ut Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. ex haustu sequente sumeret.

℞. Aq. Lact. alex. ℥ij. Epidem. Syr. de Meconio, Ol. Amygd. dulc. an. ℥ss. Mf. f. Haustus. Demumque, ut paretur Mucilago ad emolliendam linguam.

Die 7mo dolor fit mitior, spiritus autem perturbati sunt, & depressi: forsan ex sumpto syrupo e meconio nocte præcedente. Præscripsi itaque emplastra veficatoria quamprimum brachiis internis applicanda. Et ad continuandum sudorem haustum sequentem.

℞. Aq. Lact. alex. ℥ij. Epidem. ℥ss. Lap. Goens. Pulv. de gutt. an. ℥j. Mf.

Et spirituum defectu urgente, ut haustum Julapii perlatis, & Aq. Theriacal. Coch. j. aut, ij. vicibus alternis sumeret. Et ad linguam manusque jam paulisper tremantes, ut cum haustu potus ordinarii spiritus Lavend. comp. gutt. xx. capiat aliquoties in die.

Die 8vo pustulæ miliares in conspectum venerunt. Ideoque multo lenior factus est dorsi dolor; spiritusque minus defecerunt, neque adeo sunt perturbati. Jussi itaque ut sumeret alternis vicibus haustum ultimo præscriptum, & bolum sequentem.

℞. Bezoard. Orient. Croci an. ℥ss, Syr. Paralif. q. Mf. f. Bolus.

His addidi apozema ex Aq. Hordeatæ ℔ij. & syr. viol. ℥ij. Ut & medicamentis & pustularum materiæ expellendæ sit vehiculum. Nec non ad renes viasque urinarias abluendas: Alvinque plerumque strictiorem, leviter relaxandam. Et apozematis hausti Aq. Theriacalis aliquot cochlearia minuscule suavi addenda.

Die 9no auctus erat tremor, nec sine quibusdam indicibus levioris delirii. In quantum tamen pustulæ, adhuc plures majoresque extiterunt, spiritusque fuerunt minus depressi, jussi, ut in omnium antea præscriptorum usu persisteret.

Die 10mo symptomata, die præeunte mala, emendantur. Verum jam orta tussis levicula molestiam patienti attulit. Ideoque ne materiæ morbificæ reliquæ pulmonibus post pustulas desiccatas irruerent, sequentem linctum præscripsi.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Syr. Heder. terr. Capill. Vener. an. ℥j. Sacch. albi. q. s. Mf. f. Linctus.

Et ut loco apozematis antea præscripti bibat sequentem pisanam instar potus ordinarii.

℞. Decoct. pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an. ℔j. Mf.

Et ut sumat sequentis mixturæ gutt. xx. cum haustu pisanæ in languoribus.

℞. Tint. Castor. ℥ij. Salis Vol. Oleos. ℥ss. Mf. Demumque ut in usu Haustus, & Bolorum persisteret.

Die 11mo cum omnia pene eadem ac in die præcedente viderim, jussi ultimo præscripta continuanda.

Die 12mo ex noctis præcedentis vigiliis quodammodo perturbantur spiritus; sed minime defecerunt. Quoad reliqua, medio-

criter etiam se æger habuit; pustulæque in desiccationem inclinarunt. Ne tamen morbi reliquæ in sanguinem nervosque transferrentur, veficatorium inter scapulas præscripsi applicandum, usumque bolorum, & julapii perlatis repetendum.

Die 15to a febre liberatur, excepta quadam spirituum perturbatione levicuta. Ad quam enema repetendum jussi; bolumque cum julapio mane, & vesperi, & in languoribus sumendum, ne medicamentorum usui nimis subito defuisset.

Die 18vo ex pilularum quarundam catharticarum usu sensit se capite multum levare. Deinceps, etiam si pulmones præcautione antea memorata evasere salvi, ex morbi tamen reliquiis versus exteriora propulsis, apostema fuit genitum: quod sub cura D. Hunter brevi sanatum est.

Ex hac febre licet ægroti memoria læsa fuit maxime, exquisitæ tamen diætæ usu, post bimestre spatium perfecte redintegrata est.

N. B. Symptoma in febre miliari primo sensibile partem antea affectam fere semper occupare; ut in casu jam supra descripto contingit.

Historia Febris Miliaris ex sumpta Emulstone Lethalis.

Die 10mo Septembris 1700. vocatus sum ad viri admodum honorab. D. Trevor Aurigæ uxorem, in Candelariorum societatis ædibus habitantem, & jam puerperam; cuique pharmacopœus erat D. Hunter.

Tertio a partu die, febrili horrore, caloreque succedente, febris lactææ simili, correpta est. In maximum etiam languorem, pectorisque oppressionem cum suspiriis incidit, infomnis diem noctemque transegit. Quæ symptomata, cum mere hysterica vulgo putarentur, ægrotæ hæc hysterica etiam medicamenta, sed frustra sumpsit. Quamobrem a digniss. viro D. Thoma Lane Equite Aurato, cui patientis maritus olim inservierat, visitare illam exoratus sum. Quam cum primo adiverim, pulsu frequenti ac debili, perturbatis spiritibus, oppresso pectore, suspiriis caloreque interno, laborantem vidi. Et licet urina ejus esset sanorum similis; palmæ tamen caluere. Quæ omnia ut febris miliaris mihi visa sunt indicia; ita & quædam pustulæ, in illius deinde denudato pectore conspicuæ, hanc meam conjecturam comprobarunt. Præscripsi itaque secundum meam usitatam methodum pulverem sequentem, sexta quaque hora sumendum.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Croci ℥ss. Mf. f. Pulvis.

Die 11mo pustulæ miliares mirum in modum constipabantur. Unde & nox patienti transiit placidissime; spirituumque perturbatio, & suspiria fuere mediocria. Præscripsi itaque ut in pulveris, & julapii usu triduum persisteret; sumeretque in languoribus spir. C. C. guttas aliquot in potu ordinario.

Die 14to pustularum eruptio fuit adhuc magis conspicua, languore & oppressione pectoris jam devictis. Nam præter calorem internum vix quicquam mali sensit. Forsan autem perstitit iste calor, quod ægra diluentia, vel nondum, vel non satis potavisset. Ideoque lactis aquam alexiteriam instar potius ordinarii bibendam præscripsi. Et ut sumat aquæ theriacalis aliquot cochlearia in haustu ejusdem, ad servandum inter potum & medicamenta æquilibrium: præcipue, si vel languor, & oppressio recurrebant, vel remitteretur diaphoresis. Demum, ut veficatoria brachiis internis applicarentur, tam ad pustulas felicius ampliandas, quam ad mala quæcunque accidentia avertenda.

Diebus 15to & 16to cum eadem esset morbi facies, ultimo præscripta censui repetenda.

Die 17mo ex usu Aq. Lactis intermisso incidit ægrotæ in levem dysuriam. Statim itaque D. Hunter pharmacopœus, eoque absente alter accersitus est. Qui dum solummodo dysuriam præ oculis haberet, emulsionis libram bibendam misit. A cujus usu statim subsistit diaphoresis, maximaque oppressione & dyspnœa prehensa fuit. Tandem & me vocarunt. Sed antequam illam adiverim, de ea conclamatum est, & brevi obiit.

Ex historia jam supra descripta patet, quam maximum periculum in hac febre ab errore, etiam minimo pendere potest.

Historia Febris Miliaris, cum Ulcere, Calculoque Renum.

Febr. 27mo 1707. vocatus sum ad D. Coutts, in Vico Mark lane vulgo dicto, jam puerperam; cui D. Hunter ut pharmacopœus ministravit.

Annos aliquot sinistri lateris dolorem sustinuerat. Quem a splene genitum plerique ob id æstimarunt, quod prope partem lienis anticam latus occupare videretur, cum sinistri renis antica pars esset revera affecta.

Ex morbo nephritico totum ægrotæ genus nervosum imbecillitatem alioque vitia contraxerat. In pyalissimum incidere solebat. Et per bimestre spatium ante partum passa est internum calorem. Qui (ut antea monui) sæpe & præcipue in gravidis paulo ante partum febrem miliarem præcedit. Tandem, sine obstetricis ope, foetum enixa est.

Post dies aliquot dolorem primo sensit in sinistro latere, deinde in dextro cum horrore. Postea calore, & frigore alternis, sed inæqualibus intervallis, vexabatur.

Die quo illam primo visitavi, pulsus ei erat frequens ac debilis; lingua subalba & humida, fere sanorum similis; quemadmodum & urina, sed sine sedimento. Calor & frigus irregulares habuere vires. In dorso manus calor erat mediocris, cum palmæ ferverent. Ut ab illa dormitura avolvit somnus, ita & spiritus ejus tumultuaria quadam perturbatione commoti sunt. His etiam sonitus aurium, palpitatio cordis, dyspnœa irregulariter repetita, maximaque oppressio cum suspiriis, accessere. Nonnunquam item tremuere manus. Et a pyalismo omnino suppresso, lochiisque parce effluentibus, tum deliravit, tum motibus convulsivis levioribus correpta fuit. A quibus symptomatibus, febrem hanc esse censui miliarem. Et præcipue a spirituum defectu, & pectoris oppressionem cum suspiriis, mihi hujus febris signis pathognonicis, & a dyspnœa, tremore, & debilitate, febrem præcedentibus, periculosam esse intellexi.

Duplicem itaque præ oculis habui indicationem. Scilicet, excitare diaphoresin, & ad symptomata sigillatim respicere.

Ut priori satisfacerem, & ad lochia restituenda, dyspnœamque levandam, bolum sequentem præscripsi.

2℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. Sperti. Ceti an. ℥j. Castor. gr. iv. Syr. e Mecon. q. s. Mf. f. Bolus cum Julapii sequentis haustu sexta quaque hora sumendus.

2℥. Aq. Ceras. nigr. 3℔. Bryon. comp. 3j℔. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Julapium, de quo sumat haustum ut supra & in languoribus.

Porro ad dyspnœam materiamque morbificam minuendam, & caput defendendum, vesicatorium nuchæ applicandum iussi.

Ad renovandum autem ptyalismum, sanguinemque diluendum, eoque modo pustularum egressum promovendum, & ne dysuria ex empl. vesicatorio contingeret, sequens apozema præscripsi.

2℥. Decocti Pector. 1℔j℔. Aq. Pæon. comp. 3j℔. Syr. de Alb. Jubin. an. 3j. Mf. f. Apozema, de quo sumat haustum frequenter.

Et ad promovendam diaphoresin, ut Sp. corn. C. gutt. xx. hausti apozematis adderentur.

Deinde ad lateris dolorem leniendum, haustum sequentem, cum pulv. e chel. cancror. comp. ℥j. sumendum præscripsi.

2℥. Ad Meliss. 3j. Bryon. comp. Syr. de Mecon. Ol. Amyd. dult. an. 3℔. Mf. f. Haustus.

Et quo melius restitueretur ptyalismus, quoddam gargarisma, a patiente antea probatum, permisi usurpandum.

Ad hæc omni loquacitate, & visitantium turba ægrotæ interdicti. Ut si insomnis fuerit, saltem tranquillitate frueretur. Suasi etiam, ut possetum salviatum, & calidulum affatim bibat, ad calorem internum minuendum, meliusque producendam diaphoresin.

Die 28vo dolor lateris multo fuit remissior, & jam quiete jacuit, etiamsi nox sine somno præterisset. Caput etiam pacatius, & respiratio facilior. Pulsus tamen frequens adhuc, & debilis; at cum motu magis æquabili. Quin & palpitatio cordis, tremorque persistere, & convulsivorum motuum quædam specimina, lenis tamen jam orta fuit & universalis diaphoresis. Calor item externus magis regularis, & in manu ubique sui similis. Lingua & urina eadem ac die præcedente. Et quamvis pectus adhuc fuerit oppressum, spiritusque defecerint, rariora tamen trahebat suspiria. Quibus omnibus perpensis sequentia præscripsi.

2℥. Pul. Chel. Cancr. comp. ℥j. Croci, Pulv. de gutt. an. 3℔. Syr. Pæon. comp. q. s. Mf. f. Bolus circa tertiam pomeridianam sumendus, & deinceps sexta quaque hora, cum Julapii sequentis haustulo.

2℥. Aq. Ceras. nigr. 3x. Pæon. comp. 3j℔. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Julap.

Et ut Apozema antea præscriptum continuaretur.

Cum vero cubicularia nre jam discessuro submissiori voce fuisset allocutæ; contigit ut ægrotæ putaret illam dixisse, se brevi fore maniacam. Quod ei adeo perturbavit animum, ut paulo post in delirium (a quo ex primo meo præscripto huc usque immunis fuerat) de novo incidit. Pharmacopœus itaque missus est indicare mihi, quod Domino Couts gratum foret, si Medicum jam a multis annis sibi suisque ordinarium, meis associarem consiliis; ut si forsan alio fuerim advocatus, ille in promptu esset.

Vesperis convenimus. Et statim a consultatione inita, iste Medicus, primariam indicationem pro continuanda diaphoresi flocci faciens, medicamentis valde calorificis opus esse urget. Quibus a me rejectis, sequentia præscripsimus.

2℥. Lapid. Goens. 3℔. Oculor. Cancr. pp. ℥j. Croci, gr. iv. Syr. Pæon. comp. q. s. Mf. f. Bolus hora nona sumendus in Coch. j. Julapii sequentibus superbib. Coch. v.

2℥. Aq. Meliss. 3vj. Puleg. Bryon. comp. an. 3j℔. Oculor. Cancr. pp. Marg. pp. an. 3j. Sacchar. albiss. q. s. Mf. f. Julapium.

Et ut applicentur emplastra epispastica super carpis.

Martii imo nobis narratum est, patientem nocte præcedente insomnem fuisse: & jam inquietudine, calore, & delirio laborare vidimus: medicamentum enim sudorificum, diluensque omissa fuere. Proposui itaque antimonii diaphoretici usum, medicamenti, scilicet ad pustulas miliaryes emittendas nec non ad levandum delirium, a me sæpissime probati. Ille vero, postquam diu renixus est, tandem mihi assensit; convenitque inter nos sequentia præscribere.

2℥. Antimon. Diaphor. ℥j. Lap. Goens. gr. xij. Castorei grana aliquot, Syr. Caryoph. q. s. Mf. f. Bolus sexta quaque hora sumendus, cum Julapio antea præscripto.

Et ut emplastra subpedalia applicarentur.

Die 2do involuntarie quidem urina extillaverat; sed id a vesicatoriis, ut videbatur. Domiti enim delirii loco sana mens rediit. Respiratio etiam erat facilior; motusque convulsivi vix quicquam sensibiles. Vidimusque pustulam quandam rubram super inspecto collo. Quod alter Medicus, hanc febrem hand esse miliaryem, arguere contendit. Quem errorem postquam illi ex aliis symptomatibus patefecissem; concordi animo eadem quæ ultimo præscripta sunt, continuari iussimus.

Die 3io in denudato pectore pustulas miliaryes absque ullis alterius generis conspeximus. Unde & quæque lenia sunt symptomata. Quamvis enim per noctem pene insomnis fuisset, ex leni tamen diaphoresi, quietudine, animique tranquillitate, & respiratione facili fruebatur.

Nihilominus ille idem Medicus, eorum loco, quorum usu finem desideratum obtinuimus, calida medicamenta, ad spiritus, ut aiebat, exaltandos, usurpari voluit. Ego vero, post longam discrepationem, cum assentire minime ausus sim, ipsum, ut per se faceret experimentum, permisi. Interim pharmacopœum cubiculariamque monui, ut horum calidorum effectum accuratissime notarent. Ille vero sequentia præscripsit.

2℥. Conf. Alchem. sine odor. 3℔. Pulv. e chel. cancr. comp. Lapid. contray. an. gr. xij. Salis Succin. gr. v. castor. gr. iij. Syr. e cort. citr. q. s. Mf. f. Bolus sumendus quinta quaque hora, superbib. Julap. seq. coch. iv.

2℥. Aq. Meliss. Lact. alex. an. 3iv. Scordii comp. 3j. Bryon. comu. 3j℔. Margar. pp. 3iv. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Julapium, sumendum ut supra præscriptum est, & pro libitu in languoribus.

Die 4to nobis narratum est, ægrotæ noctem valde inquiete transisse. Ita ut præ anxia quadam ægritudine sudores calidi per totum corpus ei effusi sint, & (ut asseveravit pedisequa) linthea mordere cogeretur. Ad hæc, maxima oppressione & dyspnœa, moribusque convulsivis magnis, & frequenter repetitis afflicta fuit. Quæ omnia pulsus frequentissimus, & vermicularis comitabatur.

Foras prædicta dos, quoad quantitatem, non adeo calorifica videbatur. Cum tamen brevioribus intervallis, & ab ægrotæ, jam & antehac ad febrilem effervescentiam proclivi, sumeretur; & ubi ren suo proprio morbo fuit affectus; minor dos, instar majoris valere potuit.

Cæterum ille alter Medicus, cum ad consultandum secesserimus, a me quæsit, quid esset tandem faciendum. Ego vero respondere haud dubitavi, locum consultandi dari nullum, nec quidem sperandi. Ille vero a sudoribus salutem promisit. E contra, eos ex agonia, & morbi veneno esse mere colliquativos admonui. Demum, post quædam alia hic illic objecta, sequentia præscripta sunt.

Applicentur empl. vesicat. ampla, & acria femoribus internis. Et repetantur subpedalia.

2℥. Bezor. Orient. 3j. Antimon. Diaphoret. gr. xii. Conf. Alchem. sine odor. 3j. Syr. Caryoph. q. s. Mf. f. Bolus quamprimum sumendus, superbib. Julapii ultimo præscripti Coch. iv.

2℥. Tinct. Castor. 3j. Capiat gutt. xvi. in haustu potus ordinarii.

2℥. Decoct. alb. 1℔j℔. Aq. Cinnam. kord. 3iv. Sacch. albi q. s. Mf. pro potu ordinario. Sed, antequam parata erant medicamenta, ægrotæ hæc mortua est.

In dissecto cadavere intestina, ut sæpe solent, flatibus valde distenta vidimus; & illorum vasa capillaria sanguine referta. Majora vero, & præcipue in peritonei interna superficie, stagnante sanguine quasi nigricantia, gangrænæ similitudinem præ se ferebant: scilicet, circa dextrum latus, ubi nuper ægra de dolore maxime querebatur. Nam antea latus præcipue sinistrum ei doluit. Ideoque sinistri renis parenchyma conspeximus absumptum, tunicalque pure plenas, & calculo magno, cum quibusdam parvulis infima, & antica parte positus. Ren dexter videbatur fere sanus; & similiter hepar, atque uterus. Vesica vero fellea bile flavissima, & subflavis lapillis distenta erat.

Ex his patet, dolorem diuturnum, & in recensitione symptomatum memoratum, a sinistri renis calculo; hæticam autem intemperiem, ab ulcere, & forsan e vesicæ felleæ lapillis, bilis exitum præcludentibus, pendere. Doloremque recentem in regione dextra a stagnante sanguine. Qualem dolorem, hoc est recentem, in aliis etiam cadaveris sanguinis stagnationi conjunctum sæpe comperi.

Historia Variolarum cum pustulis Miliaribus.

Julii 15. 1706. vocatus sum ad Dominam Bek, D. Bek Mercatoris celebris uxorem; quæ tum temporis, apud Hampstedium commorata est; cuique D. Schervood erat pharmacopœus. Hæc, cum antea perfecta valetudine usa fuisset; 14to die Julii, dolore dorsi vehementi, cum oppressione pectoris, atque altis suspiriis, spirituumque defectu, correpta est. Ex quibus symptomatibus, febris miliaris signis pathognomonicis, novi hanc esse hujus generis, pustulasque miliaryes se brevi exhibituras prædixi. Et de expectandis variolis feci etiam conjecturam. Eo magis probabilem, quod tum temporis longe lateque grassabantur. Consului itaque illam ad visitationes facilitandas, in Londinum deferri. Et ut tutius suum iter perficeret, Pulverem ex Bezoar. Orient. & Pul. e Chel. Cancr. comp. an. 3j. sumendum præscripsi.

Die 16to variolæ cum pustulis miliaribus interjectis emicuerunt. Præscripsi itaque pulv. e chel. cancr. comp. 3j. cum Julapii perlato communis haustulo, sexta quaque hora sumendum. Ad præveniendam diarrhœam dyspnœamque, tum decoctum album, tum pectorale, alternis vicibus bibenda. Quibus etiam provisum est, ne pustularum miliarum variolarumque materia emittenda desit vehiculum: & ut melius lingue viscositas inhiberi possit. Præscripsi etiam astringens gargarisma, ut ejus usu variolas de faucibus repellerem.

Die 17. pustulæ miliaryes, & variolæ numerosius extabant. Capite, gutture, Thorace, ventriculo, ægra bene se habebat. Oppressio etiam, & defectus spirituum fuere mitiores. Tantum insomnis erat, ut febre miliari correpti solent. Suasi itaque ut in omnium die præcedente præscriptorum usu persisteret.

Vespere paulum delirabat. Non a pustularum miliarum aut variolarum paucitate, satis enim erant numerosæ; sed ex perpetuis vigiliis. Ad quam confectioem Fracastorii, in hac febre vel laudano vel diacordio potior, in sequente haustu præscripsi.

2℥. Aq. Ceras. nigr. 3ij. Epid. 3ij. Conf. Fracast. 3j. Mf. f. Haustus persistente Delirio sumendus.

Die 18vo a nocturno somno delirium pacatum fuit. Ægrotæ autem embrionis recentis concepti abortum, verum absque ullo malo symptomate, passa est. Iussi itaque ut in usu antea præscriptorum persisteret. Addendo pulv. e chel. cancr. comp. singulis scrupulis margarit. pp. gr. vij. quo certius, & a diarrhœa, & a nimio lochiorum fluxu præcaverem.

Vespere variolæ satis erant conspicuæ. Ægrotæ tamen summa pectoris oppressione, spirituumque defectu laborabat cum suspiriis. Quæ symptomata, cum lenem & continuam diaphoresin indicarent, præscripsi pulv. e chel. cancr. comp. usum sine margaritis, & cum Julapio seq.

2℥. Aq. Meliss. 3vij. Pæon. comp. 3j. Syr. Caryoph. 3j. Mf. f. Julap.

Suasi etiam ut persisteret in usu apozematis pectoralis, addendo singulis haustibus spir. C. C. gutt. xx. Tum ad levanda ex oppressione suspiria, tum ad continuandam uberiores diaphoresin. Ubi enim per se extant variolæ, spiritusque elevari possunt sine diaphoresi, sale volatili oleo potius quam spiritu C. cervi utor.

Die 19no facies atque artus paulisper rumuere. Variolæ autem pleræque exsiccæ, & colore quasi corneæ videbantur. Oppressio etiam magna erat, & suspiriis conjuncta; sed sine spirituum defectu. Habita itaque ratione ad partium & variolarum tumorem, & pustularum miliarum eruptionem, julapium seq. præscripsi.

2℥. Aq. Ceras. nigr. 3x. Pæon. comp. 3j℔. Conf. Fracast. 3j.

Spec. Conf. de Hyacinth. sine odorat. 3j. Syr. e Mecon. & e Cort. Citr. an. 3℔. Mf. f. Julap. de quo sumat. Coch. iv. tertia quaque hora. Eo fine, ut ex dosibus, brevioribus intervallis sumptis, ægra perpetua quietudine in lecto jaceret. Eoque modo a frigore externo, & non semper variolarum, vesicularum tamen miliarum eruptioni inimico, præcaveretur. Præscripsi etiam, ut ad tussim dyspnœamque saltem minuendas, in usu apozematis pectoralis persisteret. Et cum variolæ jam & in collo & in toto corpore plene expulsæ fuerint, loco astringentis gargarismatis lenientem sublitui.

Vespere quiete, sed pene insomnis, jacuerat. In vola manuum, ubi

ubi cutis valde crassa, variolæ videbantur vesiculæ sero limbo plenæ; in aliis partibus quasi exsiccatæ. Præscripsi itaque, ut in apozematis pectoralis frequenti usu persisteret; scilicet, ad materiam & variolis & salivationi præbendam. Et ad maiorem cautelam, ne aut variolæ aut pustulæ miliares versus interiora remearent; haustui apozematis, aquæ theriacal. cochl. j. sæpe addendum monui. Et ut tumorem partium promoverem, hora somni haustum sequentem bibendum.

24. Aq. Paralyf. ℥ij. Theriacal. ℥ij. Confectionis Fracastorii ℥j. Syr. de Mecon. ℥ss. ms. f. Haustus.

Die 20mo omnia in eodem statu perdurarunt symptomata. Iussi itaque ut in usu mixturæ pacificæ antea præscriptæ quarta quaque hora persisteret: Et in usu apozematis, julapii, & gargarismatis.

Vespere, cum eadem videretur morbi facies, eadem quæ prius præscriptis continuanda. Et ut Julapii sequentis haustum sumeret in languoribus.

24. Aq. Meliss. ℥x. Peon. comp. Epidem. an. ℥i℥. Syr. Peon. comp. q. s. ms. f. Julapium.

Die 21mo ægra fere eadem ac antea. Id tantum jam querebatur, totum corpus vehementer prurire. Præscripsi itaque ut in usu omnium persisteret, præcipue, mixturæ pacificæ, ne inquietudine ex pruritu pateret frigori, eoque pustulæ miliares recederent.

Vespere, cum in eodem statu fuisset ac matutino tempore, visum est omnia jubere continuari. Eo potius, quod ex usu apozematis pectoralis gargarismatisque frequente omisso, salivationem (ut in variolis siccioribus, & corneis solet) sisti viderim. Hincque patet, cur multi, circa diem a morbi principio undecimum moriuntur. Nimirum, quod nimis parce ad diluendum attenuandumque sanguinem, & materiam in salivationem præparandam biberent. Unde & oneri succumbit natura, faucium subsidit tumor, cum gravissima dyspnœa, quæcunque expectorantia eludente; demumque ex alvo semel aut bis soluta, vel mensum effluxu, subito mortem obeunt. Calida quoque medicamenta, a multis præscripta, dyspnœam siccitatemque gutturis, & linguæ inferendo, simili epilogo præcludunt. Semper itaque usque ab initio, & per totum progressum morbi, diluentia præscribo. Nec cerevisiam tenuem pane tosto alteratam prohibeo; nisi ægritudo, vel nausea, vomitio, vel diarrhœa contraindicaverint.

In difficili respiratione, & ubi salivatione maxime opus est, indicationes pro medicamentis valde calidis nullas agnosco. Cæterum, si forsan, non obstante eorum usu, patientes evadant, viribus naturæ referendum est. Partium extumescens opiatæ satis bene promoven; & salivationem diluentia. Calida autem medicamenta, sanguinis accelerando motum, utrumque inhibent. Etenim fermentatio, & secretio contemporaneæ, nullo modo consistunt. Cujus rei exemplum nuperrime vidi singulare in domino *Hatfield*, cui pharmacopœus erat D. *Lancashire*. Is enim cum mali moris variolis laboraret, & ex sumpta tincturâ croci, vel confect. alchermis tantum pusilla dosi, febris vehementius accenderetur, coactus sum oculos cancerorum, margaritas, & similia, cum diluentibus præscribere. Quorum benigna vi ægrotum ex orci faucibus ereptum sanavi. Sed ad historiam præ manibus jam redeo.

Die 22do intellexi generosam mulierem, cujus hic casum narro, nocte præcedente vix dormiisse. Multum de calore interno querebatur, palluitque urina. Unde & metastasim materiæ, aut pustularum miliarium, aut variolarum metu. Præscripsi itaque sequentia.

24. Decoct. Pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an. ℥ss. Theriacal. ℥ij. Ms. sumat haustum aliquoties in die.

Et quo melius, non solum variolas, diluendo, sed & pustulas miliares, spiritus roborando foverem, julapium cum diascordio antea præscriptum, & alterum cordiale, una cum diluente julapio, vicissim sumenda præscripsi.

Vespere in eodem statu persistit. Ideoque eadem medicamenta iussi continuanda.

Die 23tio nempe a morbi principio undecimo, ægrotâ incidit in aliquanto gravius quam hætenus periculum. Nam totam fere noctem insomnis fuerat, potius, ut mihi videbatur, a pustularum miliarium vitio, quam variolarum. Præscripsi itaque Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. cum Julap. perlato sumendum octava quaque hora.

Vespere ter alvus descendere. Iussi itaque paregoricum antea præscriptum quamprimum repetendum. Et post singulas sedes, mixturæ cum conf. Fracast. cochl. iv. bibenda; addendumque decoctum album. Et ad alia symptomata, ut sint in promptu mucilago, & gargarisma, necnon apozema pectorale spiritu sulphuris leviter acidulatum.

Die 24. narratum est, febrem totam noctem intensiorem fuisse. Facies manusque, sed hæc minus, detumescere. Ad hæc persistit diarrhœa, defecere spiritus, respiravit difficillime, & salivatio declinavit. Quibus symptomatibus ultimo præscripta methodo occurrendum censui: Addendo oxymelitis scillit. cochl. j. aq. cinnam. hord. dilutum. Et ut pulv. e chelis cancer. comp. apozematisque pectoralis in usu persisteret; cum spiritus corn. c. gutt. xvj. in singulis haustibus apozematis. Et in diarrhœam, mixturam cum confect. Fracast. statim & post singulas sedes sumendam iussi.

Vespere facilius respirabat. Verum ex sumpto oxymelite scillitico aliquoties vomuerat. Julapii itaque sequentis haustum urgente vomitu bibendum præscripsi.

24. Aq. Mentb. ℥x. Peon. comp. ℥i℥. Spirit. Mentbæ gutt. xi. Syrup. Mentb. ℥j. ms. f. Julapium.

Die 25to narratum est patientem nocte præcedente calore febrili valde accenso gravatam fuisse; nec non delirio, respiratione difficili, & diarrhœa: minime autem modo paroxysmi regularis. Variolas etiam ubique nigricantes, quasi gangræna tactas, apparuisse. At cum mane accederem, symptomata hæc vidi maxime diminuta, & vomitio penitus suppressa. Ad trachæam autem, quam nunc passa est, strangulationem, pilulas sequentes sumendas curavi.

24. Castor. gr. vj. Assæ fœtid. gr. xij. Syr. Paralyf. q. s. ms. f. Pil. n. vj. Et ut persisteret in usu ultimo præscriptorum.

Vespere exacerbatio febrilis, cum vigiliis, delirio, dyspnœa, sedibus, motibusque convulsivis, fuit repetita. Emplastra itaque subpedalia, vesicatorium inter scapulas, bolumque cum julapio sequentem præscripsi.

24. Spermat. Ceti, & Pulv. Cancr. comp. an. ℥j. Laud. Lond. gr. j. Syr. Paralyf. q. s. Ms. f. Bolus sumendus statim, superbibendo Julap. seq. Cochl. iv. & deinceps per intervalla.

24. Aq. Rutæ, ℥x. Peon. comp. ℥i℥. Sacchar. albi q. s. Ms. f. Sydenham Opera Medica.

Julapium. Ut persilaret in usu apozematis pectoralis, & mixtura cum confect. Fracast. pro re nata.

Die 26to intellexi, noctu ægram perturbatam fuisse inquietudine, & delirio, nec non sedibus, spirituum defectu; sed sine suffocatione. Imperavi itaque ut in usu ultimo præscriptorum persisteret.

Vespere caloris exacerbatio renovatur. Mitius autem deliravit, sedesque paulo restrictæ sunt. Præscripsi itaque omnia continuanda; & urgente delirio, vesicatoria brachiis applicanda.

Die 27mo relatum est, noctem ægrorum pessime sustinuisse. Nam ex reacensa febre deliravit cum vociferatione. Quamobrem, & curatrix præscripta vesicatoria apposuit: Et ex vesicis apertis tam febris quam delirium multum levabantur. Iussi itaque, ut tinctura corticis Peruviani in promptu esset. Interim ad sitim sedandam, in lactis aquam alexit. saccharo edulcoratam biberet, & persisteret in usu reliquorum præscriptorum pro re nata.

Observandum est, post apertas vesicas emplastris excitatas, salivationem fuisse redintegratam, & ad diem hinc usque quartum persistisse. Unde constat in variolis, durante salivatione, medicamenta calida minime ad rem esse, nisi magnum aliquod symptoma indicaverit, & jam tum multum ea debere esse diluentia.

Eodem die circa meridiem ad patientem accedens vidi illam, inquietudine, delirio, dyspnœa, suffocatione, sedibusque immunes. Calorem solummodo sensit internum, illius, qui febris miliari, vel corticis Peruviani in febre intermittente præproprio usui succedit, non absimilem. Ad quem præscripsi margar. pp. ℥j. quinta quaque hora sumendum, cujus efficaciam, ad hujusmodi calorem extinguendum, frequenter expertus sum.

Vespere febrilis caloris erat expertus, nondum tamen alvus substitit. Volui itaque, ut sumeret perlato pulverem in forma boli, quo in ventriculo, & intestinis diutius maneret, transiretque melius in venas. Et ut decoctum album mixturamque ex conf. Fracast. &c. in promptu haberet.

Dio 28vo minus caluit, sedesque pauciores sunt. Nec recurrere reliqua mala symptomata. Præscripsi itaque ut in usu decocti albi, bolique cum Julapio sexta quaque hora persisteret.

Vespere in eodem statu erat laudabili quo mane. Ne tamen a vesicarum ulceribus, nimis cito desiccatis, morbificæ materiæ pars superesset, iussi vesicatoria pone aures applicanda. Scilicet ut cathartici vicem expleret, donec purgatio per alvum foret tempestiva. Et ut Julapii & decocti albi usus continuaretur.

Die 29no similiter ut pridie se habuit. Quemadmodum & diebus 30mo & 31mo. Quapropter & iussi, ut in usu pilularum ex assa fœtida &c. & Julapii persisteret. Et hoc die 31mo præscripsi pilulæ stomachicæ cum gum. ℥ss. hora somni sumendam, & mane seq. syr. rosacei solutivi ℥j.

August. 1mo ter quaterve alvus laxa fuit bonis avibus.

2do Usa est Julapio, & pilulis de assa fœtida, &c.

3tio & 4to & deinde 5to & 6to pilulas catharticas & syrupum repetendo, a morbo periculossimo omnino convaleuit.

Historia Febris Exitialis, ubi Æger statim a principio sua voce fuit privatus.

Circa quintam diem Octobris 1709. digniss. Viri D. *Guilielmus Morisoni* armigeri filius, sedecim annos natus, temperie biliosus, & in iracundiam aliaque animi patemata accensus, febre correptus est: in qua tempestate, ab aliquot antea hebdomadis, febris maligna Londini grassata fuerat.

Cum primum illum visitaverim, nulla pars ei doluit. Neque ulla vomitione, aut ventriculi ægritudine emetici usum indicante, tentabatur. Pulsus erat frequens ac debilis. Et usque a morbi principio magna loquendi difficultate, cum stupore, affectus est. Quibus accessere tumores subsultusque tendinum, lingua arida & subnigra, urina coloratior & clara, & ut plurimum involuntarie emissâ, cutisque calida, & sicca.

Hac pessimorum symptomatum apparente syndrome, accitus est D. D. *Grew*. Præscripsimus alexipharmaca ex serpentariæ radice, bezoar, &c. & paucos post dies maculis rubris, & purpureis ægroti cuticula, in primis super pectus, crura, tibiasque, fœdata fuit. Hæc symptomata, aliquando paulo mitiora, dies quatuordecim prævalebant. Postea evanuerunt maculæ, creveruntque adeo motus convulsivi, ut æger plures dies moribundus videretur.

Fere in morbi principio emplastrum vesicatorium capiti applicandum iussimus; ex quo recolligere mentem, & quodam modo balbutire cœpit. Deinde & in morbi progressu artubus universis alia apponenda; imo & aliquibus renovanda. Semper enim exsiccatis vesicarum ulceribus ferocius ingruiebant symptomata.

Deinceps, cum dies aliquot eadem vespere exacerbari videremus, corticis Peruviani tum pulverem tum infusum, minore dosi visum est præscribere. Unde motus convulsivi suppressi sunt. Ægrotus tamen, cujus vires & ipsa caro absumptæ fuere (ita ut in coxa, in quam cubabat, sphacelismus generaretur) tandem fato cessit.

Notatu non indignum est, quod morbi decem aut duodecim ultimis diebus, adeo fœtide spiraret perspiraretque ægrotus, ut cubiculum odoratis fumigare necessum esset. Et ego ipse, dum paulo propius illi, in os meum respiranti inclinarem, subito ægritudine, & languore correptus, horas aliquot in patulis agris vehi coactus sum; & inde rediens vinum Hispanicum montanum assatim inter prandium bibere.

Dissectus est cadaver perita manu D. D. *Duglafs*. Super pectus fusci coloris macularum congeries adhuc erat conspicua. In arteriis venisque in abdomine magis conspicuis, nil contentum erat, præter *σφοδρὸς* nigricantis sanguinis, mediis spatiis sero omnino vacuis. Haud quidem vulgare spectaculum. Vel quod rarius contingeret, vel ex febribus mortuorum rarius dissecaremus cadavera. Etiam si hic constet, hujusmodi cadaverum, æque ac aliorum, anatomem, haud mediocri ex usu fore. Proindeque hanc febris, licet alterius generis, historiam apposui; tum ut exhiberem exemplum, ad Tractatus prioris appendicem referendum; tum ut alios alia hujusmodi exempla, in communem Medicorum usum suaderem proferre.

Cum vel ætas jam provectior & in occasum ruens, vel adversa quacum jamdiu confictor valetudo, opportunum forte spatium posthac non concefferit, quo nuperas aliquot observationes a me (tametsi nimis sero in vita mea) factas, circa *Febrem Secundariam* variolis confluentibus supervenientem, in publicum edam; veniam dabit lector, opinor, si paucula quædam de hoc affectu, quantumvis a morbo quem superius tractavimus satis abhorrente, pergant subnectere.

Jamdiu alias demonstravi quantum intersit inter variolas generis distincti, & confluentis: in hoc scilicet quod qui *Distincto* genere laborat, vix opis medicæ indiguus, sponte sua, & naturæ vi convalescet; nisi forte ab initiodiaphoresi in lectulo continuo indulserit. Namque, uti pridem alibi adnotavi, qui *Discretis Variolis* laborat æger, cum satis prompte sudoribus diffluat, ac sibi omnia bona promittat, si morbi, ut sperat, virus per cutis poros hoc pacto amandaverit, diligenter ideo huic methodo insistit, tum remediis cardiacis intro assumptis, tum regimine calidiore, ut par est, adhibito; (atque hæc eo facit lubentius, quod tum ab hac methodo in principio sibi melius videatur habere, tum etiam ad male fundatam astantium opinionem propius accedat.) Tandem vero eliminatis per *diaphoresin* particulis istis, quæ ad pustularum elevationem, atque intumescuntiam faciei debuerant facere, die *Octavo* quæ turgescere, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat facies; flaccida e contra reperitur, & albescunt interstitia, licet interim rubescant pustulæ atque eleventur, etiam post ægri mortem. Qui ad hunc usque diem nullo negotio manaverat sudor, jam subito suæque sponte evanescit, neque remediis ullis cardiacis, vel etiam calidissimis, revocari potest. Æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementibus; urinam parce reddit, ac frequenter; ac tandem paucissimarum horarum spatio amicorum spem fallit, & ad plures migrat. Quando idem ille sine ullo vitæ periculo a morbo convalesceret, si naturæ rem committens, nulli se prorsus regimini subjecisset.

At in *Variolarum Confluentium* genere longe aliter se res habet: licet enim hæc (nisi sanguinis sive per pulmones, sive per meatus urinarios excretio primis diebus accedat) nec astantes admodum perterrefaciant, nec ægrum in discrimen aliquod vitæ adducant ad primos morbi dies: postea tamen istis diebus, sub morbi exitu, quibus ægrum maxime periclitari jam olim monui, ita derepente ad incitas redigitur æger, ut, an vita, an mors insequatur, pariter incertum sit. In horum numero *Undecimum* pono (si a primo morbi insultu computes) scilicet in minime crudo, at maxime vulgari confluentium genere: *Decimum quartum* in crudiore adhuc: *Decimum septimum* vero in omnium, quæ passim obviæ sunt, genere crudissimo. Tametsi æger nonnunquam, sed rarius, non ante *Diem Vicesimum Primum* fato defungatur, pustulis usque ad id tempus ita incrustatis exsiccatisque, & in carnes quasi impactis, maxime in ipsa facie, ut ad separationem nulla arte queant perducī. At vero undecimo die æger, ut plurimum primum periclitari videtur, febre atrociori, inquietudine, aliisque symptomatibus una invadentibus; quæ mortem in propinquo esse denunciant; a qua æger, nisi ars medicæ intercesserit, plerumque opprimitur. Quod si hoc die non succumbat morbo, utrique illi posteriores, quos indicavimus, adhuc metuenti restant. Quinimo per spatium illud omne quod inter undecimum, & decimum septimum interjacet, appetente vespere, molestissimo inquietudinis quasi paroxysmo quotidie vexatur; & mors quasi vi, & armis protelatur. Porro ostendi hanc causam esse majoris minorisve, in his variolarum generibus, periculi ægroto impendentis, quod scilicet in genere *Discreto* cum phlegmone sive tumore cum inflammatione (cujusmodi sunt pustulæ omnes ubi primum eleventur) puriores extiterint, ac proinde non nisi exigua puris quantitas in sanguinem per circulationis leges foret reagenda, ubi illæ jam cœperint maturefcere; nullus ex hac parte metus est, ne febris nimium insurgat, cum natura impressionibus in sanguinem factis a tantillo puris, cohibendis facile par sit. Cum vero in genere *Confluentium*, ubi corpus fere universum his phlegmonis protegitur, quæ postmodum in abscessulos totidem facessunt, tanta puris vis, diebus præfatis (in quibus pustulæ duce natura, *auxilio* suam, vel debitam maturitatem ut plurimum obtinent) per venas in sanguinem reducit, tanta item halituum putridorum copia ab omni corporis jam quasi suppurati undique superficie, in sanguinem subrepat, ut febris ex hac occasione excitata, naturæ vires penitus prosternat: atque ita extinguitur tandem æger, partim a febre, partim a veneno quod sanguinis massam infecerat, jugulatus. Quapropter quando ægri incolumitas usque adeo a variolarum paucitate, periculum vero e contra ab earumdem auctiori numero pendeat; dictat ratio, vel etiam sensus omnibus communis; periti Medici esse ita non materiam variolosam, sub principio morbi, regimine & cardiacis calidioribus vehementer propellere (unde nimia sit assimilatio materiæ morbificæ in sanguine contentæ, totaque corporis substantia quasi in fomitem morbi facessit) ut omnem potius operam in reprimenda tam enormi, & subtili inflammatione collocare debeat. Nempe educto ante omnia e brachii venis sanguine, si vel levis fuerit suspicio, sive a florente ægri ætate, sive ex eo quod sanguinem liquoribus generosis accenderit, sive quod vehementiores dolores in aliqua corporis parte fuerit perpeffus, sive denique ab immani vomitione, variolas jamjam exituras ad confluentium speciem referendas: postea vero propinato *Emetico*, ad eundem scopum collimabit. Cum vero nihil æque ægrum percalefaciat, nec proinde nimis copiosam materiæ variolosæ assimilationem æque promoveat, atque ægri jugis in lecto decubitus: ego illum ab usu lectuli interdum semper arceo usque ad *Sextam diem* a prima morbi invasione, sive ab eruptione pustularum *Quartam*, quo tempore omne pustularum agmen jam in conspectu est. Posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem: at non pluribus densioribusve stragulis coopertum, aut luculentiori in cubiculo foco illum uti sino, quam quibus sanus cum esset solebat uti. Interim cerevisiæ tenuioris aliorumque liquorum refrigerantium qui ægro sunt acceptissimi, usum liberalem concedo. Quandoquidem vero non obstante vel temperatissimo regimine, æger nihilominus in calores, deliria & molestas inquietudines frequenter incidet: *Hypnoticum*

præscribo singulis noctibus, sed paulo temperatius quam pro recepto more, sumendum: quoniam in hoc morbo quasi paroxysmus quidam, sive exacerbatio caloris & inquietudinis quotidie sub vespere fere reperitur. Quæ hic traditur methodus & ad præcavendum justo uberius variolarum proventum, (unde maximum ægro periculum intentatur, ut supra docui) & ad conciliandum tum incrementum pustulis, ubi jam omnes exierint, tum debitam postea maturationem, accommodatissima est.

Attamen (quod sane dolendum est, cum florentissima hominum ætas hac fere strage deleatur) tum his quæ præcipimus, tum aliis omnibus quæ hæcenus invenit ars medica præsidii nihil proficientibus; sæpenumero æger, licet usque eo admodum periclitetur, tamen vel *Undecimo*, quod usu venit, die, vel alio aliquo istorum, quos variis speciebus variolarum confluentium ceu *magis fatales* assignavi, vehementer febre corripitur, una cum suffocatione, & jactatione inquietissima, & de tanta spe decidens subito moritur, attonitis & stupentibus amicis, qui ad hoc usque punctum ægro bene ominabantur. In frangendo improvise hoc morbi imperu, cum prius is omnia fecerit quibus præcaveri potuerat, maximopere defudabit Medicus. Quem in finem serio perpendendum est, febrem illam adventitiam, quæ undecimo die variolis confluentibus laborantes adoritur, morbum esse tam ab ipsis variolis, quam ista febre quæ vel earum eruptionem præcedit, vel primis nonnunquam diebus a plegmonarum inflammatione gignitur, prorsus diversum. Nihil enim est aliud quam *Febris putrida*, proprie dicta, particulis putrescentibus, & a pustulis jam adeptis maturitatem suam inquinatis, in sanguinem, uti dixi, reorptis ortum debens, quarum noxia & naturæ inimica qualitate æger eodem tempore, & pessima febre, & veneno laceffitur. Quamobrem ea sola in remediis huic malo cedere posse, prudens quispiam existimaverit, quæ ad retundendam secundariam hanc febrem, quam putridam appello, maxime faciunt. Id vero nihil efficacius præstat, quam copiosa sanguinis eductio; quo pacto vitiatæ illæ particulæ quæ morbi sunt fomes, confestim e sanguine exulant. Neque huic praxi, si quid ego judico, variolæ in quo jam sunt statu, vel minimum intercedunt. Jam enim pustulæ nullo modo introrsum agi possunt, adeo ut si æger morbi tempore satis cederet, & cadaver in terram frigidam exponeretur, attamen pustulæ jam in duritiem incrustatæ, nec intra cutem se recipere, nec minimam molis suæ partem amittere poterint. Nec sane cum variolis jam nobis res est, sed cum alio prorsus morbo, nempe *Febre putrida*. Has ob causas sequente methodo, a quo postremas de variolis observationes in publicum edidim mihi comperta, feliciter usus sum, quam si omittas nec aliam video, nec conjectura assequi possum, quo pacto æger ita certo queat liberari. Cum itaque ad hæc incitas redactus fuerit æger, & ex inusitata symptomatum immanitate, statim animam acturus videatur, nisi quis *Seis* *ἡμέραι* præsentissimam opem adferat, in hoc inquam casu, sive alius quis isto posterior, sanguinis *℥x.* vel *xij.* ex eo brachio, in quo pustulæ rariores situ majorem feriendæ venæ commoditatem fecerint, quamprimum sunt mittendæ. Quamvis enim paregorica, vel lectuli interdum abdicatio primis morbi diebus etiam omiſsa venæ sectione, orgasmo vel paroxysmo, cum nocte ut plurimum ingruenti, debellando queant sufficere: attamen per hos dies febris secundariæ, nulli alteri adminiculo secure fiditur nisi copiosæ sanguinis detractio, qua sola orgasmus per id temporis deficiens tuto sedatur. Vespere anodynum, uti prius, larga dosi exhibendum est (ad quod jam tamquam ad sacram anchoram confugimus) atque ita deinceps tam mane quam sero, alicubi etiam & hoc sæpius. Est enim diligenter observandum, quod in quibusdam orgasmus ita supra modum afferatur, ut etiam prælonga paregorici dosis ejusdem impetum usque ad 12. horarum spatium subjugare vel sistere nequeat; quo in casu omnino necesse est, ut dicta dosi octava quaque hora repetatur.

Cum vero sub ultimis morbi diebus haud raro accadat, ægri alvum, partim a morbi natura, partim a magna paregoricorum vi, quorum opem plane deposcebat medendi ratio, ita constipatum esse, ut tum fere suffocetur ille, tum febris ad eum gradum ascenderit, ut jam de ægro pene conclamatum videatur; dabo huic nodo durus cuneus aptandus est, & rebus sic stantibus longe minus ægro periculi erit ab assumpto cathartico leniente, quam a febre eo vehementiæ ab alvinarum sæcum retentione profecta. Hic ego satis feliciter *℥iſſ.* *Electuarii Lenitivi in Aq. stillatitiæ tenuioris*, (ex gr. *Aq. Cichorei*, vel *Aq. Lactis Alexiter.*) *℥iv.* solut. propinavi. Qui quidem haustus licet tum ob alvi constrictionem huic affectui solemnem, tum etiam ob diuturniorem hypnoticorum usum haud ita subito ventrem exolvat, plerumque tamen si mane deglutiat, ante noctem defectiones aliquas parit. Quod si minus præstare valeat: attamen paregoricum vespere assumendum est, immo & citius, non obstante cathartico paregorico nuper assumpto, si modo inquietudo ingens aut ægritudo aliqua insignis periculum imminetur, ne æger hoc præsidio destitutus, dum defectiones nos præstolamur, luce privetur. Nec æger damni vel minimum ex hoc tam leni cathartico capiet, si nihil prorsus efficiat ad defectionem provocandam. Si itaque primo die votis non respondeat, iteretur proxime sequenti; quæ secunda dosi priori in suppetias data, rarissime Medici opem frustrabitur. At si primo die egerit, ut hujus saburræ quantum satis in præsens est, subduxisse Medico videatur, atque æger exinde melius se habere cœperit, secunda dosi in aliud tempus potest differri. Atque hac ratione tam venæ sectio, quam catharsis per intervalla repeti possint, prout febris mos, atque ægri inquietudo postulare videantur, donec tandem res in vado sit. Veruntamen in cathartico negotio illud probe notari velim, (ne injecta ejus rei mentio longe plus damni quam emolumenti apportet) ægrum non esse purgandum, nisi facessente jam morbo v. gr. die *decimo tertio*, aut eorum aliquo qui illum sequuntur; nec per istos etiam dies, nisi sanguis a quo secundaria febris invasit, fuerat imminutus.

Sed ut quantum in me est, praxi in hoc morbo ultimam manum imponam, paucula de *Sputo Sanguinis*, ut & de *Mictu Sanguineo* variolis supervenientibus in medium proferre non gravabor. Utraque hæc hæmorrhagia, ut olim adnotavi, sub morbi initio contingit pustulis nondum erumpentibus, vel si in quibusdam locis se ostendant, in plerisque tamen aliis adhuc sub cute densæ latent, atque ejus sunt generis, quæ in maxime confluentes adoleſcerent, nisi jam dictum symptoma ægri morte morbum finierit, maculæ interim purpureæ hic illic superficiem corporis obſident, tristem eventum interminantes.

tes. Verum tamen debita sanguinis contemperatione maculæ ejusmodi auferantur, attamen tam mictus sanguinis, quam violenta ejusdem e pulmonibus eruptio indubie mortem prænnunciare solent. Veruntamen tremenda hæc difficultas superari etiam possit, & ægrum in tuto collocari. Etenim cum hæc symptomata intensæ sanguinis inflammationi, ac proinde summæ ejusdem tenuitati originem suam debeant; remedia ista, quæ sanguinem contemperant, ac pariter quæ vi, qua pollent, astringendi incrassandique eum minus fluxilem reddunt, hæmorrhagiis hæc apprimere succurrunt. Quamobrem post unicam sanguinis liberali manu educationem *Paregoricum* exhibeatur, ut:

2℥. *Aq. papav. rhæad.* ʒij. *Laud. liq. gutt.* XIV. *Aceti distillat.* ʒij. *Syr. de Mecon.* ʒss. *Mf. f. Haustus.*

Deinde sequentia vel his similia præscribantur, donec hæmorrhagia prorsus evanuerit.

2℥. *Trochisc. de Terra Lemn. & boli Armenæ an.* ʒj. *Terræ sigill. Lapid. hæmatit. sang. Draconis, & Corall. rubri præparati ana* ʒss. *Maſtich. & gum. Arab. ana* ʒj. *M. f. Pulv. subtiliss. cujus cap.* ʒss. *tertia quaque hora ex Coch. uno Syr. de Symphyto, superbibendo coch. IV. vel V. Julap. sequentis.*

2℥. *Aq. Plantag. & germin. Quercus ana* ʒij. *Aq. Cinnam. bordeat.* ʒij. *Syr. de Rosar. siccis* ʒj. *Spirit. Vitrioli q. s. ad levem aciditatem.*

Interim singulis noctibus paregoricum præscriptum propinetur. Emulsionem item ex 4. sem. frig. maj. cum sem. papav. alb. magnopere conferunt.

Cessante vero hæmorrhagia, reliqua per decursum morbi agantur, prout in *Variolarum Capite* traditur.

Antequam finem faciam, hoc adjiciam; quod quoties guttulas aliquot laudani liquidi usurpandas præscribo, *Laudanum* meæ descriptionis intelligo; cujus formula in libro nostro *de Morbis Acutis*, capite de *Dysenteria* habetur. Et quod *Syrupum de Meconio* illum volo, qui conficitur ex ʒxiv. *Capitum Papaveris* albi bene siccatorem, & post (macerationem in aquæ font. ʒviii. ad horas 24.) probe coctorum, dein expressorum quam fortissime; quorum colaturæ adduntur sacchari ʒxxiv. & in syrupum coquitur. Has enim duas præparaciones in suo genere efficacissimas esse judico: præsertim *Syrupum de Meconio*, cujus ʒj. plus præstat quam ʒij. alterius istius, in quo papaverum capita humidiora usurpantur, liquor non ita fortiter exprimitur, & loco *Nigri* quandoque capita *Papaveris Rheados*, quæ paululum virtutis habent, partem ita magnam suppeditant. Quoties itaque non satis mihi constet de alterutro horum paregoricorum viribus, utrorumvis, loco *Laudani Londinensis solidi* sesquigranum, vel etiam *gr. ij.* soleo præscribere in aqua appropriata soluta; quo pacto ab omni errore & mihi, & ægro meo caveo.

THOMÆ SYDENHAM,

DE MICTU SANGUINEO

A Calculo Renibus impaeto.

Quamvis hominis minus cauti & prudentis esse videatur, observationem in vulgus spargere, cujus in seipso tantum experimentum cœperit; nemo tamen, opinor, æquus rerum arbiter ægre feret me, qui tandiu tantaque a *Mictu Sanguineo*, a calculo renibus impaeto orto, fuerim perpeſsus, humanitate & miseratione erga sodales in hoc malo meos commotum; iis qui eodem morbo excruciaci quandoque poterint, ista remedia indicare, quæ mihi alicquali levamini fuerunt, quantumlibet vulgaria, & nihili facienda forte videantur.

Anno 1660. *Podagra* me invasit, paroxysmo tum immaniore, tum diuturniore, quam prius unquam, miserum affligens, cum ex hac causa æstivo tempore, vel intra, vel supra lectum submollem jugiter ad duos menses decumberem, finem paroxysmi, dolorem hebetem & obtusum maxime in sinistro rene nonnunquam, licet rarius, & in dextro cœpi perſentiscere. A *podagra* convalescenti hærebatur utrinque renum dolor, qui per intervalla quædam, nullatenus acutus, sed satis tolerabilis, me submonebat; nondum enim paroxysmo nephritico (cujus sunt comites dolor ingens per ureterum ductus vesicam versus tendens, tum vomitio enormis) vel semel laboraveram. Quamvis vero nondum aderant ista calculi renum indicia, cum ratione tamen judicabam, me calculum, mole insigniorem in renum pelvi gestare; qui cum major esset, quam ut ex pelvi dicta in ureterum ductus elabi posset, prædicta symptomata non intulit. Qua in re, post annos multos elapsos me hallucinatum non fuisse certo comperi. Etenim cum bruma anni 1676. statim a soluto rigidissimo gelu, diu multumque obambulasse, urinam mox reddidi sanguine permixtam; idque toties mihi usuvenit, quoties vel multum itineris pedibus conficerem, vel in curru per platearum pavimenta veherer, quantumlibet lento equorum gressu; quod mihi tamen non accidebat, quoties per viam regiam lapidibus non stratom, licet quam longissime, curru vectarer. Urina quam tunc excernebam, tamen terribili sanguinis tantum non sinceri specie prodiret, non ita diu post sanguine in fundo seorsim grumescere, in summitate limpida & sui similis conspiciebatur. In hujusce mali remedium sanguinem satis copiosum e brachio mitti curabam, & post purgationes universales, medicamenta refrigerantia & incrassantia varii generis in usum revocabam; diætâ interea his consentaneam adhibens, liquores acidos, acres, & attenuantes solcite devitans. Cum autem neque ista, neque alia permulta, quæ numerare longum esset, quicquam prodesse, & metuens calculum, quem grandiores esse suspicabar quam ut expelli posset, aquis chalybeatibus ad exitum sollicitare, tandem spem rei bene gerendæ prorsus amisi; idque eo potissimum nomine, quod observarem senes aliquot mihi notos si bi mortem accersisse, dum hujusmodi remediis incassum morbi curationem molirentur. Stetit itaque sententia non amplius tentare, at vitato tantum, quam potui maxime corporis motu, ab hoc effectu mihi cavere. Tandem vero animo forte recolens, quam mire nonnulli deprædicent seminis *Fraxini* vim lithontrippticam, subiit cogitare, quod si semen ejusmodi virtute polleret, omnino verisimile esset *Mannam* fraxini adhuc plus posse. Cum manna, quam habemus, docente Botanographo τὸ πρῶτον Dom. Jo. Ray post alios scriptores, neque mel æereum est, nec ros aliquis cælestis; sed liquor potius, tam e foliis, quam e trunco & ramis fraxinorum in

Sydenham Opera Medica.

Calabria nascentium, exundans; de cujus rei veritate idem dum in *Italia* peregrinaretur certior factus est ab eruditissimo Medico, qui ex ramulis, & foliis linteis a se curiose contextis mannam (qui est succus, ut dixi) sæpius collegit. *Vid. Jo. Ray Catalogum plantarum Angliæ.* Experimentum itaque facturus, manna ʒijss. in feri lactis ʒbij. soluta hausi, paulillum succi limonum subinde, dum purgaret, deglutiens; quo & catharticum acuerem, quod segnius operari solet, & ventriculo minus ingratum redderem. Ab hujusce remedii usu vix dici queat, quantum ego levaminis circa renum regionem perceperim: licet enim antea non semper dolerent renes, tamen pondere quodam gravativo & molesto sensu afficiebantur. Quod cum ita feliciter mihi cessit, idem catharticum singulis hebdomadis stato quodam die ad menses aliquot continuos in usum revocabam, & post singulas catharticos vices melius me habuisse plane sum expertus, donec tandem etiam rudiorum curru conquassationem ferre potuerim, ab hoc symptomate prorsus liberatus usque ad veris tempus jam proxime elapsam. Quo appetente, cum per prægressam hyemem fere omnem *podagra* laborassem, atque nimia corporis ad motum inhabilitate, quieti, & *αὐτισμός* magis, quam alias solebam, indulgissem, rediit denuo sanguinis mictus. Hic ego an ad catharsin me iterum reciperem, hærebam dubius; quoniam nuperis hæc annis omni corporis substantia in *podagra* sedem, & somitem quasi perversa, catharticum, quantumlibet lene, diutinum *podagra* paroxysmum certo certius accersebat. Tandem animo succurrebat, quod si paregoricum singulis noctibus post purgationem adhiberem, quo tumultus a cathartico excitatus sedaretur, posse me pristinam methodum manna semel in hebdomada capiendæ tuto resumere. Uncias itaque duas cum semisse in feri lactis ʒbij. dissolutas mane hausi, & sero guttas xvi. *Laudani liquidi* in cerevisia tenui dormiturus adjeci. Et mannam & laudani dicto modo repetens bis in septimana ad sex vices. Postea vero manna semel in septimana tantum uterer, humorum illuvie jam ita copiose a cathartico subducta, ut a *podagra* minus metuendum erat. Cum tamen mea mihi ratio plane dictaverit, quod si facultate aliqua, sive dissolvente, sive alio quovis modo lithontriptica, fuerit insignita manna, omnino est necesse ut medicamentum, quale est laudanum, valide adstringens, remedii, in quo spem collocaveram, efficaciam, ac vim quadantenus infringat; satius esse duxi hypnoticum missum facere, cum jam semel tantum in septimana alvum solverem. In qua methodo jam ad menses aliquot perſisterim, eundem septimanæ diem ubique catharsi dicans; nec me ab hoc meo more, ex quacunque data ansa dimoveri paterer, licet a prima remedii hujus dosi dolor, qui in dorso erat, remittebat, uti prius, tamen non ita diu post repetita catharsis *podagra* signum dedit; quod nunc artubus, nunc visceribus, bellum cœpit indicare: at hæc morbi tentamina laudanum fortiter repressit. Cum hæc mihi medendi ratio hætenus bene verterit, in eadem perseverandum mihi esse judicabam, tam ad præcavendum mictus sanguinis recursum, quam ad imminuendam aliquantulum calculi somitem. Quod tandem votis respondit, hæmorrhagia ista ex quo *Tractatulum* hunc primum edidi prorsus evanescente, proindeque manna in totum abjecta. Purgationem itaque quod attinet (modo sanguinis mictus urgeat, & solum cathartico hoc lenitivo, manna scilicet, & secundum methodum supra a me traditam subducatur alvus) jam retractanda mihi est sententia illa mea, quam in scripto de *podagra* olim evulgaveram; nempe *podagra* affectis minime conducere, ut vel initio, ut vel in declinatione, vel per paroxysmorum intervalla purgentur.

..... *Nec si miserum fortuna Sinonem Finxit, vanum etiam mendacemque improba finger.*

Nondum enim in mentem mihi venerat, paroxysmum, quem a tumultuante cathartico excitandum metuebam, exhibitio sub noctem hypnotico prohiberi potuisse. Nihilominus si *podagram* solum respiciamus, evacuationes qualescunque plurimum nocent, ac proinde nequaquam sunt admittendæ, nisi symptoma dictum earundem usum omnino potulaverit.

De *Regimine & victus* ratione, quæ utrovis horum affectuum laborantibus competere mihi videntur, (quando nihil eorum præterire velim quæ istis usui esse poterint, qui iisdem, quibuscum Ego, morbis conflitantur) hæc addo: Mane lecto exurgens, decoctionis *foliorum Tea* cyathum unum alterumve exhibeo; dein curru ad meridiem usque gestatus, & domum reversus, quovis ciborum genere mihi grato & eupepto *modice* (id enim ante omnia semper, & diligenti cum cura tenendum est) me reficio; statim a prandio per singulos dies vini Canarini plus aliquid quarta parte libræ (seu pintæ) vulgaris ad promovendam ciborum in ventriculo concoctionem, & ad arthritidem e visceribus procul arcendam, haurire soleo. Pransus iterum rheda vector, & quoties per occupationes meas non distineor, rus peto, aeris salubrius inspirandi gratia, ad miliaria duo vel tria. Cerevisiæ tenuioris haustus mihi pro cœna est; sed & hunc repeto etiam in lectulo, me jam ad somnum compositurus, idque eo fene ut hoc julapio succos acres calidosque in renibus stabulantes, equibus fit calculus, refrigerem simul ac diluam. Ego vero & hic & inter prandendum cerevisiani tenuem lupulatum, cerevisiæ non lupulata, quantumlibet tenui ac miti, præferendam cenſeo. Licet enim non lupulata, mollitie ac lubricitate, qua pollet, ad subducendum calculum jam in renibus concretum magis faciat; attamen lupulata, ob levem illam stipticitatem quam impertiunt lupuli, minus facit ad sabuli vel materiæ calculolæ generationem, quam facit non lupulata, cujus & viscidior est substantia, & lutulentior. Quo die catharsi defungor, ex pulli carnis prandium mihi est; vinum tamen Canarinum pro more meo superbibo. Mihi cura est, præsertim hyeme, ut lectum temporius petam quo nihil magis confert ad concoctiones recte perficiendas, & conservandum pariter tenorem illum atque ordinem, qui naturæ jure debetur. Sicuti ex adverso, nocturnæ lubricationes senum cum morbo chronicis qualicumque conflitantur, tum concoctiones omnes imminuunt ac depravant, tum eorundem principio vitali vulnus haud facile medicabile infligunt. Illud etiam sedulo observo, ad præcavendum a calculo mictum sanguineum, ut quoties per plateas ad longius aliquod intervallum curru vehendus sum (gestatio enim, vel ad maximam quamlibet distantiam, per vias lapidibus non stratas minime officit mihi) non prius rhedam ingrediar, quam haustum cerevisiæ tenuis paulo liberaliorem inges-

fero, quem pariter iterum ante regressum domum versus, si forte alicubi diutius fuerim commoratus; quo pacto semper mihi amictu sanguineo satis est praecautum. At quoad podagram hoc unum adjiciam. Nuperis hisce annis ex errore aliquo circa sex res non naturales commissio, mihi retrocessio subinde materiae podagricae accidit; cujus signa sunt ægritudo ingens, cum vomitione, & alicui ventris dolore. Artus interim ex improvise doloris sunt expertes, ac ad motum plus solito habiles. In hoc casu congium unum liquoris possetrici, vel cerevisiae tenuis devoto, & quamprimum totum per vomitionem rejecerim, vini Canarii haustulum, cui instillatae fuerint laudani liquidi gutt. xviii. ebibo, in lecto ad quietem me componens. Atque hac methodo meipsum ab imminente morte aliquoties liberavi.

Et si vero haud quinquam fortasse deceat (eum maxime quem sive saluum, sive mortuum esse hominem vix interfit) ita crebram sui mentionem injicere; hæc tamen eo animo dicta volui, ut aliis, quorum vita salusque majoris fortasse ponderis & momenti sunt, queant prodesse.

Hic postremo subindicandum est ingens discrimen, in quod nonnulli se conjiciunt, tam calculo, quam podagra laborantes, quoties mannam in *Aquis Mineralibus* cathartici solutam inconsulto capiunt. Quamvis enim hoc modo assumpta, & celerius vim cathartica edat, & minori nausea ventriculum irriter; tamen minora ista commoda injuriam aliam ab aquis illatam pensare non valent. Etenim si calculus renibus inclusus ita magnæ molis sit, ut per uretherum ductus in vesicam propelli nequeat, istæ aquæ paroxysmum ut plurimum excitant, qui eousque perdurabit, cum magno vitæ ægri periculo, donec tandem calculus in pelvim redierit. Quinimo nec *chalybeatis Aquis* æger se tuto committet, nisi prius certo sciat calculum majorem non esse, quam ut per uretheres viam possit sive invenire sive facere, quod hoc tantum modo, quantum ego conjicio, certo dignoscere potest, si nempe jam antea paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpeffus, (cum dolore scilicet sævissimo in renem alterutro, per uretherum ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiorum aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguum congeriem, quorum unus subinde in uretherem illabitur, atque ita paroxysmum hunc invitat, qui fere non definit calculo in vesicam detruso. Cum res ita se habeat, nullum est magis efficax remedium, sive ad præcavendum minorum calculorum incrementum, sive ad eosdem e renibus deturbandos, quam *Aquarum Chalybeatarum* potatio liberalior, per singulas ætates jugiter repetenda.

Cum vero sæpe accidat, ut *Paroxysmo Nephritico* quis corripiatur, quando hujusmodi minerales aquæ haud præsto sunt, vel etiam tempestas anni adsit, quæ earundem potationi minus faveat, hac itaque compendiosa methodo, sine ulteriore remedium apparatu, insistentum. Si æger temperamento sanguineo præditus fuerit, & ætatem proveciorem haud adhuc attigerit, sanguis ex brachio reni affecto respondentem, ad 3x. extrahatur, deinde *Liquoris possetrici*, cui *Rad. Altheæ 3ij. incoctæ fuerint*, Congium unum quam citissime devoretur, & sequens *Enema* injiciatur. 24. *Rad. Altheæ & Lilior. an. 3j. Fol. Malva, Parietar. Branc. Ursin. & Flor. Chamam. an. M. j. Sem. lin. & Fœnurg. ana 3ss. Coq. s. q. Aq. ad 1biss. Colatura dissolve Sacchari culinaria, & Syr. Dialtheæ, an. 3ij. Ms. Enema.* Quamprimum per vomitionem æger totum reddiderit, quod per os ingestum fuerit, ut etiam erema rejecerit, *Laudani liquidi* satis magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel *Pil. Matthæi* xv. vel xvi.

In senibus vero, morbo aliquo diuturno fractis, ut & in vetulis, *Vaporibus*, vulgo dictis, obnoxiiis (præcipue si sub initium paroxysmi urinam ex reddant nigram ac sabulosam) venæ sectio ommittatur. At quoad reliqua, eadem, quæ jam dicta fuit, via omnino procedendum.

Sed ad calculum, qui hujus loci est, grandiorum revertamur. Quod si calculosus nullo unquam paroxysmo nephritico fuerit tentatus; cum jam major sit calculus quam ut ex pelvi possit elabi: non solum mihi proderunt *Ferræ Aquæ*, sed etiam ob jam dictas rationes, non sine præsentis periculo fumentur. Neque minus male quandoque *Podagricis* cedit aquarum mineralium usus, modo senes fuerint (ut sunt plerumque) & pariter corporis habitu phlegmatico imbecilloque. In his enim nonnunquam naturæ vires eo usque sunt imminutæ ac succisæ, ut omnino metuendum sit, ne tanta copia aquarum penitus obruantur ac succumbant. Sive vero hoc in causa sit noxæ, quam exinde capiunt homines tali habitu ac temperamento præditi, sive non sit; illud mihi compertissimum est, haud paucos, quorum corpora hoc morbo fracta admodum, & quasi confecta fuerant, hisce aquis interemptos diem suum obiisse.

Atque hæc eorum fere summa est, quæ mihi in morborum curatione hætenus innotescunt, ad diem quo hæc scribo, Septembris sc. vicesimum & nonum, Anno Domini, 1686.

DE calculo renibus impacto, ac inde enato mictu sanguineo, verba fecit in specie Clariss. noster Auctor, propria in hoc morbo describendo, eaque sane durissima usus experientia. At vero de aliis calculis, tum vesicæ, tum variarum etiam corporis cavitatum, aut solidorum partium, alium omnino siluit. Non itaque ingratum Doctissimo Lectori fuerit, si quæ de ejus natura, origine, progressibus, varietatibus, diversisque sedibus ac cura, magna diligentia scriptis consignarunt Præclarissimi Viri Carolus Drelincurtius, & Martinus Listerus, hic legendum exhibeamus, eoque magis, quod quæ ex illius Auctoris primo loco nominati, Discipulis, Magni sui Præceptoris duetu scribentibus & disputantibus, habemus, ejusdem variis observationibus, raris prorsus & curiosis, nobis jam dudum a Celeberrimo hoc Viro communicatis abunde illustrare valeamus. Sit itaque primo.

DISPUTATIO MEDICA

D E

CALCULO VESICÆ,

Quam sub Præsidio Præclarissimi Viri

CAROLI DRELINCURTII

Lugduni in Batavis Professoris Medici Senioris, habuit doctissimus Philippus Rose, Gallo-Cadomæus.

CUM Microcosmum inter & Macrocosmum, collationem instituo, & summas utriusque dignitates, rationis bilance exploro, summam illius cum hoc necessitudinem, satis demirari non possum. Quamquam etenim meliore principique sui parte, Microcosmus omnes Macrocosmi potiores excellentioresque videatur doctes excedere, posteriore tamen, utpote materiali, tanta illi cum hoc datur affinitas, ut ab iisdem principiis, ab iisdem elementis, iisdem prorsus, variorum impetuum, a Sapientissimo Creatore, editis legibus omnino pendeant. Hinc sane ter beatum prædicabimus, qui indefatigata, exactaque orbis machinæ φαινομένων, indagazione, accuratissimam, perfectissimamque eorum notionem erit adeptus. Enimvero hic præviæ scientiæ memor, consciusque, facta attentionis suæ translatione, omnes corporis humani tam salubres, quam insalubres, anomalasque constitutiones, maximo cum emolumento, scrutari potis est. At quamquam tam diviti scientiæ thesauro, mentis nostræ arcam locupletatam non sentiamus, nihil tamen est, quod nos a speciminis consilio deterreat, vel impediatur, quominus omnes contendamus nervos, ut *Calculi*, affectuum quibus adeo misere conflatur Adami posteritas, mehercule non infimi, *Natura*, *Differentiis*, & *Symptomatibus* rite explanatis, ejusdem *modella* delineationem absolvamus, eamque rationi consentaneam. Adsit infirmo tyroni saluberrimus humanæ profapiæ Medicus.

Quia animi Mercurius, loquela est, atque mentis nostræ sensa, aliter quam sermone, scriptura, vel nutibus, unicuique significare penes nos non est: hac moti ratione quædam in calculi ετυμολογία prælibare, ab instituto haud alienum ducimus. Calculus latinis vulgo sic appellatur, eos vero, qui aliquam in vesica fovent rupem, calculosos nominant. Istud autem concretum a calce suam traxisse denominationem (alicujus nempe αἰχλογίας ergo) cum fecundissimo Ger. Joban. Voss. in Etymol. Ling. Lat. existimamus. Medicorum Princeps nomine λῖθος calculum plerumque intelligit, uti videtur libro iv. de morbis. Calculosos vero λιθιῶνας, lib. de vuln. ut & affectum λιθίασιν, aphorif. 26. sect. 3. nuncupat. Helmontio post *Paracelsum*, calculus in tractatu de Lithiasi, vocabulo *Duelech* indigitatur.

Calculi nomine explicato, rem ipsam aggrediamur. Ejus autem naturæ certam, distinctamque notionem assecuti videbimur, si diligenti, rectoque examine, causas ejus tam efficientem quam materiam, quantum in nobis est, in medium protulerimus. De calculi materia, ipsiusque concrescendi modo, non parum apud artis proceres hætenus fuit dimicatum: quod quidem nemini admirationem pariat, si quot de cæteris affectibus & morbis, inter ipsos variæ promulgentur sententiæ, paulisper apud se perpenderit. Sed ne curiosius quæsitæ harum dissensionum occasione, extra operis cancellos vagari conspiciamus, Πατεικῶς Primariorum, hæc de re sensus huc referre, atque ex iisdem quid potius, quid verosimilius habeant ad majorem hujus lemmatis dilucidationem, depromere sat nobis fore judicamus.

Venerandus Ἀρχιατρός lib. 4. de morbis, qui sit calculus, quæque generetur ratione trutinans, sic scribit: Εἰν τῇ κύσει γίνεται λίθος τὸ πῶς ποῖός τε ὡς περ ἐφ' ὅδατι μὴ καθαρῶ παραχρῆσται εὐ κύσει, ἢ εὐ χαλκῶ, ἢ καπνῶντι, ἀποσάδμη ἅλις γίνεται εὐ τῷ μέσῳ. Οὕτω ὡς εὐ τῇ κύσει ὑπὸ τῆ δρᾶς, μὴ καθαρῶ εὐντος &c. in vesica generatur lapis hoc modo: quemadmodum in aqua non pura turbata in calice, aut in vase æneo, & denovo quiescente, sax simul fit in medio, sic & in vesica, ab urina non pura existente. Quæ quidem explicatio propter tanti Viri auctoritatem nobis plurimum arrideret, nisi facis in calicis fundo coacervatæ exemplum, quadantenus impar, mancumque animadverteremus. Quamvis enim facis in calicis fundo coacervatio, & calculi in vesica formatio utrunque convenire videantur, quod utrobique sit quædam particularum mixti liquidi, ab aliis secretio, seu coagulatio, procul tamen a sese invicem eas non parum distare, neminem negaturum arbitror, vel qui minimum ad speciem formamque utriusque concreti attendit. Nec dubio locum fore spero, si ἀποψία discrimen, quod intendo, unicuique palam fecerit.

Optice nimirum dignoscimus, facis in fundo calicis congestionem eam esse, quæ vel minimo ipsius vasis motu, vel aquæ in eodem vase coercitæ, facta bacillo agitatione, omnino solvatur, atque aqua impuris istis quicquid modis purgata, ipsis iterum inquinetur, summeque saturatur. Quod sane a calculi concretionem longe abesse, nullus refragabitur, qui matulam introspicere non dedignatur: nam inibi non secus ac in vesica calculum formari, cum Paracelso Helmontioque, mens nobis est: quod postea solidis confirmabimus argumentis. Si ergo calculi materia, sive calculus ipse parietibus & fundo matulæ adhærens examinatur, magnam certe ejus esse duritiem, nec non arctam vasis concavo adhæSIONem, sensus organici innotescet, adeo ut vel matula concussa, vel lotio alia ratione commoto, prædictus calculus a matulæ muris non secedat. Præterea silentio non possum prætermittere, calculi coagulationem absolute in fundo matulæ, instar facis prædictæ nequaquam fieri: insipientibus enim patet, matulæ fundi crustam, ab eisdem parietum lorica non multum differre, & æqualem fere cum ea crassitudinem habere. Unde merito concludimus, pace Hippocratis, facis in fundo vasis aqua pleni, eumulatæ exemplum, calculi διαμόρφωσιν, minus perfecte exponere.

At forte aliquis integer Hippocratis sensuum assertor nostram in improbando culpabit audaciam, atque ad paulo post sequentia ejusdem Auctoris verba nos ablegabit. Πηγνυται τε ὑπὸ τῆ φλέγματος ὡμῶς εὐντος, καὶ γὰρ γίνεται τῇ ὑποσάδμη τῆ φλέγματος μεμιγμένον: Indura-

turque a phlegmate crudo, gluten enim fit, phlegmate cum fecce mixto. Sed hæc prædictam nostram sententiam nullatenus debilitant, quin nihil aliud probant quam calculi concretionem a facis coactione, ut jam innuimus, maxime discrepare: καὶ αὖτε enim quam ex phlegmate & facis commixtione statuit Hippocrates, coagulationem calculosam alio penitus modo ac faculentam perfici, certo arguit. Nec etiam tale phlegma sive materiam pituitosam, ad calculi compactionem, & indurationem, maxime necessariam nobis fingimus: cum in matula tale gluten ut plurimum non reperiatur, nec ideo ibidem desinat constipari calculus. Sed donemus adesse in matula aliquam glutinis speciem, ac inde consequi liceat, eam calculi formationis esse causam esse genuinam, nec non eandem istam materiam esse meram pituitam? Quoad prius stare nequit; adsit enim tale gluten, vel desit, calculus in matula proinde nascitur. Quoad posterius, merito in dubium revocemus, utrum ista materia, pura puta sit pituita, an porius internum viscæ intro exsudans, atque ex ea in matulam emictum. Et licet talis mucago, calculi compositionem forsan ingrediatur, immerito tamen ejus concretionis atque indurationis causam, ad phlegma idque αἶμα, referamus.

Verum reclamabit alius, calculum suam coagmentationem duriemque glutini prædicto non absolute quidem debere, sed vesicæ calore atque siccitate, instar laterum fictilium, condensari atque lapidescere. Sed quam futilia & absurda sint illa vesicæ calor & siccitas, aut frigus ipsum, ad calculi ῥύσιν, nemo non videt. Nec etenim matula, sive vesica, intensis clibani ardoribus retorrentur, aut quid ex gravi Borealis Poli frigore participant, quo calculus instar lateris coquatur, aut instar glaciei congeletur, atque ad debitam, quam solet exhibere soliditatem deducatur. Quis etenim nescit, vesicam perpetuo serosi laticis stillicidio irrorari, matulamque, dum in ipsa calculus perficitur, lotio madere. Nonne etiam notum est matulæ calorem, si quis adsit, igni admoto, vesicæ autem calculo benignam ejus mucaginem abstergenti, fibras asperitatibus vellicanti, atque atterenti, acceptum referri debere. At hæc non magis in renuni, quam vesicæ, calculi generationem, prædictarum causarum ullam agnoscimus. Utrumque enim ab eadem causa esse oriundum, posthac propalabimus.

Sed in tantis rerum angustiis, tamque obscuro opinionum pene infinitarum chaos, veritatis partus maxime languescit: cui plures obstetricandi avidi, renuni vel vesicæ vim lapidificam alta voce implorabunt. Ast talis Lucinæ auxilium frustra invocetur. Quem etenim fugit ita philosophantes, obscurum per obscurius explicare niti, & ad patens celeberrimumque crassioris ignorantia facellum citatis equis confugere? Apage apage insulas, causas ignotas, superbamque qualitatem quadrigam, qua velocissime abrepti omnia naturæ ænigmata solvere, universasque difficultates superare, ac veluti calcare, nimis gloriose contendunt. Hos itaque missos facimus, ut quid hæc de re sentiat Fernellius curiose expendamus.

Prædictus Auctor lib. VI. de part. morb. & sympt. cap. XIII. asserit: *Omniem calculum in vesica conclusum, rudimentum quoddam e renibus traxisse, e quibus per nephriticum dolorem excidens, si grandiusculus est, in vesica aliquandiu hæret, ac plerumque persistit, illique allatarum sordium adhæsu coagmentatur, dum vetus confirmatusque lapis fiat.* Quæ Fernellii mens sua non orbat verisimilitudine, eamque ob rem ab ea non omnino dissentimus: cum enim ipse eodem libro notaverit, se neminem in vesica calculum habentem offendisse, qui nephriticis doloribus ante non fuisset divexatus; inde sane liquet plerumque vesicæ lapides calculo e renibus per urethres in vesicam delapso, principium suum debere. Quod suum judicium sequente paulo post observatione confirmare conatur Auctor, ajens: *Quoscumque exemptos vesicæ calculos obrivi (obtrivi autem experundi gratia permultos) in eorum medio quasi nucleum reperi, verum rudimentum e renibus deturbatum, diversi quam reliquum integumentum, ac involucrium, & coloris et substantiæ.* Luculentissima hæc Fernellii animadversio, ad ejus opinionem fulciendam non parum confert, adeo ut ipsius vestigiis incedentes, calculos vesicæ, maximam partem, prima a renibus accepisse voluminis sui stamina, non dubitemus affirmare: nec tamen ipsi penitus subscribimus; vesicam enim non secus ac renes fæxo fetu, quanquam rarius, imprægnari, a ratione alienum minime censemus.

Enim vero quamvis a Fernellii parte contra Hippocratem stemus, faciem subsidentem, sanguinis grumos, pus, mucosam pituitam aliisque id genus crassiora, facile ex vesica profluere cum urina, ac proinde calculum ex his non formari: ipsi tamen talium e vesicæ excretionem posita, calculi ibidem generationem, eamque primariam, tolli constanter negamus, neque enim ex ejus ratiocinio, inductionem imperfectam referente, quid generale deduci potest. Nam unicuique primo intuitu elucescit, prædicta omnia, a Fernellio enumerata, siquidem valeant semper e vesica foras amandari, calculi formationi nequiquam prodesse, ac proinde ex istis calculum progigni, negare, ipsi fas esse: sed inde omnem calculi in vesica concretionem, primariamque, ut jam scriptum est, omnino explodi, inficias imus; nam peculiarem calculi materiam, & a facie subsidente grumis sanguineis, pure, mucosa pituita, maxime diversam postea assignabimus.

Quæcumque hæc Auctorum placita ponderavimus, quo obscuram calculi cognitionem, e Democriti puteo nobis fortunate contingeret eruere, parum utilitatis nostræ tribuerunt indagini: aliorum ergo proram convertamus, ut ad optatum veritatis portum tuto valeamus appellere. Jamque mihi faustum iter polliceor, modo hac in densa tenebrarum caligine, ad ignem protinus apparentem, portusque optati nihil monstrantem ostia, recta contendam. Emporii *Spargyrici* siquidem portus hic est, bene est, nec etenim sibi temere persuadeant, abstrusam calculi indolem, aliter quam industria Vulcani resolutione, posse unquam referari. Hæcce investiganti, ratio omnium tutissima nobis est, sed cum curis, laboribus, nec non impensis, ardua sit, incerti de prospero cepti eventu, forsitan pro foribus hæreremus, nisi bonis avibus res in promptu nobis occurreret, Vigili quippe & indefesso, *Præstantissimi, & Expertissimi, DD. Caroli Dorelincurtii, Apollinis mei, æternum suspiciendi, reverendique*, scrutinio, perfectam calculi nanciscor analysim. Hic enim in *Epistola* sua Gallice exarata, cui nomen est, *La Legende du Gascon* &c. calculum in singula principia subtilissime diremptum, famoso offert viro. Quanta autem maxima possum fidelitate verba

Sydenham Opera Medica.

quæ pagina 35. habentur hic Latine referam. Sed quod tua longe dignius est experientia, & quod evidentissimum argumentorum augmentum mihi est, scilicet corporis humani calculi per ignem mihi suppeditat, longe potiori ratione quam per aquam, tertiam salis volatilis, & spiritus urinosi penetrantissimi, & circiter quadragesimam partem olei foetidi aut sulphuris: adeo ut inde mihi supersint fere due tertiæ partium terrenarum, qua trigesimam partem continent salis adeo fixi, ut ignem violentissimum sustineat. Quibus verbis cernere est hanc calculi resolutionem igne fuisse peractam, post aliam beneficio aquæ expeditam: quæ in superiori pagina est reperiunda: ea tamen quæ igne fuit absoluta, frequentius usuri, quandoquidem ut placet clarissimo Auctori: *per ignem mihi suppeditat longe potiori ratione, quam per aquam.* Tam certo tamque egregia calculi potius anatome, hic pedem figere segniter, instituti conditio prohibet. Pergo igitur inditas unicuique principio δυνάμεις sedulo investigaturus.

Scenam recludit *Spiritus urinosus*, isque penetrantissimus, potentissimus, mehercule, naturæ coagulum ac forsan pari non gaudens. Talem enim præ se fert ἐνέργειαν, ut spiritum vini, seu aquam vitæ dephlegmatam in offam coagulet. Testem appello *Helmontium de Lithiæ* cap. 3. §. 5. Rara hæc mirabilisque simul spiritus urinosi virium experientia, obsepiens calculi σύμπτειν, nebulas non parum diluit & dissipat. Validissimum quippe assequimur ἐλάττωσιν, quo præcepta a peripheria in centrum motus peragatur. Hic per transennam hominum sortem dolere mihi incumbit, quod ipsis fere solis inter animalia, talem spiritum gignere contigerit. Helmontii etenim opera distillata est urina equina, verum dissimilis prorsus inde emanavit spiritus, quod apud ipsum legere est, *Tract. de Lith. cap. 4. §. 9.* Hujus phænomeni, humano generi, proh dolor! nimium familiaris, rationem hanc esse arbitror. Homo scilicet gulæ satiandæ avidior, viscera condit in visceribus, sæpeque intempestiva eduliorum, spiritibus tam sulphureis, quam salinis, præsertimque terrestribus abundantium, farragine ventriculum ingurgitat, quæ ipsis fermentato forte non imbelli edomita atque elaborata per ductus mesentericos in lebetem cardiacum promoventur, ubi ulteriore donata coctione, majoreque exaltatione, numerosos spiritus, a sese invicem, volumine, figura, motuque sapissime non parum diversos acquirunt. Quemadmodum autem plurium Regnorum Imperia, dominationi suæ imminutionem pertimescere non solent, cum libris singulorum viribus, ex nulla parte in aliam, cum successu, fieri potest invasio: pariter si spiritus varii massam sanguineam exagitant, eamque uno tenore compellentes, temperata quadam proportionem, æquisque legibus, motus suos exerant; nihil sane, tunc, humano corpori, damni impendere potest. Sin autem res aliter se habeat, adeo ut v. gt. *Spiritus urinosus* aliis dominetur, ipse, procul dubio, in subtilissimas adjacentes particulas perpetim incurrens, eas non solum varia impellet ratione, sed etiam cum ipsis in mutuos ruens amplexus, siquidem idonea, al coeundum figura præditæ fuerint, pro superficiebus magis vel minus mediato contractu, magis vel minus solidum lapidem, seu calculum exhibebit. Felicior hac in parte equus suo Domino, ut & multæ aliæ brutæ animantes. Nam herbaceis parumque spirituosus vescentes pabulis, succum particulis activis minime, vel saltem parum turgentem obtinent: adeoque fermento generosiori, seu agente efficaciori, qualis est *Spiritus urinae*, destituti, calculosis concretionibus vacare, vel saltem raro infestari, debent. Quod rationi, nec non experientiæ consonum reperimus.

Canere palinodiam, molestum est: valeant ergo quæ scripsimus, sit quæ *Spiritus urinae* summus coagulator, seu genuina calculi efficiens causa audiat. Nunc in subjectam ipsius materiam diligenter inquiramus. At certe ipsa λέγεται αἶμα nequaquam erit. In matula enim materiam, seu calculum ipsum concavo adnatum vidimus, sed antea nullum urinæ phlegma aderat; neque etiam terra, sicuti videtur in concreto calculo: quin potius urina recens emicta, ubique & æqualiter citrino erat colore perfusa. Præterea notante Helmontio *Tractatu de Lith. capit. 3. §. 36.* concretio calculosa in vitreo recipiente e spiritibus, liquoribus nempe stillatis & claris, facta est: unde infero, calculosam crustam in matula contentam: pariter e spiritibus in urina mea delitescens fuisse confestim. Nec nobis obtrudant urinam nostram non fuisse destillatam; certissimum enim est, Helmontii urinam ab ipso destillatam aliud duelech non produxisse, quam quod non destillata fuisset editura.

Satis commode satisque evidenter *Spiritus urinosi* notitiam videmur adepti, nec aliorum cognitionem majus nobis negotium facessituram confidimus, si methodo jam incepta progrediamur. Ideo quadragesimam partem olei foetidi aut sulphuris considerare subest. Non solum autem ad prædicti olei qualitatem, sed & quantitatem fortiter attendere, non parvi momenti est. Primo, quoad ejus qualitatem, aliorum oleorum naturam sapit: quatenus ex particulis longiusculis, ramolis, sive invicem intricatis, ac proinde ductilibus constat. Foetidum etiam est, quatenus nimirum in distillatione, & præcipue in sanguineæ fermentatione, ac dein, vel in naturali, vel in artificiali matula maximam passum est sui dissolutionem: unde corpuscula ab ipso jugiter emanantia, nimioque fermentationis attritu figuras valde irregulares nacta, cum ad nervos olfactorios allidunt; irregularem etiam, seu ingratum sensum in nobis debent excitare. Secundo, quod ad quantitatem attinet, valde exilis est: quadragesimam enim tantum exhibet. Unde jure consequimur, parum olei seu *Spiritus urinosi* ad concretionem duelech concurrere. Præterea hoc sulphure eruto, materiam habemus in quam spiritus urinosus, dum in urina adhuc resideret suam potuerit ἀπορρόσιν exercere; eadem fere ratione, qua in Helmontii experimento citato.

Supereff tandem, ut duas tertiæ partium terrenarum, ut patet, contemplerur: ex siquidem etsi crassiores & graviores sentiantur, quam quæ ullo possent motu cieri, sicque vix eo inducamur, ut eas naturam spirituum potuisse unquam asciscere, credamus, ex præcognitis tamen liquido apparet, istam quam rudem & pene informem cernimus molem, motui tamen non plane fuisse ineptam atque alias, ante scilicet ipsius coagulationem, volatilisationis legibus paruisse. Rasuræ etenim matulæ duelech in pulverem redactum representant, ante ipsarum orium & captivitatem, per campam lotii libere exspatiabantur, atque in omnem loci differentiam abreptæ, spiritum indolem necessario æmulabantur, eoque magis, quod nullam peculiarem nobis præberent sui visionem.

Integrum non esset *partium terrendrum* examen, nisi quædam in *salem* intra earum viscera conclusum quædam mitteremus. Nam etsi *terrenas* calculi partes, *spirituosas* olim extitisse, in propatulo fit, dubio tamen aliquo posset quis nos laceßere; eo præsertim fretus, quod perpetuo laudandus Clarissimus D. Drelincurtius, designet illum *salem* adeo fixum, ut ignem violentissimum sustineret. Sed objectionis hujus facilis est enodatio, si mature considerabimus, istius salis, dum ignis viribus subiceretur, eam fuisse constitutionem ut ipsius minutissimæ particulæ arctissimam inter se iniissent unionem, convenienter præterea caruisse juvamine, seu vehiculo, quod veluti mechanicæ potuisset attolli. In matula, vel in vesica non item; singula etenim corpuscula salina, tum seroso latice, tum aliis particulis ibidem occurrentibus a sese invicem distincta, & divisa, communi liquoris motu, ultro citroque provehebantur. Ad hanc sententiam ulterius corroborandam multa possemus asserre, rationi & experientiæ cognata, sed cum præscriptæ nobis angustia, seu limites id non patiantur, iter maturabimus.

Cum res ita se habeant, causas calculosæ concretionis, tam efficientem, quam materialem, nos jam fuisse consecutos arbitramur. Pensandum nunc est quonam pacto ab istis duelech in matula oriatur. Quod sane non fuerit nobis cognitu difficile, si spiritus urinosi, spiritum vitæ coagulantis, virum meminerimus: Is etenim penetrantissimus, id est particulis valde activis donatus, stipatusque, vinosas, seu sulphureas impetens, easque ad mutuum cogens accessum, intermedias, tum terrestres, tum salinas, in summas redigit angustias, adeo ut velut irretitæ, motumque suum idcirco amplius edere nesciæ, in immediatum fere cum vicinis acquirant superficiem contractum, ac proinde cum ipsis firmissima fruantur connectione. Hoc prorsus morbo in matula æque ac in vesica, calculum fieri, persuasum habemus. Cum nimirum ægri urina in vesica, vel sani in matula, talem sui texturæ affectum est dissolutionem, seu corruptionem, spiritus urina penetrantissimi titulum adeptus talem valeat effectum producere. Si quis autem cum Paracelso, Crollio, aliisque causam calculi materialem tartari nomine velit intelligere, de verbo non litigabimus.

Calculi natura abunde satis explanata, præcipuas ipsius differentias enumerare, ordo postulat. Primo, alius est magnus, alius parvus. Secundo, alius mollis, alius durus. Tertio, alius gravis, alius levis. Quarto, alius levis, alius asper. Quinto, alius albus, alius subfuscus &c. Sexto, alius in centro nucleum habet, alius caret. Septimo denique, alius adhærens, alius vagus: quorum discriminum causas has esse opinor. Primo, quo diutius vel brevius in vesica calculus hospitatus est, eo majorem vel minorem materiæ appositionem passus est, ideoque grandior vel exilior est. Secundo, quo abundantior internæ vesicæ mucaginis copia in calculi compositionem contrahitur, eo mollius; quo autem parcius, eo durius duelech compingitur. Tertio, alius gravis, alius levis. Quod quidem secundum ampliorem tantum & minorem molem non est intelligendum, sed etiam respectum ejusdem calculi voluminis: uti perbelle *Mæcenas* meus, in Epistola sua a nobiscitata, scilicet pagin. 32. animadvertit. Quarto, alius levis, alius asper, prout nimirum æqualis facta est materiæ accessio, indeque sequitur. Quinta differentia, quæ colorem spectat: nam a varia corpusculorum ordinatione variæ parantur superficies, quæ solares, vel candelares radios diversimode reflectentes modificantesque, diversos necessario, ut *πρότερον ἀνέστηναι* suggerant colorum sensus: de quibus in *physica*. Sexto, si nucleus, ut sæpissime accidit, e renibus per urethras in vesicam devolvatur, ibique ulterius accipiat molis suæ incrementum, haud laboriosum cogitatu est, in calculi inde orti in centro, nucleum debere occurrere: non solum enim nucleus ille superstratis corticibus longe durior & firmior est: ut præclare monet *Athenum* colendus *Mæcenas*, prædictæ Epistolæ pag. 34. Sed insuper tam congrua, tamque homogœnea, particularum, uno verbo *tartarearum*, fieri non potuit adjectio, quin earum stratificationum ordines, a genuinis nuclei corpusculorum seriebus maxime differrent. Ista omnia contra *Fernelii* sententiam a nobis superius oppugnatam nihil facerent, nisi ex doctissimi *Salesii* ad eruditissimum *Beverovicium* responsione pag. 141. sciremus calculos dari nucleos carentes, qui proinde in ipsa vesica primariam, ut ante a nobis scriptum

est, sortiti fuerint generationem. Septimo tandem, alius vesicæ adhærens, alius vagus: hujus ratio nulli non perspicua: illius vero hanc esse reor. Quemadmodum matula, seu sigulinæ, seu stannæ, interior superficies tam continua ubique, & polita non est, quin innumeris scateat poris & asperitatibus, quibus proxime adjacent calculi materia concrescendo impingatur, atque affigatur: similiter in vesica eoque potiori jure, cum ea sit membranacea, accidere putamus. His subnectimus expertissimi Bartol. observationem pag. 200. anatomiz recens editæ; ubi (inquit de intima vesicæ membrana) *rugæ quam plurimæ in calculosis, & veluti cuniculi exculpti cernuntur, calculos servantes ex dilationis desuetudine contracti*. Unde haurio calculos non solum prædicto modo, interiori vesicæ membranæ, summa adhæensione adnasci, sed etiam intra ejusdem membranæ rugas intime coacervari, atque ibidem caveos cuniculos agere. (a)

Præcipuis calculi Differentiis perlustratis, antequam ad ipsius Symptomatum Signorumque explorationem nos accingamus, operæ pretium videtur disquirere, quinam illi sint in quos gravis hic affectus imperium suum exercere soleat. Primum obtinent locum, qui a patre vel a matre vel ab utroque calculosum acceperunt characterem; namut ait *Fernelius lib. 1. de morborum causis, cap. xi. nephritici, arthritici, & epileptici, filios vitiosa constitutione gignunt, qua tandem in morbos similes, hereditarios idcirco nuncupatos, incurrant, ut parentibus liberi succedant, non minus morborum, quam possessionum heredes*.

Quare mirum non videatur, si tot infantes, totque adulti miseræ vitæ stadium sæpe imperfecte emetientes, tam horrendis cruciatibus disorqueantur. Apud ipsos enim morbosum matrimonium tam validas tamque altas egit radices, ut nulla mortalium vis id unquam valeat penitus extorquere, funditusque revellere. Gaudeant ergo bene nati. Prioribus succedunt ii qui a parentibus aliquo infans oriundi, propter tamen magnam a causis externis in ipsos introductam alternationem, eodem ac præcedentes, affliguntur malo. Novit enim quilibet, quod causæ necessariae quas declinare non possumus, ut sunt aer, quem respiramus, *cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia*, quæ excernuntur aut subsistunt, *animi denique perturbationes*, totam animalis œconomiam gubernent, ideoque eorum vitio, vel ipsius animalis abusu, multa emergant monstra, humanæ valetudini infensissima. Hic inter marem & foeminam discrimen aliquod interferendum venit. Quamvis enim acceptas a parentibus morbosas affectiones, æquali jure, portioneque partiantur; attamen propter diversam partium, vesicæ in primis, varietatem, ille hac, in calculum propensior evadit. Utriusque nimirum, anatomie docet maris urethram longam, curvam, & angustam, foeminæ vero ductum, brevem, rectum, amplumque existere, adeoque difficulter ex illius, verum ex hujus, vesica, facile fatis calculum nondum seniore posse eliminari. Non omittendum adoltores, renem, infantes vero & senes vesicæ calculo magis esse obnoxios. Illis scilicet arteriæ & venæ sanguine adeo fermentato turgescunt, ut cum serum in renibus a massa sanguinea segregatur, spiritus urinosus, quo tinctum est, tali jam polleat virtute, ut particulas sulphureas & salinoterrenas in renum anfractibus statim coagulet, quo peracto latex aquosus per ureteres in vesicam stillans, in ipsa sterili omnino residet, utpote saxeæ semine in renibus orbatus. In infantibus senioribusque contra res habet. In illis enim adhuc tenellis & imbecillis, sanguinis principia, tanto fermentationis orgasmo non percelluntur, nec his senio pene confectis spirituum *δυνάμεις* adeo vegetæ, ut coagulator urinosus, tartareas particulas, in renibus, dum eos cum sero pertransit, queat in unum cogere, exinde salvis sæpe renibus in vesicam cum seroso latice depluit, ubi majori robore, atque imperio in particulis sulphureas & salinoterrenas, comparatis, earum vibrationes infringit, & quasi arctis compedibus revinctas impedit, quo minus vesicæ carcerem effugiant. Haud dubie tamen multi sunt senium a limine salutantes, qui calculos in vesica, ex renibus contraxerint, eodem pacto, quo cum *Fernelio*, supra narravimus.

Symptomata, quæ calculum vulgo comitantur, & ex quibus affectus *διάρρωσις* haurit Medicus, quinque enumerat *Hippocrates, lib. 4. de morbis. Σημεία δὲ ἡ νόσος ἔχει πέντε, ἐπὶ πέντε ἔρησε δὲ*

λν,

(a) Hæc omnia quam maxime illustrabuntur per ea, quæ nobis olim amicissime communicavit Vir omni sane laude major, ipse scilicet Carolus Drelincurtius: cujus hæc ipsa sunt verba.

Calculos instar corallii ramosos, & expansos ab ambitu pedis asferini in pelvim, ubi coeunt molem in unam, alias compactam & unicam; alias vero multiplicem atque divulgam, necnon articulis veluti distinctam, & *ginglymi visum*, ad lumbos inflexos & erectos, mobilem aliquando eduxi & iteri musei mei cimelia anatomica curiosis oculis objicio. Et isti porro calculi caput uretheris obstruant quidem & expanduntur; sed quia raro sphaerici sunt, urinam vulgo e pelvi in vesicam influere sinunt.

Calculos præterea in extremo urethere ita constrictos vidi, ut in vesicam devolvi nequeant, sed inibi hærentes, dum urinæ tenuissimum per rimulas transmittunt, crassam retinent, cujus accessu mole sunt auctiores, & uretheris infimul atque vesicæ unicæ ita distendunt, ut alterius idea vesicæ rudiores deludat, quasi reapse foret vesicæ duplex; & in illum crassum atque supinum errorem Medicos Casauboni incidisse putem, dum viri tanti vesicam urinariam nobis geminam obtrudunt. Hic porro, ubi ad extrema devenit, est, & calculi in infimo urethere taliter impacti atque cuneati viam urinæ præcludunt omnino, tunc illa in urethere stagnat, & illud enormiter expandit, una cum pelvi sua. Inde est ut in cadaveribus aliquot distentam urina pelvim, illaque olidissima detexerim. Imo totum uretherem eadem illa turgidulum & expansum. Sed a calculis divelli nequeo citra hist. unam & alteram. Ia. est de molli uno & farinaceo, qui solius in vesicam catheteris impulsu ita comminutus est & attritus, ut per frustilla minutiora totus fuerit abreptus urinae fluente: atque sic qui cystotomus erat in procinctu ad carnificinam, ab ea fuerit longe semotus. At e diverso calculos confervo siliceos omnino, quique de marmore resiliunt, uti *Brassavol.* narrat Comm. in Aph. 79. Sect. iv. Altera hist. puerilis quidem est, sed *Pæonio* stylo notanda. Puer calculi doloribus excarnificatus, & ambulationi impar, lecto detinetur, ubi post aliquot dies furunculus in peritonæo subortus est, cujus pus per medios acceleratores tam profunde serpsit, ut vesicam arroserit, quæ validius contracta non urinam modo, sed & calculum per ulcus emisit, atque ita prædam quidem eripuit cystotomo, sed fistulam ingeneravit, quæ perennat, & qua jugiter & unice effluit urina, abolito prorsus usu ductus nativi.

Caronidis vice fæmineos calculos subnectam per uretheram (*virili brevior, latior, atque rectior*) longe optatius excerni, quam in nobis, atque ita raras esse feminas quibus calculus extrahatur. Imo quædam vidi vesicæ doloribus seu labore partus, excruciatas, sed quæ post tormenta enormia pe-

træos fætus excluderint, in renibus embryonatos, & intra urinæ cisternam sensim auctos in molem usque ovi columbini. Et ipsum profecto, imo quid majus ab Hipp. visum est, viro ubique præxeos summe perito.

Calculorum Chymicam analysin habes in Epimetis Theſium de *Lienosis*. Sed in hæc Chymica calculorum vesicæ analysi, paucum exhibet oleum, quo bilarii calculi scatent, tanto ut aquæ innatent, & toti ardeant, picis instar. Deridendos ergo sese propinant, qui profitentur bilarios calculos in vesicula bilis & ejus ductibus concrescere ob prædominium tartari sive calcis, & defectum olei, sive sulphuris. Et id ipsum nequidem vere proferrent de concretionibus in arthritide nodosa; nam e virili pede, mensis unius decursu, gypſum vidi, sing. dieb. matur. eductum, quod glutine multo e tendinibus extensorum nudatis, & lymphæ ductibus incisis, viscetum erat; sed quod exiccatum, ac cerei flammulæ admotum leviter tantum arsit. Sulphuris itaque confors, sellei calculi forte. Id autem tartari singulis diebus a me collectum, supra chartam emporiticam extendebatur, exiccationis gratia, & ex illo, (*ad unciam circiter unam probe siccat*) frustra majora aquæ imposui, ac etiam demersi; sed suberis instar semper resiliunt & innatant. Illorum igitur comparatio cum calce vel gypſo, candoris quidem ratione valet, sed ponderis ergo claudicat. At calculi urinariæ vesicæ plani quidem innatant, sed depressi resiliunt, nunquam flammæ autem admoti non ardent, etsi sulphuris non exortes, sed ob ejus paritatem non ignescunt.

Isthæc rara quidem: sed rariora 2 proferam, i. de calculo unc. xv. quem inter *νεφρική* sedulus confervo. Is intra viri pancreas sensim increverat cum gravitate ad lumbos, maxime post pastum & inter ambulandum. Vomitus denique cievit enormes & letiferam atrophiam intulit, omni præpedito tam conficiendo quam distribuendo chylo. Mediæ est consistentiæ atque soliditatis inter vesicales, quos rarinaeos siliceosque designavi. Fundum aquæ petit, nec ardet, metalli more.

Alterum est de Virgine ann. circiter 20. qua dira cephalæa semestri discruciatâ, occæcata est tandem, ac reliquis deinceps sensibus orbata; & mediis in planctibus extincta.

Tota ipsi pinealis gland. saxeæ fuit, unius ovi gallin. amplitudine, & mole tanta nervor. optico. thalamos, nec non reliquos tandem nervos lethifice compressit.

ἀπὸ πονέεται καὶ τὸ ὅσον κατ' ὀλίγον ῥέειν, ὥστε τραγγυεκοῖσι. καὶ εἰς ὑφαίμον οἷα τῆς κύστεως ἠλκωμένῃ, ὑπὸ τῆς λίθου. ἢ ἡ κύστις φλεγμαίνει· ἀλλὰ τὸτο μετ' ἀφανέος σημεῖον δὲ ἀκροποσθίν. *Signa autem morbus quinque habet; nam ubi melle vult, dolore affligitur, & urina paulatim fluit, velut in urinæ stillicidio: & est subcruenta nimirum vesica a lapide exulcerata, & vesica inflammata est: verum hoc signum inconspicuum est: indicat tamen summa glandis pars.* Hominum symptomatum signorumque causas has esse ducimus. Primo quidem ἐπὶ πᾶσι δέλη, πονέεται. Quia cum muscoli abdominis, nec non diaphragma, vesicam in urinæ excretionem comprimant, valde verosimile est eorum & membranæ musculosæ vesicæ actione, lapidem e suo loco dimoveri, atque asperitatibus ejus interioris membranæ fibras corradere: unde non parum sensibilis debet exoriri dolor. Verum quandoquidem totus omnium prædictorum musculorum impulsus, urinam ad meatum urinarium impellit, maxime probabile est, calculum eadem vi, eodem loci pelli, præsentiaque sua qua egressum urinæ fere præcludi, eam sinere κατ' ὀλίγον ῥέειν ὥστε τραγγυεκοῖσι. id est veluti in urinæ stillicidio dolorifico: quod est tertium symptoma. Quarto καὶ εἰς ὑφαίμον, & est urina subcruenta. Cujus symptomatis rationem reddit ipse Hippocrates: οἷα τῆς κύστεως ἠλκωμένῃ, ὑπὸ τῆς λίθου. nimirum vesica a lapide exulcerata. Quinto tandem, καὶ ἡ κύστις φλεγμαίνει, & vesica inflammata est. Quod de symptomate nutare videtur Auctor, id enim vocat ἀφανέος. Exinde conjectare licet, illud symptoma non esse perpetuum, nec παθογενέον, sed tantum in iis locum habere, quibus vesica calculo impense læsa fuerit; adeo ut etiam ἀκροποσθία, id est, summæ glandis ardor illud significare debeat, seu potius ordinario manifestet. His accedit subsequens Hippocratis textus, ex quo aphorismus 79. sect. 4. Οἷοσσις ἐν τῷ ὕρῳ ψαμύδεα ὀφίσταται, τετίσιον ἢ κύστις λίθια, quibus in urina subsident sabulosa, iis vesica calculo laborat. At hic aphorismus tam renum, quam vesicæ calculo competere mihi videtur. Renibus quippe calculo laborantibus, sabulosa etiam excernuntur. Vesicam tamen vel renes speciatim potest respicere, modo cum aliis signis magis particularibus conjungatur, seu coincidat. Hæc & alia signa, ut crurum intercrucesiones, manuum pudendis admotio, priapismus, tenesmus, &c. tam ab Hippocrate quam Fernelio, Sennerto, aliisque magnæ notæ Auctoribus probata, cum fructu possunt usurpari si calculus vagus fuerit; at si laterali vesicæ parti, vel etiam ejus fundo adhæserit, vix ullum ex prædictis signis de illo nuncium refert. Hæc in re nobis favet Fernelius de part. morb. & sympt. lib. vi. c. 13. Huc accedit memorabilis historia ab Helmontio descripta tractatu de lithiasis, cap. 3. §. 40. de quodam Prædicatore prope Barclajam in Anglia, qui anno 1629. sanus atque sospes contendens a prandio, librum e sublimi ad se trahere, in imo ventre, magno percussus pondere atque dolore, certis inde a quadriduo signis, scivit se calculo gravatum. Ex hujus narrationis conditione & circumstantiis, judicare possumus Prædicatorem, nullam antea ab isto calculo tulisse molestantiam, nec ullam forte utinque manifestam de illo suspitionis causam habuisse. Omnia hoc in casu Medicorum dubia solvit catheter: ipso etenim leniter & industrie in vesicam immisso omnes explorantur anfractus, omniaque latibula, in quibus alioquin calculus omnem Medicorum solertiam & sagacitatem eluderet.

Jam hujus ægritudinis curationem suspicendi hora est. Sed hoc opus, hic labor est. Nam etsi concepta, causarum externarum immoderatione, atque intemperie, in calculum inclinatio, earundem immoderatione, & temperie, sæpe avertatur & emendetur, hæreditariam tamen, nulla posse fugari ratione, ratum habeo. Rara etiam, ut fortasse ignota sunt medicamenta, quæ ore assumpta activitatis sphaeram, tam longe lateque petant, ut ad calculum in regione vesicæ situm, ea extendantur. Tentandum tamen est quod ratio experientia maritata nobis est dictatura.

Vera & recta hujus hostis debellandi methodo insitemus, si primo grassari incipientis progressus inhibeamus, cumque si fieri queat, capite truncemus. Secundo, si eum jam vesicæ muris loricatum atque munitum, foras ejiciamus, integra, in primis, remanente arce. Primam indicationem absolvere poterimus, tali vivendi ratione, quæ massæ sanguineæ succos ad pristinam συμμετρίαν revocet; adeo ut spiritus urinosus omni sua ferocia deposita, cum partibus tartareis, tragicam suam personam amplius non possit agere. Primo si aer sit immoderatus, atque vaporibus seu effluviis e cryptis faxeis avolantibus, infamis, protinus deferatur. Hæc etenim non solum fermenta seu semina, calculo excitando idonea largiuntur, sed & homines, bestias, carpenta, reliquamque supellestem, in rupes aliquando valent convertere: ut legitur in Helmontio de lith. cap. 1. §. 18. multique in aliis Auctoribus. Secundo, summa cautio in esculentis, & potulentis capienda. Quippe ut ea, nimia quantitate ingesta, grave ventriculi fermento detrimentum incurrunt, & vitalem auram maxime pessundant, sæpeque suffocant, sic nociva qualitate, pluribus heteroclitis affectibus, ac præcipue hinc ansam præbent. Absit tetra ingluvies, quæ plures quam gladius perimit. Procul panis male fermentatus nec bene coctus. Legumina fere omnia, rubris ciceribus exceptis, caseus, lacticia omnia, pisces grandiores, haleces passæ, seu infumata, ostrea & conchyliæ, & tandem omnia quæ copiam feminis petrificantis secum gerunt. Horum vices subeant caro vervecina, vitulina, capones, perdicæ, turdi, coturnices, vitelli, ovorum &c. amygdalæ amaræ, pistacia, pinæ, nuclei persicorum ceras. ficus, rubra cicera. Inter herbas malva, atriplex, petroselinum, asparagus, & in primis chærosolium Sennerto singulare calculi remedium. Vitetur cerevisia nondum bene fermentata, in eamque dum coquitur semen dauci injiciatur. Fugiat etiam vinum non defæcatum. Nam ea morbi causam secum portant. Ex insalubrium numero est aqua stagnans, in fundo conceptaculi, silicibus, seu arenis orba, talis enim impura est, & terrenis graviora. Verum ea optima censetur, quæ perenni scarurigne, jugique fluente e terræ visceribus per summum ejus corticem derivatur, innumerisque calculis & arenulis fundum stratum habet. Motu nimirum, a corruptione vindicatur, & a spermate lapidescente purgatur; dum ipsum in arenas faciens subsidet. Vinum Rhenanum album, liquor pomaceus, pyracæus propter vim diureticam, valde juvat. Si qua autem purgatione utendum, ad succum sanguineum reformandum, inter alia hæc esto, a celebri Riverio probata. R. Cassiæ recentis extractæ cum ol. amygd. dulcium ℥j. diaphœnici ℥ij. rhabarb. pulv. ℥j. cum pulvere liquiritiæ, fiat bolus. Ad hujus effectus προφυλάξιν mire faciunt aquæ minerales acidulæ, & vitriolatæ; ut etenim ex varia corpo-

Sydenham Opera Medica.

rum concreta valent dissolvere, ita calenlosam dispositionem poterit enervant, plura utilissima apud Paracelsum, Helmontium, Sennertum, Riverium, aliosque famæ Medicos, quorum ampliora volumina hic inferere non decrevi. Tertio excernendorum excretioni, & non excernendorum retentioni prospiciatur. Quarto motu nimio pretiosum hominis balsamum non profundatur, nec pignori quiete torpeat, aut gravetur. Quinto de somno & vigilia idem dicimus. Sexto animi perturbationibus consulendum, eæ etenim, idem ac motus intensior, & quies desidiior, præstant. Omnia igitur mediomodo procedant. His & aliis, quæ opusculi brevis recenseri renuit, ingruenti huic affectui succurritur.

Ad alteram indicationem adimplendam non ita pollet Medicus. Vix etenim pharmaca cum sua operandi facultate, ad vesicam pertingunt. Tentanda tamen quæ calculum minuire referuntur. Radices apii, petroselini, brusci, graminis, asparagi, folia pariet. Semina anisi, fœniculi, dauci, carvi, ameos, carthami, rutæ, sal prunellæ, crystal. tartar. Primas obtinet sanguis hirci, vel integer, vel distillatus per B. M. Studendum autem cum Riverio, ut hircus nutriatur per mensem saxifraga, pinipinella, baccis juniperi, petroselino, aliisque diureticis, sine potu. Vinum alkekengi ab Arnoldo Villanov. maxime commendatur; quod fit fructus alkekengi contundendo, cum vino albo & colaturam exhibendo. Horatius Augenius historiam refert cujusdam typographi filii, calculo liberati per pharmacum a Jesuita ipsi oblatum, quod tale est. 2℥. pulv. millep. ℥j. ad summum ℥iv. aquæ vitæ ℥ss. juris cicerum ruborum ℥ix. vel x. capiat horis ante prandium quinque. Spirit. salis hispalensis extollit Helmont. de lith. cap. 8. §. 28. atque ipso calculum imminui. His omnibus ore haustis palmam præriperent medicamenta, quæ suadente Paracelso, aliisque in vesicam syringa transfunduntur; at ægrotum experientia id alienat. Nam mitiora medicamenta in ipsam vesicam injecta, dolores magnos cient. Si igitur diætæ appositæ, & remediis deglutitis, affectus rebellis non cedat, sacra anchora, κυστομήα, amplectenda, vesicæ inflationem, flabellò peractam, apud Ægyptios olim exercitam, abhorremus: varia etiam abhinc crudelia imaginamur tormenta, nec commodam calculi educationem. Nec spiritus a Fab. Hildano extrahendi calculi modus, magis nobis cordi est. Regnet ergo ea sola calculi eruendi ratio, quæ tot excellentibus prædictis, Celsoque præsertim, maxime arridet. Si quis autem nosse aveat, quale in viro, quale in puero, mulieribus, aut virginibus calculi educendi εν χειρὶ καὶ ἐκ χειρὸς excellat, peritorem χειρουργίαν monumenta adeat. Sed a radio librorum evolvendorum labore abstinere queat, quicumque exiniam dictam epistolam, ab ipso naturæ genio scriptam, consulere voluerit. Hic sisto calamum, & DEO TRIUNI gratias ex imo meo corde fundo, & ipsum demisso, humilique rogo animo, ut tentamini huicce benignus faveat, luminisque scintillulam gratus impertire dignetur, quo densis ignorantia tenebris mens mea tandem eripiat.

Dissertationem hanc primam, alia jam Præclarissimi Martini Lister excipiat. Quæ sic habet

DISSERTATIO MEDICINALIS

D E

CALCULO HUMANO, &c.

Calculi ubique corporis humani, at præcipue in renibus & vesica generantur: cujus rei rationem infra privatim exponam. Igitur inventi sunt calculi sub lingua, in ductibus pituitariis, in cerebro, in hepate, in pulmone, in vesiculis feminalibus, in utero, in ventriculo, in intestinis, in articulis tum manuum, tum pedum, at multo frequentius in renibus & vesica. Adibis *Historia Medicinalis* Scriptores, & præcipue mortuorum dissectores.

Calculi autem, etiam si maxime inter se discrepare videantur & figura & colore & pondere; nam in iis sunt leves, sunt asperi: alii opaci, alii pellucidi & crystallorum æmuli: sunt & tophacei & valde friabiles: alii vero vere metallici, ponderosi, peneque filicei videntur: alii rotundi, alii inæquales: alii quadrati: alii fissiles: alii testacei &c. tamen eorum natura & generationis ratio eadem est, non solum in hominibus, sed etiam in aliis animalibus, ubi calculorum quoque quam maxima varietas differentiarumque occurrunt.

At licet ea distinctio calculorum secundum loca & animalium genera laudabilis & historica sit, instituti tamen nostri brevis nos diutius insistere istiusmodi minutiis non patitur.

Verum ne futilibus conjecturis oratio nostra procedat, primum videndum est, quod nobis de calculorum natura, & ex eorum analysi per ignem, & cum crudi nondumque ignem experti fuerint, existimare liceat.

De calculo autem humano cremato hæc exhibet diligentissimus Leeuwenhoekius ope microscopii.

„ In calculo humano, inquit, ignis vi in calcem redacto, magna copia insunt & salia fixa & volatilia. Idem albi, ex sale volatili & fixo maxima pars calculi constituitur, itemque, calculi vesicæ humanæ ex magna particularum salinarum copia constanter. Porro, ex calculo combusto crystalli erant pellucidæ, atque ita angulares ac lateribus planis, ac si ipsum fuisset crystallum. Rursus ex calculo adusto, cui aqua infusa est, sal coagulatur, ac tam durum fit ac rigidum, ut quamvis aqua ad coctionem usque ferveret, sal illud tamen cum aqua non denuo conjungitur. Item sal volatile calculi adeo rigidum & firmum est, ut, ubi coagulatum est, humido cælo dissolvi nequeat. Ex capite mortuo calculi combusto, cui aqua pura infusa est, eadem aqua sensim in aere siccata detegi plures salis figuras, pellucas instar adamantum: nec solum erant pellucidæ, sed & anguli earum erant adeo glabri, ac adamantum anguli possint poliri. Inter eas vero maxima erat plana, & ejus basis triangulatis: unus ex angulis erat obtusus, juxta hanc vero jacebat particularum salina, cujus basis erat sexangularis, &c. Præterea jacebat (præcipue in liquoris superficie) magna copia particularum salinarum, similitum iis, quas in *Arthritis calcem* appellamus. Etiam si cælum, dum accurate intuerer salis particulas, admodum esset humidum ac frigidum omnes hæc particule undique,

„quasi aqueo humori injectæ erant : unde earum rigiditas facile conjici potest.

„*Calculus crudus* ex aqua frigida infusus suos quoque sales similiter rigidus dat.

„Nullam vidi particulam salinam, ex tot myriadibus salis, qui calculo humano insunt, communi nostro sali similem. Neque illud ex siccato humore detegi potuit.

„Omne sal palato nostro non sapit; ita nec sal e testis conchyliorum crematis, ex alabastro crudo; ita nec sapit qui elicitur ex calculo humano: id est, *agrem & acidum* saporem admodum salis communis non exhibet; sed sal tamen esse non desinit, i. e. suum habet peculiarem saporem, de quo supra satis dictum est.

„*Capiti mortuo* materiæ calcariæ *Arthriticorum* ad nigredinem exusto, aqua adjecta inest magna copia particularum salinarum, si milium salium in calculo humano scilicet rigidorum plurimumque angulorum; nihil salis vulgaris, quo in cibis utimur, inest materia calcaria arthriticorum, *Hæftenus Leeuwenhoekius*.

„Illud autem notes velim, figurarum salium illorum varietatem ac imperfectionem apud eum ab incredibili particularum salinarum exiguitate dependere, quæ, ut is testatur, vix tantæ sunt, ut multæ earum myriades arenulam æquent: adeoque propter parvitatem vix satis recte depingi poterant.

„In crystallos itaque majusculas (quantum fieri potest) aliquo artificio cogendæ sunt, ut lenta siccatione in umbra, idque diebus maxime calidis: quo certe tempore ex aquis nostris mineralibus crystallos ad sequis scrupuli pondus habuimus: deinde quo major quantitas salis erit, eo promptius experimentum ejus concretionis in crystallos, magnitudinis conspicuæ & perfectissime successurum est.

„Hæc autem non exhibui, ac si aliquod dubium sit de veritate experimenti à Leeuwenhoekio de illis salibus expositi, sed ut, etiam sine microscopio, vel nudis oculis res manifestaretur.

„Igitur de copia & natura salis in calculo humano jam satis fere diximus, item de ipsa calce similiter sive materia calcaria & metallica.

„Illud autem unum addam de hac calculi humani materia, scilicet quod in earum aliquibus debite crematis etiam ipsum *ferreum metallum*, ad aliquot grana adhibito magnete, posse extrahi; id quod olim ostendi coram *societate Regia Londinensi*, cum ibi forte caput mortuum dictum alicujus calculi humani a *D. Slave* expositum fuisset. Appello autem registra ejusdem *S. de fide experimenti*.

„Quæ vero præterea calculi, *chymica analysi* dent, minus moror, nempe olea & aquam. Cum non alia sint a sanguine humoribusque corporis: adeoque minus faciunt ad calculi generandi intelligentiam; quæ tamen hujus Dissertationis præcipua intentio est.

„Igitur his expositis quale sit id, quod in homine lapidescat, satis intellectum puto, atque ita *calculum definit*, nempe esse quid vere lapideum a sale lapideque calcario, & interdum a ferreo metallo, humoribusque quibuslibet corporis concretum, atque in plerisque ductibus viscerum excretoriis, maxime vero in renibus & vesica natum.

„*Causam* itaque *materialem* calculi in solis humoribus, ut in pituitosis, crassis, viscosis, tartareis aut sæculentis non posuimus. Etenim materiam non solum concretioni aptam, quales sunt humores, indicare satis est, sed etiam vere lapideam & metallicam calculi exigere videntur, atque ea ipsissima est, quam in proxime superiore Tractatu Anatomico exhibuimus, e quibus conchyliorum testæ sunt, inque fontibus medicatis inveniri diximus; nempe succum lapidescentem e saxo quovis calcario, pyriteve sive ferreo metallo *Germinante* ortum, atque aquis abreptum, nobis aliisque animalibus quovis alimento, maxime vero potione assumptum.

„Humor autem sive succus lapidescens etiam si ejus effectus passim extra nos innumeris exemplis appareat, tamen a nemine quod scio, explicatus est. Etenim Helmontii somnia hic non vendito, videlicet cuncta metalla ex mera aqua fieri specifica metallorum semina, fermenta, odorem & spiritum nescio quem urinæ lapidificum, terram ejusdem volatilem, spiritum vini urinæ incolam, hæc meræ nugæ sunt.

„Non semen, inquit Helmontius, cum aqua sibi subdita solum petrescit, quin insuper corpus sibi contiguum, odoris feminis petrifici, solo tactu petrificat, at si ita esset, cur renes & ipsa vesica non petrificarentur: ubi interdum semen istud, odor & fermentum tam vehemens est, ut innumeros & sæpe ingentes calculos generare possit sit: *ἀλλὰ εὐνδεις τὸ τὰς εὐνδεις τῶν λόγων λίθου ἔχεται*.

„Quæ vero passim observare licet, ea tantum exhibeo, scilicet saxa calcaria & pyriten i. e. ferri metallum sulphurentum, præ omnibus metallis, *salia sua lapideis particulis gravida* edere, more plantarum pullulantium; has vero *plantas salinas* aquarum cursibus dissolvi, iterumque vel ob moram, adhesionem ex aptitudine quadam partium & contiguitate, imbibitionem, aliave ignorabilia accidentia inter se coire, & in primam suam materiam redire, hinc, inquam, petrificationes extraneas, & calculos intra nos fieri verisimile est.

„Est itaque peculiaris quædam materiæ sive succi lapidescentis aptitudo, ut in lapidem convertatur, nimirum ex salis lapidei naturali coitione, ejusque rigiditate, ut dissolutioni, ut dictum est, resistat; itemque ex copia & qualitate particularum lapidearum in isto succo contentarum, suo scilicet sali ex quadam harmonia ortus, prompte committendarum, nexu haud facile dissolubili.

„Igitur calculi materiam ab esculentis & potulentis, quæ hujusmodi salibus lapideisque particulis abundant provenire. Si vero corpus bene se habeat, foras ejiciuntur, neque in renibus aut vesica retinentur; si renes imbecilli fuerint & vesica labefactetur, in lapidem coire apta sunt.

„Efficiens itaque causa calculi est copia materiæ lapideæ in ductibus viscerum excretoriis imbecillis diutius suppressa.

„Si qua vero sit in aliquibus hominibus hæreditaria dispositio ad calculum generandum, ea oriri possit ex mala partium constitutione, ex usu tamen quotidiano victus, lapidea materia maxime infestis, vel in maxime integris hominibus calculi etiam generantur, videlicet si alimentis continuo & magna copia utantur, quæ plurimum succi lapidescentis in se contineant, aquave bibant tali succo vitiatas, quia in illis aquis aut cibis causa materialis; unde est, quod in quibusdam regionibus præ aliis incolæ complures calculo laborent.

„Itaque renes & vesica vitiantur vel ex nativa constitutione, vel victu calculoso supervacaneo, quam autem rem sic intelligo, nimirum a nimia copia & pondere materiæ metallicæ arteriolæ capillares, renum ductibus excretoriis commissæ, distenduntur, præterque naturam valde ampliantur, unde excretio debilitatur a constrictione arteriolarum labefactata. Igitur materia metallica in ductibus excretoriis imbecillis sensum accumulatur moramque trahit, unde ejus coitio in calculos: idem cogita in tabe hæreditaria, ubi mala renum constitutio.

„Inter causas autem calculi *antecedentes & præcatarticas*, hæc recte numerantur.

1. Mala concoctio, qua chylus crudus & lentus quo involvitur succus lapidescens, indiscriminatim intra habitum corporis assumitur, etiam si vero causa calculi materialis non ex stomacho deducenda sit, tamen eo labefactato in officio suo chyli conficiendi, succo putrescens plus minus in omnigeno alimento necessario & naturaliter existens, possit ob chyli crassitiem citius & facilius in majores arenulas coire in renibus.

„Profecto robur inæquale partium est calculosorum præcipua ratio, ita renum alter calculos parit altero sano, quod satis evincit calculi vitium a parte labefactata potius, quam ab ulla materiæ calculosæ defectu oriri, quæ semper, ut dictum est, adest, at raro supra modum arenularum concrevit, nisi vitetur tonus & vigor renis expulsivus.

2. *Lactea infirmata*; nam ab iis integris etiam chylus bene digestus a succo istiusmodi putrescente ex parte purgans, quod scilicet is fluori minus aptus sit, adeoque inter alimenti soluti excrementa per intestina dejicitur, antequam venas lacteas subire possit.

3. Hyems autumnusque calculos renum parit, auctore *Artæo*, an quod magis laborent renes, suppressa ex frigore perspiratione cutanea.

„Sed ad alia pergamus, & privatim materiam calculi suppeditant maxime *ostrea* & omnia *Testacea* animalia, *aque medicata*, quæque vel calcario vel ferreo metallo imbutæ, & quæ petrescentes ob conspicuos effectus præcipue audiunt. *Vina* aut quælibet alia alimenta locis aqua petrescente vitiosis nutrita.

„*Salsa* autem *carnes* minime, prout Leeuwenhoekius extra dubium posuit, scilicet in calculo omnino nil salis culinarii reperitum esse.

„His vero adjici possunt *vehementissima quæque Diuretica*, quæ materiam morbificam vel nimio impetu ad renes deturbent, vel nictum per se minus noxium infestum reddant, quod ipsi renes ob nimiam excretionem infirmantur.

„In his quoque causis *Balneæ* ponenda sunt, quibus renes nimirum laxentur, item alimenta vehementer calida, ut piper, alia, resina quævis, exercitium vehemens, Venus immoderata.

„Audi Hippocratem, (a) pueris calculi principium *ex lacte impuro*, pituita enim ex eo lacte urinæ sedimento admixta, glutinum evadit; ac primum quidem parva lanugo accrescit, deinde quod accedit arenolum. Rursus autem alimentum solidum aut *lapidosum* efficitur, non secus ac *ferrum ex lapidibus* &c.

„Ita nobiscum satis bene sentit antiquissimus Medicus, calculum accrescere ex arena pituitæ commista, i. e. ex materia vere lapidea, primoque mollem velut lanuginem, mox virtute arenosæ accessionis solidum ac lapidosum effici, non secus ac *ferrum ex lapidibus*.

„Hæftenus de calculi natura, ejusque generandi modo causisque; proximo autem in loco ipsius morbi ratio sine *pathologia*, sive in renibus, sive in vesica fiat, instituenda est, cum *Diagnosticis* vero incipiam.

„Hæc autem calculi in renibus indicia sunt. 1. Omnium certissima significatio, calculus excretus est.

2. Ad renem doloris gravitas. (b)

3. Femoris e directo stupor sentitur, *idem ibidem*.

4. Nausea & vomitus.

5. Urina cruenta: at hoc perpetuum non est: unum tamen e præcipuis est quando contigerit, quod dolorem nephriticum a colico distinguat.

6. Urina in principio aquata, pauca, aut integra suppressio: a moto vero calculo per uretres, ea copiosa, fere turbida, arenosa.

„Hæc autem indicia per se patent, neque ulla explicatione, certe arte peritis, indigent.

„Ubi vero id malum in vesica fuerit, his indiciis, inquit *Celsus*, (c) cognoscitur. „Difficulus urinæ redditur, paulatimque, interdum etiam sine voluntate destillat, eadem arenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut *purulentum* aliquid cum ea excernitur; eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maxime hi, qui grandes habent calculos, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo dolorem levant. Gravitatis quoque cujusdam in ea parte sensus est; atque ea cursu omnique motu augetur: quidam etiam cum torquentur, pedes inter se, subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ vero oras naturalium suorum, manibus admotis, scabere crebro coguntur; nonnunquam si digitum admoverint, ubi vesicæ cervicem is urget, calculum sentiunt.

„Neque multum aliter Hippocrates. (d) „Hic morbus quinque habet signa: Dolor in urinæ reddenda: ejus stillicidium: interdum cruenta, a vesica inflammatione vexata: verum id non apparet, indicio tamen est *summa præputii pars* (i. e. inflammata) interdum arenosa reddit, interdum duos aut plures calculos.

„*Aræteus* ex antiquissimis auctoribus in plerisque confentit. „Si vesicæ inhæserit calculus, ex colliquationibus patefiat, neque doloris neque gravitatis expertes sunt, licet urinam expedite reddant: Sin minus & urinæ difficultas accedet: omnes vero calculos ex fabulosis urinæ subsidentis deprehendes, & quod istis virilia sæpius eriguntur: quando enim mejuat subestque calculus, dolent, tractant, attrahuntque pudenda, anus quoque vitii particeps redditur.

„De inflammatione autem vesicæ satis constat ex observatione Hippocratis, cum ad summam glandem fere visibilis sit ex insigni rubore; unde non mirandum est, si molestus interdum *pruritus* sit in pudendo, *dolorque* in vesicæ collo incipiens, ad glandis extremum usque porri-

(a) Lib. 4. de Morbis.

(b) Hipp. Epidem. l. I. S. I.

(c) Lib. 2. cap. 7.

(d) 4. de Morbis.

porrigatur, unde etiam *Virilium* frequens *erectio*, non secus accantharidibus sumptis.

Urinæ autem *Stillicidium*, & ponderis sensus: item mictio faciliior in uno corporis positu quam in alio; item deiectionis cupiditas, quæ mictionem excipit, hæc omnia a magnitudine, & figura & motu calculi oriri videntur.

Ultimum autem & omnium certissimum signum est exploratio, vel per digitum in anum, vel per catheterem in ipsam vesicam immissum.

De illo autem Hippocratis (a) aphorismo magna interpretum dissensio est a Galeno ad nostra tempora. Quibus in urina arenæ *Φαρυγγία* subsident, his vesica calculo laborat.

Johannis Zechii (b) opinio, ut video, plerisque arridet; qui hanc subsidentiam non meram arenam esse vult, sed gluren istud mucaginofum in plerisque calculosis conspicuum; at hoc non perpetuum signum est, adeoque minime pathognomonicum.

Sed, brevitatis causa, missis aliorum disputationibus mihi videtur Hippocratem hinc, generationis arenæ locum, non calculi existentiam indicare voluisse, & dicit tantum ipsam vesicam in vitio, ubi arenæ a mictione formantur atque subsident; ita quidem expono *ἡ κύστη λιθαία*, imo idem Hippocrates (c) alibi ait arenam non esse signum calculi in vesica; atque ita ille aphorismus diverso ab hoc sensu intelligendus est.

Verum ais, arenæ non sunt calculi, neque negandum est, quod a quibusdam exhibetur, scilicet vix e decem unum reperiri, qui arenas cum lotio non excernant; raros tamen esse, qui renum calculo laborent, & rariores multo, qui vesicæ.

Quamvis autem arenæ revera calculi sint, nec ab iis essentialiter differant; tantum secundum magis & minus, nam perexiguus calculus arena est; tamen aliquo sensu, in gratiam Medicorum, probanda est ista distinctio, nempe arenarum quotidianarum cum urina ejectarum, & calculorum majusculorum non sine dolore & difficulter excernendorum, utraque tamen partes, & renes & vesica tum suas arenas, suosque calculos generant; neque aliter visum est Hippocrati, ut supra dictum est in diagnosticis; vult autem in hoc aphorismo arenas ex urina micta subsidentes præcipue a vesica vitiatæ oriri, eamque calculis generandis præ renibus pronam esse innuere. At hic prætereunda non est singularis opinio Fernelii, qui statuit omnem vesicæ calculum, rudimentum quoddam, seu interiorem nucleum ex renibus trahere, e quibus per nephriticum dolorem excidens, si sit grandiusculus, in vesica hæret, & sordium illic allatarum adhæsu coagmentatur, dum adoleverit inustum lapidem; eo, inquit, argumento, quod neminem ostenderit in vesica calculosum, qui non fuerit diu ante nephritide vexatus: item quod in contritis vesicæ lapidibus nucleum quendam se reperisse asserit, diversi a reliquo integumento coloris & substantiæ.

Huic autem opinioni ipse addo, etiam in mediis calculis, e vesica excisis, vidi & *ferramenta* (d) & ossa, per ipsum penem injecta: possunt itaque arenulæ renum esse pro rudimentis calculorum vesicæ: at hoc perpetuum non est.

Etenim priorem hujus rei rationem alii Medici ex propria sua experientia negant; nempe in pueris calculosos dari, quibus nulli nephritici dolores antecesserunt: item non in omnibus calculis nucleum istiusmodi inesse.

Illud quidem verum est, calculos renum sive arenulas ab iis plerumque fulvas esse, vesicæ vero albicantes, quare? calculorum color, ut supra dictum est & consistentia varia: modo rufi, modo nigricantes, modo albi sunt, nempe pro ratione cibi potitionisve assumpti; at fere a renibus subcrocei, a vesica albi: an quia in renibus urina defœcatur, puriorque ei insit, arenularum materia ad oram accedens, in vesica vero eadem pituitæ mucosæ & albicanti, e glandulis excretæ, mista & contaminata sit.

Sed ad *Prognostica* transeamus.

Lapis magnus potione, neque medicamento frangitur, auctore Aræto. Chemicorum insomnia hæcenus vana sunt.

Morbus periculosus: hæreditarius incurabilis: nam calculorum procreantem (cum Aræto loquor) e fecunda sterilem reddere, nemo potest: facilius est enim uterum a pariendo prohibere, quam calculosos renes calculis vacuare.

Vitia renum & vesicæ in senibus difficulter curantur. (e)

Hippocrates in coacis vult lapidem in vesica non generari a 14. ætatis anno usque ad 60. nisi prius extiterit.

Ita parvi & senes sunt ipsis viris calculosiores. Pueri autem magis calculo vesicæ laborant, senes vero calculo renum: quid ita? Audi Galenum (f), quia in pueris facultas renum expultrix fortior est, ejus autem actio naturalis est, item retinendi in vesica facultas non minus fortis est; at cum vesica proprie receptaculum est, & pueri parum bibant, parumque mingant, cum mictio actio voluntaria est, vesicæ exonerandæ non attendunt, sic calculorum coitioni major opportunitas ex mora.

Ex anatomia autem discimus, ubi calculosis ægris mucosa urina effunditur, vesicæ corpus cancriforme esse, & digiti aut pollicis crassitiem nonnunquam adeptum esse: in calculosis vero, qui claram ac tenuem urinam mingunt, vesicæ substantia invenitur membranosa, fereque ut in statu naturali se habet; de his autem ita sentio, calculum primum exiguum concrevisse, vesica adhuc integra; aucto vero calculo, ab ejus pondere, asperitate motuque vesicam lædi, ejusque membranarum glandulas inflammari, intumescere, indurari, i. e. cancriformes fieri: unde veluti puris sive pituitæ viscosæ, interdum cruentatæ ingens copia cum urina profluit.

Postremo in *sectione* sola cura magnorum lapidum, *Celsio Aureliano* (g) auctore.

At, inquit, cur non quibusdam medicamentis dissolvantur, certe quidam lapides majores cum ex calculis in humano corpore reperti quidam tophacei & friabiles & leves, quales sub lingua & in articulis orti? Respondeo in vesica lapides fere silicei sunt, raro molles; & si ita, tamen ex arenulis duris compaginantur; Ratio est, quia per majores vias & in majoribus conceptaculis metalla, sive particulæ tum salinæ, tum lapideæ, e quibus iste succus petrescens constat, ponderis sui virtute fere copiosius & excernantur & in calculos concrecant, atque hæc hæcenus. Proximo autem in loco de curatione & medicamentis dicendum est.

tur & in calculos concrecant, atque hæc hæcenus. Proximo autem in loco de curatione & medicamentis dicendum est.

Curationes autem hæc fere instituendæ sunt: vel ad calculos minores, arenasve, cum molesti fuerint, expellendos, specialibus adjutoris: atque hæc fere diuretica sunt: vel materiam calculosam minuendam, doloresque acerbos mitigandos, in majoribus calculis excretioni ineptis: atque illa prophylactica anodyna sunt. profecto qui dolorem sustulit, satis ad valetudinem profuit.

Quoniam autem instituti nostri ratio brevitatem requirit, & ut repetitiones supervacaneæ evitentur, ex adversariis nostris ægros aliquot, qui nobis commissi fuerint, eorumque curationes paucis enarrabo, deinde medicamentorum, maxime a nobis exhibitorum rationes exponam.

Hi autem *Nephritide* laborarunt.

1. *Ægrotus.*

D. Dryden, Presbyter Ecclesiæ Eboracensis, mediæ ætatis vir, ex pluribus mensibus sanguinis mictione misere affectus est, maxime ab equitatione, aut vehementiori corporis motu: item calculos innumeros, fere arenosos (& in iis fuerunt, qui seminum coriandri grana implebant) excernere consuevit, huic etiam frequentissima mingendi cupiditas.

Is autem multa a multis frustra sumpsit: tandem hoc remedium a me feliciter præscriptum est (*℞. sem. & rad. pæoniae maris, & garici vitrioli Romani, mithridat. an. ʒ. ʒ. conserv. ros. rubr. ʒiii. Syrup. e ros. q. s. f. f. Electuarium.*

2. *Ægrotus.*

D. Breeden de Pangburne, unus e Parlamento Jacobi Secundi Regis, sexagenarius, ex vehementi saltatione in uno & dextro pede per hortos suos, quo exercitio aliis sæpius certare consuevit, sanguinem minxit.

Huic malo curando ei pluries sanguis e brachio missus est, aquas *ferratas* sumpsit; aliaque plurima medicamenta frustra ab aliis atque aliis Medicis adhibita sunt.

Post sesquiannum autem hominem in hac conditione inveni. Sanguinis plus minus ab aliquot septimanis quotidie mingebat, non sine urinæ stillicidio tumor ingens & durus in abdomine contra renem dextrum; item dolor continuus in dorso: summus ardor in imo abdomine e regione renis dextri; *vene* abdomine e regione renis dextri; *vene* abdominis externæ ejusdem lateris *varicosæ* & præter modum tumidæ; habitus corporis qualis in leucophlegmatia: multum stiebat: parum dormiebat. Denique huic coxendicum stupor, & summa crurum imbecillitas.

Huic autem malo sic auxiliandum censeui. (*℞. Mithridatii sine opio confecti. ʒi. ʒ. G. Tragacanth. aq. rosac. dissolut. ʒi. ʒ. f. pilul. n. vi.*) ex his unam singulis noctibus sumpsit.

Item (*℞. Aq. hordei ʒiij. olei vitrioli guttas vi. succi limon. ʒiv. C. C. ufl. ʒi. sacch. candi. albi. ʒiij. ʒ. misce; de qua ad ʒvi. bis quotidie propinavit.*

Item (*℞. Balsami martis i. e. salis martis ex balsamo Lucateli ʒi. (optime super marmor contriti) gr. iij. hora aliqua vespertina devoravit.*

Ex his autem medicamentis intra diem unum vel alterum multo melius se habuit.

Postremo bis hominem purgavi hieræ diacolocynthidos ʒi. quod medicamentum facile tulit.

N. B. Quamvis in reliquis mire a meis medicamentis levatus est: adeo ut non amplius sanguinem mingeret, & optime dormiret, & sat bene cibum appeteret; tamen vix ambulare centum passus præ mira imbecillitate crurum potuit, aut scalas ullatenus ascendere.

In hoc statu ad tres hebdomadas mansit: tandem nulla amicorum prece prohiberi potuit, quin rus iret ad quinquagesimum fere lapidem a Londiniis, ad videndum uxorem moribundam; ex itinere autem (quamvis lectica veheretur) iterum sanguinem minxit, & aliquot postea diebus ex urinæ suppressione interiit.

Ex dissectione Ren. dexter immensæ magnitudinis inventus est, cancriformis, ad quinquaginta uncias pendebat, atque in eo inventi sunt plurimi exigui calculi.

Nequeo sane mirari satis veterum diligentiam; nam cum rarissimum sit hoc morbi genus, idque mihi semel tantum in praxi occurrit, tamen apud Aetium summa accuratone descriptum illud legere est.

3. *Ægrotus.*

D. Athins, quinquagenarius, unus e regni Justitiaris, Eboraci, cum publica negotia obiturus erat, calculo laboravit, huic in altero rene dolor vehemens, vomuit, mingere cupit, at frustra, nam paucam tantum urinam reddidit, eamque aqueam.

E lenioribus autem medicamentis hæc sumpsit, nimirum præmissio enemate e therebinthina ex vitello ovi dissoluta in decoct. communi, cui vini emetici ʒiii. adjecta fuerint, parum effecimus: ideo statim hæc purgatoria exhibuimus cum diureticis mixta & stomachicis. (*℞. Elect. lenitiv. ʒʒ. assellorum cochinnell. an. ʒi. sal. absint. ʒi. m. f. bolus, huic superbibat potionem sequentem. ʒi. decoct. fennæ Geron. ʒiij. syr. e spina cervina ʒi. f. aq. mirab. ʒvi. olei amygdalarum dulcium ʒi. misce f. potio.*) bene fecit: calculos enim aliquot albos cum urina subfulva & fœculenta excrevit: & postriedie publicis negotiis præfuit.

4. *Ægrotus.*

Domina Bellingham quadragenaria subito post dejectionem vehementi dolore nephritico, & ad alteram abdominis partem correpta est; vomuit, mox quatuor calculos excrevit cum tantillo urinæ. Ab his primis calculis dolore perseverante hoc medicamentum præscripsi. (*℞. Cassia recenter extractæ ʒʒ. pulv. julap. ʒi. mercurii dulcis gr. vj. olei cinnam. gut. i. m. f. bolus.*) alios autem multos calculos deinceps per aliquot dies reddidit.

N. B. Horum autem calculorum color *luteus*, figura omnium subteres; at non eadem magnitudo: ad grana vero piperis majusculi, omnium durities insignis: aliquot ex iis fractis cortex lapideus unus, more cæparum alteri superinjectus est; item interior medulla similiter & lapidea, & rufescens.

5. *Ægrotus.*

(a) Aphor. 79. S. 4. (b) Conf. 58.

(c) L. de inaffectibus. (d) Acta Philosoph. Lond.

(e) Hipp. Aphor. 6. 5. 6. (f) In 6. Epid. sect. 3.

(g) T. P. l. 5.

5. *Ægrotus.*

D. Harduich, mediæ ætatis vir, ex itinere primum sanguinem minxit cum renum dolore; post aliquot veromenses calculos rufos exiguos non sine vomitu & vehementi renum dolore excrevit; item intra annum tertium eodem dolore renum correptus est; cum vomitu & calculorum excretionem.

Huic sic præscripti (*℥. Agarici pulv. ℥j. ℞. jalap. pulver. gr. vj. Summitat. hyperici pulverisat. ℥ij. vini veteris Rhenani ℥v. m. f. potio.*) ab ea vigesies minimum, deiecit, neque tarde aut cum ullis torminibus alvum movebat, convaluit.

6. *Ægrotus.*

D. Ascough, senex calculosæpe vexatus renisque alterius vehementi dolore, vomitu, sanguineo mictu, is autem dolor, ante meum adventum sine febre ad octiduum manserat, exhibui statim cassiæ ad ℥vi. &c. in bolo, a quo non sine levamine purgatus est; at rediit vehemens dolor; ideo nocte dormituro data est *Trochisc. Alkekengi*. ℥j. optime se habuit, postridieque mane sine ullo dolore calculum grandiusculum minxit.

7. *Ægrotus.*

D. Rhodes diu multumque renis dolore affecta est, cum vomitu: multa & enemata & alia remedia data sunt, a quibus inducias trium circiter dierum habuit, tandem huic dormitura vespere *Trochisc. Alkekengi* ℥i. exhibuimus, ea nocte placide quievit, & postridie hora aliqua pomeridiana tres calculos majusculos fere sine dolore excrevit, convaluit.

N. B. In his trochiscis insunt præter baccas solani Alkekengi dictas, & amygdalas amaras, & opium, &c.

8. *Ægrotus.*

D. Legger quinquagenaria, primaria femina, diu febre intermittente luctavit, tandem ad me venit, Eboraci degentem: graviter præter febrem symptomatibus histericis affecta est, huic adeo apozema præscripti ex cortice Peruviano, phyllitide, ceterac, ruta muraria, &c. Singulorum ad ℥iii. in vino post longam macerationem leviter coquend. de eo per aliquot dies sumpsit; tandem febre victa, vomitu & vehementi renis dolore correpta est, calculumque majusculum excrevit: id quod semel tantum in vita ante quinquennium fecerat: agnosco autem libens, & expertus jam egregiam vim herbarum capillarum ad effectus uterinos; at suspicor illas herbas non tantum calculum expellere, sed etiam ex parte illum ab iis, tanquam materia, gigni; quod rupibus fere calcariis, locisque montanis uliginosisque naturaliter crescunt, ubi eas plurimum succo calcario imbui nutritique necesse est.

Idem de eodem apozemate in alia atque alia femina, D. Roksbie, &c. observavi: unde magis magisque fidem do jam postea sententia.

D. Green, coquus aliquoties calculos a renibus excrevit; at ultimo paroxysmo, quo me accersivit ut opem ei ferrem, ex communi consilio cum D. Barwick collega meo dignissimo, *dysuriam* ad triduum passus est magna corporis jactitatione atque anxietate; in extremis autem cum pene de hominis vita desperatum fuerit, sic præscriptimus. (*℥. Cantharid. prob. tostatum, tantum non crematum ℥ss. aq. spermatis Ranarum ℔j. m. f. haustus*) paucis horis elapsis urinam ad quatuor minimum libras reddidit, & una plurimo calculos, convaluit.

Hi autem calculo vesicæ laborarunt, renibus forte in plerisque non integris.

9. *Ægrotus.*

D. Damfden, mercator Eboracensis, mediæ ætatis vir, ex patre calculis misere afflicto natus, & ipse renum & vesicæ calculo a multis retro annis vehementer laboravit; item ejus filius unicus triennis calculo correptus est, & sectione tandem a pene pueri grandiusculus calculus exemptus est, gravissimis autem symptomatibus malum in dies & molestius & periculosius fit; nam sanguinem sæpius minxit, modo dysuria, modo lumborum contra renes dolore, horrendum, cruciatus est: sæpenumero vero calculos fere asperos, & inæquales excrevit, tum albos, tum flavos hordei grani magnitudine.

Tandem vero ab equitatione primum observavit se humorem quendam albidum tenacem cum urina reddidisse; is autem humor præ lentore suo matulæ fundo adhæsit; nec facile cum urina effundi potuit; & interdum ad plures uncias diei unius spatio excretus est; neque unquam sine dolore excerni potuit, propter virgam (puta) inflammata & acrimoniam frigidæ, & marcescentis urinæ; nam vetustatem redoluit, etiam si novissime fuerit reddita.

Sane hunc hominem cum primum medicinam facerem, curavi; mihi que adeo cum ex propria experientia minus notæ essent medicamentorum vires, illud equidem unum totis viribus efficere conatus sum, scilicet, ut materiam istam lentam aut minuerem, aut liquefacerem, quo minore cum dolore per urethram exire posset.

Neque aliud magis profuit, quam *mercurius dulcis ad. gr. vi. ex pulv. jalap. ℥j. exhibitus*: quippe eo & alvus diu liquefacta est, & materia lenta & mucosa in grumos farinaceos divisa est: ac sic multo melius se habuit & ratione dysuriæ, & minus frequenter mingendi cupiditate vexatus est: tandem vero maxima ex parte desinit prodire ille mucus, ac fœtor urinæ usque permansit, etiam cum cætera sanus sibi visus fuerit.

Post mensem vero ex frigore & cruditatibus eodem mucro mire viscido tentatus est.

Tum vero hominem sic purgavi (*℥. Rhei Torrefacti ℥ss. Thebent. Venet. ad duritiem coct. & pulverisat. ℥ij. f. Pulvis: detur ex haustu sequenti. ℥. melius despumati ℥ij. aq. sperm. ranar. ℥ij. misce.*)

Urina autem quæ antea aquea fuit, jam ex rhen intense colorata est, eique ex terebintha odor suavis conciliatus est, at postridie idem urinæ pallor atque idem fœtor redierunt.

Porro, ex femicupio, in quo semel tantum ad mitigandos dolores demissus est, involuntaria mictio secuta est, idem observavi ex usu opii.

Rursus, ex mercurii dulcis aucta dosi ad gr. x. & pro secunda vice dato, idem effectus secutus est, ut sc. mucosæ urinæ materia in exiguos grumos incideretur, & matulæ fundo vix amplius adhæreret: at propter stimulatam anum & ex consensu communi cum sphinctere vesicæ, diarrhoeam plurimum dierum, imo fere integri mensis induxit: item apthæ in ore & faucibus ortæ sunt.

Cum vero levi febricula sub eo malo competeretur venam in brachio incidimus: sanguis autem missus, & refrigeratus, crassa pelle albida contextus est.

Tandem ex communi consilio aliorum mecum Medicorum & trochisci, Alkekengi & emulsi cum seminibus frigidis minoribus cum decocto symphyti majoris, &c. præscripta sunt.

Ab his autem remediis calculi multi parvi, sed *albissimi*, qualis color fuit emulsionis, excreti sunt, item postridie rediit urina mucosa & lenta & dolor vehementer auctus est, & urinæ difficultas: ideo abstinui a præscriptis medicamentis: itaque spiritus salis armoniaci cum gummi ammoniaci destillati ad guttas vj. ter quotidie sumpsit ex aquæ spermatis ranarum haustulo.

Ejus autem medicamenti post aliquot dies effectus erat, ut urinæ malus odor, fere sublatus est, & ejus sedimentum jam bona ex parte similagineum, candidius & leve factum fuerit.

Rediit autem appetitus, & ex usu salsamenti veteris, apud nostrates *Ling.* dicti, alvus subito compressa est, & urinam rursus continuit, cæteraque omnia incommoda mirifice levata sunt præter unicum in urina fœtorem, neque amplius urina viscosa.

Hic autem vir, tolerabilem valetudinem consecutus, Eboraco Londinum se contulit, ubi a chirurgis, ejus artis peritis examinatus digitis in anum immisiss, calculus ad ovi magnitudinem compertus est.

Illud sedulo autem notavi, medicamenta leniter diuretica, & renum dolorem supra modum intendisse, & sine valentissimis fuerunt, & testiculorum, ipsiusque uteræ, & glandis, ad exitum, inflammationem & rubedinem excitasse.

Ab eo tempore, quo Eboracum rediit, nihil, quantum scio, sumpsit; certe unum vel alterum annum vix, sed graviter decubuit, nec calculum ullum postea excrevit.

Tandem nescio cujus suasu, unciam unam guttarum dictarum a *Goddard* auctore, a Londino natus, ad ejus ℔ss. in qua parietariæ bis aut ter in die sumpsit; hoc autem medicamentum (ut postea didici ab ipso Rege Carolo Secundo, qui a vidua Goddard magno pretio secretum redemit) nihil aliud fuit, quam *spiritus salinus volatilis a serico crudo* vi ignis elicitus, at tanta erat ejus malitia in optimo viro, ut biduo a sumptione, sanguinis mictu, & diris cruciatibus, correptus, misereque convulsus, diem ultimum obierit.

Sub eo tempore in eadem urbe duo senes, metallorum fossores, ex calculo a plurimis annis decumbentes (*Smith* unus appellatus est, alterius nominis oblitus sum) convulsi perierunt, potione spiritus terebinthinæ, ad ℥ij. aliquoties exhibiti: unde inflammatio inum ventrem ex toto occupavit, in gangrænam protinus mutata, hoc medicamentum suasu cujusdam Agyræ chimici sumpserunt, quorum alterum, super pontem habitantem, prece viduæ, dissecuri.

10. *Ægrotus.*

Illustrissimus Baro D. Fanshaw, puer novennis, calculo vesicæ ab aliquot annis laboravit, illum *Sandbeck* vidi, villam amœnissimam D. Comitissæ de *Castleton*, dum ibi ejus matri decumbenti advocatus sum.

Hujus autem pueri urina, instar feri lactis recenter concreti, turbida & grumosa erat: item in fundo ejus resedere grumi albisimi, vere caseosi; ejusque urinæ odor ipsissimus qui casei recentis: is autem nuper, ex præscripto Medicorum, quotidie lac asinum bibere consuevit, ex ejus vero vesicæ postea calculus, feliciter excretus est Londini.

Illud autem ex hoc casu constat, sc. lactearum venarum imbecillitatem, easque officio suo non recte fungi, quod (cætera sanus puer) odorem & substantiam fracidi casei ejus urina exhibebat; aliter multo, quam in integris etiam puerulis lactantibus, quorum urinæ suus odor & consistentia est.

11. *Ægrotus.*

D. Little Prætoris cohortis eques, Eboraci tum degens mediæ ætatis vir, ex equitatione, primum urinæ difficultate correptus est: mox ea fere ex toto suppressa est cum vehemente dolore circa pubem, & in ipso penis itinere.

Cum urina vero exiit mucus quidam albidus, visci instar tenax, matulæque fundo perinaciter adhærens, item ejus odor fœtidus, qualis ex urina veteri.

Ob vehemens vero malum sæpius anima defecit, & misere convulsus est.

Hæc autem ante meum adventum, statim oleum amygdalarum dulcium leniter tepesactum, injiciendum vesicæ præscripti, cum bono eventu, deinde hoc medicamentum exhibui devorandum. (*℥. mercurii dulcis gr. iv. pulv. jalap. ℥j. Cassiæ ℥ij. f. bolus*) a quo alvus septies mota, dolores levati sunt; nocte troch. Alkekengi ℥i. dati. Verum postridie & sanguinem minxit & aquam multos majusculos calculos albos excrevit, aliosque per aliquot dies: calculis autem excretis & iste mucus exire desinit, convaluit. Hunc forte hominem in nosocomio militari Chelmsiensi superiore anno vidi, beneficii mei non immemorem & (ut mihi narravit) post viginti annos, calculos quod attinet, sanum.

12. *Ægrotus.*

D. Hedley, in vicinia Leedes, oppidi agri Eboracensis degens, quinquagenaria, admodum obesa, ex multis annis calculi cujusdam arenacei excretionem vehementer cruciata est. Ii autem calculi ipsum Saxum molare nostrum arenaceum valde referebant, nam ex arenis majusculis *CrySTALLINIS*, inter se coagmentatis in calculos majusculos constabant, interdum vero solidos, interdum solutiores eos, quotidie, haud modica quantitate cum urina reddebant.

Hæc autem symptomata præter calculorum excretionem passa est, cordis palpitatio, assiduam mingendi cupiditatem, lumborum & vesicæ dolorem, urinam aqueam, cibi inappetentiam, &c.

His autem malis sic occurrendum esse censeui,) *℥. Lingæ cervine, Trichoman. an. ℥j. macis ℥ss. f. pulvis subtilissimus, detur ex aq. bovei haustu, post horam infusionis, ter quotidie*) post 4. dies non amplius calculos reddidit; urina jam fulva, qualis sanorum cum sedimento albedo, quod fere defuit ante: ad aliquot amplius dies iisdem medicamentis, at alia atque alia compositionis ratione, usa est; præter opinionem convaluit.

Reversa autem ad suos, rursus calculorum id genus excretionem correpta est: iterumque ad me Eboracum venit: atque, iisdem medicamentis similiter sumptis, convaluit.

Huic domum redeunti usum cerevisiæ præcepi tantummodo ex aqua fluminis, & non putei, ut ante consueverat confectæ: nam non sine ratione arbitratus sum, aquas puteales horum calculorum materiam, utpote succum lapideum, in se continuisse.

13. Ægrotus.

D. Freestone de Hotnecastle, micturitione admodum dolorosa & frequenti, cum viscosa materia matulâ fundo adhærente, correptus est: nisi tamen erectus mingere hand potuit, ut multoties per noctem mingendi causa e lectulo surgere coactus sit. Diu vitam sic miseram traxit, huic sic præscripti. (2℥. Balsami martis) i. e. bals. Leucateil. & salis martis an. (ʒj. f. pilula sive bolus, quem sumat nocte & tantundem mane) quo per triduum sumpto non amplius cubitum per noctem reliquit: sed facile resupinatus in lecto mingere potuit, item huic minor dolor in urethra & extremopene.

Item (2℥. Aq. spermatis Ranarum ʒij. C. C. usti in subtilissimum pollinem contriti ʒj. gummi Tragacanth. ʒj. misce hujus bene conquassati ʒiv. ter quotidie bibat.)

Item (2℥. Balsami veneris ʒj. dividatur in sex doses) has autem per triduum sumpsit singulis diebus mane: a quo alvus die tertio leniter mota est. Omnino melius se habuit, rursusque abiit, nescio an hic æger calculosus fuit; nam in adversariis nostris de calculo nihil scriptum inveni.

14. Ægrotus.

D. Lane, Divi Laurentii in Urbe ludi-magister, ex tribus circiter annis, urinæ stillicidio vehementer cruciatus est. Item plurimos calculos excrevit. Huic autem mingendi cupiditas bis aut ter aut pluries in hora, die nocteque: alvus firma, urina foetida & visco quodam referta, item doloris acuti sensus in ano, & circa pubem.

Huic autem sic præscripti. (2℥. Succu hypocistidis glycyrrhizæ ana ʒj. mithridatii sine opio ʒj. Gummi Tragacanth. aq. spir. ranar. dissolut. ʒij. C. C. usti ʒss. missa f. pilul. iiij. ex. ʒj. misce harum pilularum unam vespere atque alteram mane quoties sumat.)

N. B. Tertia nocte ab iis sumptis ter tantum minxit; at quotidie alvus bis aut pluries soluta est. Ab eo autem tempore addies septem tantum bis aut ter in nocte minxit & placide dormivit, & mirifice levatus est; meque opium ei dedisse putavit: imo plane se convaluisse affirmavit; adeo dolor mitigatus est præ eo, quem ante meum adventum sentire consuevit, at potioni, præ siti, contra meum præceptum indulgere voluit. Unde rediit mingendi frequens cupiditas, & remediis abstinuit.

Alios autem multos calculos omitto, quibus hæc medicamenta in micturitione sive mingendi importuna cupiditate profuerunt: neque aliud malum gravius est, ex iis quæ humano generi contingunt; imo omnium, perhibente Plinio ex decisione veterum Medicorum, longe gravissimum est stillicidium urinæ.

15. Ægrotus.

D. Spacy ex multis annis sanguinem mingere consuevit: Interim plurima intervalla optimæ sanitatis habuit, eoque malo vacuus. Tandem vero mucum quandam sive pituitam vitream, viscidamque reddidit, fundo matulæ pertinaciter adhærentem: jamque urinæ odor foetidus, ejusque stillicidium molestum: at a mictione in extrema penis glande sævissimus dolor.

Huic sic medicinam feci. Trochiscos Alb. Rhasis ex aq. sperm. ranar. in penem injici feci.

Item (ʒss. Merc. dulcis ʒj. Elect. lenitiv. mithridatii an. ʒij. f. Bolus vespere detur) mane alvus soluta est mannæ potione.

At his medicamentis, calculos plurimos excrevit albidos, leves, angulosos. Symptomata ex bona parte sublata sunt.

16. Ægrotus.

D. Montege, sexagenarius & amplius, optimus vir, calculosus cum urina mire viscida; huic viscolitati urinæ ter remedia præscripti, & toties ex ea ad mensam minimum convaluit: Scil. (2℥. Aq. simplicis limacum, ex lacte destillate ʒij. C. C. usti & in tenuissimum pollinem cont. ʒj. sacch. cand. alb. ʒss. misce. Hujus probe conquassati & turbidi ʒiv. ter quotidie potavit.) item 2℥. Penis viridis testudinis furno siccati ʒij. Hujus pulveris ad ʒj. alternis diebus sumpsit ex eadem aqua: At ex recidivis frequentibus, mali vitæque pertæsus, in lithotomorum manibus, tertio a sectione die, obiit.

Verum ægrotorum & mihi & tibi fortasse lector satis superque est: ad medicamentorum vero rationes explicandas, quorum præcipua causa hæc narratiunculæ ex adversariis nostris transcriptæ sunt, propero. Simplicia autem medicamenta calculo maxime accommodata, sive specialia adjutoria, ut Cœlii Aureliani verbis utar, hæc sunt, nempe, quæ in quatuor classes commode redigi possint.

Prima autem & præcipua Classis est eorum, quæ ex insectis animalibus oriuntur.

Penis Testudinis viridis rostris, Margaritæ, Conchyliorum testæ, & crudæ, & crematæ. Millepedes sive Aselii, Scorpionum, Cantharidum, Cochinel, lumbricorum terrestrium, apum, formicarum nascentium cinis. Coccus baphice. Spongia Bedegaris sive Rosæ Sylvestris mel. aq. spermatis Ranarum, cochlearum terrestrium. Jus conchyliorum marinarum, sericum, ejusque spiritus destillatus.

Hæc autem omnia mirifice calculos expellunt; idque communi fere virtute præstant, nempe septica, qua vehementer corrodunt, stimulantque ductus viscerum excretorios, præcipueque majores renum & vesicæ.

In horum autem aliquibus ea vis tanta est, ut illa cruda sumere, nemo impune ferre possit, quin sanguinem quoque calculis effundat, contractionesque nervorum patiatur. Ideo torrenda sunt, ut igne mitescat vis illa septica, salinis particulis acrioribus ex bona parte evaporatis.

De horum autem aliquibus privatim differere lubet. De millepedis audi Scribonium Largum †. Asellos quinque ex aquæ cyathis tribus suffundere (i. infundere) & per urinam extrahere lapides certum est. Tanta erat de his animalculis experientia apud veteres.

Hic autem præterire nolo, quod olim * ediderim, nempe ex multipedarum genere esse speciem quandam apud nos non infrequenter in sepibus, teretem, longiusculam, ad digitum puta; quam si conteras, naribusque protinus admoveas, eo tanto odore sulphurelento & corrosivo percellit, ut multo mitior sit odoratus ex integra uncia spiritus urinæ destillati.

Haud dissimilis vero odor e Formicis crudis contritis prodiit, maxime ab Hippomyrmecis nostris, consule nares.

Pulvis autem Lumbricorum terrestrium tostorum falsedo insignis est.

Margaritarum vero & conchyliorum crematorum calx sale supra fidem abundat, teste Leeuwenhoekio.

Vis autem salina e serico evaporata apud nostrates notissima est, sub nomine (Goddards drops.)

Cantharidum, apum, formicarum, scorpionum vis septica & exurens, ab illorum animalculorum effectibus, si viva aliquem pupugrint, eutivæ admoveantur, neminem latet.

Idem cogita de Cocco baphice spongiæque dicta Rosæ Sylvestris, quæ ex apiculis conficiuntur, foeturæ gratia.

Neque ob aliam rationem Gallæ, (ut id hic obiter dicam) tanti usus sunt, ad lanas tingendas, aliave in artem insectoria, nisi quod insectorum mera opificia sint, eorumque excrementis & veneno septico penitus imbuantur; at pergam ad ea quæ restant.

Cochineil vero medius status est alicujus scarabæi indici, i. e. cantharidibus cogeneris; at multo mitioris virtutis.

In hoc autem censu sunt Cicadæ ad calculosos commodæ; vide Aetium, nempe Insectum quoddam ad scarabæos accedens.

Cochlea autem maxime earum cervices, ubi organa generationi dicata, ut vesicam & penem mirifice afficiant, diximus in prima exercitatione ex Petronio.

Idem puta de pene testudinis viridis, ranarumque aqua stillatiaria, magna equidem volumina non affecto: res tantum attingo, earumque virtutes quasdam communes indicare contentus, ut in singulis admiratione dignam quandam vim septicam & urentem, vehementer adeo stimulantem ductuum excretorios; privatim vero renum & vesicæ, mecum agnoscas.

His autem annumerari debent insectivora quædam animalia, propter victus rationem, calculis expellendis idonea. Tales sunt aves quædam ut hirundines, ille regulus sive passerulus quidam Troglodites, nostratibus a Werren dictus, de quo consule Aetium, * hanc autem aviculam ad calculosos summe efficacem, magna accurate describit, ejusque condiendi exhibendique modum. Naturalem autem, inquit, vim omnino admiratione dignam habet, itaque sale conditus & crudus in cibo acceptus morbum perfecte sanat: & novi adeo quosdam ab ejus usu nunquam amplius ab affectione vexatos: & infra, de causa tantæ virtutis recte judicare videtur. Albitror, inquit, & sanguinis istius aviculæ naturam quiddam in se complexi, quod minime vulgariter proficit, cui amplius stercoreis efficacia accedit; ac revera & in sanguine & in stercore insectorum, quibus vescitur, vis septica insignis est; secunda autem classis sit ex animalibus vel frigidis; nempe ossa cremata in capite tuberonis, aseli piscis, similibusque: hæc quidem parem virtutem habent cum conchyliis crematis, & ob eandem rationem, quod in calcem salinam similiter comburantur; vel calidis; scilicet tunice interiores ventriculi gallinæ, & stercus album ejusdem, item cinis corticum ovorum adulatorum: atque illa eandem facultatis suæ expulsiæ rationem habere videntur cum superioribus. Nam tunica illa tanquam cornea est: albumque stercus & urinosum, & ipsum cortexque ovorum ad testaceum genus quam proxime accedunt.

Tertia vero classis ex herbis diureticis fere est, ut terebinthina, balsamum Judaicum, Peruvianum, Copivi &c.

Omnia autem terebinthinata vehementer urinam movent, quod cuti admota corrodant: neque vim suam emplasticam, nisi unctione quadam exerunt. Etenim quatenus vulneris carnem putridam marcescentemque exedendo abstergant; viva interim, quæ subsit, in cicatricem commode nutritur.

Ex illa autem corrosione calor ac inflammatio oritur: unde ductus urinæ majores ad vehementem contractionem, expulsionemque stimulantur.

Porro in hac classe numerare licet tartarum ex vino, ipsumque vinum album acidulum, vel per se, vel sulphure, more Gallorum, vel ex gypso, more Hispanorum conditum: item succum limonium: balauftia ex granatis acidis ac sylvestribus: atque hæc omnia herbarum sale essentiali dicto, & utrinque mucronato, tenuissimis acutissimisque particulis constante abundant, quo majores ductus renum & vesicæ continuo laceffantur.

In hac quoque classe & Legumina habentur, præ reliquis vero cicera rubra decantantur ob acrium flatuum copiam: nam hos mire excitant; forte materiam iis non paucam adjiciant, ita velut mantissa quadam addita ferociam quandam flatibus, in corpore præexistentibus, præstant, eosque per renes tranant. Quam vehementer autem penem, eosque ductus afficiant, scire licet ex testimonio veterum: quos adi. Igitur verisimile est conferunt & flatu excitant, quod illas partes distendere & expulsionem obacredinem promovere apta sint.

Postremo ad hanc classem pertinent nuces avellanæ, amygdalæ præcipue amaræ: hæc autem medicamenta lenire potius videntur quam expellere; adeoque inter anodyna censenda sunt. At amaritudo amygdalarum aliud suadet.

Reliqua autem olea dulcia iter expediunt, lubricando. Sane hujusmodi olea vere pingua sunt, nec concrefcere apta; perinde ut alibi de oleo lini, nucum juglandis, & papaveris a me dictum est.

At pereunt, inquit, istiusmodi virtutes a concoctione: scilicet succus, puta citri, ex prima digestionem acorem suum amittit: minime vero: si recte se habeat aliquis & dolore vacuus sit, ita esse concedo: ubi autem adest nephritis, ac horrenda illa a vesicæ renumve calculo symptomata, digestio ex bona parte cessat, corporis habi-

† Comp. 151.

* Aët. Phil. Lond. N.

* Tetr. 3. Sermion. 3 v c. 11.

habitum medicamenta tantum non integra pertranseunt, inque venas viscerum excretorias promota, parum mutata egrediuntur, ita in maximis calculi doloribus is succus v. c. subcrudior vim suam extensivam in ipsis renum glandulis vehementer exerit profecto in ægris renes, ut & omnia alia itinera tam citra quam extra sanguinis curriculum magis aperta sunt, ac laxata: unde virium medicamentorum mira retentio & celerrima trajectio.

Ad Quartam autem ac ultimam classem pertinent a metallis medicamenta: scilicet corallium, lapis Judaicus, nitrum veterum, spiritus salis vitrioli, sulphuris, sal prunellæ, aquæ medicatæ, vel acidulæ, ferratæ, calcaris, vel mixtæ scilicet muriaticæ, calidæ, frigidaque, mercurius dulcis. Atque ex his fere medicamentis vani homines lapidum renum & vesicæ non expulsionem tantum, sed & fractionem comminutionemque vehementer jactitant.

A salibus certe metallicis, fateor ob stimulum & summam acrimoniam vehemens contractio majorum ductuum & lapidum expulsio expectanda est: idque veteribus probe cognitum est ex multiplici experientia; quos consule, unam, aut alteram tantum instantiam exhibebo.

Nitri vitriolati pondo, ex vino, in arenam solvit lapidem, Scribonio Largo auctore. †

„ Aquæ calidæ quæ sunt tuscia Ferratæ, mirifice remediunt vesicæ vitiis; appellantur item *vesicariæ* quondam Milonis Gracchi Prætorii hominis optimi ad quinquagesimum lapidem reddentis eodem * perhibente.“

„ Iis qui vesicæ lapidibus afficiuntur, erunt aquæ eligendæ *salsæ*, vel quæ Nitri habeant qualitatem, ut apud Tenariam Insulam, quæ potandæ & lavacro adhibendæ sunt. Ita Cælius Aurelianus.

„ At in labefactis calculo renibus & vesicæ, maxima opera danda est, ne quid metallicorum, aquarumve medicatarum nimis exhibeatur. Etenim fortiter licet calculum expellant, tamen propter imbecillitatem istarum partium metus est, ne & ipsa quoque remedia ibidem concreverint in lapidem, cum ipsissimam lapidis novi materiam in se contineant: scilicet & salem & succum lapideum, id quod vehementer moneo, sæpiusque dicendum esse putavi.

Hic autem nostræ sententiæ favet illud Hippocratis præceptum.

„ Qui sanus est ac valet, is * nullo habito discrimine, semper eam aquam bibat, quæ adest. Qui vero morbi causa (puta calculi) eam, quæ maxime conveniat, bibere volet, is sanitatem consequetur.

„ Item alibi; calculis maxime tentantur & renum morbis qui aquas *salsas*, (i. e. medicatas) bibunt.

„ Ejus autem rei rationem reddit; scilicet aquæ, quarum fontes in saxosis locis sunt, *duræ* sint, necesse est: aut si ubi aquæ calidæ existant, aut *ferrum* nascitur aut *sulphur*. aut *nitrum*.

„ Etenim aquæ *salsæ*, *nitrosæ*, *ferratæ*, *saxosæ* *indomite* nascuntur & coqui nequeunt; sunt tamen naturæ quædam & morbi quibus tales aquæ potu sunt commodæ, i. e. ventribus mollibus & humidis & pituosis; iis durissimæ aquæ & coctu difficiles & aliquantulum *salsæ* accommodatæ sunt.

„ Profecto illud sæpius vidi, ex iis qui animi tantum causa aquas nostras medicatas biberunt, quosdam inter ipsa remedia nephritide primum correptos fuisse, & calculos excrevisse; quos ex aquis istis putrescentibus (ita omnes aquæ medicatæ merito, ut ex supra narratis satis ostensum est, existimandæ sunt) ortos fuisse nullus dubito, cum in renum pelvi aut uretheribus nulla arenula majuscula, vel momento consistere possit sine vehementi dolore, non magis quam in aspera arteria vel minima mica panis, puta sine gravi tussi.

„ At, inquires, nulla fere aqua succo petrescente prorsus vacua est, atque adeo hoc nomine nobis noxia foret. Quid igitur indulsit na-

tura humano generi præ reliquis animalibus? libenter accedo ple- rasque aquas, certe quatenus succi petrescentis participes sint, non ulque adeo raras esse.

Atque idem olim nobis exhibuit Hippocrates. * Qui magnis fluminibus bibunt, in qua alia flumina decurrunt, & de stagno in qua alia flumina decurrunt, & de stagno in quod multarum & cujusvis generis aquarum rivuli decurrunt: quippe adventitiis (per fistulas plumbeas puta) aquis aluntur; quæ ex longo intervallo deducuntur, & calculo maxime tentantur, & renum morbis ac urinæ stillicidio &c. scilicet quia ex iis mixtis aquis aliæ *salsæ* sunt, i. e. medicatæ.

Idem quoque nobis abunde manifestatur, ex aquis plerisque nostris coctis, tam fluvialibus, quam marinis: videlicet in fundo leberis lapidem quendam calcarium, lapidis alicujus fissilis more, adhærere.

Providentia tamen divina admiranda est, vel ob hoc commune beneficium omnibus animalibus concessum: atque homo solus culpandus est, si eo non recte usus fuerit ex intemperantia; si quidem noluit natura uspiam deesse materiam animalium testis ossibusque generandis, nutriendis, firmandis.

Igitur, suadeo, memor sis admonitionis illius Hippocraticæ, supra positi; nempe de aquis non sollicitus sit sanus; at qui calculo puta laboret, aquis petrescentibus abstineat; certe de iis admodum parce, cauteque bibat, ne justas intemperantiæ pœnas luat. Atque hæc hæcenus; antequam vero manum de hac tabula auferam, illud quoque Hippocraticum de aquarum vitiis verbo considerandum non alienum erit, nimirum, Pravæ sunt *Aquæ* omnes, quæ ex *nive* & *glaciæ* fiunt: ubi enim semel concreverint, non amplius ad pristinam naturam redeunt. Hinc, inquit, urinæ stillicidium & herniæ; an quod ex frigore intenso eadem particularum petrescentium concretio metuenda sit, ac ex coctione? sane constat experientia, & ex observatione, olim edita, D. Joannis Raii inter principes hujus sæculi philosophos, mihiq; veteri amicitia conjunctissimi ab hyeme durissima, & a longa aquarum congelatione æstatem maxime morbosam secutam esse.

Verum cum nivatæ aquæ ad se nunquam redeant: tamen cur eadem aquæ fluminis alicujus, Thamesis nostri puta, toties putrescant & suaves denuo ac potabiles fiant, inquirere lubet; certe ad Indiam Orientalem navigantes experiuntur, istam aquam fere intra Tropicos & sub lineam æquinoctiali supra modum fetere turbidamque fieri: mox limpidam reddi & bene olere; item eandem aquam iterum fetere & turbari in reditu ad nos; denuo purgari a facibus & a malo odore, imo interdum sub hac mutatione illam ardescere ad candelam admotam, instar spiritus vini, dolio aperto exhalanteque.

Hujus equidem rei rationem sic intelligo, scilicet omnem aquam fluviatilem plus minus insectis refertam esse; quod microscopio adhibito extra dubium ponitur; hæc autem animalcula, quod nostratia sint, sub ardoribus pereunt, unde aquæ tantus fetor: ubi vero ista putredo e bestiis corruptis in fundum dolii subsederit, coiveritque, aqua fit limpidæ odore malo vacua. Rursus in India eadem aqua novis insectis Indicis repletur, quæ tamen in reditu similiter moriuntur, unde novus fetor ac aquæ turbatio; iidem quoque rationibus aqua ad claritatem suam suavitatemque redit.

Ad ardorem vero & inflammationem aquæ istiusmodi quod attinet, ab insectorum quoque putrefactione, id commode oriri possit, perinde ut flatus intestinorum per anum emissos, & ab alimentorum coctione putredinosa ortos, flamma admotæ ardere, notissimum est: atque ita exposui, quam brevissime potui, medicamentorum ad calculos maxime accommodatorum cognatas virtutes, earumque rationes & usus ex veterum fere diligentia fideque.

† L. de Aere, locis, & aquis.

* Ibidem.

† Comp. 153.

* Comp. 146.

* Taral. P. I. 5.



THOMÆ SYDENHAM, M. D. INTEGRIPROCESSUS IN MORBIS FERE OMNIBUS CURANDIS: QUIBUS ACCESSIT GRAPHICA SYMPTOMATUM DELINEATIO,

Una cum quamplurimis observatu dignis,

EDITIO NOVISSIMA PLURIBUS ARTICULIS AUCTA.

NEC NON

DEPHTHISI

Tractatulus nunquam antehac editus.

AMICE LECTOR.



Specimen habes Praxeos eximia, in dilectissimi filii M. D. usum, caute & diligenter excogitatum, sua ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate illa, qua omnes excepit, concessum a Cl. Sydenham, Viro sane, cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mira sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo: sed & probis moribus, & in humanum genus, studio, & amore insignibus adeo, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium. Cujus præcepta licet animo meo, & imo pectore infixæ sint, ne tamen forte fortuna in mei ipsius, & egrorum detrimentum excidant memoria parum fida, typis haud ita pridem mandabam exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepsit publicam inter Miscellanea Curiosa superioris anni Norimberg. editum, sed inepta mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum, ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis, & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refertum, nec hypothese placida solidis ut videtur rationum momentis undequaque constipata superbiens; humile autem & modestum accurate morbos depingit, & accuratius adhuc medetur; in id solum sollicitum innotescat, quod natura faciat aut ferat. Et si verum loqui liceat, modo partium situs noveris, pateant tibi per symptomata ægitudines, (quod assidua ediscas observatione) scias deinde veram & genuinam medendi methodum per dietam, & pharmaciam adhibere, felicissimus eris practicus, & tibi & infirmis optime consulens. Parum interim tua refert, utrum Alkali peccet an acidum, num in spiritibus animalibus, an in ipso sanguine, aut in recondito aliquo viscere delitescat morbi minera, unde de periodico intermittentium reditu docte satis & prolixè possis differere; dum interea ipsa febris sine ullis ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu celeri, nausea, cæterisque symptomatibus, etiam astantibus palam est, & aperte dignoscitur. Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie ita & scrupulose immediatas, & proximas morborum causas, dum medicinam pertractandam suscipiunt, indagare satagunt, & e tenebris istis, quibus natura obduxit, irritò licet conatu, eruere, gravi & subactò judicio viri, & in praxi versatissimi; satis interim gnari se latere vel quævis obvia; unde enim dimanat graminis viridis, aut albus nivis color? Quid est quod humana anima ratiocinari nequeat dum adhuc infantes aut pueri sumus? Unde forma tua specifica? satius esse Medicum quam Philosophum agere (quis enim unquam Carthesium sibi Medicum voluerit) minutissima phenomena plane & rite enumerare, & remedia quibus unusquisque morbus facilius cedat candido & sincero animo proponere: ita tandem limites suos prætergressa, quibus angustiis nimis jam includitur nobilissima, omnibus, quaquaversum patet orbis, feliciter satis, & prospere salutem, filiis autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulo ante obitum tractatum de phtisi peritissimus Medicus in perquirendo nature methodum, qua morbos amoliri studet, ut adjutrices porrigeret manus, & miseris hominum subveniret; diu noctuque pensitabundo, & anxio animo, exercitissimus; hinc fidissimarum observationum serie & irrefragabili edoctus experientia, medicine praxim ornavit, & ad saniores reduxit regulas: sed vae tabidis, dum hujusmodi nunquam intermissis studiis detenti, & defatigati spiritus, solius non vacabant excubiis, truculentissimus hostis, Podagra, quæ per multos annos obsederat, & debilitaverat artus, impetu facto in interiora viscera irrumpit, per vomitum, & successum enormiores intentans mortem, unico autem morbo nescit cedere Medicorum Princeps, sed cum malorum cumulo accessit & Renum Calculus, qui corrasis vasorum osculis, sanguinem liberalius, quam senectus tulit, urinae permixtum effudit, se jam non amplius opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam expiravit animam. Ne tamen auxilio prorsus destituantur tabidi, fragmenta quedam quæ Authorem ubivis sapiunt in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neque enim fuis est, quod egrotanti proximo opituletur, celare) in publicum prodeunt, ut exinde pateat quam accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Opt. Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phtisiologia.

Quid in febribus, variolis, morbillis, acutis cæteris, ut & chronicis sanandis valuit optime meritis Author noster, sequentes indicant pagine. Regimen, & Dieta instituuntur aptissima, præscribuntur remedia pauca, sed necessaria, nec in Pharmopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita, sitibundis agris (eodem modo quo & ipse suam suam restringere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim, & pro libitu hauriendam, unde mire reficiuntur, & refrige-

rantur, concedi; nec immanitate plus quam barbara precibus eorum surdus, Apozemata & Julapia, præ ingrato sapore fastidita, substituit; maximam adhibet cautelam ne exæstians nimis, vel igne luculentiori, vel stragulorum onere, plus adhuc incalesceret, vel a propinatis forsam remediis eum in finem ut per poros eliminetur materia morbifica cruda adhuc & inconcocta, quæ tamen hac data ansa concitato motu cerebrum petit, unde phrenesis, aut coma, aut extravasato sanguine deturpant cutim maculæ purpureæ, aut eruptiones quas vocant miliæ collum & pectus ubivis obsident. Numquid adamussum magis depingi poterat quam variolarum historia? eruptionis diem in utraque specie designat, pustularum ingenium ad unguem describit, quo tempore incipiat, & quandiu continuetur salivatio, quo iterum faciei manuumque tumor se prodat, quid tandem quolibet die expectandum diserte explicat. Paregoricorum usum, quo emolumento judicent practici, primus persuasit, malum ingerendi cardiaca, ante eruptionem, morem, unde sæpe accersitum fuerit confluentium genus, merito primus improbat. Melius autem hæc ex ipso fonte. Valeas itaque amice Lector, & sicubi scateant menda ignoscas.

Amico suo integerrimo M. D. Expertissimo Domino S.M.

Solum sequaces prætulimus diu
Cum Medentes; compar habebitur,
Qui clariorem te, minori
Reddidit hoc, Medicina, Libro.
Non hic tumoris Mole superbiens
Blattis futurus Præda opulentior:
Sensu sed arcta Dittori
Conciliant sibi Verba Pondus.
Frustra molesto vasta Volunine
Lustres Galeni Scripta: Minutule
Acumen huic majus Tabellæ;
Se stupet hic Medicina totam.
Hic non remoto sordidus Angulo
Sensim fatiscet, sedula strenue
Manus quotannis, spe perenni
Deteret, auctior ut resurgat.
Applaudet Votis Turba Medentium:
Non febris illum, Morbus atrocior
Haud afflet ullus, Commodis qui
Immoritur satagendo Vestris.

Sic vover
Christophorus Crelle, M. D.

MEDICAMENTORUM

Quedam formulæ in praxi magis familiares.

Potio communis purgativa.

4. **T**amarind. ʒss. fol. Sennæ ʒii. Rhei ʒi. coq. in f. q. aq. ad ʒiiij. in Colatura dissolve Mannæ & Syr. Rosar. solut. an. ʒj. m. f. Potio.

Emeticum commune.

4. Aq. Cardui Benedicti. ʒij. Infus. Croci Metal. ʒj. Syr. Caryophyll. ʒss. m. f. vomitorium. Sumat hora 4. pomeridiana, superbendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris possetic.

Julapium perlatum.

4. Aq. Cerasor. nigr. lact. Alexeter. an. ʒiiij. aq. Cinnamom. ʒj. Margarit. preparat. ʒss. sacchar. Crystall. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. ʒss. f. Julap. de quo cap. cochlear. iv. vel v. in languoribus.

Julapium cardiacum.

4. Aq. Lact. Alexeter. Cerasor. nigr. an. ʒiiij. aq. Epid. Syr. Caryophyll. & de succo Citri, an. unc. ʒ. m. f. Julap. de quo capiat sæpius.

Decoctum diæteticum.

4. Rad. Sarsaparill. unc. vj. ligni Sassafr. & Chinæ ana unc. ij. Glycyrrh. unc. j. coq. in aq. font. Congiis ij. per horæ diuiniidum, deinde stent clausæ super cineres calidos per horas xij. postea ebulliant ad tertiam partis consumptionem; cum primum ab igne amoveatur, infunde

de sem. Anisi unc. ℥. post duas horas coletur, & postea depuretur per residuum, & liquor reponatur in lagenis vitreis prope clausis ad usum. Sit pro potu ordinario pro xxx. dies.

Apozema aperiens & Antiscorbuticum.

℥. Rad. gramin. Cichor. Fœnicul. & Asparag. an. unc. j. uvarum Corinthiac. & passul. enucleat. an. unc. ij. fol. hepat. ling. cerv. & cap. Ven. an. M. j. Fol. Beccabung. sub finem addit. M. ij. coq. f. q. aq. fontan. ad ℥. ij. sub finem adde vini Rhenani ℥℥. Colatura adhuc calente, infunde ad duas horas, vase clauso, Coch. hortens. M. j. colatur. adde syr. e quinque radic. & e succo Aurantiana unc. ij. aq. Cinnamom. hordeat. unc. j. M. f. Apozema, Sumat. ℥℥. mane & 5. pomeridiana per xiv. dies.

Eclegma incrassans in rufi.

℥. Ol. Amygd. dul. unc. j. Syr. Papav. Rhæad. Portulac. Iujub. & Loboch. sani, ana ℥℥. Sacchar. crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium & f. Linctus perfecte mistus; recondatur in olla figulina ad usum, cap. sæpius lambend. e baculo liquiritiæ.

Eclegma fortius incrassans.

℥. Conserv. Ros. rub. Syr. violar. de Mecon. an. unc. i. sem. papav. alb. ℥iii. contundantur simul & per setaceum trahantur, deinde adde ol. nuc. Moscat. express. gr. vi. f. Eclegma.

In defluxione tenui.

℥. Conserv. ros. rub. unc. ii. Syr. de Mecon. & Iujub. an. unc. i. Oli. ban. Mastich. & Succin. an. ℥i. ol. nuc. Moschat. per expressionem gr. vi. M. f. Loboch. de quo lambat sæpe; bis in die cap. eclegm. descript. coch. j. instilland. Balsam. sulphur. anifat. a gutt. viii. ad gutt. xii.

Cerevisia purgativa.

℥. Polypod. Querc. ℥i. Rad. Rhabarb. Monac. fol. sennæ & passul. enucleat. ana ℥℥. Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an. unc. iii. fol. Coch. hortens. salu. an. M. iv. Aurantior. incis. N. iv. infunde in Congiis v. vel vi. Cerevisiæ non lupulatae, fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies xiv. vel xxi. præcipue vero sumat haustum singulis auroris.

Emplastrum hystericum.

℥. Galbani in tinctura Castor. solut. & colat. ℥iii. Tacamahach. ℥ii. f. Emplast. pro umbilico.

Catharticum pro infantibus tenellis.

℥. Syrup. Cichor. cum Rabarbar. Coch. i. parvulum.

Decoctum amarum purgativum.

℥. Decoct. amar. duplicata senna ℥iv. Syr. de Spina cervina unc. i. Elest. de Succ. Rosar. ℥ii. M. f. Potio.

Laudanum liquidum Authoris.

℥. Vini Hispanici ℥i. Opii ℥ii. Croc. ℥i. pulv. Cinnamom. & Caryophyllorum, an. ℥i. infundantur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat. Colatura servetur pro usu.

PROCESSUS INTEGRIS IN MORBIS

Fere omnibus curandis.

De affectione, in fœminis Hysterica, in maribus Hypochondriaca, dicta.

Cum a casu aliquo graviore molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subinde limpidissima copiose excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinus abjicitur, tristissima quævis sibi ominantur ægrotes: quamcunque corporis partem morbus infederit (plurimas autem insidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent; in capite apoplexia, hemiplegia soluta, statim a partu adoritur; si mi epilepsiæ per similes (vulgo uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versus intumescent) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis contegere; ægra interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, misere excruciat; cordis palitationem, rissum, passiones iliacam, & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulatur paroxysmus; vomitiones enormes, diarrhœam subinde excitat; externe in carne musculosa nunc colorem, nunc tumorem inducit in tibiis hydropis instar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor dorsi creberrime sævit; & sæpe sæpius adeo refrigerantur externæ partes, ut cadaver plane referant; in risum & lacrymas effusissimas sine ulla πρῶσις ridicule erumpunt; ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut mercurio delibutas facile crederes. Dolores hystericæ, quamcunque partem obsident, ubi discesserint, teneritudinem, quæ tangi recusant, relinquunt, ac si verberata fuissent carnes.

Mittatur sanguis ad unc. viii.

Emplast. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti mane aggreddiatur usum sequentium pilularum.

℥. Pilul. Coch. maj. ℥ij. Castor. pulv. gr. ij. Balsam. Peruv. gutt. iij. f. Pil. xij. cap. iv. singulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, hora 4. vel 5. matutina, superdormiendo.

℥. Aq. Rutæ ℥iv. Bryon. comp. ℥ij. Castor. nodulo ligat. & in vitro suspens. ℥℥. Sacchar. Crystall. q. s. f. Julap. de quo capiat coch. iv. vel v. in omni languore. Post has pilulas sumptas utatur sequenti.

℥. Limatur. Chalyb. gr. viii. cum f. q. Extract. Absinth. f. Pil. N. iij. Sumat summo mane, & repetantur hora 5. pomeridiana per xxx. dies, superbibendo haustum vini absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

℥. Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. ℥i. Angelic. condit. Nuc. Moscat. condit. & Theriac. Andromach. an. ℥℥. pulv. Ari comp. ℥iij. Zinzib. condit. ℥ij. cum f. q. Syrup. de succ. citr. vel ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Elestuarium.

℥. Elest. præscript. ℥ij. limitatur. Chalyb. gr. viii. cum f. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus sumendus mane & sero, superbibendo haustum vini absinthitis, vel coch. vi. seq. infusionis.

℥. Rad. Angel. Enul. campan. & Imperator. an. ℥j. fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel

In Deliculis Chalybs exhiberi poterit in forma pulv. sequentis.

℥. Limatur. Chalyb. probe trit. unc. j. pulv. Ari comp. ℥vi. sem. Coriand. preparat. Anisi, Fœnicul. dulc. an. ℥℥. Cinnamom. acutiss. Corall. rubr. preparat. an. ℥iij. Nuc. Mosch. ℥ij. f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. e cochleari ℥℥. bis in die per 4. dies tum ℥j. bis in dies superbibendo.

℥. Aq. Lact. Alexiter. unc. xij. Gentian. comp. iv. Absint. magis. comp. unc. ij. sacchar. albiss. q. s. f. Julap. Vel

℥. Vini Rhenan. Absinth. ℥℥. aq. Gentian. comp. ℥ij. Syr. Caryophyll. ℥j. f. Julap.

℥. Myrrh. elect. Galb. & Assæ fatidæ, an. ℥j. Castor. ℥℥. cum f. q. Balsam. Peruv. f. Pil. e singulis drachmis xij. Sumat iij. singulis noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos. coch. iii. vel iv. per rotum decursum hujus processus.

Si pilulæ præscriptæ ventrem moverint, utatur sequentibus.

℥. Castor. ℥j. sal. succin. volatil. ℥℥. cum f. q. extract. Rutæ f. pilule N. xxiv. cap. iij. singulis noctibus, superbibendo Julapii hysteric. coch. iii. vel iv.

Sp. CC. ad gutt. xvi. vel xvii. in aqua aliqua appropriata sæpius exhibitus, valde confert.

Si vero his cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas.

℥. Trochisc. de Myrrh. pulv. ℥j. Balsam. sulphur. Terebinth. gut. iv. cum f. gum. Ammoniac. solut. f. Pil. N. iv. cap. mane & sero superbib. Julap. hysteric. coch. iv. vel v. instillando, Sp. C. C. gutt. xij.

Elestuarium Antiscorbut. cum aqua ibidem descripta prodest in his affectionibus, ut & Elestuar. corroborans cum additione Conserv. Coch. hortens. ℥j. pulv. Ari compos. ℥vi. superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundem est ad aquas ferreas; & si neque his, tum ad Sulphureas, quæ sunt Bathonienses.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda, si aliquod symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. Zinziber conditum, vel Semina Caroi Saccharata, ad calefaciendum ventriculum subinde sumat. Pilule etiam hystericæ iij. devorari possunt per primas x. noctes, superbibendo Julap. hysteric. coch. iv. vel v.

Quoad usum aquarum Bathoniensium, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si Chalybs iusto plus corpus calefaciat, tum per ejus usum, quarta quaque hora sumat aq. mineralium purgantium ℥iv. Quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent cathartica ex officinis de prompta.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, laudanum aq. aliqua hystericæ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cum a morbi diuturnitate fractæ, & attritæ fuerint vires, venæ sectio, & cathartica sunt præmittenda, sed a chalybe statim incipiendum.

Ubi symptomata sunt mitiora, satis est sanguinem mittere, & alvum solvere ad dies iii. vel iv. dein pilulas hystericas ad dies x. mane & sero exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & Diarrhœa enormioribus, exhibendum laudanum, & postea corroborandi spiritus, at modo per vires liceat, ante usum laudani, educatur e venis sanguis, & catharticum propinetur: in viraginibus præfertim, & sanguineo temperamento præditis, in debilibus autem, & haud ita pridem paroxysmum passis, sufficit ventriculum congio uno lactis cerevisiati hausto, & mox per vomitum rejecto detergere, dein largam dosin Theriac. Androm. vel Elest. Orvietan. imperare, & coch. aliquot, liquoris alicujus spirituosi, cum paucula laudani liquid. guttulis, superbibenda dare. Quod si ægra jam pridem vomuerit, & ulterius emeticis sollicitare periculo non vacabit, laudanum sine morâ propinandum est, ea dosi, quæ symptoma vincat, & post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potissimum solida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in coch. j. aq. cinnamom. fortiori, ægra interim conquiescente, & caput immotum tenente.

Perdormito symptomate, mane & sero, ad dies pauculos continetur usus laudani.

Hæc duo diligenter notanda, quod cum semel post evacuationem laudanum uti cœperimus, ea dosi, atque illa toties repetita, sumendum est, donec symptoma omnino fuerit debellatum, interjecto tantum spatioso inter singulas doses, ut quid prior præsterit ante noscamus, quam alteram ingeramus: deinceps cum laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum vel per mitissimum enema.

Theriaca Andromachi crebro, diuque usurpata, magnum est in hoc, & aliis morbis quamplurimis a caloris, & concoctionis defectu ortis remedium.

Vina Hispanica gentiana, angelica, absinth. centaurio, corticum aurantior. flavedine, aliisque corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot cochlearia ter in die potenter admodum conferunt, modo ægra tenui non fuerit biliofoque corporis habitu.

Cortex Peruv. ad ℥j. mane, & sero, per septimanas aliquot deglutitus, præsertim in spasmodicis hystericis miras habet vires.

In tenui biliofoque corporis habitu potest usurpari diazta lactea,

lactea, præcipue in colica hysterica, si modo ea incommoda possint superari, quæ primis fere diebus apportat, quod nempe tum in ventriculo coagulatur, tum etiam viribus corporis, in statu conferendis, sustentandisque minus sufficiat.

Nihil tamen æque sanguinem spiritusque fovet, & confirmat, ac diu multumque singulis fere diebus equo vehi, nec itinera in curru facta suo carent successu.

De Febre Depuratoria annorum 1661. 62. 63. 64.

Si æger juvenis sit, extrahatur sanguis e brachio, & eodem die post aliquot horas, vel sequenti die, duabus horis post leve prandium, Emeticum ex infus. Croc. Metal. paratis Zythogal. ℥vi. vel viij. ut quoties vomuerit, aut alvum exoneraverit, e vestigio sumatur haustus; exhibeatur & post finitam operationem emetici, hoc vel simile paregoricum.

℥℥. Aq. Cerasor. nigr. ℥i℥. aq. Epidem. ℥℥. Laud. liquid. gutt. xvi. Caryophyl. ℥ii. M. F. Haustus.

Vomitoria ex infus. Croci Metal. parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minima quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum, singulis auroris, injiciatur enema sequens.

℥℥. Decoct. commun. pro Clystere ℥j. (vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchari Culinar. & Syrup. violac. an. ℥ij. f. Enema.

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem cardiaca moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt.

℥℥. Pulv. e Chel. Cancror. comp. gr. xiv. Elect. de Ovo ℥℥. cum s. q. Syr. Caryophyl. f. Bolus sumendus octava quaque hora, superbibendo sequentis julapii cochl. v. vel vi.

℥℥. Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nigr. an. ℥iii. Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an. ℥j. M. F. Julap. vel alia his similia.

Hac methodo solícite observata, usitato circa xv. diem (tum ex laudabili in urina separatione, tum ex manifesta symptomatum omnium remissione) tempestivum esse potionem purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum, maxime in senibus curata febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valde debilem esse, & quanque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immisso, bibat æger.

Si superveniat iliaca passio, præscribatur sal. absinth. ℥j. ex cochl. suc. limonum, mane & sero, intermediis temporibus cap. aq. menth. stillatit. sine saccharo, cochl. aliquot, bis quaque hora; dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat, postquam dolor, cum vomitu per biduum triduumve cessaverit exhibeatur Pil. Coch. maj. ℥j. in Aq. Menth. soluta, nec removendus catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis lapideis ventrem a frigore defendat.

De Febre Pestilentiali 1665. 66.

Post venæ sectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruitur, & lacinia lanea sincipiti alligetur; tum si vomitus non adsit, hoc vel simile hydroticum exhibe.

℥℥. Theriac. Andromach. ℥℥. Elect. de ov. ℥℥. Pulv. e chel. cancr. comp. gr. xii. Coccinel. gr. viii. Croc. gr. iv. cum s. q. succ. Kermes, f. Bolus; quem sumat sexta quaque hora, superbibendo cochl. vi. seq. Julapii.

℥℥. Aq. Card. Benedict. & Scord. compos. an. ℥iv. Aq. Theriacal. stillat. ℥ii. Syr. Caryophyl. ℥j. M. F. Julapium.

Si adsit vomitio, hydroticum differatur, donec solo tegumento pondere sudor promanare incipiat, lintheaminis parte vultui superinducta.

Incepta diaphoresis haustulis zythogalæ salvia alteratæ, vel cerevisiæ, cui macis aliquantulum incoxeris subinde repetitis ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet iusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sufficere; per horas adhuc a finito sudore xxiv. ægro se in lecto continente frigus caute devitetur. Indusium sponte sua in corpore arescere permittatur, potulenta omnia calidiuscule hauriantur, & zythogalæ salvia alteratæ usus etiamnum continuetur, in seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667. 1668. Febrim variolosam, & variolas prodixerunt.

Anni 1669. 70. 71. 72. Febrim dysentericam.

Anni 1673. 74. 75. Febrim comatosam.

Curationem februm horum annorum non attingo, quoniam methodo in febre anni 1685. &c. descripta curari eas potuisse autumo.

De Febris Intermittentibus.

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus; quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens ἀπορῆξις: licet in primis morbi diebus, autumnio maxime, aliquoties remissio potius quam internissio persentiscatur, in calore æque ac in rigore vomitione ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem, tonsillarum dolor, raucedo, oculi cavi, facies hippocratica, mortem enunciant.

℥℥. Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥j. cum s. q. Syr. Caryoph. de Rosis siccis, f. Electuarium dividendum in xii. doses; quarum unam capiat quaque hora, superbibendo vini cujuslibet haustum, incipiendo immediate post paroxysmum.

Si autem præscripti boli ventrem moverint, in haustu vini dentur gutt. Laud. Liquid. singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipue in quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma pilularum magis arrideat,

℥℥. Cort. Peruv. pulv. ℥j. cum s. q. Syrup. Caryophyl. f. Pilule mediocris magnitudinis, quarum capiat vi. quarta quaque hora.

℥℥. Cort. Peruv. pulv. ℥ii. Vin. Rhenan. ℥ii. stent simul in Infusione frigida, & coletur per manicam Hippocratis. Usus tempore cap. ℥iii. tercia vel quarta quaque hora.

Sin ob vomitionem, fere continuam, corticem deglutire nequeat æger, tum sexies, vel octies, spatium duarum horarum, Succ. Limonum recens expressi cochl. j. cum Salis absinth. ℥j. assumat, dein Laudan. Liquid. gutt. xvi. cum Aq. cinnam. fortior. cochl. j. ac brevi post, cessante vomitu, corticis usum aggrediatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnunquam emeticum, tempestive propinatum, ut nempe ante paroxysmum negotio suo defungi possit, felicissime successit. Nonnunquam enema in diebus intermittentibus per triduum, vel quatrimum injectum, curationem absolvit. Quæ sequenti quoque modo tentari potest.

℥℥. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. xv. Vin. alb. ℥iii. Sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per iij. vel iv. horas, idem faciendo per duas alias vices ante paroxysmum.

Si ingeminatis paroxysmis summe debilis fuerit æger.

℥℥. Conserv. Flor. Borag. Bugloss. an. ℥j. conserv. Anthos. ℥℥. cort. citr. condit. Nuc. Moschat. condit. Theriac. Andromach. an. ℥ii. confectio. Alchermes ℥ij. M. F. Opiata, cap. ad quantitatem avelanæ mane & vesperi, superbibendo cochlearia paucula, alicujus Aq. Epidemicæ simplicioris, Saccharo edulcoratæ, interdito interim enematum usu.

Si sub morbi exitum occurrat hydrops, nondum tamen depulsa febre, curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad. Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cinerum genist. &c. in vino factis, exulante autem febre, cathartics, & aperientibus.

Pro infantibus febre intermittente laborantibus.

℥℥. Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. ℥ij. cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥ii. Syr. Caryophyll. ℥j. M. f. Julap. Cap. Cochl. j. alterumve, pro ratione ætatis quarra quoque hora, donec paroxysmi non amplius discrucient, instillando alternis vicibus, si diarrhœa adfuerit, Laud. liquid. gutt. j. vel ij.

De Febre Stationaria, ab an. 1685. ad 90.

Calor & frigus se invicem excipiunt, artus pariter & caput dolent, pulsus interim fere sanus, nonnunquam tussis, dolor circa collum, & fauces, exacerbatio febris prope noctem, inquietudo, sitis, lingua vel humida & ex omni parte pellicula alba, & scabra vestita, vel sicca, fusci coloris in medio, quam partem undique cingit simbria inalbescens. A jugi in lecto decubitu coma, & phrenesis, a calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliaris morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomati divexant, qui si ab arte provocentur, viscosi a capite erumpunt, & materiam morbificam in caput aut in artus transferunt.

Mittatur sanguis ad unc. x. e brachio. Reiteretur venæ sectio; si modo respirationis difficultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, & alia signa peripneumonix nothæ adsint; in hoc casu tam venæ sectio, quam catharsis repetenda, donec æger convalescat.

Vesperi applicetur epispasticum, & sequenti aurora potio lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur, & hora somni post catharsin haustus pacificus propinetur.

℥℥. Aq. Paralyt. ℥ii. Syr. de Mecon. ℥j. Succ. Limon. recent. extract. cochl. ij. M. F. Haustus.

Aphthæ & singultus post curationem febris supervenientes sponte sua evanescent: si in longum tempus decurrant, facile fugantur Cortic. Peruv. ℥j. cum Syr. Papav. Rhæad. q. s. in formam Electuar. vel pillular. redacta, superbibend. haustum lactis deflorati. Remedium hoc certissime scopum attinget, si non frustentur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus a purgatione liberis sequentia præscribentur.

℥℥. Conserv. Lujul. & cynosbat. an. unc. j. conserv. Berber. unc. ℥. crem. Tart. ℥j. cum s. q. Syr. de Limonib. f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. Nuc. moschat. ter in die superbibendo sequent. Julap. cochl. vj.

℥℥. Aq. Portulac. Lactuc. Paral. an. ℥ii. Syr. de Limonib. ℥i℥. Syr. Violar. unc. j. M. f. Julapium. Vel

℥℥. Aq. font. ℥ij. aq. Rosar. Succ. Limonum, Sacchar. albiss. an. unc. iv. coq. lento igne dum despumaverint, cap. unc. iij. ad libitum, præscribatur quoque seq. gargarisma.

℥℥. Succ. Pomor. agrest. ℥℥. Syr. de rubo. Idæo unc. j. m. f. gargarisma.

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, Pil. Coch. maj. ad ℥ij. exhibeantur, tum est hypnoticum est concedendum, v. gr. Laudan. Londin. gr. i℥. cum simili quantitate Mastic. vel Laudan. liquid. gutt. xvij. in aq. Cinnamom. hor. deat. unc. j.

Decoctum album paratum, ex ℥j. C. C. usi, in aq. communis. ℥ii. cochl. & poster. Saccharo albissimo edulcoratum. Sit pro potu, ut & cerevisia tenuis pro libitu.

Post catharsin bis celebratam, concedatur ægro, pullorum carnibus vesci, & post ultimam purgationem, modo febris aliquantulum deflagaverit, vini Canarini cochl. iij. vel iv. mane, & sero, ut & post prandium, per dies aliquot propinentur.

In phreniride, ut & comate, nihil perinde confert, atque ægri caput radi, nullo admoto emplastro, sed pileolo tantum.

Si (quod sæpè in hysterics quandoque accidit) post venæ sectionem, & purgationes hujusmodi iteratas, etiamnum duret, procurratque febris, modo signa peripneumonix, & inflammationis circa partes vitales absint, singulis noctibus paregoricum, & medicamenta hysterica, bis vel ter in die injungantur.

De Infantibus febre Stationaria laborantibus.

Hirudines duæ utrinque pone aures applicentur, dein Emplastr. Epispasticum cervici admoveatur.

Cerevisia, qua Rhabarbarum fuerit infusum, purgetur.

Si post catharsin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum cortice Peruviano* (in capite de febre intermittenti pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De Febre Scarlatina.

Æstate exeunte, infantes præcipue infestat. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodum ægrotant; cutis univèrsa maculis parvis rubris, crebrioribus, latoribus & magis rubentibus quam in morbillis interstinguitur. Ad duos tredecim dies persistunt, quo quidem tempore evanescunt, & decedente subjecta cuticula squamulis furfuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

2℥. C.C. *ust. & pulv. e Chel. cancr. comp. an. 3℔. Coccinell. gr. ii. Sacchar. Crystall. 3j. M. f. pulvis subtiliss. in xii. Chartulas dividend. quarum unum cap. 6, quaque hora, superbibendo coch. ii. vel iii. sequentis julapii.*

2℥. Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexiter., an. 3iii. Syr. e succo citri unc. i. M. f. Julap.

Applicetur etiam epispasticum cervici, & qualibet nocte paregoricum ex Syr. de Mecon. propinetur, & postquam symptomata cessaverint, purgetur æger.

De Pleuritide.

Inter ver & æstatem dominatur. A rigore & horrore oritur, quos statim comitantur calor, sitis, inquietudo, & cætera febrium symptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore punctorio in laterum alterutro circa costas corripitur; qui nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat, tussi crebra excruciat; materia sputo rejecta in initio morbi pauca est & tenuis, & sæpe sanguinis particulis intermixta, progressu vero copiosior & magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore, & pro ratione liberiori expectorationis sensim imminuitur; nunc alvus est astricta, nunc soluta nimis. Eductus e vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert ubi refrigerit.

Mittatur sanguis e brachio lateris affecti ad 3x.

2℥. Aq. Papav. Rhæad. unc. iv. Sal. prunel. 3j. Syr. violar. unc. i. M. f. Haustus sumendus statim a prima venæ sectione.

2℥. Amygd. dulc. excorticat. N. v. sem. Melon. Pepon. an. unc. 3. sem. papav. alb. 3ii. aq. bord. 1℔. aq. Rosar. 3ii. cum s. q. sacchar. cand. f. s. a. Emulsio, Cap. unc. vi. 4. quaque hora.

2℥. Decoct. Pectoral. 1℔. Syr. Violar. & Cap. Ven. an. unc. i. 3. M. f. Apozema Cap. 1℔. 3. ter in die.

2℥. Ol. Amygd. dulc. unc. ii. Syr. Violar. & Cap. Ven. an. unc. i. Sacch. Cand. q. s. M. f. Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per se, vel Oleum sem. Lini recenter extract. exhiberi potest.

2℥. Ol. Amygd. dulc. Lilior., & unguent. Dialtheæ, an. unc. i. M. f. Linimentum, quo inungatur latus affectum mane, & sero superimponendo fol. Brassicæ.

Repetatur venæ sectio ad tres alias vices, ad eandem quantitatem, quatuor diebus continuis, ubi dolor, & respirandi difficultas tuadent.

De Peripneumonia notha.

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc incalcescit, nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ, oculique; tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans premit, poculenta vomitu rejicit, urina turbida est, & intense rubet, sanguis pleuriticorum amulus, anhelus crebro & celeriter spiritum ducit, dolente thorace. Ab asthmate sicco plane distinguitur, quod in isto nusquam comparent febris indicia, in hac manifesto se produnt, licet minora longe & magis obscura, quam in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis e brachio dextro ad unc. x. Die sequenti æger hanc potionem sumat.

2℥. Cassia extract. unc. i. Glycyrr. 3ii. ficus pingues N. iv. fol. sem. 3ii. Angarit. trochiscat. 3i. coq. s. q. aque ad unc. iv. in Colatur. dissolv. Marinc unc. i. Syr. Rosar. solut. unc. 3.

Si vero potionem assumere nequeat, Cap. Pil. Coch. mai. 3ii. hora quarta matutina.

Sequenti die celebretur iterum venæ sectio, ad eandem quantitatem; ac postero die repetatur catharsis, quæ porro repetenda est alternis diebus, vel post majora intervalla, pro ratione virium; atque insuper si symptomata non cessaverint, extrahatur iterum sanguis, semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæ sectio bis celebrata sufficiet; interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus a purgatione vacuis, utatur decocto Pectorali, Eclegmate & oleo Amygd. dulcium, in pleuritide descriptis.

De Rheumatismo.

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox, nunc in hoc, nunc illo artu, in carpis, humeris & genibus præsertim, vicissim hos relinquens, & illos occupans, rubore & tumore in parte, quam postremum affectit, adhuc residuis. Febris sensim evanescit, manente dolore, quin & nonnunquam immanius sævient. In lumbagine rheumatica immanis dolor est, circa lumborum regionem fixus, nephritin mentiens, nisi quod æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed vel e lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetua agitatione, nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur sanguis e brachio lateris affecti, ad unc. x.

2℥. Aq. Nimph. Portulac. Lactuc. an. unc. iv. Syr. de Limonib. 3i. Syr. Violar. unc. i. M. f. Julap. de quo bibat ad libitum.

Præscribend. Emulsio 4. Sem. frigid. maj. Cataplasma e mica panis albiss. & lacte Croco tincto applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur, atque iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur, atque porro quater vel

pluries, si opus fuerit, hoc observando, ut post secundam venæ sectionem majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus a phlebotomia vacuis, enema e lacte saccharato subinde injiciatur, vel sequens.

2℥. Decoct. commun. pro Clystere 1℔. Syr. Violar. & Sacchar. culinar. an. unc. ii. M. f. Enema.

Si imbecillitas ægri repetitionem phlebotomiæ non ferat, tum post secundam vel tertiam venæ sectionem, curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus *potionem purgativam communem*, donec convalescat, & iisdem noctibus paregoricum ex Syr. de Mecon.

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunque ferre nequeat, aggrediatur usum *Elect. & aq. Antiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam locum habent in rheumatismo scorbutico.

In juvenibus, atque iis, qui temperate vixerunt, vino non plus æquo dediti, rheumatismus diætæ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æque feliciter, ac repetitis venæ sectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. grat.

Solo lactis sero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane simillagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat, nisi quod postremis diebus iterum panem in cœnam indulgere liceat, symptomatibus cessantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraque eupepta concedantur, tertio autem quoque die solo lactis sero victiter, donec tandem pancreaticæ valeat.

De Febre erysipelatoza.

Nulla non corporis pars præsertim facies, tumet, dolet & summe rubet, pustulæ densæ, parvæ in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputque serpunt, oculi tumore obruti, rigor, & horror atque reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes nonnunquam, quam in vesiculas sublata, mox recedentes, tuberculorum more, sub cute se condentes, maxime pruriunt, & scalpando rursum apparent. Est & alia eruptionis species; pectus ut plurimum obsidens, macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa, cum squamulis flavis, qua vigente, æger bene se habet; eadem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus serinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis e brachio ad 3ix. vel x. Die sequenti sumat *potionem communem purgativam*.

2℥. Rad. Althææ & Lilior. an 3j. sol. Malv. Sambuc. Verbasc. flor. Chamæm. Melilot. summit. Hyperic. & centar. minor. M. j. sem. Lini, sænugræc. an. 3℔. coq. s. q. ad 1℔. Coletur liquor, & tempore usus adde singulis libris decocti Sp. Vini 3ii. Stupæ e panno laneo huic decocto immergæ, ac expressæ, calide admoveantur bis in die, & pars affecta post totum sequenti mixtura illiniatur.

2℥. Sp. Vini 1℔. Theriac. Androm. 3ii. pul. piperis longi, & Caryophyll. an. 3ii. f. mixtura, qua charta emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ venæ sectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus a venæ sectione liberis *Enema e lacte cum Syr. Violarum, Emulsio Refrigerans, & Julap. refrigerans*, sunt præscribenda.

De pruritu serino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ venæ sectioni & catharsi non cedunt.

2℥. Theriac. Andromach. 3℔. Elect. de ovo 3i. rad. Serpentar. Virgin. subtiliss. pulv. gr. xv. Lapid. Bezoar. oriental. gr. v. cum s. q. Syr. e conditur. civi f. Bolus, hora somni sumendi per dies xxi. superbibendo coch. vi. sequenti Julapii.

2℥. Aq. Card. benedict. 3vi. aq. Epidemic. & Theriacal. Stillat. unc. ii. Syrup. Caryophyll. 3i. M. f. Julap.

Singulis matutinis capiat liquoris pectetici 1℔. calide, & sudet horæ unus spatium.

His hntis, si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti linimento partes affectæ inungantur.

2℥. Unguent. ex Oxylopatho unc. ii. Unguent. Pomati unc. i. flor. Sulphur. 3ii. ol. Rbedii 3℔. f. linimentum.

Veruntamen medicamenta præscripta haud usurpentur nisi venæ sectione & catharsi rite præmissis.

De Angina.

Angina inter ver & æstatem ut plurimum aggreditur. Sequuntur febris insultum dolor, & faucium inflammatio, unde a tumore nvlæ, tonsillarum & laryngis, nec deglutire queat æger, nec spiritum ducere.

Mittatur sanguis e brachio copiose. Tangantur partes inflammatae melle Rosaceo Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vitriolo solo. Mox gargarisma sequens usurpetur, non vulgare modo, sed ita ut sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalcescat; dein expuatur, & repetatur subinde.

2℥. Aq. Plantag. Rosar. Rubr. & Sperm. Ranar. an. 3iv. album. ovor. in aquam agitando redact. N. iii. Sacchar. Crystall. 3iii. M. f. Gargarisma.

Emulsio Refrigerans in pleuritide descripta in dies sumatur.

Sequenti mane, nisi febris & dolor inter deglutendum remiserint, venæ sectio repetatur, catharsi in diem posterum rejecta, alias catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu (quod oppido rarum) repetatur adhuc venæ sectio, & catharsis, epispasticum amplum ac forte applicetur cervici post primam venæ sectionem. Omni mane, nisi diebus purgationi datus enema refrigerans & emolliens injiciatur, diætæ tenui utatur æger, & lecto per horas aliquot quotidie abstat.

In his omnibus febribus, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ stationaria est, caute observandum, quod æger a lecto abstineat magnam diei partem, ut jusculis hordeaceis, avenaceis ac id genus aliis victiter, & cerevisiam lupulata, & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Infantes plerumque imperunt. Primo die rigent horrentque, calent

calent & frigent alternatim. Secundo consummatam febrem accersunt, ægritudo vehemens, sitis inappetentia, lingua alba (non vero sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt, humor e naribus & oculis jugiter stillat (quæ lacrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum paulo ante eruptionem, vomitus, diarrhœa, cum dejectionibus colore viridi in dentibus præsertim; symptomata ingravescent ad quartum usque diem, quo quidem die (nonnunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicum moribus persimiles produnt; quæ numero & magnitudine auctæ, racematim coalescunt, faciem maculis interftringunt. Hæ maculæ e parvulis, supra cutim paulum elevatis conflantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie deprehendi possit.

A facie, quam primo solum occupant, ad pectus ventremque, crura deinde tibiasque propagantur maculæ; in his autem partibus latæ, & rubræ, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde deliniuntur symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus, sed tussicula & febris cum spirandi difficultate intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & inappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons, & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptaque cuticula, in reliquo corpore maculæ latissimæ sunt, & maxime rubescunt. Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo corpore permanent. Nono nullæ prorsus sunt, per faciem vero & artus quandoque, & totum corpus in farinam quandam, & squamulas facessunt, & tunc temporis febris, spirandi difficultas, & tussicula augentur. In adultis a calido regimine livescunt primo, mox nigrescunt exanthemata.

℞. *Decoct. Pectoral.* ℞i℞. *Syrup. Violar.* & *Cap. Ven. an.* ℞i℞. *M. f. Apozema.* *Cap.* ℞i℞. vel iv. ter vel quater in die.

℞. *Ol. Amygd. dulc. unc.* ii. *Syr. Violar.* & *Cap. ven. an. unc.* i. *Sacchar. Cand. albiss. q. s. M. f. Eclegma,* de quo sæpius lambat, præcipue quando tussi urget.

℞. *Aq. Cerasor. nigr.* ℞i℞. *Syr. de Mecon.* ℞i. *M. f. haustus* singulis noctibus sumendus, a primo morbi insultu, usque dum convalescerit æger, dosim augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem. Si post morbillorum discessum, febris, respirandi difficultas, & alia symptomata peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus e brachio; semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio inter singulas venæ sectiones; atque etiam continetur decoctum Pectorale supra descriptum ut & Loboch, vel *Ol. Amygd. dulc. per se.* Circa diem xii. ab invasione cathartico lenienti purgetur.

Diarrhœa, quæ morbillos excipit, venæ sectione sanatur.

De Variolis.

Distinctæ sunt, vel confluentes, & in dictis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomitatio, in adultis ingens in sudores propensio (& hinc minime confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis si manu prematur, stupor & somnolentia, nonnunquam & insultus epileptici (in infantibus præsertim) quibus si, dentitione peracta, corripiantur, in præcinctu esse variolas possis prædicere; ita ut si forte insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti aurora in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissime confluentes. Quarto inclusive ab invasione die, nonnunquam serius, raro tamen ante illum erumpunt, quo tempore, vel minuantur symptomata, vel prorsus evanescent. In eruptione autem subrubræ primo pustulæ tenuissimarum acicularum puncta æquant, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur. Circiter octavum a primo insultu diem intervalla pustularum prius alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proxime a facie intumescunt manus, digitique distenduntur, pustulæ faciei antea leves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent; succum insuper luteum, colore a flavo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum interstitiis colore exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum, quem quidem colorem, quo mitiores sunt variolæ, eo magis tum pustulæ tum cutis interjecta ad amissim exprimuntur. Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus minus asperæ albæque magis conspiciuntur in dies. Die undecimo faciei tumor & inflammatio recedunt, pustulæ maturæ, & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque. Decimo quarto, vel quinto pereunt funditus; manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt, & tandem dirimpuntur; cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squamulis hisce fursuraceis succedunt foveæ. Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur, vel rarissime dejicit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cum in discreto hoc genere promoventur sudores tum cardiaci, tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ tumida & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat, e contra flaccida reperitur, & albescens, pustulis nihilominus rubentibus, & elevatis, etiam post ægri mortem, sudor, qui hucusque manaverat, derepente evanescit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementibus, urinam parce reddit ac frequenter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In confluentibus eadem symptomata (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomitatio, &c. immanis sæviunt, licet non ita prompte, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa nonnunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio die aut citius, raro tardius, erumpunt; & quo citius, eo magis confluant. Quandoque ad quartum vel quintum diem differtur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. gr. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine, & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discer-

Sydenham Opera Medica.

nant; nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore plane distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicatæ, tanquam vesicula rubra vultum omnem contegunt, quem maturius elewant quam discretæ: postmodum ad instar pelliculæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superant. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore fusco: intensus magis est dolor curis, donec tandem in rruclentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quod quanto pustulæ maturescentes propius ad calorem subfuscum vergunt, eo deteriores lentius abscedunt; quo magis autem flavescunt, eo minus confluerint, & ocyus se proripiunt. Ubi primum deciderit pellicula, nulla scabritie vultus afficitur, at vero mox illam excipiunt squamulæ fursuracæ, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoque humeri & dorsum cuticula denudantur. Morbi periculum a pustularum frequentia, & numero in facie sola, æstimandum. Pustulæ manuum, & pedum majores, & quo altius ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores, & contractiores extant. In adultis salivatio, infantibus diarrhœa (licet non ita certo) confluentium comes. Ptyalismus nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduo præterito; materiam primo tenuem, die undecimo viscidiorum ægerrime, excreat. Siticulosus est æger, voce rauca, somnolentia, & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit, & potus per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere debet) & manuum jam insigniter incipiens, & diutius perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita mature infantes occupat ac ptyalismus adultos. In utraque variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, qua peracta, desinit. Superveniunt a malo regimine symptomata anomala, qualia sunt, pustularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus, vel quatuor primis diebus transigitur. Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Dies, in quo maxime periclitatur æger, in confluentibus, in minime crudo, maxime vulgari genere, a primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc, decimus quartus, & in crudissimo, decimus septimus; nonnunquam tamen, sed rarius, non ante diem vicesimum moritur æger. Quinimo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum septimum interiacet, appetente vespera, molestissimo inquietudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad unc. ix. vel x. postea Vomitorium exhibeatur ad ℞i. vel ℞i℞. *Infusionis Croci Metallorum.*

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione cerevisiæ tenuis lupulatæ, cui vitrioli spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vesperi propinetur. *Syr. de Mecon.* ℞i. quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Et nocte, si variolæ e confluentium genere fuerint, augetur dosis ad ℞i℞. quæ dein repetatur ad ℞i. mane, & ad ℞i℞. sero, singulis noctibus, donec æger convalescat.

Si syr. de mecon. minus congruat, substitui possit *Laudan. liquid. viz. gutt. xviii. pro ℞i. Syrupi, & gutt. xxv. pro unc. i℞.* Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in variolis insigniter confluentibus, sub finem harum sæpe accidit) tum octava quaque hora exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si variolæ interdistinctæ fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus post plenam eruptionem exhibeatur paregoricum; atque etiam in minori dosi.

Qualicumque autem generis variolæ fuerint, atque etiam qualicumque morbi tempore, si phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior paregorici dosi metam non attingat, atque alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatio aliquo, ut pernoscere valeamus, utrum dosi ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger e lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeo viscida, ut expectorari non possit, tum gargarisma cum syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur e *Cerevisia tenui*, vel *aq. bord. cum Melle Rosarum*, vel sequens usurpari poterit.

℞. *Cort. Ulmi* ℞vj. *rad. Glycyrrhiz.* ℞℞. *Passul. enucleat.* N. xx. *ros. rub. p. ii. coq. f. q. ad ℞i℞. in Colatur. dissolv. oxymel. simp. & mell. Rosar. an. ℞ii. M. f. Gargarisma.*

Si epileptico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte ista, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico, plantis quoque pedum applicari potest allium, a die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si infans de symptomatibus dentitionem comitantibus jam securus, derepente spasmo corripitur, hic cogitandum est, convulsionem istam, fortassis a naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere, applicetur itaque emplastr. epilepticum nuchæ, lecto quam primum committatur æger, exhibeatur insuper cardiacum, cui paregorici paucillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gutt. v. in aq. Epidem. cochl. i.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione & cæteris id genus symptomatibus, usque adeo effertur, ut paregoricis utcumque repetitis sufflamini nequeat; & mors quasi imminet, tum sanguis in satis magnam quantitatem illico detrahatur, nempe ad unc. xii. vel circiter, atque porro repeti possit semel, vel bis in sequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postularit; at non alias. Catharsis etiam blanda die

decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo venæ sectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitivi* ℥i. dissolut. in aq. Cichor. vel lactis Alexiter. ℥iv. Veruntamen nec venæ sectio, nec catharsis impediunt, quo minus paregorica in usum veniant, quæ (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin, quam repetitam exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando pustulæ perfecte exaruerint, inungatur facies linimento ex æqualibus partibus ol. Amygd. dulc. & Pomat. per bideum, at non ultra.

Die xxi. post invasionem mittatur sanguis e brachio; & sequenti die catharsis celebranda, quæ porro alternis diebus ad tres alias vi- ces repetatur.

Quoad regimen, a lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usque ad xvii. non aliis stragulis tectus, quam quibus sanus uti solebat.

Jusculis avenac. hordeac. pomis coct. & cerevisia tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanici cochl. iv. vel v. bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fotu fol. malv. verbasc. sambuc. lauri, cum floribus chamæmel. & melilot. in lacte coct. facile fugatur.

Si primis morbi diebus æger hæmoptoe laboret, vel urinam reddat sanguineam, tum pulvis, & tinctura, quæ in capite de hæmoptoe præscribuntur, sexta quaque hora (donec symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu paregorica liberali manu propinanda.

De Choreæ Sancti Viti.

Convulsionis species quædam est, pueros puellasve a decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit suorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille guttulationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim recta linea ori admoveat, sed deducta a spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem forte fortuna labris propius apponens liquorem derepente in os injicit, & avidè haurit, dedita tanquam opera, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad ℥viii. plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, portionis commun. hauriatur; & vesperi haustus sequens propinetur.

℥℥. Aq. Cerasor. nigr. ℥j. aq. Epilept. Langii ℥iij. Theriac. Andromach. ℥j. Laudan. Liquid. gut. viii. f. haustus.

Potio Cathartica. ad tres vices, alternis diebus, repetatur; & haustus Paregoricus iisdem noctibus.

Postea sanguis iterum extrahatur, & ad catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem, spatium tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi agro imminet.

Diebus a purgatione vacuis sequentia præscribantur.

℥℥. Conserv. Absinth. Roman. & flaved. Aurantior. an. ℥j. Conserv. Anthos ℥ss. Theriac. Andromach. vet. & nuc. moschat. condit. an. ℥j. Syr. e succ. citr. q. s. f. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. mane & hora quinta pomeridiana, superbibend. vini frequentis cochlear. v.

℥℥. Rad. Pæonia, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ℥j. fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summit. Cent. min. an. M. i. Baccar. Juniper. ℥vj. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in vini Canarini ℔vj. coletur tantummodo usus tempore.

℥℥. Aq. Rut. ℥iv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an. ℥j. Syr. Pæon. ℥iv. M. f. Julap. cap. cochl. iv. singulis noctibus cubitum iturus, instillando Sp. C. C. gut. viii.

Applicetur plantis pedum emplastr. e caranna.

Ob recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, ea ipsa anni sequentis tempestate (vel paulo ante) qua morbus invasit.

Verisimile mihi videtur, quod hæc methodus curationi epilepsiæ adultorum convenire possit, quod tamen non adhuc expertus sum. Cum vero Choreæ S. Viti ætates teneras adoriri soleat, in epilepsia adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quam catharticum dosis adaugentur.

De Apoplexia.

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensus & motus privatio, excepta respiratione, quam ægri habent difficilem cum stertore.

Mittatur sanguis e brachio ad ℥xij. quamprimum, ac postea ex venis jugularibus ad ℥viii. deinde Vomitorium ex ℥iij. vel unc. ii. Infus. Croc. Metal. propinetur statim.

Emplastr. Epispastic. satis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis obrutus.

Sp. Sal. Armoniac. optime rectificatus admoveatur naribus.

Finita vomitorii operatione, subinde exhibeantur cochl. iii. vel iv. sequentis julapii.

℥℥. Aq. Ruta ℥iv. aq. Bryon. comp. & Antiepilept. Lang. an. ℥j. Sp. C. C. gut. xx. Sacchar. Crystall. q. s. f. Julap.

Vel Cochlear. i. Sp. Lavendule comp. per se propinari possit bis vel ter, durante paroxysmo, hora dimidia vel integra interposita.

Cavendum est, ne cardiaca plus justo calida, ac nimis frequenter (uti mos est) exhibeantur; nam quacumque demum specifica virtute pollere videantur, plus damni quam emolumenti agro apportant, utpote quæ humores fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommodum non minus infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivam sequentia exhibeantur.

℥℥. Pil. Coch. mai. ℥ij. cap. tertia quaque die per 6. vices hora 4. matutina superdermiendo.

℥℥. Conserv. flor. salv. Rosmarin. an. unc. i. Conserv. flaved. Aurant. ℥vj. nuc. Moschat. condit. & Zinzib. condit. an. unc. ss. Theriac. Androm. vet. ℥ij. pulv. elect. diamb. diamosch. dulc. an. ℥j. cum f. q. Syr. conditur. citr. f. opiata, ad magnitudinem castaneæ mane & sero, superbibend. aq. Epilept. Lang. Coch. ij.

℥℥. Ambr. gris. ℥ss. ol. destil. sem. Anisi, cinnamom. nuc. moschat. an. gutt. ij. ol. Charyophil. gut. j. Sacchar. in aq. flor. aurantior. solut. unc. iv. f. s. a Tabellæ, quarum capiat unam ad libitum.

Ab usu potus generosioris cujusvis sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis, hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoque etiam (præcipue inter purgandum) carne pullorum, agnorum ac id genus ciborum eupepton.

De Ophthalmia.

Ex oculorum inflammatione patet.

Mittatur sanguis e brachio ad unc. x. Sequenti die sumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vices, duobus diebus interpositis; iisdem noctibus sumat haustum paregoricum ex Syr. de Mecon. unc. j.

Diebus a purgatione vacuis sumat ter aut quater in die unc. iv. Emulsionis ex sem. frigid. maj. & Papav. alb.

℥℥. Aq. Plantag. Ros. rubr. & Spermat. Ranar. an. unc. j. pul. Tutie preparat. ℥j. f. Collyrium, cujus guttæ aliquot instillantur oculis bis in die; at non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur venæ sectio semel vel bis, (præcipue si sanguis pleuriticus apparuerit) ut etiam catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquores generosi (ab usu etiam ciborum coctis difficultum, & sale conditorum,) & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quod sæpe accidit, quod venæ sectione & catharsi utcumque repetitis ophthalmia non cedit; hoc in casu Paregoric. ex Syr. de Mecon. unc. j. singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

De uteri Procidencia.

℥℥. Cort. Querc. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. sub finem addendo Cortic. Granator. contus. ℥j. ros. rubr. flor. Granator. an. ℔i. dein. adde vini rubr. ℔ss. colatura sit pro fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur mane horis duabus, antequam e lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptoma penitus evanuerit.

De Paroxysmo Nephritico.

Adfunt dolor fixus in lumborum regione, urina cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris e directo renis laborantis, testis retractio ejus lateris, in quo est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud absimilis; licet in quibusdam symptomatibus plane discrepet, quæ recensita in Capite de Colica biliosa videas.

Si æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis e brachio affecto reni respondententi ad ℥x. dein liquoris possietici, cui Rad. Althææ ℥ij. incosita fuerint. Cong. j. quam citissime deglutatur, & enema sequens injiciatur.

℥℥. Rad. Althææ & Lilior. an. ℥j. fol. Malv. Parietar. Branc. Ursin. & flor. Chamæmel. an. M. j. Sem. Lini & Fœnugr. an. ℥ss. coq. f. q. aq. ad ℔ij. M. F. Enema. Rejctis vomitorio & enemate, Laudan. Liquid. satis magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel Pil. Matth. gr. xv. vel xvi. In senibus vero, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis vaporibus obnoxiiis (præcipue si sub initium paroxysmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) venæ sectio omittatur; & quoad reliqua, eadem quæ dicta est via omnino procedendum.

In Mictu sanguineo calculo renibus impecto.

Capiat æger, statò quodam die, singulis hebdomadis, Manna ℥iij. in feri lactis ℔ij. solut.

Conducit aliquando haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis perferitur, nec paroxysmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger se non tuto committet, nisi prius certo sciat, calculum majorem non esse, quam ut per urethres viam possit invenire, quod hoc tantum modo certo potest dignosci, si nempe, jam antea; paroxysmum aliquem nephriticum fuerit perpeffus, cum dolore sævissimo in renem alterutro, per uretherum ductus propagato, & vomitu enormi pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguum congeriem, quorum unus subinde in uretherum illabitur, atque ita paroxysmum invitat, qui fere non desinit, nisi calculo in vesicam detruso; cum sic res habeat, nullum est magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio; quod si calculosus, nullo unquam paroxysmo nephritico fuerit tentatus, cum jam major sit calculus, quam qui ex pelvi possit elabi, devitandæ sunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhœa & Tenesmo.

Rigent horrentque, sequitur deinde totius corporis color, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc, dejectiones crebræ, & mucosæ omnes (nisi quod stercorosæ nonnunquam interponantur) cum ingenti cruciatu & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, quoties exoneratur alvus, sanguinis interim lineamentis intertextæ, licet aliquando ne minimum sanguinis per totum morbi decursum admisceatur. Progressu morbi sanguis sincerus quandoque excernitur, & gangræna insanabili afficiuntur intestina. Si æger floreat, vel cardiacis incalcescat, feblicitat admodum, lingua est subalbida, quadam mucilage dense obsita, interdum nigra & sicca. Prosteruntur vires, dissipantur spiritus, aphtæ insuper oris interna faucesque obsident, præsertim ubi materiæ peccantis evacuatio a ringentibus præposere impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Ali-

quan-

quando exularite febre, agmen ducunt tormina & cetera morbi symptomata sequuntur.

In diarrhoea humores excrementitii sine sanguine aut intestinorum exulceratione excernuntur.

In tenebrio assidua est desidendi cupiditas; nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur sanguis e brachio quamprimum, eademque nocte *Paregoricum* propinetur, & mane sequenti *Potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & *Paregoricum* post purgationes, quamprimum suo defunctæ sunt munere; ac diebus a purgatione vacuis idem mane & sero est exhibendum.

Post venæ sectionem & catharsin semel celebratam, per totum morbi decursum, sequens cardiacum exhibeatur.

2℥. *Aq. Ceras. nigr. & fragor. an.* ʒiij. *Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinnam. bordeat. an.* ʒi. *Margarit. preparat.* ʒiij. *Sacchar. crystall. q. s. adde Aq. Rosar. Damascen.* ʒiij. *ad gratum saporem, m. f. Julap. de quo cap. conchl. iv. vel v. in languoribus, vel ad libitum.*

Potus sit lac coctum cum *Aq. Triplo*, vel *Decoct. Alb.* ut.

2℥. *C. C. C. & Mic. panis alb. an.* ʒij. *coqu. in Aq. font.* ℔iij. *ad ℔iij. postea f. q. Sacchar. Albiss. edulcoretur.* Vel si dejectio virium postulaverit, *Aq. font.* ℔iij. *cum Vin. anarm. ℔i. simul coctæ, pro potu frigide assumantur.*

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die reperiiti postea incumbit, nisi quod *Enema ex Lact. vaccini. ℔ss. & Theriac. Androm.* ʒiij. subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in diarrhoeam tantum assurgat, phlebotom. & catharsi præscript. omittis, seq. bolus singulis matutinis exhibeatur.

2℥. *Rhabarb. pulv. ʒss. (plus minus pro ratione virium) cum f. q. Diafcozidi. f. Bolus, addendo Ol. Chym. cinnam. gutt. ij.*

Noctibus insequentibus *Paregoric. ex Aq. cinnam. bordeat. unc. j. & Laudan. Liquid. gutt. xiv.* exhibeatur.

Ubi tormina sicca sine dejectionibus excruciant, curantur diluendo sero lactis frigide propinato, & tepide injecto; ut in cholera morbo pullorum jusculo aut lacte cerevisiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeo ut omnis ejus vis in rectum intestinum decumbat, cum assidua desidendi cupiditate, diæta analeptica instituat, & liquor aliquis cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari possint vires, quibus redeuntibus tenebimus sponte se proripit.

In dysenteria male curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot discruciant; in hoc casu phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est, quod in constitutionibus huic morbo minus faventibus omittis evacuationibus dysenteria laudano solo sanatur, quod mane & sero repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter nycthemeri spatio, si opus fuerit.

De Colica biliosa.

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injecta fascia constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudescit. Sub initio non ita certo ad unum aliquod punctum determinatur, neque tam crebra vomituritio, neque alvus ita pertinaciter cathartico vim eludit; quo autem magis augeatur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio frequentior, & major alvi adstrictio, colica tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporitur secundum longitudinem ureteris. Colicus vero vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A passu colicus dolor augeatur: nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidit, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis e brachio paulo liberalius educatur, & post horas iii. vel iv. *Anodyn.* exhibeatur. Postero die *Catharticum Lenitiv.* & interposito die uno, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est; quo exantlato anodynum propinandum est; sequenti autem die vena secunda est, & in ordine præscripto procedendum.

Ubi hic morbus minus perite tractatus diutissime fatigaverit, & ægrum pene confecerit, liberalior sive aquæ epidem. sive mirab. sive alius cujuscunque, qua sanus maxime delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

De Cholera morbo.

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis effectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subseclii. Adsumt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis, pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis, æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24. horarum spatio interimunt.

Pullus tenerior in tribus circiter aquæ font. congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris possertici capaciores aliquot cyathos æger tepide exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successive repetenda. Haustibus & clysteribus *Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve* alicujus, uncia subinde admisceri poterit.

Exantlato hoc eluvionis penso (quod iii. vel iv. horas sibi vendicat) *Paregoricum* curationi coronidem imponit.

Si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus & jam frigescent membrorum extrema, tum ad *Laudanum liquidum* confugien-

Sydenham Opera Medica.

dum est in paulo majori dosi (viz. *Laudan. liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. unc. i.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus mane & sero quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam cholera morbi infantibus valde familiaris, ac sæpenumero funesta, ex dentitione vel crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minime fert, ut diluatur ventriculus larga liquorum potatione, multo minus, ut cathartici tumultus major in humoribus excitetur; sed curationem *Laudano* solo aggredi oportet; quæ obrem *gut. ii. iii. vel iv. vel plures*, pro ratione ætatis, cochlear. j. cerevisiæ tenuis vel aquæ cujuscunque appropriatæ instillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De Colica Pictorum.

Est species quædam colicæ, quæ degenerare solet in paralyfin, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem; quam hoc nomine *Riverius* in capite de paralyfi indigitat, & apud insulas Caribum notissima est, utpote quæ magnam vim hominum infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsam. Peru.* frequenter ac in magna dosi exhibitum, nempe si *ejus gutt. xx. xxx. vel xl. Sacchar. Albiss. cochl. i. instillentur*, & bis vel ter in die dentur: at paralyfis huic remedio haud cedit.

De Iliaca passione.

Peristalticus intestinorum motus invertitur, propinata cathartica & injecta enemata in emetica statim transeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis e brachio dextro ad unc. ix. vel x. post aliquot horas exhibeatur sequens pulvis.

2℥. *Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin. Julap. gr. xii. Calomelan. Turquet. ʒi. m. f. Pulvis*; cap. e cochl. i. lactis vaccini, superbibendo ejusdem lactis cochl. i. vel alterum, vel si forma pilularum magis ardeat.

2℥. *Pil. ex duob. ʒss. Calomel. Turquet. ʒi. cum f. q. Balsam. Peru. f. Pil. iv. sumend. e cochl. i. syr. violarum.*

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. Liquid. gutt. xxv. Aq. Cinnamom. fort. ʒss.* instillatæ statim propinentur; cum vero horum usu vomituritio, ac ventris dolores remiserint, catharticum dictum iterum exhibeatur, verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore restitente, ad usum paregorici supra descripti revertendum, idemque eo usque repetendum quarta vel sexta quaque hora, donec intestinis quies omnino inducatur, quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sane abs re fuerit elapsa una, aut altera, post venæ sectionem hora, clysterem aliquem, ex iis qui potentius operantur, injicere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissime insufflatum, quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finita operatione cathartici, sumat sequentem haustum.

2℥. *Aq. Cinnam. fort. unc. i. Laudan. liquid. gutt. xxv. m. f. Haustus*, qui porro repetendus est bis, ter, vel sæpius in die, donec vomituritio, & dolor penitus cessaverint, atque etiam, istis symptomatibus cessantibus, nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.

De Fluxu Mensium immodico.

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus, capacitatem testæ ovi asserini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur sanguis e brachio ad unc. viii. sequenti mane sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem *Paregoric. e Syr. de Mecon.* exhibeatur.

Diebus a purgatione vacuis sumat sequentia.

2℥. *Conserv. Rosar. sic. ʒij. Trochisc. de terra Lemnia ʒiij. Corr. Granator. Corall. rub. preparat. & boli Armen. an. ʒij. lapid. hematit. Sanguin. Dracon. an. ʒi. cum f. q. Syr. Cydonior. f. Elect. de quo sumat ad magnitudinem nucis moschat. maj. mane & hora quinta pomeridiana, superbibendo sequentis julapii cochl. vi.*

2℥. *Aq. Germin. Querc. & plantag. an. ʒiij. Aq. Cinnamom. bordeat. & Syr. de Rosis siccis an. ʒi. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

2℥. *Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, & succus exprimatur, & postea clarificetur*, de quo cap. cochl. iv. vel v. sæpiusculæ ad libitum.

Post primam purgationem applicetur emplastr. seq. regioni lumborum.

2℥. *Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. æq. extendantur super alutam, f. Emplastrum regioni lumborum admovendum.*

De Colica hysterica.

Est species quædam, seu potius insigne ac valde usitatum affectionis hystericae symptoma, cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primo, quo saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minus impediatur paregorici efficaciam, satis magna quantitas liquoris possertici affatim ingurgitetur, atque iterum per vomitionem rejiciatur, nempe *ejusdem liquoris Cong. i℔.* quo peracto *Laudan. liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq. Epidem. vel alius vehiculi unc. i.* propinentur.

In usu paregorici hoc notandum, quod eo usque repetendum est, donec symptomata omnia penitus cessaverint, debitum interea tempus interjiciendo, ut judicare valeamus, quid prior dosi effecit, antequam novam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit æger, vel si antea hoc

symptomate haud multum infestatus fuerit ac viribus fructus, hoc in casu sanguis primum a brachio detrahendus antequam vomitorium præscriptum propinetur.

Hac ipsa methodo clavus hystericus curatur. Sin vero colica hystERICA diuturnior fuerit per paroxysmos affligens: tum in eorum intervallis, sive extra paroxysmum, seq. usurpentur.

℞. Zedoar. subtiliss. pulv. ℥j. cum f. q. Syr. e conditur. citri, f. Bolus, sumendus mane & sero per xxx. dies, superbibendo sequentem infusionem.

℞. Zedoar. incis. minutim unc. ℞. vini Canar. unc. iv. infundantur frigide per xij. horas; deinde colentur pro usu, vel Balsam. Peruv. ut in colica pisonum, usurpentur.

Quæ de colica hystERICA hic dicuntur, de colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc dilihenter advertendum.

Utriusque affectus natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuine morbus cedit, tametsi ut plurimum chalybs in primis confert.

Colica hystERICA tam in hypochondriacis, quam hystERICIS sæpissime in icterum definit, qui sensim sponte sua facessit; sin autem longas moras nectat, exhibeatur apozema sequens.

℞. Rad. Rub. Tinctor. curcum. an. unc. i. chelidon. maj. cum toto & summat. centaur. an. M. j. coq. in equalib. partibus Vini Rhenani & Aq. fontan. ad ℔ij. colatur. dissolv. Syr. de 5. radicibus unc. ij. m. f. Apozema, de quo capiat ℔℞. calide mane & sero, usque dum convalescit.

De Ictero, colica nequitiam pregressa.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent afflicta, tincta, corporis pruritus, segnitie, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indignant.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium; & durante eorumdem usu, catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

℞. Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved. Aurant. an. unc. i. Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum aceto preparat. an. unc. ℞. Extract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ℥ij. croc. Anglic. pulv. ℥℞. f. q. Syrup. de 5. radicibus f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. mane & hora quinta pomeridiana (vel vice electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosim aquarum mineralium purgantium ℔iv. & post pomeridianam dosim Apozemat. in colica hystERICA descript. lib. ℞.

At si signa hydropis adfuerint, tam mane, quam sero apozema superbibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc persistit, ad aquas ferreas eundem est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præscribenda, ac in fluxu mensium immodico, omissis solummodo catharsi & succis.

De immodico Lochiorum fluxu.

Fluxum lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per triduum primum fluens; dehinc sanguis aquosus, loturæ carni crassiori similis per quadriduum præter propter durans, hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosa, paucio aut nullo sanguine permixta, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex virium defensione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsū debili & frequenti, visus obnebratione, aurium tinnitu, & convulsionibus.

Vitus in crassans instituitur, & potus sequens addatur.

℞. Aq. Plantag. vin. rubr. an. lib. i. coq. simul ad tertias, & deinde edulcoretur f. q. sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, cap. lib. ℞. bis vel ter in die.

Interim julap. aliquod hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

℞. Galban. Assæ fœtid. an. ℥ij. castor. sal. succin. volatil. an. ℥℞. m. f. nodulus, vel

℞. Sp. salis Ammoniaci ℥ij. quem sæpe olfaciat.

De suppressione Lochiorum.

Intumescit venter, dolor gravativus in venter, lumbos & inguina occupat, facies rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adfunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero, paralysis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & Emplast. hystericum umbilico admoveatur quamprimum, elect. seq. adhibeatur.

℞. Conserv. Absinth. Rom. Rut. an. unc. i. Trochisc. e Myrrh. ℥ij. Castor. croc. Anglic. sal. volatil. sal. Armoniac. & Assæ fœtid. an. ℥℞. cum f. q. Syr. e 5. radicib. f. Elect. cap. ad magnitud. nuc. moschat. quarta quaque hora, superbibendo de julap. cochl. 4. vel 5.

℞. Aq. Rutæ unc. iv. Bryon. compos. unc. jj. Sacchar. cand. q. f. f. Julap. vel sumat Trochisc. de Myrrh. ℥j. quarta quaque hora.

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & lochia adhuc supprimantur, Laudanum unicum saltem vice exhibendum ut Laudan. liquid. gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. i℞. cum Assæ fœtid. ℔℞. in pilulas duas redactum.

Si hæc nihil proficiant, tum enemata ex lacte saccharato, unica saltem vice injiciantur.

De Hydrope.

Foveæ a digitorum impressione in suarum parte inferiori sub noctem conspicuæ mane evanescentes, hoc malum primum indicant,

maxime si spiritus interim ægrius ducatur (haud raro tamen scemina prægnantes, & quibus catamenia sistuntur; ut & viri ab asthma te inveterato derepente liberati eodem timore tentantur) pedibus crurisque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis facta æger submergitur. Pro rata quæ partes a morbo obsessæ mole augentur, aliæ magis magisque gracilescent, urgentibus dyspnœa, urina paucitate, & siti intensa. Viros ingravescente ætate; sceminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primo ad aquarum evacuationem, deinde ad instaurandum sanguinis robur; quo novus aquarum proventus præcaveri possit.

℞. Vini albi ℥iv. Julap. subtiliss. pulv. ℥j. zinzib. pulv. ℔℞. Syr. de Spin. Cervin. unc. i. M. f. Potio, sumendaque singulis vel alternis diebus, pro ratione virium donec partes affectæ detumuerint, vel

℞. Tamarind. unc. ℞. fol. Senn. ℥ii. Rhei ℔℞. Coq. f. q. aq. ad unc. iii. in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. an. unc. i. Syr. de Spin. cervin. unc. ℞. Elect. e succ. Rosar. ℥iii. M. f. Potio, sumenda ut supra, vel

℞. Pil. ex duob. ℥i. Elater. gr. iii. Ol. Chym. Caryophyl. gutt. ii. f. Pil. N. iii. cap. summo mane, repetanturque, ut opus fuerit, vel

℞. Gambugii gr. xv. vin. alb. & aq. Cichor. an. unc. ℞. M. f. Potio sumenda ut supra, vel

℞. Cortic. interior. Samb. & lact. & aq. partibus equal. e ligno derafi M. iii. coq. in aq. mistorum ℔ii. ad ℔i. colaturæ capiat dimidiam partem mane, & alteram sero quotidie, donec convalescat. At hoc remedium, nisi in corporibus, quæ facillime purgativis cedunt, nihil confert.

Circa usum catharticonum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primo, utrum ægri corpus facile, an vero difficulter cathartici cedere soleat, cum iis qui facile purgantur Syr. de Spin. Cervin. solus ad unc. i. exhibitus, aquas sat copiose eliciat; in illis vero, qui difficulter purgantur, cathartica supra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundo, cathartica omnia, quæ segnius operantur, magis officiant quam profunt; quamobrem purgatio paulo fortior & nimia, iusto debiliori est præferenda.

Tertio, aquæ ea maxima celeritate exhauriri debent, quam ægri vires ferre queant: re nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuo affatim colligantur.

Est autem ubi medicamenta omnia, qualiscunque demum generis, quæ alvum movent, prorsus omitti possint ac debeant; quoties enim æger constitutione est infirmior, vel scemina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio diureticis solum committenda, inter quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus lixivialibus fiunt; ut,

℞. Cinerum Geniste ℔j. infundantur frigide in vini Renan. ℔iv. liquoris per filtrationem colati unc. iii. mane quinta pomeridiana & sero singulis diebus exhibeantur, usque dum humor evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis calefacientia & corroborantia medicamenta usurpanda; ut,

℞. Rad. Raphan. Rustican. fol. Coch. hortens. absinth. vulgar. Salv. summat. centaur. min. & Geniste; infundantur in cerevisia forti pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando sine cathartici subvenit, vel sequent. utatur.

℞. Conserv. Coch. hortens. absinth. Roman. an. unc. i. Extract. Gentian. Absint. vulgar. & Centaur. min. an. ℥iii. cum f. q. Syr. e cortic. citr. f. Electuarium, de quo sumat ad quantitatem nuc. moschat. maj. mane, quinta pomeridiana, & vespere, superbibend. unc. iv. sequentis.

℞. Rad. Gentian. unc. i. summat. Genist. Centaur. min. & Absinth. vulgar. an. M. j. Sem. fenicul. & Petroselin. an. ℥ii. incisis minutim affunde vini Rhenani ℔iv. stent simul in infusione frigida, & coletur solummodo tempore usus.

Notandum, cum ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo esse purgandum, tantisper dum sanguinis corroboratori navetur opera.

Quod & per se salium lixivialium usum omnino observandum; quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

℞. Rad. Raphan. Rustican. unc. iii. fol. Coch. Hortens. Absinth. vulg. salvia, summat. Centaur. & Geniste, an. M. iii. Aurant. incis. N. iii. Infundantur in Congiis vj. Cerevisiæ fortis non lapulata, inter fermentandum; sit pro potu ordinario.

De Gonorrhœa virulenta.

Corripiunt dolor genitalium insolitus, & rotatio testiculorum, in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat, statim a cujus exortu liquor, seminis instar, exstillat, qui quotidie a seminis colore & consistencia recedens flavescit tandem dilutius ovi vitello; in lue virulentiore virescit, & aqueo humori permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus fit, aphthis infantum simile, indies latius & profundius depascens, superveniente orificii callo. Verpi non glandis ulcere, sola Gonorrhœa tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipue urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis a fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis: sed mictu finito, per urethræ ductum acriter urens, maxime qua in glandem desinit. Caruncula lotii exitum quandoque impediunt, & scroti dolor ac inflammatio nonnunquam superveniunt.

℞. Mass. Pil. Coch. maj. ℥iii. Extract. Rud. ℥j. Resin. Jalap. & Diagryd. an. ℥℞. cum f. q. Opobalsam. f. Pilul. e singulis drachmis vi. Cap. iv. singulis auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis, admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subinde intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur Syr. e Spin. Cervin. & Elect. e Succ. Rosar. an. ℥ii. vel, curatione minus feliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viii. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral.

℞. Pil.

24. *Pil. ex duob. 3ss. Merc. dulc. ʒj. cum s. Opobalsam. f. Pil. iv. summo mane sumendæ.*

Si æger a dicta catharsi abhorreat, post pilulas primodescriptas, tribus auroris continuis sumptas, tum mane & hora quinta pomeridiana quotidie injiciatur clyster sequens, nisi quod semel aut bis in hebdomade, omisso clystere, cathartic. imperandum.

24. *Elect. e succ. Rosar. ʒvi. Terebint. Venet. Vitello ovi solut. 3ss. dissolvantur in Aq. hord. ʒvi. Colatur. adde Syrup. Violar. unc. ii. M. f. Clyster.*

Singulis noctibus cap. *Opobalsam. vel Balsam. e Mech. gutt. xxv. Sacch. frustulo exceptas.* Hujus defectu *Terebint. Cypr.* ad quantitatem avellanæ substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at cerevisia tenuis in pastibus.

Vel sequentem methodum aggrediatur.

24. *Pil. ex duobus 3ss. Opobalsam. gutt. iii. f. Pil. N. iii. cap. hora quarta matutina, superdormiendo, repetanturque alternis diebus, vel tertia quaque die. Diebus a purgatione vacuis injiciatur mane & hora quinta pomeridiana clyster supra descriptus.*

Procedente curatione (quacunque ea demum methodo tentetur) sanguis sub medium curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia, qualia sunt *hydrogala, Emulsiones ex seminib. frig. &c.*

Si penis tumore afficiatur.

24. *Rad. Altheæ, Lilior. an. unc. i. ʒ. fol. Malv. Ver. basc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmil. Melilot. an. M. i. sem. Lini, Fœnugrec. an. unc. ʒ. coq. s. q. Aq. font. & f. forus parti affectæ admovendus per horæ unius spatium bis, vel ter in die.*

Peracta fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. lin. rec. extract. dein *Emplast. e mucilaginis alutæ agninae inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si ulcus in præputii labiis, vel in subjecta glande hæreat, tum sequens linimentum præscribatur.

24. *Unguent. Basilic. ʒvi. Unguent. Nicotian. ʒii. præcipitat. Aq. Rosar. loti & optime levigat. 3ss. M. f. linimentum, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotus præscripti usum.*

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis e brachio extrahatur, atque bis in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotubus addendo *Sp. vin. Gallic. Coch. j. vel alterum, vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum* ejus loco applicandum.

Cathartics interim & refrigerantibus modo descriptis introlumpis utendum est.

De Lue venerea.

Ubi aut Gonorrhœa a mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores, & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipue invadentes in lecto calidos; crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescunt. Quo magis scabies diffunditur, tanto minus æger discruciat. In cranio, tibiis brachiisque exostoses, ossium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus, sed fauces ut plurimum primo aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilagine propagata, mox eam absumunt, ita ut fulcro desitutus natus plane concidat. Ulceribus, carie, & dolore in dies exacerbatis, pereunt per vices membra, lacerum donec cadaver, & jam superis grave humo condatur.

24. *Axung. Porc. unc. ii. Mercur. crud. unc. j. M. f. Linimentum, in tres æquales partes dividendum, quarum una brachia, crura & tibiae ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.*

Sin intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat, tum gr. viii. *Turbith. Mineral. in conserv. Rosar. rubr. exhibeantur, aut corporibus minus robustis Mercur. dulc. ʒj.* Sed si salivatio jam incœpta prius elanguescat, quam symptomata penitus disparuerint, excitulanda subinde est eadem dosi mercur. dulc.

Ptyalisinus ita moderari debet, ut lib. iv. nichemeri spatio expuat, aut circiter.

Si iusto altius exurgat ptyalisinus, cum inflammatione nimia, atque id genus symptomatibus ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis cathartics, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si diarrhœa supervenerit (quod plerunque accidit antequam salivatio bene assurgat) tunc sistenda est usu laudani liquid. ita dosin augendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, *Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto, vel seq. decoct. item colluatur.*

24. *Rad. Alb. Hord. mundat. an. unc. i. sem. Cydonior. unc. ʒ. coq. s. q. aq. ad lib. ii. M. f. Gargarisma, quo sæpius utatur.*

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in catharsi imperanda, nisi quod primis aliquot diebus liquore possertico, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisia tenui tepesacta nutriatur.

His omnibus rite peractis (etiãsi symptomata omnia evanuerint, ac subinde morbus penitus profigari videatur) quo minus recidivam postliminio patiatur, ægro seniel in septimana per 4. vel 6. vices, *Merc. dulc. ʒj.* exhibendus, utcunque bene se habeat, & etiãsi jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

Quod effluit, modo album, modo pallidum, flavum, viride aut subnigrum, modo acre & erodens, tetrum quandoque & graveolens, decoloratur facies, dolet spina dorsi, prosternitur appetentia, oculi pedesque intumescunt.

Mittatur sanguis e brachio ad unc. viii.

24. *Pil. Coch. mai. ʒij. Castor. gr. ij. Balsam. Peruv. gutt. iii. f. Pil. N. iv. cap. hora quarta matutina, superdormiendo; repetanturque per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum pro ratione virium.*

24. *Aq. Rut. unc. iv. Aq. Bryon. comp. unc. ii. Sacchar. Crystal. q. s. f. Julapium; cap. coch. iii. vel iv. in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium.*

24. *Theriac. Andromac. ʒi. ʒ. Conserv. flaved. Aurant. unc. i. Diascord. unc. ʒ. Zinzib. condit. & nuc. moschat. condit. an. ʒiii. Pulv. e Chel. cancr. comp. ʒi. ʒ. cort. exterior. granat. Rad. Angeli Hispan. corall. rubr. preparat. & trochisc. de terra Lemnia an. ʒi. Boli Armen. Sydenham Opera Medica.*

ʒij. *Gumm. Arabic. 3ss. cum s. q. Syrup. de Rosis siccis f. Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. molchat. maj. mane, hora quinta pomeridiana, & nocte per mensem integrum, superbibendo sequent. infusionis coch. vi.*

24. *Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic. Calami Aromat. an. 3ss. fol. Absynth. Roman. Marrub. alb. Centaur. min. Calament. vulg. sal. sic an. M. i. Bac. Junip. unc. i. incidantur minutim & infundantur in Vini Canarini ʒiv. stent simul in infusione frigida, coletur tantummodo tempore usus.*

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab usu olerum & fructuum qualiumcunque, & singulis pastibus bibat vinum hispanicum.

De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias crudi & inconcocti exitum sibi quærunt, unde sensim labefactantur vires, colliquescit corpus, & quasi substantia ejus per hanc cloacam exinanitur, cum siti, ardore viscerum, lumborum, coxarumque intumescencia, & salivæ spumosa exputione crebra.

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omittis solummodo venæ sectione & catharsi.

De Doloze Hemorrhoidum.

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur: Nonnunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescent, vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis e brachio dextero ad unc. x.

24. *Sem. Melon. Pepon. an. unc. ʒ. sem. papav. alb. ʒii. Amygdulc. excorticat. N. v. contundantur in mortario marmoreo, sensim affundend. Aq. Hord. ʒvi. ʒ. Aq. Rosar. ʒii. Sacchar. albiss. q. s. f. sa. emulsio; cap. unc. iii. sæpiuscule.*

24. *Flor. Sulphuris Pulv. Glycyrrhiz. Salviæ an. ʒi. cum. s. q. Balsam. Lucat. f. Pil. e sing. drachm. vi. cap. iii. ter in die, superbibendo emuls. præscript. coch. vi.*

24. *Aq. Spermat. Ranar. unc. iv. in qua dissolv. Lithargyr. ʒii. Opii. ʒi. f. mixtur. cujus tantillo linteam madefactum parti affectæ applicetur, vel si tumor intus lateat, coch. iii. ejusdem mixturæ modo clysteris injiciantur.*

Pro potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei, & a carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat diascordium.

De fluxu Hemorrhoidum immodico.

Innotescit ex viribus prostratis copia & diuturnitate sanguinis excreti, sædo corporis colore, ad citrinum (ut in ictero) vergente. succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omittis solummodo catharsi.

De Epilepsia Puerorum.

Vel primo mense aggreditur a frequentibus nimis alvi defectionibus; (quo in casu *Diascordium ad quantitatem grani piperis in Aq. Saxifrag. aut lacte materno solutum, & exhibitum, præstantissimum est remedium,*) vel circa dentitionis tempus, a septimo ad decimum mensem, tussi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhœa, viridia (ut solent hysterica) egerente infante. Quandoque improvise occupat paroxysmus, os oculosque distorquens, nigredine vultui perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnum contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbitarum immobilitate. Nunc ferius, nunc ocyus se proripiunt paroxysmi, certa subinde periodo, vago alias insultu revertentes; sed, appetente morte, a tergo se invicem premunt: Si quando inducias dent, in soporem proclives sunt infantes, donec a novo resuscitentur insultu.

Applicetur *Emplastr. Epispast. cervici* quamprimum.

24. *Aq. Epilept. Lang. ʒiii. Laudan. liquid. gut. i. vel ii. vel plures, pro ratione ætatis. Syr. Pæon. ʒi. M. f. Haustus, sumendus quamprimum.*

24. *Aq. Rutæ ʒiii. Aq. Epilept. Lang. & Aq. Bryon. comp. an. ʒi. Syr. Caryophyll. 3ss. M. f. Julap. cap. coch. i. singulis horis, si haustus præscriptus paroxysmum non fugaverit.*

De Rachitide.

In rachitidem adfunt partium laxitas & mollities, debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio, viz. caput iusto majus, facies plenior & floridior, partes carnosæ infra caput emaciantur, nodis protuberant articuli, maxime carpi, paulo minus tali, tument & extremitates costarum, ossa incurvantur, præcipue tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii; aliquando femoris & humeri, dentes tarde & moleste erumpunt, vacillant, uigrescunt, & frustulatim excidunt, pectus a lateribus angustum, antierius acuminatum, abdominis repletio, & hypochondriorum tensio, tussis & pulmonum vitia laceffunt, lateralis decubitus, modo dexteri, modo sinistri averfatio.

24. *Fol. Absynth. Vulgar. centaur. minor. Marrub. Alb. chamædryos, Scordii, calament. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper. Virg. aureæ, serpill. menth. sal. Ruta card. Benedict. Puleg. Abrotan. chamæmil. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & incis. an. M. i. axung. Porcin. ʒiv. sev. ovin. & Vin. claret. an. ʒii. macerentur in olla fictili super res calidos per horas xii. deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea coletur, ut f. Linimentum, quo venter & hypochondria illinantur mane & sero, ut etiam & artus hoc malo affecti, per 30. vel 40. dies, vel donec convaluerit.*

24. *Singulor. ingredient. præscript. an. Mij. infundantur frigide in cerevisiæ non lupulat. cong. iv. pro potu.*

In tumoribus infantum ventres occupantibus ab evacuationibus nimis procedentibus.

Sanguis & viscera herbis corroborantibus confortentur, ut in rachitide vera; nisi quod axillæ etiam utræque inungantur, at non artus.

De Febribus a Dentitione ortis.

Sp. C. C. gutt. ii. vel iii. vel iv. pro ratione ætatis in coch. j. vel altero Aq. Cerasor. nigr. vel julap. alterius appropriati, exhibeantur quarta quaque hora ad vices quatuor, vel sex.

De febre hectica infantum.

Sine insigni calore languent cum appetitus dejectione, artus & truncus corporis emaciantur.

Rhabarb. incisi ℥ii. in lagenam vitream cerevisie tenuis ℔ii. capacem immittantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, alia ℔ii. eidem *Rhabarb.* super affundantur ad tertiam vicem.

Si vero potus vi cathartica saturatius imprægnetur, tum ℔j. epota alteri cerevisia mox adjiciatur.

De Tussi puerorum convulsiva.

Phlebotomia, & repetita catharsi, eaque sola, expugnatur hæc tussis, malum alias pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica hic conveniunt, eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

De Hemorrhagia narium.

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis e brachio frequenter extrahatur; victus ratio refrigerans & incrassans injungatur, Julap. refrigerans & incrassans, cum emulsionibus refrigerantibus præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atque omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur, & semel vel bis *potio purgativa commun.* præscribatur.

Lintea quadruplicata immersa Aq. frigida, in qua *sal Prunell.* dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, & utrinque cervici sæpius in die.

Post evacuationes liquor seq. applicetur.

℥. *Vitriol. Hungaric. & Alumn. an.* ℥i. *Plegm. Vitriol. & Coq. randiu*, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigesactum filtra, & a *CrySTALLIS* subinde natis separa, liquori residua adde *Ol. Vitrioli* duas decimam partem, vel potius.

℥. *Aq. Plantag. & Bol. Armen. subtiliss. pulver.* ℥ss. probe misceantur; *Turunda ex linteo* vaso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat, indatur per dies duos istic relinquenda.

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. Aq. commun.* dissolvatur, qua *Turunda imbuta* nari indatur, liquore etiam hoc *linteamina imbuta*, & applicata sanguinem sistunt, si ex parte externa diffluat.

De Chlorosi.

Adfunt vultus & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica, & mensium suppressio.

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *Pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibend. haustum vini cujuslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum rad. angelic. ibidem descriptam. Si ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

De suppressione Mensium.

Cibum fastidiunt mulierculæ, fœdus faciei color est, gravitas totius corporis, dolores sincipitis, lumborum, crurum & imi ventris: pedum tumores infestant.

Eadem præscribenda ac in hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum seq. sunt præscribenda.

Singulis auroris, & quarta pomeridiana sumat *Julap. Hysteric. sine Castor. Cochl. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xii.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochisc. de Myrrh. & cum Syr. de Artemis. in formam boli*, vel *Pil. Redact.*

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hemoptoe.

In hæmoptoe dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad ℥x. Sequenti mane sumat *potionem purgativ. commun.* & eadem nocte *Paregoric. ex ℥iii. Aq. Cerasor. nigr. & Syr. de Mecon. ℥i.*

Postea aggrediatur usum sequent.

℥. *Bol. Armen. & Pulv. Radic. Symphyt. ℥ii. Terr. Sigillat. Lapid. hematit. & Sang. Dracon. an.* ℥j. *Sacchar. Albiss. ad pondus omnium*; M. f. *Pulvis subtilissimus*, cujus cap. ℥i. mane, quinta pomeridiana, & nocte, superbibendo sequent. *Apozemat. ℥iv.*

℥. *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, & millefol. an. M. i. coq. f. q. Aq. ad ℔ss. in colatura dissolv. Syr. de Symphyt. ℥ij. M. f. Apozema*; vel cap. cochl. vi. sequent. tincturæ.

℥. *Flor. Ros. rubr. ℥vi. Cort. intern. querc. unc. ℔. sem. Plantag. parum confus. ℥iii. Aq. font. ℔iii. Sp. Vitriol. q. f. ad levem aciditatem*, infundatur in vase clauso, calore leni, per 4. horas, Colatur. adde *Aq. cinnam. Hardeat. ℥iii. Sacchar. Albiss. q. f. ut f. Tinctura gustui grata.*

Si ab usu pulveris abhorreat, utatur electuario in fluxu mensium immodico præscripto.

Enema quotidie injiciatur, & diacodium hora somni propinetur. Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis, & semel iterum, si res postulet, repetatur *potio purgativa.*

Dietæ incrassans & refrigerans observanda.

De Punctura tendinis.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ juxta destillat.

℥. *Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. & confus. ℥iv. farin. sem. Lin. & avenac. an. ℥iii. coq. ad cataplasmat. consistentiam in eodem lacte*, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ mane & sero.

De Ambustis.

Foveatur pars affecta linteis *Sp. Vini imbutis*, usque dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur *linteum*, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

De Mania communi.

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia mania species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem a debilitate & vapiditye sanguinis, a diutina fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de ovo. Comittiss. Pulv. Gualt. Ravleigh.*, in *Aq. epidem. theriacal. vel alia*, & dieta instituantur analeptica.

In junioribus mittatur sanguis e brachio ad ℥viii. vel ix. bis vel ter, diebus tribus inter singulas venæ sectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis e venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti cathartico, quod sumat tertia vel quarta quaque die, donec convaluerit, hoc interim observando, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

℥. *Pharmac. domestic. (i. e. Rad. Bryon. alb.) pulv. ℥j. lactis vaccin. ℥iv. vel*

℥. *Ejusdem ℥ss. vel ℥vj. Vin. alb. ℥iv. infundantur per noctem, in colatura dissolve Syr. Violar. ℥i. M. f. Potio*, vel

℥. *Gambugii gr. xxv. Aq. Cerasor. nigr. ℥iii. Syr. Caryophyll. unc. ℔. f. Potio.*

De Contusionibus.

Mittatur sanguis e brachio lateris affecti ad unc. x. seq. exhibeatur *potio communis purgativa*, ac deinceps eodem modo venæ sectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

℥. *Decoct. Pectoral. ℔ss. Syr. Violar. cap. Ven. an. unc. ii. f. Apozema, cap. ℔ss. ter in die. Item Ol. Amygd. dulc. rec. Cochl. i. sæpius propinetur.*

℥. *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth. & Pomat. an. unc. i. M. f. Linimentum*, quo inungatur pars læsa mane & sero, superimponendo fol. Brassicæ.

De fursure, sive porrigne capitis.

Potio purgans communis bis propinetur, dein

℥. *Ol. Amygd. Amarar. & Laurini, Cinerum fol. Abrotani an. unc. i. misceantur probe, & f. Linimentum*, quo inungatur totum caput singulis matutinis, diligenter infundendo, & postea superimponendo vesicam suillam.

At primum abradatur totum capillitium, & postea defricentur squamulæ sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.

De morsu canis rabidi.

Post 40. dies aut plures malencholica adfunt symptomata, febris, sitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulsio.

℥. *Sp. vin. optime rectificat. unc. iv. Theriac. Andromac. unc. i. mixtura*, qua illiniatur pars læsa ter in die, superimponendo lintheum eadem mixtura imbutum.

De Ulcere Vesicæ.

Pus graveolens, aut sanguis, nonnunquam squamulæ seu pelliculæ membranæ ac veluti furfuraceæ crustulæ (sin in renibus hæreat ulcus, carunculæ minutulæ, aliquando crassiores) una cum urina excernuntur; perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ & doloris dantur intervalla, pus etiam excretum copiosius est, album, leve & minime fœtidum, lacti similis profunditur urina: & longe post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

℥. *Emplastr. Flos unguent. dict. ℥ss. f. Pil. N. ix. cap. iii. horis medicinalibus*, superbibendo sequentis aq. cochl. vi.

℥. *Rad. Fœnicul. Consol. Aristoloch. & Caryophyll. an. ℥iii. fol. Agrimoz. Hyper. Sanicul. Plantag. an. M. vi. incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an. ℔iv. & eliciantur solummodo ℔iv. pro usu.*

℥. *Pulv. rad. Consolid. maj. & gum. Arab. an. ℥i. Sacchar. Penid. ℥i. f. Pulv. cap. cochl. i. bis in die.*

De Asthmate inveterato in iis, qui sanguinea temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritus tractio ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda. Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, muscoli intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo. In priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia oppilantur. Et orthopnœam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, erecta cervice respirare possunt, muscoli etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis e brachio dextro ad ℥x. die sequenti sumat *potionem purgativam communem*, quæ repetatur tertia quaque die per duas alias vices.

Diebus a purgatione vacuis sumat sequentia.

Sem. Anis. subtiliss. pulv. ℥ii. cum f. q. Balsam. Lucatell. f. pil. ex singulis drachmis vi. cap. iii. mane & quinta pomeridiana, superbibendo *decocti Amari sine purgantibus* ℥iv. calide.

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

De Paralyfi.

Sensus & motus in partibus quæ afficiantur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguitur, aut vitatur.

Sumat *pil. Cochl. min. ℥ii. alternis matutinis per vi. vices*; deinde capiat ter in die per xxx. dies *Electuar. Antiscorbutic. ℥ii. superbibendo Aq. Antiscorbutic. Cochl. vi. Vide scorbut.*

℥. *Unguent. Nervin. ℥iii. Sp. Lavendul. comp. & Sp. Cochl. hortens. an. ℥ss. M. inungantur partes affectæ, ut spina dorsi, &c. mane & sero.*

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur; attamen cum humores crudos ac fixos volatilizare præ aliis apta nata sint, in paralyfi etiam conveniunt.

De Tussi & Phthisi.

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18. ad 35. Extenuatur totum corpus. Febris molestat hæctica, a cibo invalescens (quæ ex celeritate pulsus, rubedineque genarum dignoscitur) materia per tussim excreta est aut purulenta, in ignem congesta tetrum spirat odorem, & immixta in vas aqua repletum, fundum petit. Sudores nocturni superveniunt, livefcunt tandem genæ, facies pallor, exacuuntur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsecuturam denunciant.

Si tussis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si a pleuritide, aut peripneumonia, ob neglectam sufficientem phlebotomiam, male curatis, eadem nequaquam orta fuerit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis absteineat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt. x. Cochli. i. Sacchar. crystall. instillatum bis vel ter in die devoretur, ut etiam Tabellar. sequent. quas secum æger continuo portet, unam frequenter assumat.

24. Sacchar. cand. ʒiij. coq. f. q. Aq. font. usque dum adhærescat extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ. Enul. Camp. an. sent. Anis. & Angelic. an. ʒss. pulv. Irid. Florentina. Sulphur. an. ʒii. Ol. Chym. Anisi ʒii. f. s. a. Tabella domestica vocand. atque hoc interim eclegmate utatur.

24. Ol. Amygd. dulc. ʒii. Syr. cap. Ven. Violac. an. ʒi. Sacchar. cand. q. s. f. Loboch. de quo sæpius lambat bacillo Glycyrrhizæ, quando tussis urget.

In defluxione tenui *Eclegmata incrassantia* exhiberi poterunt.

Si vero tussis his remediis haud cessaret (præcipue autem si febtem comitem habeat, vel si a peripneumonia aut pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere, sed venæ sectione & catharsi debellanda est ut in methodo, quæ in curatione peripneumoniarum nothæ describitur.

Verum enimvero cum, his omnibus non obstantibus, tussis non modo non curationi cesserit, sed & diuturna pulmonum concussione eos adeo debilitaverit, ut phthisis tandem subingressa fuerit, tum hac methodo procedendum.

24. Balsam. Peruv. gutt. x. instillantur Cochli. j. Syr. Hederae terrestris, vel si id minus gratum fuerit ægro, Cochli. j. Sacchar. crystall. cap. ter in die superbibendo Decocti Amari sine purgantib. unc. iv. vel (si idem ventrem moverit) unc. iii.

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa sunt) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quam si puer aut juvenis esset, & sane haud multo certius cortex Peruv. febris intermittenti, quam in hac ætate equitatio phthisi medetur.

De Scorbuto.

Adsunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipue ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis e naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia, nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumque ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis e brachio ad unc. viii. nisi signa hydropis adfuerint. Seq. mane exhibeatur potio purgat. communis, quæ repetatur tertia quaque die per duas alias vices.

Diebus a purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia.

24. Conserv. Cochli. hortens. unc. ii. Conserv. Lujul. unc. j. pulv. Ari compof. ʒvj. cum f. q. Syr. Aurantior. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. maj. mane, quinta pomeridiana, & nocte, superbibendo Aq. Raphan. compof. Cochli. vj. vel sequentis.

24. Rad. Raphan. Rustican. raspat. ʒii. rad. Ari ʒi. fol. Cochli. hort. M. xii. fol. Mentb. Salv. Nasturt. Aquat. & Becabung. an. M. j. Sem. Cochli. hort. parum contus. lib. ʒ. nuc. Moschat. unc. ʒ. Vir. Alb. lib. xii. destillantur organis communib. & eliciantur solummodo lib. vj. pro usu.

Vel Folia Rec. Cochli. hortens. per se destillantur, pro usu dicto.

Porro sequens cerevisia sit pro potu ordinario.

24. Radic. Raphan. Rustican. recentis incisi ʒii. fol. Cochli. hort. N. xii. passular. enucleat. N. vj. Aurant. Cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream lib. ii. Cerevisie tenuis capacem subere mox probe obturandam immittantur.

In hunc modum parentur eodem tempore sex lagænæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps, vel

Vice hujus cerevisiæ seq. mixturæ cochli. iij. vel. iv. immisceri poterint singulis haustibus potus communis.

24. Rad. Raphan. rustic. & sem. Cochli. hortens. an. unc. ʒ. fol. Cochli. hortens. M. ii. pulpam unius Aurant. Contundantur simul in mortar. marm. sensim affundendo vin. alb. lib. ʒ. Coletur cum levi expressione, & reponatur pro usu.

Eadem remedia, phlebotomia & catharsi omitti, in rheumatismo scorbutico, sive hysterico, valde profunt.

Phthisis seu Tabis Descriptio & Cura.

Plures sunt tabis species. Prima fere oritur e frigore hyeme contracto. Paulo enim ante solstitium brumale quamplurimum ab ingruente tempestate frigida, tussi tentantur: Quæ cum illos invaserit, quibus pulmones ab ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut a repetitis tussendi conatibus magis adhuc debilitentur; atque ita tandem alimento sibi proprio assimilando, præ mala διατροφή, prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continua pulmonum agitatione & vehementi nisu afflatim per os rejicitur. Pulmones exinde pure referti purulenta μίσματα quaquaversum in carnes dispergunt. Hinc enascitur febris putrida, cuius paroxysmus sub vespere fatigat, sub auroram vero sudore copioso ac vires imminuente solvitur. Denique ad malorum cumulum

Sydenham Opera Medica.

diarrhœa succedit, partim ab humoribus putridis ex arteriis mesentericis in intestina depositis excretisque; partim a labefactato pefundatoque viscerum tono. Atque ita demum æger proxima æstate fato suo fungitur, a morbo cui prægressa hyems viam straverat, extinctus. Atque hæc est præcipua tabis species.

Porro cum sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, respiratioque a subita pororum contractione plus satis inhi-beatur, particulæ hæ in pulmones depluunt per interspersos venæ arteriosæ ramos, vel per ductus salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde jam humor per asperam arteriam delapsus in pulmones, catharri ritu, eos ita jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumque non jam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumque tueri valeant, glandulæ & tubercula adnasci solent; quæ in ægris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulenta sanie plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel evaluerit hic morbus & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunque potest medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusa in cubito vena, cathartici mitioribus, tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status accommodatis. Incrassantibus sc. ubi humor subtilior & tenuior vim expultricis facultatis videtur eludere: attenuantibus vero ubi pituita crassior æger & cum molestia per os rejicitur. Dein & hæctica febris remediis refrigerantibus contemperantibus coerenda. Talia sunt *Lac Asininum, Aqua Lactis Stillatitia, Emulsiones ex Amygd. dulc. Sem. Melon. Pepon. Papav. alb. Aq. Fl. Paralys. &c.* Denique & curando ulceri opera danda est, cui rei terebinthina illa liquida, opobalsamum vulgo dicta, apprime conferre censetur.

Hujusce morbi curatio, me iudice, hac methodo optime ac felicissime instituetur. Primum educatur e brachio sanguis, dein subducatur alvus ad tres dies continuos, vel *Pil. Coch. majoribus, vel Decoct. Leniente a nobis præscripto*. Tertia nocte exhibeatur *Syrup. de Mec. unc. ʒ.* Internitso biduo, triduo, pro re nata, repetatur purgatio, idque toties fiat, quoties opus esse videatur, donec symptomata vel prorsus evanuerint, vel saltem mitescant. Post singulas catharses jam finitas opobalsami gutt. xx, sacchari particulæ majori instillatas permixtasque nihil superbibendo. Vel pil. e terebinth. ex Insula Chio cum saccharo candido confectam. Opobalsamum non assumendum est, nisi prægressis evacuationibus debitis. Hujus loco *Electuarium e Balsamo Lucatelli, Glycyrrh. pulvere, semine Anisi & Terebinthina* concinnatum poterit substitui. Post evacuationes, sedulo conandum est ut tussis sedetur, ne pulmones jugi agitatione infirmiores evadant. Huc facit præ cæteris syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari. *24. Decoct. Pectoral. lib. i. Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. an. unc. ij. Cap. Cochli. v. ter in die.* Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in pulmones depluentem paulatim sistet; eosque in pristinam *ὑγίαν* reducet, nisi jam pridem a naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in iisdem aggestæ concoctionem.

At vero palmarium hujusce morbi præsidium est, ut æger quotidie equo vehatur. Et qui se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam diætæ legibus adstrictus, nullo cibi potusve genere privandus est: cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibusdam eorum qui ex hac methodo convalescere, tumor in collo exortus est non multum a scrophulis abludens.

Est & alia tabis species a tussi prognata, longe diverso anni tempore, initio scilicet æstatis. Hæc juvenes sæpe illos invadit qui debiliore sunt corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acerbisque refertus est, sanguinem isti e pulmonibus per tussim exantlant, nimio meri potu prius excalescenti. Ægri dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus persentiscunt: quæ symptomata nisi mature remediis appropriatis eliminentur, primo scabrities, mox & ulcus accedit, unde pus confectum demum expulrit.

Dicta jam tabis species venæ sectione & catharsi alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur: si diætæ insuper refrigerante & incrassante utatur æger & a carnibus in solidum absteineat.

Tertia hujus morbi species ortum debet materiæ febrili in pulmones febre jam fatiscente, amandatæ, qui sensim infirmiores redditi a symptomatibus jam memoratis vexantur.

Quandoque oritur a sanie ista purulenta, quæ a pleuriticis non satis copiose per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem quam empyema, curationem postulat.

Sunt etiam qui a nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in quartam tabis speciem præcipitantur. Hos calor hæcticus a cibo potuque sumpto, sub noctem laceffit: atque hoc præ cæteris apthæ infestant.

Phthisis, seu tabis descriptionem ac curam integram, Præclarissimus Author morte præoccupatus, absolvere nequivit, & pauca tantum, sed pro more suo, quam maxime accurata, in hoc argumento nobis reliquit: quibus in aliquale supplementum, adjicere non inconsultum credidimus Præclarissimi Caroli Leigh M. D. Phthisiologiam Lancastriensem, jam anno 1694. Londini editam. Opusculum sane eximium, & Methodo Sydenhamianæ omnino affini conscriptum. Sit itaque

D E

P H T H I S E O S

Speciebus & Causis.

C A P U T I.

Quo agitur de variis Phthiseos Speciebus. & earum Causis.

Phthises in hac patria praxi vulgariter occurrentes ad sequentes reduci possunt, videlicet, sunt vel scorbuticæ, strumolæ, chylosæ, vel febres epidemicas intermittentes, hydropem, rachitidem, crâpulas, chlorosin, fluorem album, icterum, rheumatismum scorbuticum, sarcocelen & vermes sæpius consequuntur: nec non hæmoptysin & vomitum sanguinis; cum phthises autem scorbuticæ præ cæteris faciunt eas choream ducere statimino.

Phthiſes ſcorbuticæ ſunt vel ab aere, vel a parentibus, vel ab erroribus ſex non naturalibus. De iis autem quæ ab aere ſunt, quæta locis plerique morbi ſtationarii appellari debent, in primis agam. Iſtis terrarum areis quæ paluſtoſis arenis ſaliſis luxuriant, vel aere fumo carbonaceo craſſeſcente tantum non epidemice graſſantur: quæ phænomena innuere videntur ex particulis vitriolaceis & ſulphureoſaliniſis hunc morbum fomitem ſuum trahere; quo autem hæc res clariuſ eluceſcat haud inconſultum duco tentamina quædam præmittere, quæ auſpiciis hiſce faciem ulteriorem accendant.

In primis. In ſalivam inſtillantur guttæ aliquot ſpiritus vitrioli, & ſtatim in coagulum album viſcoſum tranſit, quale per tuſſim in phthiſi ſæpius eructatur.

Secundo. Guttis aliquot fontis vitriolacei, juxta Haigh agro Lancaſtrenſi cum ſaliva commiſtis, in coagulum viſcoſum tranſit cinei coloris, quale in phthiſi ſcorbutica haud ſemel notavi.

Tertio. Deſtillantur carbones ſoſſiles & aſcendet liquor vitriolaceus, quo cum ſero ſanguinis commiſto, in coagulum viſcoſum tranſit, quale in phthiſi ſcorbutica obſervare in proclivi eſt.

Hiſ poſitis, videlicet quod per particulas vitriolaceas ſaliva, vel ſerum ſanguinis fit coagulum viſcoſum, ei tabidorum guſtu, conſiſtentia & colore ſimile.

Secundo. Quod in reſolutione carbonum particulæ vitriolacæ cætervatim ſublimant, quod encherieſi pyrotechnica patet, adeoque illis atmophæra propemodum ſaturatur, cum in aere hujusmodi phthiſis ſit morbus ſtationarius, haud abs re fore judicare exiſtimo, ibi terrarum per inſpirationem particulæ vitriolacæ maſſæ ſanguineæ communicantur, adeoque ſæpe ſæpius phthiſin inducunt.

Summa jam difficulas diluenda hæc eſt, nempe unde fit quod circa littora ſaliſa paluſtoſa hoc morbo tantopere inſeſtantur indigenæ, etiamſi ſolo ceſpite utuntur, cibique ſale & fumo conditis per totum vitæ decurſum abhorrent? & quomodo iſtis terrarum aeris particulis ſalinis atmophæra conſtipatur? cum ſalia marina (ſicut ab eorum evaporatione conſtat) ſint fixioris naturæ, quam ut radiis ſolaribus vel vi ventorum aſcenderent.

Anxiæ diu circa hæc cogitanti, hæc tandem conjectura in mentem mihi venit.

Obſervatu ſatis eſt obvium plagas iſtas maritimas, tam ſulphure quam ſale luxuriare; hæc hypotheſis ſequentibus argumentis nititur.

In primis. Noctiluæ infinitæ horis vespertinis hiſce quaſi toti Phosphori erumpentes, ſulphuris præſentiam arguunt.

Secundo. Sæpius odores foetidos emittunt, quales ex ſulphure & ſale unitis percipiuntur; in hiſ itaque terris ſalinis paluſtoſis, particulæ ſulphureæ fugam continuo moliuntur, particulis autem ſalinis divortium haud ferentibus, particulæ ſulphureæ ſalia muriatica ſecum gerunt, adeoque illis atmophæra conſtipatur; cum in aere itaque hujusmodi phthiſis ſit morbus ſtationarius, ibi ex particulis ſulphureoſaliniſis trahit phthiſis illius pabulum, ſicut opinari ſas eſt.

In ulteriore hujusce ſententiæ confirmationem argumentum e contrario produci poteſt. Ubi hi limi ſalini deſant, hic morbus raro aut nunquam inſeſtat. Hinc ergo fit quod in *Ruſſiæ*, & *novæ Angliæ* quibuſdam partibus per totum anni decurſum tuſſis ſonitus haud auditur, etiamſi mare ſit in præcinctu; & hinc quoque forſan fit quod celeberrimus iſte *Monſpelienſium* aer anti-phthiſicus evadit, etiamſi parum e mari *Mediterraneo* diſtat.

Dum e contra haud in ſeſe volvitur annus, quin phthiſis, hydrops, ſcorbutus, febres intermittentes, & pene dixiſſem morborum myriades in hiſce terrarum areis truculenter graſſantur; adeoque quod de terris hiſce ſaliſis paluſtoſis tale propemodum dici poteſt, quale *Pythagoras*, de herba *Apraxi* de qua ſic talia dicit: Datur herba, radix cujus *Napthæ* adinſtar ignem concipit; quique morbo quocumque correpti ſunt, hac germinante, recidivam patiuntur, quoties illius effluvia per aerem diſfunduntur.

De reliquis phthiſeos ſcorbuticæ ſpeciebus diſſerere jam reſtat, de iis ſcilicet quæ ab erroribus ſex non naturalibus, & illis quæ a parentibus derivantur. Jam vero cum phthiſes ab erroribus diæta & victu per cauſas allatas facile explicari poſſint, earum ætiologiis enodandis diutius immorari impræſentiarum inutile eſſet; quapropter de phthiſi ſcorbutica hæreditaria breviter jam attingam.

Inter omnes ſane philoſophantes foetum humanum in ovo formari ultra aleam dubitandi ponitur; de modo autem ova fœcundandi haud tam bene inter ſe convenit Auſtoribus.

Ova duplici inveſtiuntur membrana, propriisſque tunicis involuta ſunt, adeo quod ne gutta quidem liquoris iis exprimi poteſt; hinc pro Gas quodam virili, ſive aura ſeminali ovis fœcundandis quidam viriliter contendunt; in præxi tamen nihil vulgariuſ occurrit, quam hunc morbum intueri patris genium conſequentem, etiamſi per totum vitæ decurſum matre ſat athletice degente, quidam circa eandem ætatem cum patribus hoc morbo correpti ſunt, alii citius, alii ſerius, alii valetudinarii tantum vivere, alii ſat pancratice priuſquam phthiſi conſecti ſunt, pro diverſa ſcilicet craſi ſeminis virilis, ſcilicet ſicut ſpiritus eo nidulantes, magis vel minus ſunt depreſſi, & particulæ ſalinæ eveſtæ, primis vitæ incunabulis varia format ſtamina vitæ; adeoque citius vel ſerius infans vergit verſus temperiem ſalinam huic morbo inducendo aptam. Ex præmiſſis ut mihi videtur, inferre ut liceat, ab utero ſemen virile per vaſorum extremitates abſorbetur, hinc maſſæ ſanguineæ communicatur, & circuitu ſanguinis, ſicut opinari ſas eſt, ova fœcundat, arduum etenim mihi concipere videtur, quomodo hic morbus, podagra, & calculus patris genium conſequerentur, ſi ab aura ſeminali tantum ova fœcundentur: ex præmiſſis patet ex quali proſapia huic morbo ſit origo, capite itaque ſequenti venit ſymptomatum explicatio.

C A P U T II.

Hoc Capite agitur de Symptomatum Serie & eorum Cauſis in ſtatu incipiente.

Quandoquidem morborum ſcientia haud melius quam ab eorum productis expromitur, mihi hunc morbum deſcripturo, haud alia videtur inſiſtere methode, quam ſymptomatum ſyndrome delineanda. Miſſo itaque olympico pulvere cerebri circa ſtultia dimicantis, ea ſolummodo quæ ratio experientia ſuffulta diſtictat brevibus aperiam.

Invadit frequenter cum appetitus & virium dejectione, anguſtia peſtoris tuſſi titillante, ſputo copioſo, craſſo, albo, quandoque flavoſcente, pellucido, & cæruleo, cinereo, foetido, ſaſo, acido, ſubdulci, pro ſanguinis dyſcraſia ſcilicet, & obſtructionum mole & genio.

Sudoribus quandoque nocturnis, carnis intabefcentia, calore & frigore levi & incerto alternatim ſuccedentibus.

Urina lixiviali, ſedimento copioſo, albo, ſæpius autem flavo, vel ruſo ſaturata.

Aliquando diarrhœa, torminibus ventris, & partium extremarum tumore.

Hiſce prælibatis ſymptomatum explicationem aggredi jam incumbit.

Si de appetitu proſtrato interrogamur, ideo evenire dicimus: glandulæ in ventriculi parte inferiore ſitæ, quæ humores ſubacidos, fluxiles ex arteriis ſeparare debent, humores viſcoſos enutrient, adeoque fibris nerveis titillandis (quo motu conſiſtit appetitus) inepti ſunt, hic cibi ſit ſaſtidium; & hinc eſt, ni fallor, quod in quibuſdam ab emetico aſſumpto, tam immenſam ſaburram viſcoſi phlegmatis per vomitum frequenter ejeſtam inſpexi.

Per ſuccum viſcoſum in pulmonibus extravasatum aetis inſpiratione interrumpitur, adeoque anguſtia peſtoris frequenter corripitur æger; quo pariter circa glandulas tracheales depoſito, & intra pulmones ſputum iſtud, ni fallor, eſſormat quod tanta copia per tuſſim eructatur, ab hoc quoque tracheam oblinente raucedo procedit.

Hiſce coagulis, folliculis in glandulis conglobatis gravidis, adeoque foraminulis lymphæ ductuum obturatis, latex ſeroſus, qui per lymphaticam peregrinare debuit, propriis emunctoriis orbatus, maſſæ ſanguineæ regurgitat, & ſic per vaſa inſolita eliminatur; hinc ergo ex glandulis trachealibus, imbris pene dixiſſem continuis deſluit, qui tuſſim titillantem & continuam inducit.

A pari ratione ſudores tantopere proſuſi, diarrhœa, tormina ventris, & partium extremarum tumores huc collimant.

Quandoque viſcoſis humoribus meſenterii glandulis inſectis, chylo tranſitus denegatur in ſanguinem, quo pabulo diurno orbatus, nutrimento debito privatur corpus, hinc vires deſiciuntur, emaciat corpus, & quandoque ſæces albefeſcunt, quapropter a viſcoſis hiſce ſuburris venæ lacteæ meſenterio diſparent, ſicut in cœlis *Galaxia* propter denſas nubes interponentes.

Aliæ chyli portiones per particulas ſalinas præcipitantur, & inde quandoque ſputo albo, craſſo, ſubdulci, per tuſſim eructantur. Aliquando per renes ablegantur, & inde in hoc morbo frequenter urinæ ſedimento candido copioſo ſaturantur.

Propter muſculos ſubſidentes humeros alatos obſervatu in proclivi eſt, quod (ſicuti plebeijs placet) malum portendit, quaſi anima relictura corpus illius fugam appropinquantem indicaret. Hi *Hippocrati* aliisque græcis *πρεπωδεις* appellantur.

Propter glandulas in hepate obſtructas bili tranſcolanti imponitur remora, quæ ſanguini itaque regurgitat, ex ea cum acidis in ſanguine efferveſcente lenta febris frequenter in tabidis gliſcit, & ni fallor ratio urinæ lixivialis tanta flavoſcente hypotaſi, & quandoque ruſa ſaturatæ; hinc quoque petenda eſt.

Quandoque calore & frigore alternatim ſuccedentibus cruciatur æger; propter chyli aceſcentis fermentationem, & inæqualem cum ſanguine miſturam.

Sputum frequenter in hoc morbo ſit craſſum, album & dulce, quod (ſicut priuſ innuimus) chylum præcipitatum ponimus; aliquando ſit tenue & pellucidum cum craſſo commixtum, quod ponimus eſſe lympham quæ per lymphæ ductus tranſire debuit, propter glandulas autem conglobatas obſtructas, per alia ſecretoria eliminatur, & in hoc quidem caſu, quique humori huic ſiſtendo medicamentis opiaris pertinaciter inſiſtit, a verò deviat, & præſtat eis motus componere fluctus.

Sputum aliquando ſit cæruleum, ſaſum, acidum, & amarum, ſicut bilis, & ſalia diverſa proſapiæ varie cum eo miſcentur.

Reſtat aliud ſymptoma, nec minus reliquis infrequens explicandum, viz. unde eſt, quod in hoc morbo urina tam intenſe lixivialis excernitur, ſedimentum copioſum ruſum deponens, ſuavem emittens odorem parum ei diſſimilem in urinis obvium poſt medicamentata terebinthinata, & quædam præparata ſulphuris aſſumpta, ſuperficiem gerens pellicula tenui oleoſa obducta? In hoc caſu ponimus urinam particulis vitriolaceis vel muriaticis eſſe ſummopere ſaturatam; particulæ ſalinæ poſt ortam cum bile efferveſcentiam præcipitant, adeoque urinæ tantam hypotaſim deponunt: particulæ bilioſæ ab efferveſcentia cum particulis ſalinis (ſicut ſulphur ab incendio adjuncto) ruſefeſcunt, & inde urinæ ſedimentum lateritium deponunt. Particulæ ſalinæ oleoſas quaſdam particulas in fermento incarcerant, quæ tumulum una cum illis per renes ablegantur, hinc urina aeri expoſita, particulisſque fermentefcentibus ſaturatis, particulæ ſulphureæ oleoſæ divortium conantur, adeoque in ſuperficie pelliculam eſſormant, & odorem ſuavem emittunt; hypotheſi huic ſuffragatur phænomenon in ſpiritu nitri dulci ſatis obvium, ibi etenim ab acido cum ſulphure unito, odor ejuſmodi proſapiæ obſervari poteſt.

Utrum in hoc ſtatu tuberculis ſemper infarciuntur pulmones a clariffimo *Mortono* notatis; Hac patria a cultro anatomico tanquam a peſte abhorrente, nec nego, nec affirmarem; hoc tamen (præxi ſuffragante) aſſerentem, in hoc morbo plures ſatis ſuccumbere vidi, ne uno quidem ſymptomate febris inflammatoriæ apparentes, cui ſententiæ adſtipulatur *Hiſtoria* e doctore *Bennet* deſumpta Theatro tabidor. pag. 96.

Cum apud *Briſtollenſes* medicinam facerem, qua urbe penſili tabes frequenter graſſatur, nonnullos ſputum ſubdulce levi conatu expectorantes, ſpatio trimeſtri fatiſcentes, & totaliter enervatos vidi, horum vero quodaſ, non omnes tuſſis vehementior, aliquoties corripuit, & aſcendentes ſtrigoſi periere, in quorum unica derectionis cauſa, licet ſanguinem (peractæ ſalino pyaliſmo) extuſſerat, & pulmo ubique inteneratus tonum amiſerat, univerſa ſpirabilia nec non viſcera omnia naturalia, quoad ſenſum ſana comperta ſunt. Haud hic intelligi velim quod in phthiſi pulmones hiſce tuberculis nunquam infarciuntur, eos etenim ſæpius ulceratos vidi: at hoc ſolummodo aſſero ea phthiſi quæ tam vulgariter in agro *Lancaſtrenſi* graſſatur, qua in dies deſtoreſcunt ægri ſputum craſſum album expuentes, in hiſ dico, hujusce morbi principio & incremento, raro aut nun-

nunquam pulmones confodiuntur, imo aliquando, ægri e medio tolluntur, & (ſicut opinari fas eſt) iis haud ulceratis, quibuſdam etenim per totum morbi decurſum febris hæticæ ſymptoma haud apparuit unum.

C A P U T III.

In hoc Capite Symptomata in ſtatu confirmato recenſentur, & eorum Cauſæ assignantur.

Fatiſcente in dies natura in proſapiam propemodum vitriolaceam degenerat maſſa ſanguinis, hinc ſputum frequenter aluminis vel vitrioli mali ſit ſaporis, jam particulis ſalinis ſui juris factis, effuſis velut habenis hic morbus affligit; hinc febris ſit continua & auctior, ex particulis ſcilicet vitriolaceis cum ſulphure ſanguinis efferveſcentibus, ſicut ex oleis vitrioli & terebinthinæ permixtis obſervare fas eſt.

Ex hac efferveſcentia vaſis capillaribus circa genas diſtensis, inde eſt quod rubor fixus genas utraſque occupat, mortis adſtantis frequenter indicium; quaſi vitalis flamma ellychnii ad inſtar (cujus pabulum propemodum exauſtum eſt) receptaculo gliſceret, vel ſolis ad inſtar rubro colore hemiſpherium ſpargentis priuſquam Cimerias deſcendit in umbras.

Conglobatis glandulis indies magis inſarctis, & majori copia nutritio ſucco quotidie præcipitato, hinc eſt quod ſputum ſit copioſius & craſſius, & ex fermento vitriolaceo cum ſulphure ſanguinis permixto, aliquando ſaporis putridorum piſcium.

Ex ſputo copioſius in dies intra pulmones extravafato, aſthmate frequenter corripitur æger. Et continua propemodum gravitate peſtoris opprimitur. Sputum aliquando egregie foetidum hoc ſtatu quoque notavi, quod tamen haud ſemper ab ulcere pulmonum ſicut quibuſdam placet ortum ſibi ducit; ſæpius etenim hoc notavi, & patientes tam diarrhœa quam ſudoribus immunes, quod procul dubio haud evenire poſſet ulcere foetido pulmonibus conſoſis, potius itaque foetoris iſtius cauſa in hoc conſiſtere videtur, particulis ſulphureis volatilibus particulis ſalinis aculeatis, hiſque latice ſeroſo luxuriante, cum ſaliva miſcentur, jam particulis ſulphuris ad evolandum ſatis aptis ſecum ſalinas vehunt, quas unitas effluviis ſaliva emitit, huic ſenſorium olfactuſtenellum vellicant, iſſque itaque ingratuſ foetorem conciliant; ſicut e contrario particulæ ſulphureæ globosæ ſine ſalinarum mixtura, fibras olfactorias percutientes gratum odorem cauſant; ſicut in aromatibus & baſamicis ſorum effluviis obſervare in proclivi eſt. Grandiori mole indies nutritio ſucco expectorato, hinc vultus evadit Hippocraticus, & corporis univerſi maraſmus.

Indies conglobatis glandulis inſarctioribus, & verſus temperiem ſalinam vergente ſanguine hinc ſudoribus profuſis & diarrhœis immanibus cruciantur ægri, nec non doloribus acutis, iis rheumatismo verſatilibus quibuſdam atrocioribus, offibus etenim in iſſis de dolore lancinante quidam conqueſti ſunt, iique quibus morbum venereum ſuſpicari neſas.

Hiſ ſymptoma aliud haud minus commune, & ſumma quidem indagine dignum addi poteſt, ſtrigoſi plures etiam ad orci fauces propemodum ſunt redacti, appetitu laudabili ditantur, poſt cibum aſſumptum hætico nullo calore ſuccedente, neque ſudores, nec diarrhœæ, ne ventriculi inflammationes adſunt; tamen indies intabeſcit æger prægrandi copia ſputum craſſum album expuens. Auguriis noſtris ex præmiſſis ſat ſuperque propalatis particulis vitriolaceis frequenter luxuriare ſanguinem, circa hoc ſymptoma hæc conjectare liceat. Vitriolaceis particulis aculeatum naturale fermentum, iſtū altiori fibras nerveas titillat, quæ qua ab æſtro percitæ, ſpiritus fibræ ventriculi indigeni in motus concitatiores adiguntur; & inde eſt, ni fallor, quod appetitus ſit voracior, eſculenta quævis aſſumpta ſtruthionis ad inſtar colliquans; hoc colliquamentum per lacteas ductumque chyliſerum propagatum cum ſanguine miſcetur, quod in propriam naturam haud aſſimilat, & inde in univerſi corporis nutrimentum, quin ſalinæ particulæ ſanguine nidulantes, in humoribus craſſis hoc præcipitant; & inde eſt quod alimenta aſſumpta, etiam in ſanguinis naturam haud convertuntur, tamen nec per ſudores, nec diarrhœas eliminantur, quin intra pulmones coagulo albo viſcoſo ſubſidunt, & inde eſt quod indies intabeſcit æger.

Reſtat adhuc aliud ſymptoma, quod ſub hoc larvatur vultu: plures hoc morbo propemodum conſectos febris intermittens anomala frequenter invadit, quosdam ſemel tantum, alios bis vel ter ſpatio viginti quatuor horarum conquaſſat, ingruit ſæpe cum horrore & pruritu inter ſcapulas, circa regionem lumbarem, totum poſtea convellitur corpus per horam unam vel alteram tremulum permanens, calor poſtea ſuccedit, & huic ſudores & aliquando diarrhœæ: ex lentoribus falſis circa membranas nerveas, nervorum extremitates, plexus, & glandulas ſubcutaneas miliares extravafatis, hæc frigoris & caloris reciprocationes procedere videntur, hiſ ad plenitudinem aggeſtis, & acorem inſignem naſtis, partes nerveas vellicant, adeoque, ni fallor, dolores hoſce frigoriſcos inducunt, lentoribus hiſce per vaſorum extremitates tandem abſorptis, adeoque cum ſanguine permixtis, ex iis cum particulis ſulphureis ſanguinis nova repulſulat fermentatio, calor itaque febrilis ſuccedit, tandem autem materia morbiſica ſubacta aliquando per diarrhœam amandatur. Alii in ſtatu euſarco, etiamſi animi indole dulciſſima præditi, hoc morbo tandem conſecti, ex levi qualibet occaſione iracundi anſam capiunt: iraque tam continua ebulliunt, vix vocem vel viſum aliquis tranquille ferunt: ex ſuccis hiſce aceſcentibus ſpiritibus animalibus continuo tanquam ab æſtro percitis, ſicut opinari fas eſt.

Hiſce præmiſſis, de reliquis phthiſeos ſcorbuticæ ſpeciebus breviter diſſerere adhuc reſtat: at cum eæ (ſcilicet utrum ſint hæreditariæ, vel ab erroribus in diætâ & victu) maxima ex parte eadem vel ſimilia ſymptomata præbent: verosimile mihi videtur eas a tali proſapia oriri; quapropter earum ætiologiis explicandis diutius immorari impræſentiarum inutile eſſet; nobis itaque ſufficiet in caſu quolibet hiſtoriam unam vel aliam ſubnectere, & medendi methodum recenſere.

C A P U T IV.

Hoc Capite Canones quidam generales circa hunc morbum proponuntur.

In hoc capite ſymptomata in ſtatu deplorato recenſeri debent; at cum nullus ſit propemodum e plebe, quin in hoc ſtatu ægro

ex hoc vitæ curriculo manuſiſſionem pronunciet, diutius hiſce immorari extra propoſitum eſſet; nobis itaque ſufficiet canones quosdam generales circa hunc morbum proponere, exque iis medendi methodum efformare.

Canon primus:

In ſtatu ſimplici incipiente facile curatur phthiſis.

In ſtatu complicato incipiente, viſceribus & lymphaticis ſalvis, bonum ſit expectandum.

In ſtatu confirmato, difficulter, tamen quandoque curatur.

In ſtatu confirmato complicato, alea res eſt dubio plena.

In ſtatu confirmato complicato, viſceribus vel lymphaticis inſanis, nil niſi malum ſit pronunciandum.

In ſtatu confirmato phthiſes hæreditariæ inducias frequenter patiuntur, raro autem vel nunquam curantur.

In ſtatu confirmato, modo febris adſit, lacticia ſunt vitanda, in hoc quoque caſu chalibeatis abſtinendum eſt.

Urgente dyſpnœa, etiamſi catarrho titillante inſeſtetur trachœa, ex opiatis tanquam a peſte fugiendum eſt.

C A P U T V.

Hoc Capite medendi methodus in ſtatu incipiente proponitur.

Intentiones in hoc ſtadio variis indicationibus reſpondentes ad ſequentes reduci poſſunt.

In primis, per emetica vel linea cathartica, primæ viæ ex faburra viſcoſa ſunt detergendæ.

Secundo, In adultis phlebotomiam ſemper proficuam inveni.

Tertio, Pulmones ab humoribus craſſis ſunt liberandi.

Quarto, Glandulæ inſarctæ ſunt aperiendæ.

Quinto, Temperies ſalina ſanguinis ſit alteranda.

Sexto, Lymphæ ſuccedentis in pulmones deſluxus ſit præcavendus.

Medicamenta intentioni primæ reſpondentia, hæc vel ſimilia eſſe poſſunt, quibus forma liquida arridet ſequentia præſcribi poſſunt.

Si emetico opus eſt.

2℥. Mell. Sillitici. ʒii. ad ʒiv. aq. Cardui, hyſſop. ad un. ii. ſyr. ſcabioſ. compoſ. ʒ℞. M. S. F. Emeticum.

Si per catharſin alvus ſit ſubducenda, ſequentia in uſum veniunt.

2℥. Decoſti Sennæ Gereonis ʒiv. ſyr. de ſpina cervina unc. i℞. crem. tartari ʒ℞. aq. lumbricor. ʒii. M. S. F. P. cum regimine ſumend. Vel

2℥. Decoſti Sennæ Gereonis unc. iii. Mannæ Calabrinæ unc. i. tincturæ ſacrae unc. i. crem. tartari ʒ℞. aq. lumbricor. ſolutione gummi Ammoniaci ſaturat. ʒj. M. F. P.

Cum regimine ſumend. huic ſyrup. Roſar. ſolutiv. addi poteſt, pro re nata.

Quibus forma pilularis arridet, hæc vel ſimilia eſſe poſſunt.

2℥. Pil. Stomach. cum gummi. ʒj. de ammoniaco Magiſtral. ʒ℞. tartari vitriolati gr. vi. veſin. jalap. gr. vi. Baſam. Peruv. q. ſ. F. Pil. N. 7. cum regimine ſumend. Vel

2℥. Pil. aleophangin. tartarear. Quercetan. ad gr. 10. ad ammon. ʒ℞. tartari vitriolati gr. vi. veſin. jalap. a gr. 6. ad 10. Baſam. Peruv. q. ſ. F. Pil. Nu. 7. cum regimine ſumend. hiſ Calomelas a gr. 14. ad ʒj. addi poteſt pro re nata.

Quibus ſit in animo bolus talis eſſe poteſt.

2℥. Eleſt. lenitivi ʒvi. crem. tartari ʒi. ſyr. roſ. q. ſ. f. bolus cum regimine ſumend.

Pro puerulis doſes & formæ variari poſſunt, ſcilicet, pulveres de Rhubarbar. ſena, Calomelan. reſina lapæ, & id genus aliis; nec non Elixiria, & tincturæ, inter quæ tinctura ſacra & Elixir Salutis veteris palmam præripiunt.

Quibuſdam cereviſia medicata præ cæteris alluſceſcit, & in eo caſu talis eſſe poteſt.

2℥. Folior. ſennæ, Rhubar. polypodii quercini aa. unc. ii. epithymi unc. i℞. pini, tameriſci aggreſſit. aa. Mii. folior. becabung. Miii. hedere terreſtris Mv. ſalviæ aggreſſis Miii. radic. ʒ. aperientium aa. unc. ii. lapath. acut. unc. vi. baccar. juniperi unc. i. cortic. aurantior. Nu. vi. F. ſacc. pro tribus cong. cereviſiæ; doſ. ʒi. aurora qualibet, vel alterna ſicut vires ferent. Phthiſin incipientem tempore vernali hæc ſola cereviſia haud ſemel curavi. Intentioni tertiæ, quartæ, &c. medicamenta ſequentia reſpondent.

2℥. Conſerv. Cynosbat. unc. iv. corall. rubri ʒiii. ſyrup. baſamic. q. ſ. F. Elec. horis medicis ſumend. Vel

2℥. Conſerv. Cynosbat. ſorum cichorei aa. unc. i℞. extract. trifolii fibrini unc. ℞. animæ martis ab inſigni Vigani pp. unc. i. gummi ammoniaci in aq. lumbricor. ſolut. unc. i. ſorum Bezoïn. ʒi. cum ſ. q. ſyrup. baſamic. Tolutan. F. Elec. eodem modo ſumend. Vel

2℥. Conſ. Cynosbat. loboch. de pulmon. vulp. aa. ʒi℞. enulæ Campan. condit. ʒ℞. ariſtolochie rotundæ ʒii℞. glycyrrhizæ ʒii. hedere terreſtris præparatæ ʒiii. ſorum ſulphuris ʒ℞. ſyr. de Eryſimo q. ſ. F. Elec. Vel 2℥. Conſerv. Cynosbat. ʒiv. martis cum ſulphure pp. ʒiii. ſal ſpirituos. ʒj. cum ſ. q. ſyrup. e cortic. citri. F. Elec.

Eleſtuariis præſcriptis, ſicut dyſpnœa magis vel minus urgebit; ſpecies diaireos, ſolutio gummi. ammoniaci in aq. lumbricor. fact. flores Bezoïn. extract. enulæ, radix ariſtolochie rotundæ, addi poſſunt, vel omitti, ſicut medico videbitur idoneum.

2℥. Syrup. Baſamic. Tolutan. e ſucc. hed. terreſtris, capillor. veneris aa. ʒiii. f. ſyrup.

2℥. Aq. lactis alexiteriæ ʒvi. limac. magiſtral. ʒii. gentianæ compoſ. ʒiii. lumbric. ʒi. ſacchar. perlat. q. ſ. F. julapium.

ʒ Ingredientium q. ſ. ab ʒii. decoſti peſtoralis: adde radic. ſarſeparil. ʒi℞. chinæ, ſœnic. bardan. urtic. caryophyllat. aa. ʒvi. ariſtolochie rotund. ʒ℞. ſem. aniſi, coriandri, urtic. aa. ʒii. paſſular. exacinat. ʒi. baccar. juniperi ʒi. c. c. raſur. eboris aa. ʒv. folior. hyperici, capillor. veneris, hedere terreſtris, marrubii albi aa. Mi. coq. in aq. fontan. ſ. q. ad ʒiv. colature adde vini albi ʒiv. mell. deſpumat. ſacchar. cand. albi. aa. ʒii. M. F. Apozema uſus eximii in aſthmate & gravitate peſtoris.

2℥. Aq. limac. magiſtral. lumbricor. aa. ʒiv. ſyrup. baſamic. Tolutan. de Praſſio, Allio vel Eriſymo aa. ʒi. ſpir. ſal. armoniaci e grumm. ammon. diſtillat. ʒii. M. F. mixtura, vel

2℥. Aq. lactis alexiteriæ ʒvi. gentian. compoſ. ʒiv. limac. magiſtral. ʒi℞. ſacchar. q. ſ. F. julapium.

2℥. Pulveris milleped. pp. ʒiii. radic. ariſtolochie, gummi. am-

ammoniaci in aq. lumbricor. ſolut. aa. Ziſſ. ſorum Benzoin. Ziſſ. extract. enulæ. croci an. Zi. Baſam. Peruv. Zi. ſulphuris aniſat. q. ſ. F. pil. mediocres in dyſpnœa uſus egregii, vel

24. Florum Sulphuris, gum. ammoniaci aa. Zii. enulæ campan. ariſtolochie rotund. glycyrrhiz. Ireos Florentin. aa. Zi. ſem. aniſi Zii. picis liquida Barbadeos partes iv. Baſam. Peruv. partem i. M. F. Maſſa pilularis, vel

24. Baſam. Tolu. Ziſſ. milleped. pp. Zii. gum. ammoniaci depurat. Ziſſ. ſorum Benzoin. Zi. Myrrhæ Zi. Baſam. ſulphuris aniſat. gut. 12. ſucci glycyrrhiz in tinctura a croci ſolut. q. ſ. M. F. maſſa dos. Ziſſ. vel Zii.

24. Pulveris milleped. Ziii. animæ martis Zi. gum. ammon. in aq. lumbricor. ſolut. Zi. extract. trifolii fibrin. q. ſ. F. pil. mediocres.

24. Cinnabar. antimonii Doctoris Needham egregii ſit uſus.

24. Pini ſummitat. Miii. folior. beccabung. Miii. ſalviæ agreſtis Mii. capill. veneris, hedere terreſtris. aa. Mii. radic. lapath. acut. Zvi. baccar. juniperi Zi. cortic. aurantior. N. 6. F. ſacc. pro tribus cong. cereviſiæ.

24. Pini, tamarifci ſummitat. aa. Mii. folior. Beccabung. Miii. hedere terreſtris, capillor. veneris aa. Mvi. ſalviæ agreſtis Miii. radic. ofmund. Begal. Zvi. enulæ campan. Zii. lapath. acut. Zvi. ſ. aperientium aa. Zii. ſarſapar. Zvii. baccar. juniperi Zi. ſem. aniſi Ziſſ. cortic. aurantior. N. vii. F. ſacc. pro tribus cong. cereviſiæ, de qua c. ad Bii. in die cum ſyrup. & pil. prius præſcriptis. His debite adhibitis medicamentis ulteriores vix opus eſt; quo autem intentio ultima omni ex parte perfici poteſt, externa etiam in uſu veniunt v. capitis ruſura, fontanelle, veſicatoria ſatis ampla, quæ revera tuſſim Phthiſicam tutius & magis radicitus tollunt, quam medicamenta quævis opiata forma quacumque ſumpta, ingenue etenim fateor ex opiatis copioſius ſumptis, nil niſi inducias incertas mihi adhuc obſervare contigit.

C A P U T VI.

Quo agitur de methodo in ſtatu confirmato.

Intentiones in ſtatu ſecundo a prioribus tantum minutiis diſtant, niſi quod in hoc ſtadio catharſes mitiores eſſe debent, phlebotomia ſi omnino, manu tantum parciore ſit celebranda; jam calor febrilis qui vehementius exaſtuat præ ſingulis ſit temperandus: ad calorem febrilem temperandum varia ex variis authoribus præſcribuntur, pulveres ſcilicet teſtacei, antieſtici, conſervæ, antidoti, analeptici, julapia refrigerantia, emulſiones, & id genus alia, at ingenue fateor in hoc ſtatu, hac vel tali methodo haud phthiſin ſemel radicitus ſanata vidi; miſſis itaque ambagibus, ad cortic. Peruvianum (modo adſit pulmonum ulcus) ſemel in die tantum exhibitum tanquam ad aſylum fugiendum eſt, hoc tantum obſervando, quod tunc temporis pectoralibus fortioribus inſiſtendum eſt, & die quolibet tertio, vel alterno per catharſin levem alvus ſit ſubducendus; hac methodo appetitum prius totaliter proſtratum ſtatim reſtitutum vidi, & calorem febrilem totaliter debellatum. Et cum ita ſe res habet ad coronidem methodo inceptæ imponendam, ad pectoralia detergentia, aperientia, & antiſcorbutica mitiora confugio, in hoc itaque ſtatu methodus ſequens vel ſimilis obſervari poteſt.

In primis ſi vires ferent, emeticam lenē exhiberi jubeo: v. gr.

24. Mell. ſcillitic. Ziiij. aq. cardui, hyſſop. aa. Zij. ſyrup. ſcabios, compoſ. Ziſſ. M. F. Emeticum. Ab hoc aſſumpto ſapius ingentem maſſam viſcoſi phlegmatis per vomitum ejectionem inveni.

Aurora ſequenti leve catharticum exhibendum curo, ſcilicet cum quodam ex iis cap. priori præſcripto: at ſi diarrhœa adſit, quæ ſæpius in hoc morbo occurrit, inſuſionem ſequentem exhibendam ſuadeo.

24. Aq. lactis alexiteriæ Bi. gemianæ compoſ. Ziv. limac. magiſtral Ziſſ. lumbricor. Ziſſ. ſal. tartari Zij. aq. menthæ fortioris Zi. Rhabar. optimi inciſi Ziſſ. F. ſ. q. inſuſum de quo c. 6. Cochlearia Mane, Aurora qualibet tertia vel alterna.

Ad calorem temperandum.

24. Conf. Cynosbat. Ziv. Cortic. optimi Peruv. pulveriſat. Zi. cum ſ. q. ſyrup. baſam. Tolutan. F. Elec.

Methodus pro pectoralibus & antiſcorbuticis ex c. priori deſumi poteſt, pro re nata utenda; dietam ex cibis eneptis inſtituo, juſculis ſcilicet, carnibus ovinis, vitulinis, pullis, ovis ſorbilibus, & id genus aliis, religioſe obſervando a lacticiis abſtinere; modo febris adſit, liquores pectoralibus & antiſcorbuticis medicatos inſtituo. Hac methodo quamplures ultra ſuas & omnium amicorum ſpes perfectæ ſanitati reſtitui.

C A P U T VII.

Quo agitur de Phthiſi in ſtatu deplorato.

In hoc ſtadio remedia tantum palliativa exhiberi poſſunt, & vulgariter quicquid exoptat æger concedo. Utcunque ut ægri & amicorum votis importunis modo quocumque ſatiſficerem, remedium aliquod ſymptomati maxime urgenti reſpondens præſcribo. Univerſo ſcilicet marcere jam corpus colliquatur, & frequenter ſummopere gutturis dolore lancinante laborat æger, tali ſcilicet, quod vix aut ne vix deglutire poteſt, hinc lac aſinum ſi haberi poteſt, ejus autem defectu vaccinum, per ſe, vel decoctis pectoralibus baſam. exhibendum curo, hauſtu autem quolibet guttis aliquot olei tartari per deliquium, vel pulvere quodam teſtaceo commiſto, quantum ſcio remediis ulteriores haud opus eſt, quapropter his coronidem imponam.

H I S T O R I Æ

In ſtatu Primo.

Obſervatio I.

Carolus Fleetwood, Generoſus & magno ingenii acumine, oppido de Kirkham Chirurgiæ ſactitans in carnis intabefcentiam incidit, tuſſi laborabat gravi, & nycthemeri ſpatio ſaburram ingentem albi viſcoſi phlegmatis expuebat, appetitus proſtratus erat,

quandoque cochlearia aliquot ſanguinis expuebat, flatibus intumuit ventriculus, laſſitudine ſpontanea & debilitate corpus univerſum macerabat. Me tandem in ſubſidium vocato, lenitivam potionem præſcripſi, & ſemel repetendam inſtitui, poſtea ſyrup. martis Willſianum cereviſia pectoralis bis in die ſumendum ſuaſi, & hora ſomni guttas aliquot baſm. Peruv. cum ſyrupo baſamico Tolutano, brevi tempore ceſſavit tuſſis, ipſe vires recuperavit; & jam pancratice valet.

Obſervatio II.

Gilbertus Oufy de Chorley Cauſidicus, poſt febrem tertianam catarrho continuo correptus erat; ſputum craſſum album expuebat; pulſus erat debilis & celer, calor & frigus ſæpius in die alternatim ſuccedebant, vultus erat pallidus, muſculi totius corporis flaccidi, appetitus totaliter proſtratus, vires deſectæ, & ſudoribus nocturnis propemodum colliquatus. Electuarium cum cortic. Peruv. hora quarta pomeridiana ſumendum ſuaſi, aurora & hora ſomni, pil. pectorales, ſyrupos, baſam. deterſivos, & julapia pectoralia præſcripſi, die quolibet tertio, 6. cochlearia inſuſi de rhabarbaro in aqua lactis alexiteria fact. ſumenda imperabam, poſtea pil. pectorales & ſyrupos cereviſia pectorali ſumendos inſtitui; hac methodo ſanitatem priſtinam recuperavit, & jam firma valetudine fruitur.

Obſervatio III.

Jacobus Sherdley Baccalaureus in Artibus, & celeberrimo viro Domino Price de Blakburn Curatus, incidit in tuſſim gravem, anguſtia magna laborabat pectoris, ſputum craſſum copioſum expuebat cum ſanguine commixtum, vultus & oculi flaveſcebant, urina parca & lixivialis erat cum ſedimento rubro, appetitus proſtratus erat, & magna quidem debilitate laborabat. Electuarium cum cortic. Peruviano præſcripſi, poſtea pil. pectorales, ſyrupos baſam. & apozema deterſivum horis medicis ſumenda ſuaſi. Et poſtea pil. pectorales cereviſia pectorali aperitiva ſemel ſeptimana: nec non inſuſum de rhabarbaro, vel dos. pil. ſtomach. cum gum. & de ammoniaco magiſtrali, ſumenda ſuaſi hora ſomni; his aſſumptis evanuit morbus, & firma valetudine magna cum laude muniis jam ſolitibus obitur. Eadem, vel methodo ſimili Evan Mandsley de Penwortham ſanitati reſtitui.

Obſervatio IV.

Dominus Blackburſt de Preſton, tempore vernali Anno 91. modo ſequenti hoc morbo laborabat, anguſtia tanta pectoris conſtrictus erat, ut lineis tantum quibuſdam deſcribendis creber recurreret kalitus, ab imo anhelans pectore; tuſſi continua titillante tempore decubitus inſomnis jacuit, expuit ſputum tenue, pellucidum, horis autem matutinis craſſum, & quandoque æruſinum ſubſlavum, vultus pallescebat, intumere pedes, appetitus proſternitur, & vires in dies labefactabant. Eruptio miliaris cutem univerſam conſpurcavit, urina erat exigua & lixivialis, & ſæpius in die de calore & frigore conqueſtus eſt. In ſubſidium accerſitus, ſtatim phlebotomiam celebrandam inſtitui, & fontanellam in brachio ſecandam, leves catharſes repetendas præſcripſi, electuario poſtea ſequenti uſus eſt, doſi qualibet ſuperbibendo hauſtum decocti amari alterantis.

24. Pulveris Ari compoſ. Ziſſ. martis pp. Zi. ſal. ſpirituoli Zi. conſerv. cichorei, beccabung. recenter fact. aa. Zii. cum ſ. q. ſyrup. Chalib. F. Electuarium.

Hoc repetendum imperavi, & bis in die cum cereviſia pectorali ſumendum brevi vires recuperavit, & ab hoc morbo perfecte convaleuit. Anno ſequenti Dominæ perilluſtri connubio conjunctus erat, & ſex circiter menſibus elapſis recidivam paſſus eſt. Rurſus ad me miſit, tunc temporis autem tertiana epidemica me ſuſpirante, Dominus Parſons in auxilium vocatus erat, cum qua methodo tractavit, nescio, in dies autem in peſſum abiit, & hyeme ſequenti ad me rediit, at quantum mutatus ab illo! maraſmo univerſali jam conſectus erat, vultus erat Hippocraticus, febris continua, rubor fixus genas utraſque occupavit, dolore lancinante guttur quotidie teſtrebatur. Cortic. Peruv. alcalicis, baſam. antiſcorbuticis, remediisque aliis appropriatis incaſſum tentatis auſpicante vere, fatiſ ſuccubuit.

H I S T O R I Æ

In ſtatu Secundo.

Obſervatio V.

Dominus Wood de Kirkham B. A. cum per totam hyemem gravi laboraſſet tuſſi, initio veris me in auxilium vocavit; ſtrigoſum perfecte inveni, & quidem ad extremum marcorem reductus, nycthemeri ſpatio libram unam vel alteram ſputi viſcoſi cærulei eructabat, glutine propemodum tenacioris; de dolore laterali quotidie conqueſtus eſt, & magna conſtrictione, & quaſi mole pectoris, & debilitate tanta, quod vires vix ei ſufficerent ab alia thorri parte ad alteram ſibi movendo, urina lixivialis fuit, ſitis autem parva, vel nulla, nec quantum memini, de calore quodam inſigni conqueſtus eſt: in primis bolum purgantem ex electuario lenitivo præſcripſi, poſtea decoctum ex radicibus ſ. aperientibus & ſalvia agreſti vice potus communis inſtitui, deinde per menſis ſpatium pro potu communi decoctum amarum alterans & traumaticum ſolummodo conceſſi, hora ſomni linctu ſequenti uſus eſt.

24. Syr. capillor. veneris, e ſucco hedere terreſtris, baſam. Tolutan. aa. Zi. ſpecier. diaireos Ziiij. gum. ammoniaci in aqua lumbricor. ſolut. Zi. ſorum Sulphuris Ziſſ. cum ſ. q. ſyrup. de ſ. radicibus F. linctus, c. cochlear unum hora ſomni cum gut. 4. Baſam. Peruv. initio Aprilis, ſumpſit de cereviſia pectorali aperitiva bis in die, & perfecte convaleuit, quod adſtantes omnes tunc temporis pro miro habuerunt. Anno 89.

Obſervatio VI.

Johannes Veale Armiger per totam hyemem gravi catarrho correptus fuit, Anno 90. initio veris ad me accedit, tunc temporis vultus erat pallidus & perfecte Hippocraticus, tuſſis continua & ſicca, horis autem matutinis ſputum craſſum ſanguinolentum expuebat; tanta

raucedine correptus erat, vix ut ullus vocem illius caperet; appetitus proſtratus erat, ſudoribus nocturnis propemodum colliquatus; de anguſtia & pondere peſtoris conqueſtus eſt, & continuis intellinorum torminibus; urina lixivialis erat, & ſcabies ſicca manus præcipue ſudavit.

In primis decoctum lenitivum cum tinctura ſacra præſcripſi, poſtea uſum pilular. peſtoralium, ſyruporum & decocti peſtoralis, per 14. dierum ſpatium inſtitui, & deinde pilulas peſtorales & ſyrupos, cum cereviſia peſtorali per menſis ſpatium; ab his ſanitati reſtitutus fuit, & jam pancratice vivit.

Obſervatio VII.

Rogerus Threlſal tunc temporis in vico de Croſmore habitans, Anno 91. ad me miſit; vultus erat pallidus & macilentus, nec non tabe univerſali macerabat corpus; ſudoribus continuis, & febre lenta laborabat, nec non tuſſi continua, expuit & ſputum craſſum fœtidumque, quandoque ſanguinolentum; in primis bolum purgantem ex electuario lenitivo præſcripſi, & deinde uſum cereviſiæ peſtoralis aperitivæ per menſis ſpatium inſtitui, nocte qualibet hora ſomni cepit gut. aliquot baſam. Peruv. in ſyrup. Baſamico Tolutan. & perfecte convaluit.

Obſervatio VIII.

Filia natu maxima Gulielmi Tounning de VVeeton, Anno 91. tempore vernali ad me acceſſit; vultus erat pallidus, oculi conca- vi, nares acutæ, humeri elati, & inſigni quidem extabefcentia totius corporis laboravit, febris erat continua, ſitis intolerabilis, tuſſis continua, aſpera arteria perpetuo titillans, parum vel nihil expuens niſi horis matutinis, & tunc ſputum craſſum eructavit, appetitus proſtratus erat, & urina ſedimento copioſo albo ſaturata; ei inſuſum de rhabar. in aqua lactis alexiteria præſcripſi, nec non pil. peſtorales, electuarius cum cortice Peruviano, ſyrupos peſtorales, & ab his ſanitati reſtituta fuit.

Obſervatio IX.

Guilielmus Farington de Ormskirk, pharmacopola, & in arte quidem iſta huiusce Patriæ decus, pleuritide correptus erat, cui gravis ſucceſſit catarrhus, nycthemeri ſpatio libram unam vel alteram ſputi pellucidi ſaporis vitrioli martis per tuſſim eructavit; de gravitate & mole peſtoris continuo conqueſtus eſt, indies extabuit corpus, & appetitus proſtratus erat, nec non calculi ſæpius cruciante paroxyſmo laboravit; in conſilio conjunctus cum Medico fideli & prudenti Doctore Grundy, phlebotomiam repetendam imperavimus, & catharſes lenes repetendas pro re nata, & uſum pil. peſtoral. apozematis, & mixturæ peſtoralis inſtituimus, ab his valetudinem recuperavit, & per totam æſtatem magna cum laude artem ſuam exercuit; tempore hyemali recidivam paſſus eſt, rurfus in ſubſidium vocatus, methodum ſimilem præſcripſi, & julapia peſtoralia ſucco millepedum imprægnata, his autem haud cedente morbo ſurſum chalybeatum temperatum inſtitui; & quia de mole ventriculi conqueſtus eſt, emeticum ex melle ſcillitico propinandum ſuaſi, a quo copioſe evomuit, & faburram ingentem viſcoſi phlegmatis ejecit, hinc dolor & moles ventriculi evanuit, & tuſſis parvas inducias dedit, brevi autem tempore redeunte calculi paroxyſmo repullulavit morbus; hinc ſuaſi ut morbi ſyndromen delinearem, eamque celeberrimo Gibbonſio communicarem; his tranſactis vir celeberrimus aquas Spadanenſes propinandas ſuaſit, & curſum temperatum chalybeatum: nec non Bochetum ex ſarſaparilla, pulveres quoque cinnabaris antimonii, pil. de ſtryace, liquores ex cereviſia Brunſvicenſi cum antiſcorbuticis deſtillatos inſtituit, his horis medicis deglutitis, ſpes nova ſalutis aſſulſit, redeunte autem calculi paroxyſmo rurfus morbus revireſcebat; hinc æſtate elapſa Thermaſ Bateoreenſes adiit, rediit autem cum arundine alteri hærenti, expuit jam copioſius & craſſius & ſaporis ingrati, hæctico calore & febre inflammatoria immunis ſatis ſuccubuit.

Obſervatio X.

Anno 91. Guilielmus Tate de Blackburn ſicca laborabat tuſſi, qua nihil emolitus eſt, niſi horis matutinis, urina erat exigua & coloris cereviſiæ Brunſvicenſis, lingua ſicca & nigreſcens, ſitis continua, extenuatio univerſalis corporis, partes extremæ ad molem inſignem tumere, aſthmate frequenter correptus erat, & pulmones tanta mole oppreſſi vix palmæ ad inſtar depreſſæ reſurgebant, in peſtore ſibilus perpetuus aures percutit, cui talis raucedo ſuccedit, ut vix ſermo perceptibilis, tandem Medico iſto expertiſſimo Doctore Grundy mecum in conſilio conjuncto methodum ſequentem inſtituimus. In primis per leves catharſes alvum eſſe ſubducendam, deinde fontanellam in brachio celebrandam, & ſequentia præparata.

24. Pulveris millepedum pp. ʒiij. ſpecier. diareas ʒiij. gumm. ammon. in aq. lumbricor. ſolut. ʒi. ſorum Benzoin ʒʒ. conſerv. cynosbat. ʒiv. cum ſ. q. ſyrup. Baſamic. F. Elect. bis in die cum ſyr. & cereviſia peſtorali aperitiva ſumendum: his adhibitis modicum ſalutis ſtatum recuperavit, & adhuc muniis ſolitatis obitur.

Obſervatio XI.

Georgius Longworth de Ecleſton, Anno 90. me in ſubſidium vocavit, vultus erat viride-nigreſcens, appetitus proſtratus, tuſſis continua & ſicca niſi horis matutinis, quo tempore phlegma lividum viſcoſum emolitus eſt; his ſucceſſit extenuatio corporis, partes extremæ tumere, torminibus intellinorum inducias vix ferentibus cruciatus eſt, urina coloris fuit nigreſcentis, & hic revera ab omnibus adſtantibus conclamatus; morbum phthiſin ſcorbuticam judicavi, & methodum ſequentem inſtitui, leves catharſes imperavi, deinde electuaria chalybeata horis medicis cum cereviſia peſtorali aperitiva ſumenda, & perfecte convaluit.

D E

P H T H I S I

In Particulari.

C A P U T I.

De Phthiſi ab Hæmoptyſi.

Obſervatio I.

Vir inſigniſſimus Petrus Bold de Bold, Armiger, a celeberrimo nec minus antiquo Stemmate oriundus, & animi nobilitate inter eos illius ætatis facile primus, Anno 92. ætatis 35. in gravem hæmoptyſin incidit; mecum inſigni Doctore Grundy in auxilium vocato, phlebotomiam repetendam inculcavimus, nec non hauſtus ſuccorum hederæ terreſtris, plantaginis, becabungæ, & aliorum ejuſmodi proſapiæ julapis refrigerantibus ſumendos inſtituimus: ab his ſedato fermento ſanguinis, ad vaſa diſrupta conſolidanda, vel ſaltem hiantia conſtringenda, baſamica reſtringentia præſcripſerimus, ex Baſamo ſcilicet Tolutano, gumm. Arabic. & id genus aliis, poſtea ad præcavendam putredinem a ſanguine pulmonibus extravafato, decocta peſtoralia baſamica deterſiva, nec non linctus, pilulas peſtorales, & medicamenta talis proſapiæ formis diverſis inſtituimus; his debito adhibitis ceſſavit hæmoptyſis, & tuſſis, & revera ſanitati reſtitutus erat, ad recidivam autem præcavendam ingurgitationem acidularum & curſum chalybeatum temperatum inſtituimus, & evacuationes per Epicriſin diebus intermediis intercalandas. At prob dolor! vir celeberrimus indole animi dulciſſima præditus, ut teſſeram hoſpitalem haud confringeret, liquores ſpirituſoſos nimis copioſe ingurgitavit, & brevi poſtea catarrho correptus fuit, tuſſis fuit ſicca & clangora; horis autem matutinis phlegma viſcoſum ſubſlavum ex grandulis per excreationes, & pulmonibus per tuſſim eructavit, indies emaciavit, appetitus deſectus erat, urina magna ex parte ſuppreſſa, & ſibilus continuus in peſtore aures percutit; hinc peſtoralia baſamica deterſiva, liquores antiſcorbuticos, mixturas ſucco & inſuſione millepedum imprægnatas inſtituimus, his autem haud ceſſit morbus; verſus autem hæcticum calorem indies vergebat, ad hunc ſupprimendum corticem Peruvianum medicamentum Herculeum judicavimus, illius autem uſu tunc temporis hac in regione vix lanuginem adepto, inculcavimus morbi ſyndromen delineandam, & quibuſdam Collegii Regalis Londinenſium communicandam, hinc viri celeberrimi Doctores Rateliff, & Gibbons in ſubſidium vocati ſunt, & doctiſſimus Dr. Gibbons methodum ex cortice Peruviano, & lacte aſinino inſtituit; his debito adhibitis morbus inducias paſſus eſt, brevi autem repullulavit virus, hinc ſputum craſſius & copioſius, febris adauctior, diarrhœa immanior, dolor terebrans fauces continuo inſeſtavit, tumere pedes, rubor fixus genas utraſque occupavit, quo tempore omnibus ſibi cognitis lacrymas vi nulla coercentas effundentibus, quaſi in tot Niobes converſis; fato irrefiſtibili e medio tollitur.

Obſervatio II.

Dominus Flether de Cartmell Mercator, vir ingenio peracri, & totus negotiis deditus, Anno 89. in gravem hæmoptyſin incidit, nycthemeri ſpatio librarum aliquot purpureæ maſſæ diſpendium paſſus eſt, nec loqui potuit quin ore pleno ſanguinem eructavit. In auxilium vocatus, ſtatim phlebotomiam celebrandam inſtitui, ſanguis & educus fuit tantopere ſpumoſus, haud adhuc ſimilem vidi. Ingurgitationem julapiorum refrigerantium, & ſuccorum inſtitui; ſedato fermento ſanguinis, decocta peſtoralia pro potu communi inſtitui, & ad catarrhum ſiſtendum pilulas ſequentes.

24. Succo hederæ terreſtris per inſolationem depurat. ʒij. ſorum ſarſaræ ſiccæ. ſummitat. hyſſop. ſalviæ, pulgii aa. Mj. ſem. aniſi, carui, ſæmculi dulc. contuſ. aa. ʒʒ. deſtillentur in B. M. ad medietatem, deinde F. colatura; quæ deſtilletur ad conſiſtentiam pilular. addendo ſucci glycyrrhiz. ʒʒ. pulv. radic. enulæ campan. ſor. ſulph. aa. ʒiij. ſor. Benzoin. ʒi. Baſam. Peruv. ʒʒ. tinctura ſulph. ʒiij. Ladan. Pariſat. ʒij. M. F. maſſa formetur in pilulas exiguas, & ſumat iij. hora ſomni; & primo mane cereviſiam pariter peſtoralem antiſcorbuticam præſcripſi, cui ſolia lingue cervinæ addenda curavi; hac methodo perfecte convaluit per aliquot annos, & per plures annos pro potu communi lac cum aqua commixtum ſolummodo ſumpſit: tribus annis elapſis recidivam paſſus eſt. Rurfus in auxilium vocatus Phlebotomia celebrata ſequentia præſcripſi.

24. Conſervæ Roſar. rubrar. cynosbat. aa. ʒiij. pulv. ſantal. omnium aa. ʒʒ. coral. rubri pp. ʒi. croci martis rubicundiſſimi ʒii. ſal. prunel. ʒiv. cum ſ. q. ſyrup. e coral. F. Elec. hora ſomni & primo mane ſumend. ad quantitatem nucis myſtic. ſuperbibendo hauſtum julapii ſequentis.

24. Aq. lactis peſtoralis Batean. ʒi. portulac. ſpermatis ranar. aa. ʒiv. ſyrup. e ſucc. hederæ terreſtris ʒii. ſal. prunel. ʒi. M. F. julapium; pro potu communi decocta peſtoralia inſtitui, & hora ſomni gut. aliquot Baſam. Peruv. e cochlear. ſyrup. Baſamic. Tolutan. quoties recidivam paſſus eſt hac methodo uſus eſt, & nullo negotio ſanitatem recuperavit. Anno elapſo repullulavit virus, quo tempore me in agrum Eboracenſem acceſſito, vir præclarus ad medicamenta veterina quaſi valentiſſima auxilia conſugit; tunc temporis autem phlebotomia manu liberali celebrata fermentum ſanguinis haud ſedari potuit, hinc cortic. Peruvianum doſi prælargæ exhibendum curavi; hoc debito adhibito morbus inducias paſſus eſt, & de magna conſtrictione peſtoris jam conqueſtus eſt, & ſputum craſſum copioſum eructavit; hinc pil. peſtorales deterſivas, julapia peſtoralia & ſyrupos præſcripſi, & leves catharſes repetendas inſtitui; vires autem & carnes in dies labefactabant, tandem Kenſigron adiit, quo loco poſt lunarum aliquot circuitus ſatis ſuccubuit.

Obſervatio III.

Ricardus Tinkler de Poulton hoſpes, cum diu gravi hæmoptyſi laboraſſet, gravi catarrho magnopere emaciatus erat, appetitus proſtratus, & revera una voce pronunciarunt omnes ei nulla veſtigia retrorſum. In auxilium vocatus, phlebotomiam repetendam inculcavi,

vi, die ſequenti levem potionem exhibendam curavi, & poſtea remedia ſequentia.

24. *Conſerv. Cynosbat.* ℥iv. *ſal. martis, Baſam. Peruv. aa.* ℥i. *ſpecier. diatrion. ſantal. aa.* ℥iſſ. *cum ſ. q. ſyrup. Baſamic. Tolutan. F. Elec. ex hoc ſumpſit bis in die cum ſyrupis & decoctis pectoralibus, poſtea per 14. dierum ſpatium acidulas Larbricenſes copioſe ingurgitavit, perfecte convaluit, & jam pancreaticæ valet. Methodo ſimili Henric. Stirup. Servus Udwardi Hyde Apmigeri, poſt diſpendium librarum aliquot Sanguinis ad integram ſanitatē rediit.*

Domina perilluſtris Domin. Marsdea de Frekleton ex menſium ſuppreſſione toties hæmoptyes paſſa eſt, poſt potiones lenitivas purgantes per eleſtuaria chalybeata, & infuſiones amaras chalybeatas nullo negotio ad ſanitatē rediit.

P H T H I S I S

Ex Vomitu Sanguinis.

Obſervatio I.

Inſignis Domina Domin. Farington de Schavv. Halle, conſors Georgii Farington armigeri, Anno gr. æſtivo tempore per vomitum tantum ſanguinis diſpendium paſſa eſt, vix fuit inter vivos habenda, algore univerſali correpta fuit, ſudoribus algidis, pulſus & reſpiratio vix perceptibiles, vox deficit, & ab omnibus conclamata fuit. In ſubſidium vocatus, ſequentia præſcripſi.

24. *Cortic. Peruv. ℥i. corall. rubri, hæmatic. croc. martis reſtringent. aa. ℥i. conſet. Hyacinth. ℥ij. conſerv. cynosbat. ℥iv. cum ſ. q. ſyrup. Baſamic. Tolutan. F. Eleſtuarium horis medicis Julapio ſequenti ſumend.*

24. *Aq. ſpermatis ranar. Cinnamom. bordeat. tenuioris aa. ℥iij. boli armen. ℥i. ſyrup. coral. ℥iſſ. F. Julapium.*

His quarta vice doſi debita deglutitis, rediere vox, reſpiratio & pulſus; & de dolore terebranti pulſatili ventriculi conqueſta eſt. Dom. Worthington de Wigan Chirurgus expertus apoſtema ventriculo pronunciavit, ei autem ſententiæ mecum Dr. Grundi reclamavit, quapropter ut methodo præſcripta inſiſteret inculcavimus, diebus aliquot elapſis clyſmata injicienda curavimus, & ingentem maſſam ſanguinis inſtar picis nigreſcentis per ſedes ejecit, remediis ſumptis, & ſemel repetitis, leves catharſes inſtituimus, decocta baſamica, & cereviſias pectorales, ab his ad ſanitatē rediit, niſi quod vicibus quibuſdam de phlegmate viſcoſo bronchiis pulmonum adhærente conqueritur, levi autem conatu cum pectoralibus baſamicis deterſivis evaneſcit.

Phthiſis ab Hæmorrhagia uterina.

Obſervatio I.

Domina Towning. de Weeton, uxor Guilielmi Towning, cum per plures menſes hac laboraſſet, a magno diſpendio ſanguinis frequentes lypothymias & quandoque paroxyſmos hystericos patitur; ad fermentum ſedandum ſanguinis eleſtuarium cum cortice Peruviano pro baſi præſcripſi. Antidoti autem vires morbo impares fuere; quapropter eleſtuarium ſequens (cujus vires in eodem caſu in domina Sudel de Preſton expertus fueram) ſtatim præſcripſi.

24. *Corall. rubri pulverizat. ſuccini flav. boli Armen. ſanguinis draconis aa. ℥ij. ſem. plantaginis, vitrioli martis, croci martis reſtringentis aa. ℥j. cum ſ. q. conſervæ de cynosbat. & ſyrup. de roſis ſiccis. F. El. horis medicis Julapio ſequent. ſumend.*

24. *Aq. meliſſæ, lactis alexiteriæ, cinnamoni. bordeat. aa. ℥iij. conſec. hyacinth. ℥i. ſyrup. myrtini ℥i. M. F. Julapium.*

His debito ſumptis fluxus ceſſavit ſanguinis, & ipſa gradu lento in dies vires recuperavit, vere ſequenti de doloribus continuis verſatilibus conqueſta eſt, ſtatibus admodum moleſtis, appetitu proſtrato, calore & frigore ſapius in die alternatim recurrentibus, nec non de continua ſiti, & revera perfecte ſtrigofa fuit, oſſibus ſcilicet nil niſi cute pendula adhærente. Hinc ſequentia præſcripſi.

24. *Pulveris Arm. compoſ. ℥vi. ſorum ſal. armon. ℥ſſ. animæ martis Vigan. ℥i. conſerv. cynosbat. cochleariæ aa. ℥iſſ. luſule ℥ſſ. cum ſ. q. ſyrup. de cortic. citri F. Eleſt. horis medicis cum Julapio ſequent. ſumend.*

24. *Aq. lactis pectoralis ℔j. limac. magiſtral. gentian. compoſ. aa. ℥iis. lumbricor. ℥j. ſacchar. perlat. q. ſ. F. Julapium, in dos. qualibet inſillat. gutt. 7. ſpiritus ſal. armoniaci ſuccinati.*

His cum regimine deglutitis, & levi catharſi cum cereviſia aperitiva antiſcorbutica ſemel ſeptimana repetita, integre convaluit, & onus jam Lucinæ gerit.

Phthiſis ab Impetigine.

Obſervatio I.

Quamvis Græcorum & Arabum impetigines inter ſe diſcrepant, mihi brevitati ſtudenti, morbumque deſcripturo Meridiano, ut loqui amant Mathematici, calculatum, a meta propoſita alienum foret. In ſumma tamen hoc dici poteſt, hic morbus medicamentis vulgaribus raro cedit, & priuſquam pulmones illius veneno conſpurcantur, poſt ſalivationem repetitam morbum repullulaſſe novi. In hoc morbo ſymptomata præ cæteris vulgaria ad ſequentia reduci poſſunt. Rubris, duris tuberculis vultus alique corporis partes deſcendantur, his maturitatem adeptis ſquamæ furfuraceæ ab iis decidunt, tuſſi moleſta, tempore præſertim vespertino, corripitur æger, parum vel nihil expectorans, niſi copiam ſatis amplam ſputi pellucidi, frigore continuo horis antemeridianis convellitur; huic calor & ſitis ſuccedunt, adeoque inter duo extrema breves tantum dantur induciæ. Dolores pungentes tantopere fauces infeſtant, ut vix loqui vel deglutire valeat æger. Appetitus totaliter proſternitur. In hoc morbo, cum ſtatim confirmatum attingit æger, ſputum eſt copioſum, craſſum, foetidum, carnei, quandoque ruſi coloris. In veneno quodam fomes morbi conſiſtere videtur, quale autem ſit parum ſcio; ſi conjecturam tamen proponere liceat, verosimile mihi videtur in hoc morbo particulis ſalinis acidis luxuriare ſanguinem, & genus nervoſum, quæ cum particulis ſulphureis maſſa ſanguinis eliminantur, adeoque more ſublimati cujuſdam cuticulæ adhærent, ſicut in tentamine ſequenti conſpicere fas eſt; ſume acetiacerriſſi q. v. ſuper lentum ignem impone organo quodam communi, vas linteum raro

cooperies, particulæ ſulphureæ metallicæ una cum ſumis aceſcentibus ſublimabunt, & operculo forma ſicca albeſcente adhærent, ſquamis impetiginofis parum diſcrepantes. His accedunt rationes ſequentes, iſtis cælorum plagis hic morbus præcipue graſſatur, quibus particulis atmophæra conſtipatur falſis, ſcilicet paludofis, & ſumma hujus morbi antidotus carne viperina conſiſtit, cujus præcipua virtus acido infringendo conſtat, methodus medendi nititur catharticiſ, acidulis viperarum & millepedum præparationibus, cereviſiis antiſcorbuticis mitioribus, antivenericis, nec non pectoralibus baſamicis. Hiſtorias plures recitarem, at in hoc caſu nomina aſſingere forſan ingratum foret.

Phthiſis a Rheumatismo Scorbutico.

Obſervatio I.

Inter perſonas proveſtoris ætatis prope fluvios falſos habitantes hic morbus vernaculus appellari poteſt. E quorum numero Dominus Ashton de Lea prope Preſton, Anno 92. me in auxilium vocavit, tunc temporis præter atrophiam univerſalem arenulis quoque propemodum conſectus erat, per totum diem cruciatu immunis manſit, toro autem haud citius ſe commiſit, quin Hydræ nova revireſceret; inſomnis per totam noctem frequenter decubuit, quandoque eo uſque furoris morbus adveſtus eſt, circa mediam noctem, leſto quaſi tauro Phalaridis auſugit, & levaminis cauſa per horam unam vel alteram cathedra prope ignem ſe appoſuit, appetitus proſtratus erat, & vix noſocomium Skeleron quoddam magis viſui objiceret. Calore & ſiti immunis fuit, nec ulla tuſſi afflictus fuit. In primis potionem ſequentem præſcripſi.

24. *Decocti ſennæ Gereonis ℥iij. ſyrup. de ſpina cervin. ℥i. diacnicu ℥ſſ. crem. tartari ℥ſſ. aq. lumbricor. ℥ii. M. F. P. cum regimine ſumend.*

24. *Pulveris Ar. comp. ℥vj. ſorum ſal. armon. ℥ſſ. animæ mortis Vigan. ℥j. extracti trifolii fibrini ℥ii. conſerv. cochleariæ, flavedinis aurantier. aa. ℥ij. cum ſ. q. ſyrup. e cortic. citri F. Eleſt. horis medicis Julapio ſequenti ſumen.*

24. *Aq. lactis alexiteriæ ℔j. gentian. compoſ. ℥iij. limac. magiſtral. ℥ij. lumbricor. ℥j. ſucc. expreſſ. milleped. N. 500. ſacchar. perlat. q. ſ. F. Julapium.*

His deglutitis cereviſiam antiſcorbuticam aperitivam inſtitui, æſtivo tempore acidulas Larbricenſes ingurgitavit, & ſanus evaſit. Vere ſequenti repullulavit virus, methodum ſimilem præſcripſi, alius autem veneno tinſto ſyſtemate nervoſo, conatus omnis irritus fuit; hinc poſt ſummos cruciatus, pedes, tibiæ, & femora tumuere, quapropter mortem adſtanteſ pronuntiavi; hinc vir probus, tunc temporis populari Empirico oppido Preſtonienſi ſuo more medicinam faciliſſimè (columnis ſcilicet oppidanis ſchedulis ſuis obteſtis) panateis theatri ſe commiſit. Medicaſter circumforaneus etiamſi Atrophiam in ſummo gradu adſtanteſ conſpiceret, nec morbum nec vocis quidem etymologiam cognovit, quin certam ac ſubitaneam medelam promiſit, at brevi tempore fraus fallentis detecta fuit, poſt menſem etenim unum vel alterum fatis ſuccubuit.

Obſervatio II.

Illuſtriſſima Domina Domina Fleetwod de Penwortham, cum cachexia ſcorbutica diu laboraſſet, totam propemodum antiſcorbuticorum encyclopædiam tentaſſet, parum autem levaminis recepit. Thermaſ Bathoniennes adiiit, conatus autem omnis adhuc irritus erat, eandem ſuaſu viri celeberrimi Doctōris Baynard. Coll. Regal. Londinenſ. ſocii, tunc temporis herculeo ſucceſſu, & ſummo ingenii cum acumine agro Lancaſtriienſi artem Apollineam faciliſſimè, acidulas Eboracenſes adiiit, has copioſe per menſis ſpatium ingurgitabat, & ſæpius ſeptimana balneo iſto frigido, Saint Mungus charactere inſignito, ſe lavabat. Hinc dolores rheumatici & calor heſticus penitus debellati ſunt, & per plures annos valetudini reſtituta fuit. Anno 90. recidivam paſſa eſt; ruruſ acidulas ingurgitavit, & morbus inducias paſſus eſt; vere autem repullulavit virus, & jam particulis ſalinis ſaturato ſanguine, in dies vires labefactabant; tanta anorexia correpta fuit, ut a cibi uſu vomitus in immanes incideret, & frequenter bilis æruſinoſæ copiam immenſam eruſtaret, remediis quamplurimis incaſſum tentatis, in dies ſitis & calor heſticus eam affligebant, expuit phlegma viſcoſum cinereum, & quandoque æruſinoſum, aſthmate poſtea correpta fuit, hinc ſanguinis uncias aliquot a brachio ſumendas ſuaſi, ſanguis eduſtus craſſa pellicula glutine tenaciore obteſtus erat, hinc alcalicis, volatilibus, pectoralibus, deterſivis, & antiſcorbuticis cujuſcunque generis incaſſum tentatis, rediit aſthmatis paroxyſmus, aphonia correpta fuit, & ſupremam clauſit diem; hoc notaſi, poſt dominæ celeberrimæ ab acidulis & balneis frigidis per totum morbi decurſum ſolummodo quid levaminis acceſſit.

Phthiſis a Rachitide.

Obſervatio I.

In hoc morbo tantopere vultus albeſcit, quod nive propemodum candidior infans, adeoque muſculi flacceſcunt veſtimenti ad inſtar penduli cutis circumambit corpus, crura & pedes tantopere vacillant, corpori ſuſtentando inepta evadunt, durities planæ & amplæ abdomine frequenter interſperſæ, quæ idiomate vernaculo Liver cake audiunt; tuſſi corripitur æger, & quandoque diarrhœa, Febriſ lenta, & ſiti continua. In medulla ſpinali mihi fomitem morbi conſiſtere videtur, in hac quibuſdam illecebris ſpiritus animales irretiti, influxu debito ſpirituum privantur nervi ab ea ramificantes; hinc nervi & fibrillæ muſculares pabulo diurno orbatæ flacceſcunt, & conſequenter emaciat corpus, & incurvantur oſſa: in hac etenim tenella ætate, quod membra ſint firma & recta, neceſſe eſt muſculos membra circumambientes eſſe ſpiritu irriguos, aliter ex inæquali nutritione neceſſe eſt partes a ſitu naturali declinent; ſimiliter ad ereſtioneſ iſlius ſloris Heliotropium dicti radii ſolares requiruntur, quod detracto lumine ſolari vultu torvo & pendente terram deſpicit. Propter ſpiritus nimis parce fluentes albeſcit vultus, emaciat corpus, vacillant pedes, aceſcit ſanguis, hinc tuſſis, febris lenta, & quandoque diarrhœa, humores viſcoſi intra fibrillas muſculares extravasati, durities prædictas conſtituere videntur. In infantibus methodus

THOMÆ SYDENHAM

DE PODAGRA.

medendi conſtat ex linimentis nervinis, medicamentis volatilibus, ſpecificis, inter quæ prima jure *ens Veneris* & radix *Oſmundæ* regalis recenſeri debent. In adultioribus methodus medendi conſtat ex medicamentis chalybeatis, decoctis & cereviſiis aperitivis, aquis mineralibus acidulis, balneis frigidis, & id genus aliis. Methodo priori infantes virorum illuſtrium *Ambroſe Puſſay de Bolton Hale*, agro *Eboracenſi* Armigeri, & *Joannis Franc de Preſton* convaluerunt. Poſteriori methodo ab ipſis orci faucibus *Edmundus Forde*, filius natu maximus *Lanceloti Forde de Kendale*, ſanitati reſtitutus fuit.

Phthiſis a ſuore albo.

Intemperiem ſalinam ſanguine mutato, lentorum collavie luxuriat purpurea maſſa, hinc viſcoſa ſaburra ventriculis infarcitur, quapropter nec edulia aſſumpta recte concoquit, nec male concocta ſanguis aſſimilat; hinc fit quod magna chyli portio albo ſuore præcipitatur, portiones aliæ intra pulmones ſubſidunt, hinc tuſſi corripitur æger, & ſputum ſalſum viſcoſum album copia prægrandi eructat. Intumeſcunt frequenter pedes; quod ſymptoma ab eadem ſalſedine ſanguis deduci poteſt. Lenta febris glſcit indies ex ſalino fermento ſicut mihi videtur orta. Eruptiones miliareſ per cutinî univerſam frequenter interſperſæ ſunt, & lumbago doloroſa ſummopere torquet, albescit vultus, & caro indies intabescit, quæ ſymptomata per cauſam allatam facile explicari poſſunt. Methodus medendi conſtat in primis viis detergendis, maſſa ſanguinea invigoranda, & partibus continuo humorum fluxu tonum amiſſis conſtringendis. Remedia huc collimantia, ſunt emetica ſcillitica, cathartica aperitiva, chalybeata, & baſſamica parum aſtringentia. Ab his Sere-niſſimæ quædam Domina oppido de *Preſton* & *Kendale* ſanitatem integram recuperavere.

Phthiſis a Chloroſi.

Fœminis quibuſcunque bene ſe habentibus a natura inſit fermentum quoddam internum a pubertate finita ad ſenectutis uſque lanuginem; hujus gratia per quemlibet lunæ decurſum ſolemnis ſuas evacuationes habent, ex quibus ſuppreſſis pleuritidem, peripneumoniam, rheumatismum, & phthiſin haud ſemel pullulaſſe notavi. Ab æſtuanti quodam animi deſiderio, & vitiato ventriculi fermento hæ ſæpiſſime ſuppreſſiones contingunt, qualis autem proſapiæ fermentum fit menſtruale, haud magis forſan a priori explicari poteſt, quam fluxus & refluxus Oceani *Cynthiæ* motum quaſi tot ſatellites obſervantes. At ne altum ſilentium proſiteamur, liceat conjecturam proponere; Chloroſin grave quoddam animi deſiderium conſequi, amorem ſcilicet, vel mœſtitiâ, omnibus in propatulo eſt, nec non appetitum diætæ cujuſlibet obſcœnæ, cretæ ſcilicet, calcis, carbonum & id genus aliorum; Sanguinem in hoc morbo detractum ſemper glutinoſum inveni, & ventriculum viſcoſa ſaburra repletum, ex quibus opinari liceat, ex pathemate quodam graviſſimo ſpiritibus nimium oppreſſis vel circa quendam appetitum æſtuantem copia nimis prægrandi abſumptis, penu ſpirituum diurno privatur maſſa ſanguinis, ex quo fit quod particulæ ſanguinis tenaciores tardius motæ arctius cohærent & viſcoſæ fiunt, ſicut in tentamine ſequenti videre eſt.

24. *Aq. & glutinis*, q. v. vaſe quodam ſuper ignem impoſite, dum particulis igneis partes aquoſæ circumagitantur, officiunt quo minus particulæ tenaces cohæreant, & liquidæ manent, amoto autem igne, ſtatim viſcoſæ fiunt; pari forſan modo dum particulæ ferroſæ & ſegnes in maſſa ſanguinis, vi ſpirituum circumagitantur, ferri ſanguinis manet liquidum & leſtoribus immune, æſtro autem amoto, ſpiritibus ſcilicet pathemate quodam nimium oppreſſis vel appetitu quodam nimium abſumptis, particulæ ſegnes tardius movent, adeoque ſtrictius cohærent & viſcoſæ fiunt. Huic ſententiæ ſuſſagatur clariffimi *Sylvii* authoritas pag. 304. a mœrore autem ſolent humores reddi glutinoſi ac viſcoſi, maxime in tenni inteſtino, & quidem propter ſuccum pancreaticum idcirco factum aſtutiori; modus revera quo ſucci glandulæ a quodam pathemate vehementi aceſcunt, haud aliter iconographiani admittit, quantum ego conjectando valeo, quam liquores fermentiſcibiles ab icſtu fulminis aceſcentes. Methodus medendi ſumitur a vomitoriis, catharticis amaris detergentibus, volatilibus, martiatis, & aquis acidulis naturalibus & artificialibus, hiftorias pene infinitas recitarem, at brevitati ſtudent has omitto.

Phthiſis Chyloſa.

Poſt febres cujuſcunque generis inter infantes præcipue hic morbus contingit, quapropter verofiſſime videtur conſictu febrili ſpirituum penus ſummopere abſumitur, hinc in ſalinam dyſcrasiam degenerat maſſa ſanguinis, & verofiſſime pars ſeroſa ſanguinis per ſalia coagulatur, adeoque lentoribus glandulæ meſenterii infarcitur, quapropter in inteſtina regurgitat chylus, & ſi lactæ totaliter obſtruntur, emarceſcit corpus, intumeſcit abdomen, albescunt facies, & gravi tuſſi laborat patiens; quandoque lactæ totaliter haud oppilantur, & hinc facies haud albescunt, intumeſcit tamen abdomen, & emaciat corpus propter lactæas qualquam oppilatas; hoc ſymptoma frequenter notavi. Phthiſis hujusmodi lento procedit gradu, tractu tamen temporis, glandulæ infarctæ meſenterii ſtumoræ fiunt, & quandoque glandulæ pulmonares, & in iſto ſtadio conclamatum eſt. Methodus medendi quæ mihi præ cæteris aridet, & quæ ſpem raro aut nunquam abludit, modo ſit in principio vel augmento morbi, ſumitur a catharticis aperitivis, inter quæ *Elixir Salutis* cæteris palmam præripit, diebus intermediis pilulas ex trifolio fibrino, gum. ammoniaco, & anima martis, inſtituo, necnon in adultis *Electuaria Chalybeata*, & *cereviſias pectorales* aperitivas, *ens veneris* & radix *oſmundæ* regalis egregii ſunt uſus, & ubi vermium ſuſpicio, *æthiops mineralis*, abdomen ſæpius in die linimentis emollientibus aperitivis illiniendum inculco, & geſtare *Sylvii* Emplaſtrum carminans, opio omiſſo. Hac methodo, filia natu-xima Domini *Smith de Stalming Grange*, & ſcœmina quædam prope *White-bill* habitans, ſanitati reſtituta fuere. Plures recitarem; ad umbilicum autem jam ducere incumbit.

Hic eſt finis Phthiſiologiæ Lancaſtriensis; redeamus jam ad ea quæ reſtant de Clariffimi Thomæ Sydenham Proceſſibus integris, &c.

Exunte Januario aut incipiente Februario ingruit hora fere ſecunda matutina, dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, ſuram, aut talum; mox ſequitur rigor cum horrore & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, (de pari paſſu rigor atque horrore recedunt) idque in ſingulas horas, donec tandem ſub noctem ad apicem pervenerit, nunc tenſionem violentam, nunc morſum canis rodentis, quandoque preſſuram, & coarctationem exprimens, hinc præ exquisito dolore, nec linteorum ſuperincumbentium pondus, nec cubiculi a fortiori ambulatione concuſſionem ferre podagricus valeat; dolor non ſedatur, niſi ante horam ſecundam, tertiamve matutinam (decurſo ſcilicet nycthemeri ſpatio a primo appulſu) & jam leni madore perſuſus æger ſomno concedit, a quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recentem occupatam cernit. Sequenti die, forte etiam ad biduum, triduumve dolet nonnihil pars affecta, idque vehementius adveſperante die, levatur autem ſub galli cantu. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur. Poſtquam utrunque pedem exercuerit dolor, qui ſequuntur paroxyſmi enormes ſunt, tum quoad tempus invaſionis, tum ob durationem, atque ex ſerie horum paroxyſmorum, conſtat paroxyſmus, qui dicitur podagræ diuturnior breviorve, pro ægri ætate in iis qui vegetiores ſunt & quos podagra rarius invaſit, diebus ſæpe quatuordecim, in ſenioribus, atque iis quos ſæpius afflixit, duobus menſibus fere deſinit; iis vero, qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fracti ſunt, non prius valedit, quam æſtas jam adultior eam fugaverit.

At quatuordecim primos dies urina coloratior eſt, cum ſedimento rubro, & quaſi arenulis reſerto, alvus fere conſtipata eſt, Appetitus proſtratio, rigor totius corporis ſub velperam integrum paroxyſmum comitantur, recedentem paroxyſmum excipit pedis affecti inter digitos pruritus vix ferendus; unde decidunt furfures, & pedes deſquamantur.

Hactenus dolor pedibus tantum fuerit infeſtus; cum vero vel ab indebita medicatione turbatur podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam corporis ſubſtantia quaſi in morbi fomitem pervertitur; jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasque regiones occupat, quandoque unum, plureſve digitos diſtorquens, faſciculo radicum paſſinacæ ſimiles eos reddit, motu paulatim privans, tandemque concretaſ, circa articulorum ligamenta, tophaceos generans, cretam vel oculos cancrorum æmulantes, nonnunquam in cubitis tumorem ſub album ciet, fere ad ovi magnitudinem, qui ſenſim inflammatur cum rubore, nonnunquam ſemur occupans, ſenſum exhibet, quaſi ingentis ponderis appenſi, ſine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acius urget, artus jam habet æger fere undequaque contractos, & impeditos, ita ut claudicet, & permoleſte prorepit. Urina illam colore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorſum, aliaque partes ipoleſte pruriunt, maxime ſub horam ſomni.

Poſt multos, diroſque cruciatuſ paroxyſmi ſubſequentes (natura partim onere materiæ peccantis, partim ſenio oppreſſa) ægrum quoad dolorem clementius tractant, at loco doloris conſueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, laſſitudo ſpontanea, quandoque etiam propenſio ad diarrhœam ſuperveniunt, quæ ſymptomata evaneſcunt, quoties articulos dolor fatigat, atque ita nunc dolore, nunc ægritudine, quaſi alternatim laceſſentibus, paroxyſmus longas moras neſcit.

Calculus renum in quamplurimis parit hic effectus.

Fœminas perraro infeſtat, eaſque, non niſi jam vetulas, & viragines, pueros quoque, & juvenibus minores vix adoritur.

Indicatio curativa in eo vertitur, ut coſtioni conſulatur, indigeſtionibus ſublatis, ſep fit per pharmaca, ſeu victus rationem, ſeu exercitationem, ſeu alia ex iſtis qualibet, quæ ſex res non naturales indigitantur.

Venæ ſectio, cathariſis, ac diaphoreſis ſcopum non attingent, licet iis qui *Renum ſimul Calculo*, & exinde orto *Mictu Sanguineo* laborant, non abs re erit ſemel in ſeptimana, alvum *Manna* ſubducere, & ſingulis noctibus, poſt purgationem paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi ſatisfaciunt, ea ſunt, quæ moderate calent, & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt, talia ſunt, *Rad. Angelic. enulæ*; fol. *Absinth. cent. min. chamæd. chamæd. &c.* quibus addi poſſunt *Antifcorbutica* diſta, ut *Rad. raph. ruſtic. fol. Coch. hort. naſturt. Aq. &c.* quæ tamen parcius uſurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos ſubdunt, & calorem augent, præ iſtis aliis, quæ miti calore, atque amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile eſt *Electuar.* ſequens.

24. *Conſerv. Coch. hort. unc. iſſ. Absinth. rom. flav. Aurant. an. unc. j. Angel. condit. nuc. moſchat. cond. an. unc. ſſ. Theriac. Androm. Zij. Pulv. ari. comp. Zij. cum ſ. q. Syr. Aurant. f. Elect. de quo ſumat. Zij. bis in die ſuperbibendo ſeq. Aq. diſtillat. Coch. v. vel vi.*

24. *Rad. raphan. ruſtic. incif. unc. iij. Coch. hort. M. xij. naſturt. Aq. becabung. ſalv. menth. an. M. iv. cort. aurant. No. vi. nuc. moſch. cond. No. ii. cerv. Brunſvicenſ. lbxi. deſtillentur organiſ communibus, donec ſolummodo lbvi. aquæ eliciantur pro uſu.*

Hæc autem remedia *digestiva*, conſtanter, atque omni adhibita diligentia, aſſidue uſurpanda, & in *Paroxyſmorum* intervallis præcipue in uſum revocanda ſunt.

Mediocritas ea in cibo obſervanda eſt, ut neque plus alimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neque e contra nimia abſtinentia, partes ea proportionem alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem ſuſtinere potis eſt. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato conſulendum eſt, & unica ciborum ſpecie ſingulis paſtibus veſcatur, de cæteris, dempta carne, pro libitu comedat, modo nec acia, nec ſale condita ſint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem cenæ indulgeat, ſibi hauſtum cereviſiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi ſunt, qui neque ad vini generoſitatem aſcendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore ſuo lædant ventriculum, deprimuntur. Hujusmodi eſt *Cereviſia tenuis Londinenſis*, aut multa aqua cum paucis vino permixta; aqua autem pura & cruda periculosa eſt; cum autem univerſa fere corporis ſubſtantia in podagram degeneraverit, a liquore quocunque fermento quantumvis levi, & tenui abſti-

abstineat, & utatur *Decoctio Dietetico ex ex Sarsa*, in remedium formulis descripto, ubi primum a paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger a longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino nequeat concoquere, in pastibus haustum vi Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Dieteticum* abdicans.

Æger, maxime hyemis tempore, mature lectum petat, diluculo exurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis, cæteris vero omnibus, exercitatio corporis quotidiana, facile palmam præripit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo justo vehementior; quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas, nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua aere salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat. Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum a morbo corripitur, a carnibus abstinere, iusculo uti avenaceo, aut alio pari alimento, sin autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit a carnibus abstinere diutius quam ventriculus earum usum averferur, ne quid autem vel in quantitate, vel in qualitate ciborum aut potus peccet.

Symptomatibus iis occurrendum est, a quibus æger in paroxysmo

de vita periclitatur, horum maxime familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam a flatu, hoc in casu, nihil æque votis respondet, ac vini Canariensis haustulus subinde deglutitus, exercitio utatur æger; sin autem symptoma, inducias haud ferens, mortem minitetur, modo caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim confugiendum, viz. *gutt. xx.* in haustulo *Aq. Epidem.* & in lecto ad quietem se componat; hac ipsa methodo se ab imminente morte liberavit Author clarissimus, ubi ex errore aliquo, circa res sex non naturales, in ingentem ventriculi ægritudinem incidit, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore; artus interim, ex retrocessione materiæ podagricæ, doloris erant expertes, ac ad motum plus solito habiles; Congium nempe unum liquoris possetici, vel cerevisiæ tenuis devorabat, & quamprimum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint *Laudan. liquid. gutt. xvii.* sumebat. Quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur, methodo & medicamentis huic usui dicatis ad biduum, triduumve, mane & vespere per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in pulmonum lobos, liberati artubus a dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma, pari modo ac peripneumonia absoluta, venæ sectione scilicet repetita, diata, & remediis refrigerantibus, & incrassantibus, purgandus est insuper æger, inter venæ sectiones, potionibus lenientibus, sudoris autem provocatio obest.

F I N I S.

INDEX MORBORUM,

Quorum Curatio in Process. Integr. &c. habetur.

A		I	
D E Abortu præcavendo.	Pag. 148	Ictero.	150
Ambustis.	150	Iliaca passione.	147
Angina.	144		
Apoplexia.	146		
Asthmate.	150		
C		L	
Canis rabidi morsu.	150	Lochiorum fluxu immodico.	148
Chlorosi.	ibid.	Lochiorum suppressione.	ibid.
Cholare morbo.	147	Lue Venerea.	149
Chorea sancti Viti.	146		
Colica Biliofa.	147		
Colica Hysterica.	ibid.		
Colica Pictonum.	ibid.		
Contusionibus.	150		
D		M	
Diabete.	149	Mania communi.	150
Diarrhœa.	146	Mensium fluxu immodico.	147
Dysenteria.	ibid.	Mensium suppressione.	150
E		Mictu sanguineo a renum calcul.	146
		Morbillis.	144
F		N	
Febre Stationaria.	143	Nephritico Paroxysmo.	146
Febre Constitutionum variarum.	142		
Febribus a dentitione ortis.	149		
Febre Depuratoria.	143		
Febre Erysipelatosa.	144		
Febre Hæctica Infantum.	150		
Febre Intermitt.	ibid.		
Febre Pestilentiali.	ibid.		
Febre Scarlatina.	143		
Fluore Albo.	149		
Furure sive Porrigine capitis.	143		
G		O	
Gonorrhœa virulenta.	148	Ophthalmia.	ibid.
H		P	
Hæmoptoe.	150	Paralyfi.	150
Hæmorrhagia narium.	ibid.	Peripneumonia notha.	144
Hæmorrhoidum dolore.	ibid.	Phthisi.	151
Hæmorrhoidum fluxu immodico.	149	Pleuritide.	144
Hydrope.	148	Pruritu ferino.	ibid.
Hypochondriaca affectione.	142	Punctura tendinis.	150
Hysterica passione.	ibid.	Podagra.	158
		R	
		Rachitide.	149
		Rheumatismo.	144
		Remediorum formulis.	142
		S	
		Scorbuto.	151
		T	
		Tussi.	151
		Tenesmo.	146
		Tussi puerorum convulsiva.	150
		Tabis descriptio & cura.	151
		V	
		Variolis.	145
		Ulcere Vesicæ.	150
		Vomitu sanguinis.	ibid.
		Uteri procidentia.	146

Ne quid desit eorum omnium, quæ super Constitutionibus Epidemicis hæcenus in Ephemeridibus Germanicis & alibi vulgata sunt, hic, quamvis extra ordinem, adjiciemus, tum ea quæ in hoc argumento, de annis 1697. & 1698. fuere scripta, quæque a nobis proprio loco omiſſa sunt, tum alia omnia, quæ ab anno 1701. ad annum usque 1717. in variis Germaniæ locis fuere observata, quæque ad manus nostras non prius pervenerunt, quam opus nostrum ad finem prope deductum esset.

HISTORIA EPIDEMICA

GERMANIÆ.

Constitutio Epidemica Augustana An. 1697.

DN. D. LUCÆ SCHROECKII,

Academ. Cæsar. Leopold. Naturæ Curiosorum Præsidis.

Quam Morbona Anno elapſo ad finem vergente quietem Medicis Augustanis conceſſerat, multam hoc quoque continuaverat, ita ut licet morbi aliqui epidemice Urbem infestarent, raro tamen multos invadere deprehenderentur. Morbilli in primis & variolæ tum benigniores, tum confluentes, gravibusque symptomatibus stipatæ, puerilem æque ac juvenilem ætatem invadebant, & cladem iisdem inferebant. Dn. G. mercatoris filiolus novem annorum, cum variolas feliciter superasset, paulo post mense April. in tres etiam sorores fratremque octo annos natum contagium derivaverat; inter quas sororcula triennis, ad medicamenta sumenda difficilis, atque pustulis non adeo multis licet laboraret, ob crassæ lymphæ bronchia obviſcantis abundantiam gravius respirans, nec non cephalalgia intensa, cum subſequo ex aure dextra purulenti humoris, pariori tamen effluxu tentata, accedentibus convulsionibus sensum deſecit; in altera autem sorore, decimum ætatis annum agente, non admodum ægrotare viſa, variolæ quidem plurimæ, nec difficulter prodierunt, ulla tamen arte, in juſtas pustulas extolli atque suppurari recuſarunt, ut & ipſa tertia hebdomade obierit; tertia vero soror ſedecim annos nata, atque confluentibus variolis obſita, de intenso totius corporis ardore, quem & ipſe rubens cutis calor teſtabatur, potiſſimum conqueſta, feliciter emerſit; cumque ipſe frater, qui variolas diſcretas mediocri numero effloſcentes, nec symptomatum aliorum concuſſu graves licet pateretur, decimo tamen a decubitu die, magnam narium hæmorrhagiam ſubiit, quæ per quatrimum ſubinde recurrens, variolarum tamen neque ad interiora ingreſſum, neque mortem induxit, ſed temperationum emulſionum poſt uſum ceſſavit, quam, variolis jam exſiccatis, iſterus plurium dierum excepit, a quo juſculis, herbis recentibus bellidis &c. medicatis ſenſim convaluit.

Pleuritides etiam veræ, & peripneumoniæ, in principio ſi negligebantur, ſenſibus in primis ſuſceſſæ; quin & catarrhi graviores faucibus moleſti, ac fere ſuffocativi, tuſſesque humidæ notabantur: in illuſtriſſimo quodam Barone fauces conſtringebantur, ut ſuffocationis in periculo verſaretur, cui elixir proprietatis Claud. cum ſpiritu cornu cervini mixtum præſentaneam opem præſtitit, & recurrentem aliquoties inſultum potiunculæ laxativa, ſubductis ſeroſis viſcoſitatibus, penitus abegit. In aliis decocta herbæ veronicæ, radicis liquiritiæ, ſeminis aniſi &c. aliaque ſerum ſtagnans diſſolvendi vi pollentia, & quæ illius abundantiam blande eliminabant, laxativa ſe commendarunt. Nonnullis facta ſeroſa materiæ in ventrem inferiorem metraſtaſi, cum ſubſequa diarrhœa, aut febre tertiana, morbus fuit ſolutus; quidam virili in ætate conſtitutus, cum faciei intumeſcentiam, intenso calori, cephalalgia & virium debilitati junctam incidiffe, paulo poſt, a propinata bis ſudorifera potione, ceſſante tumore atque dolore, ſerum peccans inde per anteriorem corporis partem deſluere, ſcrotumque in molem inſignem extendere ſenſit, eodem tamen ſcitore, poſt propinatum binis ſolum vicibus diſcordium Fracaſtorii, alvumque ſicciorẽ per ſolia ſennæ prunorum Damalcenorum decocto inſula referatam, a cataplaſmate ex reſolventibus & diſcutientibus pulveribus cum lacte coctis parato, facile iterum evaneſcente.

Ut porro arthritides vagas, iſchiadicos dolores in Anni præcedentis exitu memoratos, & hucufque urbem inſeſtantes taceam, febres etiam ardentes in puſtuloſas ſæpe & maculoſas effloſcentias, non abſque malignitatis aut contagii nota, & cum doſi præcipue ac capitis magno dolore in principio conjunctas, abeuntes; præcipue autem, præter erraticas, quotidianæ ac tertianæ notabantur; quæ cum primum invaderent, continuarum in aliquibus metum, vehementi ſuo calore, cephalalgia, deliriis ac virium debilitate, incuſſerant; brevi autem tempore, a propinato, varia ſub forma, chinæ cortice, & ſine quo difficilis ac fere fruſtranea reddebatur cura, interpoſito quandoque blandiorum evacuantium uſu, abſque recidivæ metu, ni gravis in diætâ error committeretur, receſſerant; prout nec continuæ febres, bezoardicis & diaphoreticis continuatis hand immorigeræ, perfectam ſanitatẽ ſemper admittebant, niſi ſuperſtitem vitioſæ lymphæ abundantiam, ventriculo in primis atque inteſtinis moleſtam, in fine morbi lenitivis commode educere ſtudiſſent. Nobil. Matrona, floridæ ætatis, ſanguineæque conſtitutionis, in fine ſecundi menſis gravida, poſt cibos concoctu difficiliores ingeſtos, in tertianam incidit, cum per moleſto tenſivo dolore, a quo, poſt biduanum ſpecifici ſtomachici Poteriani uſum, pulveris Peruviani ſcrupulum unum in tantillo vini Neccarini rubri ſubadſtrigentiſ, mane & veſperi per duos dies ſumpſiſſet, libera quidem evaſit, inſignem vero uteri hæmorrhagiam, cum abortus periculo incurrit, quæ tamen a coralliorum rubrorum pulvere tum ſolitario, tum lapidi hæmatiti ac terræ ſigillatæ commixto, ſucceſſive exhibitæ, imperata ſimul quiete, ſenſim ceſſavit, alvo iterea ſicciori & flatibus gravata, cibus lubricantibus minime, ſoliſ autem ſennæ parva quantitate decocto prunorum Damalc. inſuſis, obſecundante, partu vero filiolum juſto tempore ſanum & vegetum excludente.

Pluribus ophthalmiæ, & genarum non tantum œdematoſos tumores, modo indolentes, modo odontalgia, in ulcuſcula buccarum interna aliquibus terminatæ, juncti, moleſtiam magis quam pericu-

lum creaverunt, ſed parotides etiam glandulas, modo in uno, modo utroque latere, cum præcedanea febrili efferveſcentia, in pueris quandoque ad delirium uſque ſpiritus magis mobiles exagitante, lymphæ lentefcentis ſtagnatio, M. Majo occupaverat; nec catarrhœ capitis & pectoris gravedines M. Junio omnino aberant. Ophthalmiæ ardorem nihil felicius quam vini ſpiritus linteolo exceptus & impoſitus compeſcebat. Parotides autem, juxta cum diaphoreticorum uſu, emplaſtrum malacticum Auguſt. ſimplex diſcutiebat.

Inſirmitatibus hiſce, quæ a ſeri ſtagnationibus ac coacervationibus, nec non ob ſuſtaminatam inſenſibilem tranſpirationem, variarum impuriorum particularum inquinacionibus commode derivari amant, producendis frigidi aeris inclementia, & poſtea inæqualitas plurimum contuliſſe videbatur; cum enim primus Anni menſis frigore, admodum quandoque intenso, crebriſque comitato nebulis, inſeſtus eſſet, quas M. Februario frequentes nives, præter frigoris continuationem, veſpertinis autem horis remiſſionem excipiebant, Martius & Aprilis principium inconfantia ſua modo nebulas, pluvias, nives, modo ſerenitates, aeris teporem friguiſque produxerant; uſque dum ſol ad Tauri ſignum propius accedens, amœnioriſ veris ſpem faceret, inque Majo calores ællivis fere æquales primo excitaret, quos tempeſtates non infrequentes, nobis equidem per Dei gratiam clementiores, viciniæ autem noſtræ, atque remotiſſimis etiam in locis, in primis die 21. ſt. n. grandine inſolita (nobis equidem e longinquo ſaltem comparente) admodum damnoſæ ſequiebantur; quam intemperiem ſuccedens zephyri vehementia d. 27. nivem copioſam adduxerat, aeremque poſtea ad pruinas maturinas uſque, in fine Maji, ſub crebriori euri ſtatu, ac cæli ſerenitate refrigeraverat; cum cæteroquin temperatior aeris ſtatuſ & grata caloris variatio M. Junio nihil inconfueti corporibus noſtris inferret; accedente præterea crebriori ventorum alternatione, qui modo ab orientali, modo occidentali in primis plaga, urbem hucufque perſtaverant, terramque a pluviis licet multoties madefactam iterum exſiccaverant, quin & ſimul continuo iſto aeris motu plurima morborum miaſmata diſcuſſerant.

Nec aliam æſtas faciem induerat. Sole autem Leonis ſignum percurrente, frigidiuſculam frequenter auram, & crebriores pluvias, meſſis collectioni multum damnoſas, zephyrus adduxerat; quæ ipſa temporis conſtitutio, præſertim horæorum fruſtuum abundantia cum daretur, diarrhœas non paucas, minus tamen periculoſas aut refractarias pariebat; uſque dum Sol Virginem tenebat, ubi meridionalis ventus nubila diſcutiens, ſerenius, veſpertino tamen & matutino frigore horridiuſculum cælum reddiderat. Cum æquinoctio tamen autumnali crebriores zephyri impetus plurimas denuo pluvias, frigore comitatas, adduxerant: quæ pluviola, ventola & frigida facies uſque ad Solis in Scorpionem adventum continuaverat; ubi ſub ulteriori varia ventorum alternatione, frigida aeris intemperies, quam Sole Sagittarii ſignum ingreſſo, diuturnæ nebulæ & poſtea crebriores nives comitabantur, nec non circa hyemale ſolſtitium pluviae ac temperatior aura exceperant; finem autem Anni frigidus ac nebuſoſus aer clauſerat.

Interea variolæ, quamvis malignitate carere viſæ, atque odontalgia nunquam receſſerant; ante æquinoctium autumnale febres etiam quotidianæ & tertianæ, nec non tuſſes humidæ æque ac convulſivi quid habentes, contumaciores, in puerili præcipue, ſed adulta quoque ætate, nec non poſt æquinoctium rheumatifmi ad brachia, atque ſenefcente Autumno febres petechiales notabantur, quin & iſchiatica paſſio, cum præcedaneo vel comitante circa os ſacrum dolore, hand infrequenter occurrebat; quæ etiam extra urbem inſeſta erat, quin multis in Sueviæ locis plurimos excruciare ferebatur.

Odontalgia quidem majorem pene incolarum partem affligebant, ut raræ in civitate domus eſſent, in quibus malum hoc non inveniret hoſpitiũ; a medicamentis vero ſerum ex corpore ſubducen- tibus, ac præterea ſpiritus ferocientes demulcentibus opiatũ, noctu parva doſi ſucceſſive exhibitũ, certius, quam aliis artiſciis, expelli aptum: qui vero dentium ab evulſione lenimentum ſperaverant, pertinaciorẽ ut plurimum dolorem experti fuerunt.

Rheumatifmos ad brachia, in quibus nec rubedo nec tumor notabatur, capitis dolor aut grævedo prægreſſa, a ſeri ex cerebro in nervos decubitu, productos fuiſſe indicabat; quorum difficilis erat cura; quæ etiam reiteratio laxantium ab uſu promptius, quam ſudoriferorum ſucceſſerat; externe autem crebriori ſpiritus vini camphorati aut ſimilium inunctione ſymbolum conferente.

Qua ipſa etiam methodo coxarum dolor tractari volebat, a ſimili in nervos ſeri abundantis translatione dubio procul ortus, præcipue cum illum ab offis ſacri regione potiſſimum principium ſumpſiſſe, ex ægrotorum relatione conſtitit.

Febres petechiales minus erant lethiferæ, pleuritides ut plurimum in principio mentiebantur, dolore capitis ſemper, deliriis tamen nunquam, vel rarioribus inſeſtæ. Sic vir quadragenario major, J. C. S. melancholici temperamenti, d. 22. Novembr. ſt. n. ſubito horrore cum calore alternante, intensa cephalalgia, vigiliis, virinum proſtratione, lateris ſiniſtri dolore punctorio, & appetitu proſtrato prehenuſus, tincturam bezoardicam ſumpſit, ſine ullo levamine. Die morbi tertio vocatus, potionem diaphoreticam ex diſcordio Fracaſt. ſale cornu cervi volatili, & pulvere rubeo Pannonico duabus vicibus ſumendam præſcripti; nox inquieta; d. quarto horror & dolor lateris remiſere, capitis vero erat tolerabilior, urina paulo minus tinctæ quam præcedenti die, idem medicamentum mane continuavit, veſperi ad alia nauſeabundus, tincturam bezoardicam ſolam admixit, nocte quietiore ſubſequentẽ; d. quinto eadem, ſitis adaucta, quam aqua pomis citriis medicata, demulcebat; tincturam continuavit, quam tamen poſtea ſibi nocere imaginatus eſt; ſucceſſit tuſſis ſicca, moleſta,

ita, fortasse a potu frigidiore; nox inquieta; d. 6. dolor in capitis tantum dextra patte recruduit, tantus, ut nec manus attactum ferret, ab imposita vero herba recenti rutæ, cum baccis juniperi contusis, atque inter sudandum (quæ continua diaphoresis, sub temperato aeris regimine) per bolum ex diascordio, sale C. C. vol. & antimonio diaphoretico, quavis sexta hora exhibitum, sensim promovebatur) cum halitum quasi aliquem ex aure dextra erupisse sensisset, remisit; die 7. in meliori statu versabatur, urina minus tincta & petechiales maculæ cum intermissis plurimis pustulis aqueis in collo, pectore & dorso erumpebant, sicque successive alias etiam partes, d. 8. 9. 10. occupabant; quas, earum ante ignarus, d. 11. in manibus etiam obortas cum conspiceret, valde contristatus inde & perterritus fuit; urina quoad colorem naturali similis, noctulargiori rivo effluxit, d. 12. ruficula continuavit, sitis intensa, urina maxima in quantitate, & longe ultra potus sumpti mensuram exercebatur, aquea prorsus, cum summa virium prostratione; unde vinum sive succum cydoniorum saccharatum aqua dilutum bibere vesperi iussus est: cuncta mala inde mitigari visa, nocte etiam quiete succedente, calori interea adhuc gliscenti moderato bezoardicorum, & tandem unicornu marini matutino ac vespertino usu obviam ibatur; die 16. noctu sudor magnus cum totali morbi cessatione erupit.

Mulierem juvenulam, J. L. tertio mense gravidam, eadem symptomata d. 21. Novembris invaserant, altero die meam opem domi tantum desideravit; d. 4. ut ipse accederem rogatus, magnum sanguinis æstus & præcordiorum angustiam adesse observavi, dolor lateris erat remissior, urina tincta, sed copioso viscido sedimento referta, vesperi & noctu aliquoties narium hæmorrhagiam moderatam pariebat; d. 5. dolor capitis tolerabilior, cor liberum, vesperi dolor colicus; qui d. 6. a sumpto amygdalarum dulcium oleo, & bino subsecuto vomitu cessavit, remanente tamen stomachi ardore; petechiæ apparent; nox insomnis, sed alvus soluta; d. 7. stomachus pacatior, noctu parum deliravit; d. 8. somno, quamvis interrupto nonnunquam fruebatur; d. 9. nonnihil cibi sumpsit, sicque continuans, d. 13. vesperi cibo se replevit, unde appetitus denuo prostratus; cæterum d. 14. satis commode vixit, sumptaque tinctura bezoardica, quam aliquoties per morbi decursum, (juxta cum temperatorum diaphoreticorum, alexipharmacorum, uti pulveris rub. Pannon. specier. diacret. Myns. &c. usu adhibuerat) noctu alvus cum torminibus soluta est; petechiæ sensim disparuerunt; e contra febris quotidiana, vesperi calore infesta successit, quam chinchinæ infusum, cum aqua cichorii factum, post colatram paulatim exhibitum, brevi profligavit; ipsa ægrotæ postea debito tempore pariter felicitate reddita.

Virginem N. J. unum supra viginti annum natam, eadem febris, similibus symptomatibus stipata, d. 24. Novembris occupaverat, præterquam quod dolor pleuritico similis non adesserat, hypochondrium vero sinistrum doluerat; sumpsit ex matris consilio purgans; quæ d. 3. meam opem domi imploravit, cui potionem diaphoreticam bis sumendam ordinavi; d. 4. ipse eam visitans, petechiis & pustulis totam maculatam, cæterum melius se habentem deprehendi; & cum diebus sequentibus quatuor, tincturam bezoardicam reliquis medicamentis fatiscentibus, diligenter sumpsisset, d. 9. ob alvum constipatam supra memorarum infusum sennatum bibit, a cuius usu circa vespertinam ingentem quantitatem excrementorum piruiformium, sanguini & puri permixtorum unica dejectione emisit, sicque protinus convaleuit.

Constitutio Epidemica Augustana Anni 1698.
Laudatissimi D. D.

LUCÆ SCHROECKII.

Anni principium equidem aura temperatiori, pluviis stipata illuxit, paulo post tamen nivofum & frigore horridum comparuit; & quamvis miriorem in interdum temperiem, atque post Februarii initium zephyrus pluvias adduceret, mox tamen eurus nives & frigus intensius reduxerat, usque dum circa æquinoctium vernale, zephyrus vehementer spirans crebriores pluvias concitaret, alternante subinde cum ipso Euri impetu, utroque autem terra imbris sæpius irrigante, sicque ad finem usque Maji, qui ideo, ut passim alibi in remotioribus etiam locis, frigore horridiusculus comparuit, continuante.

Interea pauci ægrotabant; tussis tamen graviores ac contumaces, nec non pleuritides, nonnullis ob vehementiam lethales, variolæ, febres continuæ, paucæ malignæ, iæterus, (cui martialia medicamenta, acidulæ Egranæ, essentia mineræ Martis Hass. opitulabantur) ob aeris inæqualitatem sparsim notabantur.

Circa Solis autem in Taurum ingressum febres tertianæ, intenso circa scrobiculum cordis compressivo, in regione etiam dorsi opposita molesto dolore, cephalalgia, interdum & vomitu stipatæ, plures invaserant, sed a sumpto purgante, & chinchinæ pariori etiam dosi facile curatæ; Virgo virginis annorum, eadem prehenso, a frigida potu die morbi sexto, cessante febre, mox sinistri lateris sævum puncturæ dolorem cum febre acuta, sputoque cruento incidit, quod in purulentum die octavo morbi mutatum, sumpta binis vicibus olei amygdalini recenter expressi dimidia uncia, copiose per alvum fuit ejectum, sicque cessante tussis ferocia, & calore præternaturali (cui antimonii diaphoretici larga dosi obviam ivi) ab iterato dicti olei usu, die nono convaleuit.

Post tot tandem pluvias cum jamjam Junius appropinquaret, senior aura comparuit, caloreque fortiori terram iterum exsiccat, Cereri autem & Floræ Bacchoque vires crescendi attulit; quæ serenitas, a pluviis tamen sæpius interrupta, calorque roto mense illo continuavit. Julius vero crebrioribus imbris & nimbis, zephyri vehementia subinde comitatis, infestus successit; quam humidam aeris constitutionem, Augustus etiam mensis induit, frigoreque insolito, sub euri dominio, austeriore reddidit, ut ita messis non tantum ferius inciperet, sed non exiguo etiam in periculo corruptionis versaretur, quam tamen blandior cæli facies, post Solis in signum Virginis progressum, satis exoptatam in vicinia nostra reddidit, ut quæ subsecuta fuit annonæ caritas, non tam Cereri deficienti, quam ad commune aliarum regionum exemplum composita, impiæ institorum avaritiæ imputari debuerit. Inclementior autem September, præter multiplicem ventorum variationem, diversam etiam aeris temperiem,

ut plurimum tamen humidam & frigidam produxerat, donec d. 5. Octobr. st. n. Sol discussis nubibus, decennio sereno nos reficeret: postea tamen austerior Favonius cum auri pluviis iterantibus multum frigoris impressisset, November præmaturum hyemis advenum dabat, crebrioresque nives spargebat, ita tamen ut varia tempestas subinde intercurreret, nebulis, pluviis, serenitate, ventisque modo ab occidentali, modo orientali aut meridionali plaga spirantibus molesta, atque hyemale usque ad solstitium continuans; quo præterlapso, zephyrus vehemens, pluviis stipatus, temperatiorem aerem effecerat.

Interea, mense nempe Junio & præsertim Julio, morbilli puerilem ætatem invaserant, per plurimosque lecto affixerant, non adeo difficulter tamen, temperatiori sub regimine, & absorbentium distorum ad diaphoreticorum blandorum, pulveris rubei Pannon. oculor. cancr. &c. usu curabiles; donec sub æquinoctium autumnale plane disparerent. In non paucis quidem hæctica dispositione, tussique pertinaci, sive ob diætæ errores, sive præexistente acriore sanguinis constitutionem superflite; diligentiori tamen sanguinem contemperantium usu, non neglectis, ubi opus, laxantibus, & quæ vermibus, quorum vestigia non raro notabantur, resistunt, tandem devictæ. Licet crebriora quoque funera puerilia numerare tum temporis datum fuerit, non tam mortis, nostrorum Medicorum artem haud adeo eludentis, malignitati, quam incuria potius, vel perversæ muliebri sapienriæ, aut medicamentorum imperitiæ adscribenda.

Cæterum rariores apud nos hoc tempore ægrotabant alii, nec epidemiorum morborum tyrannis major notabatur. Julius quidem febres quotidianas, tertianas, catarrhos pectori molestos, Augustus colicas, dysenterias; September præter cruenos hos fluxus, variolas majores, ulcerosas, (*Schafblatern* nostratibus dictas) Octobris initium strangurias seniles; adultus, cum subsequis Mensibus, pleuritides veras ac spurias; December catarrhos ad fauces ruentes (morbos omnes ex coarctata in sanguine sensim per tot aeris anomalias, frigiditas præsertim & humiditas, viscidiori lymphæ ortos, quæ tandem per varios in diætæ errores hic vel ibi stagnabat, aut etiam eandem ob causam, vel sponte in orgasmum concitabatur) alebat, non adeo mulri tamen eorum impetum experiebantur. Febres interdum præcipitantibus sic appellatis, chinchinæ autem pariori etiam dosi sumptæ facilius; catarrhi continuato expectorantium usui, non posthabita, quæ sæpe conjungebatur, febris intermittens cura, & corpore semper blande evacuato, cedebant; colicæ quæ flatuosa quidem dici merebatur, non sine convulsiva tamen labe erat, atque ideo lumborum conjuncto dolore & urinæ suppressione nephritidem simulabat, demulcentia & potissimum laxantia, sive ore sumpta, sive clysteris forma adhibita; dysenteria, tormentilla, vel catechu essentia aut extractum, cum paucio opio maritatum, & parca dosi sæpius assumptum, medebatur; variolæ benignissimæ, cum febrili tamen calore, vehementiori quandoque, paucarum tamen horarum spatium finito, invadentes, ulla fere sine medicina ode sensim sponte exsiccabantur; stranguriæ illæ, quæ visciditatem lymphæ in primis corrigunt, perque urinarios meatus educunt, uti essentia carminativa Wedeliana, spiritus nitri tincturæ cortic. aurantior. mixtus &c. Pleuritidi vero nostris in pharmacopoliis usualis pulvis, cum antimonio diaphoretico, lapillis gammatorum &c. medelam conferebant.

Constitutio Epidemica Basileensis Anni 1698.

D. D. JOANNIS JACOBI HARDERI.

Mense Febr. sub finem, cum brumæ alias rigorem adhuc experimus, sol calore suo primi veris delicias præcociter sperare fecit, quas cum Aprili dehinc, tempore destinato optabamus pleniores, anarulentas reddidit sævientis Eoli frigus, nivalisque ingruens tempestas, in Majum usque continuata, fructuum nociva pestis, nec tamen variolæ, quæ non modo tenellam, sed etiam adultiore ætate frequentissime infestabant, funestæ fuerunt apud nos, contra quam Sturgardiæ vidimus & audivimus, ubi complures materiæ malignitas, præmaturæ morti tradidit. Ingruentibus hinc pertinacibus, copiosisque pluviis, etiamsi sol desideratissimo suo calore, terram reliquis mensibus fovere studeret, usque tamen aquarum depluentium cohortes, ejus igni offecerunt, inde September efficaciam illius tam necessariam, magis experiebatur quam Augustus, uvæque minus maturæ, Octobri mense, infortunium tantum graviter luerunt, dysenteria non tam apud nos, quam in vicinia rusticam gentem crebro exercente.

November circa sui initium, candida nive arva utcunque tegebat, brumæ aliquali rigore, per ociduum, durante, quam mox intempestivus calor, udolus, cum pluviarum copia excepit, ad finem ejus tantam non durans pleuritidis, febriumque continuarum hic illic genitrix.

Mense Decembri crescente luna, etiam brumale frigus intendi ac durare cæpit, parili subitaneo udoso ac pluvioso calore, præter votum ac expectationem, scenam dehinc mutante, neque tamen morborum exitium frequentia, annus iste, vere anomalus, ferax fuit.

Constitutio Epidemica Berolinensis An. 1697.

D. DOCT. GUSTAVI CASIMIRI GAHRLIEP

von der Mullen.

Januarii Styli Gregoriani, gelu nonnunquam satis rigido, borea ut plurimum flante, pauca nive quandoque interspersa cæpit, quod ad quintum usque duravit, tunc succedente cauro paulum triduo continuo regelascens, 19no gelu redintegravit, & 21mum si exceperis, tolerabiliorem, ut & 28mum vulturno spirante remittentem, ad ipsum usque finem, ac subsequenti Febuarii 9num continuavit. A quo tempore rigor ille remisit, atque blandiori æthere, nonnunquam apprimè amæno, gelu interpolavit, ad 20mum usque, qui frigore rigidiore recrudescente, noctu præsertim, de die vero parum mitescente, ad finem ac porro quintum usque Martii transiit. A quo rigore paulatim desæviente, mitiora tempora veris prodromos, nebulas pluviis & sando intercalatas tulere, ad 14mum usque verna, sed ephemera serenitate & amœnitate commendabilem, succedente cum vulturno nubilo & horrido triduo, sed pluribus ad 24mum usque sua-

suavioribus pensato. Hic 24tus repedante vulturno variam & ingrati-
ram Aprili alias familiarem aeris intemperiem tulit, frigore, pluviis,
nive quandoque & grandine, nocturno quoque gelu nonnunquam di-
stinctam, ad 30mum usque adeoque ultimum durante sparsa noctu nive
copiosa, a succedente diurna serenitate ac aliquali amœnitate rursus
colliquata notabilem, primum sic trimestre grato fine terminantem.

Morbi hoc trimestri non adeo frequentes aut populariter grassan-
tes fuerunt, nisi forte ob variabile gelidum initio & horridum, hu-
midum postea plerumque & tempestuosum cælum, catarrhos quis aut
tusses febribus ut plurimum conitatas huc trahere velit, defluxiones
in uvulam & tonsillas, præteriti anni defluxionibus molestia & per-
tinacia analogas. Prætereaque pleuritides nonnullas, variolas inter-
spersas, paucos adultos, plures infantes adorientes, malignas quas-
dam ac periculosas, benignas plures, paucas lethales. Paralyfes
item & apoplexias quibusdam exitiosas, arthritides vagas scorbuti-
cas, ut & febres varias, quandoque & acutas & continuas, exan-
thematis etiam scorbuticam malignitatem testantes.

Aprilis temperato sed pluvioso sæculo exordio, unico interposito
sereniori die, nimirum secundo ad 9num usque nocturno gelu,
diurnisque nimbis ac inbribus horridum processit. Postea amœnio-
re paululum cælo, noctibus tamen adhuc gelidis, quandoque &
nivibus, pluviis ac ventis quibusdam variato, ad 19num transit
amœnitate verna & serenitate fere stabili cum succedentibus, 23io
solum frigido ac procelloso excepto, ad 30mum usque adeoque ul-
timum mensis, ablandientem.

Successit *Majus* frigore moderato interdum tamen, initio præfer-
tim borea interspirante, rigidiusculo: Postea sereno cælo admixtis
licet sub finem præcipue nonnullis pluviolis sic satis amœnus & ad
fertilitatem, 31mum eumque postremum, grandine nimis asperum
& nocivum si demseris, pronus.

Huic rursus *Junius* pari fere amœnitate ac serenitate, paucis se-
cundo forte & quinto blande rorantibus, 7mo & 8vo, illo turbido,
hoc Africo flante nimbo, 12mo & 24to imbre sæcundo arva ri-
gantibus, 26to imbri tonitru jungente, 27mo, Africo rursus pluvias
ipargente, udo variantibus diebus exceptis, conformis, totus prope
ad finem usque temperatus.

Morbos trimestre perinde non multos genuit. Præter enim febres
nonnullas, paucas intermittentes, pauciores continuas, & catarrha-
les paucissimas, variolas si demseris & epilepsias infantibus qui-
busdam infestas, rarissime tamen lethales, pleuritides quibusdam &
arthritides vagas scorbuticas, cardialgias, cephalæas, odontalgias &
asthmaticos affectus paucissimos, parum negotii Medicis fecerunt alii
morbi. Id quod aeris clementiæ adeo stabili Majo præsertim & Ju-
nio humores in laudabili ac moderato statu conservanti, nec nimio
æstu exagitantibus tribuendum esse reor.

Julius trimestris tertii initium pari cum præcedentibus amœnita-
te, clementia ac serenitate cæli, secundum & tertium sæcundis
imbribus temperans fecit; Verum sequenti sexto sudum diurnum
circa noctem horrendo tonitruum identidem roboante frigore, &
fulgeris fere continuis animos & oculos immensum perculit. Se-
ptimus quoque, octavus & decimus mitius tamen paulo, serenum
diei cælum vesperti tempestuoso tonitruo fœdarunt. Reliquum ad fi-
nem usque mensis vario, sed non adeo turbulento, udo tamen non-
nunquam & nimbo aere transit.

Talis quoque *Augusti*, 7mum, octavum, 10mum, 12mum, 16tum,
17mum, 30mum & 31mum, adeoque postremum, serenos & amœ-
nos dies, si exceperis, status fuit.

Nec procul ab his ultimis diebus abluit *Septembris* initium, pri-
mum nimirum biduum sic satis serenum & amœnum, cui quadriduum
successit, autumnii præludium, imbridium ac frigidum. Quod septi-
mus æstivum sudum æmulatus correxit, cui 8vus paulo frigidior, sed
adhuc & 9nus, 10mus, 11mus, ad 13vum usque, qui imbris ves-
pertinis aliquod interscenum inseruit, sereni successerunt, sequen-
tes ad 22dum usque ejusdem quo præcedentis tenoris, temperata
nimirum serenitate commendabiles, ut & reliqui ad 27mum usque,
paulo, cum sequentibus tribus postremis, turbidiorem, frigidiorum,
& aspersis subinde pluviis ac ventis asperiorum.

Rari admodum hoc trimestri fuere morbi, nec præter diarrhœas
atque dysenterias, utut pro proventu omnis generis fructuum valde,
DEO largiente, uberi, nec gula illecebris suis parcente admo-
dum paucas, tusses nonnullas, paucissimas febres, pleuriticos quos-
dam & asthmaticos affectus, nec non unum alterumve paralyseos &
arthritidis scorbuticæ casum, alii fere nulli occurrerunt.

October mixta pluviis frequentibus serenitate pauca accessit, ac
quadriduum hac ratione processit. Quintum serenum & amœnum to-
tum, sextus totus undosus secutus, sed septimus & sequentes ad us-
que mensis finem serenitate pene pares, præter nonum & ejus sequen-
tes cum sudo borea spirante frigidulos, 13mum roridum, 17mum im-
bre madentem, 24tum, 27mum & 28vum pluvias nonnullas spar-
gentes, 29num vero & 30mum sicque ultimum cæciam, frigoris in-
tensioris authorem ascendendo horridos, in procellam tandem valde
impetuofam prima *Novembris* degenerantem; Verum secundo & ter-
tio paululum desævientem. Quartus & quintus tranquilliores fuerunt
ac sereniores, rigidi tamen adhuc, sextus mane nebulosus, postea
præcedentibus similis, septimus frigidus ac nubilosus, octavus ad se-
quens usque mane nimbosus, ex quo serenior 9nus, 10mus primam
tulit glaciem ad noctem usque 12mi durante, pluviam subsequen-
tium 13tii & 14ti rursus liquatam. Quos 15to sudum admodum
gratum cum æstiva amœnitate quasi certans, sed ephemerum excep-
pit. Ab illa brevi serenitate matutinis & vespertinis pluviis, in
procellam 17mo exæstuavit horrendam 18vo quidem desinentem, sed
huius & sequentium antemeridianum cum pomeridiano, pluvias in-
ter & turbidum, siccum tamen cælum partiendo ad 25. usque, si
21mum serenum totum & amœnum excluderis, & 25tum sequentes
duos boreali sudo commendabiles. Tandem 28vus Divo Simoni Ju-
dæ dicatus frigidus & turbidus, 29nus pluviis horridis mixtus,
30mus demum serenus denuo totus, sed borea paulo acrius spirante
gelidus agmen dierum *Novembris* clausit. Successit *December* primo
die rigorem præcedentis prima nive sparsa temperans, at secundo
gelu redintegrans, sequentibus cum nive pluvias alternavit ad 11mum
usque, qui cauro aspirante raro gelicidio gelu satis intensum sub-
stituit, qui sequens nivem rursus submisit, atque hinc, borea cau-
ro succedente sequentes duos gelu prius moderatum, decimo sexto
in rigidum valde degenerans, decimo septimo nive copiosa paulo

temperatius, decimo octavo vero & vigesimo magis, accedente co-
piosa nive, invalescens, vigesimo primo rursus, vento remittente
ac nive repedante, mitescens. Triduum sequens mitius adhuc, vi-
gesimotertio pluvias immiscuit ad vespem usque vigesimi quarti
sereniorum at gelidiorem, subsequente quadriduo vehementi gelu,
vigesimo nono demum remittente ac post nebulam toto die trigesi-
mo cælum obscurantem; trigesimoprimum vero discussa nebula sudo
redintegrato simulque gelu reddente ultimum hoc trimestre sicque
totum annum 1697. terminante.

Morbi hoc ultimo trimestri paulo quam præcedentibus frequentio-
res fuerunt, ob ætheris & aeris, nunc sereni, nunc turbidi, nunc
sicci, nunc humidi ac pluviosi, nunc tranquilli, nunc turbulenti &
procellosi, nunc temperati ac remissi, nunc gelidi ac horridi, var-
ie invicem alternantis, sicque pro diversitate constitutionis suæ,
humorum quoque diathesi & crasi, communicantis tum per in-
spirationem, tum per ambientes, & porros corporis subeuntes va-
riorum tam ætheris, quam aeris miasmatum particulas, diversis
forte ut formis sic qualitatibus instructas diversimode moventibus,
alternantibus, ac ad varias ebullitiones, orgasmos, metastases, quan-
doque sed raro in melius, sæpius in pejus disponentibus atomis,
mutantis. Hinc exorti diverso tempore diversi morbi Medicorum
animos & curas exercuerunt. Inter quos potiores fuerunt febres var-
iæ, tum intermittentes, tum continuæ, hæque inter nonnullas
etiam malignæ, exanthematibus quoque variis, purpura, morbillis
& variolis stipatæ, non tamen adeo frequentes ut epidemicarum no-
men, iusto titulo inerentur; præterea catarrhales, tussi, vertigine,
odontalgias, inflammationibus gutturis & tonsillarum, uvulæ laxa-
tionibus, angina, suffocationibus, hypochondriacas imitantibus, præ-
cordiorum oppressionibus scorbuto familiaribus, comitatæ, arthriti-
cæ, pleuriticæ, nephriticæ, colicæ passiones, epilepsia, sed raræ,
ut & paralyfes tam particulares quam universales, apoplexiæ & hæ
inter quædam funestæ & lethales.

Constitutio epidemica Berolinensis An. 1698.

Dn. D. GUSTAVI CASIMIRI GAHRLIEP

von der Mullen.

Primum mensis Januarii st. Greg. biduum serenum ac gelidum re-
missius excepit degelascens ac pluviosum sex dierum intervallum.
Nono temperato diei decimus successit frigidus pauca nive canescens
dies, triduo turbido in boream tandem, satis vehementer exæstuan-
tem, despumante comitatus, ac altero triduo mitiori nivibus, ne-
bula ac pluviis ex parte interpolato exceptas. Inde ingravescentes paul-
atim gelu vulturno boreæ succedente vigesimo mensis die, octiduum
continuavit, postea mitius aliquanto actum ac nives glaciei delique-
scenti interspersæ, donec repedante una cum aquilone, ultimis hujus
primi mensis ac quatuor Februarii diebus graviori gelu serenius cæl-
um illuxit; mox vero rursus remittente, ac in pluvia nivi mixta fa-
tiscente obscurum æther ad decimum septimum usque penitus dege-
lantem perdurans. Inde gelu euro flante paulatim denno vires resu-
mere cepit, ac succedente aquilone, & aquiloni tandem apartia,
huic vere rursus euro, valide insurgente paucis tantum intermixtis
nivibus ac paucioribus blandis remissionibus ad finem usque Februa-
rii & sequentis Martii nonum continuavit. Tunc verna de die amœ-
nitas, sereno æthere ridens, austro aspirante advefta, ablandiri
quadriduum visa est; noctibus interea adhuc gelidis subsecutum,
borea pristinam recuperante sedem, gelu minantibus, euroque boreæ
succedente æther, unico vigesimo septimo sereno ac temperato die
excepto, ad trigessimum usque, primum Paschatis Gregoriani diem
festum turbantibus, qui ipse a nocte gelida, reducta aliquali tem-
perie, sequentem medium festi ac ultimum mensis ut & trimestri
huius primi diem sudo ac sereno aere beavit.

Morbos primum hoc trimestre, præter scorbutum indigenam, pro
varia aeris mutatione varios exhibuit, quos inter febres tam inter-
mittentes, quam continuas, eæque ardentes satis frequentes, ac quasi
epidemicæ, malignæ quoque nonnullæ variolis, præsertim confluen-
tibus, uti dicuntur conspicuæ, eminere valde nonnullis infestæ ac
periculosa, pleuritides hisque affines affectus, peripneumoniarum hæ-
miopæ nonnunquam comitatæ, & catarrhales, variis defluxionibus
molestæ: tusses contumaces, asthmaticæ quandoque & suffocativæ,
arthritides vagæ, hypochondriacæ, colicæ, nephriticæ passiones &
hystericæ, sed hæ posteriores prioribus rariores.

Aprilis primus secundi trimestris, festique prædicti Paschatis po-
stremus dies æstivum mane æmulatus sudum a meridie primo toni-
tru fat gravis frigore animos amœnitate ac festivitate diei in hor-
tos & campos prosectorum, atque ludis & genio indulgentium valide
perculit, subsequentibus hunc primum pluribus ad 28. usque Martii
continuavit serenus ac amœnis diebus, noctibus interea gelidis in-
tercalatis, prima fronte ablandientibus, muta vero vigesima octava
sparsis tota die pluviolis faciem variam, ut plurimum turbidam,
horridam ac inamœnam Aprili genuinam induit.

Quam etiam primus Maji retinuit, & paucis interfertis sudis,
ut 2. 5. 10. 17. 23. ad 27mum usque continuavit, qui vigesimus se-
ptimus verna temperie ac serenitate acceptus, cum sequentibus na-
tivam huic mensi gratiam redintegravit.

Eademque sequentem Junium, (octavo solum excepto, cauro
nimirum amœnitatem præcedentium pluviis interspersis turbante,
ac duodecima cum successore decimo quarto in turbidum & undosum
degenerante) serenis ac amœnis, nec nisi paucissimis nonnun-
quam ventis ac pluviolis paululum exasperatis, ad ipsum usque finem
commendavit.

Secundum hoc trimestre cæli benignioris ac stabilioris favore
morborum quoque ratione mitius aliquanto priori egit: præter enim
scorbuticos quosdam affectus, febres, catharrhales quoque nonnullas
sparsim infestantes, acutas & ardentes paucas, malignas raras mor-
billis subinde sociatas, hypochondriacas nonnullas passiones, pleu-
ritides paucissimas, asthmata, cardialgias ac cephalæas, vix alios
produxit.

Julius, præcedentis Junii sudum continuando, huic ad decimum ter-
tium usque duranti pluviosum, & quandoque nimbosum ac subfrigi-
dum triduum succenturiavit, cui triduum rursus serenum ac gratum
successit, a biduo turbidiori paulo & inconstanti, vento ac plu-
viis

viis subinde interpellato, exceptum recuperata tamen pristina amentitate, uno forte alterove paululum degenerantibus ac pluvias nonnullas aspergentibus, ad trigessimum primum usque, adeoque ultimum mensis continuavit.

Augustus mox ab ingressu procella turbatus, severiorem paulo frontem induit, ac quinto solum sudo & temperato, ut & decimo inter serenum antemeridianum ac pluviosum & tonitru fragoso horridum pomeridianum pensum suum partiente, nec non vigesimum octavum æstivam adhuc amentitatem redolente, paucisque aliis paulo mitioribus exceptis, totus varius, turbidus, frigidus, pluviosus & nimbosus fuit, unico postremo trigesimo primo sereno & amentis gratiæ pristinae factam quasi jacturam quadantenus reparante, ac

Subsequenti Septembri conservandam tradente, qui eam septimo, octavo & nono a tonitru nocturno frigidis & plurimum pluviosis, tanquam triduo degeneri decimoquinto, decimosexto & decimosextimo turbido rursus & triduo, ut & vigesimoprimum & vigesimosecundo ejusdem farinae, biduo exclusis, ad vigesimumquartum usque servavit intemeratam; donec autumnus tempestuosus & inconstanti indoli cedens horridiorem ac tempestuosam assumpsit larvam.

Morbi hoc tertio trimestri vario & mutabili frequentiores paulo quam secundo fuerunt, febres præsertim tam benignæ quam malignæ, symptomatibus varii generis stipatæ, rarius intermittentes, sæpius continuæ, & ardentes, catarrhales quoque & pleuriticae in hæcticam & phthisin proclives, malignæ quoque, aphthis, quandoque purpura, nonnunquam morbillis, frequentius variolis, raro petechiis, sæpius infames, lethales quoque & epidemicae grassantes; & has præter cephalalgia, cardialgia, asthma, arthritides statæ & vagæ intercurrentes.

October ultimi trimestris primus detracta antecessori suo horrida, quam sub exordio sumpserat, larva, gratiori vultu scenam ingressus, sexto die æstivæ amentitatis personam ad idem usque serena & exporrecta fronte egit. Exinde paulo austerior nubilo ut plurimum ac ventoso cælo varius, vigesimo sexto & vigesimosexto biduo sereno præmisso, vigesimo octavo, primam sparsit nivem, mox in pluviam postea fatiscentem, nocte succedente gelida, pruina a sudo gelascente exceptam tulit, cui biduum successit amentum ac temperatum, subsequente turbido mane cælo trigesimo primo in pluvias tonitru hoc tempore insolito comitatus, circa noctem deficiens.

November initio inconstans, mox euro instante serenior gelu induxit, remissus quidem primo nebulis subinde intermixtis, circa quam tamen aquilone irruente satis rigidum. Nivem copiosam valde præter expectationem cauro sufflante in horridum & intensum gelu quinque dies durans erupit; decimosexto tamen desævienis noctu remittere, ac subsequente decimosextimo sudo penitus degelare coepit. Inde rursus instabilis, nunc turbido cælo asperior, nunc sereno temperatior, post nives vigesimotertio denuo sparsas, vigesimoquarto gelu satis intensum redintegavit, ac ad finem prope mensis continuavit, postremo mensis die libanoto aspirante, degelascens.

December a primo ad octavum paulo gelidiorem, varius, pluviosus ac nimbosus, ab octavo ad decimum quartum gelu, sed interspersis, utut raris nivibus mite ac temperatum induxit, a decimoquarto præcedentibus algidiore varium asperum, ventis subinde ac nimbis horridum cælum ad finem usque mensis continuavit, tandemque circa vespem trigessimoprimum, adeoque ultimi hujus mensis & anni diei, senis tonitru, hoc anni tempore plane insoliti ac portentosi, pluribusque funesti fragoribus anno huic 1689. valédixit.

Morbi hoc trimestri præter febres quasdam continuas ardentes, ab omni malignitate haud vacuas, purpura & morbillis eam prodeuntibus, catarrhales satis frequentes, tussi contumaci & ferina, catarrhis & defluxionibus scorbuticis debita, valde infestæ & molestæ fuerunt, variæ, inconstanti, horridæ ac immiti cæli constitutioni natales suos debentes. Præterea arthritides vagæ, præsertim scorbuticæ, pleuritides, diarrhææ & lenteria frequentes, dyenteria tamen raræ? pro proventu prunorum hoc autumno valde uberi, cardialgiæ, & hæmoptoes nonnullæ. Sub fine tamen & soporosi ac comatosi nonnulli affectus, quibusdam lethales, eidem frigida ac humida aeris intemperiei hac hyeme prædominanti, omni procul dubio imputandi.

Constitutio Epidemica Sangallensis, finis Anni 1696. & principio 1697.
Dn. Doct. SYLVESTRI SAMUELIS ANHORNII,
DE HARTVISS.

Vix dysenteria æstiva grassari desit, autumnus successit, ventis austrinis die nocteque spirantibus, uvis fructibusque maturandis coaptatus, infantibus vero in hoc fatalis, dum insolito tepore diurno atque nocturno, ad turgescientiam motus sanguis puerorum tenerior, morbillos variolasque exclusit, quas perpaucis effugisse datum fuit. Fuerunt, qui febre continua cum inquietudine, delirio, multis deterioris notæ symptomatibus ad septimum diem dubie agitati, exhibitis ex aq. ulmar. CC. citrat. ac diaphoreticis temperatis ex magist. antimon. diaph. CC. ph. ppt. & unicorn. fossili, per sudorem vel hæmorrhagiam subsecuta crisi convalescerunt. Plures vix ac auræ liberiori commissi, insuper morbillis, hosque adhuc excipientibus variolis correpti fuerunt. Declinante autumno, & æstu remittente, mixtim grassari coeperunt febres & variolæ, plurimum tamen morbilli. Mense Novembri & Decembri initio varia fuit cæli facies, tempestas aquilonia, nebulosa, pluviosa, frigidior, morbillos qui vix superarunt, jam cum variolis colluctare, febricitantes vix non sunt, & morbilli perpauci, variolæ solæ, candida veste terra tecta, magis magisque propullularunt. Fuerunt autem optimæ indolis, cito erumpentes, rubræ, molles, fastigiatae, distinctæ, cito maturæ, nec foveas relinquentes.

Deterior fors fuit illorum, qui serius, non quidem matura tempestate, in principio anni 1697. iidem decubuerunt. In plurimis copiosiores ac confluentes visæ sunt. Multi cum febre intensa, convulsionibus, ventris meteorismo & dolore intenso, ac alvo contipatissima, pustulis tandem violaceis, lividis, nigris notati interierunt. Id vero est quod notari meretur, non alios præter lanionum infantes, & quidem trinos quandoque, & binos una in domo (ceu quod sordibus & squalore ex pellibus ad exsicandum expositis, eruore & carne præ aliis sordescant illorum domus, vel quod minus ac alij curam infantum habere possint) hoc ventris meteoris-

mo petechiisque lividis fuisse correptos, atque sublato. Si quando in aliis etiam domibus variolæ bonæ notæ, tres, quatuorve hujusmodi maculas interperfas habuerunt, mox illæ lanceola parumper scarificata, digestivo suppurata, & ad separationem escharæ perductæ fuerunt; hac tandem separata, fovea illa nunquam non instar fonticuli nunc latior, nunc profundior relicta nova carne expleta atque consolidata fuit.

Inter adultos hoc hyemis decursu, quamvis omnia frigore horruerint, nihil epidemii observatum est.

Ver vario ingruit cælo, æstum subitaneum pluviae repentinæ cum ventis septentrionalibus exceperunt. Discordiæ accesserunt a vicinis commotæ, quæ eruentum nonnullis excidium minitari visæ sunt. Inter sexum muliebrem hoc errore percussum crebri abortus conspiciuntur. Nonnullis tempesta venæ sectio & instituti sudores cum bezoardicis, quæ sanguinis coagulum tollunt, bono auxilio fuerunt. Nati abhinc infantes multi convulsionibus occubuerunt. Viri vero insuetas horrido imbribus cælo excubias diu noctuque strenue agentes, omnem tempestatem innoxie tolerarunt. Perpaucos tussis prævia corripuit.

Æstas & autumnus ex frequentibus quamvis pluviiis injucundi, insalubres non adeo fuerunt.

Mense Septembri apoplexia nonnullos corripuit.

Fœmina provectioris ætatis ex paralyti lateris dextri, præmisso vomitorio, sudoriferis atque specificis in & externis apoplecticis usitatis, intra triduum convaleuit.

In alia nobilis familiæ Matrona paralytis manus dextræ cum intercepta bihorium loquela, aquis aut apoplecticis, frictionibus, sudoriferis &c. restituta fuit.

Vir septuagenario major, Reip. Senator, recidivam passus ex instituto vomitu loquelam statim temperavit, at paralyticus in latere sinistro permanet, dum per phlogoses & stragulas ferendi impotentiam, propter tuiorem sensumque hepatis exquisitum, ad sudorem se componere hætenus non voluit, qui tamen præterito anno, toto latere paralyticus, sudoribus quotidie institutis, integre convaleuit. Interim hepatis inflammationi convenientibus, in & externis prospicitur, inter quæ emplastrum Norimbergense impositum, ceu præsentissimum sibi paregoricum, summe extollit. Fotus etiam particulares cum decocto herbarum, non sine levamine instituuntur.

Alius sexagenarius inter pocula sensu motuque privatus concidit, cum stertore spiritum duxit, in manu nullus, pede vero aliquis motus restabat, concitato syrupo emetico vomitu, & deinceps in usum vocatis frictionibus, lotionibus, aliisque usitatis ant-apoplecticis, paucas intra hebdomadas in pristinum rediit.

Neogamus dissolute vivens, dum in templo sacris interesset, subito expalluit, concidit, & æquos domum deportatur, per hypocaustum tractus varieque agitatus, ubique elanguidus movere ne digritum valuit, pulsus fuit tardus & debilis, externa frigeant, jacuit stertens a nona matutina ad primam, sine sensu & motu, ingesta difficulter deglutiit; ego accersitus ex uno cochleari syrupi emet. porrexi gr. iii. tart. emet. Operatio demum post bihorium successit. Phlegmata porracea frequenti vomitu reddidit; sudore toto corpore diffusus, sanguis e naribus protrusus est, sicque corporis motus, linguæ ac rationis usus paulatim redierunt.

Infeliciores fors fuit puellæ alias præ cæteris venustæ, quæ novendecim annos nata menses nunquam vidit. Hinc sensum expalluit, macilentior, tristior & difficilis ad motum evasit, scabie vexata, unguenta tartarea cum mercurio præcipitato adhibuit, tempestate frigidior pluviosa, vestibus male munita e domo exiens frigori pluviiisque pro expediendis negotiis incaute se credidit; post horam domum deportatur æquos sensu motuque privata stertens, & apoplectica, crebroque vomendi tentata conatu. Vicinus vocatur chirurgus, qui venam ipsi secit. Sanguis non nisi guttatim prodiit. Dantur spiritus cerasorum, aqua vitæ naribus spirituosâ admovetur. Capiti imponitur aq. Reginae Hungariæ; interim ego advocatus syrupum emeticum propinari jubeo, quem vix medium deglutiit, dum expectatur operatio, accedunt convulsiones, quæ miseræ circa vespem finem vitæ faciunt.

Constitutio Epidemica Pisoniensis Annorum MDCXCV. MDCXCVI. MDCXCVII.

Dn. D. CAROLI RAYGERI.

Quantum interfit Medico nosse & observare aeris constitutionem ac inde resultantem morbos, jam suo tempore agnovit graviterque inculcavit Hippocrates, dum ita librum suum de Aer. Aqu. & Loc. auspiciatur: *Quicumque artem Medicam integre assequi velit, primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat. Non enim simile quicquam in illis existit, verum differunt invicem propter varias, quæ in illis fiunt, mutationes.* Hinc qui morbi singulis anni temporibus proprii qualesque fiant in illis mutationes, tam prolixè tota describit sectione III. Aphorismorum. Nec dubitavit Galenus τὸ δῆλον in morbis ambientis non aeris constitutionem appellare, quam quidem sententiam fusiùs examinat & pertractat Celeberrimus D. D. Melchior Sebiz. p. m. in *Dissertatione sua de eo quod Divinum est in morbis*. Sane rem tam salutarem rei que medicæ summopere proficuum jam pridem mecum animo revolvens, statim ac manum praxi admovi, constitui singulas aeris & temporum vices indeque exortorum morborum generationes & mutationes diligenter observare, annuatim colligere ac endemiis & epidemiis meis Hungariæ, cum tempore prodituris inferere. Id cum etiam a XXV. annis scilicet ad annum usque 1695. pro meis usibus præstitissem, communicatur mihi a Perillutri ac Magifico Domino Præsede laudatissimum suum institutum, quo voluit, ut, qualis in diversis regionibus & provinciis fuerit aeris constitutio epidemica, observaretur, & quotannis ephemeridibus curiosis infereretur. Quo intellecto substiti in privato studio, & quæ ab illo tempore hac in materia a me observata atque annotata in publicum contribuere decrevi, modo initium facturus ab

Anno M. DC. XCV.

Cujus constitutio hic Pisonii in Hungaria fuit talis.

Hæc rigidissima, nix plurima, gelu in Martium usque durans. Frigus immediate post solstitium incepit, & toto Januario sine re-

ne remissione continuavit, nives cecidere supra nives, gelu supra gelu. Nec mitior Februarius, ipseque Martius adhuc frigore & gelu horridus.

Mense Jan. plurimos observavi ex castris redeuntes colica laborasse convulsiva; absque dubio febribus autumnalibus, partim non bene curatis, partim male circa solstitium hybernium judicatis. Raro quartana scilicet febris utut tractetur, recedit, quin vel hæmorrhagiam narium, vel laterum duritiem, vel pedum tumorem œdematosum, vel languorem & dolorem artuum, sæpissime vero colicam convulsivam post se relinquit. Mense Febuario & Martio grassabatur quoddam genus febrium cum latente malignitate. Imponebat plurimis catarrhus cum dolore capitis gravativo, febricula lenta, tussi sicca, coryza vehementi invadens: mox nona vel nonnunquam undecima demum post primam invasionem die exasperari cepit morbus, & graviora reddi symptomata; accessere enim vigiliæ, deliria, nonnunquam ipsæ petechiæ, subsequente morte. Servati autem omnes qui non tantum alexipharmaca ab initio adhibuere, sed & ea usque ad nonum vel decimum diem continuavere.

Ab æquinoctio vernali usque ad solstitium æstivum tempus varium, mox frigidum, mox calidum, modo pluviosum, modo serenum. Initium Aprilis adhuc brumale, circa medium vero & finem calor prope æstivus. Successit Majus pluviis mixtus, cum frigore & calore alternante. Prima & secunda dies Junii ventis turbida, tertia serenari de nocte cepit, cælum cum pruina matutina valde noxia, id quod apud nos valde rarum, & vix a seculo observatum. Segetibus nihil nocuit hoc gelu matutinum, nec destructæ vineæ, præterquam illæ quæ versus plagam occidentalem sitæ, quarta Jun. iterum pruina, sed plane innocua. Septima ros mane cecidit purpurei coloris, observatus in foliis arborum & vitium, ut & hominum in vineis laborantium lintheaminibus, in quibus, (prout ego observavi) exacte referebat colorem macularum ex succo mororum aut ceraforum. Circa id tempus morbi fuere nulli, ut plerunque fieri solet mense Junio, febres quidem comparebant tertianæ, sed adeo mites, ut etiam in quamplurimis post tertium vel quartum paroxysmum sine medicamentis aut sola purgatione & venæ sectione adhibita cessaverint. Variolis quoque corripiebantur parvuli parvulæque, sed illæ cum nullis feris aut gravioribus symptomatibus, hinc omnes servati qui non incuria neglecti aut minus rite, prout a plebe quandoque fieri solet, tractati fuere.

Successit æstas plus frigida quam calida, magis humida quam sicca: Finis tamen Junii & initium Julii gaudebant aliqua serenitate, mox nubibus exasperatum cælum & largissimam aliquot diebus effudit pluviam; unde intumescens Danubius littore supergressus longe lateque se per prata & agros diffudit cum maximo damno rucolarum, tam fensilecorum quam messorum. Rediit sub initium Augusti calor, isque intensissimus, sed ultra septem vel novem dies non perdurans, insequentibus pluviis usque ad Octobrem. Inter istas tam varias mutationes vix tamen aliquid morborum observatum; nisi quod in Septembri plurimi infantes, adulti non item, correpti fuerint dysenteria, iique ferme omnes lactantes, credo ex lymphâ plus justo acriori ad intestina delata illaque lædente. Errorem quippe illi in esu fructuum hortorum non committere poterant, nec committere nutrices sedulo examinata & observata, paucissimi tamen periire, sed omnes convenienter clysteriis, in primis ex lacte & decocto capitis vervecini tractati, convalescere.

Post æquinoctium, qui secutus autumnus, ferme totus fuit pluviosus. October subinde serenus. November inæqualis, jam ad hyemem inclinans, & prout reliquum Decembris usque ad solstitium, frigidus cum floccis nivium & creberrimis pluviis. Hinc vinum nec quantitate nec qualitate laudabile crevit. Circa initium Octobris frequenter hinc inde in civitate comparuere febres erraticæ nullum typum servantes, invadebant prope omnes cum frigore aliquando trium horarum, insequente calore ultra horas 15. durante, post apyrexiam aliquot saltem interjectis horis nova febris affligebat. Memini me habuisse quendam, in quo calor ultra 48. horas duravit, cum terribili capitis dolore, siti vehemente, squalore linguæ & faucium, summaque virium debilitate, ita ut febrem continuam fore mernerim; tamen post venæ sectionem remisit calor, morbusque in melius mutatus. In alia Illustrissima persona similem protractionem paroxysmi primi notavi, similiter post venæ sectionem remittentem & intermittentem; sed tertia die redeuntem, hinc propinatus cortex Peruvianus in aqua cichorii alvum movit, id quod nunquam in aliis, ausim dicere millenis, cui corticem hunc exhibui, factum observavi. Credidi prima vice fortuito factum, turgente forte & ad exitum per se tendente materia vitiosa in corpore, sed & post secundam, imo etiam post tertiam exhibitionem idem factum, movit autem alvum semper sexies, septies sine nausea. Alius pariter febris corripiebatur levi ab initio & cito remittente. Tertia die media nocte in lecto suo dormientem horribile invasit frigus trium vel quatuor horarum spatio, subsequente calore in alteram noctem perdurante, cum pedis dextri ingenti dolore, accepit sudoriferum, unde optime sudavit, moxque apparuit ingens rubedo & inflammatio in pede dolente, factumque erysipelas, quod facile, convenientibus remediis tractatum, sublatum est.

Anno M. DC. XCVI.

Jurasset quispiam permutata fuisse tempora; præteritam æstatem fuisse brumam; nunc autem æstatis vicem obire hyemem, usque adeo in bruma nihil brumale, & in frigidissimis alias mensibus, nullum frigus, nullum gelu, nullæ nives, breviter hyems fuit clementissima. Januarius aliquo modo ventis turbibus, nebuloſus, pluviosus. Februarius quasi totus serenus, siccus, sine notabili frigore, nisi matutino tempore, ubi aura parum frigidiuscula, mox surgente sole temperata. Hinc ad æquinoctium usque plane similis Martius, nisi quod parum ventosior, hinc etiam salubrior. Nam totis hisce mensibus vix præter catarrhos aliquid notabile occurrit in medicina. Post æquinoctium vero & aer & morbi cœpere mutari. In fine quippe Martii longe majora frigora, major cœli inclementia, de nocte gelu & nives, minus tamen durabiles, sed in pluviâ ferme continuas de die abeuntes. Nec mitior Aprilis sua natura variabilis, sub finem tamen siccior. Meliora tempora sperabantur sub gemellis, sed & Majus ipse cum initio Junii usque ad solstitium valde inæqualis. Nunc grata & vernalia serenatum pollicebatur

Sydenham Opera Medica.

cælum, tempora, mox atris iterum inhorruit nubibus, tempusque reddit turbato aere frigidiusque pluviis minus vernale, minus majale. Hinc non mirum, cum ver simile factum fuerit hyemini, non vernaes sed hyemales fuisse exortas ægritudines.

Nam quas in hyemem relegavit pleuritides Hippocrates III. Aphor. 23. eas circa hæc tempora deprehendere licuit valde frequentes. Inter has in primis notabilis fuit illa cujusdam Generalis quartiorum Magistris (ut communiter vocatur) maligna ferisque comitata symptomatibus. Excefferat ille multum in vino & comestationibus tempore bacchanaliorum, hinc catharrum acquisivit cum tussi vehemente & lateris puncturis. Aperta vena, suasi purgationem, quam tamen vocatus Medicus dissuasit. Ille autem reluctans consuetum sibi sumpsit laxativum, unde sibi videbatur melius valere, sed mox sequenti nocte omnia in deterius, aucta in summo gradu febris, accessit furibundum delirium, sputum crassum, crudum, sanguineum, idque perpaucum, quæ omnia extrema minabantur. Vocatus ego, exhibui fodoriferum, jussi applicari veficatoria, dedi oleum lini, sic remisere symptomata, illeque ex lethi faucibus erutus ad castra perrexit. In Majo notavi in nonnullis febres malignas, cum exanthematibus, minime tamen funestas, nisi in duabus personis; in servo quodam qui illa pro morbillis habuit, nec aliud nisi myrrham & semen napi accepit; hinc accedentibus gravioribus symptomatibus expiravit. Altera erat puerpera quæ febrem lacteam aut puerperalem esse credens, neglectis alexipharmacis solum potum aquæ chamæpythios cum saccharo adhibuit, nostris puerperis in hoc casu consuetum, tandem conspectu exanthematum hinc inde erumpentium perterrita Medicum vocavit quidem, sed nimis tarde, accedente enim diarrhœa, delirio, & tandem convulsione, mortua.

Jam ad æstatem devenio, in qua mense Julio & Augusto subinde calor intensus, nonnunquam, sed raro durans, intermixtis subinde pluviis frigidis usque in medium Septembrem. Notabiles erant mense Augusto dysenteria in infantibus lactantibus & ablactatis, plane ut ante annum, valde frequentes, sed ut plurimum funestæ, statim enim post unam vel alteram dejectionem comparuit sanguis, mox extrema debilitas & mors, paucissimi ad decimum servati, qui tamen mortui; adultiores facilius curabantur. Valde insuper contagiosa fuit ista dysenteria, nam facile corripiebat adstantes & infantibus ministrantes, ex quibus tamen nulli obiere. Credo malignitatis hanc litem non fuisse expertem, quæ quidem renellulis mortem intulit ob nimis teneram constitutionem, in adultis autem ita vim exerere nequivit, sed facile fuit suppressa.

Tandem in autumnio comparuit æstas. Scilicet ab æquinoctio usque ad Decembrem, per totum Octobrem & Nov. serenitas, cum frigidiuscula tamen aura matutina; hinc præter spem etiam melius crevit vinum quam ante annum, non tamen in abundantia aut illa bonitate prout alias apud nos fieri solet. In Decembri mutatus aer tempusque redditum turbidum ventis, nebulis atque pluviis, duodecima cecidit nix alta, quam ita solidavit subsequens rigidissimum frigus, ut supercadentibus consequenter aliis nivibus, prima manserit usque in Aprilem sequentis Anni. Morbi circa hoc tempus nulli notabiles. Hinc progredior ad

Annum M. DC. XCVII.

Hujus initium fuit sicut finis præteriti. Scilicet a solstitio hyemali usque ad æquinoctium vernale, frigus acerrimum sine remissione, congelatus Danubius statim in Januario, mansitque pons iste glacialis ultra octo septimanas firmus & constans, quod alias valde rarum apud nos. Fuit insuper hoc memorabile, quod sub densissimis pariter ac profundissimis nivibus terra semper manserit aperta, ita ut, remotis illis, hæc non aliter ac in vere fodi potuerit. Periire & computruere sub hac mole nivium fere omnes segetes & olera hortensia, frigus hyemale alia tolerantia, quæ, liquefactis nivibus, non aliter ac mucago quadam viridis terræ incubabant, ac in lutum resolvebantur; non levi insequente in primis frumenti penuria. Cæterum quod Hippocrates III. Aphor. 7. dicit, Magnis siccitatibus fieri morbos acutos, hoc vice versa hisce temporibus meliori jure dici potuisset, de magnis frigoribus. Iisdemque durantibus circa finem Februarii; febres acutæ malignæ per totam grassabantur civitatem. Invadebant plerisque levissimo rigore succedente calore non adeo forti & quandoque iterum remittente primis diebus, mox circa quartum vel sextum diem augeri cœpit calor, & notæ hinc inde superficie cutis apparuere malignitatis. Pulsus ab initio valde erat sanorum similis, ut & urinæ, sed ubi calor auctus rubicundæ instar sanguinis factæ. Deliria circa nonum vel decimum diem comparuere, in quibusdam vehementia & ad decimum septimum usque durantia, in quibusdam remissiora & breviora. Maculæ erant parvæ instar morsus pulicum, obscure purpurascens, circa decimum octavum aut etiam circa vigesimum primum disparescentes. Non valde lethales erant hæc febres, sed supra modum contagiosæ (quod alias non semper fieri solet) nam in aliquot ædibus ne unum omisit, quem non corripuisset, raro in una aut altera persona cessavit. Duravit hæc lues in Majum usque, ubi incalescente aere remisit.

Hyemem excepit ver, sed & hujus initia adhuc satis ventis & nivibus turbida. Successit Aprilis totus serenus, siccus, absque pluviis cum calore pro tempore insolito. Majus variabilis, nunc calidus, nunc frigidus, mox serenus, iterum pluviosus, talis etiam totus Junius. Circa hæc tempora vix ullus notabilis occurrit morbus cessantibus etiam, ut supra dictum, febribus malignis.

Æstas ferme prioris anni æstati similis; mediocriter calida, & matutinis horis subinde frigida, vicesima nona Augusti, trigesima & trigesima prima mane pruina fuerunt, sed plane innocuæ, nostrates appellant *ein Wasser Reiff*, id quod tamen apud nos insolitum, ubi tales pruinae raro ante festum S. Michaelis observantur. Hoc tempore frequentes erant icteri, qui flavedine sua plurimos deformabant. Sentiebant, qui corripiebantur, aliquam cordis compressionem, nauseam, anorexiam, & non raro vomitum, mox flavo colore toto corpore perfundebantur, sed qua velocitate venit, eadem iterum adivit. Post unum vel alterum laxativum disparuit flavedo, rediitque sanitas cum bono appetitu.

Qui subsecutus autumnus semper erat variabilis & inconstans, usque in Decembrem, cum quo hyemis ante hyemem, id est ante solstitium gelu & nivibus suum sumpsit initium. Febres quæ circa hoc tempus grassabantur ut plurimum erant tertianæ duplices, raro quar-

tanæ, & præter morem autumnalium nec longæ nec lethales, sed convenienter tractatæ, facile curabantur.

Constitutio Epidemica Augustana Anni 1701. & sequentium.

Dn. D. LUCÆ SCHROECKII.

Licet initium anni 1701. frigidum comparuisset, triduo tamen post mitior aeris temperies, submutabili ventorum, zephyri tamen prævalentis, crebrioresque nives, subinde vero etiam pluvias adducens flatu, excepit, utque dum ante, & circa æquinoctium vernale magis constantem serenitatem eurus largiretur; paulo post ventis priorem inconstantiam resumentibus, hyememque protractiorem, quin & gravem terræ siccitatem circa Solis in Tauri signum ingressum, cum sensibili frigoris molestia, ætheri quidem cælo, producentibus, ut Cereris etiam, Pomonæ & Floræ sinus tardius panderetur, atque Maji principium vernalis amœnitatis parum ostenderet, quæ postea eo largior comparuit, atque, Gemellorum signum cum Sol occupasset, aerem multum delinivit, & in tantum calefecit, ut, ni zephyrus, euronotus, & austri subinde pluvias interspersissent, nimia siccitate, præcipue quia ventorum perpetuus quasi motus continuabat, terra plurimum laborasset. Interea prior morborum in anno prægresso observatorum facies continuavit, quam itaque depingere superfluum foret, variolarum puta, febrium petechialium, tussisque humidæ. In mense Februario insuper duobusque eum excipientibus, pleuritides veræ in suppurationem abeuntes, sed diligenti pectoralium & diaphoreticorum temperatorum usu, sine etiam venæ sectione, curabiles accesserunt; quibus in nonnullis M. Aprili, cum morbus jam in decrementum vergeret, nova febrilis effervescencia supervenit, cum eruptione per totum corpus pustularum aquearum, majus periculum minitanti, ægrotis tamen per continuatam alexipharmacorum blandiorum adhibitionem intra primum, quandoque secundum ostiduum reconvalescentibus. Mense Majo & Junio, præter dictas puncturales, (quæ jam sine magna præcordiorum oppressione, cum horrore, lassitudine, lumborum, nuchæ, & capitis dolore ut plurimum ingruerant) purpuratæ etiam febres teneriorem in primis ætatem, non admodum periculose invaserunt; nec melancholici insultus maritatis foeminis, menstruis quidem rite se habentibus, infrequentes fuerunt, venæ sectione quidem mitigati, paulo post tamen recidivi facti, acidularum vero martialium potu curati.

Post Solis ingressum in Cancræ signum crebriores primo pluviae, postea cum plurimarum tempestatum graviorum impetu, calores, circa caniculares in primis dies intensi, & qui ad æquinoctium autumnale usque, paucis frigidiusculis diebus intervenientibus continuabant, fuere notati; quo tempore frequentia morborum defuit, nisi quod ibi ob transpirationem fortasse ab aere humidior & frigidiusculo nonnihil cohibita, febres quotidianæ, post exiguum horrorem intensiori calore invadentes, & facile curabiles, hic ob sanguinem aeris calore nimis rarefactum febriculæ scarlatinæ, sine magno corporis æstu aut gravibus symptomatibus, sed levi saltem præcordiorum compressione præcedente, non minus brevi & sponte quasi cessantes observarentur. Alii autem, quibus probabiliter lymphæ viscidior in sanguine erat, non maculis istis pingebantur, sed pustulis albicantibus, majoribus minoribusve, cum interspersis quandoque vesiculis parvis limpidis, pruritui comite tandem exsiccatis, ac in squamulas secedentibus, per totum corpus, sine vitæ periculo, & prævio non admodum intenso calore, onerabantur. Nec infrequentes erant diarrhææ, quibus interdum, sed rarius dysentericæ succedebant, ex negligentiori, ut mihi videbatur, corporis ab aere externo custodia, & liberaliori potus ingurgitatione, hincque stomachi tono labefactato subortæ, quæ etiam facile, vel solius rhabarbari cum terra signata, aut corallii rubris mixti usu, vel insuper essentia catechu, lenibusve aliis adstringentibus stomachicis absorbentibus curabantur. Plurimos etiam odontalgia correptos licuit conspiciere, quæ licet rarius Medicorum consilio exponeretur, quantum tamen dijudicare valui, ex eadem ventriculi imbecillitate, & chyli vel lymphæ crudioris circa dentes stagnatione citabatur. Erant insuper foeminæ præsertim, quas sinistra axillæ intensus dolor, sine tumoris vel inflammationis indicio excruciat, periodice ut plurimum & circa vesperam recurrens, cujus radicem circa ventriculum pariter hæere, tum notatæ ibidem, in primis sinistro in hypochondrio molestiæ, tum salutaris curandi ratio conjecturari faciebant: credidisset, chylum viscidior & crudior, per ductum Pecquetianum ad venam subclavianam sinistram delatum, & cum obvio ibi sanguine pernixtum, agitationem præternaturalem ibi excitasse, partesque illas dolorifice hac ratione distendisse, nisi dextrum humerum in foemina quadam idem malum tunc occupasse notasset, cum insolitam ductus illius ad partem dextram declinationem sine urgentiori causa hic fingere non audeam; quamvis in eadem rheumaticum potius affectum subsuisse credere malim, præsertim cum dolor ille dicto modo quidem intensior per intervalla redderetur, nunquam tamen plane intermiserint, ac tandem brachii tumor supervenerit, diaphoreticorum, emplastri oxycrocei, & laconici coriarii usu omnino sublatus. In cæteris repetitis leniter evacuantium & humores corrigentium, præsertim acidularum martialium usus proficiuus exstitit, remedia autem externa nullum levamen dederunt.

Eandem chyli & lymphæ vitiosæ in stomacho nidulantis labem febres quotidianæ epidemicæ, incerto quandoque paroxysmi tempore invadentes testabantur; quæ nullo prævio horrore, magna præcordiorum ad oppositam in dorso regionem se extendente oppressione, & nullo sensibili, vel tolerabili saltem excipiente calore, infestæ erant, atque propinatis, pro exigente necessitate, emeticis, vel repetitis laxantibus & absorbentibus, amaricantibus, absinthio, chinchina &c. curabantur.

Post æquinoctium autumnale primo aeris serenitas & siccitas continuabant, mox pruina, nebulæ, d. 17. & 18. Octobr. copiosæ nives, pluviae postea, & venti modo ex hac, modo ex alia mundi plaga, in primis ex septentrione frequentius irruentes comparuerunt; Sol autem ubi ad Scorpionis signum pervenit, denuo per aliquot dies serenitatem, terræque siccitatem conciliavit, varia dein aeris temperie, ut plurimum tamen austrina subsequente; & cum aer parum a ventis jam agitaretur, vapores in eo hospites parce dispellebantur; unde iidem corporibus humanis copiosiores communicati variis ægri-

tudinibus procedendis patrocinebantur; hinc non tantum variolæ iterum se exerebant, pleuritides veræ, atque febres continuæ, catarrhales magno cum æstu, cephalalgia & tussi, pueros æque ac maturiorem ætatem invadentes, nec, ubi debite tractabantur, lethales subortæ, sed frequens etiam catarrhorum cohors, coryza, odontalgia, rucedine, tussi infesta urbi incubuit. Muliebris sexus non minus habuit, de quo speciatim conquereretur, uteri nimirum hæmorrhagia, cui non gravidæ saltem, ultimis præsertim duobus graviditatis mensibus, sed aliæ quoque plures obnoxie erant; quem sanguinis orgasmum non commodius quam absorbentibus materialibus &c. uti hæmatite, croco martis adstringente, item bolo Armena, corallii rubris &c. haud neglecto, ubi opus erat, paucis opii additamento, sedatum expertus sum. Memorari etiam merentur apoplexiæ crebræ, ut plurimum exitiosæ. Memini egregium quendam virum mihi aliquando narrasse, quod jam olim fuerit observatum, post crebriorem aquilonium flatum apoplexiæ frequentes hic contigisse: neque admodum in dubium id vocare vellem, cum ab illo vento nescio quæ atomi impuræ nobis inferantur; id quod civem quendam nostratem industrium non latet, qui ceræ dealbandæ in horto suo boreæ multum exposito operam navans, eandem infesta flavedine ab eo infici notavit; unde quamprimum spirare eundem observat, ceram studiose tegere, media etiam, si is tum ingruat, nocte properat, quem in finem machinulam artificiosam excogitavit, quæ a vento hoc commota somnum excutiat. Ubi in memoriam mihi revoco, quæ nosser quondam Esculapius, Phil. Hæcstetterus, in scholiis ad dec. 4. obs. med. cas. 1. protulit, ubi urbis nostræ descriptionem exhibens, zephyrum ex depressis & alicubi paludosis Marchionatus Burgavienfis locis inquinamenta secum rapere, & huc advehere scribit; quæ sane de borea quoque nobis, & non minori jure pronunciare licet, qui ex locis humidis Danubio proximis putridas particulas abripere, atque in capita nostra effundere valet.

Tandem cum circa mensis Decembris principium zephyri impetus major denuo infurrexisset, d. 10. eundem Eurus compescuit, frigore, creberrimisque nebulis, quibus præsertim a d. 17. usque ad d. 23. Decembris continuis civitas oblecta fuit, stipatus, usque dum circa finem anni zephyro boreas succedens auram tolerabiliorem redderet, niviumque crebritate colophonem imposeret. Quo tempore, præter memoratas pleuritides, variolas & febres continuas, in pueris etiam quotidianæ febres, tussi humida & cephalalgia graves, nec non icteri, in adultis autem malignæ petechiales, ut plurimum pustulis limpidis miliaribus post macularum eruptionem comparentibus, comitatur observabantur: hæ in principio post horrorem lassitudinemque, tolerabili calore, intenso capitis dolore (quem paulo post recedentem tussis, non quidem diu durans, & sicca magis quam humida, atque calor auctior cum deliriis nocturnis insequerentur) se prodebant, contagia quandoque in alios se diffundebant, rariusque, ubi temperatioribus alexipharmacis tempestive obviam itum est, occidebant: in pleuritide vero continuatus diaphoreticorum, præcipitanium dictorum, usus coagulum sanguinis feliciter resolvebat; qualia medicamenta etiam contra quotidianas febres, ut & juxta cum martialium usu adversus icterum, promptum auxilium ferebant.

Eurus in anni 1702. introitu serenitatem cum frigore molesto induxerat, quarto tamen mox die zephyrus pluviosam primo constitutionem, postea ventorum frequens mutatio tempestatum etiam varietatem multam subinde attulit, semper tamen humida ex pluviis, & temperatior paululum, sub dominio zephyri, post solis in Pisces ingressum diu impetuosi, prævalente, ut hyems non admodum rigorosa quidem, protractior tamen fieret; præsertim cum post æquinoctium vernale eurus non solum magis spiraret, & post serenos plures dies circa initium Aprilis rediens zephyri ferocia crebriores nives spargeret; quas sub eodem faviente licet ab aliis ventis sæpe interrumpere, frequentes pluviae, cum Sol ad Tauri signum appropinquaret, exceperunt, usque dum post Maji principium eurus serenior & venæ temperiei magis conformem aerem redderet, siccitate tamen terræ exinde non parva inducta, ut Flora suas amœnitates non nisi ferius expromere valuerit. Hoc toto tempore eadem morborum facies, in primis vero pleuritides, ut plurimum sine suppuratione curabiles, usque in Aprilem continuabant. In quo & Majo mense febres continuæ, in paucis cum miliari efflorescentia, semper autem prævio horrore, (sine intenso calore) magna virium debilitate, & cephalalgia gravi, raro deliriis, aliisve gravioribus symptomatibus comitatur, atque alexipharmacorum & diaphoreticorum usui cedentes, hic ibi propullulabant. Majori vero numero febres quotidianæ & pauciores tertianæ ingruerant; illæ tantum non in omnibus, qui se curæ meæ commiserant, insignem capitis dolorem in paroxysmo inducebant, viresque prosternebant; in multis prima sub invasione, & sæpe aliquot per dies continuatum typum, vix perceptibili calor & cephalalgia remissione, referebant; chinchinatis autem medicamentis, vel arcano duplicato facile curabantur; quibus non minus tertianæ, post emetici, vel scammonii sulfurati, ubi opus erat, adhibitionem brevissime abigebantur.

Circa æquinoctium dictum arthriticis affectibus obnoxii fere omnes, quotquot mihi noti, insultus ut plurimum non admodum feroces patiebantur, atque ubi post exantlatam periodum justo citius aeri se exposuerunt vel artus delassarunt, recidivas experiebantur. Plurimos etiam infantes epilepsia e medio sustulit, quæ ex lymphæ acido viscidæ in cerebro stagnatione, præsertim dentitione difficili accedente, ortum traxisse visa est. Istæ autem lymphæ crassioris collectiones non minus in aliis frequentes admodum fuerunt, ut non tantum crebriores tussis, coryza, odontalgia exinde obortæ fuerint, sed frequentissime aliis etiam morbis epidemicæ & sporadicæ graffantibus, tussis se associaverit.

Cum Junio zephyrus euro successit, pluviarum multarum ferax paucis diebus serenis intermixtis; qui in Julio quidem per primum triduum cum calore mediocri continuabant, ast mox aere in fulgura & tonitrua desumante, in pluviosos juxta & frigidiusculos, ac postea temperatos mutabantur, usque dum post Canis exortum eurus, sæpe ad meridionalem plagam inclinans, serenitatem non sine calore reduceret. Magna dehinc ventorum varietas fuit notata, (nisi quod post autumnale æquinoctium a d. 24. Septemb. usque ad d. 6. Octobr. zephyrus impetuose admodum dominaretur, a frigido & non minus per triduum vehementi euro tandem quasi in fugam coniectus) quæ diversam quoque aeris temperiem, potissimum tamen calidam & serenam in Augusto effecit. Ast in Novembri multa hyemis præ-

ludia, imo præmaturus adventus ejusdem, crebro, & quandoque intenso frigore, niveque repetita, quam benignior aura & interpolata pluviae denuo liquabant, molestus existit. Quæ ipsa mutabilis constitutio, tum ningendo, tum præsertim pluendo, frigore modo aucto, modo remisso, zephyro reliquis ventis prævalente, & circa, nec non post solstitium hyemale, usque ad finem anni, multum sæviente, nubibus autem continuo fere Solem obducentibus, integrum præsertim Decembrem fastidiosum admodum reddidit. Morbi interea longiores inducias dederunt, tales tamen, quibus aliqualis epidemicae luis præsentia non prorsus excluderetur; uti præsertim in febribus quotidianis supra memoratis passim per Junium & subsequentes menses usque in Novembrem observari poterat; quæ tandem in non paucis, cum autumni adventaret, hæctica metum injecerunt, quibus tamen juxta cum aliis coagulatum lymphæ acidum destruentibus, specificum in primis antihecticum Poterii, lapilli gammarum &c. salutarem opem præstiterunt. Circa solstitium hyemale variolæ benignæ in pueris se exercuerunt, cum magno quidem calore ingruentes, a pulvere tamen rubeo Pannonico, antimonio diaphoretico, unicornu marino &c. quinimo quandoque etiam sine medicamentis celeriter periodum suam absolventes, & cum fine anni jam iterum omnino disparentes. Quod tandem de ægritudinibus aliis, quibus semper fere tussis se sociaverat, dictum, in hisce quoque deprehensum fuit.

Quæ Annorum sequentium, videl. 1703. 1704. & 1705. constitutio fuerit, in Appendice Dec. tertiæ Anni noni & decimi Miscellaneorum nostrorum curios. legi potest; cui nempe typothetæ negligentia antecedentem præfigere intermisit.

Anno 1706. hyemale frigus, ob austrinam aeris temperiem, qualis anni prægressi in fine observata fuerunt, & usque dum Sol Aquarii signum attingeret, continuaverat, hæctenus ut plurimum tolerabile, nunc magis se exeruit, præsertim cum orientalis ventus in Februario constanter, interdum ad meridionalem plagam inclinans, spiraret, ac continuæ fere nebulæ usque ad Solis in Pisces ingressum, ubi serenitas aeris frigus augebat, nos cingerent. Cum interea hæctica febris insultui (coryzas & tussis humidas, tanquam indivulsos quasi hyemis comites, nec non odontalgias ut taceam) dēno plures exponerentur, sed facile etiam medicamentis acridem temperantibus abigerentur.

Circa vernale æquinoctium zephyrus potissimum dominio potitus, atque reliquis tamen ventis nonnunquam interruptus, multum invalescens, diversam etiam temperiem, austrinam præcipue excitavit, ac vernali amœnitati subinde obstitit. Sub qua constitutione febres quotidianæ, & plures tertianæ ingruerunt, magno cum impetu; in quibusdam etiam cum deliriis, sine tamen cephalalgia ut plurimum, & quæ post sumptum cholagogum, vel emeticum, absorbentibus non difficulter, prompte etiam chinchinatis cesserunt. Plures insuper circa Solis in Gemellos transitus nephriticis doloribus, non admodum refractariis, obnoxii fuerunt.

Postea sub mutabili valde ventorum vicissitudine, ante & post solstitium æstivum, plures serenos calidosque dies experti fuimus, qui etiam diu continuarent, multamque ideo terræ siccitatem, præsertim a ventis adjuti, attulerunt; cui interea febres prædictas, sensim declinantes, neque tamen per reliquum postea annum prorsus silentes, crebræ odontalgia, (quæ etiam per totum hunc annum fuerunt observatæ) tussis, interdum convulsivi quid labentes, & coryzæ; adultos æque ac juniores affligerent, & cum negligentior diætâ accederet, diu durarent. Quas molestias magnæ illi & totali solari eclypsi, quæ d. 12. Maji contigit, adscribere multis placuit. Et quamvis subita illa aeris calidi, interceptos ob Solis radios, in frigidum, hincque non minus celeriter redditus, in calidum rursus mutatio, juxta cum animorum, ex insperata illa & nulli unquam visa caligine, consternatione, aliquid contribuisse videri posset, cum tamen jam ante eclipsin istæ lymphæ stases contigerint, vix locum illa opinio inveniet, negari tamen nequit, frequentiores post illam solis obscuracionem, & circa solstitium æstivum illa occurrere: ideoque non prorsus improbabile est, spiritus a phænomeno isto terrifico labefactos, (qui sane terror in nonnullis tantus fuit, ut lipothymiani ipsis induxerit) lymphamque simul crassiorē redditam, quin & a frigore illo solito magis condensatam, ad catarrhales has stagnationes disposuisse.

Mensis Julius quamvis pariter multa serenitate gauderet, nonnunquam tamen pluvias sitientem terram refocillavit; post Caniculæ vero exortum calores admodum invaluerunt, & usque ad occasum perseverarunt, quin licet temperatio ob pluvias, parciore equidem, aura per paucos dies succederet; ad pristinum tamen genium mox reversa est, usque dum d. 7. Septembr. cum luna inchoante zephyrus pluvias sæpius adduceret. Quo tempore dysenteria grassari cœperunt, & infantibus non levem stragem intulerunt, adultis vero nec tam frequenter, nec etiam lethaliter ea decumbentibus. Ubi quidem hisce fructuum horariorum intemperantiori ab esu, vel liberaliori ob caniculares æstus potu, præsertim cerevisiæ, nobis albæ dictæ, propter tenuitatem suam & imperfectam a parca fermentatione depurationem, in acorem præter, illam obtigisse verisimile est; illis autem, quorum major pars ob tenellam ætatem nihil horum degustaverat, cur adeo fatalis fuerit difficulter determinari potest. Utrum in lacte vaccino aliquid adversi delituerit, quo cum nempe pulmenta in eorum cibum coqui solent, affirmare nequeo; cum tamen alia causa non suppetat, in vaccarum sanguine, ob aeris fervorem, pratorum siccitatem, & pabuli inde ortam penuriam, temperatas balsmicas periculas multum fuisse immutatas, acrioresque redditas, haud incredibile videtur, quæ lacti communicatæ vini suam in tenerimis infantum corpusculis exerere, eorumque destructioni, quin & epilepsiæ aliis quibusdam tum temporis funestæ, ansam dare valuerunt; & cum muliebris imperita industria pusionum curæ se sufficere ut plurimum persuasa sit, aut saltem Medicum desperato jam morbo advocet, funerum multiplicatio facile contingere potuit; præsertim ubi difficilior fortasse progressus partus fœtū debilitatem aliquam antea impresserat, cum, incertum qua de causa, hoc anno de dysstokia & præmaturo partu non levibus querelis urbs perstreperet.

Reliquum anni, nna cum ventorum continua mutabilitate, nebulas inter & pluvias frequentiores, aerem temperatiorem quoad activam ejus qualitatem, (nisi quod paulo ante solstitium hybernum eurus eundem nivibus asperiores per triduum reddiderit) expertum fuit, multasque nobis inducias concessit, si rheumaticas post solstitium dictum, musculis caput attollentibus fastidiosas lymphæ

stases exceperis, quæ solo tamen tum hypocausti calore, tum suffitum mastichinorum &c. ope haud difficulter resolvi potuerunt.

Plurimas inter nebulas temperatioremque auram non saltem annum 1707. inchoavimus, sed porro etiam clementem, & Sole in Aquario versante, humidam aeris temperiem experti fuimus, raro, nec diu durabili frigore, & ac multo rarius nive comparente; neque etiam multum, humiditas nempe & nocivas alias in aere particulas frequenti ventorum variorum agitatione dispellente, morbi populares aderant, nisi quod rheumatismi præfari, nec non febres intermittentes, quamvis pauciores, atque post sumptum lene laxans, essentia corticis Peruviani facile abigendæ, continuarent; quosdam vero pleuritides veræ, in suppurationem ut plurimum terminatæ, nec tamen admodum acutæ, & antimonio diaphoretico, pulveri pleuritico Aug. prompte cedentes, puerilem autem sparsim variolæ, nulla malignitate suspectæ, ac per totum postea anni decursum observatæ; alios denique icteri non adeo contumaces, præsertim sub crebriori essentia mart. D. Lud. usu, invaderent.

Licet autem circa Martii initium frigus intensum ingruerit, mox tamen post quadrimum temperatiorem in statum denuo fuit mutatum, ut veris præludia multa comparenter, cujus vero amœnitatem ventorum diversorum, euri in primis austeritas, cui nebulæ crebræ jungebantur, multum retardavit, aeremque frigore horridiusculum reddidit; quo ipso insensibilis transpiratio admodum sufflamminata, serum in corpore auxisse, atque creberrimas adstagnationes disposuisse visa est, ut major incolarum pars catarrhosis ægritudinibus, pectus, vel nares, aures, faucesve occupantibus affligeretur; in quibusdam fluxu celerrime, vehementerque gravi cum cephalalgia & febrili incallescencia invadente. Quo tempore etiam febres, tum quotidianæ, tum tertianæ, ex eadem dubio procul causa, multiplicabantur, atque non raro graviores in principio; magna utpote cum cephalalgia, virium debilitate, & calore, ut continuæ quasi typum referrent, oriebantur, postea medicamentis oppugnatæ, prompte etiam recedebant; facile tamen ab aeris frigidi admisione, vel cerevisiæ potu recidivam passæ; quæ etiam febres in autumnum usque continuarent; qui humidus admodum & graviori zephyri vehementia fastidiosus existit. Postquam æstas, Sole Cancrī signum occupante, magno æstu, rarius a ventis pluviiisque temperato, primo sat gravis, ab ingressu autem Solis in Leonem, crebriores propter pluvias, zephyrique impetus frigidulus ut plurimum fuerat; & sic (ut crebriores catarrhos dentibus præcipue infestos taceam) non saltem in nonnullis quartanæ, longiori horrore & calore multum molestæ, eoque contumaciores, quo minus ii, qui eadem afflicti ex plebe meam opem implorarent, in diætâ convenienti medicamentorumque usu morigerose præbuerunt, sed etiam arthritidis vagæ, pulveribus ex coralliis, spodio foss. lap. gammar. cinnabari, aliisque anti-moniatis fixis, opii tantillo addito, præter interpolatum laxantium usum, haud difficulter cedentis, generationi ansam dederunt. Hyemis præsentiam in Decembris initio præmaturum frigus, & nives copiosæ ab Aquilone adductæ, indicarunt; quæ tamen post decendium e pluviiis eliquatæ, quas zephyrus ante solstitium hyemale vehementissimus concitaverat; cui cum caurus, & postea euronotus successissent, aere nubiloso & nebuloso, ac moderate frigido, morbis silentibus, reddito, anni exordium fecerunt.

Anno 1708. dissipatis nubibus, benignior euronotus per duas primas hebdomadas serenitatem, aliqua tamen nebulosa caligine ut plurimum se immiscente, produxit; quam postea humida ac pluviosa constitutio excepit, præsertim cum quadrimana circa Solis in signum Aquarii ingressum zephyri vehementia inquisisset, cui sub ventorum mutabilitate prior serenitas circa finem hujus mensis primi, & principium secundi successit, atque temperatam adeo brumam, uti passim alibi locorum, experti fuimus, ut multa veris indicia ostenderet; donec euronotus d. 10. Feb. cum nivibus frigus adduceret, humida vero paucos post dies, cum intermixto quandoque frigore, intemperies a zephyro reduceretur. Quamvis autem hac sub insolita aeris clementia multi graves esse oboriturus morbos vererentur, nihil tamen epidemici, (ut febres quotidianas & tertianas sparsim & rarius adhuc occurrentes taceam) præter variolas, usque dum Sol Tauri signum accederet, continuantes, & consuetæ hoc tempore catarrhalia incommoda, tussis præsertim humidas, & ab eadem feri stagnatione capitis erysipelas in sexu muliebri, produxit, quod ex negligentiori fortasse partis istius custodia, præviis in collo tensivis doloribus, cum febrili incallescencia invasit, & moderato lecti calore, præsertim diaphoreticorum terreorum usu accedente, non difficulter discussum fuit.

Humidus autem hic aeris status ante & post æquinoctium vernale continuabat, ut pauci sereni dies nobis obtingerent, & licet Solis quandoque radii refocillarent, nebulosæ tamen exhalationes eisdem sæpiissime deturparunt, usque dum austerior eurus d. 27. April. aerem serenaret, atque ab eo, & alternante cauro molestum frigus terræque siccitas producerentur, quæ in adultum usque Majum, in quo diversæ ventorum ex omni plaga mutationes notatæ, continuabant, donec d. 15. post fulmina & tonitrua in crebras pluvias mutarentur; quæ dein humida facies, zephyro & borea alternantibus, usque ad principium Augusti perdurabat; ubi zephyro potissimum dominante, calores magni & multa serenitas, sæpe tamen matutinis nebulosis evaporationibus gravata, usque ad Caniculæ occasum ingruiebant, pluvioso ac frigidiusculo aere succedente; qui etiam, rara intercurrente serenitate, usque ad æquinoctium autumnale continuabat. Interea frequentes febres hæcticas similes, tussis præsertim & caloribus lentis inordinatis stipatæ, atque continuato absorbentium fixorum usui obtemperantes, notabantur. Variolas autem circa Maji finem cessantes, morbilli excipiebant, non tantum in infantibus, qui prius sani fuerant, sed etiam, qui paulo ante variolis laboraverant, nec non in adultioribus, ut & non paucis morbum hunc jam olim expertis, absque tamen malignitatis nota, & sub blandorum diaphoreticorum usu paucos intra dies periodum suam absolventes, qui tamen in mense Julio iterum cessaverant; quo tempore postea odontalgia, ophthalmia, nec non dolores spasmodici uterini in feminis, ischiadicque præcipue in viris frequenter occurrebant, ex lymphæ, uti mihi videbatur, ab aeris inclementia viscidioris atque ideo in stagnationem proclivioris redditæ vitio generati, præsertim cum cerevisiæ aculentis, qua de plurimæ passim querelæ fiebant, potus accederet, & nervis ad coxas ac uterum tendentibus spicula sua infingeret, ubi præter lenia ecoprotica, hystericis medicamenta castorina, cinnabarina &c. & ischia-

ischiadici blandam per vices diaphoresin promoventia, non neglecta ut plurimum opiatorum succisa miscella, profuisse expertus sum.

Circa æquinoctium autumnale per 16. dies serenitas adfuit, raro nubibus aut pluviae exposita, nebulis tamen crebris matutinis stipata, quibus post multam ventorum varietatem, subsequē. etiam diebus observatam, boreas per 12. dies nubes adduxit, a zephyro postea in pluvias resolutas; quin & post solis in signum Scorpionis ingressum, euro flante, nix decidua præmaturum quasi hyemale frigus efficiebat. Ineunte Novembri multa quidem usque ad solis in Sagittarium ingressum serenitas, crebro tamen nebulosa, præsertim matutina, caligine inquinata; succedente usque ad d. 15. Decembris fastidiosa, frigida, ob nives, nebulae intemperie; ubi quidem sol nubibus discussis, serenitatem non sine multo frigore, crebris etiam nebulis interruptam, reddidit. Interim, præter frequentes odontalgias, catarrhi in primis, capiti & pectori infesti, plurimos in M. Nevembri infestiarunt, tantumque incrementum sumpserunt, ut in M. Decembri paucissimi in urbe essent, quos molestia illa non tentaverat; multos etiam gravius tractaret, qui nempe prægresso acri horrore, febriles effervescentias, intensas cephalalgias, aut capitis stupores, virium prostrationes, quandoque faucium spasticas strangulationes, vel dolores pleurae spuriis experti fuerunt. Causam continuam quasi nebulosæ aeris tempestati potissimum adscripserim, quæ non solum particulas suas humidas, impuras, per inspirationem corpori communicare, sicque serosam colluviem augere, & sanguinem inquinare potuit, sed etiam frigore & gravitate sua poros constringendo, ac transpirationem excrementorum humorum impediendo, eosdem cumulare, incrassare, atque in subtilissimis cerebri, narium, tracheæ glandulis ac tubulis stagnare fecit. Cui itaque præter moderatum aeris regimen, medicamentis resolventibus, attenuantibus, absorbentibus, demulcentibus &c. pro subjectorum & symptomatum diversitate, ubi morbi gravitas id deposcebat, succurrendum fuit, eo cum successu, ut nullus, qui libidine censum subiisset, mihi innotuerit.

Principium anni 1709. spirante euronoto, nebulosum fuerat, altero autem & subsequē. diebus zephyrus vehemens pluvias, & noctu, inter d. 5. & 6. Januarii plurimam nivem eurns, versus aquilonem inclinans, cum intenso frigore adduxerat; quod indies fere, inter matutinas præcipue nebulas, diesque & noctes serenas, crescendo ea vehementia nos afflixit, qua de longe lateque querelas multiplicare Europæ contigit, donec d. 24. prægressa nivosa, vesperti auster temperatorem & pluviosam auram induceret. Licet autem ineunte Februario frigus iterum, tolerabilius quidem, intenderetur, ac variis sub ventis aerisque mutationibus, nive quandoque rariore decedente, ad diem usque decimum continuaret, zephyrus tamen temperatorem tunc aerem reddidit, usque dum d. 16. orientalis ventus, ad septentrionem, nonnihil denuo deflectens, & præsertim biduo post acriter spirans, novo gelu affligeret; quod incrementa subinde sumens, eo rigore inhorruit, ut d. 27. Febr. intensissimo frigori, d. 21. Januarii observato (testante id spiritu vini in meo thermometro, utrobique matutino tempore ante solis ortum, ad gradum usque septimum, vespertino autem post solis occasum ad nonum gradum depresso) parum cesserit; quod dein multas inter ventorum mutationes, variasque aeris, humidam in primis, constitutiones, tolerabilius redditum, sed d. 12. Martii, & insequente triduo iterum auctum fuerat, spiritumque vini thermometro ad gradum nonum cum dimidio, vesperti autem ad undecimum atque dimidium deprefferat; tandem autem remittens, d. 16. dicti mensis spiritum ad gradum undecimum, & sic sensim magis sursum extolli permisit, ut d. 17. Aprilis gradum decimum quintum mane attingeret. Interea non tantum ventorum mutabilitas, sed aeris etiam, ob crebriores pluvias, humida ac frigidiuscula, interveniente tamen subinde serenitate atque calore, ante & circa solis in Tauri signum ingressum intensiori, continuarent, ut fecunditati terræ non modice faverent, matutina quoque nebulae tenuiores, ubi pluviae aberant cælumque serenum erat, tunc & per totum reliquum annum, semper observabantur. Et quamvis post referatos terræ ab insolito frigore profunde contractos meatus, indeque diu repressas exhalationes, vapores isti liberiores facti multis gravium subsequendarum ægritudinum metum excitarent, contrarium tamen per DEI gratiam evenit, congelata ista terræ crusta sensim resoluta, sicque vaporibus non confertim erumpentibus, sed paulatim exhalantibus, atque ventorum perpetua agitatione particulas istas humidas impuras dissipante. Tot tamen aqueæ in atmosphæra oberrantes particulae non poterant non feri proventus nimium in corpore accumulare; præsertim cum per totum reliquum anni decursum mutabilis subinde, præsertim humida & frigidiuscula temperies (nisi quod Syrius ante & circa sui exortum finemque zephyro, uti hic, ita etiam reliquo tempore, potissimum prævalente, quandoque per pauculos dies acriter uret) & hinc catarrhorum molestiarum, cum hecticis caloribus in quibusdam metu, in naribus, bronchiis, dentibus, artubus, per totum anni decursum, & quæ omnibus fere aliis morbis sese iungebat, frequentiam excitare; præter quas etiam, in vere & æstate, febres quotidianæ & tertianæ, interdum gravibus symptomatibus, præsertim in morbi principio, uti deliriis, cephalalgis, spastico nuchæ dolore, narium hæmorrhagia, vomitu &c. supata, ex transpiratione insensibili, ob temperiem aeris sæpius variantem, impedita obortæ, minus tamen refractariæ, non paucæ notabantur. Inter remedia, juxta cum eccoproticis, blanda diaphoretica & absorbentia potissimam curæ partem abolverant.

Constitutio anni 1710. cum humida & moderate frigida, sub ventorum, zephyro tamen prævalente, alternatione, primo continuaret, affectus etiam catarrhosi, in primis arthritides nondum deserunt, & mense Martio febres tertianæ, cephalalgia, deliriis, vomituque in prima invasione sæpius molestæ, non paucos invaserunt; quibus tamen, post pulveris cornachini, & ubi ventriculus viscido muco obrutus videbatur, lenioris emetici usum, cortex Peruvianus ad ʒʒ. ʒij. &c. semel vel bis in die sumptus, præsentaneam opem ferebat, ut post secundum, aut quartum paroxysmum, sine recidivæ incommodo, ut plurimum cessarent.

Postquam in Arietis signum sol pervenit, cum serenitate, (ita tamen, ut hic quoque annus, cælo sereno, soleque oriente, nebulosum nonnihil aerem semper experiretur) triduanum quidem intensum calorem, Africo flante, excitaverat, quem tamen zephyrus pluviosus creber iterum dissipaverat, qualem etiam sextiduanum calorem, antequam sol in Tauri signum progressus esset, euro spirante, sensimus, ab occidentali tamen pluvioso vento iterum tempe-

ratum. Et hæc aeris, modo humidi, modo siccī, calidi, frigidiusculi, sæpius nubilosi, ventorum etiam crebra permutatio in posterum usque ad finem anni perseveravit, prævalente tamen semper humida constitutione; unde hæc vicissitudo primo terræ fecunditati multum, postea etiam hyems ut longius abesset, simul tamen variæ catarrhosæ & rheumaticæ invasiones ut frequenter orirentur, effecit. Febres etiam tertianæ, quamvis non frequentes, nec non quotidianæ, hecticæque per totum annum observabantur; mense autem Maio & Junio morbillis plures infantes, cum vehementi tussi, oculorum gravedine, hæmorrhagia sæpe prævia, decumbebant; variolæ quoque in multis, non quidem malignitate, sed copia, & symptomatum consuetorum vehementia, & pustularum, rariori tamen, confluxu infestæ notabantur. In cura omnium horum morborum remediis, in præcedentibus historiis memoratis, non infelicitè uti datum fuit.

Constitutio Epidemica Basileensis Anni 1700. & 1701.

Dn. D. JOANNIS JACOBI HARDERI.

Æstivus calor diebus canicularibus Anno 1700. temperiem suam non excessit, quin ventis quandoque placidis perflaretur, neque corpori incommodum facefferet, imo Augusto mense, pluvias præter votum quandoque infringebatur; September insequens siccus & calidus illo magis fuit, nec tamen sufficiens, qui uvæ ad optatam maturitatem undique perduceret; neque etiam morborum ferax ista anni constitutio fuit. October nebulosa, ut solet, & sæpiuscule pluviosa tempestate, hyemalem brumam antevertit; hæc ipsa autem per Novembrem, & Decembrem mitior exitit, & quamvis multa nive montes & juga altiora integerentur, ingruente tamen pluvioso, & hoc quandoque udoso aere, ab eadem prompte liberata fuerunt; ista autem aeris *depressionis*, non modo catarrhalibus febribus, sed pleuritidi ac pleuropneumoniæ, etiam sparsimansam præbuit.

Anno 1701. Januarii initium boreali vento magis perflabatur, aerisque serenitate animus refecit; in primis vero sub meridiem propius accedentes solares radii brumæ matutinæ spicula ex voto pepulerunt, & continuata in Februarium usque sua activitate fere inconcussa, nives boreamque in arvis campisque tantum non intempestive fugarunt, siquidem subsequente Martio ac Aprili, quibus blandioris solis calorem, & hinc pluvias amabili austro mitigatas sperabamus, brumæ rigorem majorem nivalisque tempestatis, ac nivis copiose delabentis spicula, frequenter experti sumus.

Maji delicias, si quas matutinæ auræ fulgor interdum promisit, mox nebularum crassiorum cohors, nunc calor subsequens intensior, mox irruentes grandinosæ tempestates, omnimodo amarulentas reddiderunt. Ante caniculæ autem exortum, & hac durante, solis æstus longe intensior & tantum non exurens calor, animantibus brutis non minus, quam homini, valde molestus fuit, febri intermittentium ferax mater, & quem neque tempestates horrendæ, crebrius ingruentes, usque attemperare valuerunt.

Post Caniculam increbescens tantisper pluviosa, & hinc temperatior aeris constitutio, placidiorem motum videbatur promittere; verum alcyonia hæc non diu durante, quin redeunte intensiore aeris siccitate, sereno cælo, si nebulas Septembri mense, minus tamen frequentes, mane excipias, in Octobris usque principium calor infusus & immoderatio perstitit, exarescentiæ æque, si non magis, quam majoris fructuum maturentiæ pares; & dysenterici satis atrocis apud nos, aliisque in locis fecundus genitor, cui num pluviae a diebus aliquot, arva præsiccitate hiscentia blande irrigantes, atque hominibus gratissimæ, obicem sint posituræ, horæ subsequetur docebunt.

Constitutio Epidemica Berolinensis Anni 1701.

Dn. Doct. GUSTAVI CASIMIRI GAHRLIEP

von der Müllen.

Annum sæculi septimi primum, prima Januarii, turbido, sed sicco cælo inchoavit, & in vespem pluviosam desit. Sequens secunda pluvias nivem ad meridiem usque miscuit, post discussis nubibus serenior gelu moderatum adduxit. Quod sequenti tertia continuans, ac per quatrimum ingravescens rursusque in nives, & pluvias procellæ junctas per triduum delinquit. Cui denuo undecima cum nive copiosa leve, succedit gelu, atque octiduum pauciori quandoque, quandoque copiosiori nivem aspersum duravit. Vigesima nebula densa mutationis prænuncia, sequentibus tribus, interspersis quandoque pluvias, tandemque gelicidio degelavit. Vigesima quarta Iris matutina turbidi atque pluvii ætheris nuncia apparuit, sequente per triduum, gelu moderato ac parvis nonnunquam nivibus stipato, quod quatrimum rursus nocturno, ac matutino gelu, a meridie ut plurimum degelante varium ad finem usque mensis excepit. Februarius nebula densa cum gelu moderato, sed mox in pluvias fatiscens cæpit, cui nubilum succedit cælum, remittente gelu, & in imbrem circa vespem deliquescente. Mox, tertia procellosa, sicca & clara, a nivosa nocte, die vero, licet borea flante remisso ac egelido, nocte tamen rigida succedente, ac die nivosa, sed remperata sequente, a triduo gelido iterum excepta. Nona tempestuosa cum successore decimo gelu in nives deliquescentes resolvit. Quas sequentes duæ noctes in glaciem rursus densarunt, de die parumper degelantem. Decima tertia nimbofa rursus nives parcas sparsit, mox aere temperato solutas. Decimam quartam cælo sereno gratam, gelidum excepit biduum, quod gelu nocturno & matutino temperato, pomeridianum adhuc mitius substituit. Huic aliud succedit biduum ventosum; ab octiduo gelido & ut plurimum sereno comitatum, 25ta quidem turbida, & uvida interruptum, sed triduo rursus gelido & ex parte obscuro redintegratum, & pluvias nonnullis interpolatum 25. una cum mense desinens.

Martius verna temperie initiatus, vario cælo nunc placido, nunc turbulento, ventoso, frigido, diversimode alterato, ad nonum usque decimum gelidus transit. Tum remittens, octiduo temperato ac verna amoenitate grato, ad vigesimum pluvium initio randem rursus clarescentem duravit, a quatrimum perinde variato exceptum, in noctes gelidas, sexque dies serenos desit.

Mor-

Morbos trimestre hoc, præter scorbutum endemium & illius affectas & affines aluit febres diversarum specierum, malignas quasdam variolis notatas, alias ardentes, continuas ac intermittentes, catarrhales, pleuriticas nonnullas, alias tussibus vehementibus ac diuturnis, cephalæa, asthma affligentes, in phthises quandoque degenerantes; præterea cardialgias, hypochondriacas, & colicas passiones.

Aprilis, quo Martius tramite desinit, rursus incepit, nisi quod serenitatem præcedentem cum turbido ac ventoso cælo commutavit, & a sexto per quadriduum, nives quandoque utut raras pluviolis nonnullis interfecit, tum gelu nocturno dies serenos, & haud inamænos ad 14tum usque substituerit. Cui cum 15to pluvia nivibus mixta nimboris, quadriduum successit serenum ac frigidum: huic vero biduum turbidum pluviis subinde, & nonnunquam grandine interpolatum. 24to & 25. serenitas ac verna gratia temperatis, reliqui ad trigessimum usque successerunt inconstantes, pluviosi & nimboris.

Majus turbido, sed mox sereniori inchoavit biduo subsequente triduo nubilo ac frigido, sparsis quoque nonnunquam pluviis ex parte uvido, ad septimum totum pluviosum, & octavum varium, tandemque nonum serenum ac æstivo calore gratum perrexit. Cui triduo quadriduum, intercalato decimo tertio pauca pluvia irrigato, addidit. Tum 6. dierum sudo plane æstivo ad 20. usque continuavit. Cui alii sex non æque sereni, sed varietate pluviolis nonnunquam temperata, adeoque non inamæna distincti successerunt, tandemque reliqui ad finem usque mensis verno temperamento commendabiles.

Junius a principio ad 12dum usque in ea temperie, pluviolistamen quandoque interpolata perseveravit. A 13tia verna temperies, in æstum sæpius satis grandem mutata, & præter nocturnas 16ti & 20mi pluvias fere torridum, ad 22dum usque pluvia nocturna ac tonitru matutino fractum, cui ad 26tum pluvia moderata madentem, quadriduum temperatum; huic vero 27mus paulo calidior, 28vus cum 29no pluviis modicis irrigui successerunt, tandem 30mus sereno & temperato cælo amenus mensis simulque trimestre finit.

Morbi hujus trimestris præter prædictos endemios maligni & epidemici, quantum mihi quidem innotuit, pauci fuerunt, sporadici plures, febres pleuritica, ardentes, continua, asthma, nausea, vomitu, cephalæis molestæ; intermittentes quædam, hemiplegia, cardiogmo, cæliaca passio, diarrhœa, dysenteria aliisque symptomatibus exacerbata, lypiria quoque sed urina sola.

Julius sudo ac calore æstivo, quo præcedens recessit, denuo accessit, ac ad 13tium usque serenitate jugi ac æstu indies ingravescente, si 5tum excipias temperatorem reliquis, ac 6tum pauca pluvia irriguum, continuavit. Sequentes etesius nonnunquam & pluviolis alterati, unico 27mo a meridie spargente exemptos, ad finem usque mensis serenitate ac temperie laudabili excelluerunt.

Augustus eodem fere cæli, utut quandoque rorantis inchoans, mox variabilis fuit. Secundus enim fervidior & siccior. Tertius tonitru imbrem, tota nocte durantem, addidit. Quartus mane frigidus sudum diurnum cum æstu substituit. Quintus mane pluviosus, reliquo diei priore temperatior. Septimus sudum nubibus interpolavit, cui cætera similis octavus in tonitru horridum vespere & imbrem desinit. Nono sudo antemeridiano pluvias meridie copiosas; Decimus antemeridiano sudo vespertinas submisit. Undecimus paucis pluviis matutinis, sudum promeridianum, huic vero vespertinum tonitru fragosum cum fulgetris fere perpetuis, nimboque densissimo. Duodecimus præcedenti, tonitru si dempseris, & fulgura, compar. His hætenus variis ad vigesimum usque octiduum æquabile, sudo ac æstu paucissimis pluviis temperato gratum, huicque aliud octiduum nebulosum magis, ventis pluviisque subinde madens, illique biduum serenum quidem & siccum, sed vento frigido flante haud adeo gratum successit. Tandemque 31mus sudo ac temperato æthere mensis terminavit.

September triduo sereno ac moderato sex dies, pluviis serenitati varie interpolata mixtos inseruit. Quibus post noctem procellosam, quadriduum serenum & temperatum, quandoque tamen ventosum, & pluviis parce sparsis rosicidum successit, sex diebus serenitas aliis æstu æstivo fere compari amenis exceptum. Vigessimus biduum reduxit paucarum pluviarum aspergine, ut & nebula roridum, cui triduum serenum quidem, sed algidum & ventosum, illique rursum aliud temperatius successit, & mensis simul ac trimestre absolvit.

Morbos præter scorbutum & ejus appendices, ut & ejus affinem ante hic raram, nunc ab adventu Gallorum exulum, inter Germanos etiam, infantes præsertim, fere endemiam rachitidem, hoc trimestre tam sporadicos, quam epidemicos plures tulit. Et hos inter febres malignas & contagiosas, haud paucis exitiosas, variis ut symptomatibus, sic exanthematibus miliaribus, purpura, morbilis, variolis, petechiis quoque insignitas & distinctas. Præterea ardentes etiam, continuas & intermittentes, catarrhales, erysipelatos, pleuriticas, erraticas etiam. Diarrhœas item ac dysenterias, lienterias, colicas, cardialgias, tusses ferinas ab æstu præsertim humore colliquante oriundas, hæmoptoes, cephalæas, hemiplegias, colicas & hypochondriacas passiones cum obstructionibus nonnunquam valde contumacibus, icteros, scabies & pforas.

October serenitatem Septembris, præter pluvias secundi vespertinas, quadriduo satis grato orsus sexto, & septimo frigidulis & pluvia matutina madentibus, interpositis, quadriduum rursus verna temperie gratum dedit. Cui 12mus matutina, 13tius vespertina, 14tus nocturna pluvia madidi successerunt, illisque 15tus totus pluvius ac nimboris. Quem rursus 16tus tum qua triduo perinde procelloso & subinde nimbo secutus. Vigessimus primus sparsa circa decimam pluviola rotans, quadriduo sicciori & amœniori locum fecit. Subsequens quadriduum, vario, nubilo ac quandoque rorante cælo frigidulum, 31mo turbido æthere, geluque moderato mensi finem imposuit.

Decembris primus totus pluvius, secundus a meridie tantum pluvias sparsit. His successit triduum siccum, sed nubilum & frigidum. Sextus mane nebulosus parte pluit, a meridie siccus. Septimus udosus. Octavus serenior, procellosus simul & frigidus. Nonus absque procella præcedenti similis. Decimus nives addidit ac gelu, sed hætenus moderatum, ab 11mo ad 13m rigidum, sereno ut plurimum cælo, præter 12. mane ac vespere, & 27mum vespere tantum nebulosum, 24to remittens atque circa vespem pluviolas spargens, noctu gelicidium, 26to subsequente nebula lique-

Sydenham Opera Medica.

scens, a meridie cum serenitate frigus, sed temperatum per biduum stabile reddens, 28vo nives superaddens, 29no ingravescent, 30mo nivolum, 31 absque nive perdurans, sicque cum mense trimestri ipsique anno colophonem imponens.

Morbi hoc ultimo trimestri occurrentes, præter endemios scorbuticos, arthritides præsertim & asthma scorbutico originem debentia, & venereos, epidemici fuerunt catarrhales præcipue febres, gravedine molesta, & tussi gravi & diuturna infestantes, ardentes præterea tam continuas, quam intermittentes variæ, malignæ quoque variolis, sæpius confluentibus ac petechiis infames, pleuritides graves & quandoque funestæ, cephalalgia, diarrhœa & dysenteria pertinaces, nephritica, colica & hysterica passiones.

Constitutio Epidemica aeris Berolinensis Anni 1703.

Januarius primo mane cæpit gelu, cælo succedente sereno, post obscuro, tandemque pluvioso. Secundus siccus ventosus & frigidus cum gelu moderato, successores habuit tertium circa vespem pluviolam spargentem, reliquos ad octavum usque siccus; hunc vero totum nivolum æthere temperato. Nonus miti cælo pluviolis subinde vidus. Decimus imbrofus. Undecimus parum gelascens, cætera siccus. Duodecimus cum decimo tertio cælo turbido gelidiores. Decimus quartus verna serenitate ac tempore gratus, vespere nebulosus. Decimus quintus & decimus sextus vernæ fere amœnitatis æmuli. Decimus septimus nebulosus, tandemque imbrofus. Decimus octavus vicissim siccus & serenus. Decimus nonus cum sequentibus ad vigesimum sextum usque satis rigide gelidi. Vigessimus sextus parum nivis addidit. Vigessimus septimus noctu pluvisculum ejus sparsit æthere temperato. Vigessimus octavus sereno cælo valide gelidus, ut & vigessimus nonus. Trigessimus nubilus pauloque mitior. Tandem trigessimus primus mitiori, siccio tamen cælo mensis hunc primum clausit.

Februarius temperato gelu, sed turbido siccoque cælo orsus. Secundus gelu satis rigido sereno cælo nonnunquam tamen parum remittente ad septimum usque cum gelicidio grandinem submittentem, postque degelantem continuavit. Octavus regelascens cum nono ac decimo parum sereno & amœno cælo gelidis. Undecimus gelu paulo intensius cælo obscuro induxit; ac ad decimum quartum cum sequentibus ad vigesimum usque paulo cum sequenti biduo mitiorem porrexit. Vigessimus tertius densa nebula antemeridiana remissior. Vigessimus quartus mane turbidus, postea serenus. Vigessimus quintus nebulosus ac ventosus parum nivis sparsit. Vigessimus sextus intense gelidus ut & vigessimus septimus, simulque cum vento nivosi. Vigessimus octavus nive copiosa mensi coronidem imposuit.

Martius biduano gelu intenso cæpit. Tertius noctu gelidus, a meridie remissior, circa vespem pluviosus ac ventosus. Quartus eodem tenore tota die continuavit. Quintus gelidus ac nivosus, tandem pluviosus. Sextus totus pluviosus ac ventosus. Septimus mane sparsa copiosa nive mox postea in pluviam delicuit. Octavus perinde continuavit. Nonus satis intense gelavit, parumque nivis sparsit. Decimus copiose noctu nixit, postea remissie cum parca nive gelavit. Sic & undecimus, decimo quarto nebula matutina diverso, ad decimum quintum usque sereno cælo continuavit. Hic mane nivis paucillum sparsit, post leniter degelavit. Decimus sextus totus fere pluviosus. Decimus septimus noctu gelidus post sparsa nive mitior, ut & decimus octavus cum parca nive gelascens. Decimus nonus post pluviam gelidus ac nivosus, post serenior. Vigessimus quoque gelu cum parca nive miscuit, in pluviam tandem deliquescens. Vigessimus primus tota die udosus. Vigessimus secundus mane & circa vespem pluvius. Vigessimus tertius mane parum pluviae, post verna temperiem submisit. Vigesimo quarto mane parum nebuloso æthere serenus successit ac siccus. Vigessimus quintus ventosus æthere sereno nivium aspergine subinde variato. Vigessimus sextus perinde ventosus nivem cum pluvia ac sereno sæpius cambiit. Vigessimus septimus matutino tempore serenus, post turbidus ac ventosus. Vigessimus octavus mane nivosus, a meridie pluviosus. Vigessimus nonus nubilosus, temperatus tamen. Triduo sequente sereno, temperato ac verna amœnitate & tepore grato mensi simul ac trimestre primum finit.

Morbi præter scorbutum, Proteum illum plurimorum symptomatum syndrome variatum ac hic loci endemium, frequentiores fuerunt febres variæ, continuas & intermittentes benignas & malignas catarrhales & caustodes, purpureas, pleuritides ac arthritides quandoque comitatas, cephalalgias, vertigines, passiones hysterica, asthma, cachexia & cacochymia.

Aprilis primus dies vernæ serenitatis ac temperiei particeps, circa vespem pluviola madidus fuit. Secundus mane obscurus a meridie serenus ac frigidus. Tertius, quartus & quintus primo ex affe similes, nisi quod postremus paulo frigidior. Sextus mane turbidus cum aspergine pluviolæ, postea serenus. Septimus serenus, sed frigidulus. Octavus ad decimum tertium usque sudo ac temperie, præter decimum paulo calidiorem, amœni. Decimus tertius turbidus ac ventosus mane, post serenitatem pluviolis miscuit. Decimus quartus frigidulus ac ventosus cum aspergine pluviarum. Decimus quintus totus pluviosus, ut & decimus sextus, subinde tamen paulo serenior. Decimus septimus mane pluvias sparsit pauco grandine mixtas, a meridie serenus. Decimus octavus serenus, temperatus & amœnus, nec non decimus nonus excepta pruina nocturna talis. Vigessimus cum vigesimo primo secundo verna amœnitate grati, nisi quod postremus una cum biduo sequenti pluviolarum aspergine sub vespem torridi. Vigessimus quintus obscurus ac nubilosus, raroque intercedente sudo siccus. Vigessimus sextus verna temperie ac pluviolæ subinde aspergine, cum sequenti biduo siccus. Vigessimus nonus variato identidem æthere pluvias sudo miscuit. Trigessimus post pluviam matutinam siccus mensis hunc absolvit.

Maji primus temperato cælo ad secundum mane pluviolæ aspergine uvidum post serenum processit. Secutus tertius mane frigidulus, post serenitas & amœnus, cui compar fere quartus aspergine pluviolæ roridus, cui biduum serenum, siccum & calidum successit, a meridie tamen sexti pluviolam aspergens. Septimus mane serenus, a meridie nubilus. Octavus ad decimum tertium usque sereni ac verna varietate accepti, rara pluviarum aspergine temperari, præter duodecimum cum vento tonitru adducentem. Decimus quartus a meridie modice, decimus quintus valide tonuit; quos biduum decimo, & septimo excepit sudo ac calore verno gratum. Decimus octavus mane nubilus ac ventosus, pluviolis quoque subinde sparsis turbidus. Decimus nonus similis, abs-

que tamen pluvia sicca, ac tandem serenus, a vigesimo sereno ac amœno exceptus temperatus ad vigesimum secundum & sequentes calidiores, vigesimum sextum æstu gravem, & vigesimum nonum verna temperie & amœnitate gratum transit. Reliquum triduum mane serenum, vesperi pluviolis nividum, trigesimo primo modico fulgurum additamento mensẽ hunc circumscripsit.

Junii primus nocturno imbre, diurno sũdo & æstu orsus, secundum serenum & vesperi pluviolæ aspergine udum comitem habuit. Tertius mane ad meridiem usque pluvius, post temperatus ac siccus, quartum mane subinde pluentem alias amœnum ac temperatum præcessit, sequente biduo sereno ac temperato. Septimus pluvius, post ventis flantibus siccus. Octavus serena temperie amœnus. Nonus pluviolis serenitatem subinde variavit. Decimus mane ad meridiem usque imbrofus. Decimus semel a meridie imbre molestus, alias serenus. Duodecimus pluviolarum aspergine quandoque varius. Decimus tertius serenus ac siccus, ventosus tamen simul ac frigidus, compares habuit decimum quartum, quintum & sextum, hunc æstuosum simul valde ac procellosum. Decimus septimus nubilus ac ventosus cum aspergine pluviolarum nonnunquam mixtus. Decimus octavus amœna temperie gratus. Decimus nonus nubilus ac frigidulus, pluviolis subinde rorans, cui vigesimus post noctem pluviolam æqualis, temperata amœnitate ventis placidis velut etesiis interpolatus. Vigesimo primus denuo serenus ac calidus. Vigesimo secundus æstu paulo gravior. Vigesimo tertius sũdo simul & æstu molestus. Vigesimo quartus æstu ventis paulo temperatori. Vigesimo quintus pluviola moderatus. Vigesimo sextus totus fere cum tonitru pluviolus. Vigesimo septimus mane & vesperi parum pluvius. Vigesimo octavus mane nubilus, postea clarescens. Vigesimo nonus mane serenus, a meridie pluviolus. Trigessimus mane ad meridiem usque serenus, a meridie quandoque pluvius, mensẽ simul & trimestre secundum finiit.

Morbi hoc secundo trimestri infensiores fuere cacochymia, & cachexia scorbutica variique alii affectus ejusdem farinae, febres variæ continuæ & intermittentes, tertianæ, catarrhales, ardentes benignæ ac malignæ, variolis quandoque comitata & morbillis, pleuritides veræ ut plurimum nonnunquam spuria, hypochondriacæ affectiones & passionēs hysterica, tussis inveterata, & graves, phthiseos & hectica comites. Icteri, colicæ passionēs, cholera, diarrhoeæ.

Augusti primus nubilus ac pluviolus. Secundus obscurus & ventosus subinde pluviolas aspergens. Tertius mane nubilus ac parce pluvius a meridie serenus, triduo sũdo ac calido exceptus. Septimus post mane aspergine varius, a meridie tonitru terruit. Octavus mane serenus, a meridie modice pluvius. Nonus sũdo. Decimus idem etesiis temperatum. Undecimus sũdo æstuosum, æstivum ut & duodecimus etesiis mixtum induxerunt, reliqui, exceptis decimo tertio his destituto, decimo octavo mane semel pluvio, vigesimo quarto vesperi cum imbre tonitru inducente, vigesimo quinto mane nubilo, ac ventis turbido, omnes ad finem usque mensis æstivo æstu perseverarunt, præter trigessimum primum, mensẽ hunc cælo turbido vesperi claudentem.

Septembris primum biduum sũdo & etesiis gratum. Tertius nubilus & procellofus. Quartus mane frigidus & serenus, a meridie nubilus ac turbidus, triduo pluviolo, frigido, ac ventoso exceptus. Octavus cum nono paulo temperatior ac calidior. Decimus serenus ac temperie amœnus. Undecimus sæpius pluviolus ac tandem imbrofus. Duodecimus, decimus tertius, & quartus cum sequentibus ad vigesimum primum usque præter morem æstivo calore & amœnitate grati serenitate pluvias vicerunt. Vigesimo secundus ad meridiem usque mane pluviolus, post serenus, ut & vigesimus tertius & quartus æstivo calore commendabiles. Biduo intercedente pluviolo rursus ad vigesimum octavum usque nubilum, sereno tepore laudabiles. Vigesimo nonus aspergine vespertina pluviolarum, trigessimus nubilo cælo a prioribus diversi tandem serenitate reduce mensẽ hunc ac simul trimestre coronide ornavit.

Morbi hujus trimestris fuere præter scorbuticas ac hypochondriacas affectiones, colicæ, diarrhoeæ ac dysenteria, febres variæ intermittentes & continuæ ardentes, etiam malignæ variolis, morbillis ac purpura nonnunquam suspectæ, pleuritides utriusque generis arthritides vagæ scorbuticæ, paralyfes & apoplexiæ, asthmata dispnoæ, tussis graves ac diturnæ, cachexia.

Octobris primus nubilus ac ventosus, sũdo tamen subinde mixtus. Secundus mane serenus a meridie nubilus. Tertius mane serenus, a meridie turbidus ac pluviolus. Quartus & quintus mane nubili, cum aspergine pluviarum. Sextus vice versa mane serenus, a meridie pluvius. Septimus post nebulam serenus & amœnus. Octavus mane pluvia parum roridus, alias amœnus, nono quoque ac decimo sicque ad undecimum nubilum ac subinde pluvium transit. Duodecimus nubilus, & subsequenter imbrofus. Decimus tertius procellofus ac sæpius nimbofus. Decimus quartus frigidulus ac ventosus mane, a meridie serenus, semel tantum imbre madens. Decimus quintus serenus mane ac frigidus, a meridie parum pluviæ spargens. Decimus sextus mane nubilus, post nubilus ac frigidus. Decimus septimus frigidus & pluviis mixtus. Decimus octavus frigidus cælo serenus. Decimus nonus primam nivem sparsit serenante postea cælo. Vigesimo & vigesimo primo tota die cum nive pluviæ. Vigesimo secundo cum sũdo frigus ac gelu moderatum. Vigesimo tertius post mane gelidum pluvias dedit degelascens. Vigesimo quartus mane turbidus, postea clarescens. Vigesimo quintus mane pluvius, a meridie nubilus cum pluviolarum aspergine. Vigesimo sextus mane pluviolus, postea serenitatis parum subinde miscens. Vigesimo septimus siccus, sed nubilus, solis splendore paulo interdum interlucens. Vigesimo octavus ad meridiem usque pluviolarum aspergine madens, a meridie nubilus ac siccus. Vigesimo nonus mane nubilus, postea serenus, sed frigidulus. Trigessimus frigidus & pruinosus. Trigessimus primus temperie autumnali grata mensẽ finiit.

Novembris primus ac secundus frigidi, sparsa parumper nive, post, que pluviola. Tertius & quartus temperati & amœni, ut & quintus nisi sparsa sub finem pluviola turbidus. Sextus mane nubilus, post vento frigidus molestus. Septimus nubilo mitior. Octavus nubilus ac frigidus. Nono successit simile biduum cum sũdo frigidulum. Duodecimus nubilus ac subfrigidus. Decimus tertius satis temperatus. Decimus quartus mane ad meridiem usque nubilus, a meridie pluviolus. Decimus quintus mane pluvius, post turbidus ac humidus. Decimus sextus nubilus, frigidus ac siccus. Decimus septimus idem, paucis interspersis nivium micis. Decimus octavus perinde sed sine nive gelidus. Decimo

nono ut & vigesimo sũdo subsequente noctu rigido gelu. Vigesimo primus nubilus; ut & vigesimo secundus tandem pluviolæ aspergine mirelscens. Vigesimo tertius mane nubilus, aspergine pluviolarum modica sub vespera rorans. Vigesimo quartus totus nubilus ac frigidus, ut & vigesimus quintus vesperi pluvius. Vigesimo sextus cum septimo temperati & amœni. Vigesimo octavus nubilus ac frigidus, siccus tamen. Vigesimo nonus, mane nubilus, post serenus ac temperatus. Trigessimus post modicam pruina mane serenus ac temperatus, circa vesperam pluvia mensẽ terminavit.

Decembris primus post nebulam matutinam ut & secundus sereni ac temperati, nec non tertius unica pluviolæ aspergine roridus. Quartus post nebulam matutinam serenus. Quintus sũdo frigidus. Sextus quarto similis. Septimus tota die serenus, circa vesperam inadiit. Octavus sereno cælo procellofus, nono quoque continuante procella, & pluvia a meridie interspersa. Decimus mane ad meridiem pluvius, post serenus, ac sedata procella placidus. Undecimus mane serenus, a meridie parum pluvius. Duodecimus totus pluviolus. Decimus tertius mane serenus, a meridie pluviolæ aspergine udus. Decimus quartus tota fere die pluviolus & imbrofus, ut & decimus quintus totus nimbofus & sub vesperam procellofus. Decimus sextus mane gelidus, post tota die serenus ac frigidus. Decimus septimus mane nubilus, ac mitis; tandem in pluviæ asperginem desinens. Decimus octavus mane nubilus, post pluviolus. Decimus nonus gelidus mane, ac serenus. Vigesimo aere obscuro gelidus. Vigesimo primus cum sũdo degelascens. Vigesimo secundus rigide gelans. Vigesimo tertius noctu nivem sparsit, post degelascens pluviolas. Vigesimo quartus nubilus ac humidus. Vigesimo quintus cælo sereno degelascens. Vigesimo sextus noctu nivofus, post nubilus, mox tandem serenus ac gelidus, ut & vigesimo octavus a meridie serenus. Vigesimo nonus cælo sereno rigide gelans. Trigessimus ut & trigessimus primus ex parte, ningentes mensẽ hunc simul & trimestre quartum ut & annum 1703. abolverunt.

Morbi huic trimestri familiares, præter endemios sæpius indigatos, fuerunt febres omnis generis fere, ardentes, malignæ, variolis suspectæ, intermittentes, tertianæ, quartanæ, ephemeræ, catarrhales, hectica, phthises, tussis ferina & inveterata, colicæ passionēs, scorbuticæ etiam, diarrhoeæ, arthritides scorbuticæ, vagæ & fixæ, paralyfes, cephalæ contumaces, hemicrania, passionēs hypochondriacæ & hysterica &c.

Constitutio Epidemica Berolinensis Anni 1704.

Januarii primus paucis nivium flocculis gelu orsus, paululum mox rursus remisit. Successit huic triduum cælo sereno gelidum.

Quintus cum sexto noctu totoque sequenti die nives sparsit, quorum postremus cessante nive turbidus ac frigidus. Septimus cum biduo sequenti cælo quandoque sereno gelidus. Decimus pauca interspersa nive circa vesperam remissior. Undecimus cum sequenti duodecimo ventosi ac procellosi. Decimus tertius rigido gelu horridus. Decimus quartus paululum remissior. Decimus quintus rigidum decimi tertii gelu redintegravit. Decimus sextus mane remissior, a meridie robur prioris resumpsit, cum sequenti decimo septimo paucos nivium flocculos aspergente. Decimus octavus noctu nives parumper auxit. Decimus nonus gelu pauculos denuo nivium flocculos miscuit, noctu austiores cum gelu satis rigido. Vigesimo nox cum nive copiosa procellosa inter vigesimum primum & vigesimum secundum sine nive gelidum successit, ut & sequens vigesimus tertius pauca nive præmissa serenus. Vigesimo quartus satis rigide gelidus circa vesperam nivofus ac ventosus. Vigesimo sextus noctu cum pluvia regelans, tandem serenus ac temperatus. Vigesimo septimus ea temperie sine pluvia ac nive continuavit. Ut & vigesimo octavus circa vesperam cum sequenti vigesimo nono procellofus ac parum pluvius. Trigessimus post gelu modicum a meridie serenus, tandem cum nive ventosus. Trigessimus primus mensis postremus procellofus admodum ac subinde pluviolus.

Februarii primi nox tempestuosa, succedens dies pluviolus grandinosus ac procellofus. Secundus illi ex parte similis modice degelascens, mane parum ac vesperi ningens. Tertius vento cum pluviis & pluviolis mixto varius. Quartus noctu gelidus postea serenus, ac verna quasi temperie amœnus. Quintus mane parum degelascens cætera turbidus, siccus, tandemque temperatus. Sextus absque omni gelu priori similis. Septimus turbidus ac ventosus, a meridie cum nive nimbofus. Cui triduum successit temperatum, siccum ac tranquillum. Undecimus remissior, sparsis quandoque pluviis udus ac ventosus. Duodecimus dempta pluvia priori æqualis. Decimus tertius turbidus, sparsis quandoque pluviis ac pluviolis cum sequenti decimo quarto a priori diversus. Decimus quintus cum decimo sexto noctu gelidi, de die cum serenitate procellosi. Triduum sequens noctu gelidum, mane nivofum, tandemque pluviolis aspersis uvidum. Vigesimo noctu gelidus ac nivofus, post paulo serenior. Vigesimo primus cælo sereno gelidus, paulo grandine niveo interfecto. Vigesimo secundus & vigesimo tertius mane cælo sereno satis gelidi, a meridie remissiores. Triduum subsequens rigide gelans Biduum sequens nive admixta paulo remissius. Vigesimo nonus nive vacuus mensẽ absolvit hunc intercalarem.

Martii primus mane gelidus, cætera serenus ac remissior, una cum sequenti quarriduo verna temperie ac amœnitate commendabilis. Sextus satis gelidus, turbidus ac procellofus, ut & septimus, tandem serenior. Octavus pauca nive turbidus ac aliquanto remissior, ut & nonus ac decimus tota die tales, prætereaque turbidi ac ventosi. Undecimus serenus vernaque temperie gratus, cum biduo sequenti, cuius tamen postremus decimus tertius paulo obscurior ac noctu gelidior, decimus quartus cum undecimo verna serenitate certans. Decimus quintus mane pluvia cum tepore fecunda verna amœnitate commendabilis. Decimus sextus turbidus ac ventosus, pluviola quandoque riguus. Decimus septimus mane sparsis subinde pluviolis turbidior, serenitate postmodum grata amœnus. Decimus octavus toto mane turbidus a meridie pluviolus. Decimus nonus cum sequenti triduo mane pluvius, post frigidulus, ast siccus. Vigesimo tertius mane gelidus, paulo post serenus, frigidulus ac parum ventosus. Sequens quarriduum temperate frigidum, ventosum ac obscurum. 28vus mane paulo obscurior, postea sũdo ac serena temperie acceptus, ut & sequens 29vus, vento frigidore solum diversus. 30vus nubilus, frigidulus subindeque pluvius. Postremus 31vus vento austrino frigido serenitate aspirante temperatus trimestre primum terminavit.

Morbi hac anni quadra præter scorbutum endemium, & lueni fere

fere epidemicam, febres fuere variæ, cum tertiana, duplicata, continua & ardentes, benignæ, & malignæ, catarrhales, & acutæ variis symptomatibus stipatæ, cum & sine tussi, hæcticæ, in phthisin declives, pleuritides, asthmata, dyspnœæ, arthritides statæ & vagæ scorbuticæ, icteri, catdialgiæ, hæmorrhagiæ uteri.

Aprilis primus nubilosus, pluviolis subinde aspersis frigidus. 2dus mane pluvius, post aliquanto serenior. 3tius serenior ac temperatus, vespere pluviolosus. Cui congener 4tus subinde pluviolas spargens. 5tus noctu tonuit, a meridie pluit, cætera serenior ac calidus. 6tus verna serenitate ac tempore gratus cum biduo sequenti. 7mus tamen paulo frigidior ac ventosus. 9nus mane turbidus ac frigidulus, tandem post pluviam fecundam serenior. 10mus æthere fecunda serenitate, pluviolis interdum interpolata, laudabilis. 11mus cum sequentibus duobus verna temperie ac serenitate commendabiles, ut & 13tius circa vespere paulum pluviam aspergens. 14tus sudum cum nubilo ac pluviis quibusdam miscuit. 15tus cum sequente fecundo cælo frigidulo parumper temperati. 17mus exiguum matutinum gelu sudo temperans, sequentibus ad 23tium usque, 19no ac 20mo præsertim æstivo fere calore amœnis, 23tio paululum pluviam addidit. Sequens triduum temperata serenitate ad vespere usque postremi paulo obscuriorem continuavit. 27mus mane pluvius, post frigidulus & nubilosus, perinde ut & 28vus absque tamen pluvia. 29nus temperatus cum 30. mensis postremo, paulo tamen frigidior & ventoso.

Majus eodem tenore cœpit pluviolas interdum miscens, 2dus serenior paulo & siccior. 3tius ut & sequentes ad 7timum usque sparsis quandoque pluviolis udi & subfrigidi, postremus 7mus noctu cum pruina grandinosus, mane serenior. 8vus mane frigidus ac ventosus, a meridie serenior ac calidus. 9nus verna temperie amœnus ut & 10mus circa vespere paulum pluviam, 11mus serenior ac calidus. 12mus adhuc calidior subsequente sero pluvio. 13tius absque pluvia similis. 14tus mane ad meridiem usque nubilosus ac subfrigidus, postea serenior. 15tus & sequentes verna serenitate ac spirantibus quandoque etefiis æstiva quasi temperie commendabiles, ad 20mum usque obscurum, pluvia moderata, subinde interpolatum. 21mus cum sequente triduo serenior, calidus & amœnus, parum ventosus ad 24tium usque posttonitru moderatum a vento impetuoso frigidior. Quatriduum sequens obscurum, quandoque cum, alias sine pluvia, ad 29num usque perinde turbidum sæpiusque pluvium. 30mus cum 31mo, mensis hujus postremo sine pluvia nubilosi.

Junii primus temperata serenitate ad vespere usque parumper pluviam amœnus. 2dus turbidior ac frigidior mane, a meridie serenitatem aliqualem subinde pluviis miscuit. Sequentes sudo temperati, calidi ac siccidi ad 9num usque vespere parum pluentem. 10mus cum 11mo frigidus ac ventosus. 12mus cum sequentibus serenior, calidi ac placidi, præter 13m paulo obscuriorem, ad 17mum tota die pluvium, 18vus frigidulus & obscurus, serenitate nonnunquam interpolatus, vespere pluviolosus. 19nus ventosus & a meridie imbrofus. 20mus temperatus, ut 21mus sero parum pluens. 22dus obscurior paulo, siccus tamen temperatus. 23tius serenior præcedenti. 24tus cum triduo sequenti serenitatem pluviis intercalavit, ad 28vum usque & 29num serenior, temperatus, siccus & amœnus, 30mus paucis pluviis quandoque intermixtis obscurus mensi simul cum hoc anni quadrante clausit.

Morbi hoc trimestri priori fere fuerunt analogi, præter nimirum geminos illos endemios, febres rursus varii generis, intermittentes, tertianæ simplices ac duplices, quartanæ, & continuæ ardentes, benignæ & malignæ, variis symptomatibus comitatæ, cum & sine exanthematibus catarrhales, pleuriticæ, in hæcticam & phthisin pronæ, variolæ, morbilli, diarrhœæ, colicæ passionis, cholera, melancholiæ, hypochondriacæ passionis, cephalæ, hemicranæ, paralyfes, epilepsiæ, asthmata cum & sine hydrope, rachitides.

Julii primus serenior ac temperatus vespere pluviolas sparsit. 4tus priori fere similis, nisi quod procellæ semel pluviolam asperxit. 5tus sudo absque pluviis, ventum impetuosum intercalavit. 6tus nubilo cælo serenior absque pluvia induxit æther. 7mus serenior. 8vus sudo æstivus, 9no mane pluvio, serenitas calorem intensum addidit. 10mus pluvias cum sudo alternavit, perinde & 11mus cum nubilo cælo sudum. 12mus temperatus ac siccus. 13tius, serenior & æstuosus. 14tus cum biduo sequenti mane ac vespere pluvii, cætera serenior. 17mus toto fere die pluvius, 18vus mane ad meridiem usque pluviolosus, & ventosus. 19nus mane serenior, a meridie bis pluit. 20mus pluviam cum sudo sparsit frigidulus & ventosus. 21mus mane obscurus pluviolas post quandoque sparsit. 22dus mane quidem serenior, subfrigidus tamen, a meridie pluviolas dispersit. 23tius temperatus, serenior partim, partim pluvius. 24tus amœnus, calidus ac siccus, cum quatriduo sequenti æstivo. 29nus post pluviam matutinam nubilosus, frigidus ac ventosus. 30mus temperatus & amœnus. 31mus post matutinam pluviam serenitate mensi finiit.

Augusti primus ad meridiem usque serenior, a meridie parumper pluvius. 2dus mane nubilosus, postea serenior, & amœnus. 3tius mane parum pluens, postea siccus & obscurus. 4tus tota die sine pluvia nubilosus. 5tus mane turbidus, post serenior. 6tus serenior, calidus & amœnus. 7tius nubilosus ac calidus pluviolas subinde spargens. 8vus sine pluvia serenior ac calidus. 9nus serenior & temperatus in æstium vergens. 10mus huic præcedenti analogus: vespere tonuit. 11mus nubilosus cum sudo alternans vento subinde pluviolas asperxit, cui 12mus similis semel pluviolas maduit. 13tius mane nubilosus ac frigidulus absque pluvia. 14tus pluvias nonnunquam addidit. 15tus procellam impetuosam. 16to parum remittentem. 17mus mane nubilosus, circa vespere serenior ac calidus. 18vus serenior & ob calorem temperatum amœnus. 19nus æstuosior paulo. 20mus remissior mane ac modica pluvia fecundus. 21mus serenior, calidus ac siccus, præter 23m valde æstuosum, ad 26tium nubilosus mane ac subfrigidus, 27mus cum 28vo pluviolarum quandoque aspergine ventosi. Biduum sequens serenior ac calidum. 31mus mensis postremus etefiis æstium præcedentem temperavit.

Septembris primus nubilosus mane, post ob ventum frigidus. 2dus paulo temperatior. 3tius primo fere similis, subinde pluvius. Triduum sequens mane pluviolosus, a meridie serenior. 7mus nubilosus, frigidus & siccus, ad usque vespere pluviolam spargentem. 8vus perinde frigidus, sed sæpius pluviolis madens. 9nus mane ad meridiem usque 7mo compar, a meridie pluit, tandem serenior. 10mus temperatus ac serenior totus, ut & triduum sequens ad me-

ridiem usque 13ii, a meridie quandoque pluentis. Pariter & 15tus circa meridiem semel pluens. 15tus ventosus subinde ac pluviolosus. 16tus cum 17mo siccus, temperati & amœni. 18vo sudum ut plurimum pluviis sparsim mixtum. 19mus temperatus, serenior & amœnus. 20mus mane & a meridie quandoque pluvius, cætera temperatus, serenior & amœnus. 21mus circa primam pomeridianam parum pluit reliquo temperatus & serenior. Biduum sequens turbidum, frigidum & ventosum, subinde pluens. 24tus nubilosus ac procellosus, 25tus ut & 26tus nonnunquam pluvias fundens. 27mus toto fere die pluviolosus. 28vus post pluviam matutinam subfrigidus & serenior. 29nus temperatus, serenior & amœnus, 30mus æstiva serenitate & calore mensi hunc simulque trimestre anni tertium absolvit.

Morbi hujus trimestris haud multum abluunt a prioribus, gemini nempe illorum Choragi cum affeclis suis in hac quoque tragædia personas suas egerunt, præterque illos febres omnis fere generis ephemera, hemitritæ, tertianæ, simplices & duplices, erraticæ & exquisitæ, quotidianæ, intermittentes & continuæ, putridæ, ut olim audierunt, & causodes, quartanæ quoque, benignæ pariter, & malignæ exanthematibus se prodentes, variolæ & morbilli, pleuriticæ, erysipelatodies, hæcticæ, & phthisicæ, catarrhales tandem, cephalæ pertinaces, & enormes, paralyfes, epilepsiæ, tussis contumaces, asthmata subinde convulsiva, inflammationes gutturis, anginæ, hæmoptoes, stranguriæ, hydropes, hypochondriaci affeclis, hystericae passionis, cholera, dyarrhœa & dysenteria, rheumatismi, chloroses, hæmorrhoides cæcæ & cruentæ.

Octobris primo serenior ac temperatus, 2dus mane obscurus, post serenior. 3tius mane nubilosus, mox serenior. 4tus mane pluvius, vespere serenior & frigidulus. 5tus procella pluviis mixta tempestuosus. 6tus de die frigidus & siccus, vespere pluviolosus. 7mus cum pluvia modica procellosus. 8vus serenior, quandoque tamen pluvius. 9nus cum 10mo temperate serenior. 11mus tempestuosus, frigidus ac pluviolosus. 12mus serenior & subfrigidus. 13tius mane serenior postea impetuoso ac frigidus. 14tus ad 23tium mane pluviolosus usque serenior, siccus ac temperati, præter 16tum, 19num & 22dum mane paulo obscuriores. 24tus mane turbidus ac frigidus, postea serenior. 25tus pruinosus & glacialis, cætera serenior. 26tus valide gelans, 27mus paulo remissior. 38vus cum 29no rigide gelidi. 30mus cum 31mo postremo hujus mensis mane pluvii, post serenior.

Novembris primus & secundus mane nabili, post subinde pluvii. 3tius serenior & temperatus. 4tus mane gelidus, postea serenior. 5tus cum modica nebula gelidus, 6tus & 7mus mane gelidi, vespere remissiores. 8vus cælo sereno remissus. 9nus noctu remisse gelascens, alias cum serenitate amœne temperatus cui compar fere 10mus, obscurior tamen paulo, sparsis nonnunquam modice pluviolis. 11mus huic similis vespere pluvius. 12mus satis alias serenior, semel parum pluviolæ sparsit. 13tius tota fere die pluviolosus. 14tus siccus ac frigidus. 15tus mane pluviolosus cum siccitate postea alternavit, 16tus cum 17mo pluviolosus. 18vus vento satis forti aspirante serenior, pluviolam raram sero spargens. 19nus frigidus sæpiusque pluviolosus. 20mus procellosus insuper. 21mus cum 22do grandinosus quoque. 23tius cum 24to perinde, quandoque tamen serenior. 25tus sudum cum nubilo, sicco sufflante vento campfit. 26tus toto fere die imbrofus. 27mus serenior ac subgelidus. 28vus mane gelidus, post nubilosus. 29nus nubilosus ac frigidus, 30mus mensis postremus spirante aquilone turbidus, humidus ac frigidus.

Decembris primus postremo Novembris ex affe similis, turbidus, humidus ac frigidus, ut & secundus, sed siccior paulo. 3tius sereno cælo gelidus. 4tus post matutinum gelicidium, cum 5to continue pluens. 6tus quandoque tantum pluviolas sparsit. 7mus nubilosus, siccus tamen. 8vus noctu gelavit, de die serenior. 9nus noctu nixit, de die sereno cælo gelavit. 10mus satis rigide gelans. 11mus regelavit. 12mus remisse gelidus mane absque pluvia, 13tius & 14tus ut 15tus cum sequenti triduo cum pluvia remissiores. 18vus mane etiam imbre maduit, a meridie sole eluctante parum inclauit. 19nus gelidus ac nivofus. 20mus ad 23tium usque sine nive gelidus cælo sereno. 23tius remissior nubilosus & nubilosus. 24tus cum 25to post nebulam matutinam imbrofi, triduum sequens ventosum regelans ac pluviolosus. 29nus parum gelascens atque ningens. 30mus & 31mus rigido gelu mensi huic & trimestri, simulque anno 1704. colophonem imposuit.

Morbi, si scorbutum ejusque comites, & sub illius larva sæpius latitantem infamem illam luem, cum appendicibus illorum exceperis, morbi hoc trimestri non adeo frequentes fuere ac præcedentibus. Febres nonnullæ ardentes & malignæ, quæ morbillis aut variolis ut plurimum stipatæ, catarrhales, pleuriticæ in tussis & phthisin declinantes, vagæ quandoque, catarrhis suffocativis sociatæ, melancholiæ hypochondriacæ, & passionis hysterica, cephalæ & cachexiæ, tussis contumaces admodum &c.

Constitutio Epidemica Holsatica Anni 1706.

Dn. D. GUNTHERI CHRISTOPHORI SCHELHAMERI.

Hic jam morbi penitus silent, toto autem hoc anno variolæ confluentes sævissime sunt grassatæ, multaue propemodum dixerim millia infantum maxime tum & juvenum & adultorum raptuere per Holsatiam & Hamburgi. Prorsus autem tales se exhibuere, quales Sydenhamius describit. In principio mites, mox 2. vel 3. die erumpentes, optime sibi constantes, neque gravioribus symptomatibus stipatæ, præterquam quod deliria statim ab initio usque ad finem, levia tamen, adessent. Ubi vero ad statum perveniebant, & suppurabantur, nihil remittebat calor, pulsus semper frequens & celer, æqualis tamen nec admodum debilis erat, sed die 9. 10. vel 11. ubi ad summum ascendere oportebat, subito, & quasi in momento foveam ostendebant, confluebant, concidebant, pallescent, instar lepræ, in facie præsertim, & tum actum erat. Alexipharma & calidis exhibitis, iterum tuebantur quidem, sed mox rediebant ad pristinum. V.S. ubi adhiberi poterat initio, optime cedebat, etiam in infantibus. Nonnunquam petechiæ conjungebantur in principio. Ubi vero evadebant ægri, scditate maxime faciei pulchritudo evertatur, oculi contorti, immo cæcitas etiam, ingentes furunculi, aut fistulæ ossa etiam exedentes brevisequebantur, & sphacelus.

Constitutio anni 1709. Apud Labacenses in Carniola notata a

Dn. D. MARCO GERBEZIO.

Posteaquam præterisset anni 1708. autumnus fere in meris nivium cum pluviis, nebulisque vicissitudinibus, subingressus erat annus jamjam ad exitum properans 1709. cum eis nivibus, frigoribusque, quantorum fere non recordamur unquam. Hippocrates 3. Aph. 17. quidem laudavit frigidas aeris constitutiones, dum dixit, *Aquiloniæ constitutiones cogere corpora, firma, agilia, beneque colorata, ac auditu valentiora reddere*. Quantam tamen vim ex fere universæ naturæ inferre valeant, si frigus suos limites transcendat, quemadmodum factum anno ad finem decurrente 1709. experta est cum maxima sua calamitate universa Europa, & propterea quoque nos Labacenses ipsi, quibus plane terra ipsa fuerat a frigoris in Aprilis usque protensi, rarissimisque vicibus ab austris paulisper retuli inclementia adeo effœta, & infœcunda reddita, ut colonis pro suis laboribus vix satorum semen, & illud ipsum effœctum, & ærugine corrugatum reddiderit. Arbores frugiferæ, e quibus persicæ fere cunctæ fideratæ, aut nullum, aut parvissimum, & eum fere verninosum, corrugatum, & certis nigris stigmatibus ab ærugine maculatum fructum portavere. Vites similiter usque ad radices emortuæ omnibus botrorum opimitate destitutæ, & sic de aliis. Quin saxa ipsa observabantur alicubi præ frigore in arenas comminuta. Et parvi demum æstimari poterat istud, si hujusmodi strages non etiam animata, & inter ea quoque hominem ipsum contigisset: verum deploravimus, & deploramus etiamnum, quod (ut reliqua animantia silentio præteream, quorum tamen plurima fuere frigore exanimata) ejus inclementiam quoque ex incolis nostris plurimi, & nonnulli singularissimi viri propriæ vitæ intereptione luerint. Tot siquidem vix unquam vidimus apoplexiis repente sublatos, tot vertiginosos, arthriticos, catarrhosos, pleuriticos, phthiricos &c. quot hoc ipso anno. Cui alteri autem imputari poterat strages isthæc, quam recta enarratæ immensi frigoris immanitati? Cuius, cum juxta a nobis in Chronologia nostra medica Anni I. §. XXII. & alibi dicta, vis sit refrigerare, condensare, incrassare, coagulare, adstringere, & sanguinem cum reliquis corporum succis ob inhærentes sibi magna quantitate nitrosas, vitriolicas, & alias salinas atomos acrem reddere; qui aliter fieri potuit, quam, quod intolerabilitate illa frigoris oculis cutis pori ingentem alias per insensibilem perspirationem excludendam noxiorum humorum saburram in corporibus retinebant, quæ intus coagulata facile in cerebri meatibus substitit, desuperque aut repentina corporum in excalescentis hypocaustis incallescens, aut alia quacunque occasione attenuata, & dissoluta eatenus diffudit, ut universos, vel saltem potissimos cerebri meatus, & nervorum inde in reliquum corpus protensorum origines inundaret, obstruxeritque, eoque ipso spiritibus animalibus suam circulationem, & consuetum in subjectas partes influxum præpedierit. Unde repentinæ illæ, de quibus supra, apoplexiæ, vel si qua obstructions tantæ non fuere, tantæ tamen, ut præ iis spiritus animales cursum suum debito sibi tramite prosequi non potuerint, sed potius in gyrum acti fuerint; vertigines illæ, vel saltem certe fluctuatione cerebri sæpe sæpius apoplexiarum, vel epilepsiarum prodromi: de quibus hoc anno plurimi non solum fuere lamentati, sed quipiam plane apoplectici successively, vel epileptici facti. Quod si autem tales coagulationes & subsistentiæ, seu stagnationes dictorum humorum simili modo in aliis corporis partibus quandoque accidere, aliæ ibidem evenire indispositiones; veluti in pulmonibus vomitæ, ad quas postea consecutæ sunt primum tussitationes inanes, successively humida, & sæpe cruentæ; ultimam plane purulentæ cum totius corporis contabescens phthiricos nomine veniente, & interitu ipso: in collo scrophulæ, alibi alterius generis tumores. Quatenus tales humores autem copiosius ad nares distillabant, ad fauces, aut alias partes, evadebant gravedinum, rucedinum, tussium, & aliarum vulgo dictarum defluxionum causa, sicut arthriticorum, & rheumaticorum dolorum, si ii a frigore justo acriores redditi, inque periorum articulorum, vel etiam interjacentium partium depositi, ea sua acredine rodebant, lancinabantque &c.

Sicut autem reliquus anni decursus erat quoad aeris temperiem ordinatior, ita erat sanitati humanæ conferentior: excepto, quod vere Aprilis fuerit repente a præter morem vigorosis & constantibus solis radiis adeo excalescentis, ut auræ temperie fere æstatem præ se ferret: Majus e contra ob prædominantem cum enro boream, pluviasque adeo rursus perfrigeratus, ut præ se ferret autumnum, quod ominosum Hippocrati 3. aph. 1. quod tempus præterea etiam notabiliter plurimum erat ferax morborum. Æstate e contra & autumno, utpote quoad auræ temperiem regulatoribus, tanto salubrius vivebatur, neque observabantur in eis facile aliæ indispositiones (exceptis variolis toti anno communibus) præterquam sporadicæ, & quæ potius erroribus circa victus rationem commissis videbantur esse imputandæ, quam aeris vitiiis: febres puta potissimum intermittentes, vomitiones, alvi fluxus, colici dolores &c. quamvis & ad hos poterat jam prius aliquod fundamentum jecisse prægressum adeo rigidum hyemale frigus saltem sua acredine: sicut pariter ad vertigines illas, & apoplexiæ, quæ quibusdam etiam æstate ipsa, & autumno fuere perniciosæ. Probatum siquidem fuit a nobis in præcitatæ nostræ *Chronologie Med. Ann. I. §. XLIII.* morbos, qui in temporibus accidunt, non tam ex præsentibus, quam ex præteritis aeris morbidis constitutionibus esse dimetiendos.

Nunc, qui præterit, December jam in alteram hebdomadam constantibus zephyris perflatur cælo nunc nubilo, nunc pluvioso, jugiter autem vaporoso, existente. Metuo valde, ne cum tempore sinistri quid parturiat. Curationes denique hæcenus enarratorum, & aliorum brevitatis gratia præteritorum morborum, quod concernit, ex quidem nihil singulare præ se tulere, utpote remediis nobis familiaribus, & in similibus casibus in *Chronologia nostra Medica* hinc & inde notatis communiter feliciter institutæ, sicut tamen apoplexiæ communiter fuere fortes; adeoque ex sententia Hipp. 2. aph. 41. incurabiles, ita nullam recepere curationem, uti neque confirmatæ phthirides. Quæ apoplexiæ autem fuere leviores, ex quidem demum rursus fuere superatæ, sed valde lente: quemadmodum in certo arcium Præfecto, quamvis ego eum non tam pro apoplectico habuerim, quam cui memoria adeo erat læsa, ut sui idiomatis omnimode per aliquot

hebdomadas oblitus fuerit. Reliqui siquidem sensus utcumque sibi constabant, ille se etiam, quantum ex signis colligebatur, super omnia reflectebat: solum (quod quid est plane singulare) nullam prorsus rem significativa aliqua voce nominare poterat; verum quæcumque ad se explicandum loquebatur, vel etiam scribebat, erant articulata quidem, sed nihil significativa, qui nunc demum tamen ad tot usurpata eatenus se recollegit, ut ob defectum vocabulorum significativorum intra loquendum raro tantisper subsistat.

Coxæ dolores fuere etiam plerumque adeo contumaces ut etiamnum sint, qui eis jam a vere hæc acerrime detinentur. Certus Juris Consultus ex eis suppuratis plane interiit. In quo illud admirabar ego, quod priusquam moreretur ille, tussire, pectore dolere, & cruenta rejicere, purulentaque incœpit, ante nunquam pectore indispositus. Procul dubio pus a venis in ulcere absorptum, & circulando ad pulmones delatum, eos adeo corroserat, ut & illi suppurati successive in tabem abierint; sed sic fit, dum Empiricis, sicut in hoc casu, confiditur: ubi prætermissa methodo curandi artificiali bonus se totum Empiricis concediderat.

In variolis denique, quarum curationes similiter feliciter succedebant remediis a nobis in Chronologia nostra medica descriptis (nisi eis accesserint vel petechiæ vel alvi fluxus) mirabar ego, quod quantumvis illæ fuerint satis alias malignæ & propterea multis perniciosæ; nullas tamen post se relinquere solitæ sint foveas. Uti, & quod eas hæcenus nondum consecutæ sint febres petechiales; quod tamen, quantum hæcenus observavi, communiter accidere solet. Nisi id forte primo fiat. Earum siquidem nondum est factus finis.

Quia, quibus accesserant alvi fluxus, communiter obierant, lubet curam pro coronide adjungere, quam ego cum felici successu peregi in puellula novem annorum. Illa sub principium invasionis per superna aliquoties vermes rejecerat, per decursum autem dejiciebat frequentissime cum torminibus cruenta, atque adeo versabatur juxta dicta in manifesto vitæ periculo: postquam tamen sequentia ordine usupasset, convaleuit felicissime. Omnium autem primo ipsi injiciebatur talis clyster abstergens. ʒi. Decoct. hordei cum rad. torment. ʒij. flor. ros. rub. p. i. facti 15ʒ. mell. ros. col. ʒʒ. m. f. clyster. Cui paulo post succedebat talis adstringens: Rec. Lact. vacc. chalyb. in quo decoctæ fuere rad. torment. ʒij. herb. polygon. flor. hyperic. & verbasana p. i. ʒv. Adde mell. ros. col. ʒʒ. ter. sigil. pulv. ʒiʒ. m. f. Clyster. qui per decursum etiam sæpius repetebatur.

Secundo per os quotidie assumebatur talis bolus. ʒi. Conserv. menth. elect. diascord. frac. troch. de ter. sigil. ana ʒʒ. unicorn. foss. gr. v. lap. bezoard. or. gr. iij. M. cum fyr. coral. f. bolulus. Cui semper superbibebatur tantillum de vino cydoniorum.

Tertio externe abdomini admovebantur calide a post & ante facculi herb. chamæm. absynth. menth. polygon. & ros. rub. referti, & in vino rubro decocti. Potus denique erat decoctum torment. gran. mastic. & crustæ panis. Cibus oriza, panatellæ ex bis costo &c.

Constitutio Anni 1710.

Quantum in conservanda, vel lædenda humanorum corporum valitudine valeant salubres, vel insalubres, aeris constitutiones, dedimus pluribus in *Chronologia nostra Medica*, & docuit nos proxime valedicturus annus 1710. utpote qui sicut hyeme fuit paucis nivibus perspersus, & propterea toleranter frigidus, ita fuit paucissimis morbis, & eis potius sporadicis, ac ab inordinata victus ratione, quam epidemicis, ac ab insalubri aeris temperie dependentibus obnoxius, plane aliter, ac postremo præterlapsus annus 1709. quem utpote niviosissimum, frigidissimumque ante annum recensueramus, fuisse apoplexiis, epilepsiis, vertiginibus, gravedinibus, cephalæis, pleuritidibus, rucedinibus, tussibus, hemoptiis & omnis generis aliis defluxionibus quam plenissimum. Est verum quidem neque hanc hyemem eis ipsis affectibus omnino caruisse: certum tamen æque est, eis longissime minus fuisse obnoxiam. Neque sine ratione: quando enim tempora in sibi connata temperie citra singulares repentinæ, & multum sensibiles de calido in frigidum &c. mutationes (qualiter factum hac hyeme toleranter boreali, & æqualiter frigida) decurrunt, sicut in corporibus non accedunt singulares alterationes, ita neque singulares morbi. Mutationes siquidem temporum, teste Hipp. 3. aph. 1. potissimum parviunt morbos, & in ipsis temporibus magnæ mutationes aut frigoris aut caloris. Quales proinde cum non acciderint hac hyeme, ea non potuit fuisse singulariter morbosa. Quod ea vero interea tamen morbis non caruerit, fecere ut dixi, potius subinde commissi in victus ratione errores, quam aeris morbola constitutio.

Ver autem sicut erat nonnihil inordinatior, & a septima Aprilis usque ad undecimam ad prægressam mitiorem auram nivoso pluviosum, & ex borea sensibilius frigidum. In Junio etiam sæpe sæpius tempestuoso grandinosum, consequenter pariter ultra modum asperum; ita memoratis defluxionibus tanto magis dives. Cæterum vero tamen ob prægressam, uti dictum, nitentem, & nivibus fere expertem hyemem adeo acceptum, ut jam sub dimidio Aprilis omnia essent in virore, & flore: 21. Aprilis etiam præter solitum filigo actu aristas protruderet.

Quod nunc dictum est de vere, idem plane accipiendum venit de æstate, utpote similiter varia sæpius pluvioso tonitruosa, & ex potissimum prædominante borea sæpe etiam sub ipsis canicularibus potius frigida, quam more sibi debito æstuosa, & præterea etiam præterquam satis, vineisque nociva, catarrhorum, tussium, arthritidum, & morborum autumnalium, si quæ alia ferace. Per anni siquidem tempestates, teste Hipp. 3. aph. 4. quando eodem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. Teste Valleriola etiam de loc. com. lib. 2. cap. 4. Si vicissitudine quadam aquilonius flatus austrinum sequatur, fluxionum tum morbi sequentur.

Autumnus denique non fuit quidem adeo varius, ac communiter esse solet, eo quod excepto fine Octobris quo ex diutius protractis pluviis omnia aquis inundabantur, non fuerit admodum pluviosus, neque consueta ventorum alternatione multum inæqualis: in eo tamen erat præ aliis hujus anni temporibus insalubris, quod fere incessanter aut prædominarentur austri, venti teste Hipp. 3. aph. 5. insaluberrimi, aut aura foisset nebulosa, crassa, humida, vapida, & veluti stagnans diutissime solis radiis orbatæ, ac propterea maxime tetrica, & præsertim melancholicis adversa, merarum obstructionum fabricatrix. Hinc etiam fere nunquam tot consilia medica circa affectiones hypochondriacas habita, quam recte hoc autumno. Quamvis præterea plurima passi fuerint etiam arthritici, quartanarii, & colicis doloribus

loribus torti cum non raro desuper consecutis epilepticis convulsionibus, aut paresibus. Taceo catarrhos, & omnis generis defluxiones, quorum utinam majores effectus non primo in futurum experiremur, vel etiam pestiferæ luis, cum de ejus sævitia alias jam multum spargatur, ulteriorem progressum! Nulla siquidem aeris constitutio solet esse hujusmodi malignitatis adeo ferax, quam recte talis. Quamvis, uti in *vindictis meis Medicis auræ Labacensis* §. XXIX. memini apud nos non eo usque; ob vicinitatem maris Adriatici, ex quo in transitu flatibus austrinis multum particulæ salinarum volatiliū admiscetur, quibus putredinosa illorum malignitas corrigitur. Plurimum sunt passæ etiam in uteris gerentes, propterea sæpius vel ante destinatum tempus puerperæ factæ, vel morbosos fœtus enixæ ob acetabula uterorum ex tantis aeris humiditatibus contracto referta.

Curabantur autem colicis doloribus torti feliciter legibus laxativis per intervalla propinatis, anodynis, quale fuit præprimis ol. amygd. dulc. & carminativis, quale erat decoctum florum chamomil. rom. cum additione succi stercoreis equini avena pasti, & syr. de althæ. Fern. quartanarii præmissis præmittendis tali specifico: rec. cort. peru. alcohol. ʒij. flor. salis armoniaci, antimonii diaphor. ana ʒss. m. f. pulv. detur mane & vespere, sed methodo tali, ut febris non solum emanet, quod plerunque intra hebdomadam fit, verum etiam numquam amplius revertatur, quod etiam facile præcavetur.

Arthritici denique suis specificis, præsertim off. microf. phil. pp. antimonio diaph. cinnab. nativ. mixtura simplici, lumbr. terr. &c.

DISSERTATIO EPISTOLICA

D E

MULHUSINI TERRITORII

Finitimorumque locorum Constitutione Epidemica
Anno 1700. observata,

AD DOM. LUCAM SCHROECKIUM,

Cæsareo-Leopoldinæ Nat. Cur. Academiæ Præsidem &c.

Augustam Vindelicorum transmissa

A JOANNE GEORGIO HOYERO,
Philosopho, Medico Doctore & Cæsareo-Leopoldinæ Nat. Cur.
Academiæ Collega Apollodoro dicto.

§. 1. **L**icet in historia morborum epidemicorum primus vetustissimorum scriptorum Hippocrates desudaverit, & digito quasi filius artis usus tanti laboris prorsus insignes monstraverit, nescio tamen, quo fato sequentium temporum scriptores negligentius ferme tractaverint epidemica. Postquam autem postliminio externi Medici, celeberrimus Sydenhamius de constitutione Londinensi, atque splendidissimum Italiæ sidus Excellentiss. Ramazzinus de constitutione agri Mutinensis scripta divulgaverunt, genus horum scriptorum non solum ab omnibus solide doctis semper fuit expectatum, sed & eorum vicit opinionem.

§. 2. Enim vero cum non minus climata, sub quibus laudatissimi viri suas observationes consignarunt, ut & vitæ genus seu rerum sex non naturalium usus aliæque a nostratibus diversissima sint, ipsique Germani, dum pati videntur idem quod Græci, Angeli, vel Itali, idem profecto non sit, quis obsecro non commendet, quæ plures Excellentissimi Viri de diversarum Germaniæ nostræ provinciarum Constitutionibus Epidemicis conscribere operæ pretium putarunt? Quibus eruditissimis, si parva magnis componere licet, Epidemicam Territorii patrii Mulhusini Constitutionem superaddere ac perillustri tuo nomini inscribere non erubescam. Fateor enim, a singulari gratia tua erga me, de qua suavissime in litteris tuis a me datis scripisti, magis me affectum fuisse, quam Herculem Xenophontium illum a voluptate, ut ea adducar ad hoc suscipiendum amorique tuo plusculum etiam, quam facultas, & copia mea forsitan concedit, largiar.

§. 3. Laudatum itaque liberæ hujus & imperialis civitatis territorium sub elevatione poli 51. grad. 20. minut. in Thuringiæ & Hassiæ confiniis situm ampla, & amœna planitie conspicuum, soli polique singulari clementia beatum, quamvis præ finitimis locis saluberrimum quidem putatum; nihilominus tam ab aeris & tempestatum injuriis, quam ab epidemicis & contagiosis morbis minime fuit immune. Nam ut a fine lapsi præcedentis sæculi potissimum exordiar (pluribus aliis qui duobus lustris, licet minus perfecte notaverim, data occasione intermiscendis) hyemale tempus tam finiti 1699. quam auspiciati 1700. anni nobis prorsus inconspicuum erat: nunc rigido borea ab axe ruente, mox pluvioso nobis libano (vento inter austrum & favonium medio) spirante; nunc maxima nivis copia defluente mox nebulosa ac nubilosa, maximam vero partem pluviosa, rarius procellosa in tempestate, varias subinde molestias creante.

§. 4. Durabat hæc tempestatis varietas ad æquinoctium usque vernalis; & sicut his mensibus variis microcosmi status, ita microcosmus etiam variis symptomatibus, & ægritudinibus erat obnoxius. Tenellorum, qui nutritionis annos nondum exceperant, plures febribus catarrhalibus, nonnulli catarrhis suffocativis decumbebant, qui tamen omnes ferme post adhibita pectoralia balsamica diaphoreticis maritata, laxativis, & emeticis pro re nata interpolatis ex voto convalescebant. Sub finem mensis Januarii, morbillis affligi cœperunt, benignis quidem, adeo ut pluribus, modici calor temperamento servato, sine medicamentorum usu morbilli copiosi erumperent ac tempore solito rursus evanescerent. Paucis atrocius affectis bezoardica fixiora, aquæ destillatæ & papaveracea proderant, quorum nonnullis, qui medicamenta neglexerant prorsus, post exantlatos morbillos tussis cum febre hæctica difficiliter curanda eveniebat.

§. 5. Adultorum quidam doloribus arthriticis tum vagabundis scorbuticis, tum fixioribus (quales morbi nobis endemii quasi sunt) menses hyemales fere durantibus discruciantur, qui tandem per

medicamenta specifica, sudorifera interna, nervina & spirituosa externa, venæ sectiones & sacificationes iteratas &c. unguinosis, & emplasticis (nodos & affectus chronicos imo prorsus incurabiles causantibus) vitatis, feliciter sopiebantur. Alii febribus ardentibus, & malignis, periculosis phenomenis, pleuritide, deliriis, convulsionibus &c. stipatis corripiebantur, non tamen ut annis præcedentibus æque lethiferis, nisi forsitan unus & alter vel ab empirica manu, vel negligentius tractatus ad plures abierit.

§. 6. Imminente tempore vernali anni 1700. humidioris tempestatis status aeris temperatior, & siccior excipiebat, qui per hos menses euro subinde spirante continuabatur: adeo ut pluviae vernaes fertilitatem prælagientes rariores, ipsaque tellus pulverulenta quasi notaretur, & hinc frugum æstivarum spes agricolis dubia redderetur. Id quod eventus ipse pluribus in agris tardius satis comprobabat. Neque enim hordei, avenæ leguminum, pluriumve æstivarum opimam æque quam hybernorum frumentorum siliginis & tritici messem vidimus.

§. 7. Jam morbillos excipiebant variolæ apud alios interstinctæ, apud alios confluentes: quamvis tam vernalibus hisce quam mensibus æstivis, paucis exceptis, qui diætæ limites exceperant limites exceperant liberius, minus funestæ. Neque febres more malignarum decurrentes jam cessabant: nonnullis medicamenta prorsus insuper habentibus in nostro territorio lethales. Vicinorum autem locorum, in primis septentrionem versus sitorum, Libere Imperialis Northusæ & aliorum finitimorum oppidorum & pagorum incolis Hericiniæ sylvæ accolis tam præterito brumali quam hoc vernali tempore magis infensæ & pluribus exitiosæ.

§. 8. His ita contingentibus, non potui non ruminari prognosticon, quod anno superiori 1699. grana illa nigricantia majora in filigine copiosissime reperta & per magnum Thuringiæ tractum ab Hercinia ad Semanam usque sylvam observata (vernacula lingua *Mutter Korn* appellata) curiosis subministrabant: videlicet ab usu monstrosum ejusmodi granorum inevitabili, non sane farina laudabili & altice, sed inutili, depravata, & insalubri protius materia ipsis etiam brutis nauseam movente refertorum, variis morbis, febribus, variolis, morbillis, aliis afflictum iri genus humanum.

§. 9. Cui prælagio cum jam responderet eventus, illorum sententiam confirmare videbantur, qui morbos epidemicos non præsentium, sed præcedentium effectus esse persuasum sibi habent. Quamvis a mente mea impetrare nondum potuerim, ut hoc assertum κατὰ πάντας affirmari posse credam. Certissimum quidem est, prava & depravata alimenta ab annis præcedentibus nobis suppeditata multo usu continuata epidemicos effectus sæpe producere. Qualis enim cibus, talis chylus, qualis chylus talis sanguis, qualis sanguis, talis valetudinis nostræ status. Enimvero constitutiones præsentis non solum plures epidemicos morbos, alimentis etiam sanis existentibus, parere, sed illos etiam, quos vitiosis cibis debemus, quasi modificare seu intendere & remittere cum magno Hippocrate rerum magistra quotidiana experientia testatur. Equis enim dubitavit frigidum, humidum, & cœnosum atmospheræ statum (qualis supra citata nostra hyemalis erat) ἀδύνατον (quæ illustri *Wedelio* teste *Theorem. Med. part. 4. Sect. 2. lib. 3. infinitorum morborum & febrium mater est*) peperisse? De quo pluribus ingeniosissimus *Sanctorius* in *Medicina Statica Sect. 2. aphorism. VI. & VIII. &c.* videndus.

Equis negabit aeris nostri verni & mox dicendi æstivi statum serenioris epidemicos hos affectus benigniores nobis reddidisse? Ut jam ex, quæ superioribus annis de periculosis affectibus epidemicis a præsentis constitutione unice quasi derivandis notavi, nunc mittam, neque de contagio, de nebulis, de roribus vitiosis, & aliis mille malis, (quæ atmospheræ nostra in dies & horas obnoxia,) machinæ mediante respiratione dictum factum exitiosis hic quicquam memorem.

§. 10. Amplissimus hic aperietur campus de nebulis, de roribus, in primis autem de causa dictorum corruptorum filigineorum granorum, rore puta vitioso, mellei saporis & consistentiæ, (nostratibus *Honigthau* nuncupato) differendi: sed ne iusto prolixior sim, ea, quæ hic inferere potuissim, ad observationes anno futuro, Deo volente, ephemeridibus Germanorum communicandas refero.

§. 11. Post solstitium tempus æstivum calidius & siccius usque ad æquinoctium autumnale permanebat: Pluviis enim non, nisi expectatissimis eventibus, cæli serenitas constantissima ridebat, lætamque messem & optatam, flantibus suaviter etesias, nobis ridebat. Exoptatissimus omnibus erat hujus temporis status. Postquam enim caritas annonæ mortalium myriadas partim fame enaciaverat, partim ad incitas redegerat, jam jam sub auspiciis sæculi velut e cornu copiarum omnium rerum pro vita sustentanda necessariarum Divina Munificentia largiebatur opimam messem. Horrea frumentorum ad laxiorem annonam redeuntium abundantiam vix capiebant, Conclaviæ, cellæ, pavimenta larga rerum copia & opibus Cerealiis quasi scatebant. Neque vini ultra duo lustra desiderati spes concepta autumnis sequente decollabat. Tantæ felicitatis non ultimam sane causam laudatissimum calorem æstivum putandum esse jamdudum prælagivit *Virgilianum* veriloquium *Georgic. I. Magnaque cum magno venit tritura calore*. Cujus veritatem sicut præcedentium quorundam annorum sterilitas, ita sane præsentis fertilitas per universam Europam satis confirmabat.

§. 12. Interea temporis non cessabant affectus epidemici, videlicet variolæ continuatæ benigniorum more sua tempora decurrebant, neque malignitas earum jam crescebat. Præter hæc quotidianæ, tertianæ tam continuæ quam intermittentes & quartanæ febres, minus tamen rebelles & rariores observatæ & post adhibita probata remedia brevi fugatæ. Febres ardentes autem suo contagio eo latius serpebant, quo intensior his diebus sentiebatur æstus. Mirum profecto febres hæc symptomatibus malignis horrendas, minime tamen lethales, hoc potissimum tempore, quo saluberrimum videbatur, invaluisse. Nec inanem locabo operam si plenius paulo tam phenomenorum, quam curationis historiam brevissimis hic tradam.

§. 13. Corripiebantur hac febre non solum juvenes, sed mediæ ætatis utriusque sexus homines, quin etiam senes. In plurimis horrorem prævium calor totius summe effertus subsequabatur. Hinc sitis, vigiliæ & atroces dolores capitis & aliorum membrorum circa articulos præsertim se exerentes notabantur. Arthritici hisce doloribus vexati paralyticorum more decumbebant, adeo ut neque pedes neque manus suis fungi possent muniis. Nonnullis alvus & urina vel invitis

per aliquot dies effluebat. Deliria leviora paucis saltem aderant. Vires autem omnibus pene valde prostrata. Aliis vomitus biliosi, aliis diarrhoea satis molesta. Quibusdam fluxus hæmorrhoidum nimius, ab imperitis pro fluxu dysenterico habitus. Plurimis hæmorrhagiæ narium largissimæ imo prorsus enormes eveniebant. Cumprimis vero quosdam cardialgiæ summe dolorificæ tantopere discruciant, ut de salute corporis desperantes sacram Eucharistiam moribundi velut ultimam ad consequendam æternam salutem medicinam unice expeterent, quin imo a syncopticis & moribundis discerni vix possent.

§. 14. Neque contagii expers erat hoc malum, dum unico decumbente plerumque reliqui, quotquot aderant, domestici vel una vel aliquandiu post eadem febre corripiebantur. Utenim reliquos tam in civitate & suburbis, quam in pagis decumbentes silentio præteream, exempli loco adducam milites a centurionibus sive capitaneis quibusdam nutu potentissimi Daniæ atque Norwegiæ Monarchæ noviter conscriptos, quorum unus & alter hoc febris genere cum forte vexatus fuisset, brevi post eodem malo plures afficiebantur, adeo ut intra duorum vel trium mensium spatium plures quinquaginta curationi meæ traderentur.

§. 15. Ex phænomenis citatis velut ex ungue leonem causam febris hujus proximam particulas alcalinas massæ sanguineæ crasin seu mixturem nimis rarefaciendo turbantes, facile diducere poteram. Ex quo fundamento curationis methodum formare non adeo difficile erat. Scilicet calor æstivus intensior; ætatis vigor, potus cerevisiæ nostratis satis lupulata calidior & copiosior, enormes hæmorrhagiæ, omnia & singula phlebotomiam præprimis postulare videbantur, quam plerisque semel, quibusdam pro indicationis modulo bis administrare suadebam. Sanguine vix evacuato, singulari stratagemate sudorem, quem quidem Celeberrimus *Baglivus Medicus Romanus* Prax. med. lib. 1. post sanguinis missionem cum levamine patientis statim apparere scribit, medicamentis procurabam. Quo fine pulveres ex bezoardicis fixioribus C. C. phil. præparat. oc. cancr. antimon. diaphoret. rad. contrajerv. corall. rubr. terra sigillata, nitr. anodyn. vel pulv. bez. Wed. addito camphoræ tantillo loco sudoriferi nonnullis eximio cum successu propinabam, atque febrem in prima quasi herba citius ac felicius quam emeticis vel purgantibus sine singulari successu quibusdam datis, suffocabam. Morbo nihilominus ingravescente dolorum capitis mitigandorum & delirii præcavendi causa vesicatoria optato cum levamine nuchæ applicare suadebam. Morbo durante balsamica & bezoardica medica ex tinctur. prophylact. m. d. eff. myrrh. simpl. & balsam. Scordii, mixtur. simpl. Elix. p. p. &c. præscribebam. Ad restringendam sitim loco potus ordinarii, vel infusum veronicæ, vel cerevisiæ secundaria tenuis valde, cui vel tinct. rosar. vel papav. errat. vel violar. vel spiritus ipse vitrioli sedulo instillatus commendabatur.

§. 16. Interim vero symptomatibus reliquis vel ex maligna morbi natura vel errore diætæ individuo contingentibus, aptis remediis obviam ire non neglegebam. Nam, ut verum fatear, majorem curam talia *ἐπιχειρήματα* postulare videbantur, quam ipse febrilis affectus. Sic urgentissimum symptoma cardialgia, quod nonnullos tantopere discruciant, ut ab agonizantibus discerni vix possent, spirituos aromaticis carminativis vel in primis pulvere absorbente *Wedelii* plerumque curabatur. Dolores arthritici contumaciores spiritu volatili urinoso bezoardico, eff. anod. nec non pulveribus bezoardicis diaphoreticis cinnabarinis tardius quidem, feliciter tamen mitigabantur, additis præsertim anodynis. Opiata enim, quæ febre arthritica epidemica anno 1699. grassante instar salivæ viperinæ vitanda jam velut anchora sacra nobis erant. Vomitus spontanei vel biliosi vel assumptorum, ut & alvi profluvia, quando diutius durabant, mixturis ex eff. theriacal. tinct. terræ catechu & tinct. opii cum succo cydoniorum per fermentationem parata, nec non pilulis stypticis m. d. pulveribus ex terra sigill. bos. armen. C. C. Uff. rad. bistort. pulv. bez. Wed. &c. compescebantur. Hæmorrhagiæ narium aliis quarto, aliis septimo, aliis nono, vel undecimo die contingentes, quæ multum negotii facessere solebant, ultra euphoriam & ad lipothymiam usque durantes præter interna refrigerantia & incrassantia externo probatissimo styptico Anglicano sive in forma sicca sive spissa cum aceto & gossypio, applicato: Hæmorrhoides nisi fluentes præter pulveres & stypticos & bezoardicis conflatos essent. theriac. traumat. *Wed. a Beato Hagendorpio in tr. de terra Catechu* descripta sistebantur. Taceo pleuritidem tam veram quam spuriam, anginam, alvum pur multos dies adstrictam, alia remediis aptis aliis curata. Adeo singula phænomena quamvis periculosa putata facili negotio tollebantur, & quæ a practicis infidæ crises passim notata, jam fide, perfectæ & salutare erant. Hoc apparatu perexiguo tum laudatus gregarius miles, cum plures vilioris conditionis homines, Deo benedicente, ex voto curabantur. Delicioribus nonnullis præter dictas poriones cordiales confortantes & pulveres bezoardici pretiosiores proderant.

§. 17. Quod vero admiratione maxime dignum, ne unicum satis periculose licet decumbentium, mensibus quidem æstivis vivere desissem memini. Neque lunæ phases notabilem his febris alterationem attulisse vidi, qualem tamen, cum præcedentibus annis 1698. & 99. febris epidemica, quæ nonnullis petechialis erat, hic loci grassaretur, multoties mecum plures curiosi præsertim mensibus hyemalibus & autumnalibus observabant. Mensibus enim his singulis omnibus fere, luna decrecente vel silente nonnulli febricitantes, tam illi, qui ab experientissimis Medicis summa industria probatis medicamentis curabantur, quam qui naturæ, morborum medicatricis, ope freti, sine ullo remedii genere decumbebant, celerius opinione Libitinæ tradebantur: convalescentibus plerisque qui post novilunium ad crescentem usque lunam manebant superstites.

§. 18. Vix attentius hæc mentis lance trutinasse, nisi laudatissimum *Ramazzinum*, febre petechiali in civitate & agro Mutinensi grassante, idem illud observasse, dissertationis ejus *decurie quartæ, Ephemeridum Germanorum anno quarto inferte* §. XVI. testaretur, aliosque, ut lunæ phases in morbis epidemicis animadvertent. Quam ob rem non desii causam rimari, cur febres continuæ malignæ, non tamen æque omnes pro mutationibus lunæ, adeo subitaneis alterationibus, mortem ipsam portendentibus, sint obnoxie? Cujus phænomeni causa quo dilucidius explicetur suppono

I. Juxta tritum:

Ad lunæ cursum variant animalia corpus, lunarem influxum (reliquis tam superstitionibus quam sanioribus astrologorum opinionibus juxta recentiorum quorundam hypotheses jam semotis) esse extra ullum dubium statuendum, in primis in morbida animalium cor-

pora, de quo cum laudatus *Wedelius in theorem. med. part. 3. sect. 6.* tum præprimis philosophorum recentiorum celeberrimus & accuratissimus *Sturmius in Philosophia Eclectica disp. de siderum influxu p. m. 932. seqq.* legi merentur.

II. Influentialas hæc lunares, quas vel alia sublunaria vel ipsi præprimis ægotantium corpora sentiunt, vix aliunde quam a lumine lunæ dependere, & sicut tempore interlunii nullum lumen, ita neque influentialas habere lunam; videatur *Sturmio loco citato*.

III. Influentialas tales esse subtilissimas & quasi spirituales, ideoque subtilissimum succum nervosum, quem spirituum animalium nomine indigant, potissimum concernere, id quod exempla Epilepticorum &c. toto die manifestum faciunt.

IV. Dari febres, quæ succum nervosum subtilissimum seu spiritus animales magis afficiunt & quasi depauperant, quam massam sanguineam. De quibus Celeberrimi *Würdigii Medicina spirituum* pluribus consulenda. Ut jam non laudem quotidianam experientiam, quando Medici clinicam praxin exercentes ingeminant: *Urina bona, pulsus bonus, æger moritur*: præsertim puta malignitate non æque vitales quam spiritus animales perfundante. Ex his colligere licet, utique ab influxu, lunari tempore lunæ decrescantis & interlunii debiliori existente, dependere lethiferas ejusmodi alterationes, in febribus præsertim nervosum genus seu spiritus animales potius quam massam sanguineam afficientibus. Nimirum spiritus animales ab inimico miasmate febrili depauperati, tantisper refocillantur subinde per influentialas lunares lunæ crescentis & plenilunii tempore fortiores; hisce vero tanquam aliquali fomento luna decrecente vel silente deficientibus spiritus ipsi magis magisque deficient, deficientibus spiritibus vita deficit, & ægrotus vivere desinit. Vix opus est disquirere prolixius, num febres petechiales agro Mutinensi & malignæ territorio Mulhusino annis 1698. & 1699. citatis molestæ nervosum genus magis affecerint quam massam sanguineam, cum ipsæ spirituum & sensuum læsionem variæ syncope, lipothymia, convulsiones epilepticæ, deliria phrenitica & alia symptomata, quæ febribus illis frequentia fuerunt, id satis evincant. Econtrario, cujus occasione hæc dicta sunt, æstivam nostram in massa sanguinea radicatam, & hinc prophasibus lunæ tantis alterationibus minus obnoxiam fuisse, per supra memorata clarissimum est.

§. 19. Sed ut e diverticulo redeam in viam, ex illis sane, quæ de morbis æstivis superius allata, luce meridiana clarius elucescit veritas eorum, quæ divinus præceptor *Hippocrates de Constitutione temporum* passim in operibus suis commentatus, quicquid alii in contrarium afferre sustinent. Ita sane velut e tripode Apollinis dicta quæ *lib. de aeribus, aquis & locis* §. III. p. m. 330. recte divinat: *Siquidem æstas sicca fuerit, citius sedantur morbi: Si vero pluviosa, diuturni sunt; & 3. aphorism. 15. Inter anni status omnino siccitates imbribus assiduis sunt salubriores, minusque funestæ.*

§. 20. Quæ quam consentanea vero sint, ipse equidem, qui sequebatur autumnus satis pluviosus etiam contrario exemplo confirmabat. Quippe post æquinoctium autumnale circa Michaelis festivitatem mira cæli clementia huc usque continuata pluviis assiduis permutebatur, intercurrentibus nonnunquam ventorum injuriis, quibus ad finem mensis Octobris perdurantibus, Sole ad Scorpionem accedente, circa vindemiam nebulæ pluribus diebus constantes cum frigore satis acri in scenam prodibant. Mensis sequentis Novembris auspiciis austrinum erat cum pluviis copiosissimis. Hisce post novilunium, aliquandiu cessantibus frigora nocturna, Sole interdiu splendente ventoque inter zephyrum & aquilonium medio spirante, vix diutius durantia notabantur.

Mox nivem primam vidimus, sed pluviis subsequenter ad finem mensis durantibus alternantem. Sole medios Sagittarii gradus perambulante furere cœpit aquilonius nive & frigore comitatus, phœbo dies quosdam serenante: sed brevi post carbis rediit pluviosissimus. Frigore tandem brumali leniori ad solstitium usque perdurante, tempus autumnale finiente.

§. 21. Tempestas itaque pluviosissima per maximam autumnii partem notata non solum deteriorem reddebat recensitum hæcenus affectum epidemicum variolarum, sed novam insuper morbum, tussim puta contumacissimam, tenellis itidem magis quam adultis exitiosam, chronicam ferme difficulter curandam, & hinc tam incedentibus quam ægotantibus molestissimam, præprimis circa vindemiam tempus, post nebulam illam dies aliquot durantem, in scenam producebat. Ab hac tussie assidui materiam quasi purulentam veluti phthysici consummati copiosissimam, nonnulli ob tussis vehementiam sanguinolentam (ruptis a motus vehementia & materiæ acrimonia venis pulmonaribus) excreabant. His pectoralia, resolutiva, balsamica, diaphoretica, nervina, anodyna, diluentia decocta levamen quidem afferebant, quibus vero laxativa subinde supperaddita, non nisi post hebdomadam plurium decursum curam tandem sigillabant.

§. 22. Delineata interim febris epidemica postquam depontanis quibusdam senibus finem vitæ fecerat, contagio suo plures haud afficiebat, sed cum calore æstivo ferme cessabat. Variolæ vero, quas per menses vernaes & æstivos benignas deprædicavimus, cum mutabili tempestate suam quoque mutasse genium videbantur, ex benignis & distinctis malignæ, confluentes & quasi *ἐπιδημικώταται* factæ. Existimarem profecto cæli & tempestatum singularem clementiam, qua tum verno tum æstivo tempore gavisi eramus, variolas huc usque nobis conservasse benignas, nisi annus præteriti sæculi 1689. contrarium me edocuisset. Licet enim annus citatus pari si non majori cæli clementia rideret, nihilominus Variolæ Brunsvigæ & Hafniæ eodem tempore æstivo grassantes genii malignioris erant, ipsique Hafnienibus in primis adeo insensæ, ut plus mille hominibus, atque inter eos pluribus primariis & ipsis juventutis Principibus, epicedia pararent: Autumnalibus vero mensibus anni citati, præsertim mense Octobri brumali frigore ingruente prorsus evanescerent: Ut hinc in aprico sit, neque a temporis & atmosphæræ statu epidemicam constitutionem unice derivandam, sed alias circumstantias, de quibus supra diximus, semper simul & quasi conjunctim considerandas esse.

§. 23. Nostrarum itaque variolarum genium graphice quasi delineatum laudatissimus *D. Sidenhamius in obser. Med. Sect. III. cap. I.* exhibet, quando scribit: *Appetente æquinoctio verno, variolæ caput cœperunt attollere, jamque indies latius grassantes sub autumno ἐπιδημικώταται factæ sunt.* Cujus quidem phænomeni causam, quam silentii peplo involvit, capite subsequente secundo paucis innuere voluisse videtur, quando, *Variolæ*, inquit, *quibus annis epidemicæ grassantur, si regulares etiam sint atque mitiores, circa æquinoctium*

vetum ingrediuntur. Quibus vero annis non tantum grassantur epidemice, sed & irregulares atque periculosiores sunt generis, maturius nonnunquam mense puta Januario invadunt. Quasi dicere voluisset: pro varietate causæ nunc maturius & maligniores, nunc tardius & benigniores contingunt variolæ. Videlicet massa sanguinea particulis recrementitiis, serosis sulphureis, salinis, volatilibus & fermentificis copiosioribus inquinata, variolæ prognerantur maturius & malignæ: iisdem vero in minori quantitate præsentibus tardius & benignæ fiunt. Peregrinas vero ac morbificas ejusmodi particulas massam sanguineam inquinantes, nostrarum variolarum causas, partim ob vitiosæ filiginis usum, partim ob fructuum Cerealium esum in tenerioribus in primis comite *adæquæ* extitisse facile colligere licet. Quamvis interim non negem, esum carniæ ex laudatissimi *Wedelli* sententia in *Doctrina manuscripta de febribus cap. 18.* videnda, in locis mediterraneis, sicuti piscium in maritimis hunc morbum non parum vulgare.

§. 24. Inde vero manifestissimum fieri censeo, nodum in scirpo quarere, qui variolas a sanguine menstruo materno veluticaua accersere laborant. Vellem sane ac possem falsam ejusmodi hypothesin ab Arabibus, in primis maximo Arabicæ scholæ Magistro *Ebūsina seu Avicenna lib. IV. Fen. I. tract. IV. cap. 11. pag. 434.* effectam & adhuc hodie in scholis receptam & ad ravim usque defensam, pluribus rationibus, phænomenis, observationibus tam a priori, quam a posteriori refellere, nisi Celeberrimus *D. Bebreus*, Practicus Hildesienfis, peculiari *Epistola de Variolis epidemicis ad Perillustrem D. Franchum de Franckenau.* S. R. I. Equitem Archiatrum Danicum &c. data *Ephemeridibus Germanorum Dec. III. ann. 3. inserta*, idem satis abunde fecisset.

§. 25. Id saltem nostra ætate vetustæ illius sententiæ Patroni explicent mihi velim, cur ex eadem parente prognatorum unus variolis laboret, reliquis sine exanthematibus vel febricitantibus vel etiam belle valentibus? Cur vice versa plures decumbant variolis, uno vel febricitante vel bene valente? aut quod magis mirandum foret, gemellorum unus variolis laboret, altero salvo permanente? Dicant mihi quæso ex fictitia hypothesi, cur unus, vel una, plus una, secunda scilicet & tertia vice, quod multoties observavi, variolis affligi possit. Dicant denique quomodo nonnulli, qui per totum vitæ decursum a variolarum contagio liberi permanerunt, in extrema demum senectæ, quod nuper vidi, corripantur iisdem? In quibus quæso ductibus, tubulis, meatibus vel venarum & vasorum anfractibus veluti latibulis delituisse putandum fermentum illud in utero susceptum, & per tantam annorum seriem a nullis febribus vel alio morbo, a nulla tempestate, a nullis cibis, a nullis medicamentis etiam fortissimis & volatilibus, per circulationis leges, angustissimos machinæ humanæ ductus & poros permeantibus extricandum vel eliminandum?

§. 26. Ex causis itaque citatis per menses vernos & æstivos variolæ benignæ cum symptomatibus consuetis & benignis eveniebant, nisi fortassis error individuus diætæ uni vel alteri maligniores redderet. Quo pacto puella quædam satis bella & sana, dum cerevisiam recentem non satis defæcatam largius biberet, variolis malignis & confluentibus correpta & convulsa moriebatur, convalescentibus reliquis omnibus, quotquot eodem tempore decumbebant: adaucta scilicet causa morbifica a facibus cerevisiæ recenti permixtis.

§. 27. Autumnalibus vero mensibus intempestate tepida & humida diutius continuata, accedente frugum Cerealium (quarum equidem maximam abundantiam ex hortis suburbanis, queis hæc urbs veluti densa & ampla quadam sylva cingitur, annis fertilioribus colligere solemus) usu abundantiori & iterato plurimis periculosiores nec paucis lethales eveniebant.

§. 28. Jam præter symptomata ab aliis recensita diarrhœam, salivationem, phrenitidem & alia, frequenter notabantur pandiculationes, sternutationes, stridor dentium, angina, vellicationes labiorum & narium. Ex his stridor dentium motibus convulsivis accensendus, periculosus, non tamen omnibus æque lethalis erat. Sed periculosior angina, ipsi etiam *Avicennæ* loco citato dudum suspecta, a variolis fauces & pectora obsidentibus, tam deglutationem quam respirationem ipsam inhibentibus, sæpe sæpius omnimodam quasi suffocationem inferentibus. Ut hinc recte *Lomnius*, in *observationibus Medicinalibus* pag. m. 295. *Quisquis huic malo succumbit fere, tanquam ex angina præfocatus moritur.* Ingenue fateor me huic malo, postquam radices egerat, hætenus nondum mederi potuisse, quanquam a phrenitide, diarrhœa pluribusque phænomenis (a scriptoribus pro pernicioso habitu) vexatus, feliciter cum Deo liberaverim. Id tamen silentio non prætereundum, me certo habere persuasum, posse tale symptoma potu calido præcaveri: Cum neminem decocta vel alium potum calidum, nec non juscula avenacea &c. absorberent, licet linguam & fauces copiosæ variolæ obsiderent, angina correptum vel mortuum fuisse meminerim. Neque assiduas vellicationes labiorum, & narium, ab *ἀρρώστια διακινῶσα*, perinde ut floccorum compilatio in adultis febribus malignis lethaliter decumbentibus deducendæ, periculo vocabant.

§. 29. Revalescentibus præter moderatum caloris regimen & vitium tenue, pulveres bezoardicos Sennerti, *Wedelli*, epilepticum Marchionis, vel ex antimonio diaphoretico, corn. cerv. philosophice calcinato, unicornu vero philosophico, perlis, coralliis, conchiis præparatis, nitro anodyno pulv. anod. cordiali, camphora, lapide bezoar orientali, occidentali, confiat magis quam volatilia spirituosa &c. proficua fuisse vidi. Præprimis a solo dicti lapidis bezoar orientalis usu plurimos sine præsentia Medici ex voto a variolis liberatos fuisse multoties observavi. Incredibile profecto dictu, quam cito, & quam bene ab usu lapidis hujus omnia symptomata, convulsiones, anxietatem & alii eruptionis prodromi conquieverint, ipsis variolis egregio ægrotantium cum levamine erumpentibus. Hinc non possum non mirari eos, qui pretiosum hunc lapidem, quem factitium putant, infra dignitatem nativorum verbi gr. lapidum cancrorum, concharum vel aliorum dejicere frustra laborant. Refragantibus quotidianis experimentis & Medicorum principum testimoniis, quorum plures, ut jam non laudem, ipsum equidem Perillustrem atque magnificum Dominum *Illmerum de & in Vuartenberg*, Consiliarium & Archiatrum Cæsareum & Regium &c. lapidem bezoar orientalem magni æstimare, atque agonizantibus & alterum pedem velut in tumultu habentibus, tanquam ultimum remedium non absque pereximio successu cum aliis exhibendum suadere ex *Decurie III. Ann. I. Observat. LXVIII. Ephemerid. German. pluribus elu-*

cescit. Præterea decoctum euporiston ex Corn. Cerv. raspat. glycyrrhiza, scorzonæ. passulis min. hordeo, lentibus nec non emulsionibus & potiones bezoardicas cordiales vel expellentibus vel temperantibus pro re nata variatas, instillatis tenni potui mixturis ex tinc. papaver. rhœad. non acidulata, clyffo antim. sulphurat. spiritu nitri dulcis &c. multum profuisse notavi. Neque balsamica & bezoardica media, verbi causa tinctura prophylactica m. d. (quam præservandi fine tam in Hasiensibus anno 1689. quam nostratibus utilem deprehendi) eff. myrrh. balsam. mixt. simpl. successu carebant.

§. 30. Nonnulli denique, postquam a malignitate variolarum prorsus liberati quidem videbantur, vel a materia morbifica non penitus eliminata, vel ab aeris injuriis, vel diætâ neglecta, vel alia causa præcatartica nescio qua levissima, periculosis, imo lethalibus affectibus aliis denuo corripiebantur. Quod licet nonnullis prædicebatur; tantum tamen aberat, ut haberetur fides, donec propriis exemplis confirmarent *Hypocratis lib. 2. aphorism. 12. Morborum reliquias, quæ a crisi supersunt, recidivos morbos parere.* Plurimos hoc pacto tussis contumacissima, vomitu quandoque comitata, vexabat febre lenta simul afflicto, qui multis pectoralibus, diluentibus, humectantibus, nervinis, balsamicis & laxativis curari vix poterant. Aliis abdomen intumescebat, facie inflata, infra caput macie conspicua, quasi rachitide laborantibus. Taceo tumorem pedum, scabiem tam siccam quam humidam, tinea variæque ulcera, quibus affligebantur alii. Quorum quidem plurimis siquidem vires mediocres suppetebant, laxativa iterata, ex resina gialappæ cum spiritu appropriato decenter soluta, cinnabari nativa, antimonio diaphoretico, confect. alkermes syrup. ros. vel violar. &c. & balnea ex herbis sident. conyz. tobac. saponar. organ. serpill. flor. chamæm. ocul. popul. &c. instar anchoræ sacræ subveniebant. Reliquos tabes sensim consumebat.

§. 31. Cæterum nec tempore hyemali imminente cessantem variolarum luem, sed satis licenter vagantem, nec limites epistolæ differtationis digrediar, alia occasione plenius delineandam reservo.

§. 32. Has vero observationes ad Te deferre perii, tam non obscura tua in me benevolentia, quam peracre tuum in his iudicium. Demonstrasti enim te tritas habere manus notandis ejusmodi observationibus & consuetudine legendi. Singularem vero tuam benevolentiam nisi exocularer, ferreus essem, dum tot Illustribus atque Excellentissimis Viris in Cæsareo-Leopoldina Naturæ Curiosorum Academia me quoque Collegam forte indignum adscribere non dedignatus. Stabat quidem sententia Cydoniologiam ad normam & formam Academicæ nostræ tractatam publicæ luci nunc exponere; Enim vero postquam Excellentissimum *D. D. Georg. Sebast. Jungium, Aulæ Cæsareæ Medicum*, Tractatum de Cydoniis Viennæ impressum. (nuspam a me visum) conscripisse, honoratissimæ Tuæ literæ d. 9. Decembris anni proxime finiti ad me datæ pluribus dixere, mentem mutavi, ipsasque schedulas, in quibus hujus pomi virtutes & usus sane insignes rudi quasi penicillo delineaveram, abjeci, ne forassis Iliada post Homerum scribere putarer. Interim observantia ergo, quam Tuo nomini debeo, hoc quaecunque praxeos clinicæ specimen gratique animi mei symbolum exhibere volui, debui, quod ut æqui bonique accipere velis est, quod summopere contendo.

Apollodorus.

*Scribebam Mulhuse Imperialis d. 25.
Januarii, Anno Christi 1601.*

Constitutio Epidemica Tubingensis Anni 1701.

D. D.

RUDOLPHI JACOBI CAMERARII.

Quamquam de raris & epidemiis verum forte sit illud Galeni, se observandi morbos occasionem præ Hippocrate habuisse commodiorem, cum unus Romæ vicus plures habuerit incolas, quam integra urbs Græciæ, atque adeo ex tantis urbibus, uti & e castris, historia hujus anni epidemica plurimum sibi promittat, non tamen parva negligenda putem, sed & ex talium particularium collectione formandum aliquid universale; imo juvat nosse, quibus satis diversa loca ex diversis causis in pace aut in bello fuerint exercita, ut pateat, quid universale anni vel particulare loci fuerit. Decimus per Dei gratiam completur annus, a quo Tubingam liberam reliquit dysenteria, quæ cum per tres annos prioris sæculi octuagesimum, nonum, nonagesimum, nonagesimum primum, belli injuriis alias graves, ab æstate in autumnum epidemia fuisset grassata, tum more etiam epidemico requievit, ut cum interim fama publicaret ipeacoannam novum antidysentericum, eo hætenus opus nobis fuerit, nec experimentis ejus laudes comprobata; quibus tamen multum derogat, si verum, quod in novellis legi, pro Gallorum exercitu aliud novum remedium antidysentericum in Italiam fuisse mittendum. Nostram pacem siue illas inducias rupit nupera æstas, & alvi fluxus noviter urbi intulit. Quam prior illa æstas, quæ ante decennium finem dysenteria tulit, sicco calore prævaluit duas præcedaneas, tam ultima hæc nupera omnes hætenus intermedias; quanquam illa nonagesimi tertii æstas, dysenteria apud nos non ferax, æstuosa siccitatis testimonium habuerit in bonitate sui vini & frumenti. Recordor quoque anni nonagesimi noni, quod mense Junio satis etiam calido & sicco, diarrhœas quasdam concitavit, & metum mali gravius invalituri jam tum incusserit, sed in herba velut suffocatum malum brevi evanuit, quanquam & illa æstas tulerit vinum & frumentum bonum, calidæ temperiei fructus. Quæ itaque & qualis fuerit labentis hujus anni æstas, notoria quidem, determinanda tamen. Primo enim frigida veris constitutio, diu nimis durans, & ad finem usque Aprilis se extendens, nec Majum sivit incallescere, sub inconstante adhuc aere, nisi versus finem; abhinc autem invaluit æstuosa temperies, an potius intemperies: audiebantur passim tristes novellæ de calamitatibus gravissimarum tempestatum, quæ per Dei gratiam super capita nostra transierunt fere innoxie; raræ parvæque pluvie siccitatem contemperare non valebant, usque dum finis Augusti aliquale frigus ferret, novam autem denuo subsequam æstatem terminaret pruinosus sub finem September, prævalente hætenus siccitate. Astra qui volet, his applicabit & determinabit ex ephemeridibus. Respondit istis, post

Post tardam utique germinationem, contra spem bona & messis & vindemia; etenim uvas ab immatura putredine, quam minabantur Plurium acinorum hospites vermiculi quo minus latius serperet, cohibuit illa siccitas, Poma aurem & pyra verminosa pleraque præcociter ceciderant, nec diu asservari potuerunt, in putredinem nimis proclivia, ne de fagorum foliis gallarum extraordinaria copia obstitit, de brassica ab erucis depasta, &c. dicam. Prius vero & ex vicino quodam vaccarum grege (salvo nostro) hydrops pectoris multas abstulerat, & anserum juniorum strages aliquibus locis tanta fuerat, ut præ fœtore sepeliri debuerint. Hæc igitur æstas iterum inter nos alvum fluere fecit; primi qui laborare cœperunt, erant infantes, mense statim Junio, plures sequenti Julio, quo etiam adultos (non tamen ex illis diætæ erroribus famosos) invasit diarrhœa quædam torminosa, acuta, imo cum vomitibus spasmoque furarum, cholera. Tandem rari in urbe dysenteria, non ita maligna, casus, frequentiores ex pagis aliisque locis audiebantur, nec tamen ullus illorum fluxuum, qui quidem minitari videbatur, nimis apud nos invaluit, nec stragem edidit; non desideratis nisi paucis infantibus. Insuper autumnino in totum fat cito hic loci omnis lues requievit. Mærum curæ concreditis succurri, præter usum pulverum pannonicæ, antimonii diaphoreticæ, gelatinæ cornu cervi siccatæ, seminis plantaginis in congruis vehiculis, methodo in primis Morroniana, successum secundante Deo, jungens corticem Peruvianum cum electuario diascordio per syrupos in bolos, vel ejus extractum cum nostro bezoardico aut theriaca cælesti in pilulas formando. Ultra illos alvi fluxus nil epidemii tulit æstas, nisi quod eodem tempore puerorum genæ communiter intumuerint, auditique quoque fuerint catarrhi æstivi, sive tussis plerumque siccatæ, quibus addi possunt tres studiosi unius collegii, quorum unus hæmorrhagia narium enormi, alter hæmoptoe larga, tertius vomitu cruento sub idem tempus laborarunt. Hæc est nostra æstivi fluxus historia, quam propterea notare volui, ut conferri possit cum aliis, utpote spe fretus, fore vel tandem clariorem causam, cur non omnibus, sed certis annis fiant talium epidemiarum recursus.

Ejusdem Schediasma ad Historiam Epidemicam Anni 1702.

Quandoquidem adhuc super nos manet Dei benignitas, quam prioribus annis deprædicavi, quod pristinam epidemiarum morborum malitiam Tubingæ gravem represserit, nec sinat hucusque iterum invalescere; idcirco historiæ illorum pro hoc anno per modum appendicis tria solum breviter subjungam, quæ notari poterant.

Ante omnia inconstantiæ & anomaliz, quæ per ultimam hyemem, uti & per duas priores fuit, non satis videntur respondere morborum effectus. Major illa fuit, & omnino talis, ut sub ea sanitatem mortalium adeo bene sibi potuisse constare, sæpe admirationem moverit, dum pauci utique per urbem illo tempore ægotarent, & malignorum epidemia plane exularet, eorum autem morborum, qui quadrant anni sunt congrui, nec magnus numerus, nec extraordinaria esset ferocia. Hoc est paradoxum, quod vexare possit & soleat præcitos, sævire luen eandem sub diverso aere, & filere ipsam sub tali, quem morbiferum accusaveras.

Quia vero morborum effectus non statim ipso mense vel quadrante erupere, sed sequenti demum succedere perhibentur, huc proin referri poterit, quod secundo notari mereretur, scilicet utut interdum proprie epidemiam in urbe nihil sit, sed sporadice multi ægotent, certo tamen tempore plures ægros abripi, quam alio, per morbos diversos & dispersos. Tale fuit tempus vernum hujus anni sub finem Aprilis & principium Maji, quo personæ diu infirmæ, senes, viduæ, infantes, plures quam alias fuerunt abreptæ. Quomodo singulorum ita fata concurrant, vel in quantum debilitas eorum non ferendo conveniat, facilius est determinatu in thesi, quam hypothesi.

Tertio, quæ de fluxibus alvi mediocritatem adhuc servanribus per æstatem ad annum præteritum notavi, huc repeti possunt pro hoc anno; nam pariter cum æstate redeunt non invaluerunt ultra gradum pristinum. Illud modo addam, aliunde ad nos advectum fuisse quid mali gravioris. Inter reduces ex castris ad Landavium, qui febre tertiana & diarrhœa laborarunt, unus ex civibus sub finem obidionis, ibi & Philisburgi non nisi per diem unum & alterum commoratus vix domum attigerat post medium Septembris, cum dysenteria dejiceretur atroci. Hæc uti per contagium hausta fuisse videtur, quia non tam errores in diætâ commissos novit, quam conceptum inter infectos horrorem ipse accusat; ita domi etiam sedifudit ad plures, observans quidem fatalem illum morem, quo certæ solum personæ solent corripri, salvis aliis: Nam conjux omnium fordidum injuriis exposita mansit intracta, conjugis autem soror ipso die septimo a decubitu viri completo dejecta fuit, & die sequente filiolus trimulus sedes torminose cruentas frequentare cœpit; evasit tamen illa triga feliciter, & perstitit hanc intra domum lues. Multo autem gravior fuit hujus viri dysenteria peregre allata, quam ulla per urbem sponte oborta, non solum duratione in terram septimanam & dejectionum nimis citata frequentia, sed excreti diu sinceri cruoris, dein non muci, verum flavo viridis liquaminis, copia perquam magna, slipata etiam symptomatum molestissima vehementia, præter oppressionem præcordialem, tormina, tenesmum, in primis disuria & tantum non jugi singultu, de quibus ultra decem dies & præ reliquis majores audiebantur ægri querelæ. Cum die sexto, quod demum post tentata domi varia consuli ceptum, ut & diebus sequentibus nullæ distingui possunt remissionem & exacerbationum vicissitudines, & urina omnis rubedinis expers, flava & clara, sed turbata admodum facilis, offerretur, paucis cum non tam febris (nec aphthæ unquam nec deliria supervenerunt) quam fluxus & vires urgere viderentur; æger item a meridie per vespem sumptas ana duas corticis Peruviani & electuarii diascordii drachmas, ut ingrati sibi formulam, porro nanfearer, inde purioris cruoris copiam citari prætendens. Itaque pro nocte primum medicam narcotici dosin extractis corticis, tormentillæ & bezoardico addere consultum videbatur, & ob bonum effectum continuare alternatim tales pilulas & emulsiões ex semine papaveris albi, plantaginis, amygdalorum, in congruo vehiculo, edulcoratas cum absorbentibus & pulvere anodino, semper ita dosi nocturnæ reservando vim opiati. Per dies vero suis horis dabantur quater scrupuli pulveris ex unicornu fossili, coralliis, semine plantaginis, priapo cervi, dente hyppopotami, pannonico, itidem in consimili vehiculo; Quibus tandem accesserunt datæ subin guttæ balsani Peruviani cum cochleari syruporum papaveris erratici,

rosarum rubrarum, symphiti, & electuarium temperatum cordiale stomachicum. Dubia movit potus, cum ab aqua cieri alvum, a vino æstum prætenderet æger; Videbatur ergo medium tenendum, concessio modico vino vetere pro pastu, etiam ob languorem & anurexiam perparco, extra id tempus præscripto decocto ex rasura cornu cervi, malliche, & cinnamomo. Serum lactis commendatum nescio cur cito nauseavit æger, multum autem gelatinæ cornu cervi hausit solutæ in vario vehiculo calido. Externa scrobiculo cordis, sedi, membro, roboris & linimenti ergo admota, & cætera, prolixius recensere opus non fuerit. Illud addendum, dysenteriam fœminæ cruore multo, magnis torminibus, ad usque deliquia, non impedisse tamen, quo minus die quarto, statuto utique tempore, venirent menses, & durarent aliquandiu, citius tamen finiti, quibus etiam id dandum videbatur, ut interim parcius insistetur usui ischæmorum.

Quam in ephemeridibus meteorologicis Tubingensibus olim exhibui tabulam motuum mercurialium per triennium, eam ulterius ad præsens tempus continuatam, perque annos adeo plusquam octodecim, extensam, quia brevis est, publice hic propono, dum ephemerides ipsæ tot annorum domi latent prolixiores. Observationes quidem circa experimentum Torricellianum fuerunt inscriptæ alicubi difficiles nugæ; habuerunt tamen suos vindices. Transeat, aut maneat liberum, quorumcunque judicium: meam ego tabulam illis modo destinavi, qui nihil temere prætermittentes etiam perpetuo tali mobili delectantur, utuntur. Horum non modo curiositas cum propriis conferre alienas amabit observationes, verum etiam sagacitas per earum sylvam venabitur prædam, aut scrutabitur vias, quas in meteorologia non minus ac in epidemia occulit natura. Ne asymbolus ipse sim, excerpam unum alterumque casum, cui applicari possint, quæ in tabula exhibentur stationes. Si prius monuero, sermonem adhuc esse de uno eodemque barometro illo simplici, cui scalam adnotam fuisse olim monui minutorum decem, qualium palmo Romano dat P. Lana; illam hac vice subdivisi in gradus viginti, ut evitarem numerorum fractiones. Sic omnium suprema statio & altitudo mercurii designatur per seminata 20. medium scalæ habet 10. innum 60.

Horum sive decem palmi minutorum, sive viginti scalæ graduum varietate absolvuntur motus mercurii intra tubum; quibus extra respondent motus aeris tanti & tales, ac per hos annos contigisse meminimus magna copia & differentia. Variant anni, interdum nec ad summum nec ad innum scalæ deducunt, mercurium: variant menses, interdum diu quasi in eodem tenent ipsum, sub exigua motuum differentia, alias intra paucos dies fit lapsus a summo ad innum, aut ascensus ab hoc ad illud. Itaque si cui libuerit comparare annos annorumque partes inter se, habebit, in quo se exerceat; occurret autem ipsi communius hyeme gradus supremus, interdum quoque autumnino, rarius primo vere, nunquam æstate. Quibus autem mensibus supremus, iisdem quoque infimus: sic æstivis neuter. Adeoque differentia illa moruum maxima decem, novem minutorum est hyberna: autumnalis nunquam minor quinque minutis, sæpe fuit major: His æstiva nunquam major, sæpe minor. Dantur autem menses omnium anni partium, quibus non nisi trium min. est differentia: uti dantur interdum dies, quibus quasi suorum moruum dememinisse videtur mercurius, hærens diu in eodem.

Sed ad ea, quæ promisi, specialia. *Diluvium tempestuosum* anno 1702. ad d. 13. Jul. de quo in ENC. 3. 7. 137. non fuit cum illa mensis statione humili, quam exhibet tabula, sed cum medio scalæ: Præcesserat descensus non nisi per gradum unum; plane non pro ratione talis ac tantæ exonerationis, tam venientis quam fientis & factæ. Billi fluxus, quorum omen illud tunc metuebatur, irruerunt utique nimis heu graves, transierunt tamen Dei gratia; quæ vel tandem plene ipsos compescat! Nondum quippe cessant. Nam nupero demum Augusto hujus anni 1710. noviter fuit præceps vallium nostrarum inundario; iterum non cum humilitate, quanta solet esse cum talibus exonerationibus aeris hybernis, sed cum gradu modo scalæ sexto.

Ominosum quoque inter alia nimis multa tristia signa videbatur *fulmen extraordinarium*, cum nocte præcise media inter ultimum Decembris Ann. 1702. & primum Januarii Ann. 1703. ad sonum fere duodecimæ graviter detonaret vetus, aut intonaret novus annus: Utique tristis recordationis. Tulerat serus & ultimus vespere lapsus ad innum illud scalæ, quod in tabula, sub austrino, laxo & humido aere. Mensis diu tunc humilis mercurius, imo quod non alias factum, descendit adhuc infra illud scalæ innum: Ut non nisi illa vice differentia motuum fieret major decem minutis. Cito enim, ejusdem quippe Januarii sub finem, conspicuus iterum fuit in altiore gradu illo, quem tabula exhibet. Nescio, num ad causas vel signa fatorum talium spectet, quod singulare tunc videbatur spectaculum: Mars accedens ad vicinos Saturnum & Jovem; hoc subinuisse modo sufficiat.

Anno 1705. ad gradum scalæ, quem tabula offert, sextum, cecidit Majo mense *intempestiva nix*; nobis quidem pluvia, vicinis autem alpiibus utique nix copiosa. Scribebatur tunc ex provinciis Germaniæ septentrionalioribus, gravem pari arbores calamitatem, præ nivis mole avulsos vel grandes riliarum ramos: Ad alpes nostras multa nive rectæ & pressæ segetes & vinearum frondes, manserunt tamen in salvo, post paucos dies resurgebant & lætæ virebant; retardata modo, non uti alias a pruinis, læsa fuit germinatio. Successit brevi, sc. nivi diei 25. aliud die 29. meteorum, cum jam supremam mensis stationem occupasset mercurius, sub aere nondum quieto, dejiciebat enim granedulæ copiam, aprili formis.

Ex An. 1706. *Eclipsis Solis* memorabilis fuit neque cum suprema neque cum infima Maji mensis statione, sed cum media: Et quod sub eclipsi solari partiali, magna tamen An. 1699. in ENC. 3. 7. 88. annotavi, de barometri nulla prorsus facta mutatione, per omne illud obscuracionis tempus, idem sub totali nobis & annulari pariter omnino se habuit. Stetit mercurius obscuro illo tempore, quasi crepusculo, fixus, plane invariatus, ne pili laritudine vel dimissus vel elevatus, utut thermometri fide aer bene refrigeraretur. Vespere autem comparuit per quartam minuti partem humilior: Tunc nubes pomeridianas, quidem diffarat eurus, sequens mane tamen tulit pluviam, & serus vespere signum gratiæ, iridem, cum altior jam ac ante eclipsin esset mercurius.

Annorum 1707. & 1708. *hyemes austrinæ* non tulerunt consue-

fuetam altitudinem. Januarius 1708. vernus potius, quam hybernus; quo in pratis colchicum, mezereon in silvis floruerunt. Et insolita tamen illius temporis lenitas & temperies docente thermometro fuisset nobis per æstatem summa rigiditas. Nunquam illo mense altus mercurius, vix semel, nec diu, venit ac stetit ultra scalæ medium, plerunque multum infra ipsum. Cum in imo hæreret per decimum & sequentes dies, mirum non fuit cum aere turbulento, sed satis quieto, grato, apud nos, post nebulam aut flavedinem vel rubedinem matutinam, tunc frequentem, non pluviosus, sed vel serenus vel nubilus solisque radiis alternans. Alibi forsan se exoneravit. Die illius Januarii 20. & seqq. cum perturbaret aerem ventorum vis, & ferret fulgura, irides, pluvias, mercurius quidem descenderat, sed non eo usque. Interim passim quoque scribitur aliunde, visa metora varia, facta diluvia, delapsos ignes, &c. Communiter autem, ex septentrione, esse potius ver, quam hyemem. Prægressus December 1707. fuerat non minus & aeris & mercurii motu apriliformis, differentiam suam quatuor minutorum absolvens vel viginti quatuor horarum spatio, a nive ad ejus solutionem: Nec ad imum, nec ad summum scalæ, ut alias hyeme solet, unquam pertigit.

Anno 1709. Januarii hyems sine pari, sive gelu extraordinarie longum & magnum, non obstitit, quo minus caderet mercurius, scilicet ad venturam opportune nivem, tegmentum segeti. Certe per diem duodecimum & tres sequentes bene humilis, etiam post nivem adhuc, sub aere sereno, constanter gelido: Atqui media æstate communiter illa statio solet esse tempestuosa. Non nisi uno minuto humilior stetit die quinto, ante gelu illud, qui tamen fuerat toto cælo diversus, scilicet austrinus, laxus, pluvius, quem rigor venti nocturnus strinxit & mutavit in plane alium; tunc enim nix & gelu hyemis illius acerrimæ principium. Hinc decimo sexto motus per scalam sursum, nondum tamen ad summum: quo pertingit demum die decimo nono serenato post nebulas constanter aere. Tales tunc dies quatuor, inter quos unus ex frigidissimis totius mensis, & per quos tamen descensus duorum minutorum. Cum vero intra breve tempus per tria minuta fieret ulterior lapsus ad scalæ medium, tunc alia venit nix, & comparuit ad vesperam pruina murorum; Hinc molestissimi rigoris vel tandem aliqua relaxatio. Fuit, siquidem Astrologos audire lubet, prævia laxitas austrina sub oppositione Martis & solis. Superveniens oppositio Saturni & Mercurii dedit principium hyemis per stringentem euroboream. Finem fecit oppositio Saturni & Veneris cum PL. & aliis ad diem Pauli. Supremam interim mensis stationem & inclementiam fuisse non sub istis, sed sub quadrato Jovis & Solis, mirum forte cuiuspiam videri posset.

Sic utique visum quondam fuit M. Slutero, occupato in dextra applicatione principiorum IV. Cokii ad constitutionem meteorologicam anni 1695. ubi tractat inter bene multa notatu digna quæstionem: cur calefaciens alias quadratum Jovis & Solis die sexto Decembris forte gelu tulerit? Transeat hic examen rationum, hoc solum addam. Ante seculum Helis. Roeslinum in d. navig. Septentr. (laudato Belgis libello) de hoc paradoxo jam monuisse Astrologos. Scilicet hybernus gelu a Saturni configuratione cum aliquo planeta fuisse mitigatum. Contra, Solem, Jovem, Martem, Mercurium tunc configuratos frigus intendisse. Exemplis annorum 1608. 1609. Quo ipso simul innuitur alterum Sluteri dubium, quod scilicet conjunctio Saturni & solis uno anno liquationem, altero gelu tulerit. Etenim d. 18. Dec. 94. sub illa intensum frigus: anno 95. d. 8. Januar. sub conjunctio Martis & Solis liquatio, ad imum scalæ; d. 13. Januar. post conjunctio Saturni & Mercurii gelu fuit, ad supremam mensis stationem; Et ad analogiam cum aspectibus & meteoris Jan.

anno 1709. Cæterum, priores illæ hyemes austrinæ uti videbantur fovere pestem Polonicam, ita succedens borealis eadem sperabatur ex tinctura: Et erat utique silentium aliquandiu; verum enim vero tristitia porro leguntur in novellis publicis. Opponam adhuc illi gelu, æstum, quem substituimus per dies Julii anno 1707. quatuor, scilicet die 19. 20. 21. 22. insolitum; non tamen cum humili mercurio, nec cum magna motuum differentia, sed a supremo hujus mensis, & communiter æstatis gradu, a nebula per serenitatem extreme calidam ad tempestatem nocturnam, sensim facto descensu non nisi per quatuor gradus, nec infra scalæ medium. Interim, qui primo die aspirarat adhuc aer lenis, dispellens nubeculas (quæ quidem solet esse gratia Etesiarum, sive euroboræ & euri, pomeridianum aerem temperantium) emanabat prorsus, ne auræ quidem appulsus sentiebatur, urgebat autem calor, quantum thermometri testimonio ab illo tempore nullus annorum sequentium tulit. Hæc, ut dixi ad tempestatem; qui cum succederent ultiores binis diebus sequentibus, & obtineret insignis temperati jam, imo refrigerati, aeris inconstancia, tunc quod siccus calor non potuit, procuravit laxa humiditas, scilicet descensum ulteriorem, ut differentia tamen stationum sub tam diverso aere fieret octo tantum graduum. Si cui libeat recurrere ad ephemerides illius temporis astrologicas, inveniet Jovem apud Martem, & aspectus forsitan pro etesiis quoque & subsequa inconstancia.

Cum reviderim tabulam, offendi, quod æstate rarum, scalæ imum ipso Julio anni 1703. Itaque recurrens ad Ephemerides, deprehendo lapsum per quatuor minuta factum intra 24. horas, & mox reascensum intra horas non plures, per quinque minuta, die mensis sexto, sub aere non calido, cum pluviae copia ventique impetu: Flabat ille ex plaga a meridie ad occasum, versus quam nobis situs est Lacus Podamicus. Atqui hic ipse tum dicebatur intumuisse ultra modum; An perturbatus appulsu hostis vicinæ graviter minacis?

Video etiam, quod vix alias factum, Decembris non stetit humilior mercurium, sed tenuisse octavum scalæ gradum anno eodem 1703. Inspicienti autem ephemerides occurrit illa statio die Decembris octavo nubilo, inconstanti, ventosa. Tempestas horrenda cum fulg. ton. vi venti insolita, vix sine terræ motu fuisse credita, quæ in Anglia, Belgio, & ad mare Balticum valde sævit, & ruinam multis intentavit vel intulit, scribebatur tunc nocte inter 7. & 8. Decemb. incepisse ex SVV. & durasse ad meridiem octavi; qui turbulenter, ut dictum, apud nos, non tamen tempestuosus, transiit de cætero sine damnis. Cur sub tali aere non humilior mercurius? An medius inter oppositiones & post conjunctiones trigonus id non permisit? (illa vero videtur apud Astronomos) Certe a NL. tunc ecliptico properavit ad supremam, quæ in tabula fixit stationem intra triduum.

Denique finem his imposituro ad manus venit la connaissance des temps, quam Gallica scientiarum Academia publicari facit, ubi de anno 1708. scribitur, supremam per ipsum elevationem mercurii fuisse observatam d. 17. Novembr. 28. poll. 1. lin. 1. infimam d. 10. Januarii 26. poll. 9. lin. 1. Hæc plane conveniunt cum observationibus meis: Etenim scalæ meæ gradus decimus octavus, qui in tabula ad annum 1708. Novembri respondet, etiam non fuit per hunc annum, nisi mane istius diei 17. quo longam nebulam excepit serenitas: Frigidum utique fuit illud mane, minus tamen, quam sequens, quod habuit mercurium tribus jam gradibus inferiorem. Alterum huic oppositum, ex Januario ejusdem anni, est illud ipsum scalæ imum, de quo supra, ad hyemem austrinam, quod mirabar fuisse sine aeris turbulentia. In quo itaque subsisto; Ad occasionem quamcunque aliam reservans plura.

Tabula Motuum Mercurialium, sive Stationes Barometri suprema & infima.

	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710
Januarius		20 2	20 10	19 6	16 1	20 4	18 4	14 0	20 0	20 0	14 2	18 0	18 0	16 0	18 6	16 10	16 8	12 0	18 2	16 0
Februarius		14 1	19 4	19 10	18 4	18 4	16 0	16 6	16 4	14 2	16 2	10 2	10 2	18 2	19 0	16 4	14 8	16 2	16 2	16 8
Martius		15 2	14 2	15 5	14 4	14 0	18 0	16 8	17 0	18 6	12 0	16 4	16 6	12 2	18 0	16 6	16 6	12 2	14 4	14 0
Aprilis		14 2	12 6	15 6	10 3	14 5	14 5	12 4	14 0	16 2	14 4		14 2	14 4	16 2	14 4	14 0	12 2	14 4	14 2
Majus		13 4	12 4	12 5	13 4	16 7	14 8	14 6	14 5	14 5	14 6		14 4	12 5	14 6	14 6	12 6	14 4	12 4	16 6
Junius		12 5	13 6	13 8	16 6	15 5	14 4	15 8	16 4	14 4	16 8	11 6	14 6	14 4	14 4	14 6	14 6	12 4	14 6	14 8
Julius	13 7	13 5	13 8	14 7	13 8	14 6	14 7	14 8	14 6	16 8	14 4	12 6	14 0	14 6	14 7	14 8	14 6	14 6	14 6	14 6
Augustus	14 9	13 6	13 6	12 7	16 6	16 8	16 5	14 6	15 8	14 8	16 6	14 4	12 6	14 8	14 6	14 8	12 2	14 6	14 8	14 6
September	16 8	16 6	15 4	15 4	12 4	17 1	14 4	14 6	16 6	14 8	16 12	14 4	14 2	13 2	16 2	16 4	14 4	14 4	16 6	16 6
October	16 9	15 6	17 4	16 0	19 6	14 4	18 5	10 0	16 5	14 5	18 6	16 0	14 2	18 6	14 4	14 6	14 0	14 4	16 2	
November	15 0	14 4	15 4	14 0	16 11	10 0	16 0	15 3	20 0	20 0	18 2	16 0	18 4	16 2	16 6	14 0	18 4	18 4	18 6	
December	18 7	20 2	18 0	19 5	14 2	18 4	14 8	18 2	20 0	19 6	16 6	16 0	19 8	18 2	14 0	18 0	12 4	14 2	18 0	

De frigore hyemali Anni MDCCIX.

Rigoris vehementia, quæ Anni 1709. principium memorabile reddidit, digna est habita, quæ curiosorum considerationem eruditam subeat, quos inter præcipue Exc. D. Jo. Guilielmus Bajerus, in Ill. Noricorum universitate Altdorfina professor publicus in dissertatione d. 15. Februarii edita causam ejus exposuit; & celeberrimus D. Bernardinus Ramazzinus in Antenoreo Lyceo primarius practicæ Medicinæ professor in oratione die 13. Maji anni prædicti publice habita, præter causas, in effectus etiam morbosos algidissimæ hujus constitutionis inquirere voluit. Horum itaque propria verba Lectoris in gratiam, cum paucorum in manus Opuscula devenerint, Historiæ nostræ epidemicæ subicere libuit.

D. Joannes Guilielmus Bajerus.

§. 1. Rigoris illius post hominum memoriam maximi, quod mense proximo per Europam sævit, rationes breviter evolaturi, merito præmittimus recensionem quorundam phaenomeno-

rum tam antecedentium, quam durante ejus vi. in aere terraque nostra observatorum, unde totius rei cognitio facile ducitur.

§. 2. Erant jam tum Decembris dies plurimi gelidi satis ac nivoli, terra frigore tam alte constricta, ut currus onustos superficie sua ferret; neque omnino solvebatur, tametsi per intervalla tepidi venti aerem agitant, & post Calendas Januarias ad nonas usque pluvia tempestas impenderet.

§. 3. Ipso nonarum die, cum aquis nivalibus pluviiisque telluris facies undique maderet, (latente tamen adhuc subtus glacie) circa vesperam demum quammaxime humidam, ventus orientalis spirare primum leniter, sed provecta nocte vehementius coepit; post quem sub auroram statim terra omnis nive & pruina visa est obriguisse.

§. 4. Ventum hunc, per sequens biduum & ultra cum assiduo frigoris incremento, sed diverso impetu continuatum, paulo antea Mercurii in barometro per plures gradus ascensio subita prænunciavit, cum prius ad vesperam usque diei v. Jan. multum infra mediocritatem lapsus esset.

§. 5. Thermometrorum ex adverso liquores subinde majores frigoris

goris gradus notabant ad medium usque Januariam; quo cum ad tantam vehementiam gelu processisset, quantam in nostris regionibus vix attingere posse credebatur, circa diem XVIII. observatum est remississe paululum, sed non diu neque constanter: quandoquidem & per brevissima intervalla rursus crevit decrevitque, & die XXI. tempore matutino majorem quam antea unquam vim in nostris thermoscopiis ostendit, post meridiem autem notabiliter defecit.

§. 6. Mercurius interim in barometro alterno ascensu descensuque ventorum potius, elaterem aeris variantium, vicissitudines indicabat, quam frigoris incrementa & decrementa; nobis quidem haud mirantibus, qui pridem noveramus, & calorem & frigus, & ferenitatem & perturbationem cæli cum diverso elateris aeris statu per accidens saltem conjungi: tamen vulgo ista qualitatium aeris temperatio barometrorum scalis pro regula consueverit adscribi.

§. 7. Quemadmodum igitur istas barometri mutationes, utpote parum ad hoc negotium conferentes, sigillatim exponere superse-derimus; ita nec operæ pretium fore arbitramur gradus thermometrorum hic enumerare, qui diversi sine dubio sunt non solum in diversis machinarum generibus, (unde eodem tempore v. gr. Hamburgi liquor a gr. 60. ad 86. ascendisse, Francofurti ad gr. 21. descendisse, in diariis publicis memoratur) sed diversi quoque in singulis speciebus, pro diversitate scalarum, liquorum, variaque altitudine & amplitudine vitrorum. Quare facile conjicimus, neminem ex hujusmodi recensione animo percepturum quid res sit, nisi qui vel thermometra nostra oculis usurparit, vel prolixam eorum legerit descriptionem.

§. 8. Cætera licet eandem ob rationem, ex observatis Berolinensium, Francofurtensium, Dantiscanorum, Hamburgensium, Roslochiensium, Stetinensium, aliisque, quorum copiam diaria publica fecerunt, colligi satis tuto non possit, ubinam locorum maxime frigus dominatum fuerit, quique gradus diversis locis intercesserint; tamen hæc certa & notatu digna sunt, quod 1. (eadem nocte universam Germaniam invaserit gelu,) 2. eadem proportionem ubivis creverit decreveritque, 3. (ad supremum ubique culmen, pro climatis ratione, & ultra quam putabatur, pervenerit, 4.) calidiores Europæ in tractus, Galliam & Italiam, simili cum rigore penetrarit, quin etiam, incredibile dictu, ipsas thermas Aquigranenses congelarit.

§. 9. Nec præterire possunt, quin memorem, frigus decrescere lunari lumine invaluisse, & biduo ante plenilunium maxime remississe, secus ac vulgo creditur fieri. Quin & cæterorum aspectus planetarum tanti non erant, ut exinde talem effectum ominarentur Astrologorum regulæ: nisi dicere velis, ∞ $\bar{\eta}$ ♀, quæ diē VII. Jan. contigit, biduo antequam fieret, istam mutationem aeri intulisse. Sed nec defunt calendariorum artifices, qui Jovem beneficium hyemis istius præsidem declararent, & hinc Januario mensi insignem frigoris temperaturam promitterent.

§. 10. Jam vero ut ad causas eventus hujus inexpectati accedamus, e modo dictis patet facile, quam debile, imo nullum subsidium ab Astrologia sit sperandum. Quare missis ambagibus originem memorati frigoris dicimus a vento orientali præcedente (vid. *Phæn. III.*) hujus autem occasionem ab impedito aeris nostri, per priorum dierum turbulentam tempestatem, elatere, de quo *Phæn. II. & V.* loquuntur. Etenim cum venti tepidi humidique d. IV. V. Jan. leniter spirantes tenuiorem fecissent aerem regionum planarum illo, qui silvosis montibus, nive & glacie rigentibus (Bohemicos intelligo Carpathiosque) imminerebat, fieri non poterat, quin sublato sic aeris utriusque æquilibrio, hic in istum gravem irrueret, advectisque secum spiculis glacialibus totum impleteret. Ita vero & illi vapores, qui prius atmosphæram nostram confertim occupant, excusso calore modico simul in pruinas abierunt, & aquam in superficie telluris fluentem pariter suo actu congelarunt. Namque ipsum terræ solum jam tunc priore a frigore jacuisse constrictum, *Phæn. I.* observavimus.

§. 11. Quid vero sic cælo soloque juxta gravi ad consummatum frigus deerat? quidve poterat impedire, quo minus ille ventus orientalis, æqualem per Germaniam statum aeris offendens (quod relationes publicæ docebant) eadem nocte eam totam pervalerit, & per aliquot dies continuatus, contiguo nostris tractibus aeri similem rigorem longe lateque induceret? quo facto, etiam venti australes & occidentales, alias calorem humoremque nobis adspirantes, jam non nisi vapores pruinosos dabant; & si quando aer superior modico tepore tangeretur, ille tamen solvendis his inferioribus nimium argenribus hand sufficiebat, usque dum sol, quotidie nobis sublimior factus, primo australiorum terrarum infregit rigorem, & mox inde potentiores ventos calidos ad nos transmisit.

§. 12. Equidem facile prævidemus, adductas in medium rationes non statim omnibus satis facturas cogitantibus, quod intra sæculum proximum haud dubie sæpius venti orientales supervenerint hyemi liquefcenti, (quam nos hoc anno occasionem tali vento fuisse fassum) nec tamen frigoris tantam sævitiam asportarint. Sed hæc objecta dimovere nos de sententia non valebunt, nisi conslitterit, omnes, quæ nuper ad effectum conspirabant, causas, & circumstantias, etiam alio tempore & crebrius fuisse conjunctas: ut ventus flaverit e regione solido ac diuturno frigore horrente, ut inciderit in aerem tot vaporibus refertum terramque intus jam congelatam, ut contrariis ventis non impeditus per plusculos dies regnaverit; & quæ huc pertinent alia. Neque vero vel nostra memoria destituitur exemplo simili: quandoquidem anno 1697. circa II. post Epiphan. Dominic. & Januariam medium tam subito & acri frigore tellus humida corripiebatur, eodem vento orientali intercedente, ut parum differret a statu nupero, præterquam diuturnitate, quæ tunc minor, etiam minorem sibi peperit famam.

§. 13. Quando ea inter portentoso huic frigori e natura causas assignamus, haudquaquam exclusam volumus singularem quandam Numinis providentiam, quæ forte naturalium corporum actiones solito firmitus in istum effectum direxit, eo quidem fine, ut homines, hen nimis cito Dei obliti suisque innixi viribus, novum impotentia suæ caperent documentum, utque armis hostilibus, per hyemem quoque non quieturis necessarias faceret inducias. Huic ergo Numini supremo omnis sapientia, potentia, clementia laus & gloria sempiterna tribuatur.

D. D. Bernardinus Ramazzinus.

Lubet in prægressa hyemis algidam & nivofam tempestatem, quæ frigoris vehementia atque asperitate non solum Italiam, verum universam Europam tanta hominum, ut omnium cujusque generis

viventium strage male multavit, philosophica & medica indagine inquirere; quod si tam portentosi frigoris veram & germanam causam in apricum eruere non dabitur, non abs re forsitan neque ad sanitatis custodiam infrugiferum erit exquirere, quid mali hac proxima æstate ex hac tam male morata constitutione timeri possit.

Nolo autem hujus hyberni frigoris, quod annum hunc nefastum fecit, & ad multa sæcula memorandum faciet, inclementiam non dicam, sed insolentiam longo verborum ambitu describere; quotus enim quisque repertus est tam denso corio, ac tam forti a natura temperie donatus, qui non in cute solum, sed intus quoque & intra ipsa præcordia, (ubi vestalis ignis nativos lares, & focum habet, ab algidissimi aeris inspiratu noxam aliquam non perferent?) Magna sunt quæ vidimus, majora quæ audivimus; vidimus magna flumina tam arcto; tam alto gelu adstricta, ut armentis, plaustris onustis, & ipsis quoque exercitibus transvehendis sufficerent. Vidimus ad binos & amplius menses vim nivium immodicam e cælo non tacite, ut solet, ad instar velleris labentem, sed magno cum impetu in solum projectam, & quod magis mirere sub æquinoctium ipsum, quod in hac Civitate prodigio par est. Vidimus in partibus ædium interioribus, & in ipsis hypogæis fluida quæque congelari solidioribus vasis ex opere figulino disruptis, ac dum cibum capturi mensæ accumberemus, non procul a luculento igne vidimus fumantes epulas temporis momento gelascere. At vulgaria sunt isthæc, & fidem invenient. Urtem vidimus Adriæ Reginam, cui nullum unquam nisi navigiis cum terra fuit commercium, continenti junctam, marinis aquis in maream duritiem solidatis, ut ad septem passuum millia ultro citroque longo agmine commearent viatores, veterinarii, & annonariæ gentes cum armentis, & gregibus, ut laboranti civitati victuales suppetias ferrent. Quam admiranda porro, imo quam miseranda sunt, quæ alibi facta accepinus, velut in Gallia, Anglia, Germania, ac tota septentrionali plaga, non solum magnis fluminibus marinum æstum pari solitis, sed Oceano ipso congelato, ut sublatis commerciis centena hominum chiliades in civitatibus, in agris inter frigoris rabiem, & famis morsus misere perierint, ac ex iis, qui militiæ sacramento erant auctorati longe plures in castris hyemando, quam in acie pugnando in orci familiam transferint. Profecto si cujusque regionis, civitatis, atque oppidi necronologiam haberemus, in quibus eorum, qui evita decesserint, nomenclatura continetur, ac ratio iniri posset, quot hominum myriades duorum vel trium mensium spatio in libitina censum deduxerit intolerando suo frigore funesta hæc hyems, nulla certe pestis ut ut truculenta & pernicialis, nec ea, quæ apud Historicos, & Poetas adeo pervulgata, quæ universam Græciam depopulata est, algidissimæ hujus constitutionis pesti, si ita fas loqui, ullo pacto esset conferenda.

Ast undenam quæso tam violenti frigoris petenda est origo? Si a Aquilone frigoris promocondo malum hoc venit, cur hoc anno tam diuturnum, ut quotquot in viventium numero adhuc extant provectioris ætatis homines, & silicernio jam proximi tam enorme frigus nunquam se perensisse meminerint, nec scriptorum quisquam prodigium hujusmodi litteris prodiderit? Scire optatis, quam proportionem habuerit hujus anni frigus ad præcedentium octo annorum, quos in hac civitate observare mihi datum, summum frigus? Pycnometro teste proportionem habuit sesquialteram, hoc est ut ternarium ad binarium. Is fuit hyberni frigoris hoc anno supra cæteros excessus, qui in regnum quoque vegetabile defæviens, non solum plantas, quæ hortorum ornamenta sunt, sed quod dolendum, oleas & vites ad internecionem usque absumpsit. Mehercle si in hujusmodi tempora incidisset Cardanus, eam, quam de frigoris natura opinionem mordicus tenuit, dubio procul abjecisset; non esse frigus quid re vera subsistens, sed simplicem caloris privationem, ventosque omnes plus minus calidos esse, inter suas subtilitates recensuit vir ille, quem censoria virgula fugillans, severissimus ille Cardanomastix hisce verbis sic eum interpellavit: *Abjice soleas, ac pileum, Cardane, quo tempore ex Alpibus Reticis urit vos Boreas; frigidus enim, & siccus est.* Hic autem mihi haudquaquam mense est in frigoris naturam curiosius inquirere, neque quodnam primum sit frigidorum, num aqua, ut Aristoteles, an terra, uti Parmenides, & num venti aerem comprimendo frigus efficiant, aut illius vectores sint, cujusmodi quæstiones Philosophos tum veteres, tum recentiores exercuere, & adhuc exercent; sed solum in votis mihi esset causam perspicuam habere, quæ hac hyeme tantum frigoris ac tam ex improvviso excitaverit. Jam præcedens brumale solstitium exegisse nos, & annum cum satis placido aeris statu clausisse lætabamur, ut spes esset hyemis reliquum eodem tenore processurum. Ast tanto impetu nascenti anno Janus fores aperuit, ut nobis ferale bellum indicere visus fuerit; illico enim, ex boreali plaga ventorum turbines biduo tanta vi efflarunt, ut omnibus horrores essent, illos acerrimo frigore comitantes, & continuo nivium descensu subsequente. Grande igitur aliquid in hyperboreis contigisse credendum est, quod tam subitam in aereo mari magno tempestatem excitavit? Anne magnum aliquem terræ hiatus ex improvviso apertum fuisse putandum est, unde una cum ventis algidissimis tanta nitrosi spiritus copia eruperit, quæ totam atmosphæram frigorificis particulis ad saturitatem usque opplerit? Quanta vi polleat nitrum ad sensum frigoris inducendum, satis demonstrat experientia, dum nivi & glaciei commixtum illarum activitatem excutit, ac in earum defectu nitri portionem in aqua dissolvendo modum habemus, quo media æstate vina & frigidas potiones nobis conparemus, non aliunde autem quam e terræ sinu tam horrendi frigoris causam deducendam arbitror; ad tam subitam enim & adeo turbulentam ventorum irruptionem locum aliquem in aerea regione intra polarem circulum fingere oporteret, in quo spiritus adeo furens conclusi essent, & effracto carcere subito erumperent, quod tamen Poetæ, quibus quidlibet audendi data est potestas, ausi non sunt, qui ventorum turbam in antris terræ obscurioribus abditam esse voluerunt, ac insuper regem illis statnere, qui imperio premeret, & laxas sciret dare jussus habenas. Minus porro rationi congruum videtur cælestia illa corpora culpæ velle, quæ suo lumine & afflatu in nostram perniciem conspirarint. Quid novi enim in cælo a syderalis scientia peritis antea fuerat observatum? Num ferale cometæ visi sunt aut alia hujusmodi portenta? Num planetæ in choreis suis agendis a præscriptis sibi legibus exorbitarunt, ut novis syzigiis & insolitis motionibus cælestem illam harmoniam perturbarint, ut postea propter illorum aberrationes nos plectendi essemus?

Sit quidem, ut ajunt, multum pollere lunare sydus ad perfrisc-

randum, at illius lumen ad nos reflexum, licet a Sole prodeat, actu frigidum esse, seu ut alii putant vi magnetica calorem terræ & aeris ad se elicere, sicque frigefaciendi vim habere, at forsan luna hoc anno propius ad nos accessit. Haud sum nescius ab astronomis, a veteribus agricolis, a Medicis quoque peritioribus, ut olim ab Hippocrate ad prænoscentiam futuræ hyemis indolem observari solitum plejadum occasum, & ortum arcturi, atque ut monebat Virgilius Georg. I.

Frigida Saturni sese quo Stella receptet.

At isthac singulis annis observantur & adventantis hyemis signa sunt potius quam causæ. E magnæ parentis utero itaque monstrosum hoc frigus prodixisse, a vero non prorsus alienum videtur. Terra enim tota intus cavernosa est, & non secus ac animalium corpora suos habet ventres distinctos & magnas cavitates, in quibus non hospitantur tantummodo silentes umbræ & segnis aer; sed varia & admiranda intercurrente spiritu exercentur officina. Nusquam certe operosior natura est, quam in subterraneis officinis ad generationem intenta tot pretiosorum lapidum, fossilium, mineralium, & metallorum, quæ si hominum avaritia potius quam curiositas, & abditiora quæque investigandi cupido surripiat effossis terræ visceribus, non minus natura sollicita est in illis suo tempore reponendis, & damno refarciendo. Hinc innumeri pene fontes & terræ scatebris erumpunt non solum aquarum dulcium, sed medicatarum quoque, quales sunt ferratæ, æneæ, sulphureæ, aluminosæ, nitrosæ, aliæque omnigenæ. Cum autem borealis plaga in sinu suo nitri multum recondat, quod satis norunt nitri collectores pro tormentario pulvere conflando, qui e parietibus & locis boream respicientibus longe plus nitri obtinent, quam ab iis qui austrum, cur suspicari non liceat in regione illa inhospita, & Solis radiis ad plures menses inaccessa ex subito & præcipiti montis alicujus in magnas illas cavernas lapsu, ut in Apennino & Alpibus aliquando contigisse legimus, portam ingentem algidissimis ventis & nitrosæ exhalationi apertam fuisse, unde tam horrida tempestas hac hyeme ortum duxerit? In Islandia magnam cavernam esse referunt, ex qua venti frigidissimi expirent, qui glaciei fragmina identidem in altum protrudant. In Hetruria penes lacum Vulturnensium ad radicem cujusdam montis boream versus antrum extat, in cuius latere rima visitur, ex qua, æstate præcipue, ventus efflat adeo frigidus, ut sine noxa perferri nequeat, in quo specu si vina deponantur, ad pauca temporis minuta pene gelascunt, & fructus pruinosi educuntur, magnum utique blandimentum ad exhilaranda convivia, quæ ab indigenis illis, cum Procyon fuit, celebrari solent. In Peruvia duo oppida Platam & Potosam describit Acosta, quæ non multum inter se distent, ac utraque in montanis locis posita, quorum unum, Potosa scilicet, temperaturam hyemis habeat, Plata vero vernali similem, cujus prodigii in calidissima regione causam in argenti fodinas referunt, & terræ spiracula, unde aura algidissima expiret. Quanto igitur longe probabilius est frigus ab imis terræ visceribus in aerem efferri, quam ab æthereâ regione in hæc inferiora descendere, tam grandis phænomeni, quod hæc hyems præ se tulit, & cui aliud simile ulla ætas non vidit, nullam aliam causam comminisci possum, quam magnam terræ scissuram recens factam, paratum tamen me protestans ad expuendum ex animo meum hoc commentum, sicubi aliqui feliciore forte meliora proferant. Si ergo forte ita evenit, uti conjeci, tam horrendi frigoris, ac tantarum nivium descensus causam tenere mihi videretur. Nitrosa enim emanatio illa una cum ventis validissimis longe lateque diffusa tam magnum algorem efficeret, & vapores, aquei elementi sobolem, in aere suspensos arripiens, iisque se confocians nivem conformare potuit, atque illis suis capillamentis sexangularem & stellatam figuram impertiri. Non aspernandam nitri portionem nivibus inesse chymica enchrasis ostendit, qua nitrum in sinu nivis delitescens educitur, & medicus usus comprobatur, dum ex aqua nivis ratione nitri in illa contenti parantur remedia in æstuosissimis febribus exhiberi solita.

Verum dictum illud e sacris paginis mihi forsan obtrudet aliquis, *Nunquid ingressus es thesauros nivis*, tu, qui adeo fidenter modum tradis, quo in aere consentitur nives? Ulro fateor, non esse apud me ipsum tanti ponderis, quas produxi de nivis conformatione, & credito terræ hiatus conjecturas, ut veram & germanam tam inusitati frigoris causam e Democriti puteo hausisse me persuasum habeam. Conjectoris tamen non prorsus improbandi munus obisse me arbitror, si in negotio tam abstruso ita fieri potuisse naturæ legibus non repugnet, nil enim amplius a rerum naturalium scrutatore in re obscura exigebat Peripateticorum Princeps. Quid ergo in quæstione tam ardua & impervia dicendum? Num ad effugium illud histroniam exercentibus adeo familiare recurendum, qui ubi fabulæ negotium ita implexum & involutum est, ut nodo solvendo humani ingenii acies non sit satis, pro more habent, Deum aliquem e machina in scenam inducere? ita sane. Ut ergo aliquid proferam, quod pro vero accipi possit, de hac tam horrida constitutione dicam, quod magnus Hippocrates de morbis populariter grassantibus, ubi phænomena quædam apparet, quorum ratio abditior esset, dicere consueverat: *ἄμα δὲ καὶ τὸ θεῶν ἐννοεῖν ἐν ταῖς νόσοις considerandum an sit quid divinum in morbis*; illud itaque θεῶν apud Medicos tam in morbis quam in remediis adeo celebre hic quoque vim habuisse censendum est, ab ipso Deo nimirum tam rigidam tempestatem fuisse excitatam, ut corruptos sæculi mores & vitia novo & inusitato pœnæ genere expiaret. Neque enim in suis armamentariis justissimum illum criminum vindicem solum ignem & fulmina habere credendum est, quæ multorum metu & paucorum periculo jaculetur in terras; in iisdem enim habet, *Glaciem, & Nives, quæ faciunt verbum ejus*. Ille est qui, ut cecinit Regius Vates, de thesauris suis ventos educit, qui temporis momento aerem non minus quam maria, in magnas tempestates agant, & palam faciant, cui serviant, cui militent. Illud sane admirationi fuit, quod toto eo tempore, quo a sexta Januarii usque ad æquinoctium fere perzinacissimum persistit frigus, unquam hincere ausi fuerint australes venti, quod in hisce regionibus perrarum est, cum vel media hyeme rigidiori identidem caput efferre soleant ab ora meridionali calidiores flatus, adeo ut ex improvviso liquecant nives & regelent flumina, si quæ prius glacie erant adstricta, ut quandoque campos inundent, quasi Deus borealium ventorum ministerio plectere nos volens australes flatus intra suos lares, unde ortum habent conclusos, voluerit, ne blando suo tepore inflatæ pœnæ rigorem delinirent.

Sydenham Opera Medica.

Sic eleganter non minus quam ingeniose Ovidius Jovem qui totum mortale genus aquarum eluvione perdere statuerat, finxit reposuisse tela manibus fabricata Cyclopum, in antris autem æoliis aquilonem aliisque ventos nebulas fugare solitos clausisse, emisisse autem notos, euronotos, atque austrum pluviarum pincernam.

Utinam autem malorum hic finis fuerit, & hujusce anni felicius sit exitus, quam fuit initium. Quam infesta, quam pernicialis humano generi fuerit hyemalis hæc constitutio, & quænam morborum genera invexerit, nemo est qui ignoret. Frequentissima fuit in hac Civitate, ut de aliis taceam, funera, ac nulla pene domus visa est, quæ pullam vestem non induerit. Primo quidem teneros infantes, decrepitos senes, & valetudinarios fere omnes, mox juvenes, & robustiores viros, nec solum minutam plebem, sed non paucos quoque ex procerum ordinibus hiberni frigoris violentia in libitinæ cenatium deduxit. Tussis, destillationes, pleuritides, peripneumoniz, dyspnœæ, & morbi id genus dominatum obrinuerunt. Rariori autem consensum fuit, ut hujusmodi affectus populariter grassarentur; sicuti enim austrina tempestas capiti infensa est, ita aquilonaris spiritalibus organis est maxime infesta. Possumus equidem adscititiis comis, adversus aeris injurias calvariam munire, ac benechlamydati, & palliolati corporis extrema a frigoris rabie & morsu possumus tutari; at quomodo visceribus in pectoris cavea contentis ab aere rigidiori propici potest, si ab indefinitis & reciprocante aeris inspiratu & expiratu vitam precariam habemus? Non est ergo quod miremur, si hæc hyems, glaciali aura per ostium patens thoracis penetralia subeunte, tam diram hominum & cujusque generis animantium cladem ediderit.

Verum ante putandum hanc male moratam constitutionem totam sævitiam suam explevisse, ut in nostris corporibus labem nullam reliquerit, quæ nova morborum genera hac æstate non possit accessere? Si Cui senis, cui futurorum mens divinatrix divini nomen adscivit, oraculum adeamus, responsa referemus, quæ non multum nobis arrideant. *De temporibus*, aiebat ille, *si quidem hyems sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluviosum & austrinum; necesse est æstate acutas febres fieri, lippitudines, & intestinorum difficultates*. Observatione profecto dignum est, quomodo Hippocrates, Vir in prædicendo alioquin cautissimus, tam fidenter & absolute pronunciarit, quod si hyemem aquilonarem, vel austrinum & pluviosum exceperit, ex necessitate subsequi debeant æstate acutæ febres, & alvi profluvia. Ast ratio sic fieri oportere satis evincit; etenim si hyems plus æquo algida & nivosa sit, parum perspirant humana corpora, ac ea præsertim, quæ debiliora sunt, unde seorsum colluviem cumulari necesse est, eamque augescere si ver pluviosum successerit, qua postea per æstivum calorem diffusa & in motum concitata, acutæ febres & alvi fluxus oriantur necesse est. Nec quis putet Hippocratem nisi experientia prius edoctum tam grande effatum pronunciasse; in libris enim Epidemiorum constitutionem habet, in qua pars hyemis posterior, ut in nostra evenit, aquilonaris fuit cum magno frigore & nivibus, cui ver successit pluviosum, unde postea memorati effectus æstate & autumno apparuerint.

Ver equidem, quod modo excurrit, & cujus medium jam teneamus, atque hyemi algidissimæ successit, sub initium visum est ad pluviosum propendere velle, non paucos tamen Aprilis mense dies habuimus siccos, sine ullis omnino imbris, sed ita calentes, ut a canicularium dierum æstus parum differrent, sub finem tamen mensis tam magna ac subita facta est a calore ad frigus conversio, ut unica fere die rariores synthèses & holoserica deponere necesse fuerit, ac e vestuario pannosas vestes reposcere, quam mutationem postea subsequutæ sunt ingentes pluviz. Quo tenore veris pars altera processura sit, solus novit, qui fecit tempora, dies, & annos. Id tamen certum est hujusmodi temporum anomalias, & a sua temperie aberrationes ominosas esse, & morborum mali moris, quod superi avertant, prænuncias. Nam ex eodem Hippocrate, *in legitimis temporibus & convenientem servantibus temperaturam morbi legitimi & boni judicii sunt; in intempestivis autem non legitimi & mali judicii*.

Sed quid frugis ex hujusmodi apparatu datur colligere ad præcautionem & sanitatis custodiam? Paucis dicam quod sentio. Adversus temporum tam enormes intemperantis niagnum erit præsidium temperantia, neque solum in victu, sed in omnibus, quæ res non naturales vocant Medici. Non inopportunitatem tamen erit purgationes instituere, & si opus fuerit sanguinem mittere. *Quibuscumque convenit vena sectio vel purgatio hoc Vere purgare, vel Venam secare oportet*, aiebat idem Hippocrates. Magna certe animadversione particula illa disjunctiva digna est; Prædicorum enim non pauci magnum piaculum committere sibi viderentur, si purgationem verno tempore instituentes venam simul non tunderent. Ast quam longe a divini Præceptoris vestigiis aberrant, nemo non videt. Est ubi tantum sanguinem mittere oporteat, est ubi solum purgare liceat, est ubi utrumque remedium conveniat. Si vero aliquis ex memoratis affectibus hac æstate populariter vagari incipiat, boni & periti Medici erit, non tam propere & inauspicato communibus remediis, ut in morbis sporadicis, curationes aggredi, recte propterea Celsus de pestilenti febre verba faciens aiebat, *sanguinem non facile mittere, alvum non facile ducere*. Suspensio pede igitur procedendum erit, atque attente observandum, qua methodo natura morborum medicatrix in iis utatur, qui sponte aut paucis remediis evadant; illa enim sibi vias & egressionem invenit, quas prænoscere & divinare non possumus; fateamur enim necesse est, quandocumque aliqua epidemica affectio ex improviso se prodatur, esse non juvenes ac tyrones, licet medendo ætatem triverimus, ideoque oportere, ut naturæ quam *αὐτοδιδάκτορ* & doctam sine Magistro Hippocrates dixit nos erudiendos tradamus.

Constitutio Epidemica inferioris Hungariæ Anni 1711.

Dn. D. JO. ADAMI GENSELII.

H yems sat rigorosa, euro dominante, nivibus copiosis, purpura rubra maligna multos, præsertim vero infantes corripuit, secunda & tertia die accedentibus convulsionibus, quinta & septima lethalis. Manus, pedes, deorsum post mortem atra summæ malignitatis signa conspiciantur, in duobus facta anatome pulmones & hepar lividis conspersa maculis inveni.

Ver nimis siccum, 25. Aprilis hora X. sol duobus slipatur pareliis observatus, quorum unus vividissimi erat coloris, subsequente Majo æstu fervente cum fulminibus & fragore tonitruum.

Junius frigidus in principio ac pluvius, ipidum, scarabæorum.

M

cur

erucarum; aliorumque insectorum serax, circa finem æstuosus. Variolæ & morbilli invalescebant, aliquibus etiam funestæ, illis præprimis, quos vetulæ curabant; parotides crebræ erant, ast paucæ suppurabantur, vel enim a natura sponte resolvebantur, vel emollientibus & solventibus discutiebantur, sudoris guttulis in cute & emplastris instar roris conspicuis, in duobus pueris illas induratas vidi, quæ cum ab incauto barbitonfore contra nutum apertæ fuissent, in cacoethica degenerabant ulcera.

Julii principium calidum, interspersa quandoque pluvia frigida. Augustus in initio serenus & temperatus, circa medium frigidiusculus & pluvius. Septembris major pars serena & calida.

Febres tertianæ absque ullo rigore grassabantur, per 24. horas & ultra durantes, quinque & sex ad summum septem terminabantur paroxysmis: petechiæ quoque sporadice vagabantur, cum dysenteria septima & nona lethales. Fœmina 57. annorum gravis, pro hydropica a medicastro quodam reputata, cum stupore omnium puellam vegetam ac sanam enixa est. Octobris & Novembris constitutio pluviosa & nimbofa, flante pluviarum pincerna austro, septem enim fere continuos dies & noctes durabant. Decembris principium itidem pluvium, medium ventosum, at ob austrinam aeris temperiem temperatum. Febres intermittentes increbescabant, diarrhææ, item, rheumatismi ac asthmata ob *ἀδυναμία* ab humido cœnoso atmosphæræ statu causata, apoplexiæ quoque & paralyfes frequentes erant, ut & variolæ & morbilli, in infante trium annorum, moribus convulsivis in dentitione difficili mortuo, dentes atroces & ob grangrænam carie infectos sua sponte excidentibus observavi. Annus hic utcunque fertilis erat, vinum etiam generosum ac optimæ notæ.

Constitutio Epidemica inferioris Hungariæ Anni 1712.

Cum historicis, & meteorologicis Observationibus,

Dn. D. JO. ADAMI GENSELII.

Pincipium Januarii rigido gelu fuit horridum & ventosum cum nivibus copiosissimis, adeo ut in quibusdam locis novem pedes superarent altitudine: circa medium mensis nix cœpit liquefieri, flante zephyro, nubibus in pluviam resolutis, circa finem intensum frigus gravidis in primis valde perniciosum, abortus quippe epidemicus plurimis lethalis grassabatur, vid. Hipp. aph. 12. sect. 3. ob inæqualitatem & improprietatem ætheris, quædam apoplexia tactæ ægrorum reddebantur, quædam pleuritide, multæ purpura alba correptæ exspirabant, febres etiam intermittentes invalescebant, vario typo anomalo revirescentes. *Februarius* in principio turbidus, circa medium & finem temperatus. *Martius* circa medium procellosus ac nivosus, cum tonitruis & pluviis circa finem, febres causavit acutas, summa cum vehementia prima & secunda die sævientes, quinta & septima subsequenibus deliriis fatales. Ver pluviosum cum terræ motu trematorio sat notabili in nostris partibus, in primis Neostadii, ubi multæ fornices dirutæ ac domus ruinatæ a motu illo concussorio concipiebantur. *Majus* itidem pluvius, ut plane diluvium quasi appareret in quibusdam Hungariæ locis, in primis in Holing, ubi vites e terra evulsæ, & domus aqua vix non cooperuit. Hoc mense miræ fuerunt metamorphoses febrium, in principio mentiebantur continuas, calor enim per tres continuas durabat dies, quarta remisit, quinta paroxysmus bis mane scilicet & circa noctem invasit ægros, die sexta etiam bis, tandem octava in tertianas veras degenerarunt, servato ternis vicibus typo ordinario; hinc rursus typo anomalo calor per triduum continuavit, remittente denuo per 24. horas calore, bis de die paroxysmus afflixit ægros, & porro cum in tertianas degenerassent, adhibitis temperantibus, mineram biliosam præcipitantibus, leniterque evacuantibus, cessaverunt, & cum natura eo, quo vergit, ducenda sit, hic ad sudorem critice vergebat, ideo diaphoreticis, illam cum *ὑποεὶα* juvimus: qui vero inscio Medico denuo naturam turbavit, venæ sectione nimirum vel purgantibus, omnes recidivam passi sunt, quæ enim judicantur & iudicata sunt integre, neque movere, neque novare aliquid, sive medicamentis, sive aliter irritando, sed finire oportet: Hipp. Sect. I. aph. 20. Notandum quod hoc mense temperies quoque aeris Proteo mutabilior fuerit, v. g. circa maritinam sextam frigus, circa decimam calor ingens, tertia pomeridiana iterum frigus, & appetente vespere observabatur calor, quæ vicissitudines aeris subitanæ non parum ad hæc generandas contribuerunt febres, juxta Hipp. aph. 1. & 4. sect. 3. quo major est aeris inæqualitas, in primis citiori vicissitudine, eo magis corpus alterat & afficit, motus enim contrarios minus sufferre potest natura, siquidem valde a se differant. Vid. Wedelii Commentar. in h. l. *Mense Junio & Julio* æstus magnus, & copia insectorum, in primis reptilium, & in specie serpentum, qui rucolas sæpius infestant, morsuque communicatum miasma venenosum fermento bilioso volatili sulphureo salino inquinatum totum peragravit corpus, cujus omnes illico intumuerunt partes, in primis lingua, ut nec verbum articulatum proferre potuerint, cum ingenti cephalalgia; pecora etiam mirum in modum ab illis affligebantur magna subsequente strage, ex hominibus multi, non adhibitis prima statim die remediis, veneno illo extincti sunt. Notatu dignum, quod ex quodam fonte certis horis fœtidus ac rubicundus promanaverit liquor, quem supersticiosus & fatidicus credulum vulgus sanguinem esse dicebat, inductum argumentis ab odore & consistentia illius ad coagulum accedente desumptis, post aliquot dies limpidum iterum acquisivit colorem; per chymiam deprehendi, in illa aqua terram rubram martialem instar boli vel cinnabaris, particulis nitrosis & vitriolicis mixtam, ab æstivo solis calore percoctam, quam in cavernis subterraneis alluebat, illaque tingebatur, fœtorem vero attribui materiæ viscidæ bituminosæ asphaltum redolenti, ut adeo non necesse sit ad supernaturalia confugere & mysteria, si naturales prostant causæ & principia, in quæ iterum resolvi possunt mechanice. Vid. Ephemerid. N. C. A. 1712. appendic. p. 193. & 209. Item Nova literaria German. A. 1705. mens. Mart. p. 103. *Augusto* nimis pluvioso increbuerunt febres erraticæ bis de die ægros invadentes, cum deliriis continuis, suspiriis ac ejulationibus; multi attoniti & quasi cataleptici sine usu rationis neminem agnoscentes jacebant, calore per duas durante dies, tertia demum intermittente, in aliquibus quinta & sexta. Eodem mense strages pecorum invalescebat, corripiebantur scilicet certis pustulis albicantibus cum anhelitu difficili,

quibus dissectis materia purulenta mephitim spirans effluxit, ex faucibus quoque fœtor morticinus intolerabilis, ad aliquot sensibilis passus prodiit, cumque maximis boatibus crepuerunt, in ventriculo repti fuerunt certi globi magnitudinis nucis majoris, repleti pilis tunica membranosa dura aciem cultri vix non eludente instructi; feræ quoque omnis generis ad Somogy in copia periere, & in nemoribus passim a rusticis repertæ fuere; canes ex voratione tam illarum ferarum, quam pecorum prædictorum rabidi facti, a quorum morsu homines in phrenitidem inciderunt ac hydrophobiam, latratum etiam & rabiem imitati canum, moribus in adstantes sævire tristi cum spectaculo cœperunt, imo aliqui remedium latenti, aceto & sale ora rabidorum pecorum lavando, rabiem contraxerunt ab illo venenato miasmate, id quod & Matthiolus Comment. ad L. 6. C. 36. Diosc. observavit: multæ nihilominus bestiarum rabidæ servatæ fuere, data statim in principio fuligine cum cupro vel orichalco raso pulverisato.

Principio Autumni exundationes fuere maximæ. In unico pago quadraginta & ultra periere personæ: medium autumni itidem pluviosum cum tonitruis, assiduisque imbribus, qui febres, dysenterias, catarrhos, & in multis apoplexias causarunt, juxta Hipp. aph. 16. sect. 3. a frequentibus quippe imbribus, ob insensibilem prohibitam transpirationem succi corporis redduntur frigidiores, fulgines coacervantur, spirituumque & feri inferuntur morbi. In vineis maxima sterilitas, generositate vini quadantenus eandem compensante nec, agri adeo erant fertiles. Circa ingressum solis in signum Capricornis, variolæ regulares & idcirco mitiores quoque observabantur, tarduitamen (quam ordinarie fieri solet) suam absolverunt periodum, licet absque ulla fuerint malignitate, nec foveas solitas post se reliquerunt. Notatu dignum senem 65. annorum variolis correptum, feliciter restitutum fuisse, pulsus in eo observabatur oppido curiosus, intra momenti spatium ex celeri & inæquali tardus & æqualis, mox ex parvo magnus & vice versa. Cum jam videam institutum hoc anxie hucusque desideratum, multis probatum fuisse, in primis Schelhamero Kiloniensi Machaoni in sua medendi methodo, animus est imposterum quoque constitutiones epidemicas inferioris Hungariæ, summo adspirante Numine continuare, dummodo Academia nostra Mecœnatum suffulciatur munificentia.

Constitutio Epidemica inferioris Hungariæ Anni 1713.

Una cum historicis & meteorologicis observationibus

Dn. D. JO. ADAMI GENSELII.

Pincipium Januarii temperatum, humidum ac nebulosum, circa medium furente Euro-noto fortiter gelare cœpit. In omnium dierum operosa enumeratione non ero multus & molestus, cum inutile sit & tædiosum verborum inanitate aures defatigare. Vigesima pluvia, sequentibus nimbi cum ventis vehementioribus. Hoc mense febres quartanæ grassabantur, quæ dato cathartico in veras degenerarunt tertianas, quatuor & quinque accessionibus suam absolventes periodum. Variolæ continuarunt, ast malignæ & confluentes, illique funestæ, qui non statim in principio remedia adhibuerunt congrua, temperata nimirum diaphoretica, & bezoardica, omisiss volatilibus generosioribus. Vigevano fama ad nos deferebatur, intra montes cecidisse nivem rubram ad spithamæ altitudinem, quæ ab exhalationibus terræ rubræ procul dubio suam traxit originem.

Mense Februario crescente luna ingravescere etiam frigus, quod sexta remisit, decima pluvix calidæ, duodecima caligo cum pruina subsequente pluvia per tres dies, circa finem cælum serenum absque ullis nivibus. Hoc mense observavi digitorum apices duarum puellarum sine dolore sua sponte absque ulla vulneratione, aut cicatriculæ signo sanguinem floridum curioso spectaculo guttatum stillasse: in alia puella idem observavi in facie; vide Ephem. N. C. An. 1712. p. 72. Act. Erud. Lips. Ann. 1686. Mens. August. p. 387. febres malignæ petechiales inceperunt grassari, quinta lethales cum feroicibus deliriis; verum pulsu (quod notatu dignum) tardo & æquali, sanorum pulsui simillimo. In adolecente 13. annorum loco tibiæ cariosæ, per manus chirurgi fere ad patellam usque genu suffice excerptæ, cartilago quædam usque ad ossa tarsi vices tibiæ obiens succrevit, qua etiamnum offescente nititur, & pedetentim ambulat, provida certo natura defectum ossis a vicinia superioris processus ossis tibiæ supplevit.

Principium Martii serenum & temperatum, octava primæ cecidere nives copiosæ, sequente die liquefactæ pluvia per sex dies continuos, hinc exundationes damnosæ fluviorum ac rivorum cum magna hominum, animantiumque strage. Continuarunt febres malignæ multis funestæ.

Aprilis usque ad 15. contra morem suum serenus, ast frigidulus, decima octava pluvix frigidæ furente aquilone in nives hoc anno secundas versæ quatuor geometricorum pedum altitudinis cum turbulentissimis procellis, maximas campanas ad sonum impellentibus, subsequente excessivo frigore in regnum animale & vegetabile defæciente cum internecone, gemmarum in arboribus, & pro dolor vitibus, alitum quoque ovis incubantium in primis ciconiarum & cornicum. Vigesima septima grando cum turbine, ne prior calamitas sola esset, admiratione autem dignum, quod in diversis grandinis granis vermes ac scarabæi alati inventi fuerint, quos in præsentia multorum oculis meis usurpavi: utrum e seminibus in nubes elevatis, ibidemque exclusis & nutritis oriantur, an aliunde accedant, curiosioribus relinquo; ex atmosphærâ saltem nostra ob penuriam moræ vix abripi possunt. Confer de hac materia Jonston. taumatograph. class. 3. C. 1. Fromond. lib. 5. meteorolog. C. 6. Scotus physic. curios. lib. 2. Ephemerid. Germ. D. I. An. IV. & D. II. An. II. III. Rusticus quidam calcem vivam telam surripiens, cum domum properaret, nimis festinans currum evertit, ita ut in aquam caderet, hinc subito calcis vivæ ebullitione & impetuosa effervescencia orta, stramen adjunctum flammam concepit, quæ asseres contiguos accendit curioso spectaculo, totusque conflagrasset currus, nisi ei succurrissent.

Principium Maji cum fulgure, tonitru ac imbribus frigidum, usque ad 17. ventosum ac nubilosum, vigesima pluvix copiosæ, vigesima quarta calor ingens, subsequente fulgure & tonitru horribili, cum imbre frigido ac turbine boreali, vigesima sexta imber, reliquum nubilum. Bruchi & volucres numerosæ (de quibus plura hoc loco addere libet) teneros pampinos & uvas præroserunt immenso damno:

damno: infesta hæc & damnifica animalcula, vites consumere nata in lingua sancta appellantur פל' a radice פל' lingere, lambere (vid. Joel. c. i. v. 4.) quod lambendo quasi virulentia sua uvas inficiant, easque absumant, græce vocantur ἵπες & epides ab ἵπτην lædere, nocere, quod vites lummopere ab iis lædantur. Plinio L. 18. c. 18. dicuntur convolvuli, & volvoces, Columellæ volucræ, Tullio butyri, Plauto involvuli (in Cistell. Act. 4. sc. 2. v. 63.) quod in pampini foliis, ovula ponentes se involvant & implicent, illaque proboscide sua virulenta quasi conglutinent. Ipso corpore caruleo, pedibus obscure latefcentibus, nascitur ex ovibz bombicum ovibz similibus magnitudine, colore rubicundis, hic cum parere vult, multa cumulat, volvitque folia & in his sua ova reponit; Germani antiphrastice vocant *Weinzedel* vel *Weinzerl* quod minime vineas orneant & excolant, sed potius deturpent, & ad incitas redigant summitates palmitum, uvarumque gemmas depascendo. Oriuntur ut plurimum spirante austro, flante vero borea pereunt. Confer Samuel. Bocharti hierozoic. p. II. L. IV. C. IV. Ulysses Aldrovand. L. IV. de insect. c. 1. iconismum tamen ipidis minus accuratum exhibet. C. V. Italici rusticis est tagliadizzo, Ringavis *Rebstichel*, Hungaris Vinzellir, proprium illarum est in vitibus versari, easque ut & cornua arrodere. Qui serpentis genus esse putant, ab Hermolao redarguuntur, vide Jonston. L. 3. H. N. p. 86. seq. quid quod ex vitis pampinis enascantur vermiculi, qui pubescentes uvas prærodunt, vid. Columella de arboribus c. 15. Theoph. Eresio L. 3. de caus. plant. C. 27. ipes vitarius bestia nominatur damnifica, quæ in pampini folio intorta implicet. Tremellius cum nonnullis vocat melolontham, est autem melolontha scarabæi genus, quod alio nomine teste Hesychio χρυσόκάνθαρος h. e. aureus vocatur, de quo Gesnerus ait: *μυλολόγη* est galleruca insectum pennatum, scarabæo simile χρυσόκάνθαρος dictum; a quibusdam vero ea animalcula hac voce designari existimantur, quæ Galli Hanetons nominant (de quo vide Dictionar. Richelet) ea autem ab Anglis appellantur Dors. videatur Liveus T. III. Critic. Sac. p. 946. Quomodo differant ipes, ikes, thripes, vide apud Aldovrand. l. c. & Bochartum c. 17. ubi bene monet in Galeni verbis perperam legi σκίπες pro ἵπτες cum dicit: ἀμπελιτίδα γὰρ perdere τὴν ἡμνομένην ἀπ' αὐτῆς σκώληκας, & σκίπας ὀνομάζουσιν, ubi etiam notandum, quod ipes certam speciem locustorum in vitibus generari idem asserat, cui adstriplatur Theophrastus l. c. de Caus. plant. c. 27. causam hanc subnectit, utpote cum vites humescant, atque aer foetificet, tum ipes quoque materiem sibi congenerem statim erodunt, addens: Vitis hoc potissimum evenit, quia natura præhumidæ sunt, & humor earum insipidus sit atque aquosus; humor enim qui talis est, facillime affici potest, nonnunquam ipes omnino nequeunt generari, scilicet loco placidi spiritus, neque humido, neque succoso. Non solum autem illo anno, quo vites infestat & veneno quasi inficit, colluvies hæc exitiosa existit, sed etiam futuris, hinc inter sæculi incommoda & res orbi noxias numerantur ab Arnobio L. 1. adversus gentes, quibus negotia incurfantur humana, aspectu quidem sunt pulchra, coloribus rutilantia diversis, ast summe damnifica & maligna, vid. Salmasius in exercit. Plinianis ad Solin. p. 272. Jo. Frischmuth dissert. 1. de hirco emissario, c. 1. §. 5. D. Dan. Henrici dissert. V. de relig. Zwingl. p. ult. Dan. Guil. Mollerus in meditatione de quibusdam insectis Hungaricis, Francof. 1673. in 12. Bern. Saccus in hist. Ticin. L. 4. inquit: Dirum hoc animal frequentissimum esse prope Alagniam in Lomellino agro urbem, ubi vitis folia depascunt, quibus ablatis arefcunt exiles & immaturi racemi sine umbra relictæ, ab uvarum vero cupidis sturnis postmodum castigari, vide Eph. Nat. Cur. Decad. II. A. VI. p. 202. seq. Cornar. in Theolog. Vir. L. 1. c. 17. p. 205. D. Phil. Jac. Sachs. in ampelograph. L. 1. c. 6. p. 47. Mouseti theat. insect. L. 1. c. 19. p. 142. seq. in primis D. Joh. Theod. Mæren. Observ. in Decad. II. Ephem. N. C. A. V. p. 220. passim per vinea volitat animalculum magnitudine pisci, scarabæi parvi figuram corporis referens, variegati plurimum coloris &c. Græci duas res æqualiter malas exprimere volentes, dicere solebant: κακὰ μὲν θρίπες, κακὰ δὲ ἵπες, mala quidem thripes, mala rursus ipes; thripes culicibus similes, sunt teredines si ve cossi arborum fructus, ipes vero uvarum germina prærodentes, de quibus Prudentius in Hamartigen. v. 266. seq. canit.

Quamvis maceries florentes ambiat hortos

Sepibus, & densis vallentur vitea rura.

Aut populator edet gemmantia germina bruchus,

Aut avibus discerpta feris lacerabitur uva.

Majores nostri vix observarunt, quod horrenda istorum depopulationum animalculorum rabies tot annos in tanta copia duraverit, subque nive & glacie illæsa tam in limosis quam saxosis locis, in primis intra cortices arborum permanferit. De hujus insecti exstirpatione video sollicitos antiquos pariter & recentiores operosa subministrantes remedia: quidam vinea sulphure lierbisque graveolentibus suffiebant: alii vites illiniebant terra ampelotide, ut docet Galenus L. 9. simpl. Medic. quam pharmacitin vocat Dioscorides L. 5. eo quod vitium morbo medeatur. Laboriosius exstirpant perniciem hanc Ringavi & Sempronienfes, assignatis enim temporibus quisque patrumfamilias mittit suos homines, qui e vitibus colligant ipsum animal, & convoluta folia ovibz foeta, urceoque aqua semipieno injiciant, ut vesperi in unum cumulum ante Prætoris vel heri ædes, aut in foro coarcentur, & superstructo igne comburantur. Vide D. Mæren. l. c. Petr. Andr. Matthiol. L. 3. Epist. Medic. p. 141. Hohbergii Georgica Curios. P. 1. p. 341. & 481. D. Samuel Ledelii relationem in Ephem. Dec. III. A. Ult. p. 386. In libris Geoponicon (qui Imperatori Constantino Porphyrogenetæ adscribuntur) tria grana sinapis juxta vitem implantanda commendantur, verba L. 13. sic sonant: αἰ το σέλεχος τῆς ἀμπελὸς παρὰ τὴν ρίζαν τρεῖς κόκκους σινάπεως ὡς σὺν φυτὸν ὁμοῦ, γὰρ ταῦτα τῇ ὁσμῇ πὺν βρῶχον ἀναέρει: cum vero in nostris regionibus semen sinapis nimis tarde procreseat, vix finem suum paterfamilias obtinebit exoptatum. Alii vites aqua, in qua ipides enecati sunt, vel cultros, quibus palmites amputantur, illiniunt, ita Plinius Hist. Nat. L. 17. C. ult. ne convolvulus fiat in vinea, amurcæ congios duos decoctos in crassitudinem mellis, rursusque cum bituminis tertia parte, & sulphuris quarta sub dio coqui, usque quo exardescat sub tecto, hoc vites circa capita & sub brachiis ungi, ita non fore convolvulum: quidam contenti sunt fumo hujus mixturæ suffire vineas secundo flatu continuo triduo: plerique non minus auxilii & alimenti arbitrantur in urina, quam Cato de re Rustica c. 95. in

Sydenham Opera Medica.

amurca, addita modo aquæ pari portione, quoniam per se noceat: alii falces cum sint exacutæ, fibrina pelle detergant, atque ita putant, aut sanguine urfino liniri volunt post putationem eadem; ex aliis authoribus Aldrovandus l. c. p. 191. sequentia contra cantharides (forsan & ipides) remedia tradit. Baptista pius in suis ad Plauti comædias contra animalcula, quæ vitibus nocent, accipit cantharides, quas in rosis invenire consuevimus, si oleo immergantur, ne in tabem resolvantur: alii non observantes, quo loco, aut qua in herba nascantur, ipsas qualescunque sunt, cantharides in oleo coquunt, ex eoque cotem, in qua falx exacui debet, obducunt; idem præsidium præstabit falx illita cum hircino adipe, aut ranarum sanguine, aut coticulæ cinere, vel oleo illita, qua falcem exacnes. Gaudentius Merula, cantharides viribus noxias, stercoris bubuli, cui aliquantulum galbani commixtum sit, suffitu procul abigit, cum spirant antræ. Fabulosum remedium narrat Claudius Alianus, mulierem scilicet mensibus laborantem erucis & scarabæis perniciem asserre. Ethnici pro pœna a Diis immissa, insecta agnoscentes, idolis suis sacrificabant, certaque instituebant festa, de quibus videatur Cælius Rhodiginus Lect. antiqu. L. 4. c. 15. hinc & idolum Ekronis vocatur עֶקְרוֹן Deus muscarum, vid. Bochart. l. c. P. II. L. 4. c. 9. & p. 1. c. 5. & Hercules appellatur ἱποκτόνος ipidum occisor. Confer Alex. ab Alexand. Genial. Dier. L. 2. c. 14. Cæli Rhodig. lect. antiqu. L. 6. c. 7. Bochart. P. II. c. 17. 27. Aldrovand. l. c. Optimum, quamvis laboriosum remedium est, illos mature & indefesse e vitibus colligere, ac una cum ovulis comburere.

Hoc mense in Austria in primis Viennæ febres malignæ cum atris exanthematibus & bubonibus (quos benignos appellabant) magna cum hominum mortalitate grassabantur: quidam exsectum bubonem cum carne bubula cani ad devorandum absque ejus noxa dabant, & ex hoc pestem negabant, cum tamen longe alia sit ratio carbunculi & bubonis in corpore vivo, quam ex cadavere secti, & juxta Celsum nihil sit ineptius, quam quale quidque in homine vivo est, tale existimare esse moriente vel mortuo, & vice versa; accedit quod ex bubonibus pestilentialibus & carbunculis nonnulli per chimiam spiritum antipestilentialem & volatile elicere conentur, qua de re plura dabo in schediasmate de differentia pestis humanæ & brutorum; licet itaque morbum tantum contagiosum vocaverint, pestemque nomine contagii velaverint, vera tamen febris erat pestilentialis, quod & internecio tot hominum, præcipue vero decem Medicorum comprobatur, vide Francisci Xaverii Benfæ historiam relationem pestis Austriæ & conterminas partes instantis. Viennæ A. 1717. 8.

Junii principium pluviosum, ventosum atque frigidum cum exundationibus torrentum & fluviorum damnosis, octava æstus usque ad duodecimum, 13a pluvie subsequente frigore, medium serenum & calidum cum intermixtis imbris ac procellis: circa finem pluvie furente Euro, Pestis in Austria incrementum sumpsit ut & Posonii in Hungaria.

Julius usque ad 5um serenus, ventosus & frigidus, sexta calor mediocris, septima pluvie copiosæ cum frigore extraordinario, usque ad finem mensis (paucis exceptis diebus) flante aquilone durantes. Pestis in Austria, & aliquibus partibus inferioris Hungariæ, ut & Posonii valde sævit; meteora quædam lucida sub forma draconis apparebant, ab exhalationibus sulphureo ois in sublime evectis, per continuum attritum incalcescentibus, tandem accensis, ac in tonitrua & fulmina fatiscientibus, subsequenter inundationibus & fragminibus nubium.

Principium Augusti pluviosum & frigidum, a quarta usque ad 9nam calor ingens, undecima tonitrua horrenda cum fulminibus ac pluvia frigida, 16ta nubilum infrequentibus pluviis ingentibus, rubigine & uredine vitibus & frugibus summe perniciosæ, circa finem nebulae densissimæ quasi hybernæ in altum evectæ, & in pluvias frigidas resolutæ cum tonitru & fulmine: incus fabrilis ab ictu fulminis urentis & concutientis, partim sulcus, partim fissus observabatur, globum quoque igneum seu glomerem flammeum in terram delapsum conspexerunt maximo cum fragore dissilientem, tetræque odorem & fumum spargentem, incrudescente magis magisque tempestate, iteratisque ictibus fulminum horrendis. Pestis tam in Austria quam Hungaria continuavit sævire; grassabantur etiam variolæ malignæ confluentes cum petechiis intermixtis, illisque, qui non statim in principio remedia adhibuerunt, fatales, jamjam suppuratæ, rursus materia ichorosa repletæ conspiciebantur, & secunda vice ad suppurationem pervenere, inque interstitiis suppuratorum novæ subinde oriebantur variolæ, in defunctis per nares, aures, & oculos sanguis prorupit copiosus: nonnulli a barbitonsoribus imperitis male tractati, tubercula circa artuum juncturas; & his retropulsis per topica, totalem reportarunt contracturam, alii cæcitatem, strumososque colli tumores quibus evanescentibus corripiebantur vomitu cruento lethali.

Septembris initium pluvium & caliginosum, octava eurus effluvia humida dissipando serenitatem conciliavit, medium itidem pluvium, circa finem serenum & frigidum. Sempronii quoque morbi contagiosi cœperunt grassari cum vomitu, & ardore in abdomine tertia & quinta lethales, petechiæ item atræ cum dysenteria in scapulis, ac bubonibus sub axillis & in inguine, septima & nona funestæ, nec vomitoria, nec purgantia, nec venæ sectio in principio conducebant, nec oia aut acidia, sed bezoardica balsamica cum volatilibus refracta dosi mixta, in primis tinctura nostra antipestilentialis cum spiritu CC. maritata, quæ & in peste Ratisponæ salutari effectu se probavit. Lanio quidam nomine Lidel dysenteria exstinctus, herniam habuit raram, non quippe in scroto, sed intra cutem & musculos ad femur usque intestinum ileon prolapsum observabatur, hanc herniam a casu cum equo ante decennium reportabat. In vilitatione Medicus Pestilentarius tumorem hunc herniosum (qualem antea nunquam viderat) pro bubone pestilentiali fat crasse reputabat, domumque ejus ceu infestam, qualis tamen minime erat, obsignabant. Similem herniam extraordinariam ex prolapsu intestino ad femur observavit Barbette c. 7. Chirurg. & B. D. Petermannus in viro septuagenario, ultra triginta annos eadem laborante, & ego in Italia bis talem conspexi: Stalpart vander Wiel quoque in Observ. medico chirurg. rarior. Observ. 54. Cent. I. similem errorem Medici cujusdam & Chirurgi rudis detegit, bubonoclem in juvene quodam pro bubone pestilentiali cum læsione ipsius intestini aperientium, vide Rhod. Observ. M. Cent. 2. c. 72. Høchstetter.

Dec. 10. variolæ confluentes etiam increbuerunt multis fatales, apoplexiæ quoque frequentes erant, qui morbi omnes pluviosæ hujus anni Constitutioni adscribendi juxta Hipp. Aph. XI. sect. III. *si ver pluviosum & australe fuerit, necesse est febres acutas, & dysenterias fieri*, & aph. 16. morbi in pluviosis constitutionibus plerumque fiunt febres, putredines, siderationes &c.

Principium Octobris serenum & temperatum, quarta æther nimbis cinctus usque ad septimum cum frigore, 14ta pluvix cum insolitis nivibus flante vulturno, cæteris ferme omnibus, vel caliginosis, vel pluviosis existentibus diebus. Febres increbuerunt tertianæ duplices gravidis exitiosæ cum vomitu, cardialgia & diarrhœa febres continuas mentientes, in quibusdam cum deliriis, invitaque sæcum excretionibus, octo & novem accessionibus periodum suum absolventes, febris quoque pestilentialis continuabat, sed sporadice tantum cum pulsu tardo & inæquali, frequenter bubonibus, raro carbunculis erumpentibus. Chirurgus expositus egregio bubone (ita enim Pestilentialius ille Medicus appellabat) correptus, quinta obiit, adhibita damnosa & inconsiderata venæ sectione, vix non omnibus illo tempore funesta, prouti & in peste comitatus Castri ferrei agrum depulante, Anno MDCCX. observavi, de qua peculiarem dissertationem editurus sum. Cæterum erysipelas, atheromata, steatomata, alique affectus cutanei etiam minimi in quibusdam subjectis pro signis pestilentialibus ex ignorantia vincibili & crassa reputabantur.

Prima Novembris imber atrox, sed calidus, tonitrua insolita & terribilia cum fulminibus, aliquibus in locis urentibus, & grandine, a tertia usque ad decimam pluvix, undecima nives secundæ cum frigore extraordinario furente aquilone quatuor pedes altæ; circa finem frigus intensum cum sævis turbinibus. Febres acutæ cum petechiis & bubonibus subreptitæ quasi hinc inde homines invadebant, in autumno enim morbi acutissimi & omnino mortiferi juxta estatum Hippocratis aph. IX. sect. III.

Circa Neostadium terræ dehiscente agri portio viginti aliquos organum una cum arboribus (absque sensibili terræ motu) hiatu vasto sperto sine chasmate periit, relicto post se lacu. *Hoc anno annonæ abertas erat & vilitas, vini autem & fructuum maxima sterilitas & caritas, etiam racematione* (ob vindemiam imprudenter a nonnullis ante nives neglectam) *in maximis nivibus instituta, vinum erat tenue, insipidum ac vappescens.*

Decembris principium horridum cum procellis, nivibus & gelu immani usque ad duodecimam, reliquum temperatum, variabile & pluvium. Bubones adhuc vagabantur, sed benigniores, rigore forte temporis malo hoc mitigato: febres vero quartanæ mirum quantum invaluerunt, rebelles admodum & contumaces.

Constitutio Epidemica Augustana An. 1711. & sequentium.

Dn. D. LUCÆ SCHROECKII.

Aeris status, quo Annus prægressus fuit finitus, in principio quoque Anni 1711. persistit, humidus nempe ac multo frigore molestus, variorumque ventorum agitationi expositus, usque dum d. 7. eurus serenitatem, & post ostiduum zephyrus pluvias, tandemque nives frequentiores adduceret; circa finem autem mensis hujus primi eurus denuo prævalens, cum serenitate frigus diuturnum & intensum excitaret, ut mei thermometri liquor ad gradum 8. (quod etiam d. 13. Februarii contigit) descenderet, præcipue postquam zephyrus d. 4. Febr. & caurus post quatrimum, nec non eurus quintiduo abhinc nivem admodum copiosam sparserant; quæ sub africo, comite pluvia & frigoris remissione, d. 18. Febr. liquari cœpit; & quamvis nova subinde nix, occidentali vento (sæpe ad meridionalem, quandoque etiam septentrionalem plagam inclinante, rarius vero ab aliis ventis interpolato) spirante, usque ad d. 10. Martii caderet, eadem tamen pluvii supervenientibus brevi denuo resolvebatur. Interea, præter febres quotidie vel alternis diebus recurrentes, licet rariores, in vere tamen crebriores, & in principio sæpe continuarum speciem præ se ferentes, primum teneriori ætati, in progressu autem adultis magis infestas, ut & catarrhosam ægritudinem multitudinem, Variolæ benignæ in primis, usque in Aprilem frequentes, ast circa Solis in signum Cancri ingressum, una cum febribus evanescentes, continuant, nec non pleuritidis nota, atque coxendiculi dolor (diaphoreticis, tinctura præsertim bezoardica, juxta cum eccoproticis, utrique malo opem ferentibus) multos lecto affixerunt.

Ver cum ventorum varietate, zephyro tamen prævalente, aura nebulosa, humida & temperata (catarrhosis ideo morbis, præsertim odontalgis, apoplexiis etiam lethaliibus opportuna) primo erat præditum, quæ circa Aprilis medium in serenitatem mutabatur. Majus frigidiusculum potissimum euro spirante comparuit, in medio tamen caloris sat acris per decendium particeps, paucosque dies serenos per totum reliquum suum decursum numerans, crebrioribus autem tempestatibus grandinosis, e longinquo tamen nobis tantum se ostendentibus, vicinis autem admodum damnosus. Cum Junio eurus, interdum ab aliis diversis ventis interceptus, serenitatem caloresque magnos proferebat, usque dum post solstitium æstivum zephyrus dominium obtinebat, & mutabilem aeris statum, sæpius vero pluviosum producebat, quæ humida aeris intemperies postea etiam continuabat, diæque caniculares magis temperatos quam fervidos efficiebat. Et licet postmodum cum Sol in Libra versaretur, eurus serenitatem quandoque redderet, antequam tamen signo hoc excedebat, zephyrus, aliquoties valde impetuofus, pluviiis frigidis denuo molestus extitit, quin & pluviosa illa intemperies usque ad finem Anni persistit, nisi quod in Decembri crebræ nebulæ, & serenitates quandoque, euro præcipue, austro & africo intervenientibus, comparerent. Cæterum præter catarrhos nihil epidemiarum malorum prioribus istis temporibus observatur; post Canis tamen occasum variolæ denuo multos infantes invaserunt, confluentium jam specie gravius aliquos affligentes & negligentius habitæ non paucis lethiferæ, paulo post tamen, usque ad anni exitum, & in Januarium usque Anni sequentis, ulteriusque, sed rariores discretæ mitioresque parentes. Diarrhœæ circa finem Novembris, & per Decembrem in multis, prævio ut plurimum vomitu, torminibusque stipatæ, prompte tamen stomachum roborantibus cedentes, notatæ fuerunt.

Circa finem æstatis, & per autumnum lues illa, quæ bubulo ge-

neri per Germaniam Italiamque tam infesta fuit, postquam ex Hungaria versus Danubium sensim progressa, ubique lactuosa sui vestigia reliquit, nostra quoque confinia attigit, ac insignem stragem, integra etiam numerosa bovilia evacuantem apud nos, ac plurimis vicinis in locis edidit; quam non aeris ex vitio, sed contagio per boves ex regno illo adductos exortam fuisse; vel inde satis nobis notuit, quod illa primum loca, ubi pascuis frui illis advenis contigit, invaserit, armentis vero omnino pepercerit, ad quæ illi, vel alii ab his infecti haud pervenerunt, atque ubi consortium illorum, ad quod contagium jam penetraverat, evitatum fuerat. Miasma vero hoc per salivam animalium infectorum, quo gramina inter pascendum conspurcarunt, se primo, postea etiam per exhalantes vitiosas a corruptis humoribus visceribusque particulas ulterius, his in terris, propagasse, atque caustica acredine infestum, fauces, ventriculos ac intestina hostiliter invasisse, inque spasmodicos motus non tantum nervosas partes irritasse, sicque ob contractos exin vatorum sanguiferorum tubulos inflammationem excitasse, sed ipsam etiam eorum substantiam ad putrilaginem disposuisse, credibile videtur: Id quod lingua in quibusdam inflammata, & vesiculis rubris referta, ventriculi, præsertim omasus, & intestina non minus inflammata, & non tantum sanguineæ, sed foetidæ etiam & purulentæ excretiones, ut dysenterix malignæ speciem ut plurimum præ se tulerit, nec non intestina hepatis contigua bile suffusa testabantur. Unde etiam, quæ in prima invasione notata fuerunt symptomata potiora, appetitus nenipe dejectus, difficilis respiratio, calorque præternaturalis ortum habuisse videntur. Cæterum caro lue hac demortuorum boum quamvis pluribus, egenis præcipue, in cibum primo venerit, nec sinistri quid ipsis inde accidisse rescitum fuerit, tutius tamen esse iisdem abstinere, tum ratio suadet, qua ex viscerum observata labe prompte etiam eandem carnibus communicari, quia & nauseam, facile exin oriundam, multum nocere posse evincitur, tum exempla confirmant, quibus noxium quandoque extitisse carniū contagiosa labe infectorum animalium esum constat. Vid. præter alios Nob. D. Rosini Lentilli Miscell. med. pract. part. 2. pag. 519. Liceat etiam memorare exemplum, ab Exc. Dn. D. Joanne Meyero, Arch. Elect. Palat. & Physico Neuburgensi, Anno 1712. d. 16. Julii ad me perscriptum, duobus nempe rusticis, cum bovem ægotantem mactassent, & quia lienem pulmonesque male constitutos invenerunt, sepeliissent, carbunculos in brachiis fuisse exortos, cum febre acuta, vomitu & diarrhœa; duos autem canes, qui carnes istas degustaverant, eodem die mortuos fuisse. Ex Hungaria quidem Venetias advektorū boum dysenteria laborantium carnes innoxias quondam Medici aliqui Patavini insignes pronunciarunt, ast tutius esse talibus abstinere, celeberrimi olim Jenenses Medici, Guern. Rolincius in Ord. & meth. spec. comm. lib. 2. sect. 3. cap. 60. & Jo. Theodor. Schenckius hist. gener. humor. cap. 2. judicant. Prout etiam Collegium Medicum Augustanum circa casum hunc ab Illustr. Senatu requisitum, hujusmodi carniū ulteriorem venditionem, ad noxas inde emergendas præcavendas, dissuadere tutius duxit, atque per Senatus Decretum impetravit.

Circa principium Anni 1712. zephyrus, interdum ad unum alterumve latus declinans, cum frigore nivem, sed rariorem sparserat; & licet sæpius aer serenus postea redderetur, semper tamen nebulosus una fuerat: frigus quidem in progressu remissius, ast brevi post, flante euro vel austro, denuo intensius factum est: usque dum d. 3. febr. zephyro redeunte, pluviiis, quæ per decendium durarunt, obortis cessarunt. Varius abhinc aeris status, quoad temperiem tolerabile frigus, crebriores autem nives attulit, usque dum circa æquinoctium verum eurus temperatiorem aerem redderet, mox vero diversis sub ventis humida & pluviosa constitutio usque ad Solis in signum Tauri ingressum valde molesta extitit, quam euro prædominante, calida & sicca excepit, sæpius tamen postea variando: Sole vero Leonis signum occupante, occidentales venti pluvias multiplicarunt, & d. 6. Augusti cum serenitate calores magni oborti fuerunt; qui etiam, licet circa finem mensis hujus, delapsis pluviiis, remiserint, mox tamen denuo comparuerunt. Cæterum hucusque præter consuetos hyemales catarrhosos insultus, in mensibus vernalibus tusses ferinæ puerilem ætatem admodum affligerunt, eccoproticis repetitis, absorbentibusque, nervinis, ac demulcentibus ægre profigatæ febres etiam quotidianæ non valde contumaces, purgantibusque præmissis, per antimoniatas calces, arcenum duplicatum, & corticem Peruvianum &c. devictæ, per æstatem plures occurrerunt; in Augusto autem non paucæ diarrhœæ, in nonnullis quoque dysenterix, ut & cholæræ, sed benignæ, omnes facile, post rhabarbari nonnihil tosti usum, in primis pulveribus dictis præcipitantibus, coralliis, unicorū fossili, quandoque etiam tormentilla, succo catechu &c. curatæ. Hæc ægritudines in progressu mensis febris catarrhalis exceperat, sine sexus ætarisve discrimine, magis tamen adultos quam pueros, cum febrili inhorrescentia, subsequente calore, cum cephalalgia, & hinc productis pervigiliis, quas interdum deliria nocturna comitabantur, oculorum item, dorsi & artuum dolore, ac tussi ut plurimum invadens, & instar ephemeræ, altero, vel tertio, quartove die, sponte, aut impetus ubi vehementior erat, post moderatum sudorem, modo per volatilia, modo fixa medicamenta, pro subjectorum diversitate, excitatum, recedens; nisi quod tussis quandoque pertinacius insisteret. Qui morbus uti multis, remotis etiam in locis, ita nostra quoque in urbe plurimos invaserat, ut vix domus esset, ubi eo laborantes non deprehendebantur; atque nobis ex prægressa humida aeris intemperie, similes in corpore nostro particulas augente, ac magnis dein ejusdem caloribus, lympham in corpore fundentibus & agitantibus, subito tamen tempestatis frigidæ aliquoties obortæ interventu, quæ transpirationem ob poros inde occlusos sufflamina-bat, condensatam generata mihi videbatur. Nec aliam causam pleuritides hanc in mense Octobri excipientes, non admodum refractariæ habebant, atque ideo sudoriferis moderatis præcipue, ac satis prompte cedebant. Aliorum morborum minime ferax erat autumnus, qui satis temperatus & serenus in principio, in progressu autem, præsertim zephyro ut plurimum, & quidem nonnunquam multa cum vehementia spirante, humidus ac pariter temperatus se habuit; sicque continuavit hæc temperies: ante solstitium tamen quatrimum frigus, & talem etiam in fine Anni, euro flante, experti fuimus.

Non

Non prætereunda hic est lues admodum gravis & funesta, quæ in vere equos potissimum extra urbem & in vicinia, rarissimos in urbe invasit, multosque trucidavit, postea etiam bobus, feris, quin & porcis, asneribus atque gallopavonibus, quibusdam in locis, non pepercit, & adultum usque in Julium tragœdiam suam ludere perrexit. Oriebantur fere semper in pectore, aut etiam in inguine, aliisque locis tumores duri, qui paulo post in amplius spatium se diffundebant, & intra breve temporis spatium interimebant. Hos ab iectu crabronum, qui copia & magnitudine insolita præditi observabantur, ortum habuisse mihi credibile videbatur. Uti vero cadavera boum elapso anno demortuorum, nec ubique alte satis in terram defossorum & putrescentium insectis hisce pabulum gratum exhibuisse, (in cavernis enim & sub terra nidos ab eis fieri, carnibusque vesci, Aristoteles lib. 5. histor. animal. cap. 23. Plinius lib. 11. hist. nat. cap. 21. aliique testantur) sicque multiplicationi & augmento eorum, humorisque venenati, quem glandula in imo abdominis, cui aculeus nigricans & cavus, juxta nobil. D. Joannis Muralti relationem in Eph. nostr. Dec. 2. Ann. 1. obs. 56. implantatus est, majori acedini velificasse, non improbabile est: ita venenata etiam hæ atomi in humoribus animalium ab eis ictorum sese multiplicare, atque dein alia quoque animalia sic inficere potuerunt: quale exemplum in prædio vicino Illustr. cujusdam Baronis equum hac lue defunctum, & in fovea non alte satis effossa, terra obrutum exhibuisse scio, cujus ideo pes unus extra terram prominens a servo cum securi amputaretur, profliens exin humor in ejus oculum, mox tumorem & inflammationem excitaverat, alterum etiam oculum, & successive totum caput occupantem, atque cum ope medica destitueretur, mortem brevi accelerantem. Salis ex aceto potum adversus crabronum virus præfatus Plinius lib. 32. cap. 9. & Casp. Schwenckfeldius Theriotr. Siles. pag. 526. remedium esse tradunt, eque vestigio fluxisse vehementius, suctuque infixos aculeos, vel potius humorem virulentum revulsisse: Inter alia sane remedia, theriacam, allium, bolum vulgarem, nitrum &c. cum aceto propinata, quibusdam (uti etiam in superius memorata boum lue) profuisse, ab aliis non infelicitè tumores scarificatos, aut etiam ex incisa cute fuisse extractos, relatum fuit.

Anni 1713. principium, sub variis ventis, potissimum occidentalibus, frigore, quod cum primis in medio mensis Januarii intensum valde fuerat, & serenitate, usque dum sol Piscium signo appropinquaret, gaudebat. Ubi post plurimas pluvias cælum nebulosum, versus finem autem Februarii serenum, cæterum valde temperatum reddebatur; quæ temperies, sub mutabili cæli facie etiam usque ad æquinoctium vernum & ulterius continuabat. Reliquis vernalis & æstivus decursus quandoque temperatus, ut plurimum autem pluviosus, & sæpe una frigidiusculus extitit. Mensem vero Septembrem, in quo eurus spirabat, serenitas commendabat; in reliquis autem tribus mensibus crebræ nebulæ pluvizque (quibus in Octobri nives sæpe intermiscebantur) aderant. Humida hæc præpollens aeris constitutio, zephyro majori ex parte comite, multorum superveniendorum morborum timorem nonnullis pariebat, nihil tamen singulare apud nos inde evenit. Attamen præter varias catarrhofas molestias, variolæ discretæ, rarius confluentes, nec mali moris, per totum Annum, frequentiores tamen post solstitium æstivum, & per reliquum Anni; præterea etiam febres tertianæ ac quotidianæ, ut & quandoque icteri, facile omnes sanationem admittentes, sparsim, in Majo plures infantes morbillis benignis laborarunt; in Decembri non pauci febre petechiali, cujus in pagis vicinis multum grassantis contagium in urbem delatum fuerat, interierunt, brevi tamen iterum per DEI gratiam malum cessare contigit.

Constitutio Epidemica Augustana Anni 1715.

Dn. D. LUCÆ SCHROECKII.

Hymale frigus uti in fine Anni præteriti, ita jam quoque tolerabile extitit, & raro, nec diu intensius redditum fuit; interea mutabilem aeris, in primis autem nebulosam & humidam intemperiem experti fuimus; & quamvis ventorum esset varia mutatio, zephyrus tamen ut plurimum prævaluit; qui noctu d. 8. Februarii vehemens redditus, postea d. 11. & 12. invaluit, imo d. 2. & 4. Martii, omnium maxime vero d. 3. ejusdem, in magnum furorem erupit, & non ea quidem damnorum multitudine, qua in Anglia, Hollandia &c. infamis, non tamen plane infons delavit, cælo interim nebuloso, cum intervenientibus, parciore quidem, nivibus, comparente; temperie autem paulo prius nominata continuante; usque dum d. 5. Aprilis eurus aerem serenaret & excalesceret; redeunte tamen circa Solis in signum Tauri ingressum sub diversa ventorum facie, humida ob pluvias frequentiores intemperie. Mense Majo vernalis amœnitas usque in adultum Junium comparuit; & licet Sol quandoque acius ureret, pluviz tamen intervenientes, & tempestates, attamen nobis non admodum graves aut damnosæ, calores temperabant. Sol postquam Cancri in signum pervenit, euro flante, æstivos calores experti fuimus; quos vero, zephyro succedente, Mense Julio temperatior aura excepit, pluvias subinde æstum temperantibus; talique statu usque ad d. 15. Decembris ut plurimum permanente: ubi hymale frigus, aere sereno per sextiduum, postea fere semper nebuloso usque ad finem anni durante, admodum penetrans eurus excitavit. Cæterum humida hæc aeris constitutio catarrhofas infirmitates, leviores tamen, oculis, dentibus, faucibus & pectori creavit, atque in autumnio & hyemis principio, multis infantibus tussi & catarrho suffocativo, præsertim post morbillos, exitialis fuit: postquam enim variolæ præteritis duobus annis sequentes fuerunt, hoc anno quoque, & quidem mensibus æstivis vehementiores, confluentium naturam in multis induentes, in pueris continuarunt, & præter eas morbilli benigniores in vere supervenerunt, atque post inducias æstivas, in mense Novembri atque Decembri gravius affligentes recurrerunt, pluribusque, qui aut gravius, corpore in primis vitioso sero laborante, iis infestabantur, aut cura negligentiore tractabantur, mortem accelerarunt: quod aliis etiam infantibus multis ex catarrho suffocativo, aut insultibus epilepticis contigit.

Sydenham Opera Medica.

Anni 1716.

Frigus anno superiore obortum, Anno 1716. quoque continuavit, & in primis die 17. 18. & 19. Januarii adeo invaluit, ut frigori Anni 1709. ubi in Thermometro meo spiritus vini ad septimum usque gradum descenderat, æquale comparuerit, imo d. 18. illud dimidio gradu superaverit. Quæ austerior aura etiam usque in adultum Majum, rarius temperatiori interveniente, perseveravit; & licet alibi, etiam in vicinia nostra, nives crebriores & copiosæ admodum delapsæ fuerint, in urbe tamen nostra altitudinem alibi observatam non attigerunt. Cæterum multa ventorum mutatio, & rarior serenitas semper occurrit, præterquam quod in Aprilis eurus plures dies serenos efficeret. Unde vernalis amœnitas & rarior, & fera admodum obtigit, ut incrementum Floræ, Cereis, & Pomonæ multum retardaverit.

Nec æstas multo melius se habuit, crebris ventorum alternationibus, pluviasque obnoxia, exceptis diebus canicularibus, qui plures fereni, non tamen calore nimio infensi extiterunt.

Autumnus non minus, sub zephyri, præsertim post æquinoctium, & primis Decembris diebus admodum vehementis, prædominio, frigidus humidusque, & in Novembri crebris nebulis infestus, atque circa finem denuo pluviosus extitit.

Post solstitium quoque hyemale crebræ rursus nebulæ comparuerunt.

Ex humida autem hac aeris constitutione catarrhofas infirmitates fere nunquam non per totum annum fuerunt obortæ; & in primis circa Anni principium apoplexiæ adultis, ac tusses convulsivæ pariter ac humidæ puerili ætati, non sine multorum internecione infestæ: nec deerant pleuritides veræ, diaphoreticis tamen & pectoralibus non difficulter curabiles; in quinque primis mensibus febres insuper intermittentes, tertianæ & quartanæ, non paucis molestæ, sed facile, chinchinæ, observatis observandis, cedentes.

Nec variolæ prorsus cessarunt, sparsim subinde comparentes, in autumnio tamen plures invaserunt, & confluentium naturam in quibusdam induendo, malignitatis etiam notas exhibuerunt, ac ita aliquibus funestæ evaserunt.

Anni 1717.

Cum post Anni principium nix crebrior decidisset, cælumque serenum redditum esset, frigus sub euronoto obortum est, quod usque ad principium Februarii continuavit; ubi a zephyro, interdum & africo, nivis liquatio sensim successit; die autem 9. novum obortum frigus, euro præpollente, per undecim dies duravit, & diebus 18. 19. ac 20. adeo intensum fuit redditum, ut fere frigus Anni 1709. æquaverit, sed zephyro tum oborto mitius cælum evasit. Ubi etiam variolæ sensim disparuerunt, postquam in Anni principio, in pluribus confluentes, non sine malignitatis nota, infantibus, rarius adultis infestæ esse perrexerunt. Erant, in quibus pustulæ nigræ interspersæ notabantur, morte subsequente. Puerulo sexenni, sub temperato regimine, variolæ discretæ rite prodierunt; die vero morbi sexto passim pustulæ sanguine turgidæ sunt redditæ, cum nictu sanguinis, deliriis, magna inquietudine, & lethali die 8. morbi eventum. Erant, qui per totum morbi decursum de alteratrius pedis vel genu dolore, sine tumore & inflammatione conqueiebantur, cum variolarum exsiccatione iterum sponte cessante. Martius, Aprilis, & Majus varia constitutione, præsertim autem humida ac frigidiuscula præditi, adventum veris valde retardarunt, sed post solis in Gemellorum signum ingressum temperatius cælum, & sæpius valde calidum, intermissis tamen crebrioribus pluvias, ventis ut plurimum ab occidente vel septentrione spirantibus, factum est, & in primis sirius, sub euri prædominio, magnum æstum excitavit. Ubi, cum hætenus rariores ægrotassent, jam dysenteria multis, potissimum ex plebeja gente, & adulta ætate, cum majori malignitatis, quam caloris sensu, ex magna virium prostratione, contagii labe, breviorique morbi decursu, (infantibus nonnunquam intra triduum succubentibus) colligenda, usque ad æquinoctium autumnale infesta esse cepit; quæ postea ulterius progressa puerili in primis ætati multam stragem, non tantum ob teneram, corporis dispositionem, sed medicamentorum etiam difficiliorem, & incongruum usum, intulit. Causa potissima ab aeris varia intemperie, primo frigida & humida, postmodum calida, ibi transpirationem sufflaminante & collectioni serosarum fassarum particularum favente, hic easdem in orgasmum concitante, imputari potuit; præcipue cum cerevisiæ minus defæcatæ & aculentis frequentior potus accessisset. Ex medicamentis, quæ non tantum malignitati resistere, sed acres etiam humores edulcare fibras, leniter stringere, & dolores mitigare valent, sub varia forma, provide administratæ conduxerunt, qualia erant uniconu fossile, corallia rubra, bolus Armena, terra sigillata, smaragdus, hæmatites, tormentilla, succus catechu &c. cum & sine opiatorum moderato accessu; balsamum etiam Peruvianum cum vitellis ovorum subactum, in clysteribus aliquoties injectum, egregiam opem in non paucis tulisse observavi.

Autumnus, zephyro, cum aquilone, denuo prævalente, (& illo quidem, sæpe vehementer, præcipue autem a die 24. Decembris ubi vesperi impetuosissimus, sine tamen aliquo, per Dei gratiam, damno, secus ac alibi, in Hollandia, Hamburgo &c. tum temporis contigerat, per quadriduum furente) humidus admodum ob nebulas & pluvias, extitit; talisque aeris conditio ad finem usque anni, cujus ultima nox fulguribus illustrabatur, perduravit, nullis aliis morbis epidemice, paucissimis etiam sporadice se offerentibus, præter odontalgias & consuetas hoc tempore tusses & coryzas.

Constitutio Anni 1712. apud Labacenses in Carnioliæ

D. D. MARCO GERBEZIO,

Apud eosdem Physico, & Medico ord. medice considerata, & Augustam Vindelicorum die 28. Decembris 1712. communicata.

Frigori alias Hippocrates non videtur imputare singularem infalubritatem, dum 3. Aph. 17. adeo corpora firma, agilia, & bene colo-

colorata reddi afferit: quam id tamen insalubre esse soleat, saltem dum modum excedit, docuit nos præterquam hyems Anni 1709. si quæ alia nivosa, & frigida, quoque currentis Anni 1712. hyems ob non multo demissiores nives, & frequentes aquilonares ventos similiter ultra modum frigida. Sub ejus siquidem decursu plurimi a febribus catarrhalibus, tussibus, raucedinibus, pleuritidibus, phthisibus, cephalalgis, gravedinibus, hemiplegiis, cachexiis, hydropibus, & aliis a variis modis peccante lymphâ dependentibus indispositionibus, fuere apprehensi. Quamvis tamen forte per se non tam frigus fuerit causa tantarum indispositionum, quam prægressa elapsi Anni 1711. austrina, & pluviosa autumnii constitutio, quæ a præsentis anni perrigida hyeme excepta humiditates, elapso autumnio in corporibus aggregatas, occlusis cutis poris, & per id impedita insensibili transpiratione, in corporibus retinuit, coagulavit, stagnare, & extravasari fecit, præsertim dum subinde tamen etiam intercurrerint austrini flatus, qui eas rursus solverunt, & exundare fecerunt. Si vicissitudine quadam, dicit Valeriola lib. 2. cap. 4. locor. com. aquilonius flatus austrinum sequatur, fluxionum tum morbi sunt. Quemadmodum & nos in *Chronologie nostræ Med. An. 1. xx. & xxi.*

Sic Ego ipse mox sub anni ingressu cum pluribus aliis a febris catarrhali apprehensus eram, sed brevi liberatus introspectione manarum granarum in jure dissolutæ quantitate unc. trium, & sudatione ad tales pulveres específicos mane cum decocto herbæ theæ assumptos, ℥. spec. diamarg. frig. diatrag. frig. ℥ij. diaphor. ana ℥ss. succin. alb. præp. flor. Δ. ana gr. iij. m. f. pulv. in triplo. Aliis præterea subinde venæ sectione sanguinem imminuebam, & alia pectoralia propinabam, puta decoctum pectorale cum syrup. de alth. Fern. de farfara, aut similibus specificis dulcificatum. Item Trochisc. bechicos, ol. amygd. dulc. cum sacch. candido, vel jula-pio violato &c.

Certus puellus quinquennis non pridem pro capitis, & reliqui corporis scabie abigenda, nescio quo, perunctus, & præterea ab extra perfrigeratus in eam dyspnœam inciderat, ut suffocandus videretur. In subsidium vocatus fuam, ut eum syr. Mannati ℥j. & jalap. pulv. ℥j. expurgarent. Hinc in jure dissolutam spermat. ceti ℥j. propinarent. Nec non ad sudorem cogerent his pulvisculis. R. spec. diamarg. frig. ℥. diaphor. ana ℥ss. pulv. march. succin. alb. præp. ana gr. iij. flor. Δ. gr. j. sacch. perl. gr. iij. m. f. pulv. in triplo. Et sæpius cochleatim propinarent de tali mixtura appropriata. R. Extract. helen. fumar. ana ℥j. croci gr. v. subigantur in aq. asthmat. chæresol. ana ℥ss. syrup. de hyssopo ℥ss. m. f. potio. Atque, nisi malum remitteret, utrique brachio vesicatoria applicarent. Dictum factum, & puellus præter parentum expectationem convaleuit.

Hyemeni quidem cum majore amœnitate excipere velle videbatur ver, utpote sub cujus ingressu ex amœnis solis radiis adhuc residuæ nives successive optatissime dissolvebantur. Postquam autem in Aprilis progressu sæpius intercurrere incēpissent pluviae austrinæ, a 20. Aprilis usque ad 25. autem ex euro pristina hyemalis auræ asperitas, adeo desolati evadere incēperamus, ut adhuc vel tunc nobis non meliora de corporum valetudine, quam de futura satorum uberitate ominari tristes occēpissimus. Quando enim in nostris oris nives, & hyemale frigus eo usque, & ultra æquinoctium vernum protrahuntur, experientia annua edocti nunquam messem optimam, fructus arborum copiosos, & vindemias lætas nobis adpromittere audemus. Emori siquidem accidit vel in ipsa radice hyemalia fata, flores arborum fructiferarum emarcescere, & primos vitium pampinos a pruinis, & nocturnis auræ asperitatibus exitialiter aduri: quemadmodum id etiam, ut postea dicitur, hoc ipso anno evenit. Nec minorem stragem valetudo humana perpeffa est. Corpora siquidem hyemali asperitate enervata, & per tot intercurrentes auræ vicissitudines alterata, nec non per tot vernas pluvias nova humorum illuvie repleta, non poterant non solum ab adhuc hyemalibus indispositionibus opprimi, verum & vernis subjacere, potissimum eis, quæ a peccante lymphâ, quales sunt omnis generis vulgo defluxionibus imputari soliti affectus, produci solent. Non minus autem Majus erat inconstans, & inamœnus, quam Aprilis, utpote fere quotidie versus vespem pluviosus, quin immo subinde & tempestuosus, quemadmodum secunda Maji, qua excussus ex nubibus fulmen arcis horologio adjacentis turris tectum magne parte disjecerat. Junius erat quidem nonnihil ordinatior, & versus exitum utcumque æstivus, aliquoties tamen æque tempestuosus: quin immo ad festum S. Medardi ex aquilone plane frigidus. Ut adeo neque ipse plane inculcate transire potuerit.

Certus archi-hypochondriacus, jam tribus annis consequenter semper circa dimidium Aprilis deterius affectus, & præsertim de capitis gravitate & obfuscatione quadam lamentatus, 13. Aprilis inexpectate factus epilepticus intra bihorium obiit. Obiisse quoque observati sunt alii repente eodem tempore facti epileptici. Memorabile est a jam dicto hypochondriaco notarum discrimen inter auram civicam, seu urbis arcis subjacentis, & inter auram sublimem arcis ipsius Labacensis. Asserebat is enim, quod quoties adiisset (solebat autem diebus amœnis facere frequentissime) arcem, consedissetque aliquandiu subtrilia, suprematam montis amœne coronante, vel obambulasset; se semper notabiliter melius sensisse, caputque habuisse serenius; quamprimum vero redux domum versus subjacenti urbi appropinquasset, se illico rursus deterius sensisse. Ut adeo plane dubitare non liceat de veritate eorum, quæ nos in *vindictis nostris Medicis de aura Labacensi* §. 37. de discrimine inter salubritatem urbium, & locorum liberæ auræ expositorum, campestriumve docuimus.

Ad repentinam Junii circa festum S. Medardi perfrigerationem, pleuriticus factus Jacobus Ubez, expertus Chirurgus, corpore ultra modum obesum, & plethoricum, elusis quibuscunque adhibitis remediis quoque intra triduum obiit, cæterum homo apparenter sanissimus. Obesi videlicet facilius moriuntur, quam graciles ex Hippocrate.

Æstas habuit quidem sua intervalla utcumque connaturalia; quod totius tamen intercurrissent tempestuosæ pluviae cum tonitruis, fulgurationibus, & fulminationibus, subinde etiam cum grandine, cum communiter subsecuta notabili auræ perfrigeratione, quemadmodum 21. Augusti, qua mane hora septima fulmen in suburbio Tyrnavi dicto octo nautarum casas, non obstante densissima pluvia, in cineres redegerat; pro vix temperata, & vernam temperiem assecuta haberi poterat. Ob quam causam fata tardius maturata messem tristissimam colonis præbuerant.

Adhuc parum siquidem illud, quod hyemalem rigiditatem, & ultra æquinoctium protractas nives subterfugerat, perque vernas pluvias in lolium conversum non erat, per toties iteratas coruscationes adeo exustum fuit, ut aristæ vel steriles plane evaserint, vel grana macra effectave, & potiore farina orbata progenerant.

Neque humana valetudo interea minimum passa. Vidimus siquidem, quod, quæ per Junii, Juliique decursum ob imminutas successive per hyemem, & ver in corporibus aggregatas humiditates, utcumque subsidere incēperat, mox sub Augusto labascere visa sit a febribus tertianis intermittentibus, subinde & quartanis, & tertianis nothis, continuis, diarrhœis, dysenteris, vomitionibus &c. impetita. Quæ febres vel in eo fuere singulares, quod non solum raro consuetum typum in paroxysmis observaverint; verum etiam, quod communiter post aliquot paroxysmos in continuas mutari solitæ fuerint, similiter adeo inordinatas, ut etsi typum tertianarum duplicium præ se ferre viderentur, tamen subinde 24. & plures horæ intercesserint, quibus in pulsu nulla fere alteratio animadvertetur, urinis fere crassis, & lateritio sedimento refertis existentibus, desuper vero tamen rursus insistente continua alteratione, per sæpe cum maculis petechialibus scarlatinis saltem per brachia dispersis, sæpe etiam cum diarrhœis & vomitionibus vel copiosissimis sudoribus; vix tamen aliquando cum ægrorum interitu, etsi semper cum tardissima integræ valetudinis recuperatione. Quod Medici communiter febriliter cum succo pancreatico iusto acidior effervescenti bili, sed multæ pituitæ admixtæ imputabant; & vel propterea non tam ardentes, acutæve febres producenti, quam potius nothas, minus acutas, & diuturnas. Quando æstas fit similis veri, sudores in febribus multos expectare oportet. Hipp. 3. Aph. 6.

Curabantur autem febres illæ, si quandoque perflittere intermittentes, pulvere cornach. diebus a febris liberis iusta dosi assumpto, & sala febrili myns. una alterave hora ante paroxysmos in aqua card. ben. vel cent. minoris propinato. Si qua vero eas in continuas degenerare accideret, præterea venæ sectio celebrabatur in petechialium macularum absentia, alias vero scarificatio dorsi cum subjunctis cucurbitulis. Quamvis viderim apud unum alterumve opificem, cui etiam actu prostantibus petechiis, sed pro pulicem morsibus habitis; erat sanguis venæ sectione emissus, & qui tamen æque convaluit, ac alii, quibus sanguis emissus non erat. Unde conjicere licebat eas solita sibi malignitate non fuisse præditas. Per reliquum morbi decursum autem insisteretur usui pulverum pan. rub. de gem. frig. cc. phil. præp. ℥ diaph. arcan. dupl. bezoardico min. additis, si diarrhœa symptomatica urgebat, troch. de terr. sigill. unicorn. foss. &c.

Certa filiola, quæ simili febre continua cum maculis petechialibus, & dysenteria detinebatur, convaluit ad subinde pro necessitate injectos clysteres primum abstergentes, postea astringentes, & ad quotidianam intro sumptionem pulv. pan. rub. troch. de terr. sigill. cc. phil. præp. unicorn. foss. & smaragd. præp. cum sacch. rosato dulcificatorum. Quodque præterea linguam haberet aridam, eam humectabat mucilagine sem. cydon. aqua prunell. extr. addito rob. diamor. & lap. prunell. eluebatque frequenter os aqua & aceto invicem commixtis, absterfa lingua denticulipio, non intermissis externis astringentibus.

Certus nobilis denique plane adhuc pluribus habebat opus. Laborabat is vero hemitritæ, febre ex æstu febrili continuo, & febre intermittente cum rigore & duplicato æstu alternis diebus intercurrente constante; & quod deterius erat, semper cum quadam veluti cholera seu excretionibus numerosissimis per superna, & inferna materiæ variæ veluti æruginosæ. Hic erat primum purgatus decocto sen. c. rhab. Myns. Hinc ipsi vena secabatur, & pro attemperatione æstus febrilis præter mixturam cordialem ad intro porrigebantur pulv. de gem. frig. cc. phil. præp. ℥ium diaphor. arcan. dupl. Ast intercurrerat tertius paroxysmus cum ea violentia, vomitionibus, & alvi defectionibus, ut æger, si sæpius taliter invaderetur, malo succubitus metueretur. Hinc postmodum illius paroxysmi loco arcani duplicati memorato, pulveri cort. Peruviani & troch. de terr. sigill. ana ℥ss. erat additus. Vespere autem ante somnum pridie quarti paroxysmi febris intermittens talis bolus. ℥. Conserv. menth. rosar. elect. diascord. frac. ana ℥ss. cort. peruv. subtil. pulv. ℥ij. troch. de terr. sig. gr. vij. m. cum sacch. f. bolus. Et non solum quieverat ea nocte utcumque æger, verum & a vomitionibus illis, aliisque defectionibus fere liber erat, præterquam totus debilis, & a continuante æstu febris continuæ totus anxiosus. Qui propterea pro possibili cordialibus & caponis jure cum gelatina permixto reficiebatur. Quodque expectaretur accessus quarti paroxysmi mox a meridie, quatuor horis ante eum fuit ægro talis mixtura specifica propinata. R. Aq. cord. saxon. secundæ, card. ben. ana ℥ss. syr. coral. ℥ij. cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ss. @. absinth. gr. v. m. f. pot. Et desideratissime emanerat, quem adeo non minus nos, quam æger ipse metuerat, paroxysmus. Ut adeo nobis nihil superfluerit expugnandum, quam adhuc febris illa continua, viriumque prostratio: quibus proinde diligenti continuatione pulv. de gem. frig. cc. phil. præp. ℥ij. diaphor. & @. perlat. nec non mixturis cordialibus opem ferre eoque conabamur, usque dum successive & ista feliciter sopita fuere. Certe si in quo alio, in hoc manifeste periculoso casu se Herculem exhibuit cortex Peruvianus, rite ob conjunctam choleram stomachicis associatus.

Autumnus denique usque ad extremum Octobris erat satis commodus, ut adeo vindemiarum quidem in optata aeris temperie potuerint peragi, sed vel ex eo tristes, quod magna botrorum pars, uti in constitutione verna dictum, aut in primis adhuc pampinis vere emarcuisset, aut æstate a tantis coruscationibus, & rubiginosis pluviis, ipsis etiam arborum foliis, & arboreis fructibus propterea copiosissimis maculis notatis, & ad putredinem pronissimis notanter insensis, adusta penitus arida & vitibus decidissent, postea autem, & toto Novembri, Decembrique mensibus usque ad 13. Decembris adeo pluviosus, ut fere non intercesserit dies, qua non pluisset, aut saltem nubilum, & ad pluvias proclive non fuisset, & ex austro jagiter (excepta 20. & 21. Novembris, qua primæ nives ex euro ceciderant, & 8. Decembr. qua per quinque continuos dies africanus vehementissime furebat) flante veluti tepidum. Hinc non mirandum, quod interruptis diebus tum continuis, tum intermittentibus febribus, e contra turmatim irruissent febres catarrhales, hemiplegiæ, vertigines, hemiplegiæ, arthritides, post 20. Novembris repente perfrigeratam raucedines, gravedines, tussis, pleuritides, obauditiones &c.

A 13. Decembris ex affricum excipiente leni aquilone demum saltem a prandis serenum cum successiva aeris perfrigeratione usque fere ad anni exitum, nisi quod postremis diebus constanter obnubilatum cælum nos solis radiis privaverit. Atque adeo apparet totum hunc annum, excepta hyeme, quæ saltem frigoris acerbitate excesserat, fuisse valde insalubrem, & ob tot pluvias, coruscationes, & potissimum prævalentes ventos meridionales, non minus terræ fructibus, quam hominibus magnopere infensum. Num vero & animalibus, quæ etiamnum crepare continuant? sub iudice lis est. Interea certum est, tot æruginosas pluvias eorum pascua non reddidisse salubria, quin potius insalubria. Quamvis probabilius videatur, istam interitus animalium continuationem potius contagii semel eis impressi propagationi esse imputandam, quam pascuorum vitio: eo, quod & alibi terrarum grassetur tale malum, ubi forte tamen tot corrosivæ pluviae non ceciderint, quot apud nos.

Duo hemiplegici fere plane æqualiter affecti, id est uterque cum immobilitate brachii dextri, & loquendi impotentia, fuere fere æqualiter percurati, ita ut etiamnum fere pro lubitu moveant brachia, & loquantur libere. Purgabantur videlicet hac potione. R. mass. pil. cochiar. ʒi. dissolvatur in tantillo aq. apopl. adde syrup. de stœchad. ʒij. spir. lil. convall. gutt. vii. m. f. potio. Hinc uni eorum, qui plethoricus erat, emittebantur ex dorso mediante scarificatione circiter quatuor uncias sanguinis. Utrique vero erat injunctum, ut pro corroboratione spirituum bis de die assumerent, castaneæ quantitate, de hac opiata. ʒ. conserv. flor. beton. salviæ, anthos, majoran. ana ʒʒ. spec. contra apoplex. ʒiʒ. specific. cephal. Michael. ʒj. spir. ceras. nigr. lilii convall. ana parum m. cum syr. flor. tunicæ f. opiata. Cui superbibatur unum vel alterum cochlear aquæ apoplecticæ.

Item, ut spinam dorsi cum nucha ungerent unguento nervino, & ol. lumbr. tetr. utque os frequenter eluerent spir. lil. convall. cui theriaca esset admixta.

Quinta morbi die fuit repetita potio purgans; atque subsequenter septem diebus sudor procuratus decocto lignorum cum ligno rorismar. & visco querc. Et, uti dixi, successive convaleuit uterque.

Non multo absimilius tractatus fuit etiam certus mercator ex hemiplegia saltem oris torturam, & palpebræ dextri oculi, ita, ut eam citra manus subsidium occludere non posset, resolutionem passus. Purgabatur is nempe his pilulis. R. Extr. cephal. ʒʒ. castor. gr. j. Resin. jalap. pin. sub. gr. vii. spir. mac. gutt. j. m. cum spiritu ceras. nigr. f. pil. n. ix. Nucham calide unxerat ung. nervino & ol. succini; pro corroboratione utebatur eadem opiata, qua duo illi hemiplegici, & post triduum repetitis pillulis sudabat ad potum decocti sudoriferi per octiduum, prætereaque partem affectam fovebat sacculis speciebus nervinis refertis, & in vino albo decoctis. Et eatenus restitutus fuit successive, ut vix animadvertatur, quod aliquando fuisset læsus.

Armamentarii Cæsarei præfectus tamen, postquam jam antehac ter fuisset a simillima hemiplexia simillimis remediis feliciter restitutus circa dimidium Novembris brachio sinistro, quod alias prioribus vicibus erat intactum, resolutus cum omnimoda loquendi impotentia, frustra adhibitis quibuscunque, ad initium Decembris interiit.

Ex quartanariis certus sexagenarius ad solas has pilulas. ʒ. pil. tart. Schrœd. ʒʒ. extr. gentian. cent. min. ana gr. iv. resin. jalap. pin. sub. gr. v. m. cum tinct. tart. f. pil. n. ix. Et ad sectionem salvatellæ manus sinistræ, atque ad gr. iij. tart. emet. Nec non ad continuatum usum hujus tincturæ convaleuit. ʒ. Essent. absynth. Elix. propr. parac. tinct. tart. spir. e. *ci ana ʒi. m. dosis gut. xxx. ex aqua absynthii. Alii tres quartanarii vero priusquam fuere liberati, præterea usi sunt suis temporibus his pulveribus specificis. ʒ. cort. Peruv. subtilissime pulv. ʒii. *ci, & diaphor. ana gr. x. m. f. pulv. Aliorum affectuum curationes, utpote magis obvias, studio prætermitto, excepto solo adhuc materialista illo, qui 20. currentis Decembris in ædibus carpentarii ad Ecclesiam S. Floriani ex diuturnis coli intestini doloribus, & ossis pubis, illique apostemate obiit. In eo siquidem illud erat singulare, quod ex aperto apostemate in femore aliquot digitis infra os pubis ob commodiorem puris evacuationem cum pure genuinæ alvi fæces profluere animadvertæ fuerint. Propterea demortuo post octiduum circiter ægro, jam pridem penitus exhausto, erat inquisitum in dictarum fæcem transitum, & deprehensum, quod colon intestinum, ea, qua coxam spectat, parte fuerit ad imperialis nummi amplitudinem exesum, perforatumque, & inde facto successive cuniculo per pure excavatos musculos, patet illas confegentes, penetrasse ex læso intestino fæces illas alvinas usque ad incisum locum. Induta est scilicet caro hominis putredine, & sordibus. Job cap. 7.

Constitutio Anni 1713.

Dn. D. MARCO GERBEZIO

Medico Labacensi, communicata die 15. Januarii An. 1714.

A Deo varius erat apud nos Labacenses, quoad auræ temperiem hujus anni 1713. decursus, ut fere vix præterierit octiduum, quo ob jugem omnis generis intercurrentium ventorum vicissitudinem alia non fuisset introducta aeris constitutio. Solus Januarius sibi hyeme aliquantulum constabat, æstate Augustus, & autumnus posterior Novembris, & anterior Decembris pars cælo ex solito maturius partis nivibus, easque secuto flatu aquilone serenato. Ceterum vero toto reliquo tempore varietas, potissimum cum pluviis, & auræ asperitate conjuncta: proindeque sicut terræ frugibus maxime incommoda (qui propterea, exceptis montanis locis, ubi solum natura sua aridius est, non solum crevere perpauci, verum & impuri, & viciis, zizaniisque plenissimi, arboreis fructibus quidem itidem saltem in montanis existentibus utcumque copiosis, verum, & ipsis ob nimias pluvias veluti eviratis, & solita sapiditate destitutis, consequenter minus sanis, plurimisque hominum eis indiscrete vescientium febrium, diarrhæarum, dysenteriarum, vomitionum, & ventris corrosionum causa) ita sanitati humanæ maxime importuna. Mutationes siquidem temporum, teste Hipp. 3. aph. 1. pariunt morbos. Quod ea tamen non tulerit singulares aliquas, præter copiosas defluxiones, epidemias, qualium alias feraces esse solent si Sydenham Opera Medica.

miles annorum constitutiones; existimo in singulare nostrum contumodum fecisse, quod dictæ illæ varietates nunquam repente irruerint, sed successive, & veluti inadvertibiliter, neque diu tales perseverarint, neque magnæ fuerint: quod tamen requiritur ad inducendos in corpora ex aere morbos populares. Magnas siquidem, dicit Hippoc. citato loco, mutationes facere morbos, 3. aph. 7. autem dicit: Si annus magna ex parte talis fuerit. Quod ipsum sentit & Galenus Comment. 1. in lib. 1. Hipp. de morbis vulgaribus. Quandoquidem igitur hic annus, juxta dicta, maxima ex parte fuerit varius, & frequentissime pluviosus: tales constitutiones vero solent esse defluxionum, seu morborum a peccante lymphâ dependentium feraces; mirum non est, quod potissimo tempore præ quibuscunque aliis affectibus vigerint defluxionum morbi.

Curationes eorum non adduco, sed relego benevolam Lectorem ad Chronologiam meam Med. elapso vere Francosurti una cum Intricato Extricato meo Medico recusam. Ne vacuæ tamen omnino sint hæc pagina, aliorum morborum hoc tempore observatorum, & solum breviter meminisse hic lubet certæ nobilis matronæ, elapsa quadragesima a me ab hydropse ascite feliciter percuratæ, elapso autumno vero ex eodem malo tamen; sed per errorem defunctæ. Hæc tota elapsa æstate citra querelam vixerat: quod ea vero horariis fructibus nimium indulisset, & alias licentiosius pro ordinario muliercularum more victisset, sub initium autumnus de novo cruribus intumescere occæperat, successive & abdomine; sed quod cum nescio quo in ventre motu, se concepisse suspicari incæperat, & propterea omnia remedia, ne inde forte abortus periculo sese exponeret, negligere, usque dum exacto, sua opinione, gestationis tempore, dum parituram sese existimaret, vitam cum morte commutavit. Apertum propterea cadaver, ut fœtus eximeretur: ast ejus loco aliud non repertum, quam ingens in abdomine aquarum colluvies. Ut adeo manifeste conjicere licuerit, motum illum, quem fœtui illa imputabat, aliunde non fuisse, quam a flatibus, aut colluviei illius aquosæ in abdomine contentæ, & sub corporis motu, aut ventris contrectatione perceptæ fluctuatione. Si infelix mulier alias tempestive ad rem fecisset (quamvis gravidas a similibus generosis remediis indigentibus malis citra abortum liberare, sit ex nostra in Intricato Extricato nostro Medico tradita doctrina, perarduum) forte non minus juvari potuisset, quam adjuncta a me fuit Sutorissa illa, cujus ut talis curatio proposita fuit in Chronologia mea Med. Anno 1. §. cxxi. In simili siquidem peccantium humorum aggregatione remedia etiam valentiora, qualium hydrops præ aliis affectibus indiget, non tam fœtum, utpote rem domesticam, & naturæ congenerem, quam humorem peccantem, utpote quid a natura alienum, citra abortus consecutionem, aggrediuntur. Prouti id pluribus deductum a me fuit in jam allegata Chronol. mea Med. Anno II. §. cxxvii. alibi. Ut taceam, quod in tali casu præstare videatur saltem matrem etiam cum aliquo abortus periculo salvare, quam matrem & fœtum evidenti periculo expositum, relinquere. De imaginariis conceptibus alias si quis plura legere cupit, inspicere potest Sachsum in Scholio ad observ. I. Anni I. Decurie I. Ephem. Nat. Curios.

Meminisse item lubet duorum febricitantium, quorum uterque in sextum usque mensem intermittenter febricitabat, non obstantibus variis a suis Medicis sibi ordinatis remediis, quos ego tamen solis sequentibus mox ad anni principium celerrime liberaveram. ʒ. Pil. tartarear. Schrœd. ʒʒ. extr. gentian. cent. min. ana gr. iv. Resin. jalap. pin. sub. gr. vii. ol. mac. gutt. ii. M. cum tinctura tartari F. pil. n. ix. Sumantur die a paroxysmo libera. Hinc pro ventriculi corroboracione, & cruditatum correctione sumantur quotidie mane ex juscule de sequenti tinctura in diuturnis febribus specifica guttæ xxx. ʒ. Essent. absynth. agrimon. Elix. propriet. parac. f. acido tinct. tart. spir. sal. *ci ana ʒi. M. Atque ab extra lienis regioni applicetur emplastrum de Cicuta cum ammon.

Sique videretur, memoratæ pilulæ adhuc semel iterentur. Et exacte observata interea victus regula uterque constanter convaleuit.

Ad certum quinquagenarium hypochondriacum sæpe sæpius ventris corrosionibus, & nocturnis vigiliis tortum pro dando consilio vocatus, dum vidissem, quod ei a Medico suo ord. frequentissime ad vespertinum pilulæ de cynoglossa aliquot granis laud. op. acuatæ concederentur; earundem tam frequentem usum absolute dissuaseram veritus, ne ex forte successive caput ad apoplexiam disponderent. Quod in eo vero mihi non obsequeretur patiens, utpote ab earum usu semper, uti ipse assererat, alleviari solitus; ei ultimam cum suo interitu obtigerat, quod Ego ipsi pridem prædixeram. Sæpe siquidem etiam ea, quæ prodesse videntur, obsunt.

Prosperiore sorte sibi e contra procuratum fuisse per sex hebdomadas frustra desideratum in arthritide vaga somnum, mihi eodem tempore fide dignissimum narraverat certus Soc. JESU pater, chara, in qua multo tempore involutus in officina aromataria asserabatur crocus, capiti obvoluta. Ut adeo non vane suaserit Wedelius apud Friccium in singulari suo tractatu de virtute Venenorum Medica cap. xxiii. de croco, crocum sacculo inclusum, & infantum, si qua dormire non possunt, capitibus suppositum, cum admonitione tamen, ut, ne is eis forte nimium soporem inducat, postquam obdormivere, is iterum subtrahatur.

Adjicio rarioris illius affectus, quem ob involuntariam, & justo copiosorem crudæ & factæ haustu analogæ urinæ profusionem, diabetem vocant Medici, succinctam, sed felicissime peractam curationem. Certus in honorifica dignitate constitutus 52. annorum Sacerdos, temperamento atrabilarius, & ob plurima negotia vitamque sedentariam factus, uti dicitur, hypochondriacus, inter reliqua hypochondriacis familiaria accidentia successive demum etiam de urinæ ardore, & multo in urina fabulo lamentari cæperat. Hinc præter referendis obstructionibus dicata plurima remedia etiam abstergentibus, leniter diureticis, & urinæ acrimoniam obtundentibus usus est, quale præ aliis erat decoctum Foresti, & syrup. de althæa Fernel. Taceo stomachica, & alia, quæ subinde ab urgentibus circumstantiis exigi videbantur. Inde sublatus quidem fuit molestissimus ille urinæ ardor, sublatus etiam cum urina excerni solitum sabulum; verum ejus loco inducta memorata illa involuntaria, & nimia crudæ, & potui colore plane analogæ urinæ profusio cum ea marasmodica corporis contabescencia, ut venerabilis æger omni prorsus appetentia, & somno destitutus sine fine sitibundus proxime interiturus videretur.

Hinc itum in consilium, & conclusum, ut posthac cura tota eo

ta eo dirigeretur, quo urinæ nimia illi profusioni corporis substantiam eatenus depascenti idoneis remediis occurreretur.

Statutum propterea, ut æger ab omni difficili digestibili abstineret, vitaret vinum, & ejus loco pro siti, quamvis pulsum vix alteratum haberet, biberet jus carnis bubulæ refrigeratum, & ab omni pinguedine per præviā per pannum lineum colaturam liberatum, subinde autem emulsionem amygdalarum dulcium, exhibarato quandoque sitiente ore cochleari vini cydoniorum, vel granatorum acidorum, quandoque etiam granis ipsis pomorum granatorum. Pro cibo vesceretur juribus caponis, in quibus concussus sit vitellus ovi rec. contusus, amygdalatis, avenatis, hordeatis, & pultribus ex ovis, & pulpa panis triticeī paratis, malis cotoneis &c. sique posset, carne vitulina, caponum, pullorum, avicularumque montanarum. Mane etiam & vespere assumeret bonæ castaneæ magnitudinem de hoc specifico.

24. *Conserv. ros. rub. 3iij.*

rad. symphyt. maj. 3ij.

spec. diatrag. frig. 3ß.

coral. rub. præp.

terre sigill. ana 3i. M.

cum syr. cydon. F. electuarium.

Regionem renum ungeret ungu. rosato refriger. Gal. & Comitissæ. Spinam dorsi autem & pectus ungu. resumptivo. Quibus constanter continuatis rediit successive tantus appetitus, ut sibi a cibis vix temperare valuerit. Item somnus, vires, & carniū consumptarum recuperatio ad admirationem.

Anni 1714.

SI unquam aliquis annus fuit irregulariter constitutus, fuit apud nos Labacenses annus 1714. cujus constitutionem quoad aeris temperiem in præsentī communicamus; excepta siquidem sola hyeme, quæ fuit cum paucis nivibus aquilonia, & per totum tolerant frigida, & sicca, totum reliquum ejus residuum, ver videlicet, æstas & autumnus, excepto Novembri mense & dimidio Decembris, quorum dies in accepta aeris amœnitate decurrerant, erat meris varietatibus, & veluti quotidianis pluviis subiectum. Unde tot, tantæque aquarum exundationes, ut nec fata maturefcere, nec gramina defalcari, siccarique, nec semina opportunis temporibus terræ mandari potuerint; quæque terræ mandata fuere, aut prorsus non adoleverant, in semine suffocata, aut adulta a meris vicis, zizaniis, & lolis adeo conspurcabantur, ut usui esse vix potuerint, aut ab uredine adusta grana effœta, & farina fere destituta tulerint. Unde insueta annonæ penuria, & propterea præsertim Croatiā versus, fere communis inter plebejos fames.

Qua stante aeris constitutione qualiter humana valetudo subsisterit, nemini credo difficile fore conjicere; qui ex Hippocratis libro tertio aphor. & alias novit, qualium tales annorum constitutiones soleant esse feraces corporum dispositionum; præsertim, siis præterea perpenderit, qualem victus rationem in simili rerum penuria, & caritate fuerit observare necesse, & quali, quamve insalubri qualitate debuere fuisse præditi non solum terræ, verum & arborum, vitiumque fructus, utpote dicta uredine adeo exesi, adustique, ut vix fuerit reperire pyrum, pomum, vel etiam botrum, qui integer, immaculatus, & connaturali suo sapore præditus fuisset: quamvis & talium partissimus fuerit quæstus. Substitit videlicet, si unquam aliquis, lamentabiliter. Eo, quod similes temporum constitutiones, soleant esse ex Hipp. citato loco, & nostra in *Chronologia Medica* tradita doctrina, morborum feracissimæ.

De hyeme quidem nobis non erat, quod adeo quereremur, utpote quæ utcumque tolerabili suo frigore siccitateque corpora potius reddebat *firma, agilia, & bene colorata*, adeoque bene valentia, quosque tulerat morbos, eorum saltem solum accidentalis extitit causa, quatenus videlicet humiditates a prægresso pluvioso anno in corporibus nostris aggregatas altius impresserat, coagularat, & a discussione per insensibilem perspirationem impediverat.

Quod ipsum puta & de Novembri mense, Decembris que anteriore dimidio, utpote similiter leni aquilone perflatis, & potissimum amœna serenitate illustratis. Ast tanto majores querelæ nobis fuerunt contra veris, æstatis, & reliqui autumnī (utpote adeo pluviosorum, ut vix intercurrerit duorum triumve dierum serenitas, solive illustratio, quæ a pluviis, aut saltem nubilo cœlo cum plane insueta aeris asperitate non fuisset interrupta) decursum: Qui propterea tantis cum ægrotis negotiis nos oneraverat, ut iis expediendis vix suffecerimus. Quinimo, postquam affinem nobis Stiriam ad Judenburgum peste infectam perceperamus, nobis plane de adhuc deterioribus metuere inceperamus. A quibus tamen præservavit nos hætenus gratiofum Numen.

Morbi autem, a quibus adeo impetebamur, erant præter omnis generis defluxiones similibus temporum constitutionibus semper familiares, arthritides, colici dolores, pleuritides, hydropes, febres tam intermittentes, quam continuæ, & ex eis multæ plane malignæ, diarrhææ, dysenterix, vomitiones, lumbrici, variolæ, morbilli, & rubeolæ: nulli tamen funestiores, quam febres petechiales, & præsertim Decembri mense variolæ. Quibus propterea etiam multi, præsertim Augusto mense, & Septembri plane succubuere. Quamvis, qui victus rationem observant, riteque curabantur, potissimum reconvalerent.

Singulare quid duobus fratribus acciderat: Utrumque prævio totius corporis rigore febrilis incallescencia apprehenderat. Hinc plane intolerabiles lumborum puncturæ. Desuper unum petechiæ scarlatinæ seu purpureæ, alterum petechiæ nigræ, & variolæ purissimo sanguine soliti puris loco suffulæ. Et ille tertia morbi die, hic septima inopinate succubuit.

Certa etiam 10 annorum herula cortice Peruviano vix a febre quartana liberata in variolas confluentes densissimas inciderat, quæ successive etiam eo perductæ fuere, ut contractis crustis instantaneæ abscessuræ crederentur, herulamque pristinæ valetudini more solito restituta. Ast ecce quam inexpectatum fatum! præterquam enim, quod crustæ etiam sæpius oleo amygd. dulcium perunctæ nullatenus recessissent (persistente interea semper febre acuta continua, & tussicula) ultimatim eæ eo deductæ fuere, ut si quam casu tamen abscedere accideret, ea post se ardentissimum ulcus absque omni pure relinqueret, usque dum miserabili herulæ ultimatim, 21. scil.

morbi die, e vita excedere fuerit necesse. Usque adeo de variolis, nisi cum eis & febris, & reliqua accidentia recedant, nunquam venit triumphandum.

Certus Mercator Goritia Labacum cum intensissima & ea continua febre in maximo frigore delatus, de intensissimis & faucium, & artuum doloribus lamentabatur: a quibus demum etiam idoneis remediis liberatus erat. Sed desuper (persistente adhuc febre) toto corpore minutis, & densissimis hydatidibus, seu vesiculis aqua repletis, adeo fuit perspersus, ut quis eum undique fervidissima aqua fuisse persusum, perusumve citra dubitationem jurasset. Et non obstantibus quibuscunque remediis quoque ipse 18. morbi die obiit.

Certus Lib. Baro e contra usque ad desperationem asceticus, dum proxime expiraturus crederetur, superveniente tumidissimo scroto, inflammatione, & abscessu, sponteque evacuat inde aquis præter omnem expectationem convaleuit. Usque adeo desperandum nunquam: sed dum spiramus, speremus.

Carbonum suffocatorum illorum, quibus fabri ferrarii uti consuevere, vapores esse nocentissimos, nemo facile est, qui nesciat: noxios vero æque esse ordinarios illos ab aperto igne combustis lignis relictos, non facile credo fuisse observatum. Accidit tamen, quod elapso Decembri ex intenso frigore domum reversus faber ferrarius septuagenarius, eo quod sese, ad talium carbonum ignem excalefecisset, in eum soporem, cum maximo stertore inciderit, ut is ab adstantibus pro fortissime apoplectico, adeoque ex sententia Hipp. 2. aph. 42. pro omnino desperato haberetur, successive quidem clystere acri, frictionibus, sternutatoriis, vesicantibus, & volatilibus antiapoplecticis, rursus excitatus, ultimatim vero, decima tertia videlicet morbi die tamen e vivis sublatus.

Simillimum fatum accidisse recordor ante annos Iggeni rustico in noviter calefacto, & non pridem extructo fornicato cubili, qui vero libero aeri expositus sese tamen rursus recollegerat. Sed Septuagenario illo longe junior erat.

Singularis molis calculum in vesica gestare absque eo, quod ab eo saltem subinde urinæ excretio interceptiatur, meo judicio pro raro habendum est. Factum id tamen fuisse detexerat nobis nuperime dissectum corpus nostri Labacensis Ecclesiæ Decani. In ejus siquidem vesica ad digiti crassitiem corrugata deprehensus fuit trium unciarum calculus, qui tamen urinam nunquam interceptisse fuit observatus; quin potius is, postremo præserti manno, continui urinæ crudissimæ profluvii extitit causa. Sed sciendum venit, calculum hunc ab ægro semper fuisse pro hernia habitum, quem propterea a pluribus annis semper sursum cingulo herniosis consueto religatum gestabat, impediebatque hoc medio, ne is unquam ad vesicæ orificium devolveret, & urinam omnino procludere potuerit: quin potius, quatenus totum contractæ vesicæ spatium sua mole occupabat, causa erat, ne a renibus jugiter affluens urina ibidem subsistere potuerit, sed potius veluti guttatim jugiter excerni debuerit. Juvalet propterea quoque forte alias (nisi lithotomia remedio periculoso & sæpe impossibili sese subjicere mallent) tali medio uti, ut taliter saltem ab eis alias consueta urinæ præclusionē liberi viverent.

Anni 1715.

Quem non piget revolvere constitutiones anni 1713. & 1714. a me notatas, & postremo Ephem. Nat. Cur. tomo insertas, is facile conjiciet, qualiter saltem per hyemem currentis anni 1715. subsisterit inter nostrates Labacenses humana valetudo. Ex temporum siquidem salubribus, vel insalubribus aeris constitutionibus potissimum dependere humanorum corporum bonam, vel malam valetudinem, demonstravi luculenter in *Chronologia mea Med.* Quandoquidem igitur ex dictorum annorum constitutionibus elucescit, eorum tempora potissimum fuisse varia, aspera, & pluviosa, talia autem solere esse fluxionum, & omnis generis a putredine, & humorum corruptione oriundarum indispositionum feracia; arguere pronissimum est, saltem hyemem memoratos annos immediate consecutam debuisse fluxionibus, & omnis generis a putredine, & humorum corruptione oriundis indispositionibus fuisse obnoxiam, non obstante, quod ea de se adeo insalubris non fuerit, utpote potiori ex parte aquilonia, tolerantius frigida & sicca, adeoque ex sententia Hippocratis utcumque salubris. Corpora siquidem per antecedentem talem insalubrem aeris constitutionem vitiosis humoribus semel referta, præsertim hyemali tempore, quo cutis pori ab externo frigore occlusi, talium humorum debitæ per insensibilem perspirationem depurationi obstant; per subsequentem, etsi etiam utcumque salubrem aeris constitutionem, sibi adeo restitui vix possunt tam celeriter, ut in affectus a tali putredine, & corruptione oriundos non incidant, eo saltem usque insistentes, donec a salubriori, & ea contraria, calida videlicet aeris temperie in contrarium non alterentur. Hinc etiam observatum fuit, non obstante juxta dicta de se alias utcumque salutari hyemis constitutione, plurimos Labacensium incidisse, præter omnis generis defluxionum morbos, quoque in febres malignas, morbillaceas & varii generis etiam aliis cutis efflorescentiis adeo periculosas, & contagiosis stipatas, ut potissimæ urbis domus eis fuerint coinquinatæ: magna etiam incolarum pars, præsertim pauperum, utpote & competente victu, & necessariis remediis destitutorum, plane e medio sublata. Distum siquidem fuit præterlapsum annum 1714. fuisse adeo sterilem, & insuper fructibus, quos protulerat, vitiatum, ut inde in corporibus ab eis nutritis alii succi progenerari non potuerint, præterquam morboſi. Accesserat & mortalitas animalium, quorum, etsi nondum actu ægrotorum, re ipsa vero tamen actu insectorum comestas carnes probabile est, etiam quidpiam ad humanorum corporum insalubritatem contulisse. Item inter plebem famem ipsam, quæ propterea tot mendicos ad urbem compulerat, ut non pauci eorum conquisito ibidem cibo faturati mox animo, & vita etiam in publicis plateis concidere visi fuerint, usque dum eis in publico Lazæro alias pro impestatis destinato, ex collectitia eleemosyna necessaria sustentatio a Magistratu suppeditaretur.

Petechiales, seu scarlatinæ illæ maculæ, quas vulgo petechias nominamus, vix apud ullum ægrum observabantur: morbillaceæ vero, alias rubeolæ dictæ, quales ego anno 1699. per æstatem hic grassatas fuisse Anno iii. meæ *Chronolog. Med.* §. XL. & seq. descripsi, communiter apud omnes, præcipue in dorso magis conspicuæ: quibus tamen non raro elevatæ quæpiam pustulæ instar variolarum interspergebant.

gebantur, sæpe etiam discussis jam illis exanthematibus undecima morbi die, 14. vel etiam tardius superveniebant, miliares quædam pustulæ totum corpus densissime cum pruritu obsidentes: subinde vero hydatides, seu limpidissimo sero repletæ vesiculæ, eis ex asse simillimæ, quæ perfusione cutis aqua fervidissima excitari solent. Et ista potissimum post se traxere ægri, utpote aliunde jam prius enervati, inevitabilem interitum, sicut illæ non facile.

Variolæ quidem, & morbilli etiamnum quoque adhuc una grassabantur inter infantes, & adultos, minori tamen cum sævitie, quam elapso Decembri, præter unicam monialem, apud quam variolis densissime perspersam usque ad duodecimam morbi diem securissime procedere videbantur; duodecima autem epidermis, seu extrema illa cuticula, quæ veram cutim contegit, adeo elevata conspiciebatur per faciem & totum reliquum corpus, præcipue brachia, latentibus subtus variolis, ut ad humerum digitis apprehensa, per totum brachium uno tractu detrahi potuerit, idem puta de facie. Et ista 13. morbi die obiit. Plura hic mihi essent adhuc de epidemia hac valde multis fatali commemoranda: quod ea vero potissimum retigerim in Chronol. mea Med. loco citato describendo febri morbillarem apud nos anno 1699. similiter, etsi non adeo ferociter sævientem, benevolam lectorem eo ablego. Interea solum adhuc id hic adjiciens, quod epidemia isthæ malignitate parum a peste ipsa recedens tota hyeme, & vere, præcipue Majo mense, usque in Junium, quæ erat amœnissimum, eatenus, in omnem ætatem, & sexum præsertim in quoad faciem cæterum sanissimos sævierit, ut tale quid nostra memoria hic Labaci adhuc nunquam fuerit observatum. Neque hoc solum hic Labaci, sed successive & per reliquam provinciam, præsertim circa Sitticium in parochia S. Viti, & circa Rudolphsbertum in parochia S. Ruperti, ubi maximam subditorum partem e medio sustulit.

Ex sexu muliebri tamen utero gerentes præ aliis impegerant, utpote communiter abortum passæ, & retractis a lochiali fluxu ad interiora exanthematibus. Idem fere puta de eis mulieribus, quibus mox in mali principio, aut sub ipsa exanthematum eruptione menstrua proruperant.

A Junio usque ad exitum Augusti erant fere omnia benigna; de variolis autem, & morbillis nec auditum quidem: e contra febres tertianæ, præsertim Octobri mense (quamvis is fuerit una cum Septembri, imo & Novembri, præter solitum amœnus) adeo contumaces, & inconstantes, ut post tertium, vel quartum paroxysmum communiter degenerarent in lentas continuas per plures hebdomadas, non obstantibus idoneis remediis, continuantes; ultimam vero rursus in intermittentes terminatæ: quæ vero erraticæ ægros apprehendebant, serius, aut citius in quartanas mutabantur, quas tamen omnes sequenti methodo, & remediis, propterea bene annotandis, feliciter curabam. Primo purgabam corpus ter, quater, vel quinquies (pro exigentia videlicet cacochymia, vel cachexia) communiter pridie paroxysmi (quia ea die tolerantius se habere solent ægri) tali pristana. ʒi. fol. sen. f. st. ʒiij. salis tartari ʒss. flor. viol. martial. passul. min. mund. an. p. i. f. per noctem infusio in loco calido in f. q. aq. agrimon. vel borrag. vel aq. com. vel etiam in jure pulli pro colatura ʒiv. Mane prævia levi ebullitione f. expressio, & potio. Vel talibus pilulis. ʒi. pil. tartar. schrœd. ʒss. exrr. gentian. cent. min. an. gr. iv. resin. jalap. pin. sup. gr. v. vel viij. m. cum tinct. tart. f. pil. n. ix. intermediis diebus fiat humorum digestio, & obstructionum referatio. ʒi. Essent. absynt. agrimon. elixir propr. parac. tinct. tartar. martis aperit. spir. sal. ammon. an. ʒj. m. dosis mane & vespere gutt. xxx. ultimam. ʒi. pulv. patrum ʒiij. conf. alkerim. ʒij. antim. diaph. ʒiij. arcan. dupl. sal. absynt. cent. min. card. ben. ammon. an. ʒss. m. cum. conditura cort. citr. f. elect. molle. Dosis diebus apyrexias mane & a prandiiis tribus horis ante pastum castaneæ magnitudo, superbibendo aliquid aq. card. bened. vel vini melioris: die febrili autem eadem quantitas in declinatione æstus febrilis, continuando id saltem semel de die per 4. circiter hebdomadas etiam post expugnatam febrem, cum exactæ diætæ observantia.

Qua ratione autem feliciter cesserit febrium malignarum, & petechialium curatio eis rusticis, de quibus mihi ex Conitatu Cillien. si perscripserat certus amicus, quod illi sese in summo febrili æstu frigida immergere soliti sint? Ego non capio. Quod vero pedibus, & reliquo corpore tumefacti ad potum cent. min. & immersionem pedum in aquam fimi detinuerint, ejus demum ratio reddi jam potest.

Anni 1716.

A Tricennio huc recorder, nos quidem varias hyemes ob non minus copiosas nives, quam asperam auram perdifficulter superasse, in primis hyemen anni 1709. a me in Ephem. Nat. Cur. centur. 1. & 2. sub titulo: Constitutio anni 1709. descriptam; nullam tamen fere difficilius, quam cujus constitutionem nunc communico; hyemem videlicet currentis anni 1716. Ista siquidem vix aliquando, ab intercurrentibus brevissimis austris aliquantum refracta nivium copia, & frigoris asperitate per totum adeo sævierat, ut æquinoctium vernum, quod alias apud nos hyemis finis esse solet, longe excesserit, obque indefinenter furentes aquilonares ventos, indeque summa ariditate constrictam terram arbores, non nisi primo circa dimidium Maji in folia, & flores, idem puta de satis in aristas, erumpere siverit: exemplo alias nostra memoria nunquam viso, præterquam ante annos circiter 50. quo recenset certus septuagenarius illius hyemis frigus usque ad Maji exitum adeo institisse, ut passim necesse fuerit sese a frigoris intolerabilitate lignis excalescentis fornacibus tueri. Omnes tunc, addit dictus feniculus, desperaverant de factorum fere emortuorum, & frugum vel tolerabili ubertate; interea vero tamen consecutum fuisse annum adeo fertilem, ut is raros sibi habuerit pares. Quemadmodum idem ipsum inexpectata Dei benedictione factum admiramur & nos currente hoc anno.

A dimidio Maji demum prægressis pluviis tempus vernum, & successive terræ viror, efflorescentiaque, quam vernam amœnitatem continuarat & Junius, cum Julio, & Augusto mensibus, terræ frugibus vel propterea opportunis, quod fertilibus, eisque brevibus pluviis sapius ad colonorum votum interspergerentur. Sique September jam nominatorum mensium temperiem saltem proportionate secundasset, uberiores annum optare non potuissimus. Quod hic vero per totum fuerit pluviosus & frigidus, maturandoque fagotritico, postorum colonorum panis quotidiano, usque plane importunus; factum est, quod fagotriticum vix maturatum, uvæ vero plane fere non. Unde vina non minus pauca, quam ultra modum acerba, proculdubio in

futurum colicorum, & arthriticorum, nec non aliorum ab acido, & austero oriundorum, affectuum causa exitura. Arborei fructus e contra, præsertim poma, fuere copiosissima.

Veluti exhaustis demum per pluviosissimum Septembrem nubibus autumnus subsecutus fuit præter morem & expectationem acceptus, terra nivibus non nisi 11. Decembris, cum intenso tamen frigore, cooperta.

Hinc humana corpora sicut per hyemis decursum multum fuere ab omnis generis defluxionibus perpeffa, ita verno tempore præsertim a pectoris affectibus; adeo ut de actu phthificis nemo mortem evaserit: plurimi alii vero eidem obnoxii prima sibiejusdem injecta fuisse fundamenta etiamnum deplorent. Per reliquum anni decursum vero demum fere meræ indispositiones sporadicæ.

Qualis erat, ut saltem unam vel alteram curationem pro usu medico subjungam, heruli illius, qui pridem cachecticus, & scabiosus veluti repente fuit a scabie per se liberatus, inciderat e contra in vehementes epatis puncturas, febrem acutam continuam, sitim tussim, vigilias &c. Huic præmissis clystere fuere sanguinis ex basilica brachii dextri emissæ uncia v. Hinc pro febris sufflammatione talis pulvis bis quotidie introsumentus datus. ʒi. spec. de gem. frigidis, diatrag. frig. antim. diaph. ocul. 69. ana gr. v. nitr. perl. iij. m. f. pulv. Et ab extra præmissa unctione ung. dealth. anodyn. & ol. viol. iterato superpositum tale cataplasma. ʒi. Herb. malv. althæ. melil. flor. ros. rub. ana mj. herb. hyosc. m. ʒss. farin. sem. lin. sænugr. ana ʒj. m. dentur minut. concisa pro sacculo in lacte decoquendo. Et intra novem dies, obortis interea sæpius sudoribus, habuimus levamen desideratissimum; adeo ut aliis ulterius non indiguerimus, quam corporis expurgatione, & quibusdam levibus bechicis.

Item certæ Comitissæ dysuria cum intolerabili regionis vesicæ si ve a simplici urinæ acrimonia, si ve a viscositatibus (de arena si quidem nihil fuit animadvertum) oriundo dolore: quæ tamen infra 12. horas cesserat (frustra prius applicatis quatuor clysteribus, tor unctionibus, & cataplasmatibus ex parietaria &c. combinatis) ad ab extra applicatam dolenti regioni theriacam ol. scorpion. Marth. perspersam, & ad introsumptam ex vino ʒj. radices parreiræ bravæ ante biennium per Germaniam a D. Lochnero, Illust. nostræ Academiæ directore, divulgatam. Post trium circiter hebdomadarum intervallum in idem malum reciderat eadem Comitissa cum urinæ cruentæ excretionem, & eadem ipsa remedia experta fuit sibi fuisse sicut prius, maxime proficua. Suavissime siquidem urinam promover laudata radix quomodocunque introsumpta, per se, vel cum aliquot granis salis genissæ, & ejus acrimoniam cum admiratione temperat. Quemadmodum id expertus fui quoque in memetipso, & primo his diebus apud nephriticis doloribus detentum Jesuitam.

Et denique, ut alia præteream, arthritidis illa, quam vehementem patiebatur certa puella, intra paucos dies his solis liberata: primo purgabatur hoc bolo specifico, & propterea mihi in arthritide familiaris. ʒi. elect. caryocost. ʒiij. spec. diatereb. myns. ʒj. m. cum sacch. f. bolus. Hinc ex ischiatica pedis emiserat ʒv. sanguinis, & sudabat quotidie ad hunc pulverem itidem specificum. ʒi. Pulv. march. off. microcos. phil. præpar. antimon. diaphoret. ana ʒss. cinnab. nat. præpar. gr. iij. m. f. pulv. qui mane sumatur ex decocto theæ cum decocto ligni sassafr. visc. querc. & rad. liquir. sassafr. vespere vero ex aqua beton. Et convalescerat intra dies duodecim.

His ipsissimis remediis recorder me pluries curasse quoque dolorissimas ischiaticas, solis adhuc subinde in subsidium vocatis cataplasmatibus, seu fomentis anodynis. E cura compendiosa, commoda, & tamen, si continuantur, magis, quam quis sibi persuadere possit, efficax.

Anni 1717.

QUantum ad annorum salubritatem, & humanorum corporum valetudinem conferat regulata suis temporibus proportionata aeris temperies, jam toties a nobis dictum est, præsertim in chronol. nostra med. Id quod equidem etiam manifeste comprobavit ad finem decurrens annus 1717. Is siquidem, quod hyeme fuerit competenter frigidus, præterquam circa Februarii dimidium, quo frigore eatenus exhorrescebat, ut inde vel arbores ipsæ fuerint notabile damnum perpeffa, præsertim molliores, quales sunt persicæ; vere temperatus: æstate saltem Junio, & Julio mensibus æstuosus; quamvis, quantum publica nova peregre retulerant, alibi insolenter rempestuosus: autumnus fere veris instar amœnus, humana corpora per totum adeo bene valere, ut Medicis fere nullum negotium facefferint, nisi circa sporadice patientes. Unicui occurrit, quod videbatur quibuspiam quid ex aere forte ab astris taliter infecto suam originem traxisse, epilepticæ nimirum convulsiones, quæ Septembri mense intra eclipsim lunarem, & solarem plures homines unis iisdemque diebus præter omnem expectationem adortæ fuerant. Duorum talium cura mihi obrigerat: tertii alteri meo collegæ. Duo mei ope divina fuere feliciter ad sanitatem perducti: tertius ille, qui puella septennis erat, e medio sublatus. Duo illi mei non nisi primo exacto integro triduo aliquantum ad se redire & titubanter fere incipere fuere observati: tertiam illam autem, uti dixi, quarta morbi die succumbere oportuit; num tamen revera, uti multis credebatur, ad eorum internecionem quid contulerint memoratæ eclipses? Astronomiæ cultores certius judicare noverint. Interea mihi remedia, quæ meos duos pristina valetudini restituisse videbantur, breviter specificare lubet, forte in simili casu quoque aliis servitura. Primum autem, a quo curam auspicandam esse judicaveram, erat applicatio ex acrioribus, specificisque confecti clysteris. Secundum, & priusquam clyster præpararetur, cochlearium propinandum mixtura hæc antiepileptica: ʒi. Aq. hirund. comp. cum castor. epilepticæ Langii, ceras. nigr. flor. tilia an. ʒss. liquor. cc. succin. ʒj. essent. anodyn. gr. IX. m. f. potio. Tertium & seqq. frictiones crurum deorsum versus, perunctio verticis ungu. alabastrino cum ol. rutæ, cran. hum. & succin. conmixto. Quartum columbarum, & pullorum vivorum recens per dimidium discipulorum vertici raso iterata applicatio. Quintum naribus & volatilis succini admonitio, nec non pulv. sternutatorii per pennam in nares inflatio, successive vero, & postquam ægri jam nonnihil sese recollegerant, faciliusque quid introsumere poterant, pulvis march. spec. diacinnab. myns. & volat. succini. Ultimum etiam corporis expurgatio. Quæ singula quidem etiam sæpius iterare oportuerat, quin & alteri eorum, quæ puella 17. annorum erat, & menstruis deficiebat, venam in talo tecare, priusquam plene convalesceret.

Puel.

Puellula illa septennis a 4. hebdomadis prius febricitans, erat post mortem cultro anatomico subjecta, & deprehensum, quod ejus cerebrum quoad piam matrem fuerit undique multa viscositate obductum, quoad ventriculos autem plurimo, eoque procul dubio acrissero, seu lymphâ repletum; unde vellicatum nervorum principium conjecturabatur convulsionum illarum immediata extitisse causa, meatuum cerebri a sero illo inundatio autem mortis ipsius. Prouiti ea de re perspicaciter D. Anton. Pacchionus Regiensis Medicus Romanus in *Epist. de glandulis conglobatis duræ Meningis* ad Magnif. D. D. Lucam Schroeckium data in *Ephem. Nat. Curios.* Dec. 4. An. I. & II. App.

Hinc mihi, uti reor, non vane persuadebam quoque meos duos ægrotos ex simillima causa idem ipsum malum primitus contraxisse. Primus siquidem, qui vir obesus erat valde, bibulus, & pridem quoad memoriam defectuosus, ad fauces tantas a capite defluxiones patiebatur, ut nisi ei injectionibus per os (postquam is jam aliquantulum sese recollegerat, & os aperire poterat) tempestive succurreretur, ei infallibiliter vel ex solo hoc accidente intereundum fuisset. Adhærebant siquidem frustatim utrinque circa uvulam fauces ab aere, qui ob obstructas nares inspirando saltem per os attrahebatur, indurata phlegmata nonnisi dictis injectionibus, & gargarismis inde avellenda. Frequenter etiam simillima sputa ejiciebat. In puella quidem ista causa sese non adeo clare manifestabat; conquerebatur tamen, postquam ad se redierat, de gravitate quadam oculorum, obturatione aurium, & narium, ac si eo ipsi aliquid defluxisset, qui oculi etiam ipsi diu postea debiles, & vacillantes, præque fibrarum muscularium a sero relaxatione veluti confluentes permanserant. Communiter forte & apud alios simillimum convulsionum causa est similis cerebri animia, eaque acrilymphâ inundatio, & propterea ei revellendæ, & discutiendæ nihil æque prodesse solet, quam tempestive nuchæ, brachiis, cruribusque, vel ipsi etiam naso vertici adhibita vesicantia, quæ causa forte etiam Florentinis est, quod infantibus suis vix natis, ut eos ab epilepticis insultibus, quibus illi endemice obnoxii esse solent, præservent, nucham actuali igne adurant.

Recordor etiam in aula Averspergiana ante annos ex epilepsia defunctum infantem, & postea anatomico cultro in mea præsentia subjectum cerebrum simillime habuisse constitutum.

Reliquos affectus, qui mihi alias per anni decursum occurrebant curandi, tractabam feliciter methodo, & remediis in Chronolog. mea medica notatis: puta febres, arthritides, colicas, hæmoptyses &c. Rarius tamen quid observaveram in duobus subjectis circa pulsum: nimirum quod unus eorum melancholico-hypochondriacus qui sanus communiter habuerit pulsum adeo tardum, ut priusquam subsequens pulsus consequeretur antecedentem, facile apud alium sanum tres pulsationes præerierint: qui tamen postquam elapso Augusto in febrem malignam incidisset, pulsum habuit adeo frequentem, & per omnes vitiosas differentias varium, ut talem nunquam observaverim. Propterea mox adhuc in principio morbi malum morbi exitum prædixeram. Tamen notabiles siquidem naturæ a connaturali statu recessus non possunt, nisi pessima quæque ominari. Vir alias erat robustus, & in actionibus suis accuratus, sed tardissimus, sapius vertiginosus, & subinde leviter insultibus epilepticis obnoxius.

Alter vero similiter robustus cum in febrem similem incidisset, in decimum usque diem pulsum, & urinam præ se tulerat adeo ordinatum, & naturalem, ut nisi contrarium suassent pessima quæque, quibus una detinebatur, symptomata, virum nimirum ingens prostratio, linguæ ariditas, inquietus somnus, delirium, tendinum subsultationes &c. eum quis nullatenus febricitasse, neque singulari periculo fuisse subjectum credidisset: qui 13. morbi die supervenientibus convulsionibus tamen succubuit.

Adeo parum subinde fidere licet etiam optimo pulsui, & urinæ, nisi reliqua ei bonitate corresponscant, parum etiam de præsentia, vel absentia febris edicere; quantumcunque febrium præsentia vulgo communiter arguitur vel ex sola pulsus frequentia, & inæqualitate; ubi vero hæc duo non animadvertuntur, ibi hoc ipso non censetur adesse febris.

Constitutio Epidemica Ferrariensis Anni 1715.

Dn. D. JOSEPHI LANZONI.

Postquam annis proxime elapsis lues pessima boves miserabiliter invasit, atque copiosissimi imbres tellurem inquinaverunt nostram, rotumque agrum Ferrariensem stagnantibus aquis pessime vitium vidimus, ita ut femina futuræ niessis pro majori parte perditæ fuerint, unde caritas, ac inopia anni 1715. surrexit, facta est etiam sanitatis jactura.

Martio mense vix inchoato, magnus bufonum & ranarum numerus observatus est, & crescente vere innumerabilis culicum, vermium, serpentum, muscarum, papilionum, locustarum, erucarum, aliorumque insectorum copia super terræ faciem apparuit, & liberum aeris campum occupavit, ex quo nonnulli multas ægritudines in humano genere prædixerant. Verno etiam tempore adhuc corrente maximi solis æstus in Maji fine corpora nostra vexarunt, mox aura nebulosa & humida, dolorum dentium, capitis, & rheumæ pars surrexit. quæ tamen brevi in multam est mutata serenitatem. Accessit Junius, & summis caloribus corpora nostra affecit; hinc exordium habuere febres quædam, quæ prima facie tertianæ simplicis notam præferabant, mox duplicatæ pertinaciter utrinque sexum omnesque ætates invadebant; primo enim rigor incipiebat, qui ad plures horas durabat, vomitus amari succi aderat, cardialgia, dolor capitis, & eximia succedebat sitis; in multis tormina, & ventris fluxus, in aliis summa alvi stypticitas, inappetentia in omnibus, ac vigilæ aderant. In tali, ac tanto autem numero febres istæ invadebant, ut nulla Religiosorum tam marium, quam feminarum Monasteria, nullus denique in urbe locus fuerit ab hoc febrili incendio immunis. Miserandum erat videre unum vix in domo ægrotare, dein paucos post dies totam febricitare familiam; sic cœnobîa, xenodochia videbantur, & rura repleta febricitantibus, in tinidis nonnullis ac effeminatis contagionis timorem crearunt, ægrotantes crescebant in dies, & sine salute primorum, numerum agebant secundi, ut vix sufficerent Medici ad tantras ægrotorum visitationes; dies enim licet æstivus ad tale ministerium brevis erat. In curatione talium febrium primo lenitiva proponebantur ad educendas pravas materias in primis viis hærentes, & hoc die pari, & vacua fiebat; elapsa autem impari, in qua febris redibat, ve-

næ sectio celebrabatur; sed hic notavi, die talis remedii, quo febris, quia tertiana, abesse debuerat, accessionem duplicatam, & ex simplici, duplicem factam fuisse, & continuam, sicque majus minari periculum; qua experientia edoctus, imposturum nunquam in talibus curandis febribus venam secari jussi, sed ubi opus erat, cucurbitulas scarificatas tantummodo applicari mandavi; alterantia, cordialia, clysteria, narcotica, diuretica, & sudorifica incassum semper fuere administrata; imo summum illud remedium nempe cortex chinæ chinæ, per plures dies exhibitum, parum aut nihil præstabat auxilii; siue cum vino generoso, siue in bolo syr. absynth. confecto in decoctione, tinctura, extracto, syrupis, in rotulis, aliisque modis exhiberetur. Medicorum aliqui istum pulverem cum rhabbaro, zedoaria, gentiana & centauro min. mixtum dederunt, aliique pulverem corticum fraxini, & corticum aurantium, baccarum juniperi similiter experti sunt. Si in aliquibus cessabat febris, brevi redibat, ac ter & quater recidivam patiebantur ægrotantes. Ego & uxor mea dilectissima, sub Augusti finem ab hac febre correpti, usque ad Novembr. ea laboravimus. Sic inter alios sub festo Paschatis Clariss. Dn. Hieronymus Baruffaldus Philosophiæ Doctor Excellentiss. atque amicus meus suavissimus, pertinacissimam hanc febrem, pravis stipatam symptomatibus, usque ad æquinoctium autumnale fuit passus; ego optima instituta victus ratione, & ad plures dies assumpto vino generoso, in quo chinachinæ infusa fuerat, tandem convalui; uxor vero mea, quia purgata, & aliis pharmaceuticis remediis usa est, sanguine etiam e vena pedis emisso ad febrem cicurandam, semper in pejus ruebat, & majores patiebatur febriles insultus. Modo quartanæ duplices apparebant, modo simplices, hinc tertianæ redibant, inde duplices fiebant, iterum quartana, imo in aliquibus de septima in septimam diem revertebantur febres, pertinacem, & malignam semper servando naturam. Observatum est, nonnullos aërem mutavisse, aliaque loca petivisse, ibique morantes sanitatem recuperasse. Reversi vero Ferrariam, illico a nova febre vexati sunt.

Pauca fuere funera, sed longissimæ convalescentiæ, hinc in multis obstructions obortæ, in aliis crurum, & pedum intumescencia, in aliquibus isteritia, surditas, tremor, ac scabies, signa erant infirmitatis elapsæ. Notatum fuit in pejus semper ruere ægrotos, atque recidivare faciliter, spirante euro, qui ventus pertinaciter ad plures dies perseverabat. Causam inquirentes nonnulli, nimium sideribus tribuentes, putaverunt, stellarum influxum malignum, primo boves, inde homines affecisse. Alii calorem æstatis nimis intensum, longum, atque molestum accusabant, quatenus extenuando corpora, & humores fundendo, nec non ipsos spiritus dissipando, hujusce naturæ febres excitaret. Multi in vino causam horum morborum latitare autumabant, eo quia anno elapso 1714. ob cæli inclementiam ex uvis fere immaturis vinum aciditate abundans confectum fuerit, quod assumptum crasim humorum, ac fermentorum vitiando tales febres excitaret. Non pauci cadavera boum, lue pessima anno elapso denatorum, & hinc inde passim sepulta, causam istarum calamitatum agnovere: dicebant enim, particulas nobis insensas, ac mortiferas cadaverum corruptione elevatas atque per porositates terræ ad aërem inquinandum sublevatas infectionem in humoribus nostris peperisse. Nec defuerunt, qui nimis creduli constitutionem a fascino & maleficarum artibus diabolice provenire crediderunt. Aliqui, cum quibus ego facio, cogitaverunt causam harum febrium internam fuisse humores viscidos atque tenaces, concoctum difficile ac vix separabiles, nec sine longo tempore consummi aptos; externam autem causam in vitio terræ constitutam esse, cum enim annis elapsis, ex copiosis imbribus, & fluminum diluvie, tota facies nostræ telluris tecta apparuerit, & per consequens viscera ejus coinquinata a stagnantibus aquis fuissent, unde infectæ ex pravis humoribus herbæ pascua nociva exhibuerint. Ex hoc morbi animalium, arborum multarum obitus, rubigo segetum orta, particulæ enim nitrosulphureæ assidue elevabantur, & fructus adhuc tenellos & uvas nondum maturas adurendo, spem colligendi alimenta furabantur; quin puteorum nostrorum aquæ, quibus juscula, pulles &c. conficiuntur, particulis istis imbutæ, vitium cum alimento præstabant. Qui exactam vivendi normam observant, sæpe pejus vexabantur, quam illi, qui diætæ regulas aspernati, omnis generis cibaria pro libitu ac voluntate assumebant. Aliqui intemperantes, ante accessionem largam vini generosi quantitatem potabant, ac inde se ad somnum & sudorem componebant, & nonnulli tali modo sanitati sunt restituti. Alii omnimode se abdicarunt a vino, absque ullo fructu: febres enim pari pertinacia procedebant, atque diætam, quantumvis regulis propriis exercitam, eludebant. Ad effugiendam pessimam hanc constitutionem ad rura ibant non pauci, verum quia agri nobis vicini, eadem valetudine afficiebantur, parum utilitatis experti sunt. Qui vero extra nostra confinia proficiscebantur, atque vel Bononiam, Mantuam, Patavium, Veronam, Venetias, atque Romandiolæ urbes pergebant, ii sanitatem facile recuperabant. Non minus accidit nonnullis, qui tædio affecti ad exterarum urbem se contulerunt adhuc febricitantes, ut absque alio remedio pristinam recuperaverint sanitatem, & bene valentes in patriam redierint. In puellis passim observabatur in præsentia constitutione magna lumbricorum copia; per vomitum enim & per secessum vermes in febrium exordio prodibant, & multi pueri ex hac peste denati sunt. Hystericas insuper affectiones in scæminis, talibus febribus conjunctas præter modum notavi, earumque insultus fortiores, atque frequentiores maxime in febris principio, & augmento. Fructus pene omnes verminosi, ac ingrati saporis, ita ut bonæ substantiæ fuerint illi soli, qui ab exteris ad nos mittebantur, & præsertim illi optimi succi erant, qui a Patavinis montibus veniebant. Postremo tandem observavi per publicas nostras vias, per vicos, & plateas, si quid aquæ, aut alterius humiditatis, ad paucos dies permaneret, viridem colorem, ac foetorem emittere, quod non tam facile annis transactis eveniebat. Faxit Deus, ut hæc terminante anno 1715. finem habeant, atque meliorem anni venturi 1716. constitutionem possimus sani describere.

Annorum 1716. & 1717.

FRigus hyemale quod 1715. mense Decembri incæpit, anno etiam 1716. usque ad mensem Martii perduravit; multæ nives, cum ventis borealibus super faciem terræ glaciem ad multas hebdomadas con-

conservarunt, & licet remissam sub Martii finem videretur frigus, atramen recruduit mense Aprili, & usque ad Majum non cessavit. Itaque hoc durante frigore, gravedines multæ, ac pleuritides observatæ sunt; quinimo oculorum inflammationes passim obortæ & pertinaces adeo extiterunt, ut nonnullæ ad mensem usque protractæ, patientes vexarint. Ver accessit, & imbres frequentes tellurem infestabant nostram, flumina augebant, & segetes nimio madore irrigabant; si vero mutatis ventis serenitas apparebat, vix sol igne suo terram fovebat, statim elevatis aqueis vaporibus nebulae densissimæ obortæ sunt, hinc natæ in hominibus surditates, apostemata, & vagi dolores cum flatibus. Æstas calidissima ineunte Junio derepente invaluit, unde multæ tertianæ febres, tam simplices, quam duplices obortæ sunt, cum nausea, vomitu materiæ amaricantis, capitis dolore, ac immodica siti, quin imo nonnullos tertiana perniciose vexavit, quæ omnes ope chinæ sanatae sunt, prius tamen leviter alvo exonerata. In autumnii primordiis pluvia multa, qua cessante, serenitas usque ad Kalendas Decembris continuavit, ita ut semina terræ bono ordine tradita, & magna uvarum copia feliciter collecta, vinaque optima reposita fuerint. Hoc autem tempore salubritas aeris, corporibus humanis bonam valetudinem impertita est, ita ut præter aliquas leves quartanas, & placidas erraticas febres, nil aliud mali quoad salutem Ferrariensibus acciderit; solummodo notatu dignum fuit, autumnii tempore, multas gravidas abortum passas fuisse, sine ulla causa manifesta. December sanus extitit.

Terminato Decembri, mensis Januarius ingreditur anni 1717. & frigus primo remissum apparuit; ast die hujus mensis undecima, aura septentrionalis rigida advenit, & tam fortiter agitavit auras, ut quædam arbores, quidam muri ab ejus impetu, erutæ, ac collapsi ruerint. Quatuor dierum spatio borealis hic ventus dominatus fuit, quo cessante illico magna nivis copia descendit, inde frigida serenitate favente, usque ad secundum anni mensem nives perduraverunt, mox aura dulciori reddita, dissolutisque nivibus, sub finem Februarii frigoris sævities evanuit. Hoc vero tempore, anginae multæ, colici dolores, ac febres catarrhales ubique debaccharunt, imo epidemia in infantibus tali hyeme incepit variolarum, quæ postea toto anno 1717. miserrime perseverans puerorum stragem multiplicavit, & quod notabile fuit, hujus anni hyems, quoad morbos, plus juvenes, quam senes affecit; horum enim vix unum aut alterum curandum habui. Ineunte vere multæ nebulae densiores observabantur, quæ tandem in pluvias terminabant. Sequebatur, imo semper major fiebat epidemia variolarum in puellis, ac nonnullæ malignæ febres obortæ sunt, quæ in principio leves apparebant, progressu tamen temporis funestæ, ac mortales manifestabantur, ex quibus febribus quatuor nostri medicinæ Doctores, præter alios denati sunt, primus Dn. Andreas Zuffi, alter Dn. Joseph Vaccarius, juvenis optimæ spei, tertius Dn. Cæsar Lollius discipulus meus, & quartus tandem Dn. Franciscus Salmius, ætatis annor. 5. compater meus honoratissimus, & omni scientiarum genere instructus. Parvus difficiles multi, & multæ pariter icteritiæ, Accessit æstas, cujus mensibus magna siccitas, & austrini venti calorem augebant; sequebantur malignæ febres, atque nonnullos vexabant tertianæ duplices melioris notæ, cum vomitibus in principio accessionis, ac dolore capitis sævo, qui non nisi declinante febre mitescebat. Mense Augusti nonnullæ occurrerunt dysenteriae, quæ tamen Deo adjuvante sanatae omnes fuere. Erat miserandum cernere quotidie infantum cadavera variolis enecata ad tumulum deferri. In principio Septembris cælum mutavit faciem, & calore remisso, aquas dedit sa-

lutaes ad terram irrigandam, sic maligna febrium constitutio mitigata fuit, & tantummodo subortæ vertigines, tussis, ac gravedines. Increfcente autumno iterum serenitas rediit, atque aureis solis radiis toto Octobris mense gavisi sumus. Cereris, Bacchi, ac Pomonæ dona hoc anno non modica fuere collecta, & inaletudines paucæ homines male habuerunt; non ita tamen in bobus, ac suisbus accidit; in illa quippe animalia mors falcem immisit; unde timor colonos invasit, ne epidemica lues in bovino genere anni 1713. resurgeret, & lacrymas iterum excitaret.

Cæterum præter dictas febres, & magnam variolarum copiam cum lumbricis in puellis, annus 1717. salubris dici potuit, nullæ enim apoplexiæ, paucæ quartanæ, in minima copia scabies, ac articulorum dolores. Mense Decembri hyems apparuit, sed parum ab autumno differebat, frigus enim tolerabile, ac mite observabatur. Quod vero notabile fuit hoc anno, extitit ventorum frequens copia, unde pericula multa, imo naufragia in mari Adriatico ad nostra ora, & Pado, aliisque nostris fluminibus acciderunt, subversis enim navigiis merces non tantum, sed homines etiam miserabiliter deperditi fuere. Æstivo tempore magis insectorum copia segetes infestabat, ac hominibus ruri præsertim degentibus molestiam inferebat. Arthriticos annus præsens modice infestavit, & leviter tantum tacti, cito ad consueta exercenda munia redibant. Ardente siccitate multi canes in rabiem perciti fuere, quod aliis annis mitius evenire observatum fuit. Parturientibus, ac puerperis Lucina favit, ita ut vix una puerperii vel partus tempore obierit; hystericas affectiones, ut plurimum mites, & magis in juvenibus, quam senibus tussis, & gravedines in autumnii principio, hypochondriacis, ac melancholicis præsens annus nec profuit, nec nocuit; eorum enim ordo parum consilia Medicorum imploravit, unusque ex illis tantummodo gradum fecit ad maniam, nonnullæ observatæ fuerunt icteritiæ flavæ, absque præviis morbis, vel doloribus ortæ, quæ tamen adeo leves fuerunt, ut absque læsione actionum non solum apparuerint, verum sine ullo prorsus remedio evanuerint sponte; istæ autem potius in juvenibus, quam in senibus observatæ sunt. Lue venerea affectos pessime vexatos vidimus, & multos ex hac peste mortuos, licet multa tentaverint remedia, & ad usum ipsius mercurii desperati confugerint; sic postremo Andreas Pareschius Ferrariensis gallica lue affectus post decoctâ falsæparil. Ligni Guajac. & sudoribus tentatis, tandem ad mercurialem unctionem desperatus advenit, qua admissa gingivæ, lingua, aliarumque oris partium gangræna suborta miserabile veneris sectatoribus exemplum, ultimam clausit diem; in Sanctimonialibus paucissimi morbi, & Regularium Religiosorum sacerdotum nonnulla tantum funera; nosterque Antistes Cardinalis de Verme ætatis ann. 77. febri maligna correptus sancte obdormivit in Domino, in cujus cadavere reperta sunt pene omnia viscera saria. In aliquibus nostri suburbii locis nonnullæ febres malignæ peticulares, & contagiosæ naturæ, uno enim ægotante, brevi temporis intervallo tota simul ægotavit familia; hæc tamen influenza trium tantummodo mensium spatio perduravit: accedente enim autumno omnino evanuit. Impetigines multæ in fine Novembris adultos affecerunt, quæ usque ad anni finem pertinaciter duravere. In principio Decembris ophthalmiæ multæ, pertinaces tam in maribus, quam in fœminis. Observavi tandem in multis pauperibus sola diætâ multas febres sanatas, sicque cum Jo. Damasceno in ultimo aphorismo concludendum, *Diæticam medicinam præstantiorem esse pharmaceuticâ, & chirurgicâ,*



ELENCHUS RERUM OBSERVATIONUM.

SECTIO PRIM A.

CAPUT I.

De Morbis Acutis in genere.

MOrbus naturæ conamen in ægri salutem, pag. 1. Morbi partim ab aere, partim a varia fermentatione, & humorum putrefactione, ibid. Pestis & arthritidis naturæ medicatricis instrumenta, ibid. Ratio morborum acutorum, ibid. Febres intermittentes acutis, licet minus proprie, accensendæ, ib. Chronicorum ratio, ibid. Acuti ab aeris alteratione impressi epidemici dicuntur, ibid. Acuti a particulari corporum ἀνομαλία, quovis cujuslibet anni tempore invadentes, intercurrentes seu sporadici dici possunt, ib.

CAPUT II.

De Morbis Epidemicis.

EPidemicos, tum a propriis quibusdam symptomatibus, tum a medendi ratione dispari, differre ab invicem constat, pag. 2. Febrium continuarum epidemicarum diversæ species, diversa omnino methodo sunt curandæ, ibid. Febres stationariæ ab occulta alteratione in terræ visceribus aerem contaminante pendere videntur, ibid. Stationariæ dicuntur, quæ generalem anni constitutionem sequuntur, neque extra illam comparent, ibid. Intercurrentes quæ omnibus annis competunt, ibid. Sensibiles aeris qualitates ad has producendas facere possunt, non ad illas, ibid. Unde epidemicorum alii regulares, ibid. Alii anomali, ibid. Epidemici vel sunt verna-les, vel autumnales, ibid. Vernalium alii circa æquinoctium ver-num ad statum perveniunt, circa solstitium æstivum evanescent; alii æquinoctium autumnale, brumaleque solstitium præstolantur, ibid. Cholera morbus per unum mensem, dysenteria, febres quar-tanæ, & tertianæ autumnales, vix ultra duos epidemice grassantur, ibid. Intermittentes autumnales aliquandiu sub continuatum specie nonnunquam latent, ibid. Epidemici prædominantis genio σφοδρῶς omnes se accommodant, ibid. Quo ab hyemis frigore pressio, infe-rioris ordinis epidemici se efferunt, ibid. Diversarum febrium ratio-nes a causa morbifica in humano corpore aggesta perperam dedu-cuntur, ibid. In novis febribus ad magna remedia tardius procedendum; Indicationem a lædentibus & javantibus præsertim esse sumendam, pag. 3.

CAPUT III.

Constitutio Epidemica annorum 1661. 62. 63. 64. Londini.

Tertianæ hujus constitutionis ab intermittentibus tertianis aliis differentia, p. 3. Febris continua hæc intermittentium quasi compendium, ibid. Unica hæc fuit febris continuæ species ab an. 61. ad an. 65. ibid. Quo ordine morbi epidemici hanc constitutio-nem pervadebant, & se mutuo excipiebant, ibid. Febris continua hujus constitutionis aliarum omnium præcipua videtur, ibid. Cæte-ris etiam frequentior, ibid. Symptomata ejus magis peculiariora, ibid.

CAPUT IV.

Febris Continua hujus Constitutionis.

Fermentationis atque ebullitionis vocabula minus proprie in fe-brium negotio usurpantur, p. 3. In quibus differt sanguinis ebullitio a liquorum vinosorum fermentatione, ibid. Febrilis san-guinis commotio vel ad materiæ heterogeneæ secretionem dirigitur, vel ad immutandam sanguinis diathesin, ibid. In utroque casu id maxime indicatur, ut sanguis intra modum naturæ proposito con-gruentem continuatur, ibid. Quibus nocet venæ sectio, ibid. Qui-bus eadem prodest, 4. Quibus emeticum est propinandum, quibus ab eo abstinendum, ibid. Id si prætermisum fuerit, ubi indicaba-tur, diarrhœa insequitur, ib. At non semper in febribus malignis, ibid. In quo consistit hujus diarrhœæ periculum, ib. Et ab exhibi-to emetico, non vero ab astringentibus statim sistitur, ib. Emeti-ca antimonialia periculosa nisi copiose diluantur, ib. Ubi indicatur utrunque, venæ sectio vomitorium debet præcedere, ibid. Emeticum in morbi initio propinandum, vel quovis morbi tempore, modo vires ferant, ib. Periculum a vomitione cohibita, emetico prius non propinato, ib. Post emeticum haustus paregoricus hora somni exhibendus, ib. Nonnunquam etiam diascordii dosis satis larga præ-scribenda est, vomitoria ex infusione croci metallorum nullis infra adolescentiam constitutis tuto exhibentur, ibid. Sanguinis æstus in nonnullis venæ sectione repetita, in aliis clystere alternis diebus injecto frænandus, ib. Plura de usu enematum, ibid. Cardiacæ qui-bus conferunt, & quo morbi tempore exhibenda, ib. Materiæ fe-brilis concoctio nihil est aliud quam peccantis materiæ a sana se-paratio, ibid. Despumatio circa diem 14. peragitur, ibid. Refrige-rantia post diem 14. exhibita morbum protrahunt, ibid. Cardiacæ moderatiora in morbi principio, calidiora in progressu adhibenda, ibid. Formulæ cardiacorum, ibid. Si fermentatio recte procedat, nullis omnino remediis est opus, ibid. Circa diem 15. potio pur-gans sumenda est, ne scilicet sedimentum a fermentatione hic illic depositum in sanguinem remigrans recidivam conciliet, ibid. Qua-re purgatio non ita necessaria est post febres, aliosque etiam mor-bos vernaes, atque post autumnales, ibid. Purgationis ommissio post morbos autumnales, plurium morborum fons, ibid. Catharsis ad diem decimum septimum quandoque est differenda, ibid. Diæta & regimen convalescentium, ibid. Vinum Maloganum annosum vel aliud e generosis senibus in morbi fine confert ad phlegma visco-sum expectorandum, ibid. Errores medentium quandoque in mor-

bi malignitatem, & scorbutum solent transferri, ibid. Non tamen negatur febres alias malignas esse, alias cum scorbuto complicari, p. 8. Refrigerantia & enemata serius exhibita materiæ morbificæ despumationem, maxime in grandævis, retardant, ibi. Adolescen-tulorum juxta cubantium calor his præ cæteris omnibus prodest. Cujus ratio redditur, ibid. Symptomata quædam hujus febris pro-priam sibi curam postulant, ibid. Phrenitis & vigilæ pro pacto tractandæ, ibid. Narcotica vigente febre non profunt, at in mor-bi declinatione præclaros effectus edunt, ib. Ejus rei ratio reddi-tur, ibid. Ante diem duodecimum, vel etiam decimum quartum, non sunt exhibenda, ibid. Æger, si id comode fieri possit, pri-us est purgandus, ibid. Vigilæ post febrem quomodo consopienda, ib. Oleum Amygdal. dulcium in tussi reliquis anteferendum, par-ce, at frequenter sumendum est, ibid. Narium hæmorrhagia hujus febris symptomata ut curanda sit, p. 6. Ea nonnunquam permit-tenda, utpote qua morbus critice aliquando solvitur, ib. Post hæ-morrhagiam immodicam quamlibet purgandus est æger, ne recidi-vam patiat, ibid. Singultus, senibus maxime accidens post co-piosas evacuationes, sæpe mortis est prænuncius, ibid. diascordii dosis liberalior specificis omnibus in eo sedando præfertur, ibid. Diarrhœa, ob vomitorii in principio exhibendi omissionem obor-ta, emetico sistenda est. Si ea exhibito emetico nihilominus super-venit, enema astringens injiciendum, ibid. Ad genuinam sangui-nis depurationem duplex secretio requiritur, & quæ per fæces fit, & quæ per flores, ibid. Hæc sensim & paulo pleniori διαπνοή po-tius quam sudore manifesto peragitur ut plurimum, p. 7. Separatione hac per flores jam facta, minus periculosa est diarrhœa, ib. Passionis illiacæ causa duplex, obstructio & irritatio, ibid. Quo pa-cto ea producitur, ibid. Argenti vivi & globulorum usus in ileo parum conducunt, noxam sæpe inferunt, ibid. Methodus qua ileus curandus est, ibid. Ventriculus prius est roborandus, quam inge-ratur catharticum, alias emeticum evadet, ibid. Diæta & regimen hoc morbo laborantis, ibid. Et ab eo jam convalescentis, ibid.

CAPUT V.

Febres Intermittentes.

IN febrium intermittentium paroxysmis tria tempora spectanda sunt, exhorrescentiæ, ebullitionis, despumationis, p. 7. Ratio harum omnium redditur, ibid. Qui in febribus paroxysmo pereunt exhorrescentiæ tempore fato funguntur. ib. Unde est, quod redeunt paroxysmi, ib. Paroxysmorum descriptio, ib. Paroxysmorum redup-licatio vel a materiæ febrilis excessu atque activitate, vel a prostra-tis ægri viribus producitur: in hoc casu paroxysmus adventitius prima-rium insequitur, in illo eum antevertit, p. 8. Utriusque ratio indica-tur, ib. Febres intermittentes vernaes sunt, vel autumnales, ib. Quæ quidem essentialiter distinguuntur, ib. Vernaes omnes vel quotidianæ sunt, vel tertianæ, ib. Quare paucae febres continuæ vere occurrant, nisi in constitutione epidemica, ib. Intermittentes vernaes rarissime diuturnæ, semper vero salutares, ib. Tertianæ vernaes a phlebotomia & catharsi indebite celebratis, protrahuntur, ibid. Ægorum ab his convalescentium nonnulli in maniam incidunt, ibid. Tertiana autumnalis epidemica haud semper vacat periculo, ibid. Quartanæ autumnales natu grandiores quandoque jugulant, ibid. Juniores non nisi appetente solstitio brumali frequentius etiam æquinoctium verno, ab iis liberantur, ibid. Qui semel quartana laboravit, haud diu ab ea secunda vice multabitur, ibid. Intertinentes vernaes suo arbi-trio possint permitti, cum neminem jugulent, ibid. & seq. Curan-tur nunc emetico, ibid. Nunc diaphoreticis, nunc etiam enemati-bus, ibid. Phlebotomia manu liberaliori celebrata diuturnas eas red-dit, ibid. Intermittentes autumnales haud ita facile submoventur, ibid. Earum paroxysmi plerumque una eademque diei hora variis æ-gris contingunt, ibid. Harum typus, præcipue epidemicarum primis invasionis diebus difficulter distinguitur, ibid. Quartanæ genuina au-tumni soboles, ibid. Quotidianam hac tempestate nullam observavi unquam, p. 9. Intermittentes autumnales oriuntur a sanguine in decidentia statu constituto, & proinde impressioni morbificæ magis obnoxio, ib. In febribus autumnalibus tam continuis quam inter-mittentibus, fermentatio, naturæ ductu, spatio horarum 336. aut circiter peragitur, ibid. Excipiuntur tamen istæ febres, quæ a levi aliqua offensa ex sex rerum non naturalium abusu ortum ducunt, ibid. Adolescentulorum item febres & eorum, qui sanguine spiri-tuoso sunt præditi, ib. Quæ ad fermentationem requirantur, ibid. Febres intermittentes æque ac continuæ iis sunt curandæ, quæ ad despumationis opus perficiendum adhibentur, ib. Catharsis (nisi modo intra dicendo instituta) præsertim vero phlebotomia in intermit-tentibus autumnalibus ubique nocent, ib. Intermittentium tertianarum autumnalium curatio, ib. Tertianæ duplicis curatio, ib. Cortex Peru-vianus inducias sæpius quartanæ impetrat, quam eam debellat, ib. Magno cum ægri emolumento exhibentur qui paulum ab ejus usu respirat a morbo, ib. Methodus exhibendi corticis, ib. Idem & in tertianis qua vernis, qua autumnalibus cum fructu exhiberi potest, ib. In infantibus, & florentibus ætate, five tertiana, five quartana laborantibus, tota res naturæ permittenda, ib. & seq. In provectio-ribus fermentatio cardiacorum & corroborantis diæte beneficio susti-nenda, p. 10. Aeris mutatio his necessaria est, jam perfecta san-guinis despumatione; ante hoc tempus minus convenit, ib. Saltem oportet ut medicamento cardiaco forti hoc temporis articulo utan-tur, ib. Calidiora citius exhibita, vel morbum duplicant, vel in febrim continuam permutant, ib. Sublato morbo æger sedulo pur-gandum est, ib. At non nisi elapso mense uno, a quo non paro-xysmi tantum, sed etiam ea alteratio, quæ diebus iis, in quos in-cidere debuerat paroxysmus, perferuntur, prorsus evanuerint, ib. Purgatio quoties repetenda, & quibus intervallis, ibid. Quorum haustus paregoricus hora somni assumendus singulis vicibus, ibid. Symptomata febribus intermittentibus vernaes pauca superveniunt in decli-

declinatione, autumnalibus plura, & graviora, ibidem. Hydrops hic symptomaticus unde oritur, ibidem. Juvenes raro obfident, nisi cathartici per febris decursum sæpe iteratis, accersitus fuerit, ib. Recens cathartici & aperientibus facile sanatur, ib. Hydrops ex febre intermittenti natus non nisi post febris discessum cathartici expugnandus, at infusionibus rad. raphani rusticani, fol. absinthii, baccarum juniperi, Cinerum genistæ, & similibus tentari potest, ib. Infantum ventribus inflatis, tussi, & rachitidi quo pacto subveniendum, quoties a febribus autumnalibus ista nascuntur, ib. Curatio non aggredienda priusquam febris penitus evanuerit, ib. Abdominis inflatio in pueris, & crurum tumor in adultis, febres has brevi solvendas prænuunt, ib. Veræ rachitides rarius occurrunt, nisi iis annis quibus intermittentes autumnales prædominium habent, ib. Tonsillarum dolor post febres sive continuas sive intermittentes, cum raucedine, oculis cavis, & facie Hippocratica mortem certo imminuentem præmonstrant, ib. Mania peculiaris intermittentes diuturniores excipiens, modo longe diverso ab aliis ejus speciebus, cardiacis sc. generosioribus sananda, ib. Nec venæ sectionem, nec catharsin, nec enemata potest ferre, ib. Mania communis alio modo tractanda est, ib. Eiusdem curatio, ib. Febris continua atque intermittentes jam descriptæ, soli ferme erant morbi epidemici qui per annos 1661. 62. 63. 64. emicuerunt. Eadem ab anno 1664. ad hunc usque annum, quo hæc edimus, rarissimæ Londini comparuerunt, p. 11. & seq. De variolis hujus constitutionis nonnulla, ibid.

S E C T I O S E C U N D A

C A P U T I.

Constitutio Epidemica Annorum 1665. & 1666. Londini.

Febbris continua epidemica novi generis una cum morbis aliis inflammatoriis grassari incipit, p. 11. Ejus signa diagnostica, ibid. Diarrhœa, quam in priore febre diximus assumpto emetico præcaveri potuisse, hic ab eodem provocabatur, ibid. Pestis sævissime debacchatur. Varia ejus tempora, ibid.

C A P U T II.

Febris Pestilentialis & Pestis.

Febrium nonnullarum, quæ pro malignis vulgo habentur, symptomata, non a morbi indole, sed a therapeja perperam administrata proficiunt, p. 11. Febris vere maligna cum peste specie convenit, nec ab ea nisi ob gradum remissiore discriminatur, ibid. Variolæ & pestis ostendunt morbos epidemicos a diversa aeris massæ crasi pendere, ib. Qualis ea sit plane ignoratur, ib. Pestis vix Britanniam nostram frequentius quam post annorum circiter 40. revolutionem devastat, ib. Febres quæ anno uno vel altero post graviores pestem grassantur pestilentes sunt, & similem medendi rationem sibi vindicant, ib. Præter aeris διαθεσιν requiritur etiam μίσματος a pestifero aliquo corpore vel immediate, vel mediate transmissi fomes ad pestem excitandam, ib. Quæ ab aere jam infecto latius propagatur, ib. Quoties epidemica est tempore inter veracitatem ambigente exoritur, ib. Alio aliquo tempore oppido raro, ib. Aeris dispositio quantumvis λοιμός, Pesti excitandæ per se impar videtur, pag. 12. Nec pestis epidemica erit nisi accedente idonea aeris diathesi, ib. Modus invadendi describitur, ib. Repentina examinatio nisi in pestis admodum funestæ exordio vix contigit, ib. Quibus tumores sine febre & gravi aliquo symptomate prorumpunt, ii nulla egent curatione, ib. Morborum essentia perinde ac animalium stirpiumve nos latent, ib. Non causarum, sed methodi experientia comprobata cognitione, affectuum plurimorum curatio absolvitur, ib. Pestis est febris sui generis, a particularum sanguinis spirituosiorum inflammatione originem ducens, ib. Febres pestilentes ab inflammatione sunt remissiores, ib. Ignis sacer pestis imago quædam, ib. Pestem ab inflammatione oriri pluribus argumentis conficitur, ib. Alexipharmaca aliaque calidiora medicamenta per accidens tantum prosunt, sc. quatenus diaphoretica sunt, ib. Vinum liberalius haustum & antidota fortiora complures verisimiliter in pestem præcipitarunt, p. 13. In curanda peste, aut naturæ succurremus ejusdem ductum sequendo, aut methodum tutiorem ab ejus methodo diversam substituendo, ib. Alexiteria tam in hoc quam aliis morbis omnibus, evacuationem potius sollicitando, quam virtute aliqua specifica prodesse videntur, ib. Pestis per abscessum in emunctoriis, febris pestilens, per diaphoresin maxime ex naturæ lege solvi videtur, ib. Diversa itaque his morbis medendi ratio adhibenda est, ib. Sudores in peste excitati nonnunquam funesti, ib. Bubonis eruptionem materiam alio versum distrahendo sæpe impediunt, ib. In aliis morbis naturæ ductum sequi, in peste ei renunciare Medicus tenetur, ib. Vel per sanguinis missionem, vel per sudores pestis expugnanda videtur, ib. Phlebotomia larga manu ac repetitis vicibus celebrata, nullo tumore protuberante, nemini adhuc, quod scimus, unquam funesta, ib. Parca, vel tumore jam conspicuo, instituta, quare semper damnosa, ib. Venæ sectionem in peste convenire pluresque gravissimi scriptores jam pridem senserunt, p. 14. Botalli testimonium luculentissimum, exemplis probantis innumeris, venæ sectionem in omni peste supra omnia remedia salutarem esse, ib. Confirmatur idem historia admiranda & irrefragabili hic apud nostros, ib. Pestilentis fermenti per διαφύσιν dissipatio evacuationi per venæ sectionem quo nomine anteferenda, ib. Quibus illa urgetur difficultas, ib. Maculæ purpureæ pestilenciales a fibrarum sanguinearum dissolutione oriri videntur, non secus ac vibices a plaga fortiori inflata, ib. Diaphoresi justo præmaturius abrupta, bubones prodire jam incipientes vel remanent, vel nunquam ad legitimos abscessus perducuntur, ib. Idem in variolarum abscessibus etiam accidit eadem de causa, ib. Quibus argumentis author inductus est ut aliam ab ea quam hæctenus cum successu usurpaverat methodum, novæ hinc febris adaptaret, ib. Febres continuæ circa veris finem & initium æstatis vel intermittentes, vel in pleuritides alioque generis inflammatorii morbos promptissime accessunt, ib. Febris pestilentialis (dubitatur an non vera pestis illa fuerit) tam peste jam incipiente grassari, quam eadem parcius sæviente ab autore venæ sectionibus repetitis curata fuit, ib. Sanguis hic aut sufficienti quantitate, aut non omnino detrakendus, ibid.

Quam ob causam author ab hac methodo desistere coactus est, ib. Ejus rei historia, ib. Qualem deinde medendi rationem substituit, ibid. Venæ sectio, diaphoresi præmissa, eam & tutiorem reddit, & expeditiorem, ib. Capitis obsectio ab sudores ciendos multum confert, ibid. Ubi primum materiæ morbificæ radii versus ambitum corporis se exporrigunt alvi profluvium & vomitiones ab iisdem orta ultra sedantur, ibid. Historia id confirmatur, ibid. Diaphoresis ad naturalis diei spacium semper continuanda, ibid. Ab abstersione sedulo cavendum, ib. Nec indusium nisi post horas 24. a finitis sudoribus mutandum, ib. Si sudores citius abrumpantur, recrudescit illico symptomatum sævitia, ib. Objectioni Diemerbroechii respondetur, contra prolixioris diaphoresin, ib. Ostenditur ægros haud inde debiliores reddi, at vires e contra recipere, ib. Æger in sudoris vigore iusculis ac sorbilibus confortativis refici potest, ib. Catharticum postridie exhibendum, ib. Mirus hujus methodi successus in febre pestilentiali, ib. Tumore jam enato venam aperire Author non sustinuit, ib. Qua lege tuto id tentari posse videtur, ib. Authoris sinceritas; ib. Quid per naturæ nomen intelligi is velit, ib.

S E C T I O T E R T I A

C A P U T I.

Constitutio Epidemica Annorum 1667. 1668. partim etiam Anni 1669. Londini.

Variolæ in constitutione pestilentiali rarissimæ comparebant, p. 15. Quo anni tempore invalescebant maxime, quo minuebantur, ibid. Novum febris genus cum variolis exoritur, invalescens quoties illæ minuerentur, quoties invalescerent, recedens, ib. Cum variolis una etiam disparuit, ib. Diarrhœa se his comitem adjungit, ib. Morbus hic nihil aliud esse videbatur quam febris quæ tum regnabat, introversa, ibid. Hæ variolæ genuinæ præ cæteris, ac regulares, a quibus ut in suo genere perfectissimis, tum vera morbi historia, tum medendi methodus est desumenda, ibid. Non tantum febris quædam propria, sed & peculiare variolarum genus cuilibet constitutioni peculiari competit, ibid.

C A P U T II.

Variolæ Regulares.

Quo anni tempore ingrediuntur variolæ regulares, quo etiam irregulares, ibid. Variolæ vel distinctæ sunt, vel confluentes, ib. Discretarum symptomata ubi primum invadunt, ib. Eruptio quo tempore accidit & quo se habet modo, ibid. Discretarum historia, p. 15. Confluentium historia, ibid. Et morbi magnitudo unde æstimanda, ibid. Salivatio in adultis, in infantibus diarrhœa, confluentes fere semper comitatur, p. 16. Febris in insultu primo usque ad eruptionem, dein circa tempus maturitatis pustularum præcipue dominatur, ib. Sub vesperam exacerbatur morbus, ib. Variolis discretis laborantes octavo, confluentibus vero, undecimo die maxime intereunt, ib. Illorum catastrophe describitur, ib. Regimen calidius quibus minus officiat, ib. Horum item, ib. Alia symptomata utriusque generi variolarum communia recensentur. Phrenitis sc. affectus comatosus, maculæ purpureæ, ibid. Mictus sanguineus, sanguinis sputum, a qua causa hic nascuntur, ibid. Urinæ suppressio totalis quibus maxime contigit, & quo morbi tempore, p. 17. Symptomata a frigore suscepto oriunda pauca sunt & raro occurrant, ibid. Inflammatio videtur hic morbus tum reliquorum etiam humorum, ib. Duo habet tempora, separationis & expulsionis, ibid. Indicationes curativæ duæ 1. Ut æquabilis tenor ebullitionis conservetur. 2. Ut abscessuli sustineantur debito modo, ib. Cavendum ne nimium assurgat ebullitio, & quamobrem, ib. Quo diutius natura separationem molitur, eo certius & universalius absolvit, ib. Regiminis iusto calidioris noxæ, ibid. Nondum constat vel unum ex eo perierit, quod variolæ primo non eruperint, ib. Ebullitio venæ sectione, clysteribus, emeticis, cathartice contrario non est minuenda, ib. A venæ sectionis atque aliarum evacuationum usu promovetur sæpissime eruptio, nunquam impeditur, ib. Argumenta contra remedia evacuantia, ib. Regimen calidius non tantum secretionis, sed quovis morbi tempore vitandum; & qua de causa, ib. Cavendum pariter a frigore: a quo etiam pustularum eruptio impeditur, ib. Gradus caloris earum expulsionem promovendæ accommodatissimus naturalis omnino est, ib. Cardiacorum usus quando indicatur, ib. Repetitis ebullitionibus in sanguine excitatis ægrorum mors potiori jure tribuenda est, quam venæ sectioni, ib. Curatio, ib. Variolæ ante diem quartum, qui eruptioni proprius est, haud temere in cutem propellendæ, ib. Nimia hac diligentia ex distinctis confluentes possunt fieri, ib. Non opus est, ut æger ante diem quartum lecto addicatur, ib. Sanguinis mictus, e maculæ purpureæ ætate florentibus ideo nonnumquam superveniunt, quod lectulo præpropere nimis assignatur, ib. Cardiacum blandius die quarto exhiberi potest, si eruptio parum pro votis succedat. Laudanum liquidum & diascordium reliquis præferuntur, ib. Nec vel urgente diarrhœa est illud propinandum, ib. In quo casu sanguis mittendus est, ib. In genere discreto atque æstivo tempore, æger singulis diebus per horas aliquot e lecto potest surgere, p. 18. Ejus commoda, ib. In lecto quoties jugiter cubandum est, non sunt adjicienda stragula præter ea quibus sanus consueverat, ib. Sudores non sine ingenti periculo promoventur, ib. Vinum Canarinum, vel aliud cardiacum in fine morbi exhibendum, ne halitus putridi in sanguinis massam postliminio revertantur, ib. Diæta etiam calidior eandem ob causam, ibid. Discretum genus ex sua natura omni vacat periculo, ib. Phlebotomia regimen calidius minus periculosum reddit, ib. Unde est quod tenuioribus æquior sit hic morbus, quam divitibus, ib. Variolæ confluentes haud minus a discretis discrepant, quam ab illis ipsa pestis, ib. Eger hic in lecto assidue continendus, at modice tectus, nec uni ejus parti affixus. At per sæpe versandus, ut evitentur sudores, ib. Ptyalismus, qui evacuationi per pustulas pleniori hic substituitur, in vigore conservandus, ib. Cum eruptione incipit & die undecimo minuitur, ib. Tumor faciei dicto die evanescit; cum quo si salivatio una disparereat, in lubrico sunt res ægri; ib. Salivatio quo pacto promoveri possit, ib. Narcotica ad sustentandum ptyalismum præ cæteris quibuscunque faciunt, ibidem. Quare non nisi adultis ea sunt indulgenda.

genda, ibid. Paregorica quæ afferunt adultis commoda, ibid. Post plenam eruptionem ad morbi usque finem tuto & utiliter sumuntur. ibid. Quæ hora potissimum exhibenda sunt, ibid. In variolis confluentibus hanc minus certo infantes diarrhœa comitatur, quam adultos pyralismus. p. 19. Diarrhœa in hac variolarum specie salutaris, in distincta non item. Muliercularum eandem sistentium opera multa infantum millia perire, ibid. Facies ultimis morbi diebus oleo amygdalarum dulcium inungenda, ibid. Sub hoc regimine a cicatricibus non valde metuendum, ibid. Olea & linimenta officium hic magis quam profunt, ibid. Curatio symptomatum, ib. Ad promovendum faciei intumescantiam paregoricum debet propinari, ibid. Nonnunquam die octavo, Sanguis e brachio copiose extrahendus, ibid. Auræ etiam liberiori exponendus, ibid. Non quod pustulæ recedant, perit æger, sed quod facies non turgescat, ibid. In quo variolarum genere, & quo in casu phrenesis venæ sectionem indicat, ib. Phreneticorum exempla suadent ut aere liberiori isti refocillentur, ibid. Historia miranda cujusdam pro mortuo expositi, & eo pacto convalescentis, ibid. In variolis confluentibus, si æger die undecimo a saliva jam viscidior pene suffocetur, gargarismate, vel etiam emetico fortiori sublevandus est, ib. Coma etiam sanguinis contemperatione ac ventilatione curatur, ib. Ut & maculæ purpureæ, ibid. Mictus sanguineus, & sanguinis e pulmonibus eruptio ubique mortem prænunciant, ibid. Urinæ suppressioni quo pacto occurrere potest, ib. Pustularum depressio, & diarrhœa in variolis discretis medicamenta cardiaca postulant, p. 28. Unde natus videtur tumor de crebra pustularum retrocessione, ib. Post morbum atrocioris sanguis quare e brachio extrahendus, ib. Æger ad tres vel quatuor vices purgandus est, ib. Crurum tumor sponte non facessens, quo modo tolli debet, ibid.

CAPUT III.

Febris Continua hujus Constitutionis.

Describitur hæc febris, pag. 19. Ejusdem cum variolis prolapia omnino fuit, ib. Methodo tamen eadem qua illa curari non debuit, ib. Natura hic evacuationem per pyralismum designasse videtur, ib. Unde oritur diarrhœa tam in hoc morbo, quam aliis inflammatoriis, ib. In febre constitutionis intermittentibus epidemica, materia erat crassior, non nisi prævia digestionem a sanguine separanda, ib. In hac non item, p. 20. Ejus curatio, ib. In hac febre, aliisque morbis inflammatoriis, phlebotomia & refrigerantia parum prodesse solent, si æger in lecto indefinenter se contineat, ibid. Æger in hoc morbo a sudoribus non levabatur, sed inde, pejus habuit, ibid. Quibus rationibus ductus authorum plerorumque Theoriæ hic adversatur, ib. Febris hæc a nudo potius calore, quam ab humore aliquo e sanguine expellendo, pendere videtur, ib. *Cæta, non cruda sunt medicanda*, tam sudores respicit, quam dejectiones, ib. Venæ sectio & sanguinis contemperatio diarrhœam huic morbo familiarem præ cæteris sistebant, ib. Regimen calidum & periculosus erat, & pluribus gravabatur symptomatibus, ibid. Febris hæc per salivationem non raro solvebatur, ibid. Qua oborta, nulla convenit evacuatio, ib. Refrigerantia salivationem promovent, quam reprimunt cardiaca calefacientia, ib. Diarrhœa epidemica sine febre, ejusdem cum hac febre essentia videbatur, eadem plane habens symptomata, parem medendi methodum postulat, ib. & seq.

SECTIO QUARTA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica partis Anni 1669. atque integrorum 1670. 1671. 1672. Londini.

Qui morbi ineunte Augusto 1669. sunt ingressi, p. 21. Cholera morbus mense Augusto fere finiebatur, ib. Quare tormina sine dejectionibus dysenterias duratione non æquabant, ibid. Febris dysenteria se ad tempus subducente, magis grassabatur, ib. Morbilli variolis anomalis constitutionis dysentericæ viam sternebant, ib. Quo ordine varii morbi se ostendebant per annum 1670. ibid. Quo item, anno 71. ib. Quo item, anno 72. ib. Mensis Julius certissima autumnalis epocha, uti vernarum Februarius, 106. morborum circulus per omnem hanc constitutionem, ib. Uti morbi epidemici in subiectis particularibus, ita etiam constitutiones generales suas habent periodos, ibid.

CAPUT II.

Cholera Morbus.

Choleræ morbi descriptio, p. 21. Cholera sicca, ibid. Curatio cholæræ morbi nec cathartica nec astringentibus est tentanda, & quamobrem, ibid. Quo pacto perficitur, ib. Ægro in extremis fere versante ad laudanum recte confugiendum est, ibid. Cholera morbus qui quovis alio anni tempore invadit, ab hoc legitimo toto cælo distat, ibid.

CAPUT III.

Dysenteria.

Tormina sine dejectionibus nec sua natura nec curationis methodo multum a dysenteriis diffidebant, p. 22. Dysenteria autumnali initio solet invadere, appropinquanti hyemi cedens pro tempore, ibid. Dysentericæ descriptio, ibid. Cardiacorum & regiminis calidioris in hoc morbo incommoda, ib. Intestina quandoque gangræna afficiuntur, ib. Aphthæ mortem imminuentem ut plurimum denunciant, ib. Hic morbus licet adultis, maxime grandævus, sæpe exitialis, infantibus perbenignus est, ibid. Epidemici ubi primum oriuntur principio magis spirituosos videntur inhærescere, & ad occasum vergentes magis crassi indies atque humorales redduntur, ibid. Id contigit ob refractas particularum inimicarum vires, a quibus pendet constitutio epidemica, ibid. Probatum exemplo pestis & dysenteriarum, ib. Curatio, ib. Dysenteria hæc febris videtur intestina introverta, ibid. Humores acres vena secta revelandi & per cathartica educendi. Sanguis contemperandus, ib. Pa-

regoricum quare temperatius hic exhibendum quam post purgationes solet, ib. Aqua cardiaca temperatior post venæ sectionem & catharsim semel celebratam concedenda maxime grandævioribus, p. 23. Hi etiam lectulo magis addicendi, ib. In morbo contumaciori paregoricum singulis diebus mane & sero ad septimanas aliquot tuto potest, & debet exhiberi, ib. Curatio alvi fluxus ad diarrhœam tantum assurgentis, ibid. Infantes quo pacto in hoc morbo tractandi, ib. Laudani liquidi simplicior præparatio, ib. Narcoticorum vis non tam ab artificiosa præparatione, quam ipsius opii excellentia nativa videtur pendere, ibid. Opium est remedium cardiacum præstantissimum, si non unicum, hæcenus cognitum, ibid. Dysentericæ, incipiente illa constitutione, ad modum fere cholæræ morbi optime curabatur, non item sequentibus annis, ibid. Dysenteria eodem modo in Africa per ea tempora sanabatur, ib. Exempla aliquot adducuntur, ibid. Tenesmus sub finem hujus morbi non est ab ulcere recti, sed a materia mucosa qua intestina duplicantur, ibid. Topicum qualecunque hic nocet, ibid. Sola diætæ analeptica prodest, ibid. Dysentericæ inveteratæ venæ sectione repetita curatæ exemplum, ibid. Dysenteria, cum non sit epidemica, laudani solius usu est curanda, ibid.

CAPUT IV.

Febris Continua hujus Constitutionis.

Febbris dysenterica describitur, p. 23. Aphthæ unde tam in hac febre, quam in dysenteriis pervicacioribus, ibid. Aeris qualitates manifestæ non sunt causæ epidemicorum productivæ; eos tamen vel excludunt, vel admittunt pro tempore, ibid. Febris stationaria quæ ad epidemicum prædominantem attinet, Julio potissimum sævit: Autumno vero appropinquante, magno epidemico cedit, ibid. Nominatæ febres symptomata varia a sua natura aliena, a manifestis qualitatibus mutantur, ib. Unde tot febres novæ vulgo audiunt, ibid. Febris speciem optime dignoscet, qui ad alios morbos eodem anno ingruentes diligentius attenderit; & ad symptomata modum evacuationis spectantia, p. 24. Ad methodum insuper, vel medicamentum, a quibus febris facillime vincitur, ib. Februm stationariorum symptomata vel intensiora sunt, vel remissiora, prout intenduntur vel remittuntur symptomata epidemicorum ad quos pertinent, ibid. Febris hæc eadem methodo qua dysentericæ curabatur, ibid. Nisi quod paregorica purgationibus interjecta obessent, ibid. Tardius convalescentibus laudanum in parva dosi, biduo triduo a postrema catharsi elapso rite concedebatur, ibid. Auræ liberior usus viribus renovandis in primis conferebat febre fugata, ibid. Unde ansa ad hanc praxin instituendam data est, ibid. Ad comprobendam medendi methodum in acutis requiritur ut morbus quasi suo sponte cedat, ib. Adolescentes stupore ad carum accedente percussi, maxime qui in sudoribus extorquendis operam collocant, nulla arte sublevari poterant, ibid.

CAPUT V.

Morbilli.

Morbilli quo anni tempore regnant, p. 24. & seq. Eorum descriptio, ibid. Et historia, ib. Regimen iusto calidius quæ hic afferat incommoda, ibid. Et quo pacto iisdem possit subveniri, ib. Morbillorum curatio, ibid. Morbillis & natura & medendi ratione cum variolis convenit, ib. Infantes febre, dyspnœa aliisque accidentibus post morbillorum discessum laborantes, venæ sectione sola liberantur, ibid. Phlebotomia haud minus tuto infantibus quam adultis, ibid. Convulsionibus puerorum dentientium præ specificis quibuscunque opem fert, ibid. Infantum item pertussi, vel tussi convulsivæ, ibid.

CAPUT VI.

Variole Anomalæ hujus Constitutionis.

Variolæ anomalæ distinctæ quibus discriminabantur a genere distincto regulari, pag. 25. Ad confluentium naturam illæ propius accedebant, inflammationis majoris participes, ibid. Confluentes anomalæ quibus discrepabant a confluentibus regularibus, ibid. Curatio variolarum utriusque generis, ibid. Inflammatio in his quam in regularibus intensior, regimen temperamentum magis adhuc efflagitabat, ib. Fluxus mensium, tempore non consueto, liberalem liquorem refrigerantium usum suadet, & quare: ibid. Remedia cardiaca & regimen calidius hic adhibita plurimas mulieres pessunderunt, ibid. Historia cujusdam fluxu mensium una cum variolis laborantis insignior, ibid. & seq. In genere discreto satis erat ut æger pro sitis modo cerevisiam tenuem potaret, p. 226.

CAPUT VII.

Colica Biliosa.

QUO nomine hic venit tractanda, p. 26. Vel dysenteriam diuturniorem excipiebat, vel a febre ordiebatur, ibid. Ejus morbi descriptio, ib. In iliacam passionem facile transit, ib. Causa morbi est acris aliquis sive humor sive halitus e sanguine in intestina excussus, ibid. Curatio venæ sectione & cathartico leniente perficitur, ibid. Si a fructibus horariis aut cibo *δυσπντω* oritur morbus, ventriculus est eluendus & anodynum exhibendum antequam secetur vena, ibid. Quando intendendæ catharticonum vires, & quam ob causam, ibid. In magna ventriculi debilitate & vomitione narcoticum cathartico præmittendum, ibid. Anodynum mane & sero exhibendum quotidie, & spatio inter purgationes medio, & post singulas purgationes, ibid. Turfissime repetuntur narcotica urgente hujusmodi dolore, non item ubi ille desierit, ibid. Enemata carminantia diuturniorem morbum reddunt, ibid. Cum evacuationes copiosiores non diu ante colicæ adventum fuerint institutæ, a paregoricis omnino incipiendum est, pag. 27. Ejus rei exemplum proponitur, ibid. Equitatio, cæteris non proficientibus, curationem nonnunquam absolvit. Cautiones circa eam, ibid. Exemplum memorabile, ibid. Unde est quod equitatio tantum præstet in morbis chronicis quam plurimis, ibid. Qualis diætæ hic conveniat, ib. In morbo diuturniore, & magna debilitate a quæ epidemica, mirabilis, aut alterius similis usus debet concedi; & qua-

& quare, ibid. Diæta tenuis quare aliquandiu post depulsum morbum est observanda, ibid. Colica hysterica biliofa simillima, ibid. Quibus potissimum fœminis contingit, ibid. Ejus descriptio, ibid. Levissima animi commotio dolorem revocat, ibid. Exercitium item præmatu-
re nimis susceptum, ibid. Vapores, sic vulgo dicti, symptomata pa-
riunt parti quam obfederint accommoda, plerisque morbos affabre
simulantes, ib. Colica hysterica biliofam nonnunquam mentitur, ibid.
Quandoque etiam vel renum, vel etiam vesicæ calculum, Enemati-
bus, aliisque lithonripticis exasperatur, ibid. Sedatur anodyno, ibid.
Nulla corporis pars, sive interna, sive externa ab ejus insultu eximi-
tur. ib. Nec venæ sectio, nec catharsis hic celebranda. Nocent &
enemata, ib. Hic morbus a spirituum ἀταξία potius quam vitio hu-
morum videtur nasci, ibid. Emetica etiam frustra propinantur, ib. In
fœminis tamen temperamenti magis sanguinei & viraginis, non-
nunquam vel phlebotomia, vel catharsis, vel utraque anodyno via
aperienda est. Hæc methodus doloris symptomata tantum respicit,
non causam morbi, ibid. Hic morbus in ictero solet desinere, ibid. In
cujus curatione nulla purgantia nisi rhabarbarum & similia sunt usur-
panda, ib. Hujus icteri curatio, ibid. Curatio icteri communis, ibid.

S E C T I O Q U I N T A.

C A P U T I.

Constitutio Epidemica Anpi 1673. atque integrorum 1674. 1675.

Exolescente constitutione dysenterica, nova suboritur circa initium
Julii 1673. Syllabus morborum se per hoc triennium excipien-
tium, quo ordine invalescebant, recedebantque, pag. 28. Dysenteria
& diarrhœa pro hujus febris symptomatibus potius quam morbis es-
sentialibus erant habenda, ibid. Post subitam tempestatis mutatio-
nem catarrhi & tusses se huic febrī adiungunt, unde nascuntur sym-
ptomata peripneumonica & pleuritica, febre eadem manente, ibid.
Constitutio hæc perquam est anomala, ut & ejus morbi, ibid.

C A P U T II.

Febris continua hujus Constitutionis.

Nascente morbo majora erant inflammationis signa, quam eo
jam provectiore; pag. 28. Symptomata huic febrī peculiariter re-
censentur, ibid. Affectus quidam comatosus hanc febrim comitaba-
tur, nonnunquam in aphonia desinens, ibid. Qui eo passu discessit
quo vires æger resumpsit, ibid. Remedia calidiora & diaphoretica
symptomata hoc accersebant, ibid. Ubi primum erupit hæc febris, nul-
lum habuit epidemicum sibi σύγχρονον, unde ejus species difficiliter
investigabatur, ibid. Phlebotomia in hac febre haud plus semel ce-
lebranda erat; repetitis enematis ac medicamentis refrigerantibus
curatio absolvebatur, ib. Epispastica posteriori cervici applicata hic
magis ex usu quam in aliis febribus, ibid. Curatio ib. & seq. Ene-
mata quo usque repetenda, p. 29. Quare e lecto surgendum erat quo-
tidie, ibid. Cavendum tamen ne diutius quam par est æger e lecto
absuerit, ibid. In morbi declinatione tutius æger in lecto jugiter de-
cumbit, quam vel initio, vel in statu; & quare, ibid. Diaphoresis
non omni febrī debetur, ib. Sudores a prævia digestionē fluentes pro-
sunt, nocent alii, ib. Intermittentium paroxysmi, & febris ejus con-
stitutioni παραμυή sudorem criticum postulant, ib. Febris item pe-
stilentialis vel primis morbi diebus, ibid. In hac febris specie, quæ
sine sudoribus potuit fugari non sine discrimine ii. sollicitabantur,
ibid. Stupor comatosus a nimia curatricum diligentia sudores impor-
tune provocant, ut plurimum inevitabatur, ibid. Quo pacto sym-
ptoma hoc vincebatur, ibid. In morborum curatione nocet quando-
que festinatio, p. 30. Etiam incongrua ciborum genera convalescentibus
nonnunquam indulgenda, ib. Spiritus vitrioli ad phrenesin debellandam
egregie contulit, ibid. Dysenteria symptomata quo pacto tolleba-
tur, ib. Diarrhœa a narcotico, ubi opus erat, sistebatur, ibid. Nar-
coticorum usus hoc solo in casu hic erat probandus, ibid. Convale-
scentium sudores nocturni unde orti, & quo modo tollendi, ibid.

C A P U T III.

Morbilli.

Morbilli anomali hujus constitutionis quibus maxime differe-
bant a regularibus jam descriptis, pag. 30. & seq. Febris
morbillosa nunc venæ sectionem tulit, nunc enemata: *Methodo*
morbillis dicatæ concessit, ibid.

C A P U T IV.

Variolæ Anomale hujus Constitutionis.

Variolæ hujus constitutionis nigras anni 1670. satis referebant,
pag. 30. Putredinis majoris erant soboles naturæque magis
crassæ ac inconcoctilis, ibid. Quanto mitior morbi species, tanto
citius pustulæ ad maturitatem, morbus ad finem perducitur, ibid.
Per tres hæc constitutiones, posterior variolarum species priorem
semper exuperavit, tum quoad majorem putredinem, tum quoad
morbi materiam minus coctilem, ibid. Species nova hæc videtur e
priore jam inveterascente suborta, ibid. Morbi epidemici ab aere
effluviis a minerali aliqua fermentatione repleto, oriri videntur,
ibid. Eousque propagantur, donec expiraverit subterranea illa hali-
tum minera, ibid. Curatio, ibid. Indicationes plane contrarias sug-
gerit hic morbus, ibid. Quæ in variolis aliis confluentibus feliciter
cessit methodus, hic non profecit, ibid. Spiritus vitrioli omnem
numerum absolvit, ibid. Quo tempore & modo exhibendus, ibid.
Quæ ab eo liberalius sumpto commoda, pag. 31. Nihil ab eo incom-
modi, licet salivationem fere sistat, cujus vicem subeunt dejectiones
aliquot, ib. Nullum variolarum vestigium vel apud Hippocratem
vel Galenum, unde excusator methodus nova, cum modernorum
tantum curationibus adversetur, ibid. In curatione febrium vario-
losarum eadem pariter de causa innovandum fuit, ibid. Videntur
morbi certas habere periodos pro occultis alterationibus quæ ter-
ræ visceribus accidunt, pro varia scilicet ejusdem ætate ac duratio-

ne, ibid. Unde novæ morborum species exoriuntur, prioribus etiam
extinctis, ibid.

C A P U T V.

Tusses Epidemica cum Pleuritide & Peripneumonia supervenientibus.

Ex improvisa symptomatum mutatione febris, quæ eadem ma-
nebat, pro pleuritide essentiali, aut essentiali peripneumonia
ab incautioribus est habita, p. 31. & seq. Medendi methodus ea-
dem quæ febrī hujus constitutionis quadrabat; ab illa vero quæ
pleuritidi veræ conveniebat, longe diversa, p. 32. Non eo anni
tempore invadebat febris hæc, quo solet pleuritis, ib. Curatio,
ibid. Tussis ex qua προφύσσει nascitur, ut & febris eam comitans,
ib. Nova hæc febris in febris stationariæ tum regnantis nomen &
familiam statim transit, ibid. Tussis sine febre, abstinentia a car-
nibus, moderato exercitio, & præsana pectorali refrigerante cura-
batur, ibid. Nec narcotica, nec liquores spirituosi, nec diaphore-
tica hic tuto usurpabantur ad sedandam tussim, ibid. Et quare e-
nemata (tam in hac quam aliis febribus) fractis jam morbi viri-
bus non sunt repetenda; maxime in fœminis hysteris, virisque
hypochondriacis, ibid. Pleuritis vera sola repetita venæ sectione
curatur. In hac febre semel, vel ut plurimum bis, venam secasse
satis erat, ibid. De pleuresi maligna dicta, quæ venæ sectionem
non fert, ib. In pleuresi symptomata non multo plus sanguinis
symptomatis ratione educendum est, quam febris nomine, a qua
pendet, educi debuisset, ibid. In febrium curatione anni consti-
tutio, quatenus huic alterive epidemico producendo faver, ob o-
culos semper est habenda. ib. Curatio tussis sine febre, ib. Maligni-
tas in particulis calidissimis ac spirituosissimis, humorum in huma-
no corpore contentorum naturæ adversantibus, consistere videtur,
ibid. Particulæ dictæ assimilando agunt, ibid. Hæc in peste sudori-
bus eliminari possunt; Non vero in iis febribus, in quibus particu-
læ assimilantes non ita sunt subtiles, ibid. Ufu calefacientium
actuata, magis assimilant particulæ calidæ, & humores extenuati
minus resistunt, ibid. Docet experientia purpureas febrium maculas,
& variolarum pustulas nigras a calefacientibus augeri. A regimine
vero moderatori minui solet, ibid. Particulæ νοσινπαι in peste ita
quandoque subtiles sunt, ut ne sanguinem quidem in ebullitionem
attollant, unde æger sine febre perit, ibid. In malignis aliis epide-
micis ita parca febris signa conspiciuntur, nonnunquam ob confu-
sionem in sanguine & humoribus nonnunquam etiam ob metasta-
sin mineræ maligna in genus nervosum, vel alias corporis partes,
ibid. Nulla alia methodus medendi malignitati qualicunque, præ-
ter eam quæ epidemico cui inhæret, debetur, ibid.

C A P U T VI.

Anacephaleosis.

Quinq̃ue constitutionum genera, quinque nimirum aeris diatheses,
quæ totidem febrium epidemicarum species peculiares produce-
bant, hoc tractu describuntur p. 33. & seq. Harum prima, depurato-
ria quæ dici potest, præcipua naturæ febris, p. 48. Huic adaptantur
axiomata quæ tradiderunt Hippocrates alique Medici antiqui: sequen-
tibus febrium speciebus vix accommodanda, facile transibant, in aliis
vero rarissime, ibid. Febris continuæ species potest dignosci, primo
ab aliis epidemicis eo locorum tum grassantibus, ibid. Secundo a
propriis cujuslibet febris symptomatibus, ibid. Ægri sive sudatio, sive
siccitas in hoc vel illo morbi tempore, febris speciem præ cæteris
demonstrat, ibid. Cognitio speciei novæ febris vertente primum an-
ni constitutione, a perdiligenti atque accuratissima circumstantia-
rum omnium observatione pendet, ibid. Indicatio a juvantibus &
lædentibus sumenda ad curationem saltem relinquitur, ibid. Ubi
nondum constat, quid sit agendum, nihil agendo & Medico &
ægro optime consultitur, ibid.

S E C T I O S E X T A.

C A P U T I.

Febres Intercurrentes.

Febres stationariæ quæ a particulari anni constitutione pendent,
& singulæ suo ordine grassantur. Intercurrentes quæ cum statio-
nariarum quibuslibet, ut etiam & secum invicem eodem anno diffe-
rentes commiscuntur, p. 33. Intercurrentes sunt febris scarlatina,
pleuritis, peripneumonia notha, rheumatismus, febris erysipelato-
sa, angina. In his, febris morbus primarius videtur, & reliqui affectus
tantum ejus symptomata, κρίσις modum, vel partem in qua illa
sit, spectantia, ibid. Intercurrentes nonnunquam, licet non ita fre-
quenter ac stationariæ, epidemicæ grassantur, ibid. Duo hæc febrium
genera quoad causas externas sæpenumero conveniunt, ib. Plures præ-
matura vestium abiectione, & subita refrigeratione post exercitium,
quam peste, gladio & fame simul omnibus, pereunt, ibid. Vestes
quibus quis assueverit non nisi mense uno ante solstitium æstivum
sunt deponendæ, ibid. Quoties hi morbi essentielles non sunt, sed fe-
brium stationariarum symptomata, ista methodo tolli debent qua fe-
bris illa curatur, ibid. In genere ad anni febrim serio attendendum
est, ibid. Qualia sunt symptomata quæ invasionem febris stationariæ
comitantur, talia omnino erunt symptomata quæ insultum sive an-
ginæ sequuntur, quoties ejusmodi febris accidentia sunt tantum;
quo ab essentialibus distinguuntur, ibid. Anni tempus quo intercur-
rentes plerique infestare solent, essentielles ii fuerint, an sympto-
matici, subinnuit, ibid. In febrium curatione maximi momenti est
scire qua porta sit excludenda materia febrilis, ibid.

C A P U T II.

Febris Scarlatina.

Exunte æstate ut plurimum invadit præ cæteris, p. 34. & seq. De-
scriptio morbi, ibid. Curatio, ib. Nec venæ sectione, nec ene-
matibus, nec cardiacis est opus. A carnibus tantum & spirituosis li-
quoribus æger abstineat, nec foras prodeat, nec lecto perpetuo affiga-
tur. ib. Quid agendum, si convulsiones vel coma supervenerint, ib.

CAPUT III.

Pleuritis.

QUare tempore inter ver & æstatem medio potissimum invadat, pag. 34. Temperamento sanguineo præditos rusticos frequentissime aggreditur, ib. Morbi historia, ib. Febribus quandoque supervenit, sæpissime ex intempestivo ac præpostero calidorum medicamento- rum usu, ib. De pleuriticorum sanguine quædam notatu digna, ib. Curatio pleuritidis, ibid. in adultis raro minori quam 40. circiter uncia- rum sanguinis impensa sanatur, ibid. Diarrhœa repetita venæ sec- tione sistitur, ibid. Æger e lecto quotidie eximendus ad horas ali- quot, ibid. Hic morbus expectorationi eliminandus non sine ingenti periculo committitur, ibid. Curatio puncturæ tendinis, ibid.

CAPUT IV.

Peripneumonia Notha.

SUB hyemis exitum emergit: Paulo habitiores & crassos, virilem ætatem affecutos, vel prætergressos, liquoribus spirituosus addictos præcipue aggreditur, p. 35. Morbi descriptio, ibid. In habitioribus nul- la fere febris indicia, vel ob interceptam circulationem, vel pitui- ræ, qua sanguis gravatur, copiam, ibid. Curatio venæ sectione, re- mediis pectoralibus, diætâ refrigerante perficitur, ibid. In crassioribus maxime ætatis florem prætergressis cum minus feliciter cedat venæ sectio, repetita catharsis crebrior est substituenda, ibid. Sanguis e brachio ægri in lecto jacentis extrahendus, ibid. Vera peripneumo- nia a pleuritide in eo tantum differt quod pulmones universaliter afficiat, ib. Notha hæc peripneumonia ab asthma sicco distingui- tur febre, quam illa semper habet comitem, ibid. Quam egregia præstat spiritus vini in ambustorum curatione, ibid.

CAPUT V.

Rheumatismus.

ANnis florentes maxime, atque autumnio præcipue invadit: a re- pentino frigore post calefactionem admissa plerumque oritur, pag. 36. Morbi historia, ibid. Febris sæpe recrudescit ob materiam morbosam intempestivo externorum usu percussam, ibid. Arthritis sæpe audit hic morbus, quoties a febre sejourgitur: non est tamen, ib. Eo desinente æger nonnunquam membrorum motu ad mortem usque privatur, ibid. Lumbago rheumatica, alia hujus morbi species, de- scribitur, ibid. Morbi curatio, ibid. Utraque morbi species ab inflam- matione orta, venæ sectione & refrigerantibus tollenda est, ibid. & seq. Ab anodynis abstinendum, quorum usu morbus finitur, ibid. Quo tempore purgandus æger, ibid. Dolores a rheumatismo imperite tra- ctato reliqui pro scorbuticis sæpe habentur, ibid. Scorbutus non ita frequens apud nos morbus, atque a vulgo putatur, ibid. Multi ex iis affectibus qui scorbutici audiunt, vel affecta sunt morborum fientium, vel nondum perfecte devictorum reliquæ, ibid. Probatum illud exem- plo arthritidis, podagræ, atque hydropis, ibid. Methodus medendi non adulterinis illis symptomatibus, sed ipsi morbo, seu perfecte formato est accommodanda, ibid. In rheumatismo inveterato lon- gius spatium inter venæ sectiones repetitas est interponendum, ibid. Fontanella in crure, & spiritus quivis volatilis hic profunt, ibid. Rheumatismi scorbutici curatio, ibid. & seq.

CAPUT VI.

Febris Erysipelatosa.

DESCRIBITUR morbi species notissima, pag. 27. Describitur species alia rarius occurrens, ib. Curatio materiam peccantem evacuan- tibus, partibus jam impactam discutientibus, & sanguinem contem- perantibus, absolvenda, ibid. Topicis etiam post catharsin applicandis, ibid. Quæ diætâ hic conveniat, ibid. Pruritus ferini curatio, ibid.

CAPUT VII.

Angina.

TEMPore ver atque æstatem interjacente juvenes præ cæteris, & temperamento sanguineo præditos, rufos item, invadit, pag. 37. Morbi descriptio, ibid. Curatio sanguine copiose detracto primum e brachio, mox ex ranula utraque; litu ex melle rosaceo & spiritu vi- trioli, gargarismate, dein catharsis perficitur, p. 38. Enema etiam re- frigerans emolliens quotidie injiciendum est. A carnibus, a lecto per horas aliquot singulis diebus abstinendum, ibid. Angina sympto- matica eadem methodo, qua febris, cujus symptomata est, debet cu- rari, ibid. Nonnullæ febres intercurrentibus annumerandæ, vulgo pro symptomatibus tantum habentur, ibid. hujusmodi sunt hæmorrhagia narium, hæmoptoe, ibid. Describitur narium hæmorrhagia, ibid. Eiusdem curatio, ibid. Quo nomine catharsis hic instituenda, ibid. Hæmoptoe ejusdem fere indolis cum hæmorrhagia jam tractata, ibid. Eandem fere quam hæmorrhagia methodum medendi sibi vin- dicat, nisi quod catharsin minus ferat; a qua, præsertim repetita, æger facile in tabem conjicitur, ibid. Conclusio, ibid.

Epist. Resp. prima.

ANnus 1676. eosdem peperit morbos quos prægressi 1673. 74. & 75. pag. 40. Exolescente hac crasi, mitiores quam pro suo genio evadebant morbi, & minus epidemici, ibid. Non tam manifesta, quam occulta aeris temperies morbis epidemicis favet; nisi quod sym- ptomata aliquando, ibid. Morbilli licet non admodum epidemici, lon- gius tamen quam pro more suo procurrebant, ibid. Non tamen di- versam medendi methodum ad usitata postulabant, ibid. Exeunte æstate, cholera morbus epidemicæ sæviebat, atrocioribus solito con- vulsionum symptomatibus stipatus, ibid. Anodyna fortiora, & fre- quentiora quam alias unquam indicabantur, ibid. Historia eo laboran- tis, & convalescentis, ibid. Usque augenda, & repetenda est laudani liqu. dosis cum symptomata subjugaveris, ibid. Tres sunt effectus in quibus opio parata indicantur, ibid. Dosis & repetendi vices cum symptomatis magnitudine sunt conferendæ, ibid. Anno 1677. sicco pede præterit Author, per integrum ejus decursum valetudinarius, ibid. Anno 1678. febres intermittentes per 13. annos exultantes epide-

micæ rursus audiunt, ibid. Hyeme paululum fatiscientes variolis, aliis- que per id temporis epidemicis locum cedebant, ibid. Olim quar- tanæ frequentius occurrebant, nunc dierum aut tertianæ, aut quo- tidianæ, & moris plane diversi, ibid. Cardiacis, & regimine calido adeo præter indolem suam incrudere, ut tacto cerebro haud pauci extinguerentur, ibid. In tertianis & quotidianis per sudorifica cura- tionem moliri periculosum est, ib. Ita enim quæ intermittebat febris, fit continua, ibid. Æthiologia ejusdem, ibid. Venæ sectio & cathar- sis morbum protrahunt, ibid. Nonnunquam e longo corticis Peruvia- ni usu species quædam rheumatismi scorbutici inducitur; sed rarissi- me, & facile curatur, ibid. Cortex insignium est virium non in hoc tantum morbo, sed & in uteri, & ventriculi affectibus, ibid. Ob quæ præjudicia, & rationes temere deductas cortex male audit, ibid. Vel ipsos curavit quos purgavit, ibid. Haud illæ nobis arrogandæ sunt facultates quas natura negavit, ibid. Provocantur Philosophi ad unicam differentiam specificam in natura enodandam, ibid. In mor- borum curatione non oportet alicui hypothesi indulgere: sed reje- ctis speculationum commentis, experientiam cum recta ratione con- junctam tanquam indicem, atque magistrum sequi, ibid. Cortex Pe- ruv. 25. plus minus abhinc annis primum cœpit inclarescere, ibid. Duæ causæ memorantur, ob quas in desuetudinem abierat, ibid. Hercu- leum est medicamentum si qua par est cura propinatur, ibid. Qui- bus rationum momentis ductus est Author ut hanc suam methodum excogitaret, ibid. Methodus exhibendi, ibid. Vel in forma pilul. vel electuar. vel in infus. ibid. Si obidiosyncrasiam (quod sæpe accidit) expurgetur æger, cum laudano est exhibendus, ibid. Eadem metho- dus (sed in dosi minori) valet in tertianis, & quotidianis, pag. 41. Tertianæ, quotidianæque non ita raro in continuarum fere speciem vergunt, præsertim ægro regimine justo calidiore multato, ibid. In quo casu a remissione quantumlibet exigua oportet corticem in- gerere, nec paroxysmum præstolari, ibid. Maxime continuis apyre- xiam conciliat Cortex, modo regimine justo calidiore non impe- diatur vis, ibid. nec obstat vinum in quo exhibetur, ibid. Quo ma- gis proclivis est in continuitatem febris, eo majori in dosi detur Cortex, ibid. Quibus arridet infusio paretur, ibid. Si vomituritio in- cesserit laudata hic methodo est compescenda, & tunc Cortex in- gerendus, ibid. Teneræ infantium ætati Julapium accommodatur, ibid. Quare in tertianis sæpe, & quotidianis medicam, non nisi post biduum curationem, absolvit, ibid. Si omni adhibita cautela æger re- cidivam patitur, decoctum amarum exauctorato cortici succenturi- tur, ibid. Æger nec a cibo, nec potu qui ad stomachum facit, ar- cendus est, fructibus horariis, & liquoribus frigidis exceptis, ibid. Carnibus eupeptis, euchymis vescatur, vinoque modice utatur, ibid. Aura frigidiior viterur, ut & omnes evacuationes, blandis. enim Catharsis, vel enema e lacte saccharato in recidivæ discrimen con- jicit, ibid. Febres Symptomatibus stipatæ quæ Apoplexiam veram mentiebantur, ibid. Quibus indicis judicandum, ibid. Cautio de me- thodo medendi, ibid. Senes imperite tractati in Diabete aliquan- do incidunt, ibid. In omni Diabete invigorandus est sanguis, ibid. Methodus therapeutica, ibid. Medicam. formulæ, & diætæ, p. 42. Eadem methodo, (nisi quod præmittenda est phlebotomia & Cathar- sis) sanatur & fluor muliebris, ibid. In tertianis verminabilibus, tem- peramento sanguineo, & flore ætate quid agendum, ibid. Me- thodus in gratiam pauperum, ibid. Anno 1679. sub initium Julii ex- dem febres vires deintegrabant, & mense Augusto immanissime debac- chabantur, ibid. Cum Novembri subingrediebantur tusses *ἄσθμη μικρά*, quarum mala indoles adumbratur, ibid. Ad tussim puerorum convulsivam proxime accedebant, ibid. In earum causam inquiritur, ibid. Curatio recte insistitur Venæ sectione & Catharsis, ib. Pectora- libus gratificamur ægris, sed non diu iis immorandum, & quare, ibid. Sudorifica non ita tuto adhibentur, ibid. Sæpe iis accenditur Pleuritis, ibid. Misto sanguine, & epispastico nuchæ applicato Cathar- ticum propinatur, ibid. Qua sola methodo tussis puerorum convulsi- va expugnatur, ibid. Ratio redditur quare in omnibus morbis epi- demicis phlebotomia Catharsis præmittenda est, ibid. Cui multiplex experientia, dux & magistra opt. suffragatur, ibid. Empirici & scio- li perstringuntur, ibid. In accurata Naturæ operationum observatio- ne vera praxis med. fundatur, ibid. Febres duas e tribus in medicina faciendæ partes occupant, ibid. In quem scopum unice collimant Empirici in earum curatione, p. 43. Non facile dijudicant speciem, ibid. Quævis peculiarem postulant medendi methodum, ibid. Eadem per diversos gradus diverse tractanda, ibid. Minutiora quæ observan- da sunt non facile enumerantur, ibid. Semper erit quod posteri ad- jiciant, ibid. Tussis modo dictæ, si imperite tractentur, febrem ac- cendebant, ibid. Methodus therapeutica, ibid. In febre a tussi si ter purgetur æger, sufficit, ibid. Post mensem unum vel alterum cessa- bat tussis, sed febris quoad cætera ejusdem indolis grassabatur, ibid. Eadem febris usque ad initium anni 1680. se extendebat, ibid. Fe- bres intermitt. cum surgente anno apparebant, ibid. Perseverabant ad initium 1685. sed non adeo epidemicæ ac in 4. primis annis, ib. Generalis constitutio intermitt. producendis favet, ibid. Verosimile est febrem depuratoriam postliminio revereram, ibid. In Peste, & fe- bribus inflammatoriis obest cortex, ibid. Epidemici alii alios ordi- ne excipient, ibid. Æger Rheumatismo laborans si phlebotomia liberiori manu celebrata curetur, variis morbis obnoxius redditur, ibid. Diætâ e sero lactis phlebotomiæ loco substituta, ibid. Historia, ibid. Leviora sunt ingenia, quæ res vilipendunt quod simplices sunt, & aperta, ibid. Dicta methodus aliis etiam morbis accommodare- tur, ibid. Casus rarior cujusdam qui mercurium subtr. corrol. deglu- tiverat, repetitis aquæ tepidæ haustibus ab orci faucibus erepti, ib. Cautio de diætâ lactea in virilem ætatem prætergressis, & vino assue- tis, ibid. Post tertiam Venæ sectionem Cath. exhibeantur, repetan- turque, ibid. Ita viam sternes paregoricis, ibid. Purgantia sint e le- nitivis, ibid. Affectus quidam qui febres intermittentes excipiebat nunc Rheumatismum, nunc dolorem nephriticum æmulans comme- moratur, pag. 44. Eandem vendicabat medendi methodum, quam morbus cui adhærebat, ibid.

Epist. Resp. Secunda.

NIL vetat, at jubet charitas luis venereæ curationem docere, pag. 77. Quando primum hic morb. Europam appulit, ib. Cujus re- gionis Endemius, ib. Magna celeritate grassabatur primum, nunc lan- guet indies, ib. Centum retro annis Gonorrhœæ virulentæ specie se- primum ostendebant, ib. Quot modis propagatur, ibid. Quibus gradibus proce-

procedit, ib. Varia enumerantur symptomata, ib. Constrictio virge erectæ dolorificæ est signum παθολογικόν, ib. Ardor urinæ, caruncula in urethra erosa, unde Ichuria, scroti inflammatio, ib. Quomodo Gonorrhœa adolescit in veram lue, p. 78. Bubones, dolores vagi nocturni, ib. Crustulæ, & purriginæ leprosæ, ib. Exostoles, ulcera Phagedænica, Tragœdiæ, Catastrophe, ib. Natura huius essentialis nos latet, ib. Nec mercurius, nec ligna exsiccantia proprie hic audiunt specifica, ib. Alia debet esse evacuatio in Gonorrhœa, alia in lue formata, ib. Gonorrhœæ curationis cardo in remediis catharticis vertitur, ib. Quibus præ cæteris purgantibus cedit, ib. Diætâ refrigerans a carceribus ad metas, ib. Methodus observanda circa Catharsin, ib. Quid denuo faciendum si purgationi non cesserit Gonorrhœa, ib. Quid in Idiosyncrasis, ib. Quid in iis qui ægre purgantur, ib. Diætâ inter curandum, ib. In quo casu vena tundenda, p. 79. Catharsis hic ad instar omnium est, ib. Qui mundificat bene, bene sanat, ib. Incommoda ex aq. mineralibus, & aliis adstringentibus, ib. Item e lignis exsiccantibus, ib. Methodus curandi glandem præputio coniectam, & inflammata, ib. atque etiam scrotum inflamm. ib. Lues confirmata non nisi per salivationem ab hydrargyro excitatam potest extirpari, ib. In ejus curatione corporis per evacuantia præparatio damnatur. ib. Ut & correctiva in unguent. & Cathart. ib. Æger ter inungendus, ib. Quibus remediis Phthalismus extimuletur, ib. Gradus salivationis sedulo observandus, ib. Quid si purgaretur æger, p. 80. Convalescente ægro, potius promoveri debet phthalismus, quam cohiberi, ib. Refrenandus tamen in statu, si iustos limites transileret, ib. Post salivationem non necessaria est Catharsis, ib. Cautio ne salivatio importunius urgeatur, φύσεως ἀντιπαράστη, ib. Qua methodo optata potiaris arena, ib. Mercurius dicatur specificum mediatum. ib. Quid agendum si Lues & Gonorrhœa una stabulentur, ib. Curatio Exostosis, ib. oris exulcerati, ib. Diætâ, & reliquum ægri regimen, p. 81. Quare hoc morbo mulctati in Galliam commigrare coguntur, ib. Quo tempore carnes teneriores indulgendæ sint ægro, ib. Hæc methodus usitata expeditior, minus periculosa, & recidivæ minus obnoxia, ib.

Dissertatio Epistolaris.

Rationes quæ Authorem instigarunt ad observationes hæc edendas, p. 83. Febres intermitt. quæ primum an. 1677. caput extulere, anno vero 1681. regnabant, iis tempestatibus grassabantur maxime, quæ cum earum indole magis faciebant, ib. Quo ordine morbi se invicem excipiebant, ib. Variolæ επιδημικότητα factæ sunt, ib. Qua data occasione maculæ purpureæ extrudebantur æger pro exanthematum numero. ib. Sanguinis mictus, & maculæ purpureæ, vel paucissimis, vel nullis apparentibus pustulis ægrum e medio tollant, ib. Status diverso tempore pro ratione morbi, ib. Confluentes tanto distinctis periculosiores, quanto confluentibus peffis, ib. Juvenes in ætatis flore omnium maxime periclitantur, ib. Pustulæ & phlegmonis comparatio, ib. Densa pustularum eruptio coercenda, & quare, ib. Unde oritur, & a qua προέρχεται, ib. Die sexto ab invasione omne pustularum examen conspicitur, ib. Quo morbi tempore æger infolidum lecto adjudicandus, ib. Essentia morbi videtur in inflamm. consistere, p. 85. E qua varia symptomata oriuntur, ib. Peccantem materiam in sanguine sola febre amolitur Natura, in massa carnea apostemate, ib. Pus resorptum sanguinem inquinat, ib. Phthalismus ab intenso febris calore sistitur, ib. Eventus pendet a jacto fundamento, ib. Quot mala a regimine calido oriuntur & a modice frigidiusculo commoda, ib. In quo casu æger libero aeri exponendus est, ib. Quomodo accadat, ut æger in morbi principio tollatur, ib. Sanguis missionem non tanti esse ac ejusdem contemperationem, probatur instantia, ib. Quantum valet reiterata Catharsis sanguine nondum inquinato, ib. Objectiones contra regimen moderatum retorquentur, p. 85. & seq. Incommoda a pustulis præpropere elicitis, ib. Lecti calor quantus, ib. Nec febris coercenda, nec sudor provocandus, ib. Æger lecto arcendus, ne forte variolæ forent e confluent. genere. ib. Nihil suo iudicio tribuit Author nisi quatenus experientia conformi, ib. Dogmatici invidiam depellit, ib. Quocunque modo tractentur variolæ, aliquando insigniter confluent, ib. Quantum dandum ægrorum appetitionibus, p. 86. Naturæ, non Arti mos est gerendus, ib. Morbi acuti sunt qui DEUM habent Authorem, sicut Chronici ipsos nos, ib. Quale bonum esset Ars medica, si vere Ars esset, ib. Infantes spasmo correpti ut tractandi, ib. Quantum hic errari solet quum symptomata pro affectibus essentialibus habentur, ib. Post spasmos in infantibus raro insigniter confluent variolæ, e contra, post affectus comatosos, ib. In utrovis effectu quomodo tractandæ, ib. Quo enormiora sunt symptomata, eo magis confluent variolæ. ib. Post amissum sanguinem Emeticum eradicativum exhibendum, ib. sp. vitriolis cerevisiæ tenuiores immiscendus, ib. Liberior aeris appulsus magis confert ad sanguinem contemperandum, quam evacuantia quævis, ib. In quibus hæc methodus observanda, ib. Die ab invasione sexto æger lecto addicetur, ib. De variolis confluent. tantum hic agitur, ib. Medicamenta paregorica sunt hic quasi specifica, ib. Quo sedatiores sunt sanguis, & spir. eo commodius & separatio fit mat. variolosæ, & pustulæ adolefcunt. ib. Quo nomine syr. de Maconio laudano liquido est præferendus, ib. Dosis symptomatum gradui adaptanda, ib. De adultis impræsentiarum agitur, ib. Infantibus tamen aliquando danda sunt hypnotica, ib. Toties repetenda sunt, donec metam attigerit, ib. observatio, ib. Calor lecti eludit medicamenti vires, ib. Quod etiam in Febribus intermit. aliquando accidit, ib. A sexta ab Invasione nocte ad 17. exhibendum Anodynum. ibid. Tempore in ultimis morbi diebus ob paroxysm. vespertinum, ibid. Æqua dosi ib. Si ægro nauseam creaverit syr. de meconio, laudanium liq. ejus vices suppleat, ib. Objectioni responderetur de discrimine Phthalismus retundendi, p. 87. Quare non æque indicatur Diacodium in infantibus, quo casu propinandum, ib. Duo Cardines in quibus variolarum curatio vertitur, ib. Die decimo epispast. nuchæ applicandum, & quamobrem, ib. Die undecimo vix micat pulsus, ib. Alium incisum pedum plantis admovendum a die octavo donec æger extra aleam positus fuerit, ib. Diætâ per totum morbi decursum, ib. Vino, instante maturatione, indulgendum, ib. Sudores evitentur, ib. Casus rarior, ib. & seq. Variolæ insigniter confluentes, licet ut plurimum, non tamen semper tertio

ab invasione die erumpunt, p. 88. Omnia hæc theorematum ad confluentes tantum pertinent, ib. Historia insignior de quodam a Pectehis, & mictu sanguineo facilliter liberato, ib. Par methodus in causarum paritate (quantum fert utriusque morbi Genius) adhibetur, p. 89. Non Phantasia, sed phænomenis practicis litat Author, ib. Probi Medici officium, ib. Unde est quod quæ Medica appellatur, confabulandi potius, quam medendi Ars evasit, ib. Naturæ operationes deprehendimus, sed modus operandi nos semper latebit, ib. Instantia in Cerebro, ib. Non quæ librorum lectio suggestit, sed quæ propria experientia docuit, hic tradit Author, ib. Affectus hysterici Chronicorum pars media sunt, ib. Paucissimæ fœminæ, vel viri sedentarii ab iis liberantur, ib. Affect. hysteric. & hypochondriac. analogia, ib. Omnes fere affectus æmulatur, ib. Apoplexiam refert, & Hemiplegia solvitur, ib. Quas præcipue adoritur fœminas hæc species, ib. Spasmos gignit horrendos Epilepsia perisimiles, ib. Strangulatus uteri quibus temperamentis familiaris, ib. Exteriorem capitis partem impetens cum vomitione enormi clavum hystericum parit chlorosi laborantibus familiarem, ib. Cordis palpitacionem excitat in infirmioribus, & febre alba pallescentibus, ib. Tussim etiam hystericam, quæ pituita scatentes fatigat, ib. Iliacam passionem mentitur cum frequenti vomendi nixu, & bile porracea rejecta. Ictero solvitur paroxysmus, ib. Desperatio de salute indivisus ejus comes, ib. Quo corporis habitu locum habet hæc species, ib. Paroxysmum Nephriticum mentitur, ib. Calculum velicæ, & Ichuriam parit: sed rarissima est hæc species, ib. In iis, qui fractis sunt viribus a repetitis ejus insultibus, ib. Nunc vomitiones excitat, nunc Diarrhœam sed sine dolore, ib. Quibus competunt, ib. Partes exteriores carnemque musculosam infestans dolores excitat tumoresque, ib. Differentia inter hosce tumores, & hydropicos, ib. Dentibus licet fartis testis ab omni defluxu liberis atrociss. & expugnati difficillimos dolores affigit, ib. Dolorem in dorso certo certius persentiscunt quotquot hoc affectu tanguntur, ib. Partem cui insederat teneram relinquit, ibid. Externarum partium refrigeratio quasi viam sternit, ib. De spirit. Dejectione, sive subsidentia conqueruntur ægri, ib. In risus, & lacrymas effunduntur nulla data ansa, ib. Limpida urina copiose reddita est signum pathognomicotaton, ib. Flatus nidorosi, & ructus acidi, ib. Atrocissima animi pathemata in sinu sovent, p. 90. Qui hisce affectibus tentantur, ingenio ut plurimum pollent, ib. Difficile est multiformes affectus hystericos enumerare, ib. Causæ eorum procathartica, ib. Diagnos. Causæ προγενέσθαι, ib. Antecedens, ib. Cur plures fœminæ quam mares iis fatigantur, ib. Speciei illius quæ Uteri strangulatus dicitur, descriptio, & origo, ib. Illius quæ Colicam biliosam æmulatur, ib. Color viridis, in rejectis unde, ib. Clavi hysterici ætiologia, p. 91. Urinæ limpida, ib. Historia, ib. Phthalismi hysterici unde, ib. Frigus, Fletus, & Cachinni, ib. Casus cujusdem fletui immodico ex nulla προέρχεται obnoxii, ib. Infirma spirituum σύστασις quot animi, & corporis intemperies parit, ib. Morbi fomitem in materia non delitescere instantia elucidatur, ib. Spirituum ἀσέληα humores putridos aliquando gignit, ib. Hinc etiam αἰσθησις, chlorosis, & hydrops testium, ib. Diathesis hysterica est causa primaria, ib. Quemadmodum & μίσημα spirituosum in febre quartana, ib. Præcipua indicatio curativa sanguinis corroboracionem indigitat, ib. Quare venæ sect. & Catharsis præmittendæ, ib. Ab Anodyno aliquando & remediis vulgo dictis hystericis curationis tela ordiendæ est, ib. Post Venæ sect. & Cathars. omnia ægro videntur in pejorare, ib. Remedia chalybeata per 30. dies sumantur, ib. Nihil magis erigit spiritus, ib. Indicium est effectus in chlorosi, ib. In quibus, Venæ sect. & Cathars. omittis, cum chalybe recta incipiendum, ib. Nuda chalybis substantia quavis ejusdem præparatione efficacior, ib. Crudæ forsân mineræ vis maxima, ib. Ab officiosa Chymicorum sedulitate medicamenta sæpe nativis spoliuntur viribus, ib. Præcipue eorum vires a Natura, ib. Quod testantur Opium, & cortex Peruv. ib. Syr. chalibis a substantia ejusdem secundus, ibid. Et in chalybis, & aquar. mineralium usu Cathartica melius omittuntur, ib. Repetita Cathartica in imbecillis, & infantibus plurimum officiunt. ib. Unde tumores in infimo ventre, glandulæ præternaturales in mesenterio, &c. ib. Post evacuationes universales confortentur sanguis, & viscera, p. 92. Medicam. formulæ quæ huic intentioni inserviunt, ib. In ventris tumoribus post longas febres intermit. repetita Catharsis indicatur, ib. At in Rachitide vera semel, vel bis ad plurimum, & dein alterantia, ib. Non pauci infantes a Catharticis sæpe repetitis interempti sunt, ib. Objectioni fit obviam de chalybis aculeis in intestinis hæsuris nisi expurgentur, ib. Hysterica dicta remedia in forma solida usurpanda sunt, ib. Methodus & remed. formulæ, ib. Si chalybeata perturbent, laudanum singulis noctibus sumendum, ib. ubi symptomata mitiora sunt, pil. hysteric. sufficiant, ib. Idiosyncrasis sunt observandæ, ib. Instantia in laudano liq. syr. de meconio vices gerente, ib. Si chalybs malo vincendo par non sit, adeundæ aq. minerales, ib. & seq. Observanda inter bibendum, p. 93. Ob purgativa iis mista difficilior operantur, ib. Infus. clavorum equinorum si modo debite assumantur, eundem cum aq. miner. effectum sortiuntur, ib. In quo casu aq. Bathonienses adeundæ, ib. Theriacæ Androm. vis, ib. Vinum Hispan. vel corroborantibus medicatum, vel simplex quantum valet, ib. Cort. Peru. ad spir. invigorandos eximia est vis, ib. Præcipue in fœminis quæ spasms urgentur, ibid. Diætâ lactea in temperamento bilioso tenui, & colica hysterica affectis, ib. Sed non omnibus ex æquo convenit, ib. Nihil tamen adeo impense sanguinem & spiritus firmat, fovetque ac diu multumque equo vehi, ib. Historia notabili comprobatur, ib. & seq. Nec in hypochondriacis magis quam in tabidis phthificisque pene deploratis locum habet hoc exercitii genus, ib. Inter chronicos Phthisis duos fere Trientes jugulat, ib. Nec mercurius in Lue Venerea, nec Cortex in intermit. efficaciores extent, quam in hac curanda (observatis observandis) exercitium laudatum, ib. In Paroxysmo hysterico ad fœtida confugiendum, quæ spiritus ab excursibus in ordines compellunt, ib. Quæcunque fuerint, huic intentioni inserviunt, ib. Si vehemens dolor, vomitio enormior, aut Diarrhœa inceserit, solo laudano cohibentur, ib. In quibus evacuationes præmittendæ, & quamobrem, ib. In quo casu a laudano incipiendum, ib. Vomitiones enormes dosin max. & sæpissime repetitam indicant, ib. Paregoricum vel in forma solida exhibeatur, vel vehiculo parco, ib. Capitis motus vomitionem provocat, ib. Recidiva ut præcavenda, p. 194. A dolore, & vomitione Medicis frequentius imponitur, quam aliis quibuslibet symptomatibus, ibid. In illa specie quæ paroxysmum Nephriticum

imitatur iudicanda quam graviter errari solet, ib. Ut & illa quæ calculum renum, colicam biliosam vel Iliacam passionem simulat, ib. Quas repetitis suis evacuationibus Medici non solum non compescunt, sed irritant, ib. Præsertim emetico propinato, ib. De Diagnosi ergo sedulo cavendum, ib. Plurimæ puerperæ pereunt, quod debito citius e lecto exurgunt, unde lochiorum suppressio, phrenesis, spasmi, febres, ib. Vix decima perit mulier vel ex dolore, vel quod vires parvi ferendo non sint, ib. Ad diem saltem decimum jacere debent, ib. Indicationes curativæ duæ, ib. Si remedia usurpari solita votis non respondeant, ab iis temperandum, ib. Emplast. hyst. umbilico admoveatur, & elect. cuni Julap. hic laudato exhibeatur, ib. Si hæc malum non devincunt, laudanum una saltem vice tentandum, ib. Quod aliquando lochiorum fluxum revocat, ib. Narcotica cum hystericis & Emmenagogis propinentur, ib. Si non sequantur lochia, rejiciantur narcotica & hystericis ac Emmenagogis enema addatur, ib. Enema non repetendum, sed temporis *συμμυρία* præstolanda, p. 95. Post diem 20. res fere in vado est, ib. Si remedia nihil proficientia obstinatius ingerantur, & morbum, & spir. perturbationem angent, ib. Historia, ib. In quo casu boni Medici est rem toram aliquandiu Naturæ committere, ib. Sæpe fluxus mensium immodicus siue in puerperio siue extra idem Affectus hystericæ causa fit, ib. Prima species post partum laboriosior primis solum diebus ingruit, & brevi se proripere solet, ib. Victus sit incrassans, ib. Medicam. formulæ, ib. Species altera licet omni tempore accidit circa æt. anno 45. vel 50. quo menses cessaturi sunt, præcipue invadit, ib. Hystericæ fortiora evitentur, ib. Methodus medendi cum medicament. form. ibid. Uteri proclitæ Curatio, ib. Conclusio, ib.

Tractatus de Podagra.

Quos præcipue invadit Podagra, p. 99. Diversus ejus mos pro ratione subjecti, & tempore invadendi, ib. Quo tempore, & modo Podagra regularis ægrum aggreditur, ib. Quo ordine & quibus stipata phænomenis partes laceffit, ib. Paroxysmus graphice depingitur, ib. Nunc hic, nunc illic tragœdias excitat, ib. Dolor semper noctu recrudescit, mane vero remittitur, ib. Ex serie paroxysmulorum constat paroxysmus, ib. In diversis diverso tempore solvitur, ib. Quomodo se habet æger quoad urinam, alvum & appetitum, ib. Pruritus in discessu & pedum desquamatio, ib. Pro majori, vel minori unius paroxys. sævitia, vel serius, vel citius revertitur paroxysmus, ib. In Podagra inveterata, vel indebita medicatione turbata phænomena sunt diversa, ib. Pedes peccantis materiæ sedes genuina sunt, ib. Jani varias corporis partes occupat, ib. In digitis & c. tophos generat, in cubitis tumorem album excitat, ib. Femur, genuque & c. ut impetit, ib. Per annum fere integrum durat paroxys; ibid. Paroxysmi particulares diutius sæviunt, nec ante diem 14. castra movent, p. 100. In intervallis artus sunt, ib. Quanto magis æger ambulando pedes firmare contendit, tanto periculosius morbi fomes visceribus imminet, ib. Venarum hæmorrh. dolore, ructu nidorofo, appetitus prostratione infestatur, ib. Urina illa imitatur, quæ in Diabete excernitur. Dorsum, aliæque partes moleste pruriunt, ib. Dolores in metatarso lancinantes, & spasmi intenduntur musculorum tibiarum ut ægrum invadunt, ib. Doloribus recedentibus ægritudines, lassitudo spontanea, & in diarrhœam propensio succedunt, ib. In Podagra diuturniore ægritudine potius quam dolore conficitur paroxysmus, ib. Quo vehementior est dolor, eo citius præterlabitur paroxysmus, & diutius abest, & vice versa, ib. Calculum renum in quamplurimis parit, ibid. Qui aliquando meatus urinarum obstruens ægrum e medio rollit, ib. Animus corpori compatitur, unde æger variis passionibus obnoxius est, ib. Morbi Catastrophe, ib. Plures divites, & sapientes, quam pauperes, & fatuos interemit, ib. Si quas fœminas (quod perraro est) non nisi vetulas, & viragines infestat, ib. Neque pueris, neque juvenibus minores vera, & genuina vexantur, ib. Leviculum tamen vellicationem præsentiant, quibus ex traduce morbi seminiū impressum est, ib. Morbus *ἀνέστη* ortum debet, ib. Qui vino, veneri, laboribus improbis, studiis intensis, cæterisque, quæ spiritus exhauriunt, cõsiones destruunt, & partium tonum laxant, nimium indulgere, hunc morbum accerunt, ib. & seq. In curatione, Venæ sectio, Catharsis, & sudores non indicantur, p. 101. Venæ sectio ut pugnat cum judicatione quam causa antecedens sibi vendicat, præcipue in iis qui ætate sunt provectiores. ib. Quo modo hydropi aditus aperitur, ib. Quando in juvenibus locum habet, ib. Ut ab Emeticis, & Catharticis æger de vita periclitatur, ib. Ab humoribus intro versus intestina sollicitatis quæ mala ingruunt, ib. Catharsis nec paroxysmo ad peccantem materiam minuendam, nec in fine ad reliquias amoliendas, nec ad ventri aditum præcavendum omnino prodest, ib. Unde spiruum *ὀνείας* infirmatur, & disjicitur, p. 102. Quo pacto fiat ut æger confestim convalescat, sed pœnas posterum ab *ἀνέστη* pendat, dirissimas, ib. Quibus nominibus sudores officiant, ib. In omnibus morbis, dempta sola Peste, sudores prolicere non tam Medici est, quam Naturæ provincia, ib. Hic affectus ob contra indicationes curatu perdifficilis est, ib. Causæ antecedenti, & Continenti obviam eundum est, ib. Quo sensu causa continens intelligenda est, ib. Præcipua curandi intentio in eo verti debet, ut cõctioni consulatur, ib. Quæ proprie digestiva appellantur, ib. Medicamenta quæ hanc intentionem adimplent, ibid. & seq. Curatio in iis sumendis, ib. Quo in casu, quanto major est simplicium numerus, tanto potentius medicamentum operatur, ib. Forma Electuarii quo Author uti solet, ib. Quo nomine theriacæ Androm. præferendum est, ib. Inter simplicia cortex Peruv. primas obtinet in sanguine corroborando, ib. Quantum hujusmodi medicamina in aliis Chron. plerisque juvant, ib. Differentia inter morbos acutos, & chronicos, ibid. Ejus causa indagatur, ib. Qui morbi Epidem. audiunt, qui intercurrentes, & sporadici, ibid. Indigestio communis est Chronic. pars, ibid. Ex eo probatur, quod senes magis hisce affectibus obnoxii sunt, quam juniores; & ad eos gignendos magis facit hyems quam æstas, ibid. Equitationis emolumenta, in morbis chronicis plerisque, Phthisi præcipue, stupenda sunt, ib. Herbæ excalescentes quæ adserunt commoda, ib. Licer in Podagra lædant, in aliis tamen chronicis plerisque Venæ sectio, & Catharsis corroborantibus, & digestivis præmittenda sunt, ib. Sed cum morbi cujusque curatio remed. corrobor. innititur, evacuationes qualesque officiant, prorsus, p. 103. Digestiva haud obiter, sed assidue, & constanter sunt usurpanda. ib. Nam cum

erroribus siue his, siue illis, tota corporis æconomia sit quasi funditus eversa, eadem de novo extruenda, atque redintegranda est, ib. In digestivorum usu, præcipue in paroxys. intervallis perseverandum, ib. In cibo, potuque quæ mediocritas servanda, ibid. Cur ægri palato consulendum, ib. Unica ciborum specie singulis partibus vescatur, ib. Acris, sale condita, & aromata evitentur, ib. Prandere tantum expedit, ib. Liberaliorem cerevisiæ tenuioris haustum ob calculum renum generari aptum nocte sibi indulgeat, ib. Diætæ lactea quæ ratione magis obest, quam prodest, ib. Potus sit Cerev. tenuis Lond. ib. Vinum de facto officit, & quare, ib. Neque tutius a vino assuetis liquores nimis refrigerantes in usum revocantur, p. 104. Quis modus in potu statuendus, ib. Copia, & luxus nativæ, tum animæ, tum corporis rectitudini vini infert. ib. Ab ineunte ætate satis commode potaretur aqua, ib. In Podagra inveterata potus diæteticus (cujusmodi hic forma præscribitur) plurimis nominibus prodest, ib. Quando primum commodissime in usum trahitur, ib. In quo casu vinum Hispanicum, illudque præ aliis ægro indulgendum, ib. Ob quas rationes lectus mature petendus, præcipue hyemis tempore, ibid. Animi pathemata, nimisque ad studia, & res serias applicatio spirituum systasin solvunt, ideoque evitanda sunt, ib. & seq. Cæteris omnibus, quæ indigestionem impediunt, sanguinem corroborant, & partibus firmitudinem conciliant, exercitium corporis facile palmam præripit, ib. Quotidianum & moderatum sit oportet. ib. Quod qui spernit ad calculi generationem erit proclivior, & in discriminem a materia tophacea in articulis admodum aucta omni motu privetur, ib. Exercitatio non tantum tophorum generationi officit, sed veteres, & induratos plerumque solvit, ib. Equitatio aliis exercitiis præferenda est, ib. Frequenter curru vehi eodem fere recidit, ib. Idque ruri potius aere perflato, & salubri, quam in urbe, ib. Quam improvidus senex Veneri indulgens, ibid. Regimen hoc utut religiose a quovis observetur, ab enormioribus podagræ insultibus tuetur, eum tamen ab omnibus immunem præstare non valet, ib. Totius corporis habitus, quoad fieri possit, in paroxysmorum intervallis est immutandus, ib. Morbi fomitis expulsio Naturæ, (ut in Febribus intermit.) permittenda est, ib. Qui symptomatibus coercendis incumbit, morbi curationem remoratur, p. 105. De errore in victu ab ægro summopere cavendum, ib. A motu curru minus dolebit, quam in Cathedra quiescens, ib. A quo etiam somnus invitatur, ib. Et Calculus quadantenus præcavetur, ib. Atque etiam totali artuum ad motum impotentia occurritur, ib. Morbi digestionem sine exercitio in senibus frustra quis speret, ibid. In quo casu lectus, & Diætæ tenuis necessaria sunt, ib. In quo exercitium, ib. Ipse dolor aliquando amarum licet, magnum tamen est remedium, ib. Inrer symptomata a quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur ventriculi debilitas cum torminibus maxime est familiare. ib. Qua data anfa ingruit, ibid. Ei mitigando vinum Canariense confert maxime, sed nec illud, nec Cardiacorum aliud quodlibet ægrum, si exercitio non utatur, servare posse existimandum est, ib. In quo casu ad laudanum statim confugiendum est, ib. In quo sudores provocandi, ib. Quibus Author aliquando suæ vitæ consuluit, ib. Materiæ peccantis in pulmonum lobos metastasis qua methodo curanda, ib. Sudores hic sedulo evitentur, p. 106. In paroxysmo nephritico ut æger tractandus, ib. Plures indebita medicatione quam podagra perimuntur, ibid. Remedia externa nocere quandoque possunt, prodesse nunquam, ib. Ustulatio partis affectæ Hippocratæ non latebat, ib. Nihil interest utrum moxa, an lino crudo fiat, ib. Dolorem aliquatenus mitigat, sed causam Podagræ antecedentem non attingit, ib. In doloribus quorum in partibus internis sedes est, locum non habet, ib. De specificis quanta hic, & alibi decantentur, ib. Venæ sectio, & purgatio alternatim celebrata in contusionibus continua solutione, & quavis organorum læsione quantum valeant, ib. Quisquis alia petit medicamenta ad Lucianum relegandus est, ib. Therapeja radicalis adhuc Democriti puteo latet, ib. Quam tamen quandoque inventum iri Author nullus dubitat, ib. Unde elucescet quantum hallucinati sunt dogmatici morborum essentiis dignoscendis, ibid. Et quam inauspicato in febrium causis investigandis vel solertissimi ingenia sua exercuere, ibid. Cujus rei Cort. Peruv. repertio exemplum est satis luculentum, ibid.

De Hydropæ.

Omnis hominum ætas, sexus omnis ab Hydropæ nonnunquam infestatur, p. 106. Fœminæ magis quam viri obnoxie sunt. ib. Hi ætate ingravescente, illæ ubi jam parere desierint, ib. Foveæ a digitorum impressione in surarum parte inferiore primum mali indicium, ib. Quare non perinde certum in fœminis, atque in maribus, ib. In senibus vero a multis annis Asthmate laborantibus hydropem non certo indicant, ib. Si generaliter loquamur, suræ, & tibiæ intumescunt etiam in viris pro signo hydropis supervenientis habendæ sunt, ibid. Pedibus cruribusque ad extremum extensis in abdomen ruentes aquæ, dein & umbilicum exophalon quandoque constituunt, ib. Tria nunc morbum stipant symptomata, Dyspnæa, urinæ paucitas, & sitis intensa, ib. Unde originem trahunt, ib. Pro rata qua partes quas obfider morbus, augment, aliæ magis magisque gracilescent, ib. Impetu tandem in viscera nobiliora, & vitalem arcem facto, æger cacachismo quasi submersus perit, ib. Causa morbi in genere est sanguinis debilitas, ib. Illi debilitando quæ operam commodant, ibid. Hydrops testium in fœminis obiter notatur, ib. Aliæ sunt duæ species in fœminis hydropem mentientes, ib. & seq. Illa carniū intra abdomen excrescentiæ præternaturali, hæc flatibus ortum debet, quin ingravitationis signa pariunt, p. 107. Neutra harum ad morbum, de quo agitur, referenda est, ib. Quas præcipue exercent, ib. Indicationes curativæ duæ, aquas contentas evacuare, & sanguis robur instaurare, ib. Cathartica quæ vel segnius, vel mitius operantur, officiant magis, quam profunt, ib. Utrum ægri corpus facile, an ægre, Catharticis cedat, sollicite inquirendum, ibid. Purgatio per *ἐπιχρᾶσι* non tantum non imminuit tumorem, sed adauget, ib. Quare expurgatio fortis, vel nimia, justo debiliore præferenda est, ibid. Quas ob causas maxima celeritate quam ægri vires ferre queant, aquæ exantlandæ sunt, ib. Hydragoga quem usum obtinent in iis difficiles, quem in iis qui faciles purgati sunt, ib. In istis qui Catharsi promptè cedunt syr. de spina Cervina aquas sat copiose elicit, ib. Id habet incommodi hic syrupus quod inter purgandum ingentem sitim provocet, ibid. Catharticis lenioribus opus suum cum bona euphoria non

non peragentibus, fortiora sunt tentanda, quod historia probatur, ib. Quo casu hydragoga sola vix votis respondent, sed lenioribus calcaris vice permista, efficacissima evadunt, ib. Potionis forma pro robustioribus, ib. Alia, ib. & seq. Tertia calefaciens inter purgandum, tum & corroborans, ib. In iis qui ægre purgantur aliis *δραστηρίαις* sunt Elaterium, & infus. Croci metal. p. 108. Emeticæ operationis ratio investigatur, ib. Cæcos dari meatus ex abdominis cavitate in intestina de facto liquet, ib. Hippocrates in scenam ducitur. ib. Quam curiosa corporis humani inspectio, & fabricæ notitia, tum Medicis, tum Chirurgis necessaria est, ib. In acutis quibuslibet, & Chronicis plerisque specifica quædam inest proprietas nulla corporis contemplatione in lucem eruenda, ib. Mens divini Senis in loco supra citato explicatur, ib. Majora licet organa patient, exiles tamen meatus oculos acutiss. vel microscopio exquisitissime elaborato adjutos effugiunt prorsus, ib. Cognitio nostra ad *τὸ ὄν* assurgat, sed *τὸ διότι* nullatenus attingat, ib. Et quæ innotescunt, & ad quæ cæcutimus impellunt ut divinum Artificem suspiciamus, & adoremus, ib. Chimix laus, & emolumenta intra quos limites coercenda, ib. Medicinæ faciendæ defectus in eo non vertitur quod nesciamus, quo pacto huic, aut illi intentioni satisfacere debeamus; sed quod non satis sciamus quænam sit illa intentio, cui satisfaciendum est, ib. Ad iudicium in hac re rite formandum naturalia morborum phænomena atque iuvantia, & lædientia diligenter observata, collata, & trutinata conferunt maxime, ib. Exquiritissimæ speculationum dissertationes quam labili fundamento innituntur, ib. Hypotheses solidas, & genuinas Praxi quædamtenus originem debere exemplo comprobatur, ib. Vomitus ab Emetico excitata hydropicorum aquas *αἶμα*, & *κρότα* potenter evacuat, ib. Hydropicæ cujusdam curatio Emeticis, & Catharticis absoluta, ib. Tria hic notata dignissima, ib. *Ἀτρεξία* ab evacuationibus excitata ut occurrendum, ib. In quo casu convenit ut tota res evacuantibus per inferiora committatur. Decoct. ex interiore cortice Sambuci eodem modo quo Crocus metalli morbum hunc depellit, non autem vi aliqua specifica, ib. In quibus casibus Emetica & Cathartica malum augent, totaque curatio in sanguine, ac visceribus corroborandis, firmandisque vertitur, ib. Huic inten-

tionis aeris mutatio, & exercitium quale quale demum sit, apprime respondent, p. 109. In constitutione infirma, & hysteris, aquæ diureticis educendæ sunt, ib. Efficacissima e salibus lixivialibus fiunt, ib. Medicinæ forma, ib. Cineres genistæ in vino Rhen. ac quantum hic valent, ib. Aquis evacuatis debilitas sanguinis medicam. calefacientibus, & corroborantibus præcaveri debet, præsertim in ætate proVectioribus, ib. Quæ in Podagra laudantur, an hic locum habere possint, ib. Vinum a quo in podagra abstinendum, pro potu ordinario in hydropse usurpetur, ib. Morbi plerique Chronici indigestioni ortum debent, ib. In essentielles & específicas morborum tam Chronicorum, quam acutorum differentias penetrare non datum est, ib. Curationem in utrisque non ad essentialem eorum naturam, sed ad causam magis generalem dirigere cogimur. ib. Curandique methodum naturæ, vel experientiæ indicibus accommodare, ib. Æger inter curandum, post porras aquis datas, vel vinum, vel Cerevisiam generosorem potare teneatur, ib. Liquores generosi, modo spir. distillatione elicit non sint, soli aliquando hydropicos in principio curarunt, ib. Cerevisia medicata pro pauperibus, pro ditioribus, vina, & Electuarium digestivum laudantur. ib. Liquores minus generosi parce admodum bibendi, ib. Sitis ut restinguenda, ib. Chalybs in hydropse incipiente haud infimum sibi vindicat locum, ib. Allium solum hunc morbum depulit aliquando, ib. Cujusmodi hydrops evacuantia non deponit, ib. Cum sanguinis corroborationi navatur opera, totaque res in eo solum cardine vertitur, ager nullo modo expurgandus est, ib. Ita enim tumor, qui minni cœperat, augebitur, ib. Morbus ad supremum gradum proVectus artis subsidia spernit, ib. Quare tamen Medici est non animo cadere, sed morbum tanquam nuper cœptum aggredi, ib. Topica in forma Cataplasmatum, vel linimenti minus nocent, p. 110. Unguent. a Cathart. fortioribus confecta atque abdomini applicata quas turbas faciunt, ib. Vesicatoria gangrenam sæpe invitant, ib. Quare vulnus leviss. in hydropicorum carne curari est difficillimum, ib. Conclusio, ib. post scriptum de Febre hyemali, cujus historia & curatio traduntur, ib. Scheda monitoria de novæ Febris ingressu, ib. Processus integri in morbis fere omnibus curandis, ib.



INDEX

RERUM ET VERBORUM

TOTIUS OPERIS COPIOSISSIMUS.

A.

Aldominis Tumor in Hydropica, ex tumultu a Catharticis excitato, novum aquarum proventum simulans. 108. Diacodii Syrupo integrè repel-
litur. 109.

Infaneum, circa Lienem præcipue, Febribus Intermiss. Autumn. diu-
turnioribus eos discurtationibus enatus, primum est incidium eas abituras;
neque hæ prius discedere solent. 10.

pro varia Febrium Constitutione varius est, jam scirrostatem, jam
flatusitatem tantum, æmulans. ibid.

Abortus remediis istis, quibus Mensium immodicus fluxus sistitur, præcave-
ntur; Catharticis & succis Herb. omisiss. 91. 148.

Abcessus. vid. Apostema.

Acu-punctura in Hydropice, non minori, quam Vesicatorii applicatio, periculo va-
cat. 110.

Acuti Morbi, vid. Morbi Acuti.

Affectio Hypochondriaca, vid. Hypochondriaca Affectio.

Hysterica vel Affectus Hysterici, vid. Hysterica Affectio.

Affectus Comatosi, vid. Comatosi Affectus.

Affectus nervosi V. S. & Purgationibus repetitis sape indigent; uti in Choreæ
Sancti Viti. 113.

plurimi Scorbuti nomina insigniuntur, qui sape vel effecti morborum Fien-
tium, h. e. qui nullum adhuc certum induerunt typum: vel infelices reliquæ
morbi, non perfecte curati, tantummodo sunt. 36. Quod argumentis ex Ar-
thritide incipiente, Podagra, Hydrops, evincitur. 36. 37. confer. itidem.
5. ad 6.

Affectuum plurimorum Curatio, non caussarum, sed veræ atque expertæ Me-
thodi, cognitione absolvitur. 12.

Adolescentes a Variolis plus periclitantur, quam Fœminæ vel impubes. 84.

Adolescentium iuxta cubantium calor, debilibus corporibus, profluus admo-
dum. 5.

Adpetitionibus ægrorum, in Morbis plus sape dandum, quam artis regulis. 85.
86. Exempli huius. 85. ad 86.

Adpetitus prostratus ex humorum depravatione. 91.

Adstringentia, in Cholera, euta non sunt, in initio. 21.

in Gonorrhœa virulenta scroti tumorem producant, Luem veram, & alia
mala, inducunt. 78. 79.

Adulti, in Variolis Confluentibus, Salivatione vexantur fere certo; & semel
tantum omisissam vidit Auctor. 16. In Variol. Discretis, prodituris, ad Sudo-
res prouti quam maxime sunt, non vero infantes. 15. 16.

Ægri periculo pleni, respectu curationis modi, si inter primos occurrant, in Epi-
demica nona Constitutione, donec Morbi genium cognitum sit. 2.

a Peste convalescentes, postea sanissimi, nec aliis Affectibus, uti post alios
Morbos contingit, obnoxii sunt. 12.

Ægritudines ab omni ævo cur terris incubuerint. VIII.

Ægritudo vehementer in Variolis, ipsas Confluentes fore prædicat. 86.

Aer occulta quadam crasi, seu inexplicabili conditione, variis temporibus, va-
rios Epidemicos Morbos producit. 1. 11. 24. 112. Exemplo sune Variolæ ac in
primis Pestis. 11. Hancque Aeris Dispositionem, quidquid Philopothaneum
turba nūgetur, plane ignoramus. ibid.

Effluviis terrenis inquinatus, Epidemicorum Morborum causa producent,
& propagans aliquandiu, considerandus. 1. 30. 112.

ad hoc illudve tempus parvulis sciet, Humani corporis, ut & aliquando
Brutorum Oeconomicis adversantibus; quod an fiat, quoniam Terra viscera
varias Mutationes subeant, unde Vapores exhalantes aerem inquinant; vel
quoniam Atmosphæra inficitur ab alteratione ex Corporum Cælestium quorum-
dam Conjunctione, idem erit, saltem inde Morbi producantur Epidemici di-
cti, istius generis, ac illa præcipue inducere valent. 102.

Pestilentialis utut sit, tamen per se solus non videtur aptus Pestis suscitandæ.
11.

ita per terræ quendam tractum, tum laborantium, tum eadaverum habi-
tibus ita contaminari potest, ut ipsum remotum a Peste correptis, absque fo-
mite vel personali consortio, modo corpus ad adflatum excipiendum paratum
habeat, inferre valeat. 11.

Pestilentialis Constitutionis, Dei bonitate, variis occurrit, quam ille, qui
aliis Epidemicis Morbis, minus exitalibus, suscitandis inservit. ibid.

contemperatus, in Variolis, plus quam V. S. impetum Morbi cohibet. 85.

frigidior, in Variolis, admittendus, qualis intelligendus? illoque modo
plures a morte sunt liberati. 95. 96. Ubi Phrenitis, hic, ex defectu faciei in-
tumescentiæ, adest, quæcumque tum necessitatis ille sit, docent ægri, qui Nutri-
cium curam fefellerunt, & aeri semet exposuere, felici eventu. 19.

post Corticis Peruviani usum vitandus, donec vires restauratæ fuerint. 41.

liberior, in Variolis, quantum resocillet ægros. 85. Et in hoc casu, per
Pulmones reciprocatus, plus facit ad sanguinem contemperandum, quam alia
quæcumque. 30.

nimis in Febre Scarlatina vitandus. 34.

manifesta quadam Crasi Tussim, seu novum Epidemicum Morbum, An.
1679. sub fine, infect. 42.

Aer pro Podagricis, in quo se exercent, rusticanus quare urbano præferendus.
104.

Aeri libero, in Variolis, quandam exponendus æger. 84.

Aeris Constitutio. vid. Constitutio Aeris.

mutatio in Febre Quartana post illud tempus, quod sanguis ad suam de-
spumationem perficiendam exigit, eantummodo convenit, nec prius; & quæ.
re. 10. In Hydropice quando requiratur. 109.

particulæ cum humoribus nostris non convenientes, nudoque sanguini admi-
stæ, unan, Morbos producent, um, Causarum universalium Classem consti-
tuunt. 1.

Qualitates manifestæ seu sensibiles, uti & Res. 6. N. N. corpora nostra,
ad huius illiusve Morbi Epidemici generationem magis minusve disponunt. 2.
confer. 34.

Febres, quæ in quolibet Constitutione se exerunt, eundem non vero illas
quæ Constitutioni cuidam propriæ ac peculiare sunt producant. 2.

Qualitates manifestæ Constitutioni cuilibet generali, eantam vim imprime-
re non valent, ut Epidemicorum, qui ad eam referuntur, causæ Productivæ
sint; verum illos tantum intrinsece vel excludere possunt, hæc vel illo
tempore, sub eadem Constitutione, prout illis plus vel minus favent, illis
temporibus, Qualitates manifestæ. 23. confer. 2. Hinc sese Morbi hi exserere
solent ea tempestate, ad quam sensibiles illæ Qualitates tot destinaverunt.
23.

occultæ Epidemicis plus favent, quam manifestæ. 134. Nonnulli tamen
horum quoad Symptomata a manifestis pendent. ibid.

Aeris Temperies Epidemicos aliquando elicit, ut citius invadant; & e con-
tra. 2.

quo ubi, ut parciore apparatus, ad Febres Intermitentes producen-
das donata, eo maturius, vel tardius ipse inducunt. 6. & 8.

Æstas Morbos Chronicos minus progignit, quam Hyems. 102.

Æstas Podagræ irregularis Paroxysmus paulo mitior est. 100.

Æstus in Febribus Continuis quomodo dirigenda. 4.

Ætas hominis unius Experimentis supra Morbos instituendis, par non est. 1.

Alexipharmaca pleræque calida sunt. 12.

quælibet, forte, materiam Morbi per sudores evacuando potius, quam spe-
cifica quadam virtute, ægrotantibus succurrunt. ibid.

in Peste, calidiora quamvis, profunt per accidens, quatenus nempe Dia-
phoretica simul sunt. ibid. Eorum vero vis occultæ Specifica indoli, eantum
antipestilentiali, non referri debet. ibid.

Antivenerea ut Mercurius, & Sarsaparilla, evacuando foree potius, quam
Specifica virtute agunt. ibid.

Alexiterium Pestis proprium, in Natura senu additum, adhuc delitescit. 13.

Alum in Hydropice incipiente solum, evacuantibus missis, hunc Morbum aliquan-
do depulit. 109. Pedibus adplicatum omnium optime revellit; hinc Adultis
Variol. Confl. laborantibus adplicatur. 87.

Alvi profluviū, & Vomitus, sudoribus, in Peste curantur. 14.

Alvus, in Variolis Discretis, eoto morbo fere constipata. 15.

Ambustio Spiritu Vini omnium optime curatur, si lintea eo malida adplicentur,
& aliquandiu retineantur. 36. 150.

Amentia, sive Mania, post Febres Intermiss. Autumn. 10.

Anatomia quænam notissima Medico necessaria. 108.

Anethi semen specificum habetur in Singultu, sed non semper juvat. 6.

Angina quibusnam cum Symptomatibus invadat, & progrediatur. 37. 144. Tem-
pore quolibet, eo tamen, quod ver æstas interjacet maximo adpredi-
tur, ibid. Unde hoc. 38. A calore, intensum tragus subito excipiente, plerum-
que oritur. 2. Juvenes, & Sanguineos, sed præcipue rufos, adficit. 37. Pe-
riculo plenus Morbus, sape brevi suffocans. ibid.

qua Methodo curetur. 38.

Symptomata eodem Methodo qua Febris, cujus Symptoma est, curari de-
bet: quod probe notandum. ibid.

in Angina Febris pro Morbo primario habenda; & reliqui affectus, a quibus
nomen mutuatur Morbus, tanquam Symptomata, quæ a materia febrili, a
modo criseos, a parte in quam ruit, pendent, considerandi. 33.

Gargarismata non, ut vulgo solet, usurpanda, sed sine agitatione in ore
detinenda, donec incalescant. 38. Partes inflammatae Melle Rosar. cum Sp.
Sulph. tangantur. ibid.

V. S. foris in brachio, tum in vanulis, instituenda. ibid. Et si Febris ac
dolor inde minuantur, Cathartic. lenitivum perutile. ibid. Hic non minu-
tis, V. S. iteranda in brachio, Catharsis in diem posterum rejecta. ibid. Et si
Morbus post V. S. & Catharsin non cedit, quod oppido rarum, quid agen-
dum. ibid. 145.

Anginæ Epidemica. 34.

verno tempore An. 1665. Londini, post hyemem frigidam, & siccum gelu,
grassantur. 11.

Pleuritides, aliæque inflammatae Sanguinis adfectiones, per aliquot septi-
manas, Pestis Londinensis exortum antecesserunt. 12.

Anicula Medicorum Simia, stolidæ, ac infelices. 19.

Anima Mundi Philopothum. 14.

Animi commotio Apoplexiæ speciem, in Puerperis Hystericis, sape excitat. 89.

compages magis delicata, quam corporis structura. 91. Qualis ab Auctore
concipiatur. ibid.

Pathemata Spirituum systasem solvunt. 104.

in Hypochondriacæ seu Hysterica adfectione, atrociora. 90.

in Podagra sunt vitanda. 104.

Robur, unde. 91.

& Corporis motus violentiores Affectum Hystericum excitare valent. 27.

Animus in Hysterico & Hypochondriacis quomodo sit constitutus. 90. In Po-
dagra inveterata, contagio tandem etiam ita adflat, ut rectius Iracundiæ,
quam Podagræ, Paroxysmus dici queat. 100.

Annorum Constitutiones, vid. Constitutiones.

Annus, quo Pestis Londini grassabatur, cæteroquin salubris, & mirissimus
fuit. 12.

Anodyna vid. Paregorica.

Apoplexia ex Humoribus depravatis. 91.

Anthraxes, in Peste, adflatam faciem, pyrotici actualis impressioni non absmi-
lem, habent. 12.

Antidotaria calida Pestem potius invitant, ut Vinum ipsum liberalius adsum-
ptum, quam arcant. ibid.

Antimonialia Emetica Puerulis, infra adolescentiam constitutis, numquam su-
to exhibentur. 4. Neque tuto umquam præbentur, nisi copiose diluantur. ibid.

Antiscorbatica Hydropem, ex Febre Intermiss. Autumn. natam, expellunt. 10. & 143.

Antivenerea Alexipharmaca. vid. Alexipharm. Antivenerea.

Aphorismus Hippocratis 2. §. 1. tam in Sudoribus provocandis, quam in sub-
ducenda alvo, locum habet. 101. Imo non tam Catharsin quam Diaphoresin
spectat. 115.

Aphthæ, Dysenteris recedentibus supervenientes, unde nascantur. 23. ad 24.

in Dysenteria, a Cathartico & aliis neglectis, mortem denunciantes. 22.

in Febre Dysenterica unde nascantur. 24.

An. 1669. ubi hæc recedebat, erant frequentiores quam in Febre ulla nota; &
quare? 23. ad 24.

in Febre Epidemia nova, A. 1685. recidivam Febrium inducunt, quæ Sym-
ptomata tantum est. 112.

Cortice Peruviano quandam sanentur. 113.

Apoplexia qualis sit Morbus. 146. Quomodo tractanda, tum in Paroxysmo, eum
extra eundem. ibid.

Febribus Intermiss. An. 1678. superveniens, erat Febris ipsa, caput impe-
tens. 41. Signa unde hoc constabat. ibid. Sed Cortice Peruviano curabatur. 15.

Apoplexia vulgaris causam non habet eandem, quam Hystericarum Apople-
xia. 89.

in Podagræ paroxysmo, sudoriferis exhibitis, cur nascatur. 101.

Apostema entis Naturæ Machina in carnibus, qualis Febris in humoribus. 20.

sive, Naturæ est Methodus, qua partes firmas, ab extraneis libera, quemad-
modum Febris materiam peccantem ex Sanguine amolitur. 84.

Apostemata quomodo Febrem, resorpto pure excitent. ibid.

ad Pestis veræ curationem, nondum excitari a nobis possunt; neque tuto per
Cardiacæ hoc tentaretur, licet ea sola, forte, hoc efficerent. 12.

in Peste ubi ad maturitatem perveniunt, licet Pestilentialem Morbum tol-
lere possint, incertam ac fallacem tamen consuevit curationem. ibid. 14.

Apozema aperiens & Antiscorbaticum. 142.

pectorale in Morbillis ad Tussim. 25. In Pleuritide. 35.

purgans post Febres Intermiss. Autumn. propinandum, Hydropem ex his natam
sepe tollens. 10.

Aqua pura, & cruda ni ab ineunte ætate adsumatur, nocua. 103.

si potatur in iis, qui spirituosos liquoribus diu adfuerint, Hydropem
parit. 107.

Podagricis, pura & cruda periculosa. 103. frigida ab Auctore Podagræ
imprudenter potata, Diarrhœam excitavit, quod materia in Artus non elimi-
nabatur; quam Sudoribus curavit. 105.

Aqua pura Oleo præsertim ab Auctore, ad dilutionem veneni, ex Mercur. subl.
corrosivo, adsumti. 76.

Mentha in Vomitu egregie confert. 7. In Ileico vero. ibid.

Mirabilis, in Colicæ biliosa, quandam conducit. 27.

Rosarum capiti adplicata vigilis medetur. 6.

Stillatitia composita Antiscorbatica. 37. 151.

ad Podagram. 101.

in Rheumatismo Scorbuto. 37.

Aquæ Bathonienses in Hysterica Adf. si Tunbrigenses non juvant, adunde 92.
Qua methodo fumende, & quamdiu. ibid.
Cardiacæ temperatæ. 22.
Chalybeatæ, vid. Aquæ Minerales.
in Calculo Renum, sepe moriem accerserunt. 131.
Epidemicæ, in Colica biliosa, quando conveniant. 27.
Ferreæ, vid. Aquæ Minerales.
Aquæ Hydropicorum, maxima celeritate, quam ægri vires ferre queant, h. e. singulis diebus, expurgentur, & quas ob causas. 107. Nonnunquam vero dies unus aut alter intercalari potest. ibid.
Vomitione per Crocum Metallorum, ex abdominis cavitate, per sedem, & per os, potenter evacuantur. 10.
in Hydropice, Vomitionis ope, non ita prompte expelluntur, ubi levis Abdominis tumor adeft, quam ubi ingens aquarum copia adgesta fuerit. 109.
Aquæ Hydrop. quomodo ex Abdominis cavo in Intestina transeant. 108.
in Hydropica, diebus Purgationibus liberis, per sedem copiose exercebantur, & sub finem per Urinas etiam. ibid.
Aquæ Minerales Ferri Minera sunt participes. 92. Nihil sunt quam simplices aquæ, virtute Minera, per quam evanescunt impregnata; quod, Clavos, ex calcis Equorum, aqua communi injiciendo imitari possumus. ibid.
artificiales quomodo ex clavis fiant. ibid.
& Naturales, diversos effectus non edunt. ibid. Diuretica sunt & aliquando Ventrem movent. ibid.
quare ipso Chalybe potentius agant. ibid. Viam sibi met ipsi sepe præcludunt, spiritus exagitando, turbandoque. ibid.
ubi sumuntur, si aliquod Symptoma, Morbo proprium, superveniat, & transitum Aquarum impediatur, ab iis per diem unum, alterumve, abstinentur, donec transierint. ibid.
line Purgantibus intercalatis efficaciores multo, quam si interim exhibeantur hæc, 92.
in Calculosis, ubi tantum lapilli in Renibus hærent, omni æstate liberaliter epotæ, præstantissimum ad eos exturbandos, horumque incrementum impedendum, medium est, 132. 146. Quid agendum ubi hæ non possunt. 150.
non usurpanda, nisi prius notum fuerit Calculum majorem non esse, quam ut per Uretres transire queat; cum alias multum noceant. 132. 146.
Aquæ arti & nat. purgantibus admixtis, in Calculosis, quomodo noceant, si Calculus major, quam ut ex Renum pelvi ejici queat. 132.
in Diarrhæa, Ventris Tormentibus, Vomitionibus, a Febre oriundis, perniciosæ sunt. 114.
in Erysipelatose Eruptionis Specie. 37.
in Gonorrhæa virulenta quare noceant, & Scroti tumorem, ut & Carunculas, producant. 79.
in Hysterica Adf. ubi Chalybs non juvat. 92.
Podagricis quondam male cedant. 132.
Sulphureæ calide uti Bathonienses, in Hysterica Adf. ubi Tanbrigenses non juvant, adunde. 92.
Tunbrigenses ad Hysterica Adf. si Calybs non juvat. 123. ad Icterus perniciossimum. 28.
Ardor Urinæ in Gonorrhæa virul. qualis. 78.
Arenulæ Nephritidem ubi causant, quid agendum. 94. ad 95.
Argentum vivum, & Globuli, plus mali, quam boni, præstant, in Ileo vero. 7.
Argumenta Pestem inflammatoriam esse morbum quæ persuadent. 12.
Aristoteles Melancholicos ingenio ceteris præstare adserit. 90.
Aromata in Podagra quare vitanda. 103.
Aromatica, si eorum species quædam miscantur, quasi aliquid tertium gignunt; quod in ita conjunctis majorum est virium in pari quantitate, quam in eorum quolibet. 102.
Ars Medica haud rectius, quam ab ipsius Artis exercitio, atque usu, perdiscenda. VI.
Ars Med. duobus mediis ulterius provehi potest, sum ope Historiæ Morborum exquisita, sum Methodi medendi fixæ ac consummatæ. VIII. Hæc vide ib. & IX.
si illa Methodo semper traderetur, ut Indicationes ex Historia Morbi, seu Morborum Phenomenis, observando elicerentur, hocque Experientia firmaretur, non vilesceret, quin potius illustraretur; & difficilior reddita, nonnisi sapientes & peritos admitteret, atque rudi vulgo de uno aliove Morbo forte tantum constaret; nam uti major subtilitas in Naturæ operationibus, quam in alia arte, sic Ars Medica quam Natura præcipit, ingenium vulgi longius superaret, quam ea, quæ a Philosophia docetur. 42.
Febrim Curationem per Diaphoresin imitari nequit; quia nescit quomodo materies ad exitum præparanda; istius præparationis nulla habet indicia; & deinde ignorat quantum temporis in sudore persistendum. 115.
Arthritis sepe habetur, quod verus Rheumatismus est, quamvis essentialiter differant; sed fit quando hicce a Febre sejungitur. 36.
& Pestis nec non plerique alii Morbi, Naturæ Medicatricis instrumenta sunt. I.
Scorbutum quondam mentiat. 36.
In Arthritide ubi exigua Malignitatis suspicio, haud minus ac in Peste, materia morbifica recursum fatum accersit. 13.
Articuli digitorum & Ligamenta in Podagra irregulari quomodo adficiantur. 100.
Articuli in Rheumatismo sepe invertuntur, cessante jam dolore. 36.
Artus in Podagræ irregularis Paroxysmorum intervallis quomodo se habeant. 100.
Artuum, in Podagra, impotentia ad motum præcavetur unctione in curru; ipso Paroxysmi tempore. 105.
dolor, in Variolis, ingens ac si ex Rheumatismo, Confluentes eas fore prædicat. 86.
Ascites verus, pro deplorato habitus, aque certa, ac alii permulti, qui non ita funesti vulgo æstimantur, subjugantur, modo viscera non sint corrupta. 109.
inveteratus, quomodo partes corruptat, & insanabilis fiat. ibid. Accamen curationem Medicus adgredi debet, quia ignorat, quantum noxæ visceribus illatum. ibid.
Asthma inveteratum, & de repente recedens, in viris habitus plenioris, tumorem Scurum excitas, Hydropicorum emulam, ad mortem usque comitantem. 106.
quomodo curandum. 150.
siccum Febrim non habet, unde a Peripneumonia notha, distinguitur. 36.
Atraxia Hysterica malorum causa. 27.
Spirituum Materiam viridem, biliosam, ævo & nato plerumque semper exprimit; si ipsa fuerit a Convulsionibus, si ab Hysterica adfectione; si a motu Maris in nave; si a Purgantibus, vel Vomitionis, excitata. 90.
Hypochondriacæ seu Hystericæ Adfectionis προηγουμένη seu efficiens causa interna videtur; cujus origo, seu antecedens causa, est debilitas illorum crassæ, quæ facile dissipantur aut perturbantur. ibid. 91. Hinc non videtur Hystericæ Adfect. Morbus a depravatis humoribus pendens, licet ille ipsos inficere valeat. ibid. Quod utrumque Adfectum pluribus Argumentis firmatur. 90. 91.
Atraxia humores putridos, in Hysterica Adfect. diuturniore, quomodo gignat. 91. Ee quinam exinde Morbi. ibid.
Hypochondriacorum, & Hystericarum Symptomata, ut Uteri strangulatum, quomodo producat. 90. 91.
Dolores producents, in Hysterica & Hypochondr. Adf. comparatur actioni vitri Incensorii. 90.
Auctor sapere non audeat ultra quam res ipsa loquitur. 30.
errores suos solito suo candore, ab Amicis, annosa & repetita experientia melius edoctis, reprehensos cupit. 111.
an alii eadem cum ipso adserant, non ita quærit, quam, utrum ea quæ tradit, cum veritate consentiant. 99.
quid de Operum suorum repetita lectione promittat. 110.
in Acutorum Morborum Historia eradenda, non tam metam figere, quam aliis animum addere tentat. XII. Tractatum de Morbis Acutis edendo, viam præmonstrasse existimat, quæ Viri docti Morborum Historiam & Curationem possint investigare. 77. Objectioni respondet, quam contra suam de Morbis Acutis doctrinam, quod Malignitati, quæ pluribus horum Morborum adhæret, non satis adverteretur, fieri posse prævidet. 32. ad 33. Veterum & Recentiorum de Malignitate Opinionem non rejicit, sed suam de ea sententiam exponit. 32. ad 33.
Auctor Chronicorum Morborum Historiam promittit. 77. Temeritatis, quod tanta Laudani copia in Cholera exhibuerit, non est inculpandus. 40.
Epidemicarum Constitutionum vicissitudinis causas, ex Aeris manifestis, Sydenham Opera Medica.

qualitatibus nondum expiscari potuit. 2. Quævis Epidemica Constitutio nova ingruit, anceps hæret, quæ nempe via insitet, ut ægris subveniat; unde unus; aut alter, eorum in principio vita periclitatur. ibid. Dum Epidemicorum Morborum Observationes aliquot Annorum succedentium, ita tradit, qualem finem habuerit. 3. Cum de Morbis Epidemicis Constitus 1676. ad 1680. scriberet; jam per triginta Annos circiter Podagra, & diu Calculo, erigita multatus fuerat. 39. Ee Morbos Epidemicos An 1677. non describit, quia eo tempore Mictu sanguineo, dein Podagra sevisima, per tres menses, cruciatus fuit. 40.
in Febris ejusque Symptomatis describendis, adeo sinterus, ut nullas Opiniones, nullaque cerebri figmenta, orbi vendere cupiat. 38. Veniam rogat, quod in erudenda certiore Methodo, ad Febres ejusque Symptomata, debellandum, spretis aliorum judiciis, suo magis confusus, in semitis, nullo ancea pede calcatis, ingressus fuerit, & rebus novis studuerit. ibid. Integritate solita taceatur, se non semel in Febris ubi de natura earum nondum constaret, & sibi & ægris nihil agendo, optime consuluisse; dum interim invigilans percipisset vel Febrem evanuisse, vel ad Typum redactam fuisse, unde cognosceretur. 33. De curatione Febrim Intermitentium adhucdum ignota conqueritur. 9. Serio monet, de perquirendis mediis, Febres Intermitent. Autumn. citius, quam soles, debellantibus. 10. Cuidam nova Febri, Pestilentiali quasi dein reperta, & Pestem Lond. ipsam prægressæ, Meebodium diversam ab ea, quam hæctenus cum successu, in hujusmodi fere Febris, usurpaverat, adaptare cogitur. 13. Intersubatur ægrorum damno, præadstantium protervia, ne eam liberaliter V. S. instigat, in Febre Pestilentiali, Pestem Lond. inscuta. 14. Hinc in Febre Pestilentiali illa de modo curandi, a V. S. diverso, cogitat. ibid. Et Curationem hujus Febris Pestilentialis, aliam, quam per V. S. frequentiore, invenit. ibid. Hujusque inventæ Methodi successus. ibid.
Auctor in Hydropicis curandis, initio suæ Praxeos, decipitur, usu Syrupi Spinae Cervinæ, quod hujus ope curata Hydropica, quæ facile purgatur, existimavit omnem Hydropem isto Syrupu curari posse. 107.
in Hystericæ Adfectionis Historia tradenda, illud facit juxta vera Naturæ Phenomena, & propriam Experientiam. 89.
ad Medicam Artem, de ea ne vel somnians, quomodo Celeberr. Th. Coxe M. D. horatu, serio se adinverit. 111. Quare se ad Artem Medicam nondum pervenisse putat. 105. Quæ ratione Medendi Scientia ulterius promoveri queat, Tract. de Morbis Acutis, post diuturnas meditationes, & sitam plurium Annor. Observationem in medium proferre decrevit. VIII. Perpulchre de Medicorum in Morbis curandis nimia festinatione ratiocinatur. 19.
Auctor Medicamenta in Hydropicis simplicia, & inartificialia, quod tradat, arguentes redarguit. 109. 110.
de Mictu Sanguineo & Calculo renibus impacto, sum de Podagra, quæ mala in semet ipso expertus, miseratione erga sodales commotus, tantum scribit. 131. 132.
in Peste & Pestilentiali Febre describendis, veniam rogat, quoad Dogmata Theoretica, naturam Morbi quæ respiciunt; verum quoad Praxin adserit, se omni fide, ea tantum proposuisse, quæ exploratissima hæberet; & ægros suos ita tractasse, ac ipse tractari cuperet, si hoc morbo ægrotaret. 14. Difficulenter, in Peste curanda, sudoriferorum effectus, suboras 12. sua Methodo curativa solvit. ibid. Historiam Pestis tradit, quia Medici alii, quæ eoto tempore adfuerunt, de ea nihil, publici juris fecerunt. 12. Fugientium turbis, Pestis metu, amicorum suavis, se adjungit. 14. Tempore Pestis Lond. maxima parte, complurium miliarium intervallo ab Urbe secessit. 12. 14.
in Pleuritide, Curationem frustra tentat, per aliam præstantiorem viam, quam per V. S. 35.
Podagræ An 1660. immaniore quam ante, Paroxysmo, adficiat; quem & Calculus Renum & Mictus Sanguineus inscunt. 131. De Podagra Tractatum edens, jam, per triginta quatuor Annos, ab ea vexatus fuerat. 99. Et calidum regere ex adjuvatur a Joh. Drake. ibid. Podagricus in semetipso Diarrhæam, ex materia morbi in artus non eliminata, sed retroulsâ, propter Aquæ frigide imprudentem usum, enatam, Sudoribus, ubi nec exercitiis, nec Laudano, neque Cardiacis, vel nec adstringentibus cederet, curavit. 105. Sententiam suam revocat, se. Podagra adfectis Purgantia minime conducere. 131.
Auctor Rheumatismi Curationem, tempore aliter edoctus, in quibusdam emendat. 76. Rheumatismi Scorbutici Curationem cum publici juris facit, privato suo commodo publicum præfert. 37.
ad Variolis decumbentes, ne amplius accerseretur, cur exoptabat. 85. Cujusnam essentia Morbus sine Variolæ, ignorat cum aliis. 16. Quod in Variolis curandis Methodum novam induxit. eo magis erit excusandus, quod hæc Recentiorum tantum Curationibus, cum Hippocrati ac Galeno ignotus Morbus fuerit, adfuerit. 31. Qualem de sua, Variolis Discretis & lenibus, medendi Methodo fidem habet. 18. Integerrimus in exponenda Methodo Variolarum curandarum. 85. In sua Variolas curandi Methodo, non phantasia, sed Phænomenis prædictis litat. 88. 89. Quare non definit, an Salivatio ac Diarrhæa, in Variolis Confluentibus, idæo a Natura fuerint substituta, quod parvum hocce pusillum genus materiem Morbi non ita exterminare queat, ac majores Pusule, in Discretis, faciunt. 16. Vene sectionem negligit in Variolis. 31. De Variolis An. 1680 scribit ideo, ut, quæ olim deficiebant ex iis, quæ experientia jam annosius suggererat, faceret. 84. Filium suum, Variolis Anomal. Discret. laborantem, sua Methodo restituit. 26.
Auctor istius Sententie non est, Veneræ Luis Curationem docendam non esse; cum sui negotii existimet corpora sanare, non vero ægros censorio vexare fastu, Deo relinquens fontes castigare. 77.
Auctores in Morbis, horumque Historia siue Phenomenis, describendis, ealis vulgo præbent subsidia, quæ sequentem potius in præcipitia agant, quam in genuina Naturæ Methodo indaganda dirigant; nam nihil eradunt quam Hypotheses, quas lascivientis ingenii luxuria peperit, ad quas etiam Praxin suam, in hominum perniciem non ad rei veritatem, componunt. 77.
qui Venæ Sectionem in Peste commendavit. 13.
Aura liberior in Tussi Epid. 1675. concedenda. 16. 32.
in Variolis vid. Aer liberior.
Autumno humores sunt viscidiores quam Vere. 8.
Autumnus Dysenteris favet. 25.
Axiomata Hippocratis aliorumque Veterum, de Materia Febrili præparanda ad Crisin per sudores rite faciendam, isti soli Febris Constit. 1661. ad 1664. quæ Intermitentes ceteris prædominabantur, videntur adaptanda.

Balsamus e Mecha, Terebinthina genus liquidum, & purum, in Gonorrhæa virul. bonus. 79.
Bulus purgans in Diarrhæa. 23.
Bulus Diaphoreticus in Pestilentiali Febre. 14.
in Pruritu sereno. 37.
Botallus (Leonardus) unus, qui, æquæ ac Sydenham, totum Pestis curationis negotium in copiosa Venæ sectione collocat. 13.
Botalli argumenta luculentissima exemplis plurimis stabilita, V. S. in omni Pestis, supra omnia remedia salutarem esse. ibid.
Botanica sensuum testimonio debet inniti. 3.
Brassicæ folium in Pleuritide lateri imponendum. 35.
Bubo, vel Parotis, in Peste, Febri ardenti superveniens, ægros a luctuoso disserimine sepe liberat. 12.
Bubones in Peste quomodo ex Materia Morbi subtilissima & maxime inflammabilis fiant. 20.
in Peste, ut alii tumores inflammatorii, in Abscessum terminantur. 13.
Pestilentialia suppurations licet, in Pestilenti Febre, incerti ac fallacis tamen successus sunt. 13. 14.
interdum ex improvviso disparent. 13.
Diaphoreticorum præparatorum actione quomodo inopellantur & turbantur. ibid.
retrocedentes, Maculis purpureis succedentibus, letale. ibid. Cujus sepe expressus sudor expressio importuna. 12. 13.
Bubones Veneræ, ex Gonorrhæa virul. primum Luis gradum constituunt. 78.
Butler M. D. in Africa Dysenteriam & Febrem Dysentericam eodem modo, ac Auctor in Anglia, curat. 23.

Cachexia ex Humoribus depravatis. 91.
Calculi minores ex Renum pelvi non melius deturbantur quam Aquarum Chalyb. usu. 132.
Calculus an major quam ut per Uretres transeat, vel an lapillorum congeries in pelvi hæbeat, quomodo dignoscatur. 132. 146.

- ex decubitu in dorso supra lectum submollem, primam originem suam, in Podagricis, sepe desumit. 131.
- Nephritidem ubi caussat, quid agendum. 91.
- Renum vel Vesicæ aliquando videtur adesse, quod tantum effectus quidam Hysterice Affectionis est. 27. 99. Huius Exempl. notabile, ubi Calculo decata nocebant, Narcotica vero iuvabant. 35.
- qua ratione se manifestaverit in ipso Auctore. 131.
- in Podagra inveterata plerumque nascitur. 105. Quid tum agendum. ibid.
- Podagricis superveniens, unde? 100. In Ischuriam aliquando excitans, egrum de medio tollit. ibid.
- in Podagricis Potu acri, & assenuante, tum excitatur, tum generatur. 104. An ejusdem Podagrica materia morbosica portio? 100. Exercitio corporis constantiore prohibetur: sed præsertim, Equitatione, nisi grandior ætas, aut Calculus major impediaverit; tum vero Pessione in curru utendum; sed utrumque fiat in aere ruficano potius quam in urbano. 104. confer. 105. Dein præcaveatur lautiori usu Cerevisie tenuis. 103. Tum usu Potus Diæterici. 104.
- Calculus ubi adest, & vel Nephritidem, vel Mictum sanguineum producat, quænam medela. 105. 131. 132. 146.
- Calefacientia Antidotaria Pestem potius accersunt, quam præveniunt. 12.
- in Apoplexia cur noceant. 146.
- in Chronicis, vid. Herbæ Excalefacientes.
- Corticis Peruviani salutarem actionem delent, in Febribus Intermitt. 40. 41.
- in Dysenteria, & ætas florida, qualia Phenomena inducant. 22.
- a Medicis in Febribus male exhibentur, ad Venenum suppositum per cutim expellendum, ubi Refrigerantia requirebantur. 115.
- in Febribus acutis quæ mala inferunt. 113. in Febre Epid. An. 1673. caput adficebant. 28. In Febre nova Epid. quandonam Iliacæ passionem excitare valent. 114. In Febre hyemali vitanda. 110. In Febribus Intern. Aut. citius exhibita, vel has duplicant, vel in Continuas permittunt. 10. In Febribus Intern. Pueris exhibere periculosum. ibid. In Febr. Intermitt. An. 1678. tamquam Oleum camino additum, eas exasperabant. 40. In Febre nova hyemali, quænam mala inferant. 112. 113. In Febre Variolosa Salivationi efficiunt. 20.
- Calefacientia in Hydrope, quando, & quare, convenient. 109.
- Maculæ purpureas in Febribus augent, pro gradu quo calefaciunt, & contra. 32.
- in Malignis Morbis quibusdam, quare ledant. 32.
- quælibet in Morbillorum, & Variolarum Curatione nocent. 25. Peripneumoniam lethalem inducunt, aliæque mala inferunt, quibus tenaperantibus & V. S. succurritur. ibid.
- Pleuritidem Symptomaticam, quandonam inferant. 35.
- in Pleuritide verò obesse possunt, quo minus V. S. omnem Curationis numerum absolvat. 32.
- Medicamenta vegetabilia in Podagra, quæ amancant vel linguam feriunt, vera sunt in hoc Morbo Digestiva: sed certa cum cautione usurpanda. 102. In aliis Chronicis quoque quare conducant. ibid. confer. ibid.
- in Rheumatismo exhibitæ, frequentioris solito V. S. causa esse possunt. 36.
- Spirituosa in Tussi Epid. 1675. sine periculo non exhibebantur. 32. ibid.
- in Variolis quænam mala, & quo tempore præsertim, inferant. 16. In Ex-pulsionis, initio præsertim, æque ac in Secretionis, statu nocere possunt. ibid. Et quare. ibid. In Eruptionis finem, Junioribus, & Sanguineis præsertim, præmature exhibitæ, eidem potius obicem ponunt, temperantibus amovendum. ibid. Et in temperamentis vegetis, ex Discretis, sepe Confluentes inde red-duntur. 17. Initio Morbi exhibitæ Confluxum Pustularum inducunt, illo modo, quo Aeris intemperies An. 1681 illud ipsum producebat. 234. Ea præmature exhibere, siue agrum lecto adjudicare, ante diem quartum, æque no-cuum. 17. 18.
- Calefacientia ubi Symptomata a nimio frigore, vel ab Evacuationibus indebi-tis, concedenda, sed non diu. 19.
- Anomal. Confluentibus exhibitæ in Dysenteriam quandonam eas mu-tabant. 26.
- Menstruorum fluxu tempore non solito superveniente, adhibita, admi-nis licet adstringentibus, letalia sepe fuer. ibid.
- Pustulas nigras augent, pro ratione qua calefaciunt; & contra. 32.
- Regularibus Confluentibus magis adhuc quam in Regul. Discret. vi-tanda. 18. Salivationem fiant. ibid.
- Discretis sudorem, per se promptum, urgentia, quantum, & quomo-do, noceant. 16. Intumescantiam Faciei, quæ octavo die adesse debet, nec non ruborem inter Pustulas, avertunt. 19.
- sudorem promoventia, quandonam minus noceant, faciei tumorem non ita impediunt. 16.
- Calida in Febribus, Variolis, &c. vid. Calefacientia.
- tempestas insperata, acri gelu succedens, Dysenterias, mense Novemb. An. 1678. leves caussavit. 28.
- Calidum Regimen, vid. Regimen. Calidum.
- Calor Febris in se fere sufficit ad Materie concoctionem, ut sudore expelli que-at; nec calefacientibus iis servidis, forissecus adlatis, indigemus. 29.
- frigido diuturniori Vere, de repente succedens, Pleuritides, Anginas, qualis-cunque fuerit Constitutio, inducit. 34. confer. 2.
- Lecti in Febr. Intermitt. vira Corticis Peruviani enervat. 87.
- Rheumatismum promovet. 36.
- in Variolis Const. vim Morbi adauget, & vira Paregoricorum enervat. 87.
- Plura de Lecti calore in Variolis, vid. Lectum.
- Calor in Pleuritide nocuus. 35.
- Canis tabidi morsus, huiusque Cursus. 150.
- Capillorum abrasio in Phrenitide a calefacientibus inducitur. 113.
- Capitis Dolores in Febre Dysent. An. 1669. frequentiores, sed Sudores vario-res. 23.
- motus, in Vomitione, ex Hysterica Adf. ipsam præ cæteris provocat. 94.
- Obtestio lacinia lancea ad Sudores ciendam mirum quam conferat. 14.
- Carbunculi ac Bubones in Peste materie expulsionis inserviunt, uti Pustule in Variolis. 20.
- Cardiaca servant ægrum, ubi, a Venæ-sectione temeraria, damna inlata. 3. Na-turam languentem adjuvat ubi refrigerantibus, aut Clysteribus, debilitata. 9.
- in Apoplexia, cur noceant. 146. In Dysenteria, qualia, quando, & in qui-bus, propinanda. 22.
- moderatiora, uti & calidiora quo tempore Febris, & quonam in casu gra-datim &c. sumenda. 5.
- Cardiaca Febribus contin. An. 1661. &c. initio quare non exhibenda. ibid. Cir-ca earum finem, quando necessaria. ibid. Post Evacuationes institutas, quænam esse debeant. ibid. Quando in initio propinanda. ibid. In debilibus requi-runtur, ut Febres spatio 336. hor. h. e. 14. dier. depurationem suam absolvere queant. 9.
- inopportuna transmutant Febres Intermittentes in Continuarum Speciem. 40. 41. Et Corticis Peruviani salutarem effectum delent. 41.
- Corroborantia in Febribus Intern. Autumn. ad Naturam sublevandam, quando & cur convenient. 9. Sufficient adhuc Senes per tempus aliquod. 10.
- in Febre Scarlatina quare damnosa? 34.
- in Febre Variolosa Salivationi obiciunt. 20.
- in Mania post Febr. Intermitt. diuturn. nata, exiguntur. 11. Eorum usus quando dimittendus. ibid.
- verantur in Phrenitide præsertim ante usum Narcoticorum. 6.
- in Variolis nocent, quod Ebullitionis statum nimis evitant. 17. In tempe-stiva quænam mala producant. 85. Initio se vitantur Maculæ purpureæ, & Mictus Sanguineus præcaveantur. ibid. Ante diem quartum non necessaria, Diarrhœa quamvis adsit. 17. 18. Mortis sepe causa sunt, licet V. S. præ-gressa sepius impetatur. 17.
- Discretis sudorem, per se satis promptum, urgentia, qua ratione no-ceant. 16.
- præmature exhibere, & lecto ægrum adjudicare, ante diem quartum, æque nocuum esse. 90. ad 18. Quarto die quandonam exhiberi queant. 17. Sed Paregorica esse debent, & qualia. 18. Effectum hic quomodo edant. ibid. Omni tempore, quænam occasione exhiberi queant; & quænam tum illa sunt. 19. Confluere faciunt Pustulas, si inopportune applicentur. 17. Hocque præsertim in temperamentis vegetis. ibid. In Eruptionis finem & ad eam acce-lerandam, præsertim in junioribus & sanguineis, in initio præmature exhibi-tæ, Eruptionis potius obicem ponunt, temperantibus dein amovendum. ibid. Retrocedentibus Var. ex P. S. inopportuna, vel frigora nimio applicato, ad-hibentur; sed caute, neque nimis fortiora sint. ibid.
- Cardiacorum Generosiorum Formulæ 11.
- Moderatorum series. 5.
- Carnes vetantur in Podagræ Paroxysmo, si ab iis abstinere sine alio incommodo possunt; alias modice concedenda. 105. Harum usus Hypochondriacos & Hy-stericas restaurat. 91. Et abstinencia ab iis Morbum sepe invitat. ibid. con-fer. ibid.
- Caruncula in Gonorrhœa Virul. est caro spongiosa in Urethra, ab ejus excoria-tione enata, sensim indurata, Urinæ viam interceptans. 78. Ex ulceribus sibi adnatis ichorem sepe quemdam evomunt; quod tum pessimum malum. ibid. Ex Aquis Mineral. sepe nascuntur. 79.
- Calus rari ad Historiam Morborum non pertinent. IX.
- Catamenia, vide Menstrua.
- Cataplasma, ad dolores ab Allia pedibus applicito excitatos. 87. In Hydrope, Abdomini applicitura ad discutendum, nec nocet, nec prodest. 109. In Po-dagræ paroxysmo, quod Auctori præ ceteris profuit. 106. In Punctura Tendi-nis a V. S. 35. In Rheumatismo. 36. In Scroti inflammatione a Morbo Ve-nereo. 79.
- Catarrhi, & Tuffes Epidem. An. 1675. videantur. 28.
- Cathartica, vid. Purgantia.
- Catulus vivens, in Ileo vero, nudo ventri quamdiu accumbendus. 7.
- Causæ Proximæ & Conjunctæ solæ a nobis possunt cognosci; & ex iisdem con-tum Indicationes Curativæ sunt mutuandæ. X. Intellectui se fiunt, vel sen-sus testimonio, vel Anatomicis Observationibus ab aliis jam factis. ibid.
- Remotiores Morborum, seu primæ, sunt imperferabiles, neque ex iis, sed ex conjunctis solis cognoscendis, Indicationes curativæ sunt mutuandæ. IX. Quod demonstratur. ibid. confer. X.
- Morbosæ Symptomatum peculiarium perceptione, deprehenduntur. VIII.
- Causarum Differentia quælibet specifica nos latet. 26.
- Cerebrum humanum ita, forte, constitutum, ut non tam quid absolute verum, quam quid maxime conveniens, ac suis Naturis adcommodum, percipiat. 116.
- Sensus & motus fons, ac Cogitationum & Memoria officina, quamvis nobis adpareat, tamen ex ejus substantia assignare nemo poterit, qua ratio-ne ex natura ejus vi, & structura partium, hæc illare facultas necessario fue-rit exercenda. 89.
- Cerevilla generosior, in Hydrope, iisdem sub conditionibus admittitur ac Vi-num. 109.
- medicata, in Hydrope, pro Pauperibus. ibid.
- purgativa. 142.
- cui Macis aliquid incoctum, ad Diaphoresin, in Pestilentialibus morbis, continuandam. 14.
- cum Rhabarb. pro Infantibus, quomodo paranda, & qua ratione adsu-menda. 115.
- tenuis Calculum ardet, in Podagricis. 103. In Calculo hausta ante motum in Curru, Mictum Sanguineum præcaveat. 131. In Febribus, agris non dane-ganda, sed potius commendanda. 5. cum Aurantium succo, in Febrili ar-dore. ibid. cum Vitrioli spiritui, in Mictu cruento, & Petechiis, ex Febre acuta. 83. In Morbillis Anom. An. 1674. pro potu. 30. In Peripneumonia notha. 36. Lond. in Podagra optimus potus, lupulata sit vel non. 103. In Tussi Epid. ubi Febris &c. adsunt. 32. In Variolis organum temperat. 39. In Variolis Anomalis Discretis, pro Potu sufficit. 26.
- In Variol. Confluent. qualis eligenda. 87.
- Chalybs in Chlorosi exhibitus quomodo pulsus & faciem emmuset. 91. In Hy-drope, initio Morbi haud infimum sibi vendicat locum. 109. In Colica Hy-pochondr. & Hyster. in primis confert, non ad Symptomata lenienda, sed radicem Morbi exstirpandam. 148. In Hysterica Adf. ad dies triginta adsum-pus, post Evacuationes, Remedium est præstantissimum: Et qua ratione a-gat. 91. Statim ante Evacuationes exhibetur, ubi nimis debiles ægræ. ibid. Si eam curare non valet, Aqua Mineral. adjuvanda. 92. Quæ si non juvant, Aquis Sulphureis calidis utendum. ibid.
- Calybs in Substantia omnium optima, & cito, & citius, opus persolvit. 91. Ipsius Minera e terra effusa nondum ignem passæ, an præstantior adhuc, ibid. In Syrupi forma post substantiam, præ cæteris formis conducit. 92.
- in Substantia adsumptus, sine Purgantibus intermissis, an in Visceribus herens nocere possit? ibid.
- sine Purgantium intermissione citius & præstantius suum edit Effectum. ibid.
- Exhibitus, si corpus nimis turbet, Laudano atendum. ibid.
- Chemia plurimum emolumentum Medicinæ adferens, non tamen sola habenda Avs, quibus illa promoveri tantum possit. 108.
- Chemici Medicamentis suis nondum meliora præstare possunt, quam alii succis, vel Decoctis, simplicibus. 90. Remedia optima nimis officiosa sedulitate enervant sepius. 91.
- Chirurgus, in Castro Duntar, V. S. audaci ac liberali, Milites a Peste sa-nat. 13.
- Chlorosis idem ac Febris alba, species Hysterice Adfect. ex Humoribus depravatis. 91.
- ea Methodo qua Hysterica Adf. sanatur. 92. 150.
- Chlorosi laborantes Clava Hysterico frequentius adficiuntur. 89.
- Cholera Morbus ex Epidemicorum Familia, Augusto exorsus, mensis spatio, sua percurrit tempora. 2. 26. 147. Alio mense, quam Augusto non grassatur, licet eadem causa adsit; ac se in ære cum aliquid, quod specificam hanc alterationem producat, residet. 22.
- Cholera Morbus alio tempore, quam Augusto, invadens, a Legitimo toto celo & distat. ibid.
- intra 24. horas interficere potest. 21. 147.
- siccus eisdem datur, cujus unum modo vidit exemplum Auctor. 27.
- legitimus describitur. 22. 147.
- a fructibus borariis excitatur. 22.
- legitimus An. 1659. antea numquam ita Epidemicus, grassari incipit, sem-per intra Augusti cancellos contentus, vix Septembri mense adparet. 21. 38. 147. confer. 2. Ejus Symptomata. 21. 147.
- ejus Symptomata licet a crapula videantur, & eodem fere modo curentur, alterius tamen Naturæ Morbus est. 21. 147.
- curatur partim diluendo, & partim evacuando humorem peccantem. 21.
- Adstringentia & Narcotica intempestive exhibitæ pluribus malis occasionem præbent, inimicum visceribus includendo, & bello intestino occasionem præben-do; binque Febrem accendunt, quæ Emittit tantum tollitur, adeoque initio curata non sunt. 4. 21. Evacuantia tamen hic etiam curata non sunt. 22. confer. 21. Et Cathartica exhibere idem esset, ac oleo ignem extinguere. ibid. 22. Jusculum ex Pullo multa aqua cocto, tam per Os, quam Enemata, adsum-ptum, Syrupis lenibus admixtis, magnam partem absolvit, initio Morbi. 21. 147. Possetum loco Jusculi ad abluendum stomachum exhiberi potest. ibid. Quam-diū ita abluendum. ibid. Paregoricum, abluo jusculis ventriculo exhibendum. 21. Potendi conans majorem haustum Medicamenti vetat. 39. Post horas 10. vel 12 vomitus & dejectionis, si Medicus accersituscantem, frigescentibus extre-mis, Paregorica illico exhibeat; atque mane & sero aliquandiu in iis con-tinuandum. 22. 147.
- Cholera Morbus An. 1676. exeunte ætate Epidemicæ regnare incipiens, atrocio-res Convulsiones, & diuturniores, habuit. 39.
- Curabatur ut legitimus. ibid.
- Anodyna fortiora, & magis repetita solito, exigebat. ibid. Quietem corpo-ris, ne vomitus de novo excitaretur, diuturniorem commendabat. ibid.
- Cholera Morbi species in Infantibus ex Dentitione vel Crapula. 147. Quomo-do curetur. ibid.
- Choreæ Sancti Viti qualis Morbus sit. 113. 146. Ætates teneras adorat. ibid.
- Causam quamnam ponat. 113.
- curatur, minuendo humores V. S. & Purgantibus; dein genus Nervosum roborando. ibid. confer. 145.
- ubi semel invasit, facile sequenti Anno redit; quomodo præcavenda. 113. 146.
- Choreæ vero adhuc Auctori occurrit, & quinquies modo vidit, ac curavit. 113. Chronicis Morbi, vid. Morbi Chronici.
- Cibi eupepti in Febribus Intern. & modicum Vinum, ubi Cortex Peruvianus nihil amplius efficit, rem sepe absolunt. 41.
- in Gonorrhœa virulenta quinam sumendi, quinam vitandi. 79.
- Cicatrices post Variolas unde fiant, & cur primis diebus non adpareant. 15. Ab humoribus nimis calidis fiunt; sed Auctoris Methodo præcaveantur. 31.

— Anomalia, An. 1670. ad 1672. fecliores erant. 22. Post Confusio-
nes foedæ unde fiant. 16. Post Dyfcretas raro relinquuntur. 15. Linimentis an
præcaveri queant? 19. Regimine temperato præveniuntur. ibid.
Cicero laudatur. 39. Quod de fupervifiofis dicit, Melancholicis quadras. 90.
Circulationis Sanguinis impedimentum & quafi strangulatus, a Venæ-fectione,
in Febribus, neglecta, quando. 3.
Clavus Hyftericus defcribitur. 90. Quomodo ex fpiricum enormitate procedat.
ibid. Quomodo curetur. 147.
Clyfter, vid. Enema.
Cofta non cruda funt medicanda. 20.
Cogitationes nimis Podagricis obficiunt. 84.
Colica biliofa Confiftus An. 1670. ad 1672. defcribitur, & 147.
— Chronicis cum adnumerari debeat, quare inter Acutos hic defcribitur. 26.
— Hanc præcedebant Symptomata, qua Dyfenteriam iftus temporis præcedere fo-
lebant; & Dyfenteria ipfa aliquando præcedebat. ibid.
Colica biliofa quofnam, & quo tempore præferim adoriatur. ibid.
— Incipit cum Febre aliquot horarum, fi Dyfenteria non præcefferit. ibid.
— Dolorem quantum inferat. ibid.
— ex Hyfterica Adfect. orta. 90. confer. 89. Quædam Hyfterica Adfectionis
merus effectus 27.
— ab eo, quam Hyfterica Adfectio fimulat, exquisitè diftinguendo in Cura-
tione. 94.
— à Nephritico dolore quomodo diftinguatur. 147.
— in Miacem Paffionem facile tranfit. 26. 147.
— ab humore acris fanguinis, ad Inteftina translato, orta videtur Auctori. 26.
— curatur evacuando humorem antecedentem in venis, & continentem in vi-
fceribus, tum impetum & dolores compescendo. ibid. Que perfolvuntur V. S.
Anodynis, & Catharticis. 26. 147. confer. 27. Que Methodus feliciffime
Auctori præ aliis celfis, ubi Enemata carminantia crabrones irritant & Mor-
bum diuturniorem reddant. 25. Sed a Narcoticis, omiffis aliis, incipiendum
aliquando, ubi ante Morbum hunc egritudo quædam evacuationes copiofiores
expoftulaverit. 26. ad 27. Rei Exempli trahitur. ibid. Si ægro alio non fa-
cile folubilis, leniora Cathartica non exhibenda. 26. Cathartico vim quan-
donam eludat. ibid. Si Cathartica Ventriculo retineri nequeunt, Anodynum
præmittendum eft Cathartico; fed quidem horis duodecim, & ultra, interpo-
fitis. 27. Anodyna poft Cathartica, & diebus inter Purgationes, mane & fe-
ro exhibenda. ibid. Ubi non amplius purgandum, in ufu tamen. Narcotico-
rum, & larqæ quidem dofi, continuandum mane & fero, donec dolores cessa-
verint, & non ultra. ibid. Ubi Fructus horæ, vel Cibi duntaxat Morbi
caufa funt, ventriculus Zythogula antequam alia inftituatur, diluendus.
26. 147. Dein exhibetur Narcoticum, & fi quæ die vena fecetur. ibid.
Dieta quenam. 27. Diu adhuc poft Curationem in illa continuandum. ibid.
Equitationem vero poftulas hic Morbus. ibid. Dolor ubi recidit, Paregori-
co hic de die exhibito, prævertitur, vel eo non juvante Equitatio unum fup-
er. eft remedium, vel in Cuiu veltio, fimul tum Anodyno, poft debitas Eva-
cuationes, fi diu continentur. ibid.
Colica biliofa ubi non bene tractata, fi languor adest & macies, quenam exhi-
benda. 27. 147.
— Hypochondriaca eodem modo concipitur & curatur, ac Hyfterica. 148. 27.
— Hyfterica defcribitur. 131. ad 28. 147. Ad ungum Colicam biliofam refert.
27. Quafiam aliquando præcipue Mulieres adficiat. ibid. Iterum aliquando
comitem habet. ibid.
— a Spirituum ἀταξία & inordinato motu, potius quam humorum vitio a-
liquo, producit. ibid. Hoc Causæ antecedentes probare videntur.
Colica Hyft. proprie ift Adfectus Hyftericus, Coli partes adjacentes occupans.
ibid. Dolor licet vehemens in eo, nullum tamen vitæ difcrimen adportat, nifi
perverfa cura. ibid. Dolor in eo Morbo acutiffimus, ubi folvetur Paroxyfmus.
ibid. Ifterus hic aliquando comitatur, brevi fponfe evanefcens, ibid. Vel ex
hoc Morbo oritur. ibid. Animi leviffima commotio Symptomata revocat. ibid.
Exercitium præcuratur idem facit. ibid.
— aliter longe curatur, quam Biliofa. ibid. V. S. Purgationes, Enemata,
vetantur; Anodyna rem abfolvunt. ibid. 93. Paregorica quandiu, & qua
Methodo ufurpanda. 147. Præftat vero Zythogula ventriculum abluere ante
ufum Anodynæ. ibid. Anodyna poft Curationem, ut in Colica biliofa, conti-
nuanda funt. 27. Verum aliquando ob humorum in corpore abundantiam,
Phlebotomia, vel Cathartica, Anodyno via aperienda eft; quod tum præftantius
agit, & minori dofi. 27. 147. Hæc Morbi Curatio radicalis alio loco tradi-
tur; fed Symptomatum Curatio exhibitur. 27.
— Lactæ Dieta præprimis curatur, ubi reperiata Narcoticorum vis nihil am-
plius, cum recidiva fit, juvat. 93.
— fi per Paroxyfmos affligit, ad eos prævertendos quid agendum. 147. Chaly-
bs tandem poft varia ufurpata, in primis Morbum erueri valet. 148.
Colica Piftionum quinam Morbus; & quomodo curetur. 147.
Collutorium in Oris exulceratione intolerabili, ex Salivatione Mercuriali. 80.
Color Evacuationibus rejectæ materiæ, non tantæ auctoritatis eft, ut inde de
Malignitate dijudicetur. 27.
— Interititiorum Pustularum in Variolis Dyfcretis, octavo die ruber, inftar
Rofarum Damascen. ex inflammatione legitima; fi enim pallor adest, ma-
lum. 15. 16.
— Materiæ viridis, in Hyftericis rejectæ, quomodo ex ἀταξία Spirituum. 90.
— Pustularum, in Variolis, harum naturam quomodo diftinguat. 16.
— Anomalia Dyfcretis, An. 1674. non niger eras. 30.
— Genuinis naturaliter fubflavus eft. 16.
— ruber in Variolis, in Interititiis Pustularum, inftar Rofar. Damasc. Osta-
vo die incipiens, bonus; fi cito recedit, malus. 15. 16.
— faturatus, Chemica arte, ex duobus limpidis liquoribus exhibitur. 90.
— viridis humorum noftorum excretorum, non magis exigit, ut acres hifint,
quam ubi ifti acres, ut virides fint exigant. ibid.
Colorum fpeculatio adeo lubrica, ut de corporum natura, in quibus adparent,
nihil certi poffit deprehendi. ibid.
Coma, in Febribus, plerumque Naturæ committendum, tumque tuto, licet
tarde, recedit. 29. Confirmatur Hiftoria. 30.
— in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. qualis fuerit. 28. 29.
— & Stupor in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. Naturæ ope fenfim recedebat,
fed aliquando tricefimo tantum dis. 29. 30. Quo tempore absurda licet pe-
tere eger, erant concedenda. 30.
Coma ex Febre nova Epidemica a calore lecti. 112.
— in Febre nova Epidemica, ubi adft opprefia, adesse videtur, fi lingue
albedinem excipiat. 113.
— in Febre nova Epidemica, ubi adest, vel calefacientibus ubi inductum,
tractandum ut Phrenitis. ibid.
— in Febre nova Epidemica, naturæ committendum, poft V. S. & Purga-
tiones inftitutus. ibid.
— in Febre Scarlatina Infantis, quomodo tractandum. 34.
— a Paregoricis, poft purgantia exhibitis, non excitatur, fed potius amolitur
quod fi Auctor cogitaffet, cum in Febre Comatofa, An. 1673. Enomata præ-
fcriberet, aufus fuiffet Purgantia exhibere. 112.
— in Variolis, aliquando Symptoma eft. 16.
— Confluentibus ex calido regimine natum, contraria methodo, qua &
præcaveri poffiffet, isidem tollitur. 19.
Comatofus Adfectus in Febrium Intermittent. Paroxyfmis, tam in Infansibus,
quam Adultis, fepe invadentes, non adtingendi, quin adgraveretur malum;
fed Febris tantum, cujus Symptoma funt, tollenda. 86.
— Variolas Confluentes præcedere folent. ibid. Quid tum agendum. ibid.
Combustio, vid. Ambullio.
— in Podagra, ad dolorem committendum, Remedii genus eft, quod, Indiis
Orientalibus Moxa, feu Mufci Indici, ope acceptum licet feratur, & Euro-
pæis incognitum habeatur, Hippocrati jam ante his mille annos, ope Lini cru-
di cognitum fuit. 106. In podagra incipiente tantum prodest. ibid. Combustio
illa cauffam Morbi antecedentem, h. s. Indigestionem, non attingit, neque in
Podagra inveterata, aut perversa cura intro repulfa, aliquid præftabit. ibid.
Commotio Febrilis h. e. Commotio inordinata maffæ Sanguineæ, Febris vel
cauffa, vel comes, a Natura quem in finem concitetur. 3.
— maffæ Sanguineæ, qui differat a Fermentatione liquidorum. ibid. A na-
tura concitatur, tum ob materiæ ipfi adversantis fecretionem, ibid. tum ad
fanguinis renovandum flatum, & immutandam diathefim. ibid. Sic tamen,
in utroque cafu, hoc inditatur, in Febr. Contin. præferim, ut illa intra mo-
dum. Natura propofito congruentem, fiftatur, h. s. ne hinc plus æquo gli-
fiat, nec illine nimium sorpeat; & quare, ibid.
Sydenham Opera Medica.

Commotiois Vocabulum, in exponendis Febribus, cur potius quam vel Fernien-
tationis, vel Ebullitionis, arrideat Sydenhamo. ibid.
Computatio in Variolis, femper a primo Morbi infultu fit. 16.
Concoctio Materiæ febrilis quid fit. 5. Urina in Febribus Continuis, in decli-
natione præfertim, hanc denotat. ibid.
— in Febribus, qua, exolefcente Intermittentium Autumn prædomi-
nio vigeant, decimo quarto die plerumque contingebat. 33. Acceleranda at-
temperantibus diffis non eft. 5.
Concoctionem Materiæ febrilis promoventia Remedia, Medicis dicta, non in-
telligit Sydenham. 5. Quid juxta ipsum finit. ibid.
Concoctiones æftivo tempore cur melius perfolvantur, quam hieme. 105.
— Motu corporis jufto ut promovantur, fic jufto vehemensiore latuntur. 104.
Conditum, vid. Electuarium.
Confluentes Variolæ, vid. Variolæ Confluentes.
Constitutio Epidemica generalis unde pendeat, vid. Constitutiones Epidemicæ.
— qualibet Morbos parit, a Morbis ejusdem generis, alio tempore graf-
fantibus, multum abludentes. 2.
— Generalis qualibet propria ac pculiari fibi Febris Specie funeftatur, quæ
extra illam nufquam comparat. 23. 15.
— Anni qualibet huic illius Morbo Epidemicæ producendo favere folet, & a-
lios Morbos concurrentes, in ejus fimilitudinem decurves. 32.
— alicujus Anni generalis variis speciebus Epidemicorum communis, eorum
materiæ ita effingit, & format, ut licet ab invicem, quoad Typum &
formam specificam dilent, præcipua tamen Symptomata omnibus paria finit;
atque ut ut diverfæ hæc quoque fuerint species, quoad tempus invasionis, fævi-
tiæ, & remiffionis, confimiles finit. 2.
— Epidemica Universalis eadem manet, licet Epidemici Morbi, qui ad eam
referuntur, nunc excludantur, nunc intromittantur, certo tempore prout aeris
qualitates manifeftæ illis plus vel minus favent. 24. confer. 2. Que Aeris
manifeftæ qualitates eam habens in hoc Epidemicos poffetatem, ut intromit-
tantur aut excludantur prout illis favent, atque hi fe modo exferere poffint ea
tempeftate, ad quam fenfibilis ille qualitates eos deftinaverint. 24.
Constitutio Epid. totius anni, a Morbo circa æquinotium Autumn. maximopere
fufente, nomen fuum adipifcitur. 2. Et licet alii fub eadem Constitutione oc-
currant Morbi, ille qui a Constitutione generali pendet, & principatum obti-
net, Autumnum iterum dominabitur, ipfque reliqui omnes cedunt; ut patet in
Variolis An. 1661. ad 1664. Autumn. Epidemicorum coorti, Febribus nem-
pe cedentibus. 11. Tum in his Morbis, Dyfenterie An. 1659 ad 1572. au-
tumno, adfide cedentibus. 21.
— Epidemica generalis fuas Periodos augmensi, ftatus, & declinationis,
hæc alias quam Epidemici iidem in fubjecti particulari. habent. ibid.
— qualibet generalis exafto aliquot Annorum curriculo, faceffit, atque alte-
ri locum cedit. 2. 89. An itaque Constitutiones Epidemicæ alæ dantur quam
ab Auctore traditæ, an vero, exafto quodam Annorum curriculo, alie alias,
certo ac conftanti ordine, excipiant, ignorat Auctor isidem. 33.
— Epid. in Variolis Anomalia An. 1670 ad 1672. Phænomena plura infigno-
ra, a Constitutione An. 1667. ad 1669. differentia, producit. 25.
— Regularibus Confluentibus, Maculas purpureas, Pustulis inter-
fperfas, quandonam exitet. 16.
Constitutio Variolofa triplex Auctori fuit nota, quarum gradus adeo diverfifue-
re, ut pofterior priora femper exsuperavit, cum ratione putredinis, tum mi-
noris concoctilitatis. 30.
Constitutiones Epidemicæ variis Annis variant. 2. confer. ibid. Que varietas
reperitur tam refpectu Symptomatum, quam ratione mediet. ibid. Et hujus
diverfitatis cauffa hætenus latet. 2. 133. Equidem illa fuam vim, ut Epide-
micos Morbos producant, ab occulta & inexplicabili quadam Alteratione in
ipfis terræ visceribus, unde aer effluviis humana corpora huic illive Morbo
addicentibus, determinantibusque contaminatur, quamdiu fiat hæc, illave,
Constitutio obfiftens: non vero a manifestis aut fenfibilibus Aeris Qualitati-
bus, ut calore, frigore, &c. hoc pender; fed illa Conditio recondita Conftitu-
tionum cauffa productiva Epidemicorum Morborum eft. 24. confer. 2. & 34.
An forte Corporum celestium influxus hanc Epidemicorum Constitutionem pro-
duceret? 102.
— partes inimicas, aeris permiftas, in initio valentiores habent, quam ubi
earum vires refractæ. 22. Exemplum datur in Piffe, & in Dyfenteria Confis.
An. 1669. &c. 22. 23.
— quæ Intermittentes Autumnales promovunt, communibus annis multo
fæpius recurrunt, quam illæ, quæ ad Epidemicos ceteros faciunt. 3.
— Pestilentialis aeris, Dei bonitate, variis eveniunt, quam illæ, quæ aliis
Morbis Epidemicis, minus exiftalibus, fufcitandis inferviunt. 11.
Constitutionum Genera quinque, currentibus An. 1661 ad 1675. exiftite: quin-
que nimirum aeris Diathefes, totidem Febres Epidemicæ peculiare. 33.
1. Constitutio Epid. An. 1661. ad 1664. quæ ferme nihil, quam Febres Con-
tin. & Intermittentes, quæ ultima tamen principatum obtinebant, produxit.
4. 38. Variolæ tamen qualiter æftate confertiffime quoque invadebant; fed
Autumno Febribus cedebant. 62. Traditur hæc. 3. 11.
2. — An. 1665 & 166. quæ Pestilentialis fuit: hæcque durante, delite-
febant Variolæ, quæ brevi poft adparuer. 15. Traditur hæc. 11. 15.
3. — An. 1667. 1668. & partim 1669. Variolofa fuit; continebat Va-
riolas, fimulque Febrem novi generis Variolofam dictam, quod Pustulis dem-
tis, non multum ab illis abhorret. 15. Accessit isid. An. 1668. Diarrhœa E-
pidem. ejusdem Naturæ ac dicta Febri. 20. Traditur hæc. 15. 21.
4. — An. pro parte 1669. ad 1672. Dyfenterica præprimis fuit, nam &
Cholera Morbus, & Variolæ, atque Febres Intermittentes, quæ tum grassaban-
tur, qualibet Anno Autumno fuperveniente, Dyfenteria cedebant; Febri vero
Dyfenterica hyeme regnabat. 21. ad 106. Traditur hæc. 21. 28. Quo ritu &
ordine fe mutuo fubfequentes iterum fibi invicem cedentes, Morbilli, Tormina
ventris, Variolæ, Dyfenteria, Febres Dyfenterica, & Febres Intermittentes,
fepe habuerint. 21. Constitutio hæc nonndum penitus exincta erat, quando
Constitutio nova An. 1673. eft ingreffa. 28.
5. — An. 1673. ad 1675. infecuta eft. Hujus omnes Morbi prquam A.
nomali & irregulares fuer. ibid. Funestabatur quidem primo Anno Febre
Continua illa Constitutio, quamvis tum nondum virtutis iftius eras, ut Con-
stitutionis præcedentis Morbos penitus excluderet. ibid. Morbilli altero An. in-
fecuti funt, & Variolæ ingreffæ dein; Tuffes tandem, fupervenientibus Pleu-
ritide & Peripneumonia orta. ibid. Traditur hæc. 28. 33.
Constitutionum Genus alterum ab Anno 1676. ad 1685. traditur. 39. 76. In eo
Morbi Constitutio An. 1676. Morbos eisdem ad Conf. An. 1673. ad 1675. fed
mitiores & minus Epidemicos peperit. 39. 40. Aeris tamen Qualitates mani-
feftæ peculiare, illo Anno, quoad calorem & frigus, erant. 39. Quid inde
concludendum. ibid.
Constitutio generalis An. 1678. ad 1685. adeo Febr. Intermitt. favebat, ut Fe-
brim Continuum nullam toto tempore nifi forte ex perversa cura, videret
Auctor. 42.
— nova Ann. 1683. primo exfolvente gelu, mense Februario, fe
manifftavit. 112. An mutata fit Conf. præ manifestis aeris qualitatibus An-
norum binorum 1683. & 1684. fæviffimo frigore ita notabilium, ignorat Au-
tor; cum pro comperto habeat Epidemicorum Species non pendere a fenfibilibus
aeris Qualitatibus. ibid.
Contagium quomodo propagetur. 32.
Continuæ Febres, vide Febres Continuæ.
Confusiones V. S. & Purgantibus, alternatim iteratis, tutiffime curantur. 106.
150.
In Confusionibus quenam fpecifica vulgo habentur. 106. Quenam vero ad ar-
tis regulas exhibenda. 150.
Convulfiones fve Vapores, promiscue, vocari poffunt Hyfterica Adfectionis
Effectus 27.
— partium particularium, forte Adfectum Hyftericum consti-
tuunt. ibid.
— Infantum, vid. Epileptici adfectus, vel Epilepfia.
Convulfi motus non femper Evacuaciones inhihent. 113.
Cordis Scrobiculus in Variolis dolet. 15.
Cornu Cervi Spiritus, in Infantum dentisntium Febribus, arcanum.
115.
Corpus humanum cur fibi non femper conftet, fed egritudinibus obnoxium.
VIII.
— variis malis, quod variis impreffionibus forinfecus advenientibus exci-
piendis aptum, obnoxium eft. 1.

Correctiva dista Purgantibus admista, Cathartim reddunt spioriosorem. 79.
 Corroborantia, vide Roborantia.
 Cortex Peruvianus vulgo Pulvis Patrum apud Londinenses jam, tempore Sydenhami, ab Agnis circiter viginti quinq; ad Quartanas curandas, notus fuerat. 40. Quasnam laudes mereatur ibid.
 Cortex Peruv. solus, specificum Medicamentum notum habetur. XIII.
 Dogmaticorum inscitiam, in dignoscendis Morborum essentiis ac Remediis, detexit. 106.
 Senotorem, Capitaneum, & Pharmacopolam, Londini necat. 40.
 innocens, & mali nihil inferens, Medicamentum, Princeps Remediorum haberi fere potest. ibid.
 Rheumatismi Scorbutici speciem, facile superabilem, si umquam quid mali, inferit; sed raro. ibid.
 damnatus fuit, paulo postquam inclavuerat, 1. Propter Periculum quod inferere; cum aliquando, licet raro, necaret, quando ante adventum Paroxysmi exhibebatur. 2. Ob Recidivam; nam intra 14. dies recidivas Paroxysmus, in morbo recenti, nec tempore mitigato. ibid. Hec duo incommoda removere tentat Auctor. ibidem.
 infamiam obtinuit, vel propter mala Intermittentes diuturniores subsequens, ne quidem gustato Cortice; vel ob facultatem, qua sine evacuatione sanas: unde existimant materiam Febrilem inclusam. ibid. Que ultima difficultas solvitur. ibid.
 Periculum, non ex sua natura inferit, sed quia immediate ante Paroxysmum deglutitus Naturam impedit, quo minus materiam Febris aggestam sua Methodo expellat: hinc potius exhibendus ilico post Paroxysmum, diebus intermissionis, usque dum novus invadat. ibid.
 Cortex Peruv. qua Methodo exhibendus. 9. 40. 41. 42.
 si Methodo, jam ante ab Auctore descripta, administratus fuisset, viverent forte non pauci, quos jam terra regit. 42.
 vires confortandi & invigorandi eximias habet, si gr. xx. mane & sero, sumantur, ad septimanas aliquot. 123.
 adstringente virtute an Febres fugat, non tam facile demonstratur. 40.
 purgando, Febrem aliquando tollit. 40. 41. In quo casu, quare, & quomodo, Laudanum cum Cortice adsumendum. ibid.
 ad Aphthas, & Singultus, in Febre nova Epidemica quando. 113. 116.
 ad Apoplexiam Febris interm. supervenientem. 41.
 Dietsam qualem exigit. ibidem.
 ad Febrim fugendam ubi exhibetur, nil nisi Methodus observanda venit, Dietsa & Regimine quocunque, usque deque habito. 106. Lecti calor non prodest hic. ibid. Ejus calorem enervatur. 87.
 exhibendus neque Cathartim, multo minus Venæ sectionem, præmittendam expetis: & quare. 9.
 in Febris Intermitt. neque Cathartica, neque Enemata, aut Evacuantia quecumque, curato jam Morbo, sine metu Recidivæ admittit. XIII.
 si alit, quam quæ vehiculo inferiunt admiscetur, aut ignorantia fit, aut dolo malo. 41.
 vomitu si rejiciatur, quid agendum. ibid.
 intervallo a Paroxysmis longiore potius, quam paulo ante exhibendus. 10.
 Paroxysmum instantem subito confodens, quid mali inferat. ibid. Paroxysmum intervallis quomodo repetendus. ibid. 4. Diebus Paroxysmos dissimulantibus exhibitus, novæ minere accumulationem impedit, reliquis istius materie per Sudorem ultimi Paroxysmi eliminavit, sicque prævenitur Paroxysmus novus. 41. confer. 40. Exhiberi debet in interjectis Paroxysmorum spatiis; tum postea repeti, egro jam convalescente. 41. 42.
 Cortex Per. Recidivam habet, quod sanguis non satis saturatur vi febrisfuga: Quare devotio morbo, justis intervallis ejus usus repetendus. 40. 41. Recidivæ prævenjendæ causa, octavo die, post ultimam dosin iterandus; quod sic deinceps, tercio quatuor, faciendum. 41.
 non pertinaciter nimis exhibendus, ubi Recidiva frequentior; sed ejus loco Decoctum amarum. ibid.
 in Febris Intermittentibus est absolute specificum. 106.
 omnibus aliis palmam præcipit. 141.
 quasi miracula præstat; licet quibusdam non placeat, quod tam certo ac subito curet. 93.
 An 1678 certissimam spem facit. 140. Et isti tamquam Herculeo Medicamento, si justo exhibetur, fidendum. ibid.
 a mole multatos egros, eorum magno emolumento, parum refert illi; dum hos ab ipsis per duas, tres, septimanas liberavit. 9. Dysseris, quam Paroxysmi inducunt, sine ope Catharticorum, subvenit. 41.
 Cortex Peruv. ubi Febres Interm. in Continuarum speciem vergunt, nihilo minus est exhibendus, ut appropia redeat. ibid. Sed etiam multo majori dosi tum indigemus. ibid. Verum in sua actione lecti calore & calefacientibus, interturybatur. ibid. confer. 87. 106.
 an in omni Intermittentium Constitutione, æque conducas, ignorat hoc nondum expertus Auctor. 43.
 in Febris Intermitt. Autumn. quomodo exhibendus. 10. Præmature tamen nimis ingessit, quid noxii inferat. 9. Hinc ne nimis præmature ingeratur, nec prius quam Morbus parum prostratus; nisi egri nimia debilitas exigat. ibid.
 in Febre nova Epid., si Methodo tradita non omnino cedat, adhibendus. 115. Idem in Febre hac, quare a Medicis nonnullis adhibitus. 114. Sed successus voti raro respondit. ibid.
 in Febris Tertianis Vernalibus ac Autumnalibus, æque ac in Quartanis, exhiberi potest. 10.
 solus fere Febrem Quartanam licet fugare videatur, Inducias tamen potius impetrat morbo, quam quod eum debelles. 9.
 qua Methodo in Febre Quartana exhibendus. 10. 25. In hac expugnanda ad 3j. in doses dispersam, exhibendus venit. 41. In Febre Quotidiana & Tertiana possunt 3vj. sufficere. ibid. Si ad Continuarum speciem vergunt 3ij. vel 3ij. requiruntur. ibid.
 in Febris Quotidianis & Tertianis, non uti in Quartanis, primum Paroxysmum, sed secundum tantum, vulgo quare antevertat. 40. 41.
 Cortex Peruv. in Febris Intermitt. non tantum, sed tum in Uteri, tum Ventriculi, Adfectibus summa præstat. 40.
 in Hysterica & Hypochondr. Adf. præsertim, ubi Spasmi distorquent, bona præstat. 93. Sed non tam certo succurrit ac in Febris Intermitt. 12.
 Infantibus quomodo exhibendus. 40. 115. 143.
 in Morbis inflammatoriis omnibus nocet. 43.
 in Podagra tamquam Digestivum, mane & sero, ad aliquot grana adsumtum, prima obinet. 102.
 Rheumatismum Scorbuticum, ubi diu iteratis vicibus adsumtus, sepe inferit. 37. Effugit hoc unicum incommodum ex hoc Remedio illatum, quod notum. ibidem.
 Sambuci interior in Hydrope Ascite agit uti Crocus Metallorum, non vi specifica. 101.
 Coxe (Daniel) M. D. a Dysenteria Const. 1669. ad 1672 primo An. Methodo Auctoris curatur. 23.
 (Thomas) M. D. hortatur Auctorem ut Medicinæ se tradat. 111.
 Cranium grandius qui habet, Podagra obnoxius. 99.
 Crapula Febres producit. 34.
 Crocus Metallorum in Hydrope, & Sambuci Cortex, eadem ratione agunt, non vi specifica. 109.
 Quomodo adsumendus, & quoties repetendus. 105. 108. In Variolis Regular. quandonam & quomodo adsumendus. 19.
 Crurum Tumor, vid. Tumor Crurum.
 Crustæ in Variolis corpus obtegentes habitus puridos, & olentes, non sine vita periculo reprimunt. 26. Quibus mediis tum occurrendum. ibid.
 Crustulæ in Lue Venerea, hærescentes, quo signo internoscentur: & latiores, uti Lepa describitur, variis in partibus reperiuntur. 78. Quo majori copia adsunt, eo Dolores in corpore minores. ibid.
 Cubiti in Podagra irregulari quomodo adficiantur. 100.
 Curatio Adfectuum plurimorum, non causarum, sed vere atque expertæ Methodi, cognitione absolvitur. 12.
 Curationes Morborum, vid. Morborum Curationes.
 Curationis in Morbis Acutis recte instituta character. 24.
 Currus in Calculosis Mictum Sanguineum non excitat, si per vias lapidibus non stratos vehatur. 131.
 Curru itinera conficere loco Equitationis, in Morbis curandis, utcumque substitui potest. 93.

vestio, ad Colicæ biliosæ dolores, vid. Equitatio in Colica biliosa.
 in Podagra inveterata Paroxysmo quid boni præstet. 126. Quandonam vero veratur, & lectulus preferendus. ibid.
 Curvatura Penis in Gonorrhæa virul. a fræno constrictio. 78.
 Cuticula Humerorum & dors non nunquam deperditur, si Variolæ Confluentes sevisissimæ. 15.
 in Sanguine Pleuriticorum tenax, subalbida, post primam saltem V. S. unde fiat. 35. Si exagitetur digito. sanguis ille recens, non nascitur illa. ibidem.
 Cutis Adfectus, vide Cutis Eruptiones.
 Eruption quædam minus frequens describitur, ejusque Curatio proponitur. Hec species a refrigerantibus abhorret. ibid.
 quænam Aquas ferreas pro remedio exigat. ibid.
 Eruptiones, Chronici modo sint Adfectus, Methodo qua Febris Erysipelatosa, V. S. scilicet & Cathartici iteratis, curantur quam plurime.
 Ubi his non cedunt quid agendum. 37. 144.
 Methodo alia, quam Febris Erysipelatosa tractanda. 37.
 inæqualitas, Variolis discretis deciduis, nec foveæ, in facie, primis diebus apparent, propter Squammas Pustulis succedentes. 15.
 B.
 Debilibus Adolescentulorum ad cubitus mire interdum prodest. 5.
 Decocta Lignorum post Salvationem Mercurial. non exhibenda, quia Recidivæ causa esse possunt. 80. In Gonorrhæa virulenta plus mali, quam boni, inducunt. 79.
 Decoctum in Ictero ex Colica biliosa. 28. In Febris Tertianis Autumn. vulgare Antifebrile in Anglia, unde conficitur. 9.
 album, quomodo paratur. 150.
 In Dysenteria quomodo paratur, 21. In Variolis Anom. æstum temporans. 26.
 Decoctum amarum Antifebrile in Tertian. An 1678. 41.
 Purgativum 142. In Febris Intermitt. ubi Recidiva frequentior. 41.
 Aperiens & Antiscorbuticum. 141.
 Dieteticum. ibid.
 ad Hydropem ex Sambuci cortice. 109. In Pleuritide essentiali Pectorale, 35. Pro Postu Dietetico in Podagra. 104. Usus ejus in utroque fere soluto quodam Paroxysmo, summe in eo perseverandum in Paroxysmis, & extra ipsos per totam vitam. ibid.
 Pulli in Cholera. 21. 147.
 Vulnerarium, cum Spiritu Vitrioli, in Mictu cruento ex Febre acuta. 88.
 Democriti, de Morbis ab Utero productis, sententia quomodo intelligenda. 99.
 In Democriti puseo Podagra radicalis Curatio adhuc latet. 152.
 Dentibus Hysterica Adf. non parit. 90.
 Dentitioni Infantum superveniens Convulsio sola Venæ sectione curatur. 25. Specifica vulgaris hic minus nota sunt. ibid.
 Depuratio sanguis genuina fit secretionem, & per feces, & per flores. 7.
 Desperatio in Hysterica Adf. de recuperanda sanitas plurimque adest. 89. 90. confer. 89.
 Desquamatio Febrilis, seu tertium Intermittentium Paroxysmi tempus, quid sit. 7.
 Febris Continuae quibusnam causis, & mediis, impediatur. 5. 6.
 Desquamatio in Morbillis An. 1670. uti in Febre Scarlatina, farinosum quid in cute relinquit; quod in Morbillis An. 1674 non congingebat. 30.
 Diabetes quid, unde nascatur, quales edat Effectus. 41. 149. Indicationes curativæ & Medela. 41. 149.
 in Febris Intermitt. Senibus quando, & unde superveniens. 41. Quomodo curanda. ibid.
 Diacodium Laudano preferendum. 114.
 Dieta, qua Auctor Mictu Sanguineo a Calculo, & Podagra, laborans usus est describitur. 131.
 in Angina, carnes, & eorum juscula, vetat; Vegetabilia & farinosa præscribit. 38. In Apoplexia, Paroxysmo sublato, qualis. 146. In Chronicis Morbis quare observanda. 103. In Colica biliosa. 27. Diu continuanda. ibid. In Cortice Peruviano utentibus. 41. In Diarrhæa, eadem in Dysenteria. 23. In Dysenteria. ibid. In Dysenteria ex Tormentis venis, in Febre nova Epid. oborta. 114. In Febre Dysenteria. 24. In Febre Epid. An. 1673. ad 1675. quænam. 29. Febrim in Tussi Epid. An. 1675. præcavens. 32. In Febre Erysipelatosa. 37. Caviat & corroborans in Febris Intermitt. Autumn. quando, & cur, necessaria. 10. In Febre hyemali. 110. In Febre Variolosa. 20. In Febris Continuis. 5. In reconvalescentibus a Febris Continuis, ibid. In Gonorrhæa virul. qualis. 79. Quare refrigerans. 78. In Hæmorrhægia narium qualis. 38. In Ileo vero, qualis. 7. In Lue Venerea ubi salivatio adhibetur. 80. In Mensium fluxu immodico. 95. In Mictu Sanguineo, a Calculo, qualis ab Auctore instituta. 125. In Morbillis. 25. In Morbillis Anom. An. 1674. quænam. 30. In Podagra Intervallis respectu Cibi quantitatis, qualitate, temporis. 103. Cur hic Palato aliquando consulendum. ibid. In Podagra religioso observanda. ibid. ad 105. Unus religiosus vero observata enormioribus insultibus quidem liberat, & majora intervalla procurat; sed ab eo insultu, exente hieme præsertim invadente, tueri omnino non potest. 104. 105. In Podagra Paroxysmis. 105.
 Dieta Lactea in Podagra. 103. Qua ratione magis obest, quam prodest. ibid. Emolumentum per breve, ac fugax modo, inferit. ibid. E Sero Lactis Plebromia loco, in Rheumatismo, substituitur. 43. Exempl. in Casu. ibid. In Morbis pluribus quam Rheumatismo V. S. loca substitui possent, nisi obstant præjudicia vulgi. ibid. In iis vero qui virilem ætatem prætergressi, & qui vina ac spirituosos potatis, nocet multum ac Hydropem inferit. ibid.
 in Salivatione Mercuriali pro Lue Venerea. 80.
 in Tussi Epid. 1675. absente Febre, &c. 32.
 in Variolis Anomalis nigris An. 1670. temperans. 26. In Variolis Anom. nigris An. 1674. qualis. 30. In Variol. Anom. nigris pestiferis. ibid. In Variolis Confluentibus. 87. In Variolis Regularibus, primis initiis, ex temperatis seu refrigerantibus, & faciliore digestionis, commendanda. 17. In Variol. Regul. Discretis, post Eruptionem, adhibenda. 18. & confer. 17. Sed sub finem Cardiacæ paulo, ob halitus putridos, sit. 18.
 Diaphoresis, vid. Sudor.
 Diarrhæa 146. In Febris aliquando oritur a radiis inflammatoriis in Intestina invectis. 19. 20.
 in Febris Continuis, ex neglectu Emetici, ubi in principio Morbi vomendi propensio adest, excitari solet. 4. 6.
 in Febris inflammatoriis, Emetico non tantum non impeditur, sed quodque creatur. 6. Sic in Febre Const. An. 1665. Emetico non præcavebatur, ut in aliis sepe, sed provocabatur. 11.
 in Febris, ubi præcipuas ad vomendum comitatur, Emetico, vix adstringentibus, tollitur. 4. Sed, si Emetico non cedit, Enema adstringens adplicandum. ibid.
 in Febrim continuarum declinatione, an tamquam critica permittenda, vel sistenda. ibid.
 in Febris continuis non tam sæpius, at quidem vulgo existimatur, critice morbum solvit. ibid.
 si nimis, in Febris continuis, toleratur, mediam modo sanguinis depurationem procurat. &c. ibid.
 in Febr. contin. 1661. &c. quandonam, & quidnam, producere valebat. 3. Vomitorio quomodo avertenda. 4. Quomodo altius noceat. ibid. Symptomata, quomodo curanda. 6.
 Conflit. An. 1668. Febre Variolosa adhuc regnante, Epidemice grassabatur, & Dysenteriam subsequentem prægredebatur. 20. Qua tum regnabat post Febrim Variolosam, ipsa erat Febris Variolosa, ejusdem essentia, sed forma diversa, seu in Intestina introversa, nullo signo febrili exterior se prodente. ibid. Qualia cum Febre Variolosa Symptomata communia, præcipue dolorem, ad scrobiculum cordis, & alia, habuerit. ibid. Dolorem hunc ad Epigastrium usque exporrigebat. ibid. In Epigastrio inflammationem habuit aliquando, quæ in Apoplexie, & morte, terminabatur. ibid. Curatio ejus. ibid. Hec perficiebatur eodem modo ac illa Febris Variolosa; Venæ sectione scilicet, Regimine refrigerante, Dieta simili. ibid. Si contrariis tractaretur, & purgantia lenitiva pus adstringentia adhiberentur, ex leni natura in exitalem transibant. ibid.
 Diarrhæa An. 1670. ad 1672. Dysenteria regnante, quomodo curabatur, in Adultis, tum in Infantibus. 23.
 in Febr. Epid. An. 1675. Symptomata quomodo curabatur. 29. & 30. Autumno potius Symptomata, quam Morbus essentialis erat. 28. 30. — in

- in Febre variolosa, unde & quomodo curetur. 20.
ex Hyfterica Adf. cum rejectione materia viridis, sed sine dolore, quando-
nam. 89.
in Morbillis, a Calefacientibus, diu fatigans. 25. Post Morbi recessum
superveniens, V. S. curanda. ibid.
Peripneumoniam excipiens, V. S. curanda. ibid.
& Vomitiones in Peste & Febre Pestilentiali, sudore excitato, illico si-
stuntur. 14. Historia confirmatur. ibid.
Diarrhoea in Pleuritide ac aliis inflammatoriis Morbis, quare aliquando con-
tingat. 20. Pleuritidem veram excipiens, V. S. curanda. 25.
in Podagra inveterata, ex materia Morbi ad Artus non eliminata, quod
Aque frigida usu fieri potest; si Laudano, exersitio, cardiaca & adstringen-
tibus, non cedat, per Sudorem curanda. 103.
in Salivatione Mercuriali, initio sepe, simul ac Mercurius Sanguini ad-
miscetur, antequam Salivatio bene adsurgat, exoritur; quae Opiatis reprimenda,
eum & Salivationem, & Curationem, inde pendens, impediatur. 79.
in Variol. Anom. pessim. Salivationis vicem quando subeat. 31. In Va-
riolis Confluentibus aliquando Eruptionem praecedat, & quare. 48. Atque
aliquando post illam protrahitur. 18. Neque Paregoricis sistenda, quia Natura
rem absolvit. 18. In Adultis Symptoma periculosum est, ex frigore nimio or-
sum. 16. In Infantibus eque certo, ac Salivatio Adultis, maturentibus
Pustulis supervenit. 18. Aliquando tamen non ita certo adest. 16. Iis tamen
saluare est, 10. Et Infantes tardius invadit, quam Pyralis Adultos,
sed sibi commissa singula Morbi studia decurrit. 16. Materie morbificae eli-
minanda inservit. 18. Adeoque Infantibus inservit, uti Salivatio Adultis,
Naturae dono. ibid. Hinc non sistenda, in iis, sed Naturae committenda;
nam Muliercularum consilio male suppressa Infantum millia leto dedit.
ibid. Quare hic Discrimen non adferat ac in Distinctis. ibid.
Diarrhoea Confluent. & Salivatio, haec in Adultis, illa in Infantibus, Sym-
ptomata sunt non praetermittenda. 16. Et adeo in hac specie necessaria, ac
sunt Pustulae, vel & faciei, ac manuum intumescencia. ibid. An a Natura
ideo substituta, quod per parvulos Abscessus materia exterminari, ac in Dis-
cretis per majores, nequeat, quare non definit Auctor. ibid.
Discretis Symptoma anomalum ex repercussione Variolarum a frigo-
re nimio, vel Evacuationibus indebitis, oriri solitum. 19.
Variolas Epidem. Conflit. 1667. ad 1669. ultima aestate praesertim, conco-
mitans, erat tantum Febris Variolosa istius Conflit. inreversa. 15.
colliquativa in Tabes, aliisque Chronicis, morem anteferat. 93.
Diacordium ad Diarrhoeam, 23. Ad Diarrhoeam in Salivatione Mercuria-
li. 80.
in Febribus Continuis quando exhibendum. 4.
Dies eruptionis in Variolis, vid. Eruptionis Dies.
Die Primo, in Morbillis, calor & frigus se expellunt. 24.
Diebus prioribus Natura Variolas digerit. 16.
Die Secundo, Febris manifesta, in Morbillis, & alia Symptomata in-
gruunt. 24.
vel Tertio, Variolae Anomal. Confl. Conflit. An. 1670. erumpen-
bant. 25.
Die Tertio, Variolae Anomala Discretae erumpunt. ibidem.
Variolae Confluentes Regulares erumpunt. ibid.
in Var. Confl. quid contingat. 15.
Quarto, vel Quinto, Morbilli erumpunt. 24.
erumpunt Morbilli Anomali, An. 1674. semper. 25.
in Variol. Confluent. inclusit ab eruptione puta, omnes Pustulae in
conspetu sunt, nec plures expectanda. 84. 86.
erumpunt Variolae Distinctae Regulares. 25. Nam hic Variolarum E-
ruptionis proprius est, ac naturalis, dies. 17.
in Variol. Discret. quid contingat. 15.
Sexto, Morbilli exsiccari incipiunt. 24.
in Variol. Confluent., ab invasione puta, Pustulae omnes in conspectu
sunt, nec plures expectanda. 84. 86.
Octavo, Morbilli evanescent in facie. 24.
in Variol. Discretis, & Undecimo, in Confluent. Symptomata Ano-
mala quanam adsunt. 16.
in Variol. Confl., & post, quid contingat. 15. Tumor Faciei incipit
& undecimo subsidet, incipiente tumore Manuum. 87.
in Variol. Discret. quid contingat. 15. 16. Facies si non tumet, &
Pustularum interstitia pallent, malum. 19. In Discretis malignis Conflit.
An. 1661. ad 1664. periculum adest, illo die. 11.
Die Nono, Morbilli undequaque disparent. 26.
Decimo tantummodo, Puerpera generior & vaporibus obnoxia, se a lecto
contineat. 94.
Undecimo, in Variolis Anomal. Confluent. mitioribus, Febris secunda-
ria, dista, a Pure, exoritur. 84. 85. 87. Et periclitatur aeger, praecopia
Pustularum. 84. Hinc dies ille vulgo periculo plenus, nisi Medicus se inter-
posuerit. 116. Et hoc die Mors invadere solet. 85. Caloris & Inquietudinis
Paroxysmus semper vexat. 87. Hinc Paregorica temporis, quam aliis die-
bus, h. e. hora quinta exhibenda, ab Paroxysmo vespertinum. ibid. Et
horum defectu plures extincti. ibid. Hoc die quoque Tumor Manuum in-
cipit, subsidente eo tum Faciei, qui ad Pustularum maturationem usque per-
durat. ibid.
in Variol. Regul. Confl. quid contingat. 16. Periclitantur tum, eo-
que plerique moriuntur. 26. Sed licet discrimen inferat, eo semel elapso sal-
va res erit. 30. Et qui moriuntur, ex Saliva spissa suffocante intereunt. 19.
Saliva aliquando adeo viscosa, ut aegrum, stupore indotto, suffocet. ibid.
in Variol. Regular. Discret. quid contingat. 15.
Decimo quarto in Febr. Epid. An. 1673. ad 1675. qui vulgaribus Sym-
ptomatibus adfecti erant, restituti erant. 28.
in Variolis Confluent. mediocri generis, Febris secundaria, dista,
a Pure, exoritur. 84. In Variolis Anomalis Confluent. An. 1670. ad sum-
mum Decimo septimo periculum adest, quibus superatis, salva res. 30. Et
die decimo quarto moriebantur tantum, in Variol. Confluent. Anom. Conflit.
An. 1670. ut plurimum. 25.
Die decimo quarto vel quinto, in Var. Regular. Discret. quid fiat. 15.
Decimo septimo, in Variolis Confluent. pessimi generis, Febris secun-
daria dista, a Pure, exoritur. 84. Hoc die moriebantur aliquando, in
Variol. Confluent. Anom. Conflit. An. 1670. Hoc vero praeterlapso salvi
erant. 26.
Vicesimo, in Lochiorum suppressione, jam fere in valo res est. 94.
in Variolis Anomal. Confl. An. 1674. & aliquando postrioribus
adhuc, periculum adest. 30. 16. Variol. Reg. Confluent. quid contin-
gat. 16.
primo, in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. ubi Morbus perniciosis,
restituti erant. 28.
Octavo in Febr. Epid. An. 1673. ad 1675. qui Comate adfecti erant,
sepe reconvalescere incipiebant. ibid.
Tricesimo in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. qui Comate laborabant,
reconvalescere aliquando tantum incipiebant. 28. 29.
Diemerbroeckius Venae sectionem, in Peste, damnavit. 13. Refutatur cum aliis,
qui Diaphoresin culpant, ac si inde aegri debiliores fierent. 14.
Differentia inter Febres Continuas Autumnales, & Intermittentes Autumna-
les, quomodo consideranda. 3.
Specificae, ne quidem ulla, a Philosophis enodari potest. 40.
Differentiae inter Morbos Acutos, & Chronicos, percepta causa, ad invenien-
das veras Indicationes horum Morborum, magni momenti est. 102.
Digestiva in Podagra vocantur, quae Naturae opem sunt in muneribus suis
rite fungendis, sive Pharmaca, sive Diatetica, sive Gymnastica, suc-
cint. ibid.
Media, vid. Medicamenta Digestiva.
in Chronicis Morbis debellandis, quare adeo valeant. 103. Quamdiu in
eorum usu perseverandum. ibidem.
in Febribus Intermitt. Confl. An. 1661. ad 1664. ob materia crassitiem
Evacuationis erant praemittenda. 20.
in Podagra quantum conducant. Et quando usurpanda. 103.
Digni, in Podagra non Regulari, quomodo adficiantur. 100.
Digitorum Articuli in Rheumatismo, vid. Articuli Digitorum.
Discrimen, vide Periculum.
Distinctio Februm Intermitt. in Vetales & Autumnales, quam necessaria
Medicinam excolenti sit. 8.
- Divites a Variolis quare interficiantur magis quam Plebs. 18.
Diuretica in Hydropse, loco Purgantium, ubi vel Constitutio debilis, vel Hy-
sterici Adfectus, haec vetant. 109. Hic tum praeter ceteris omnibus inservit Salia
lixiviosa. ibid.
Dogmatici quomodo tam in dignoscendis Morborum essentia, quam in Medi-
camentis, quibus eos adgrediuntur, hallucinantur, confitis invento Corsice
Peruviano. 106.
Dolor, in Ileo, unde. 7.
Penis, in Gonorrh. virul. dum erigitur, noctu preprimis vexat; esseque
signum Pathognomicum. 78.
Dolor in Pleuritide punctior, quo tempore incipiat, & quem Thoracis locum
occupat. 34.
in Podagra, Pharmacum Natura est amarissimum; quo enim ille vehe-
mentior fuerit, eo citius transit Paroxysmus. 100.
in Podagra irregulari Paroxysmo, toto tempore non perdurat, si modo
pars adfecta quiescat. ibid. Minima motus contrarietate accersitur, sed su-
bito iterum evanescit. ibid. Podagra Regularis ingruentis similis est illi,
qui Ossium dislocationem comitatur. 99. Quando, & quomodo, incipiat,
procedat, desinat, & recedat. 99. 100. Vesperi semper augetur & sub
Galli cantu levatur, 100. Sudoriferorum ope, in Paroxysmo exhibitum
exacerbatur. 105. In Podagra inveterata Paroxysmo, potius leniendus quies
in lecto, quam Anodynii usu, nisi nimium seviet. 106. Vestitione, in Po-
dagra inveterata Paroxysmo, excitatus, quandonam ferendus, ad Mortis pe-
riculum effugiendum. 105.
in Scrobiculo Cordis, in Febre Variolosa. 98. Variolis Regularibus, in
infantibus tantum notus. 19. 20.
& Variolis, & Febr. Variolosa, tum & Diarrhoea An. 1658
communis fuit. 21. Sed in Diarrhoea hac ad usque Epigastrium extendebatur
ille. ibid.
Dolores in Hysterica Adf. ex Spirituum nimio impetu. 90. Medicis facile im-
ponunt; cum sepe aliorum Morborum speciem praeseferant. 94. Exempl. in
Paroxysmo Nephritico, & Colica Biliofa. ibid.
Dolores in Hysterica Adf. Teneritudinem in partibus, castrum refugientem,
ac si sustibus fuissent exceptae relinquunt. 119. Laudano compelescunt, si omni-
no intolerabiles; quin alijs Evacuantiis prius adhibeantur. 93.
Luis Venereae praesentiam initio indicantes. 78.
in Luis Venerea, progressu temporis, quinam adsunt. ibid.
Rheumatici, vid. Rheumatici Dolores.
Drake (Joannes) Auctorem, dum manu tremula calamum regere nequit, in
conscribendo Traict. de Podagra & Hydropse, adjuvat. 99.
Dux Hetruriae quo modo a Peste immunem se servaverit. 12.
Dysenteria proprie habetur, ubi frequentes sunt Dejectiones, cum Ventris tor-
minibus & colluvie mucosa, sive sanguis admisceatur, sive non. 22. Ejus
Descriptio. ibid. 146.
Autumnalis est Morbus. 2. 21. 25. Sed Hyems ipsi obest. 21. 25. Au-
tumni initio fere semper invadit; Hyems, pro tempore, recedens. 22. Sic
mense Augusto prognata usque ad hyemem excurrit, vel, duorum mensum
spatio, cursum suum absolvit. 2.
Verno ingrediente, & alio quoque tempore, si aura calidior gelu superve-
niat, vel annus epidemice faustas, non nullos adficere potest. 22.
non rite curata in initio, ad Annos aliquando, licet raro, disruiat,
crasi sanguinis infecta; qui curanda. 23.
dolores summos non tantum, sed ingens quoque vis discrimen adfert, si
non perite tractetur. 22.
quo sensu se aliquando Febris introversa & versus Intestina determinata.
22. confer. 111.
Dysenteria Adultis exitialis non raro. 110. Infantibus benignior; & diu illi
hanc ferunt, si modo res Natura committitur. ibid. In Infantibus, quomodo
curanda. 23.
Species varias, uti Variolae & Epidemici alii, diversis Constitut. habere
potest. 22.
Epidemia Hybernorum an cum aliis conveniat, quare ignoret Auctor. ibid.
Epidemica, Conflit. An. 1669 ad 1672. an cum aliorum temporum Dy-
senteris conveniat, ignorat Auctor. ibid. Ubi per decem Ann. vix comparat-
vat iste Morbus, post Febr. Variolosa, & Variolas ipsas, harumque com-
item Diarrhoeam, grassari incipit, mense Augusto. 15. 20. 21. Hanc No-
vum Febris genus comitatur. 21. Adpetente Bruma recedit, grassante tum
Febre Dysenterica; sed Autumno An. 1670. inclementius redit. ibid. Hy-
me iterum recedit, regnante tum iterum Febre Dysenterica ibid. Et tertio
redit An. 1671. sed mitior, & iterum superveniente Hyeme, cedit; regnan-
tibus iterum Febre Dysenterica cum Variolis. ibid. Tandem An. 1672. Au-
gusto redit, non pauca sed mitior, & hyeme recedit. ibid.
Febris sui generis, in Intestina introversa, Auctori videtur. 2.
Calidos & acres ibi deponens humores, & impetu vasa sanguinea aperiens,
dum simul Intestina, suo nisu hos expellere sagax, mucum naturalem
exprimit. 22. confer. 2.
Dysenteria Epid. Symptomata quanam habuerit. 22. Primo ingressu Sympto-
mata uti alii Epidemici, atrociora habuit, quam in statu; licet tum plures
adgredereur, mitiora eam evane, uti & in declinatione. ibid. Tormina
recedebant pro gradu adolescentiae Constitutionis. ibid.
primo Anno, ut alii Epidemici, Natura subtilioris fuit. ibid.
23. Humoralis quoque magis, sub finem Constitutionis erat: in initio enim
nulle dejectiones molestabant; stercorese ita non erant, tormina atrociora;
ubi faescente Constitutione omnia contrario habebant. 22. Humoralis, in
sua declinatione, magis quod fuerit, quid circa Epidemicorum naturam de-
notet. ibid.
iisdem, quibus primo Anno sanata, sequente Anno non cu-
ratur. 23. Curatio, primo Anno, differt a Curatione generali; & qualis
fuerit. ibid. In principio Sero lactis frigide hausto, & calide per Enema
quater injecto, post V. S. institutam, dein ut Cholera, diluentsibus, curaba-
tur; sed Sero Lactis loco Jusculi vel Zythogale. ibid. Quae Methodus repu-
dianda, licet fastuoso Remediorum apparatu non ornata. ibid. Per V. S. ite-
rum curata Exemplum. ibid. Cathartici primo Anno, quam diluentibus &
temperantibus, quare non ita cedebat. ibid.
haec & Febris eam concomitans, a Doctore Butler in Africa sanatur, eo-
dem modo ac ab Auctore, in Briaunia. ibid.
Conflit. An. 1670 ad 1672. Epidemice seviebat, una cum Variolis Ano-
malis, Autumno semper primas tenens. 25. Variolis in pares concurrebat
ultimo Autumno, ceterum primas Autumno tenens. ibid. In Variolis Anom.
An. 1670. ad 1672. regimine calido tractatis, sepe inserviebat materia eli-
minationis, singulari eventu. 26.
Dysenteria An. 1673. Novembri mense, post acre gelu, succedente calore, hinc
inde spargitur adhuc; nec postea amplius istius speciei adparet. 28.
Autumnali An. 1675. potius Symptoma quam Morbus essentialis erat. 28. 30.
in Febr. Epid. An. 1675. Symptomata, quomodo curabatur. 142. In
Febre nova Epid. 1685. ex Torminibus Ventris oborta, Laudano solo curatur.
114. Quare haec potius ita compelescenda, quam vulgari Methodo tractanda.
ibid. Sed, Dysenteria ubi Epidemice grassantur, primo Evacuationes in
usum revocanda. ibid.
Symptomata. 28.
Dysenteriae variae. 21.
Species, in Variol. nigris pessimis, neglectu V. S. oborta. 31.
Curatio in genere. 27. 23. 146. 147. Indicationes curativae sunt; Venam
secare ad revellendum impetum; Humores temperare, eosque per Cathartica
subducere. 22. Sed Laudano solo aliquando tuto curatur. 23. 114. 147. Ubi
Morbus consummatur, quid agendum. 22. 23. Symptomatum Curatio. 23.
Dysentericorum Febres Symptomata habere similitudinis Febris Dysentericae. 24.
In Dysenteria etas si florida, quid mali contingat. 22.
Aphthae morem denunciantes, a Cathartico neglecto, & calefacienti-
bus, adstringentibus adhibitis orae. 22. 24.
Calefacientia quae mala producant. 22.
Dejectiones mucosae cum vel sine striis Sanguineis, quales se habeant.
ibid. Unde fiant. ibid. Stercorosae aliquando interponuntur, sine dolore infi-
gni, in initio. ibid. Mucosae, progressu morbi, in eodem agro, dolorem in
Intestino recto excitant, ibid.
Stercorosae, progressu morbi, in eodem agro, quare per Intestina
tenuia, dolorem vehementem excitent. ibid.
Confl. An. 1669. ad 1692. circa finem, Dejectiones Stercorosae magis
erant, quam Mucosae. ibid.

- Digta. *ibid.*
 — Frigus manuum ac pedum Morbi periculum infert. *ibid.*
 — Gangrena Intestinarum aliquando. *ibid.*
 — Potus frigidus admittitur. *ibid.* Potus tepidus. 23.
 — ubi Recidiva quid agendum. *ibid.*
 — Sanguis sincerus progressu Morbi aliquando, cum Morbi periculo, exit. 22. Unde illud. *ibid.* Sudores Anomali concomitantes, cur nullius fuerint epulmentis. 33.
 — Tenesmus quando, & unde, *vid.* Tenesmus.
 — Dyspnoea in Hydropicis, unde. 107. In Morbillis An. 1674. recedentibus, major erat. & magis in Peripneumoniis vergens, quam in aliis. 23. In Morbillis, Infantibus, post Morbi recessum, letalis accidens, V. S. curanda. 25. Calefacientibus hic indulta, V. S. quoque curanda. *ibid.* In Pleuritide essentiali, Tussi suppressa, V. S. neglectu, aliquando fere suffocat.

E

- E** Bullitio Febrilis, seu secundum Intermittentium Paroxysmi tempus, unde *fiat*. 7.
 — Ebullitionis atque Fermentationis vocabulis, cur non aequi, ac Commotionis, in exponendis Febrilibus utatur Auctor. 3.
 — Ecceima, *vid.* Linctus.
 — Erythymata, *vid.* Exanthemata.
 — Effluvia Aerem contaminare possunt ad Epidemicos suscitandos Morbos, eosque aliquandiu propagandos. 30.
 — Elaterium quid sit, ejus dosis, & quomodo exhibendum. 107. In Hydrope pressentissimum Medicamentum, in iis qui agere purgantur. *ibid.*
 — Electuarium ad Aphthas & Singultum, e Chortice Peruviano, in Febre nova Epidemica. 113. In Apoplexiæ Paroxysmo sublato exhibendum. 146. In Choreæ Sancti Viti roborans. *ibid.* In Diabete. 41. In Diarrhoea adstringens. 23. 147. In Febr. Intermit. ex Cortice Peruviano. 10. 41. 42. In Febre nova Epidemica, roborans. 113. In Febre Tertiana duplici, corroborans. 9. In Febre Quartana ex Core. Peruv. 135. 143. In Fluore muliebri. 41. 95. In Hydrope, digestivum, ad roborandum quale. 109. In Hysterica Adfectione Chalybeatum. 92. Aliud corroborans. 142. In Ictero 28. Ad Lochia suppressa ex Hysterica Adf. 94. In Mania communi, post evacuationes factas Cerebrum corroborans. 11. In Mensium Fluxu immodico astringens. 95. 41. In Mictu cruento ex Febre Acuta. 83.
 — Electuarium in Podagra, quo Auctor tamquam Digestivum uti solet. 102. Quo nomine Theriacæ Andromachi preferendum. *ibid.* Ad ejus compositionem Simplicia, palato que minus ingrata, sunt eligenda, cum ad omnem fere aetatem in ejus usu perseverandum sit. *ibid.* Quando præcipue exhibendum; & quare. 104. In Præritu ferino. 37. In Rheumatismo Scorbutico *ibid.*
 — Emetica, *vid.* Vomitoria.
 — Emmenagoga in Lochiorum suppressione, Hysterici mista. 93.
 — Empirici, Morborum Historiæ & Methodi medenda ignari, de corio humano ludunt & majorem edunt stragem, quam Morbi eorum auxilio destituti. 42.
 — in Podagra, ex Catharticis, que adfute celabant, existimationem sibi, cum damno agerunt, quomodo comparant. 101.
 — armis infirmorum, quibus Medicorum opera imitari queant, ubi Scriptores potius in Remediis tradendis, quam in Genuinis Indicationibus expiscantibus occupantur. 15.
 — Empiricus insulsiſſimus Medicamentis Medicamentis aequè adicere novit, & solet magis, quam Medicorum prudentissimus. 33.
 — Emplastra Epispastica cervici, in Febrilibus caput petentibus, cum fructu adplicantur. 29.
 — Emplastrum pedale in Choreæ Sancti Viti. 113. 146.
 — in Hysterica Adf. umbilicalis. 92. 142. Hystericum Umbilico adplicandum ubi Lochia suppressa. 94.
 — ad Lumbos in Mensium fluxu immodico, post primam Purgationem adplicandum. 95.
 — e Mucilagin. Præputii labiis tumidis imponendum. 79.
 — Empyema, post Pleuritidem essentiali, quandoque. 35.
 — Emulsio in Angina qualis exhibenda. 38. In Febre acuta cum Mictu cruento. 88. In Febre hiemali qualis. 110. Refrigerant, in Gonorrhoea virulenta. 79.
 — In Hemorrhagia Narium. 38. In languore Febrili, cardiaca. 5. In Mictu cruento, ex Febre acuta. 88. In Mictu sanguineo in Variol. Conf. ex quibus. 130. In Pleuritide essent. leniens, & refrigerans. 35. In Rheumatismo qualis. 36. In Sputo Sanguineo in Variol. Conf. ex quibus. 130.
 — Enchymoma, *vid.* Vibices.
 — Enema in Alvi dejectionibus quibusvis, anodynum. 22. In Calculo ex Podagra diuturniore. 105. In Cholera Morbo, ex jussulo tenui, & Syrupis lenioribus. 21. In Diarrhoea quodam. 23. In Diarrhoea Februm contin. adstringens. 6. In Dysenteria præstatiore anodynum. 147. In Dysenteria Confit. 1660. ex sero Lactis puro, post V. S., & largiter adsumtum per Os serum Lactis frigidum, quater injeſtum, initio Constitutionis, Termina, & Dejectiones sanguineas sollebat. 23. In Febre acuta cum Mictu cruento & Pectechiis. 88. In Febribus contin. Sanguinem refrigerans. 4. In Febre Cont. An. 1661. &c. quandoque. *ibid.* In Febre Contin. pro Pauperibus, ex Lacte Saccharato. &c. In Febre Contin. postidie Emetici exhibiti, quando, & quale adplicandum. 4. In Febre Erysipelatosa quando & quale. 37. In Febre Variolosa. 20. In Gonorrhoea virulenta. 79. In Hemorrhagia Narium, quod tidie injiciendum, quale. 38. Ex Tabaci fumo commendatissimum in Ileo. 14. 147. In Lochiorum suppressione ex Lacte saccharato, semel tantum est adplicandum, uti de Narcotico dictum. 94. In Mictu cruento ex Febre acuta. 88. In Paroxysmo Nephritico a Calculo. 132. In Nephritide ex Podagra diuturniore. 105. In Rheumatismo quale, quando, & quomodo exhibendum. *ibid.*
 — Enemata in Angina, qualia & quando injicienda. 38.
 — carminantia, in Colica biliosa, crabrones irritant & Morbum diuturniorem reddunt. 26. In Colica Hysterica plus nocent, quam prosunt. 27. In Diarrhoea, adstringentia, parva quare ut sint mole, oportet. 6.
 — & Refrigerantia Medicamentis, in causa esse possunt, quo minus Despumatio Februm, spatio 107. hor. h. a. 14. dierum persolvatur, sed in longum evagetur. 9.
 — in Febrilibus quibuslibet, fractis Morbi viribus, non diu repetenda sunt, præsertim in Hysterici & Hypochondriaci; & quare. 32.
 — in Febrilibus continuis quando parce, vel & neutiquam. adhibenda. 4. 5. Quando largiter adhibenda. 4. In Febre Epid. An. 1673. ad 1675. propter diuturnam inflammationem & stuporem sensuum, saepe iteranda. 20. In Febre Intermit. Cortice Peruviano curatis, si neminem Recidiva, etiam lenissima, non admittuntur. 41. In Febre Morbillosa, non conducerent. 30. Febre Scarlatina quare deneganda. 24. Febr. Tertiana vernalis saepe tollunt. 8. In Febre Tertiana duplici interdicienda. 10. In Febre Variolosa ubi Pyralismus adest, vitanda. 20. In Gonorrhoea virul. si ægri a Catharticis abhorreant, vel iis perinaciter refragantur, in auxilium vocanda: at cum non aequè tuto, vicissim hinc tum Cathart. tum Enema, exhibenda, ne Lues exoriatur. 22. conf. *ibid.* Qua Methodo hoc fiat. *ibid.*
 — Enemata in Ileo vero, per os rejiciuntur; quod Morbi hujus signum individuum. 7. In Iliacæ Passione licet acuta, in Emetica abeunt. 7. 26.
 — inter Laudani usum, ex Lacte saccharato modo si fuerint, istius effectum destruant. 93. conf. 94.
 — in Nephritide ex Calculo, vel Arenulis, necessaria, ut laxentur & dilatentur meatus. *ibid.* In Nephritide ex Hysterica Adf. potius nocent. *ibid.* In Sonorosis Adfectionibus valde utilia. 20. In Pleuritide essent. ex quibus conficienda. 35. In Tussi Epidem. ubi Febris &c. adsunt, quotidiana. 32. In Variolis, evacuantia, initio an conducant. 17.
 — Refrigerantia Sanguinis robor, & tonum relaxant. 5. Quandoque loco Venæ sectionis in quibusdam Febrilibus continuis, substituenda. *ibid.*
 — Enemata in Febrilibus continuis, quo usque & in quibus, iteranda. *ibid.* Vetantur post largam Venæ sectionem, & in aetate provecta. *ibid.* Senibus minus quam aliis conducunt. *ibid.*
 — Ephemica Confit. *vid.* Confit. Epidem.
 — Epidemici Morbi, *vid.* Morbi Epidem.
 — Epilepsia Adultorum an forte curari possit, in Choreæ Sancti Viti, adaugendo dosin Venæ sectionis & Purgantium. 113. 146.
 — Puerorum. 149.
 — ex Hysterica Adf. caput obdente, in Fœminis sanguinis, & fere viragipibus, Uteri strangulatus dictus, describitur. 89.

- Infantium dentientium, nono vel decimo mense, aut a septimo ad decimum, supervenientes, ubi inflammatio Gingivarum, V. S. exigunt. 25. Hæcque, in hoc casu, quibuslibet aliis Specificis sola anteferenda. *ibid.*
 — Epileptici Adfectus Infantium dentientium Materiam vividam biliosam, ut in Hysterica Adf. expriment. 90. 149.
 — Infantium non amplius dentientium, Variolas, Morbillos, vel Febrim Scarlat. indicant. 86. Hi quomodo tractandi. *ibid.* Et cavendum ne pro Convulsionibus essentialibus habeantur. *ibid.*
 — Februm Intermit. Paroxysmos aliquando, sed raro, præcunt. *ibid.*
 — Epileptici Adfectus in Febre Scarlatina Infantium, quomodo tractandi. 34.
 — Epileptici Paroxysmi, in Variolis, Discretis præsertim, iam jam protuturis, Infantes vexantes, indicant plerumque hunc morbum mitem. & boni moris, futurum. 15. Hi Variolas Discretas præcedentes, sepe, Infantium damno, pro Essentialibus Adfectionibus evacuantiis tractati, unde Pustularum eruptio fuit impedita. 86.
 — Epispasticum in Angina, cervici vel nucha quanto adplicandum. 38. In Febre Epidem. An. 1673. ad 1675. ad Comatosum Adfectum superandum nuche imponendum. 29. Nucha in Febre nova Epid. Infantibus adplicandum. 114.
 — In Febre Scarlatina quandonam adplicandum. 34. In Tussi Epid. ubi Febris &c. admittit. 32. In Variolis, ad Epilept. Adfectus Infantium. 86.
 — Pedibus in Variolis Confluent. ex Allio, in Adultis, adplicandum, a die octavo, omni die renovando, donec periculum abstet. 87. Confer 88.
 — Epistolæ Brady ad Th. Sydenham. 39.
 — G. Cole ad Th. Sydenham. 83.
 — H. R. Paman ad Th. Sydenham. 43.
 — Epithemata in Podagra, adplicata, sepe nocent, prosunt numquam. 106.
 — Epocha, Februm Intermit. Autuma. certa, est mensis Julius. 21. Februm Intermit. Vernal. mensis Februarius est. *ibid.*
 — in Variolis, primi insulsus dies est. 15.
 — Equitatio firmas Sanguinem, ac spiritus, quam maxime. 93. Effectus in nobis egregios illos præstat, quatenus impetum omnem in Ventrē, ubi vasa excretoria plura, determinat; illaque mille succussibus ingeminatis exagitat; tumque calorem excitat; dein humores stagnantes adstimulat, dissipat per totum, & eliminat: tandem perpetuo motu Sanguinem exagitando permiscet, renovat, ac vigere facit, *ibid.*
 — Equitatio in Morbis Chronicis, & Phthisi præsertim, cur ita conducit. 103.
 — In Colica biliosa, aut vitiis in Curru, unicum remedium, (exhibito interim anodyno ad Dolorem recidivum Colicæ biliosæ extirpandum,) post debitas Evacuaciones, si aliquantū continuatur. 29. In Hypochondr. & Hysterici summi momenti, & sanitatem præ ceteris conciliat; Et hujus rei exemplum. 93. Idem in Phthisicis, Tabidisque, præstat. *ibid.*
 — in Phthisicis curantibus magis efficax, quam Cortex Peruvian. in Intermit., vel Mercarius in Lue Venerea, si observanda observentur. *ibid.* Viribus agorum admodum debet, ut prima sit modica non violenta, sic gradatim ascendendo pro variis vitium incrementis. *ibid.* In Phthisicis non juvat, nisi longa interea emetatur æger. *ibid.* In Adultioribus ad Phthisin sanandam multo diutius, quam in Junioribus, continuanda. *ibid.*
 — & Vestio in Curru in Chronicis quum pluribus præstantissimum remedium, mori quis in illo improbus perseveret; Et hujus rei ratio. 27.
 — sed constans & adidua, in Morbis Chronicis, ac Podagra, si grandior ætas, vel Calculus non intercedat, adeo præstans est Medicamentum, ut si huic simile quis haberet, quod celare vellet, opes inde amplissimas facile accumulare. 104.
 — Equus ad circuli suam pertingit septem annorum spatio. 7.
 — Eruptio Pustularum, in Variolis, tardior celeriori præferenda. 17. Sepe impeditur & supprimitur a violentia Morbi & a nimio impetu, Pustulas se mutuo opprimentes nimis urgente. 83. confer. 86. Adeoque non acceleranda (ubi de Variolis quadam suspicio) calidis & cardiacis, utut graviter agrosent; nam non necant Variolæ quia tardius erumpunt, nisi calefacientibus impetitus fuerit excreffus; hinc tum temperantibus alliciendus. 17. Verum ubi calefacientibus nimis acceleratur, pessimum, & ex Discretis in Confluentes inde sepe mutantur Variolæ. *ibid.*
 — adjuvari quarto die aliquando, si pro voto non succedat, poterit; sed per Cardiacæ blanda, pægorica, que æstuant Sanguini frænum injiciunt; ante hunc diem vero non. 17. 18.
 — Anomal. Discret. non quarto, ut in Discretis Regular., sed tertio die, ut in Confluent., contingit. 25.
 — Confluentibus Regularibus ut plurimum tertio die, ante illum aliquando, raro post, contingit. 25.
 — Discretis Regular. naturaliter, & ut plurimum, die quarto contingit. 15. 17. Raro citius, sed aliquando serius. 15. Quænam Symptomata tam in Adultis, quam Infantibus, præmittant. *ibid.* In laxiori temperamento, aliquando, sine insigni agitudine progressa, sensim ad expulſionis periodum perveniunt. *ibid.*
 — Eruptio Pustularum Regularibus Evacuacionibus oportune institutis, aliquando promoveatur. 17.
 — Eruptiones Cutis, *vid.* Cutis Eruptiones.
 — Eruptionis Pustularum tempus, in Variolis, dicitur, ubi Natura separatam, priori tempore, materiam parvorum Abcessuum, seu Pustularum, ope, amandat, atque expellit. *ibid.*
 — ab eo in Morbillis adeo discrepat, ut Morbus erumpens utique, inde, facile discerni queat. 15. 25.
 — Erysipelas, *vid.* Febris Erysipelatosa.
 — Evacuancia ubi roborantibus Curatio innititur efficiunt prorsus. 103.
 — in Apoplexia Febrilibus Intermit. superveniente mortem inferunt. 41. In Cholera, susa non sunt. 32. In Dysenteria Epidemica, *vid.* Purgantia. In Febre nova Epidemica, licet convulsivi motus, aut subultus adsint, ideo non deneganda. 193. In Febr. Intermit. Morbum protrahunt. 40. In Febr. Intermit. Cortice Peruviano curatis, quæcumque vitanda, metu Recidivæ. 41.
 — iterata in Febrilibus, licet necessaria, corpus debilitant; unde fracto quasi Spirituum Systemate, Symptomata leviora, quasi Februm reliquia, remanent; quæ tempore recedunt, vel Pægorico superantur. 115.
 — in Hydrope quomodo agant, & quænam sint. 107. 109. In Hysterica Adf. curatione, quænam initio insituentia, & quare. 78. Inter Pægoricorum usum non exhibenda, ne motu excitato, Symptomata revocentur. 94. In Nephritis specie, Febr. Intermit. concomitante, summo tempore vitanda. 96. In Podagra Curatione non modo infructuosa, sed & nocua. 101. confer. *ibid.* 102. Paroxysmum Podagricum cur exciscent. *ibid.* In Variolis, ut V. S. Enemata, Emetica, &c., in initio vitanda, si fieri potest. 17. Quo sensu nocere possint. *ib.* In quibusnam requirantur. 86. in quibusnam vero denegentur. *ib.*
 — Evacuancia in Variolis non minori cum periculo motum requisitum retardare possunt, quam calefacientia eundem nimis accelerare. 17.
 — opportune adplicata aliquando Eruptionem Pustularum promoveant. *ibid.*
 — Evacuaciones iusto copiosiores, in Morbis, quidnam producere valeant. 10.
 — Sanguinis indebitæ Adfectionem Hystericam excitare valent. 27.
 — Sponte a Natura fieri solitas, imitari velle sepe solidum est. 29.
 — Eventus in Variolis a Curationis fundamento, primis diebus jactis, pendet. 84.
 — Exanthemata in Morbillis An. 1670. faciem primo, in Morbillis An. 1674. humores primo occupabant. 30.
 — nigra, in Morbillis, Adultis contingentia, & enteritis signa, quomodo tractanda. 25.
 — Pestilentialia imminentes leti saepe indicia, a Sudoriferorum, in tenuiori humorum portione, Morbi nempe sede, impetu facto, fibræ fractis & commutatis, existantur, in iis scilicet qui difficulter sudant. 13. Et in iis, qui facile sudant, Bubonum materia introducta & furiente, isidem producantur. *ib.*
 — Exanthemata in Variolis, *vid.* Pustulæ.
 — Excrementorum alviorum liquidissima consistentia indicat Diarrhoeam non criticam. 7.
 — Exercitium corporis, inter ea, quæ humorum indigestionem impediunt, hinc Sanguinem roborant, ac firmitudinem conciliant, facile palam præcipit. 104. Et Calculum quoque prohibet. *ibid.*
 — iusto vehementius Spiritus dissipat, hinc Concoctiones lædit. *ibid.*
 — in Hydrope loco Purgantium quando. 109.
 — validius in Gonorrhoea virul. scrovi inflammationem excitare potest. 78. Vel recidivam, si reliquia quedam adsuerint, producere valet. *ibid.*
 — in Morbis Chronicis, *vid.* Exercitium corporis in Podagra.
 — in Podagra & Chronicis plevisque, siue Equo, siue Curru, constans & adiduum, adeo præstans est Medicamentum, ut si huic simile quis haberet, quod celare vellet, opes inde amplissimas accumulare possit.

posset. 104. Pro Podagricis primum est Equitatio, ut grandior aetas, vel Calculus major, obstat; tum vero Pessione in curru utendum. ibid. In Podagra tam in Paroxysmis, quam eorum interstitiis, commendatur, licet aegro displiceat. 105. In aere rustico, potius quam in urbano, instituitur. 104. Licet aegro durum videatur, propter senium, & socordiam huic Morbo naturalem, nentiquam omittendum, aut ex aliis adhibitis nihil frugis reportabitur. 104. 105. Sed iusto vehementius non fit, tale vero quale senibus, qui primum sunt subiectum, competit. 104.

Exercitium in Podagrae Paroxysmo, Curru vectio, aegro brevi multo minus dolorum videbitur, quam quies domi in Cathedra ipsi molesta est, & praeterea somnum placidum illi in subsequente nocte conciliabit: Calculum quodamtenus praevenerit: Impotentia artuum ad motum occurret: In senibus materiae inconcoctilis assimilationem parum adjuvabit. 105. Quandoque vero vetatur, & lectulus ejus defectum supplere debeat. ibid. Ubi vero aegritudo, animi deliquia & similia adsint, ut Libitina evitetur, cubiculo aeger non includatur, sed molestiam vestitionis in aere liberiore substat: & dolorem, amarissimum licet Naturae remedium, ut vite prospiciatur, ferat. ibid. Non modo Tophorum generationem impedit, verum & Tophos veteres, atque induratos, solvit, modo cutim nondum destruxerint. 104. In Podagra inveterata Paroxysmo, ad ventriculi languorem confer. 105.

in Podagra & Chronicis Morbis, quotidianum esse debet, cum totius corporis habitus sit immutandus: quin in Podagra exercitatio per vices intermissa, fortassis nocere poterit, Paroxysmum accensendo, ubi quis ab ea desuevit. 104. confer. 103.

Exercitia corporis modica in Tussi Epid. An. 1675. conceduntur. 32

Exercitio calefacti sollicite vitare debent frigus. 34

Exhorrescentia febrilis tempus, est illud in quo pereunt, qui ex Febr. Interm. moriuntur. 7

in Febris Interm. ratio. ibidem.

Exomphalos in Hydropicis unde. 106. 107

Exostoses, seu Tubera Ossium, in Lue Venerea quales. 78. Quomodo curanda. 80

Expectoratio in Pleuritide essentiali liberior facta, Symptomatis finem imponit. 34. Tamen ad Curationem attingendam non proponitur, ab Auctore, sed V. S.; quia expertus est Methodum hanc non modo radiosam, sed & periculo plenam esse, quia aliquando pars quaedam materiae non coctae Expectorationem suppressere potest; tum quia expulsionem materiae morboae, pro suo arbitrio, melius per aperituram Venae, quam per Tracheam, dirigere potest. 35

Experientia Medicorum Magistra. 78

Expulsionis tempus in Variolis, idem ac Eruptionis.

Externa, vide Topica.

Extractum Absinthii & Centaur. min. in Febr. Tert. Vernal. An. 1673. 42

F

Faciei flacciditas, in Variolis Regul. Discret. ex calefacientibus, & sudoribus nimis, producta, Paregoricis, V. S., & aura frigidiore, tollitur. 19

Faciei Tumor, vid. Tumor faciei.

Facies in Variolis, Cicatricibus ne deturpetur, an aliquid agendum, praeter Regimen temperatum. ibid.

Confluentibus, ultimis diebus ob pustulas crustosas, rigida, Ol. Amygd. dulc. inungitur, & quare. ibid.

Facultates humanae non majoris, quam quae percipiendae vel Theologiae Naturali, vel Philosophiae morali, vel Arti Medicae, Mathematicae & Mechanicae, inserviunt. 40

Fama Medici, vid. Medici Fama.

Faucium, in Variolis Discretis, dolor incipit cum Pustularum eruptione, & cum harum incremento augetur. 15

Febres duas partes, e tribus, in facienda Medicina occupant. 42. 89

id solenne habent, quod cum rigore & horrore, quas totius corporis calor sequitur, adgrediantur. 12. 22

pro causa externa, quamplurimum, Vestium praetura abiectionem, vel refrigerationem post incalescentiam ab Exercitio, habent. 160.

Aequae tum pro Constitutione Anni, vel humorum dyscrasia, variae exoriantur. 34. Et ab his duabus causis, plures quam Gladio, Peste, Fame, simul sumtis pereunt. ibid.

novae, quot Annis sub eadem Constitutione, quare enatae vulgo saepe videantur, quae tamen eadem sunt. 24

Constitutioni generali propriae, aetate, ubi corpora excalefacta sunt, invadunt, sed Autumno, Principi Epidemico iterum cedunt. 24

Febres & Morbi Epidemici simul grassantes, miram habent affinitatem. 33

novae speciei Auctori ubi sese, jugiter sibi invicem succedentes, obferunt, quae ad eas pertinent, & ab eis pendent, sedulo congerit. 6

quaedam sunt, quae singula suam sibi Methodum medendi a reliquis diversam postulant. 42. Quaedam per Diaphoresin, aliae per Catharsin, eliminandae veniunt; quaedam a Natura peculiari Methodo, sine evacuatione sensibili, ablegantur, & quomodo. 29. Per Diaphoresin quanam, per Catharsin quanam sint curandae, Experientia docet, non Ratio. ibid.

Diaphoresin licet a Natura curentur saepe quam optime; id sibi privilegii adrogare Ars nequit, sine discrimine, ob plures rationes. 115

Sudoriferis saepe accenduntur, quae vel sponte, vel V. S. abivissent. ibid.

quae in paroxysmo Sudorem criticum postulant, sunt Febres Intermittentes, quarum Paroxysmi particulares id postulant; tum Febres talis Constitutionis, quae ad Intermitt. Epid. producenda unice facit: Et nisi in iis Methodus eo dirigatur, peiores fiunt. 29. Febris Pestilentialis vero causa quia subtilis, jam primis diebus, Sudoribus dissilari potest. ibid.

Febres tenui Diata, modo Intermittentes non sint, absque alia evacuatione aliquando solvantur. ibid.

quam plurimae per V. S. & Purgationem multo melius, quam per ullam aliam Methodum curantur. 115. Praesertim quam per Diaphoresin. ibid.

ubi curandae, non modo duabus Indicationibus, uti vulgo obtinet, satisfaciendum venit; ut nempe Sudoriferis materies morboae evacuetur, tumque Symptomaticis supervenientibus obviam eatur, hoc equidem Empiricus novit; sed Historia Morbi esse debet, ut noscatur cujus speciei Febris sit; tum an Phenomena ex ipso Morbo, an ex curandi Methodo nascentur. 42. Errat, qui non continenter attendat ad Constitutionem Anni, alicui Morbo faventem, & reliquos in ejus similitudinem detorquentem. 32. Maximi momenti est scire, quanam Evacuationis via Materia febrilis sit excludenda. 34. 115

Febrilis Materies solo ipsius Febris calore, fere ad Concoctionem, ut sudore expellatur, duci potest, ut calefacientibus iis servidit, forinsecus adlatis, non indigemus. 29. Istius Concoctionem, jam ab initio promovendam vulgo clamant Medici, licet temperantia tum exhibeant; unde quid sibi velint, ignorat Sydenhamus. 5. Ejus Concoctio quid sit. ibid. Quid ipsam promovere revera sit. ibid.

Febris Instrumentum, seu sollemnis Machina Naturae est, dedita opera fabricata, ut ejus adjumento partes impurae & nocuae, a puris & sanis, secernantur & per emunctoria corporis deinde expellantur. 1. 5. 12. 20. 85. 102. Hujus operis Natura critica Materiam morbosam solvere norit, sanitas insequitur; vel Mors, si ab eadem materia oppressa Natura fatiscat. 1.

Febris cum Apostemate quamvis habeat Analogiam. 20

Nature Methodus est, qua materia peccans ex Sanguine amolitur, uti Abscessu eadem ipsa partes firmas ab extraneis liberat. 84

in Morbis Malignis cur mitior adpareat, quam Morbi violentia, ex Virium prostratione deducenda, exigere videtur. 32. 116. Quomodo ex V. S. emicuetur hec, Casus singularis. 116. In Peripneumonia notha vix reperitur ob interceptam Circulationem, aetato nimis Pulmone. 35. Sic in Peste Febris aliquando non adparet, dum perit aeger. 32

Primaria Nature videtur illa, qua Intermitt. Autum. Constit. 1661. ad 1666. ceteris praedominabantur; & soli hujusmodi Febri quae Depurato-

ria vocanda, adaptari debent Axiomata Hippocratis & aliorum Veterum, de praeparanda materia Febrili, ad Crisin per sudores rite faciendam. 33

Morborum Intercurrentium primum Morbus est: & reliqui Adfectus, a quibus illi Morbi nomen mutantur, ut Angina, Pleuritides, &c. Symptomata modo sunt, a materia Febrili, a modo criscos, a parte in quam ruit, pendentia. ibid. confer. 35

unius Anni, ab altera, ita differt, ut qua Methodo jam ab ea aegros liberaveris, alio Anno eadem ipsa forsane medio tolles: hocque pendet a varia Constitutione. Epidem. natura. 1. Nam Febris quaedam propria ac peculiaris, cuilibet Constitutioni peculiari competit. 15

Febris in Infantibus non facile semper distinguitur, an a dentitione, an vero alterius speciei, sit. 115

Commotionem in corpore ponit, pendentem a Natura, quae vel materiam inimicam excernere, vel sanguinem in novam diathesin immutare, tentat. 3. Ex quolibet horum vero fiat, Indicatio semper erit, Commotionem febrilem ita dirigere, ut vel non exorbitet, vel etiam non langueat. 4

una eademque, diversa sua periodo, diversimode tractanda saepe est. 42

Febris alba idem ac Chlorosis, species Hysterica Adf. ex Humoribus depravatis, est. 91

ex Cholera male tractata, Emetico tantum tollitur. 4

Febres Continuae varias, pro varia anni Constitutione Epidem., Species ponunt. 1. Et uno anno aliam longe, & diversam a praecedenti, pro anni Constitutione, modelam postulant. ibidem. Febris Continua vero species varia explicatur, licet singulae Symptomatis communibus implicentur; Primo ex aliorum Epidemicorum Morborum, tum tempore grassantium, Genere: ut qui speciem Variolarum regnantium quandam cognoscit, illi satis constabit de specie Febris cujusvis, per id temporis grassantis. 33. Secundo ex Symptomatibus Febrili cuilibet, praeter communia, singularibus. ibid. Febres qualibet Symptomata, praeter communia, alia habent certa, tamquam Distinctionis notas, quas singulis speciebus impressit Natura. ibid. Et distinguuntur sic praecipue, tum sudatione, tum siccitate, hoc illove Morbi tempore; modo illa sibi fuerint permixta, nec incongrua Methodo tractata, ibid. Exempla vide 33. At Febris nova cujus speciei sit, surgente primo Constitutione, cum nulli adhuc Epidemici Morbi, quos Febris praevertere solet, adparere, ut indagetur arduum est. ibid.

Febres sine Evacuationibus, sola Diata, si in initio tractentur, quomodo saepe curantur. 29.

Epidemicae quae vel Putridae, vel Malignae, vel Petechiales &c. dici solent, licet denominationum eam obtinuerint hactenus, ab insigni alteratione sanguinis impressa, vel Symptomate quodam evidentiore; potius Nomina sua sortirentur a Constitutione. 2. Quare vero ita censent Auctores. ibid.

Verna tempestate, praesertim quae aetatem propius adtingit, quare paucae occurrant, nisi Constitutio fuerit epidemica. 8. Circa Veris finem, & Aestatis initium minus producuntur, verum illa tempestate, vel in Intermittentes vel in Pleuritides, & id genus inflammationes, sua sponte dissiliunt. 13. In Intermittentium castra, maxime Autumno pendente, migrantur. 116

ex Intermittentibus Autumnalibus, defectu purgationis in fine morbi, saepe enascuntur. 5

Febres Contin. Autumnales & Intermitt. Autumnales quodnam discrimen habeant. 9. Continuae, aequae ac Intermittentes, conceptam effervescentiam (licet haec uno tenore, illae partitis vicibus, eadem defungantur) spatio 107. hor. h. e. 14. dierum absolvunt; si scilicet Naturae negotium permittatur, neque medicamentis Refrigerantibus aut Clysteribus, hujus ordo interturbetur, aut corporis debilitas ipsa impediatur. ibid. Sed non nulla harum, quae ex levi offensa, ex 6. R. N. N. oriuntur, transcunt & incerti generis, neque ad definitam periodum pertingunt. ibid.

atque Intermittentes principatum obtinere, durante Constitutione Ann. 1661. 11. iisque Variolae cedebant. ibid.

Febris Continua Compendium quoddam est Intermittentium, uti harum singuli Paroxysmi hujusce sunt Compendium. 3

Epidemica Constit. 1661. ad 1664. aliarum quotquot sunt, cur praecipua & Coryphaea habeatur. ibid. Unica species in rerum natura tum temporis Auctori nota. ibid. Intermittentibus subsecuta, ejusdem fuit generis; & Intermittentium Autumnal. Compendium, uti harum singuli Paroxysmi istius sunt, compendium, videbatur; nec, nisi ratione durationis differebat. ibid. Hanc Febrim unica facile in Intermittentium Castra transibat; sed sequentium Annorum Febres rarissime. 33. Unde patet quod cum Intermittentibus istius Constit. natura conveniret. ibid. Ad Intermittentium Autumnalium Classem quare referebatur. 3. Et quum raro surgente anno comparebat, liquet altera ratio, cum Febr. Intermitt. Autumnalium Classi adnumeretur. ibid. In quibus a Tertianae ejusdem Constit. differebat? ibid. Quartanis Autumnalibus succedit, ad usque Ver debacchatur, ubi tum Intermitt. Vernal. locum cedit. ibid. Quamvis ex propria indole perdurabat? nam male tractata diutius adstibat. ibid. Ubi hujus desumptio circa diem Decim. quart. foret, refrigerantibus ad diem Vigess. prim. & ultro, prorahitur. 5

Febris Epidem. Constit. 1661. ad 1664. Symptomata sibi singularia quanam habuerit. 3. Plura si male tractabatur superveniebant. ibid.

quomodo curabatur. 4. In quibusnam V. S. instituebatur, in quibusnam non, & quae copia; quandonam repetenda. ibid. V. S. praecedat Emetico cum ibid. Vomitorium quandonam erat exhibendum, ad avertendam instantem alias Diarrhaeam. ibid. Quo tempore morbi exhiberi poterat. ibid. Paregoricum post Vomitorium vespere exhibendum. ibid. Diastordium pro Cardiacis quandonam exhibendum. ibid. Clyster quandonam exhibendum. ibid. In quibusnam vetatur. ibid. Cardiacae ante evacuationes quare non exhiberet Auctor. 5. Quibusnam suo tempore, evacuationibus peractis, uteretur. ibid. Quae ratione omnia illa media dirigebat. ibid. 6. Quandonam post Morbum purgationem celebrabat. 5. Curatio Febris hujus, in Pauperibus, quomodo cum successu, ab Auctore instituitur. ibid. Recrudescere solet, quod notum dignum, post usum Clysterum & Catharticorum, quae Febrem prius quasi profligaverant. ibid. Quomodo tractanda tum. ibid.

Febris Epidem. An. 1667. ad 1669. cur Variolosa dista. 19

Febres Continuae Depuratoriae An. 1661. ad 1664. quare facies Intermittentium videbantur. ibid. Epidemice grassari nequeunt, nisi retusa acie Constitutionis Intermittentibus faventis. 43

Febres a Dentitione. 149

Febris Depuratoria vocatur, ubi Natura omnia Symptomata ita moderatur, ut Materiam febrilem rite concoctam, certo suo tempore, vel per diaphoresin, vel diarrhoeam, expellat. 33. Et talis fuit Febris Constit. An. 1661. ad 1664. ibid. & 142

quomodo curanda. 4. 8. 142

Febris Dysenterica, novi generis Febris, Constit. 1669. ad 1672. Dysenterias & Tormina Ventris sicca, concomitans, eos etiam adsciens, qui hisce Morbis non laborabant, Dysenterica quare dista. 21. 23. Haec Evacuationibus per alvum exceptis, per Constitutionis decursum, Dysenteriae in omnibus, simillima fuit. ibid. Subducebat se paululum, dum alii istius Constit. Morbi praevalebant, nec tamen omnino desinebat. 24. Symptomata ejus eorumque varietates describuntur. 23. 24. Febris haec in Aphthas, plus quam ulla nota Febris, propensor erat; quare. ibid. Dysenteria absente, vel se subducente magis grassabatur, (confer. ibid.) una cum Variolis mitioribus hinc inde concomitantibus. 21. Et An. 1669. Dysenteria hieme repulsa, videbat. ibid. Sed An. 1670. Julio mense jam praevalebat, & Dysenteris hieme repulsa, grassabatur iterum. ibid. Hanc vero An. 1671. fugaverunt Tertianae Intermitt. sed Julio mense de novo repetebat, Autumno iterum Dysenteris cedens, & his frigore fugatis, hiemem totam denuo contristans ibid. Tandem An. 1672. Julio rursus invadebat, Autumno iterum Dysenteris cedebat. ibid. & hieme, fugata Dysenteria, redibat. ibid.

Febris Dysenter. An. 1671. pluribus differebat, ab ea An. 1672. ejusdem

Constitutionis; utraque tamen, facie, tempore invasionis & Methodo medendi, in eadem Febre specifica, concurrebat. 24.

— *Dysenteriam Epidemicam*, in aliis locis itidem, concomitatur, ut docet *Dysenteria in Africa*, quam tractavit Dr. Butler. 23.

— curatur irritando Evacuantes, qua in *Dysenteria* contingunt, ut expellantur humores acres. 24. Hinc V. S. & Purgationes, ut in *Dysenteria* eis; sed abstinendum a Purgativis; & quare, ibid. Qua occasione Methodum hanc adscripsit Auctor, ibid. Nullis aliis indigebat. ibid.

In Febre *Dysenterica* Purgativa post Curationem, ubi vires non redeunt, ut saepe in *Hysteria*, quare conducant. ib. Quoties & quando exhibenda. ib.

In Febre *Dysenterica*. Adolescentes, praecipue si in initio sudores eis extorserant, non numquam delirabant, non uti Phrenitici, sed stupore, quasi Caro adficta: Et nulla arte sublevari poterant. ibid.

Febres Epidemicae sunt vel Stationariae vel Intercurrentes seu Sporadicæ. 1. 2. 33. 34.

— Regulas ad curationem Generales non admittunt. 2. Hinc quid Medico ubi grassari incipiunt, ut curationem dirigat, agendum. 3. Neque juxta varias annorum crases, aut ejusdem anni varia tempora, adhuc dum distingui potuerunt, a Sydenhamo. ibid. Et Febrium Epidemicarum diversarum ratio, ubi arcanæ annorum Constitutioni hæ inniuntur, non videtur a causa morbifica, in homine aggesta, deduci posse. 2.

Febres Epidemicæ species cuius sit, quomodo noscatur, 24. Et uti ex Epidemico tum temporis grassante, dignoscitur ejus species; sic ex Febre quadam conspicitur, quoniam ei jungatur Morbus Epidemicus, sive *Dysenter.* sive *Morbilli*, &c. noscitur. 33. Quod tamen, in Nova Febre specie, vertente primum Anni Constitutione arduum. ibid.

— cuius species perspecta & indoles, eadem Methodo, qua semel sublata fuit, curatur semper, donec extincta illa specie, novum genus oboriatur. 1. 2.

— Morbos alios hac Constitutione itidem prodituros, ut plurimum prævidetur. 33.

Febres Epidem. alicujus Constitut. repentina aeris quadam manifesta alteratione, materiam morbificam in Pectus deponere potest, eadem ipsa interim remanente, sed Symptomata istarum partium tum simul prodicente. 31. 32.

— Continua Constit. An. 1661. ad 1664. ubi Intermittentes Autum. prædominium habebant, unica fuit, in qua Natura Symptomata sic mitigabat, ut materia Febrilis, debita Cognitione preparata, per diaphoresin suo tempore expelleretur. Et videtur hæc Naturæ primaria Febris, duplici de nomine. 33. De eadem reliqua vid. Tit. De Febre Cont. Epidemica 1661. ad 1664.

— Constit. 1673. ad 1675. An. 1673. ingreditur, circa initium Julii, alterius Constitutionis Morbis nondum plane expulsi, & pari passu cum illa procedentibus, neutro Morbo admodum grassante, & per illum Autumnum, ac Hiemem, progrediebatur, *Dysenteria* mense Novembri, sed leniores, hinc inde, post acre gelu succedente calore, spargebantur nec amplius istius speciei adparere. 28. Phrenitis sine stupore, sed raro, aderat. 31. Initio magis erat Inflammatoria, ut patuit ex Symptomatibus Pleuriticis. 28. Variolarum nigrarum An. 1670. reliquias referebat. 28. 29. Symptomata hujus Febris propria. 28. Quibusnam comitata quando designabat? ibid. Hanc comitabatur Coma quoddam aliquando in Aphonia definit. ibid. Et qui ita adfectus vigesimo octavo, vel trigesimo die tantum convalescebat. 28. 29. Delirium leve in Adultis aderat; & in Pueris somnus abruptus cum sterore. 28. Delirium hoc Coma potius stupore emulabatur. 29. Hæc Comatosa Auctori vocatur, ob insignem stuporem comitantem. 30.

Febres Continua An. 1675. initio Julii, longe lateque depopulata, circa Autumnum in viscera cepit converteri, specie *Dysenteria* & *Diarrhæa* se prodens, per quam viam sibi fugam querere adfectabat. 28. Vel caput petebat Stuporem inferens. ibid. Sed tum temporis Anni prædominio potiebatur, ita ut *Diarrhæa* & *Dysenteria* potius Symptomata, quam Morbi essentiales, essent. 28. 29. Catarrhi & Tussis hinc Febri adjungunt, post subitam temporis mutationem. 28.

— curatur. 28. 30. Quare ad Methodum inveniendam hic diutius hærebat Auctor. 29. Qua ratione Medelam adsecutus fuit. ibid. Post V. S. pro viribus egri semel institutam Epispasticum largum nuchæ applicandum. ibid. Sequenti die Enema in tempore applicandum, & quotidie reiterandum, sed non post decimum quartum diem. ibid. Post hæc Morbus sibi committendus. ibid. Nec ulla Evacuatio violenter instituenda. ibid. Dieta sit tenuis. ibid. Lecto quotidie abstinendum, vel ei vestibus indutis incumbendum, capite elato. ibid. Si a lecto, diutius quam par est, abstineant, Rheumatici dolores, vel Icteri species, suboriuntur; & quid tum agendum. ibid. In declinatione autem Morbi, ubi mitior est, potius lecto decumbat, ut videntur dicta mala. ibid. Solvuntur Objectiones eorum, qui existimant hanc Methodum tantum sufficere, ut impetus a capite diverteretur, non vero, ut materia Febrilis concocta per Sudores eliminetur. 29. Sine Sudoribus hæc Febres species epispastice fugatur; hinc non sine discrimine sollicitantur illi, capite tum gravato. ibid. Si vero sponte prodeant, & levent, non contemnendi. ibid. Per V. S. & Enemata feliciter succedebat Curatio; nam Diaphoretica, plura Anomala Symptomata, & discrimen, inducebant. ibid. Coma & Stupor hinc Morbo comes, quibuslibet remediis tentatis, debellari non poterant, sed Naturæ si committeretur tuto, licet tarde, recedebat. ib. Aliquando ad Tricelimum diem desertur convalescentiæ primum signum; quo tempore absurda licet adperant, concedenda. 30. Confirmatur Historia. ibid. Phrenesis sine stupore, quæ aliquando sed raro aderat, induci non ferebat, sed cito nocebat, nisi Vitrioli Spiritus cum Cerevisia tenui propinaretur. ibid. *Diarrhæa*, & *Dysenteria* Symptomata, V. S. & Narcotico sanabantur; addito aliquando Cardiao. ibid. *Diarrhæa* tamen cum minus afficiebat, non multum curabatur, nisi cum periculum inducebat, tumque Narcoticis erat reprimenda. ib. Sudores nocturni convalescentibus supervenientes, in debilibus & emaceratis, Tabem aliquando inducentes, Vino Malacensi, nocte & aurore, ad cochl. v. vel vj. assumto, profligabantur. ibid.

Febres Continua An. 1679. oboritur similis illi An. 1675. hiemali (242.), ex Tussi imperite tractata; quæ tamen ut Tussis curabatur. 42.

— novæ speciei, An. 1685. primo ex solvente gelu, mense Februario, exorta est, dissimilis illi, quæ ab An. 1675. ad 1684. per octennium scilicet, invaluit. 112. Per omnes Angliæ Regionem latius vagata est, longe magis tamen Epidemice in aliis locis, quam Londini sæviens. ibid. Hæc eadem est, quam Auctor, in ea tum temporis hallucinatus, nomine Febris Hiemalis & Febris Peripneumonice tradidit, ac ad Intercurrentes relegavit, & quam deinde, æstate superveniente, ad novam Constitutionem redigendam omnino censuit. ibidem. Et Hiemalem, quam olim a colluvie serosa oriri putabat Auctor (vid. pag. 110. postea invenit nihil esse; quam simplicem Sanguinis Inflammationem, ad quam jam Indicationes Curativæ dirigendas, suadet. 113. Hanc Febrem novæ speciei, Cortice Peruviano, quare non nulli Medici profligare tentarunt. 114. Sed successus raro votis respondit. ib. Unde liquido constitit hanc Febrem, ab istis Constitutionibus 1677. ad 1685. toto celo distare. ibid.

— Infantes æque ac Adultos afficiebat. 115.

— ne primordium sit Febris Depuratoria, olim Pestem immanem prægressa, metuere videtur Auctor, & quare. 116.

Febres hæc licet Continua prorsus esset, tamen ingruente nocte exacerbescerebat. 112. 114.

— Qualia habuerit Symptomata. 112. confer. 110. Quæ Sudore spontaneo nocturno aliquando mitigantur. 113. Æstivo tempore, ventris Torminibus, præcipue se manifestabat. 114. Nihilominus V. S. & Catharsi repetitis curanda erat; exhibendo Pilul. Cochias, loco Potionis, si hanc stomachus non fert. ib. Si *Dysenteriam* ex istis Torminibus nanciscatur, hæc consuetæ Methodo tractari non debet, sed illico Laudano compescenda, & quare. ibid.

— Curatur Evacuantibus, ut V. S. Purgationibus, iteratis; Epispasticis; Purgativis insuper, adhibitis. 112. Interponuntur temperantia. 113. Aphthæ & singultus si adsunt, Cortice Peruviano curantur, ibid. Dieta quali utendum. ibid. Non ita tamen tractanda, ut Evacuantia ad Symptomatum omnium sublationem exhibeamus, letale hoc foret; hæc, equidem, leviter hinc inde remanentia, tempore disparent sponte sua, pro ratione, qua redit sanitas; sunt enim modo Evacuationum reiteratarum, & a Cibo potiusque adfuetis abstinentiæ, quæ corpus debilitant, progenies: unde Vapores, haud secus ac in faminis, elevantur; qui etiam Purgativis superantur, 115.

Febres Continua, licet aliquando alia Methodo, quam V. S. & Purg. curetur, non statuendum inde, illam Methodum præstantiorem aliis, & quare, 116. Quænam vero sit optima Method. quomodo dijudicetur. ibid.

— Methodo traditæ omnino non cedens, ad Corticem Peruvianum, ut certissimum medium recurrendum. 115.

— in *Hysteria* evacuandis protrahitur, hincque Purgativa & *Hysterica* adhibenda; & vitæ pro lubitu concedendus. 113.

— recidivam unde habeat, & quomodo hæc prævenienda. 112. Est tantum Symptomata tum, & ab Aphthis nasci. 112. 113.

— Quomodo in Infantibus curanda. 114.

Febres Erysipelatosa Rusticis Syderatio audit. 37. Speciei duplicis est. Una vulgaris cuius Phænomena antecedentia & præsentia describuntur. ibid. Altera species rarius occurrit; & describitur quoad causas antecedentes, & phænomena præsentia. ibid.

Febres Erysipel. tempore quolibet, præsertim tamen exeunte æstate incessit. ib. Partem quamlibet, at præ reliquis faciem, occupat. ibid. 144.

— Cum quibus Phænomenis incipiat. 37. In Gangræna aliquando terminatur. ibid. Pustulæ apparent, ac si apes aut vespe aculeis suis punxissent. ib.

— Vulgaris, & non vulgaris, eodem modo curantur, nisi quod ultima species externis mediis minus eget. ib. 144. Venæ sectio una, & subsequens Catharsis, in tempore adhibita, plerumque curant. 37. Venæ sectio quando & quibus intervallis sepe iteranda. ib. Dieta. ib. Julapium quale & quando exhibendum. ibid. a Lecto, per horas aliquot, quotidie temperet eger. ib.

Febres Hæctica Infantibus qualis, & quomodo curanda. 115. 149.

— post Pleuritidem essentialem quandam. 35.

Febres Hiemalis quolibet Anno, ab Hieme ingruenti, usque ad Ver adultum, invadit, in Febrium Intercurrentium Classem recensenda. 110. Unde oriatur. ibid. Peripneumoniam notham (pag. 39. descriptam) quæ Febres hujus species est, producit aliquando: non numquam Symptomata excitat quæ hic describuntur. 110. confer. 112.

— a Peripneumonia notha, ut ex causa, & symptomatis patet, non nisi gradu differt. 110.

— si male tractetur quænam Symptomata, tandem letalia, adipiscatur; quæ tum falso Malignitati ascribuntur. ibid.

Febres Hiemalis curatur V. S. & repetita Catharsi, ut exundans pituita colliuvies, ob hiemis analogiam congesta, revellatur, tumque subducatur. ib. Exhibitis interim Purgativis, & Decoctis ac Eclegmatibus Pectoralibus, &c. ib. Raro adeo sevit, ut non post unicam V. S. & tres Purgationes cedat. ib. Si errante diagnosi, pro Stationaria habeatur, plurimum interitus causa erit. ib. & Peripneumonia hæc in Forma Postscripti delineata ib. illa est quam postea Auctor tradit, Titulo de Novæ Febris ingressu 112. simul agnoscens suum errorem, & qua ratione in eum incidit, referens. ib.

Febres Intercurrentes vocantur Febres Continua quædam, quæ omnibus in universum Annis (160.) qualibet sub Constitutione, competunt, & ab hac illovis aeris temperamento, tamquam causa productiva, ortum ducunt. 1. 2. A Stationariis differunt, quod hæc ad certam Annorum seriem & Constituti. determinantur, Intercurrentes omnibus Annis communes sint, qualiscumque sit Constitutio. 34. Conveniunt vero cum Stationariis saepe quoad causas externas ac Procatarticas, licet quoad causas ab aere subministratas longe distent. ibid. Febres Intercurrentes omni fere Anno invadunt, 27. Plures simul non corripiunt, quia non a causa generali ac Aere pendente, quemadmodum Constitutio universalis, verum a particulari, corporum particularium æquivalit, quæ Sanguis atque humores vitiantur, oriuntur. 1. 34. 102. Tamen Epidemice non numquam, quamvis non ita frequenter, haud minus ac Stationaria, grassantur, quando earum causa mediata generalis, quædam aeris manifesta qualitas est, corpora ita disponens, ut certæ Sanguinis & humorum oriantur dyscrasie, quæ illarum causæ immediatæ fiunt. 160. Exempla. ib. Hæ Febres jam parcius jam inclementius seviunt, & cum Stationariis, & secum invicem, eodem Anno indifferenter commiscuntur. 33.

Febres Intercur. præcipue sunt Angina, Febres Erysipelatosa, Febres Scarlatina, Peripneumonia notha, Pleuritis, Rheumatismus. 2. 33.

Febres quædam Intercurrentibus jure merito essent adnumeranda, quæ vulgo non Febres, sed Symptomata modo habentur, quoniam cito transeunt, & in hoc vel illo Symptomate desinunt; quod Symptoma tamen revera tantum ex illis Febribus sequitur. 38. Tales sunt Hæmorrhagia Nasium & Hæmoptoe. ibid.

Febres Intermittentes per 13. An. fere exultantes, Epidemice rursus, anno 1678. audiunt. 40. Anno 1677. in Autumno primo exsertæ, quotannis increbrescentes, Epidemice passæ sunt, donec ad æquum pervenire, jam iterum decrebrescentes rariores ita factæ, ut tandem An. 1682. 1683. vix Epidemice viderentur. 112. Et jam An. 1678. Vere denno suborta, Æstate & Autumno ita sevebant, ut omnes Epidemicos fugarent alios, quorum nulli reperiebantur: Hieme Variolis & aliis Epid. locum cedebant, donec apta tempestate redierint. 40.

Febres Intermitt. An. 1677. &c. Tertianæ erant, vel Quotidianæ; nisi hæc Tertianæ duplices appellare velimus. ib. non amplius in æquum desinebant, præsertim calidis adhibitis. ib. Et Remissionem loco Intermittentis concedentes, ad speciem Continuarum pervenire, recto Cerebro, jugulabant. Interim ad Intermitt. Classem erant referendæ, & Cortice Peruviano itidem, sed majori dosi, debellandæ. ibid. 41.

— Apoplexiam aliquando comitem habebant, quæ ipsa Febres erat, caput impetens. 41. In quo casu, ab omnibus Evacuantibus revulsionis sine, ut in Apoplexia essentiali requiritur, cavendum erat. ib. Diabetis in senibus causa aliquando fure, Morbo jam curato. ib. Quomodo hæc vtro curanda. ibid. Nephritidis speciem aliquando comitem habuere; quæ ut ipsa Febres, nequaquam V. S. aut aliis evacuationibus, curari debebat. 76.

— nec Sudorifera nec alia evacuantia, ut V. S. & Catharsi, admitterebant, cum ex illis in Continuas mutarentur. 40. Ex hisce vero in longum protraherentur. ib. Unde ad Corticem Peruvianum confugit Auctor, ex quo nihil mali, sed plurimum boni, vidit. ibid. Et nulli magis, quam hoc Herculeo Medicamento confidebat, si iusto exhiberetur. ib. Periculum infert, & Recidivam concedit intra quatuordecim dies, quando ante Paroxysmum exhibetur. ib. Quæ duo incommoda removit Auctor sua exhibendi Methodo. ibid. vid. Cortex Peruvianus.

Febres Intermitt. quolibet An. resurgentes, usque ad An. 1685. perduraverunt. 42. Continua nulla, Constitutione generali An. 1678. ad 1685. durante, & Febribus Intermitt. favente, ab Auctore visa, nisi ex perversa Curatione. 43.

— An. 1679. eadem erant An. 1678. jam Julio redintegrantes & Autumno debacchantes, Novo Epidemico tandem sub mense Novembris locum cedentes. 42.

— An. 1680. (ut solent Epidemici) illis Morbis certa tempestate, quibus nempe ista fovebat, ut hieme Tussi, Febribus Peripneumoniacis, Variolis, postquam Autumno debacchata fuerat, cedebant: Vere autem redibant; donec An. 1681. minus Epidemice factæ Variolis locum integre cesserint. 84.

— quæ An. 1681. regnabant adhuc dum erant illæ, Anno 1677. quæ regnaverant. ibid.

Febres Intermittentes Epidemice unde Nomina sibi desumant varia, & discriminantur. 2. Exquisite describuntur. 7. 11.

Epidemice sepius grassatur, quam alie. 33.
 raro Londini comparare, a quo tempore Pestis regnavit. ibid.
 inter Morbos Acutos, quo sensu releganda. 1.
 calidioribus mediis, citius exhibitis, vel duplicantur, vel in Continuum speciem permittuntur; & exinde in letales verti possunt. 10. 40.
 Tum ex Continuis, circa Veris finem, & Aestatis initium, sepe producuntur. 13.
 Febres Intermitt. aequae ac Continuae suam depurationem spatio 107. hor. h. e. 14. dierum, naturaliter absolvunt. 9. Materiam a Sanguine sejungendam adeo crassam habent, ut sine praevia digestionem, ad Evacuationem debitam disponi nequeant. 20.
 Continuae quavis quoad tempus, quo materiam suam expellere solent, non differant; quod ad eorum tamen speciem, atque Naturam proprietatem adinet, & a Continuis & a se invicem plurimum differunt. 9.
 Materiam febrilem, diebus liberis, adgregant, quam Naturam Paroxysmi novi impetu expellit. 40.
 tria quasi diversa tempora, uno Paroxysmo, involvunt. 7. Horum ratio. ibid. Paroxysmi exquisita descriptio. 7. 143. In Paroxysmo qui moriuntur, tempore Exhorrescentiae fati funguntur. 7. 8. 9. Sudore prorumpente, inquietudo & alia evanescent, atque abrupta succedit. 40. Quare redeant Paroxysmi, vid. Paroxysmus.
 in Infantibus, vel etate florentibus, non attingenda, sed Naturae committenda: quin alias Morbus in longissimum tempus procurrat, & mille symptomatibus periculosus gravatur, si praesertim vel purgantia, vel Venae sectiones adhibeantur, 9. In Infantibus sive Tertiana Autumnali, sive Quartana laborant, plerumque, sanguine sua depuratione defuncto, sponte evanescent. ibid. Senibus vero Autumnales praesertim, periculosa. ibid.
 Febres Intermitt. diuturniores, Humores sua mora ubi depravaverint, non tamen curande per ea, quae humores expurgant, sed per Specifica. 91. 9.
 non oppugnanda tempore Paroxysmorum, sed horum aestu consopito. 105.
 Corticis Peruviani ope, egrorum magno emolumento, per duas, tresve septimanas delitescunt. 9.
 Febres Intermitt. ad duo Genera revocantur, quorum unum Vernales, alterum Autumnales complectitur. 7. Quaeque in tempestatibus intermediis oriuntur, atque minus frequentes, ad hasce reducenda. ibid. Quae distinctio quam necessaria Medicinam excolendi est. ibid.
 cum Autumnales tum Vernales, quavis respectu Paroxysmorum, & typorum differunt, haud adeo dissimiles, inter se essentialiter distinguuntur. ibid. Illarum Historia. 8.
 Febres Intermitt. Autumnales unde oriuntur, juxta Auctorem. ibid. Invadunt circa Junium (quae eorum est Epocha. 37.) si Constit. datur Epidemica; alias Mense Augusto, vel Septembris initio; serius raro. 8. Post se varios relinquant Morbos, ut Hydropem, Rachitidem, Tonsillarum dolorem & inflammationem, Manie quamdam speciem. ibid. 10. Diuturniores, in Infantibus, se fuerint, non discedunt, quin Abdominis tumor progignatur. 143. 10. Et Crurum tumor aliquando in Adultis. ibid. Senibus periculosa. 9. 143.
 in variis; plerumque una eademque diei hora contingunt. 8.
 Febres Intermitt. Autumn. non uti Vernales, Typum genuinum statim induunt, sed Continuae Febres ita aliquando imitantur, praesertim Epidemicae, ut nisi prudentissimo distinguantur; donec, exeunte Autumno, Lavam abiciant. 2. 8. Febres Intermittentis Autumnalis An. 1661. singuli Paroxysmi compendium Febres Continuae, uti haec compendium harum, videbantur. 3.
 cum ratione durationis, tum & periculi, longe aliter se habent Vernales. 8. Si Tertianae, sed Epidemicae non sint, atque sanos invadant, benignae satis tum sunt aliquando, instar Vernales. ibid. At si Epidemicae, & senescentes, aut cachecticas feriant, non vacant periculo, & forte in futurum Ver prostrabuntur. ibid. Si Quartanae fuerint, erunt Tertianis omni ratione peiores. Seniores aliquando brevi jugulantur in senectutis modo qui sunt confuso, licet non in eodem sint discrimine ut brevi exstinguantur, non nisi versente anno liberantur a Febre & extenuati non oriuntur. ibid. Juniores morbum hunc melius ferentes, aliquando circa solstitium Brumale, ac frequentius verno Aequinoctio, liberantur. Cathartici vero, vel Venae sectionis ope in Autumno insequentem ipsam illam Febrem deducunt. ibid. Sic Infantes tenelli in cunis, licet cum ea Febre per Menses sex confictati, de ea tamen triumphent. ibid.
 Ab Auctore nulla adhuc certa praxi curantur, antequam stas suae fermentationes, h. e. despumationis opus, peregerint. 9. In cursu suo inhibere easdem, non solum, sed & eas abrupte, Methodo aliqua certa, aut specifico medio, qui noverit, Civis officio, humano generi rem illam patefacere tenetur. ibid.
 Febres Intermitt. Autumn. non tam facile ac Vernales amoventur. 8. Curationem quae tam difficulter admittant, perpenditur. 9.
 quomodo curentur. 54. & sequ. Quare eadem in iis utatur Methodo Auct. ac in Continuis, ibid.
 Quartana praesertim, non attingenda, nisi postquam sanguis tempus illud exegerit, quod ad despumationem suam perficiendam requirit. 10. Ubi curanda veniunt, Indicationes sume debent; vel ex sollicita observatione Methodi, quae se Natura liberare tentat; vel ex causae specificae morbi perceptione ut specificum medium adquiratur. 9.
 maxime Epidemicae, Venae Sectionem, non, absque Morbi prolongatione, & senescentium morte, admittunt. ibid.
 quomodo tractanda, si Corticis Peruviano non cedunt. ibid.
 penitus sublata, nec ante, ad alios morbos periculosiores vitandos, praesertim in proventibus aetate, purgantia exigunt. ibid. Haec autem citius exhibita Morbum contumacem reddunt. ibid. Haec vero qualia, quando, quo tempore, & quousque, adsumenda. ibid.
 vel Tertianae sunt, vel Quartanae. 8. Sed ita connexae, ut sepe vices permittunt, mox tamen ad primum genium redeunt. ibid. Quotidianae non sunt, ut quidem Vernales. ibid.
 Febres Intermitt. Quartanae, Quotidianae, Tertianae suo loco videantur.
 Febres Intermitt. Vernales ad Mensem Februarii; ad mensem vero Augusti referuntur Autumnales: 8. aut Julii 21. Aliquando tamen maturius, aliquando tardius invadunt: Quod ab ubiore, parvioreve, in aeris temperie, ad has Febres producendas, apparatu, pendere videtur. 8. Quo vero maturius vel tardius invadunt, eo magis vel minus Epidemice depravantur. ibid.
 oriuntur a spiritibus prius concentratis, jam calore excitatis, viscidis humores, hieme in sanguine congestos, ut sese ex iis extricarent, dissolventes, per ebullitionem hanc vernam. ibid. Harum Historia. ibid.
 semper salubres, raro diuturnae. 8. Nunquam letales. ibid. Possunt tamen ob perversam medelam moras trahere, ad tempus Autumnalium usque: licet inde letales non fiant. ibid. Incipiunt mense Februario. 21. Mala cura, ad tempus Autumnalium protrahit, ipsa illa tempestate, ipsis contraria, exstinguuntur. 8.
 vel Quotidianae sunt vel Tertianae. ibid.
 paucioribus stipantur, in sui declinationis statu, concomitantibus Symptomatibus, quam Autumnales. 10.
 quae de causa sepe mora sua Autumnales emulantur, quavis facilius cedant. 8.
 quomodo curandae. 8. 9.
 Febres Intermitt. Vernales suo arbitrio permittenda; & quare. 8.
 Evacuandis quibuscumque pertinaciores sunt. ibid. Et diuturniores. ibid.
 Const. 1661. &c. succedunt Continuis, & circa Calendas Maji Variolis locum cedunt. 3.
 Febribus Intermitt. Vernales, licet protractis, iis tamen gravibus Symptomatibus, quae Autumnales sequuntur, non excruciantur convalescentes. 8. Sed si nimis debilitati, adhuc Evacuandis extenuentur aegri, in Maniam, brevi tamen evanescentem, aliquando incidere possunt, ibid.
 Febres quaedam tum Intermittentes, tum Continuae, transcurrent & incertigenae sunt, nec ad periodum destinatum pertinent; haec praesertim ex visio in 6. R. N. N. oritur. 9. Hae Morbis correpti subito convalescunt. ibid.
 Febres ex Lochiorum suppressione, in Puerperis tenerioribus incautis. 94.
 mali moris ob Cholerae intempestive laetant, vel adstringentibus, cohibitam, Emetico solum curatur. 4.

Febres Malignae quoniam vocantur. 115.
 Febres vere malignae, ab aliis speciebus tota idea, ac ingenio, diffidet; nec est omnium dicum Morbus. 11. Cum Peste specie convenit; nec ab ea, nisi ob gradum remissionem, discriminatur. ibid.
 in Malignis admodum Morbis, aliquando parca adparce, tum ob miram particularum subtilitatem, ut in Peste; tum a particulis conclusis; tum quod genus nervosum, vel humores extra sanguinem, per Metastasin, sine adfectu. 32.
 Febres Malignae aliquando plus a Therapeia perperam administrata, quam a venenosa morbi indole, proficiunt. 11. & quare. ibid.
 Maturationis, Secundaria dicta, vel & Putrida, in Variolis Confluent. uti & in aliis Apoplethibus fit, a Pure in sanguinem reforesco, quando contingat. 32. 84. 87. 130. Quomodo excisatur. 84. confer. 85. 87. 155. & seq. In minori specie die undecimo, in mediocri genere decimo quarto, in peiori, decimo septimo, fieri solet. 84. 130. Quo parcius sanguini Pus admiscetur eo levior. 84.
 Morbillofa An. 1674. duobus primis mensibus, quibus hi Morbilli prodierant, intercurrentes, in quibus a Morbillis differebat. 36. Immanior erat, ad 14. dies, & plures, perdurans. ibid. Curabatur ut Morbilli. ibid. V. S. nec Enemata admiscere. ibid.
 in Morbillis, die Secundo, consummata adest. 24. Octavo die augetur. 25. Febres Peripneumonicae hieme saepe oboriuntur. 84. Febres Peripneumonica quaedam, nullo non hieme, occurrunt. 112.
 Febres Pestilenciales, uno vel altero, post graviores Pestem; anno grassantes, eisdem ac Pestis, cuius reliquiae habenda, indolis sunt, & similes sibi medelam vendicant. 11. confer. 12. Et sic, Peste Londin. jam parum moderatone, eisdem generis Febres ab Auctore reperitur, quae quae jam ante Pestis invasionem grassabantur. 14.
 Febres pestilenciales per diaphoresin universalem expellit materiam morbificam, quam Pests ipsa per Abscessus eliminat; unde qui Febrem hanc aliter, quam per Diaphoresin curat, via a Natura diversa insistit. 13.
 An. 1665. verno tempore, mense Martio, post hiemem frigidam, & siccum gelu caput extulit, eo modo, ac si Febres Continua Epidemica novi generis fuisset; sed a Continuis praecedentibus valde diversa erat, neque cum ipsa Peste exstincta, verum in Ver. An. 1667. usque excurrit. 11.
 haec singularis species, An. 1665. & 1666. Pestem Londinensem praerogativa, an Pests nomine insignienda dubitat Auctor, Symptomatibus eisdem iisdem, ac ipsa Pests, stipata fuit. 14. Et non nisi ob gradum remissionem discriminabatur. 11. Quam habuerit Symptomata. 11. 13. Omnibus ab Auctore rite perpenis, consideratur tamquam Inflammatio circa partes spirituales delitescens. 13. Subsequentium omnium Inflammationum se ducent praebuit, & Chorom duxit. 33.
 illa insoliti generis, Auctoris animum exagitat, ut ejus naturam, ad concinnandam medelam, adsequatur. 13. In initio, ubi nondum cognita, Vomitorium ad praeservandam Diarrhoeam, propinat Sydenham, & eventus contrario, nec expectato, stupefactus, aliam, quam in Febribus adhibere, per aliquod tempus solebat, medelam requiri percipit. ibid. Exstincta prius Faemina nobili, in homine altero & aliis quampluribus, Methodo ad Pleuritidem usitata, curatur. ibid. 14.
 Febres Pestilentes, post Pestem, quavis Methodo alia, quam Phlebotomia frequentiore, ut cretetur, ab Auctore desideratur. 13. 14. Qualem invenire Auctor. 14. Huius Methodi tam felix successus, ut nullus aeger desideratus fuerit. ibid. Curabatur juxta Auctoris inventum, V. S. semel instituta, Sudoriferis & dein Purgantibus. ibid. Quae sudorifera cura quomodo dirigenda. ibid.
 in Pestilentiali Febre Diaphoresis quantum proficit, patet ex levamine, quod persentiscitur dum sudore diffundunt aegri; ubi simul ac sudor abruptus, omnia iterum in peris ruunt. ibid. Sudores diffuentes iusculis, ovis sorbilibus, & aliis cardiacis, refocillandi ibid. Sudor post artificialem, quasi naturalis, levans, &c. ib. Sudores nulli sponte prorumpunt, ac cum omnium Symptomatum levamine vel primis Morbi diebus excitari poterant; in quo quam maxime differebat a Febre Constit. praecedentis. 33.
 Febres Putridae Variolis Constit. superveniens. vid. Febres Maturationis.
 Febres Quotidianae, pro lubitu, Duplices Tertianae appellare possunt. 40.
 improprie aliquando appellantur, quae vel Tertianae duplices, vel Quartanae triplices, sunt. 8.
 Febres Quotidianae An. 1678. vid. Febres Intermitt. An. 1678.
 Febres Quotidianae quoniam dicuntur. 7.
 Febres Quartanae olim frequentiores erant, sed An. 1678. Tertianae aut Quotidianae grassabantur. 40.
 Febres Quartanae soboles Autumni genuinae sunt. 8. confer. x.
 Autumnales Epidemicae, usque ad hiemem excurrunt, vel, duorum mensium spatio, cursum suum absolvunt. 2. Quae ratione curandae 9. & seq. Aequae ac Vernales, in Infantibus praecipue, tum in etate vigentibus, Naturae potius commendanda, nec mali quid perpetrat. 10. In Senibus vero sunt periculosae, praesertim Autumnales. ibid.
 Febres Quartana quoniam dicuntur. 7. Triplex quando dicatur. ibid.
 sub Autumno semper ingreditur. x. Et vix ante Vernalium Aequinoctium fugari potest. ibid.
 Sanissimum corripere potest, si modo duos, tresve dies in locis paludosis egerit. 91.
 qualia parit Symptomata. 8. Diuturnior humores inquinans, uti Hysterica Affectio diuturna Cachexiam, aliaque mala inducit. 91.
 Medicinorum opprobrium. 9. Et cur. 40.
 quem semel, cuiuscumque aetatis vel temperiei fuerit, cruciatur, alia vice, quod scitu dignum, non multum fatigabit, sed brevi discedet. 8.
 Constit. 1661. &c. Autumnali tempore aliis predominatur, tumque vela contrahit. 3.
 quomodo in Senes, senescentes, agat. 8. 10. Quomodo a Junioribus, Infantibus tenellis, feratur. 8. confer. 10.
 Quae ratione per Corticem Peruvianum curetur. 40. 41. Corticis Peruviano soli licet cedere videatur; tamen bicie illi morbo potius inducias impetrat, quam quod eum debellat. 9. Nec a repetito sepius medicamento, nisi longo temporis tractu expugnatur. ibid. Corticis Peruv. quae soboles, post duas tresve septimanas recrudescens, haud segnius quam prius laceffit. ibid.
 In Febre, Quartana Cathartici aequae fere nocet ac Venae sectio, non eam usque adeo, nisi crebro repetatur. 9. Venae sectio adeo nocet, ut in juvenibus morbum ad 6. menses & ultra producat, in senioribus non modo protrahat, sed & in mortis periculum conjiciat. ibid. Aeris mutatio, post illud tempus, quod Sanguis ad suam despumationem proficiendam exigit, tantummodo convenit, nec prius. 10. Quare ante illud tempus non conveniat. ibid. Aeris mutatio suo tempore si non concedatur, quid agendum. ibid. Et quo Medicamento utendum. ibid.
 Febres Scarlatinae deservibunt, juxta Phenomena sua. 34. Multos, sed Infantes praeter ceteris, infestat. ibid. Omni tempore, sed Aetate praesertim incidit. ibid.
 Curatur abstinendo a V. S. Enematibus, Cardiacis; a Carnibus, Spirituosis, Aura nimirum libera, Purgante cessantibus Symptomatis exhibendo. ibid. Si Convulsionem, vel Coma initio Eruptionis, Infantibus praesertim supervenerint, Epispastica cervici applicanda; Paregorica singulis noctibus exhibenda; Hydrogala praescribenda. 34.
 decedens squamas farinosas relinquit. 30.
 Febres Secundariae Variolis Confluent. superveniens. vid. Febres Maturationis.
 Febres Stationariae dicuntur, Febres quaedam Continuae quae Constitutioni alicui propriae ac peculiare sunt, suo ordine invalescunt, neque extra illam usquam comparent. 2. Haec a particulari quadam, ac nondum satis cognita cujusdam Anni Constitutione pendunt, & ceteris Morbis dominantur, per totam Constitutionem. 33. 34. Non ab Aeris manifestis Qualitatibus uti Intercurrentes producuntur. 2. 34. Verum ab Aeris Qualitatibus sensibilibus jam promoveri, jam retardari possunt (Constitutione Universalis interm. ejusdem Naturae manente) prout illis favent vel adverantur praedictae Qualitates. 24. confer. 2. Unde se exserunt, ea tempestate, ad quam dictae Qualitates eas destinaverint, donec alteri Morbo, seu Febri Epidem. quem aliae subsequenti tempestatibus Qualitates advocaverint, cedere cogantur. 24. confer. 2. Ab Intercurrentibus Epidemicis differunt, quod haec omnibus Annis communes sint, Stationariae vero ad certam Annorum Constitutionem determinantur. 34. Conveniunt vero cum Intercurrentibus saepe, quoad causas externas ac Procatarticas. ibid.

- Symptomata habent differentia, ratione intensificationis vel remissionis, pro modo quo se varia Constitutionis tempora, ad quam pertinent, habent. 24. Symptomata diversa a Constitutionis Natura, ex manifestis alicujus mensis aeris qualitatibus quoque mutantur: unde quibuslibet annis novae apud vulgum, propter Phenomena diversa existimantur, licet eadem sint. ibid. Exemplum, in Febre Dysenterica An. 1671. & 1672. quae differant respectu qualitatum sensibilibus temporum, in qua inciderebant. ibid.
- Febres Stationariae sunt Morbi plerique omnes, qui a pag. 3. 33. fuerunt descripti. 34.
- Febbris Stationaria, est Febris Epidemica Constitutionis generalis. 110.
- quolibet, si Julio potissimum sevit, Autumno adveniente, magno Epidemico a quo Annus insigniri solet, & cui omnes Epidemici ad hanc Constitutionem pertinentes cedunt, cedere debet. 24. Et quare. ibid.
- An. 1675. Tussibus superveniens Autumno, & Symptomata Pleuritica & Peripneumonica excitans, eadem erat, quae Julio An. 1673. ingressa fuerat. 28. Sed in Petus illa tempestate determinabatur. ibidem.
- Febres Tertianae An. 1671. grassantur, verno tempore, & Febres Dysentericas, ac Variolas, parum reprimunt. 21.
- Febbris Tertiana quoniam dicitur. 7.
- Febres Tertianae, Autumnales, Epidemicae, usque ad Hiemem excurrunt, vel, duorum mensium spatio, cursum suum integre persolvunt. 2.
- Autumnales, praeterea h. e. Julio ingressi, non uti Venerales, genuinum Typum statim induunt, sed continuas Febres simulant ita, ut ab invicem difficile discriminari queant: sed Autumno exeunte, larva abjecta, Intermittentes vel Quartanas, vel Tertianas, se esse palam facientur: quod observatu necessarium. 2.
- Febres Tertianae Autumnales An. 1664. quibusdam Symptomatis, ab Intermitt. Tertian. aliis, determinabantur. 3.
- onst. An. 1661. initio Julii, invasere. ibid. At superveniente, hiemis frigore extinctae sunt. ibid. Et ubi desinere incipiebant, insequerantur aliae. ibid.
- quomodo curandae. 9. Purgantia hic Sudoriferis mixta, quibus, contrarios motus excitando, Paroxysmi processus confunditur atque turbatur, multum commendat Auctor. ibid.
- duplex quomodo curetur. 9. Enematis in ea interdicendum. ibid. Sudorifera, ut in Tertian. simpl., itidem, sed sine Purgantibus exhibenda. ib.
- aequae ac Venerales, in Infantibus, & aetate vigentibus, Natura potius commendanda, nec mali quid perperrant. ibid. Sed Senibus sunt periculose, praeterquam Autumnales. ibid.
- Febres Tertianae Venerales licet, modo invadant mense Februario, tamen circa Solstitium Aestivum pariter se subducunt. 2. 21. Quartanarum typos numquam induunt, ut faciunt Autumnales. 8.
- An. 1678. Cortice Peruviano non indigebant: sed curabantur, si aeger praesentem Sanguinem, V. S. Emesico, & Antisepticis amaris. 41.
- Febres Tertianae An. 1678. vid. Febres Intermitt. An. 1678.
- Febres Variolae ex Constitutione pendentes, si Variolae prioribus seculis nusquam comparuerint nequaquam antea existunt. 31. Hinc non ita culpandus Auctor, si in Methodo ipsas curante aliquod immutaverit: cum eo Recentiorum Observationibus tantum adversetur. ibidem.
- Febbris Variolosa potius a nudo calore, & sanguinis aestu seu inflammatione violenta, quam ab humore delitescens, & coctione antiqua expellatur indigente, pendere videtur. 20.
- ac Variolae Regulares, ab eadem Constit. aeris pendentes, si non eadem, saltem ejusdem Naturae fuerint, & praesepae, excepto eruptione. 11. 20. Iisdem Symptomatibus adgreditur, se exonerat. ibid. Et simul cum Variolis Regularibus maxime fuit. ibid. Hinc Febris Variolosa merito habetur Variolae vari. 20.
- Pyralismo quomodo fugam sibi querebat. ibid.
- minus recte tractata, quibusdam cum Symptomatibus ad septimanas sex vel octo, nisi mori intercederet, protraheretur. ibid.
- quia per Salivationem, non per Abscessus, eliminatur, alia Methodo quam Variolae, licet Morbus satis similis, curanda. ibid.
- ubi curanda, quibusdam fundamentis Indicationes Curativae superstrui possint. ibid. Cum materia crassa, praevia digestionem antequam evacuetur ingerentem, non habeat, sed contra materiam facile inflammandam, nec Natura Evacuationes per modum Eruptionis constituit: rei summa erit Inflammationem sedare Evacuandis & temperandis. ibid.
- Febbris Variolosa curatur Venae sectione, Enematis, Julapiis, Sero lactis ac jusculis farinosis, ibid. Regimine refrigerante tractanda, quamvis Sudores frequentes adsint. ibid.
- An. 1668. in Diarrhoeam, interversionem ad Intestina, mutata est. ibid.
- Febbris in Variolis quondam adsit, remittat, redeat. 15. 16. Variolis Confl. vero, etiam ad multos dies, ab eruptione, discruciat; in Discretis contra. 15.
- tempore invasionis unde. 113.
- interfunt, in Variolarum initio, eas Confluentes fore praedicat. 86.
- In Febris Variolis Anomali concomitantibus, cur Sudores Anomali qui simul copiosiores adfuerint, nihil evolutum praesentent. 33.
- Femur in Podagra irregulari quomodo adficiatur. 103.
- Fermentatio quamnam mutationem liquidis inducat. 3.
- liquorum in quibus differat a Commotione massae Sanguineae febrili. ibid.
- in sanguine, (quae & Commotio vel Ebullitio Auctori dicta) Natura solennis est Machina in Febris, qua sanguinem, ab intestinis iunctis, liberare conatur. 7.
- Fermentationis atque Ebullitionis vocabulis cur non utatur potius, quam Commotionis, Auctor 3.
- Fermentationum genera plura & Putrefactiones humorum ultra modum venentorum, Classem unam Caussarum universalium, Morbos producentium constituant. 1.
- Festinat in Morbis curandis quam pessima, plures aegros vita spoliatur. 33. confer. 29.
- Flatus Abdominis Tumores, ac si a collectione Aquarum productos, excitare valent, ubi Hysterica Adfectio Purgantium tumultuosa actione advocatur. 108.
- in Hysterica jam Acidi, jam Nidorosi unde. 89.
- ex Hysterica Adf. sine ulla sepe causa. ibid. Non modo in Faeminis, sed etiam in Viris. 91.
- Fluor albus. 149.
- Muliebris, seu Mensium fluxus immodicus curatur Venae sectione, dein Cathart. Corroborantium usui praemissis. 42. confer. 95. 149.
- Focus in Variolis Discret. hieme tantum extruendus. 18.
- Foelitas Cicatricum in Variolis Confluent. Regimine temperato quomodo praecaveatur. 19.
- Foeminae Hydropoe, ubi parere desinunt, praepriis adficiuntur. 107. Ubi Steriles sunt licet juniores quondam occupantur. ibid.
- paucissime ab Hysterica Adfectione, nisi quae multum laborant, liberae sunt. 89. Ratio hujus traditur. 90.
- Nobiles quaedam Charitatem suam in pascendis Pauperibus potius, quam in iis medicandis collocare debent. 35.
- Podagra raro, nisi Vesula, vel Viragines fuerint, adficiuntur. 100.
- Foeminae in Variolis minus periclitantur quam Adolescentes. 83. In Variol. Anomali. Menstruorum fluxu, tempore non solite adfuit, unde periclitantur; & quae ratione a Regimine calido, & adstringente, sepe extinctae fuerint. 26.
- Foetor in Variol. Anom. nigris pessimus. ibid.
- Fomentum in Febre Erysipelatosa. 37. Quando & quomodo adplicandum. ibid.
- Fontanella in Rheumatismo inveterato, post V. S. iterata, cruri adplicanda. ib.
- Formulae ut conscribantur, non ita Medici officium videtur, quam ut vere Indicationes evanant, ad quas Curationes sint dirigenda. 102.
- Medicamentorum in Praxi magis familiares. 114. 115.
- Formularum seu Remediorum ingentem Sylvam quare non tradat Auctor XII.
- pomposa apud Praetores exposita, Agyris modo favens, utilitati ac splendore rei Medicae plus obesse, quam prodesse solet. ibid.
- Fetus emolliunt, in Gonorrhoea viru praeprius tumefacto adplicandus. 79. Ad Uteri procidentiam. 95.
- Fovee, Variolis Discretis deciduis, nec ulla cutis inaequalitas, in facie primis diebus adparent, propter squamulas pustulis succedentes. 15.
- Fraxinifolius de Felicitate modo, laudatus. V.
- Fraxini semen virtute lithontripica laudatur: unde Mannam eadem vi pollere concludit Auctor. 31.
- Frigida tempestas, in Variolis Discretis, agro aliter satis cessuro, ob perver-
- sam medendi Methodum, per Regimen calidum, saepe salutaris. 18.
- Frigus cadaverosum partium externarum, in Hysterica Adfect. Symptomatis saepe viam quasi sternit. 89. confer. 95. Et periculum non inferit, nisi ad Evacuationem enormi procedas. ibid.
- in Dysenteria, Mortis periculum inferit. 22.
- ab Exercitio calefactes sedulo vitent. 34.
- humidum, calorem placidum, An. 1675. mense Octobri, subito excipiens, Tussis numerosiores producit. 31.
- magnam, mense Octobris, repidae, instar estatis placide, sempefasti derepente subsequens Anno 1675. Cathartos & Tussis inducit. 28.
- subitaneum post excoactionem Rheumatismum inducit. 36.
- in Variolis, neque Calor, Eruptionis tempore excedant. Utriusque Excessus periculosus. 17.
- utriusque Generis, nocet admodum, & multa mala producit. 19. 17.
- retrocessus Pustularum, & Faciei ac Manuum detumescit, causa esse potest. 17.
- Fructus Horarii Cholerae ansam praebent. 22.
- Furor seu Porrigo Capitis quomodo curetur. 151.
- Fuscitas in Variolis Confluentibus eo major, quo morbus atrocior. 16.
- G.
- Γαλακτοπότης in Podagra 103. Qua ratione magis obest quam prodest. ibid.
- Galenus Calefacientia Febres Intermitt. irritat, jam observaverat. 10.
- In Galliam migrare, qui Salivationis Mercuri effectum debilitat, & exhausti, cur sepe debeant. 80.
- Gangraena ex Erysipelate. 37. Intestinum in Dysenteria aliquando. 38.
- Gargarisma in Angina quae. 38. Non vulgari modo usurpandum, sed sine agitatione contineatur, donec incalcescat. ibid. In Aphthis post Ileum a Tormentibus ventris in Febre nova Epid. 114. In Variolis Confl. salivam spissam & viscidam diluens. 19.
- Generationes Rerum Natura certissimis ubique legibus, ac artificio sibi soli intellecto, exsequitur. 66.
- Genista Sal. lixiviosum in Hydropoe quare commendandum. 109.
- Genu in Podagra irregulari quomodo adficiatur. 100.
- Glandulae Mesenterii, in Infantibus, ex Purgantium frequentiori usu, sepe indurascunt; quod Strumae Soboles, & Morbi praesidium. 92.
- Glands, in Gonorrhoea virul. praeprius tumido, duro, si contigatur, Purgantia non juvant, nisi simul Emollientia adplicentur.
- Globuli & Argentum vivum plus mali, quam boni inferunt, in Ileo vtro. 7.
- Gonorrhoea Virulenta est stillicidium liquoris cujusdam seminis instar in initio diei flavescens ac si Viscum Ovi dilutum esset; in virulentiore viridescens, admisso saepe aequo humore sanguine tincto. 78. Morbi genus; quo a centum retro annis sese primum Lues Venerea manifestare solet, & per quam si virus suum ejiciat, Sanguinem infecti. ibid.
- Gonorrhoea Virulenta quomodo adoriatur & procedat. ibid. A virge carnosa substantia pyrum infecta quomodo exoritur. ibid. Hinc virulenta materia, ut substantiam glandis porosam, non per Urethram exillare ab Auctore visa. ibid. Si Serozum a motu violentiori vel a percussione materiae inflammantur, lenius procedit. ibid.
- Symptomata varia habet, ut Doloris sensum in erectione praesentim nolle, quod signum huius Morbi Pathognomicum; Incurvaturam penis a frigore contrahit, Ardorem Urinae; & ab erosa urethra Carunculas, plurimum malorum causam. ibid. confer. 80.
- diuturnior, vel adstringentibus suppressa, quomodo Luem veram producat. 78.
- si cum Lue Venerea confirmata concurrat, curata prius Lue, curanda venit. 80. Lue Salivatione sublata, quomodo Gonorrhoea tractanda. ibid.
- Salivatione non curatur. ibid.
- Curatur praecipue Cathartici, in quibus Curationis cardo vertitur; hocque tum ratio, sum experientia dicant. 78. confer. 79. Hydragoga praeceteris conducunt. 78. Singulo die, ad quatuordecim, vel plures, donec color materiae flavus evanuerit, continuanda. 78. 148. Si nimis cito relinquuntur, ichore adhuc manente, in summitate colicis adparente, minima occasione recidiva fit. 78. Si Purgantibus non cedat lenioribus, fortiora dentur. 79. Denique Balsamica. ibid. 148.
- Gonorrhoea virulenta Dietam refrigerantem quare exposulet. 78. Quales Cibus vetet; quales admittat. 79. 148.
- facile mutatur in Luem, si aeger a Cathartici abhorreat; vel si pertinaciter purgantibus refragetur. 79. Tumque V. S. & Clysmatibus succurrendum, licet non aequo tanto fiat. ibid. 148. Hinc vicissim exhibenda sunt Cathartica, cum Enemata. 79. Qua Methodo hoc fiat. ibid. confer. 79. 148.
- V. S. in sanguine quando exigat. 79. Aquas Minerales non admittit. ibid. Adstringentia insemperativa vetat. 78. 79.
- ex Decoctis Lignorum exsiccantium plus mali, quam boni imperit. ibid.
- A Gonorrhoea virulenta, qui purgantur agrius, difficilius curantur. ibid.
- In Gonorrhoea virulenta, qui ichor, mane praesertim guttatim adparet. vid. Ichor in Gonorrhoea virulenta.
- Goodall (Carolus) M. D. Auctoris in Curatione comes, qualis fuerit. 39. Auctori Calum singulariter communicat. 88. Auctorem semper tutatus est, ibid.
- Guttæ D. Goddard, & D. Goodall quae parantur, ceteris Spiritibus volat. praeferenda. XII.
- H.
- HABITUS totus corporis mutandus, & refrigerandus; in Podagra Curatione, datur. 103.
- Haemoptoe ejusdem indolis cum Haemorrhagia Narium Auctori habetur. 37. Cum nominis Discrimen modo pendeat a loco, per quem Morbus sibi viam facit. ibid. Quo sensu Febris adnumeranda. ibid. Febris quoque est, quae Nomen habet a crisi, qua soluta fuit. ibid. Quos & quando praecipue invadat. ibid.
- curatur iisdem ac Haemorrhagia Narium, excepta Cathart. ibid. 150.
- in Variolis 16. 130. 146. Ejus Curatione. 130. 146.
- & Mictus Sanguineus, in Variolis, mortem certo praenuntiant. 16. 19.
- Haemorrhagia Narium, describitur. 37. 150.
- tamquam Februm Continuarum Symptoma, unde. 6. Et quomodo tractanda. ibid. Quo sensu Febris adnumeranda. 37. ut plurimum, in initio, praese fert indicia, quae sibi per Nares viam facit. ibid. In Variolis Phrenitidem levans; V. S. indicat. 19.
- quomodo curetur. 37. Remedia Interna. ibid. 150. Externa. 37. 150.
- in Febris non semper sistenda, verum saepe permittenda; & quare. 6. Sistenda vulgo, in Febris Continuis, cur sepe non minus juvent, quam si gladio ignem extinguere satageremus. ibid. In Variolis pessimis Virioli Spiritus usu, in Cerevisia tenui, coercita. 31.
- recidivam singulis annis minuitur, si modo aetuer corpus. 37.
- In Haemorrhagia Narium Cathartica quondam exhibendum. ibid.
- aequae ac Haemoptysi, calor & dolor sinciput torquent. 37. 150.
- Haemorrhagia quolibet immodica, nisi, ea sedata, Purgatio Leniens exhibetur, recurrere solet. 6.
- Haemorrhagiae Hystericae Adf. sepe invitant, ubi contrarium foret, si ejus fomes in materia aliqua involveretur. 91. confer. 90.
- Haemorrhoidales Venae, in Podagra irregularis Paroxysmorum intervallis, dolent. 100.
- Haemorrhoidum Dolor & Curatione. 149.
- Fluxus immodicus. ibid.
- Halitus Magni Hystericae Adf. non sunt causa. 91.
- Putridi, in Variolis Discretis, a materia purulenta prodeuntes, circa finem, Pustulis crustosis retropelluntur. 18.
- Haustris Emeticis. 4. 141. 143.
- in Febre Quartana, languentem sanguinis depurationem promovens. 10.
- in Haemorrhagia, Sanguinis impetum sistens, in Febris Continuis. 6.
- in Mictu cruento, unus & aliter. 88.
- in Pleuritide essent, refrigerans, post V. S. exhibendus. 35. 144.
- Pare-

— Paregoricus in Cholera, post ablutionem Stomachi. 38. Forsior ubi necessitas urget. 147. In Cholera, An. 1676. 39. In Choreia Sancti Viti post Cathartismum. 113. 146. In Colica biliosa. 26. In Diarrhoea. 23. 147. In Dysenteria ex Terminibus ventris, in Febre Nova Epid. oborta. 114. In Febre nova hiemali, post Cathartismum. 112. Post Emeticum in Febris Continuis. 4. 143. Et Emmenagogus in Lochiorum suppressione. 95. Ad Tussim in Morbillis. 25. In Phrenitide. 6. In Podagra inveterata Paroxysmo, ubi Mortis metus ex recessu materia. 105. In Variol. Regul. Conf. exhibendus, post plenam Eruptionem. 18. In Variol. Anomalis. 31. In Variolis Conf. sexto die exhibitus. 88. In Variol. pessimis. 31. Post V. S. in Mictu, vel Sputo sanguineo in Variolis Conf. 120.

Hauftus Purgans in Colica Biliosa, ex quibus fiat. 26. In Dysenteria. 23. In Gonorrh. virulenta, plurimum conducens. 79. In Ilco vero. 7. Peripneumonia notha. 36.

— ad Vomitus compescendum, in Corticis Peruviani usu. 41.

Herbæ Amarae & acres, ad Podagram utiles, qua cautione usurpanda. vid. Vegetabilia ad Podagram.

— Excalescentes, ipsa hieme, calorem æstivum Sanguinis communicans, 102. Si æstase usurpantur, præcaventur mala, quæ a tempestate pendunt; alias sepe nimis sero veniunt. ibid. In Chronicis æque ac Podagra, maxime ægrorum commodo adhibeantur; hac cum differentia, quod in Chronicis Cathartici sit præmittenda. ibid.

Hieme exeunte, Podagra Paroxysmus invadere solet. 100. confer. 99.

Hiems rigidissima An. 1683. ut nemo non viventium illi parem, vel frigoris gradu, vel temporis tractu, viderat. 112.

— Dysentericis contraria. 21. 25.

Hiems Morbos Chronicos potius gignit quam æstas. 102.

Hippocrates laudatus. 1. In Medicinæ bonum quid præstiterit. VIII. De Methodo medendi laudatus. 42. confer. IX. Medicæ Artis Bæso quidnam posuerit. ibid. Quamnam habuerit Theoriam. ibid. Eos reprehendit, qui plus Speculationi, quam Naturæ iudicio, h. e. Observationibus Præcticis, sive Phenomenis Naturalibus, ut & Juvantibus & Lædentibus, dare solent. 108. Quomodo intelligendus, ubi, in Libro de Præfca Medicina, ait, quod, quæ de Natura a Sophistis dicta aut scripta ad Artem Medicam minus spectant, quam ad Præfiam. ibid. De Morbis Chronicis laudatur. 77. Ubi in Ilco Folium usum, & in Cancro nihil agendum præcipit, non minus de Melitina meruit, quam si pomposius Remediis omnia implevisset. XII.

— Combustionem, in Podagra, opæ Lini crudi, ad dolorem mitigandum jam instituebat, uti in India Orientali per Moxam, nec non in Europa, hodie facere solent. 106.

— Variolas non cognovisse videtur. 31.

Hippocratis & Veterum Aphorismi, de paranda materia Febrili ad Crisin per Sudores, Febris seu Morbis Intercurrentibus accommodari nequeunt, sed aliis. 33.

Hirudines, in Febre nova Epidemica, Infantibus applicande. 92.

Historia Morbi alicujus si diligenter persecta habetur, par malo remedium adferri potest. IX. Sola veram medendi Methodum indicare potest. 42. 43.

Historia Morborum ad Praxin quam utilis. IX. Hæftenus in Sylvam immentam, sed fructu perexiguo, quare excreverit. VIII. Adcurata deficit hæftenus, quia Symptomata haberi solent confusi Naturæ, de suo statu defecte, effectus, quæ vix adnotatione digna videntur. IX. Ubi describenda, ad plura advertere venit, quam vulgo putatur. VIII. Quæque ad Quatuor reducuntur Capita. ibid.

— Genuina ubi tradenda, 1. Morbi omnes ad definitas & certas species revocandi: 2. Hypothesibus sepositis Morborum circa Phenomena, ac Naturalia utcumque minuta, adnotentur: 3. Phenomena naturalia seorsim ab Accidentalibus enarrantur: 4. Anni tempestates huic illius generi faventes observande. VIII. IX.

— Acutorum, ab Auctore, non tam ut metam figat, quam ut aliis animum addat, traditur. XII.

— Hyæricæ Adfect. quare difficulter describenda. 90.

— Naturalis pessime tradi solet, ut docet Verulamius. VIII.

— Variolarum vera, earumque Methodus medendi, describenda, ex quonam Genere barum fieri debeat. 15.

Historia Singularis, seu Casus, Viri Cholera An. 1676. laborantis. 39. Baronis Annesly Colica biliosa laborantis & Narcoticis solis ab Auctore curati. 27. Pauperis Colica biliosa doloribus vexati, Equitatione sanati. ibid. Viri Hypochondriaci, tandem Diarrhoea colliquativa correpti, diuturna Equitatione perfecte curati. 93. Viri a Dysenteria acuta Constit. 1669. Methodo Auctoris curati. 23. Viri, Dysenteria Constit. 1669. ad 1672. laborantis, & Methodo Auctoris, initio Constit. instituenda, curati. ibid. Fœmina Dysenteria inveterata laborantis, & curata. ibid. Juvenis Febre Acuta violenta, cum Petechiis & Mictu Sanguineo, An. 1681. laborantis, per D. Goodall. Auctori communicata. 88. Comie Salisburyensis Febre Dysenterica laborantis, & curati. 24. Juvenule Febre Dysenterica laborantis, Dysenteria jam prius adfecta, & curata. ibid. Pueri, Febre Epidem. An. 1674. laborantis, Auctoris Methodo curati; Et a Comate vel stupore, quo laborabat tempore restituti. 29. Domine Febre Epid. An. 1675. laborantis, & Dejectionibus Symptomaticis adfecta, Methodo Auctoris curata. ibid. Pueri Febre Epid. & Pleuritide Symptomatica. An. 1675. laborantis, & Methodo Auctoris curati. 32. Fœminæ nobilis, mortua ex Febre maligna, Pestem Londinensem An. 1665. prægressa. 13. Juvenis, Febre maligna laborantis & post V. S. tantum validiore facta. 115. Juvenis Febre Pestilentiali laborantis, defætu Phlebotomia copiose, defuncti. 14. Juvenis Pestilentiali Febre laborantis, in quo leni excitato madore, Medicamenta diaphoretica, illico retinebantur. Medici Morrice, Febre Variolosa laborantis. 20. Hydropicæ ex incarceratione, ab Auctore curata, notatu digna; tum ob copiam aquarum, quam diu non passa, de novo eadem habuerit. 108. Hydropicæ, initio Auctoris præceps, ipsius cura commissæ, & Syrupu Spinae Cervinae curata. 107. Hydropicæ Syrupi Spinae Cervinae opæ pejus habentis. ibid. Viri Hypochondriaci Colica, ad Iliacam accedente, cum Urina limpidissima, laborantis. 90. Viri Hypochondriaci flentis immodice. 91. Comitissæ Adfectu Hyærico, Calculum Vesicæ simulante, laborantis, Narcotico curata. 27. Viri ab Ilco, Auctoris Methodo curati. 114. Fœminæ, cui, Lochiis ex Hyærica Adf. suppressis, Auctor postquam sua Methodo nil profecerat, nulla Remedia amplius adplicuit; atque Muliercularum tum consilio, V. S. in pede instituta, interit. 94. Maniæ ex temperamento frigido, & infirmiore. 11. Fœminæ Morbillis, calefacientibus exasperatis, laborantis, Methodo Auctoris curata. 25. Infantium Morbillis An. 1674. egrotantium, & curatorum Methodo Auctoris. 30. Viri, Mercurio sublimato corrosivo adsumpto, solo Aquæ, per superiora & inferiora injectæ, usu, ab Auctore curati. 43. Chirurgi, Venæ sectione audaci ac liberali, in Castro Dunstar, Milites a Peste sanatis. 13. Pharmacopolæ Rheumatismo laborantis, & Dieta ex sero lactis absque V. S. curati. 43. Pueri Variolis Methodo Auctoris, & Læto nempe eximendo, & Paregorica exhibendo, restituti. 87. Fœminæ nobilis Variolis Anom. nigris, Conf. 1670. laborantis, & Mensium profluvio tempore infolito adfectæ, Auctoris Methodo felicissime curatæ, miscescente adeo Morbo, ut nec delirium adfuerit, & nigredine quasi depulsa, in flavedinem potius abierint Crusta. 26. Filii Auctoris Variolis Anom. distinctis laborantis & Methodo Patris restituti. ibid. Infantis Variolis Anom. nigris Conf. 1670. cum Vesiculis in femoribus pessimi ominis, laborantis & extincti. 25. Infantium Variolis nigris pessimis laborantium. 31. Juvenis Variolis nigris pessimis, post computationem lægiam, laborantis. ibid. Juvenule ex Variolis insigniter confluentibus, undecimo die extinctæ, primum V. S. sepe iterata a Rheumatismo sanata. 85. Juvenis a Variolis Confluent. Methodo Auctoris, integro ibi deducta, sanati. 87. 88. Juvenis Variolis Regular. laborantis, qui mortuus adstantibus visus, nudus mense imponitur & resurgit. 19. Variolæ ex Syrupu de Meconio pessime habentis, sed Laudanum cum levamine ferentis. 92.

Homo variis malis obnoxius. 1. Ad ætatem suam pertingit spatium. 21. An. 7. Exterior uti conspiciatur ex partibus sensibilibus, & Homo interior datur, spiritualis fabricæ, rationis lumine tantum concipiendus. 90.

Hooping Cough seu Pertussis Infantum V. S. juvatur, plus quam ullis Præf. valibus. 24.

Horæ medicinales, pro Remediis adsumendis, quales 109.

Humores speciem quamdam contrahunt in corpore nostro, vel nimia in eo mora,

vel constitutione aeris morbosa, vel contagio venenoso; unde Eff. cum essentia speciei istius convenientibus, sive Symptomata singularia, producuntur. XI.

Hydragoga in Gonorrhæa virul. primaria sunt. 78.

— varia. 107. 108.

Hydrogala in Colica biliosa, pro Potu, vel Cerevisia tenuis. 27. In Dysenteria. 21. In Febre Scarlatina Infantum, ubi Convulsionem vel Coma. 34. In Gonorrhæa virulenta. 79. In Morbillis. 25. In Morbillis Anom. An. 1674. pro Potu. 30. In Tussi Epid. ubi Febris &c. adsunt. 32. In Variol. Anom. 30. In Variol. Anom. grata & utilis. 26. Præsertim tempore Maturat. ibid. In Variol. Anom. quatenus æstus fervidum temperat, Salivationem insuper promouet. ibid. Finito morbo. 31.

Hydropici Juniores, Aquis expulsi, aliquando roborantibus cur non indigeant. 109. Seniores, vel debiles, roborantibus, post evacuatæ aquas, opus habent. ibid.

— Tumores unum ex gravissimis Symptomatibus, Intermitt. Autumnales, diuturniores, infrequentibus. 8.

Hydrops omnem Etatem & Sexum infestat: Fœminas vero magis quam Viros. 106. 148. Tumore surarum mane evanescente, primo cognoscitur; præsertim in Viris; nam in Gravidis, vel iis quibus menstrua deficient, hoc fallit; & in Viris Asthmaticis, ab eodem derepente liberatis, itidem decipit. 138. confer. 148. Hunc subsequitur Abdominis Tumor, aquæ congestio plures sepe continens, a quibus Exomphalos. 106. 107. Qui vero Tumores Abdominis in Fœminis contingunt, ab excrecentia Carnium in Abdomine; vel a flatibus: præsertim in viduis, aut seronubentibus, & graviditatis idea ipsis imponunt, ad hunc Morbum non spectant. 107.

Hydrops Symptomata tria primaria habet; Dyspnoeam, Urinæ paucitatem, Sitim intensam. 107. 109. 148. unde hæc oriuntur. 107.

— ubi adest, pro rata, qua partes obfessa sunt, reliquæ gracile. seunt. ibid.

— necat, ubi Abdomine aquas non amplius continere apto, nobilia viscera & vitalem arcem ipse invadunt. ibid.

— pro Causa habet Sanguinem debiliorem: cujus debilitatis Causa præsertim V. S. nimia; vel Morbus quidam diuturnior; vel liquorum spirituosorum ingurgitatio. ibidem. Testes Fœminarum alio modo adficiuntur hoc Morbo. ibid.

— pro Causa proxima habet Aquas abundantes. 109.

— Indicationes Curativas duas absolvendæ ponit; tum Aquarum evacuationem, tum sanguinis roboris restaurationem. 107. 148. Evacuatio, prima Indicatio, quomodo persolvatur & quibusnam mediis. 107. 109. Purgantia quæ, & quando, eo inservientia. 107. ad 107. 148. Per Vomitus & Scæssum simul agentia. 107. 108. 109. Corroborantia loco Evacuantium, quando. 109. 148. loco Purgantium & Emeticorum, quæ & quando. ibid.

Hydrops non semper curatur, licet utrique Indicationi satisfactum sit; sed ad supremum gradum procectus, corruptis partibus, ætis subsidia spernit. 109. Curationem tamen adgredi debet Medicus, & quare. ibid.

— Aquis expulsi, media parte tantum curatus erit: hinc secunda Indicatio per Roborantia, tum persolvenda, ad novum proventum præcavendum. 109. 148. Juniores hoc auxilio sepe non indigent. 109. Perficitur iisdem, quibus in Podagra, paucis additis. 109. 148. Tum nullo modo purgandum. 148.

— Purgantia validissima & celerrima, præ ceteris omnibus Morbis postulat. 107. 148. Evacuandis ætæ xai xoto quibusnam in Casibus non tantum non juvatur, sed peior fit; verum, sanguinem ac viscera roborantibus, & aeris mutatione, ac exercitio, tractandus venit. 109.

— Purgantibus solis, non Vomitoriis, curandus venit, ubi collectio Aquarum non ingens. 108.

— qui vel Pedes tantum, vel etiam Ventrem, sed modice, inflavit, non statim per Cathartica & Emetica, sed calefacientibus & roborantibus curandus. 109. Et in eo casu cavendum ab omnibus Catharticis, quæ illico tumorem recedentem revocant. ibid.

— Liqueores tenues & refrigerantes cur non ferat, & e contra liqueores generosiores tamquam efficax medium admittat. ibid. Pro Potu concedit Vinum, ad roborandum; sed non adsumendum antequam meatus parum reclusi, & portæ aquis data fuerint. ibid. Cerevisia generosior loco Vini. ibid.

Hydrops Topica Medicamenta non plurimi facit. ibid. Unguenta & Cathartica, & Velicatoria præprimis, damnat. ibid.

— ibi incipit, ubi desinit Scorbutus, quomodo hoc dictum intelligendum. 36. 37.

— ex Febris Interm. Autumn. 10. Februm Autumn. Interm. Symptoma, unde enascatur. ibid. Juvenes raro obsidet, nisi Catharticis accersita. ibid. Si recens. Aperientibus & Catharticis facile curatur. ibid. 139. Cathartica vero ante discessum Febris frustra dantur: sed Antiscorbuticis expellitur. ibid. & 143. 148.

— Scorbutum quo sensu aliquando mentitur. 36.

— ex V. S. in Podagra mox a Paroxysmo. 101.

— ex subita Spiritus Vini interdictione, in aduetis, oriri potest. 36.

— Testium in Fœminis quid; & quomodo ab Humorum depravatione, ex Spirituum ataxia, in Hyærica Adf. diuturna, oboritur. 266. confer. 107.

Hydropicorum sitis quomodo fallenda. 109.

Hypercatarses sepe nata a purgationibus etiam lenitivis, quod Medicus non inquisiverit, utrum æger facile aut difficile expurgaretur. 107. A Purgantium violentia, hodie non metuuntur, cum Remedium hoc certissimum, Laudanum, habeamus. ibid.

Hypercatarsis insanabilis ab Unguentis purgantibus, abdomini illinitis. 109.

Hypochondriaca Adfectio in Fœminis Hyærica vocatur. 89. 90. 142.

— Splenis, & viscerum, Obstructioni imputata, in omnibus convenit cum Hyærica Adf. Uteri vitio adscripta. 89. Animi Pathemata atrocissima fovet. ibid. 90.

— quæ mala tum in Corpore, tum in Anima, excitet; vid. Hyærica Adfectio.

Hypochondriaci quomodo sine anima constituti. ibid.

Hypotheses speculationibus Philosophicis innixæ, quare omnino sint futiles: illæ vero, ex Phenomenorum naturalium & Practicorum Observatione nate, stabiles manent. 108. confer. IX.

Hypothesis Philosophica, quævis, in scribenda Morborum Historia, seponenda. ibid.

Hyærica Adfectio Chronicorum omnium, frequentissime occurrit, horumque pars media est. 89. Post Febris, Morborum frequentissimus. 84. In Maribus Hypochondriaca vocatur. 89. 90. 142.

— Uteri vitio ab Antiquis fuit adscripta: convenit in omnibus cum Adfectione Hypochondriaca, Splenis & viscerum obstructioni imputata. 89.

— Fœminas tamen multo crebrius quam Mares corripit; licet Uterus non peccet, ut voluit Antiquitas. ibid. Ratio hujus datur. 90. Fœminis paucissimis, nisi laboribus aduetis, parcat: Viros quoque sedentarios tentat. 89.

Hyærica Adfectio quomodo corpus male adficiat, & conquasset, adeo ut instar edis ruinas minitantis tantum non corruat. 87. 89.

— Animam adhuc magis egrotare facit quam corpus. ibid. Cujus Ægrotudo raditur. 89. 90. Delperationem de sanitate recuperanda soles in animum inferre. ibid. confer. 89. Animi Pathemata atrocissima fovet. 89. 90.

— Frigus cadaverosum parium externarum, Symptomata præcedens, sepe habet. 89. confer. 90. Et periculum non inferit, nisi ab evacuatione: enormi fuerit. ibid. 91.

— Diagnosin difficilem, præ ceteris quibuslibet Morbis, & perobscuram, habet. 89.

— Apoplexiam inducere potest; & in Puerperis magna Hemorrhagia passis, vel partu laborioso cruciatis, vel animo commotis, satis frequens. ibid. Calculum Renum aliquando & Vesicæ, exquisitè simulat. 27. Flatus excitare valet hujusmodi, ut Abdomen, tamquam ab Aquis collectis, intumescat. 109. Flatus jam Acidos, jam Nidorosos, & ventriculo eructare cur faciat. 89. Lacrymas nunc, nunc risum, sine ulla causa, excitat. ibid. 91. Lochiorum suppressionem cum diris & letalibus Symptomatibus, inducit. 94. Quomodo occurrendum. 94. 95. Podagram, in Fœminis gracilioribus adolescentibus,

- bus, vel constantioris etatis, aliquando mentitur; nam vetulas tantum vel viragines Podagra infestat. 100.
- Hysterica Adfectio Pulsum sanorum similem sistit, utus eger strangulati videatur. 90.
- Sudores nocturnos quomodo eliciat. 91.
- Urinam limpidam tamquam Pathognomicum signum habet, 89. 90. 142. Exemplum. 90.
- Salivationem Mercuriali similem, quomodo excitet. 91.
- varietate multiformi se ostendit, & nullum non emulatur adfectum. 89. confer. ibid. Pro parte corporis quam occupat, Symptomata parti competentia statim producit; adeo ut Medico sagaci opus sit, ne ista, a Morbo essentiali huius illiusve partis, pendere arbitretur. 89. 142.
- Caput externum occupans, Dolorem vehementem in quadam parte pollice regenda, Clavum Hystericum dictum, adfert, praesertim in iis, quae Chlorosis laborant. ibid. Quid sit iste Clavus, & quomodo fiat. 90. 142.
- Caput internum occupans, producit Apoplexiam; quae frequens in Puerperis; ubi sanguinis melsum amiserit, vel partu laborioso cruciata, vel passione animi commota fuerit. 89. Producit spasmos per similes Epilepsiae, qui Uteri strangulatus dicuntur, & describuntur. ibid.
- partem quamlibet corporis, siue internam, siue externam, adficere valet. 27. 89.
- partes externas, ut Crura, Humeros, Manus, Maxillas, Tibias, occupant, nunc Dolores, nunc Tumores excitat. 89. confer. ibid.
- Hysterica Adfectio Dentibus non parvis, quos, nulla alia causa concurrente, crudeliter adficit. 142. In Dorso dolorem vehementiorem aliquando excitat. 89. Intestina occupans Diarrhoeam excitat cum reiectione materiae viridis, sed sine dolore. ibid. Colicam biliosam imitatur, ubi partes Colo adjacentes occupat. 27. In Colon, & regionem Scrobiculi Cordis subiens, impetum faciens, dolorem, similem Iliacae Passioni aut Colicae biliosae, infligit, cum vomitu enormi; subsequente dein Ictero, Paroxysmum quasi solvendo; accedente desperatione de recuperanda sanitate. 89. confer. 90. Fit praesertim in laxis, crudisque habitu, vel quae Fetus grandiores sunt enixae. 89. Hic Adfectus docet Morbum ex ἀταξία Spirituum ortum. 90. Pulmones obsidens, Tussim Hystericam excitat, non adeo tamen frequentem, & pituitosas exagitantem. 89. In Renes incurans parvis dolorem; Nephriticum Paroxysmum omnino mentem, ut vix an a Calculo, an ab hoc Morbo sit, nisi aliquando Vomitu materia viridis, vel nota adfectione animi, distinguantibus, dignoscatur. ib. Venter adficiens Vomitiones excitat, reiecta materia viridi, sed sine dolore. ibid. Vesicam adficiens Calculum emulatur. ibid. in Vitales partes incidens Cordis Palpitationes excitat, praesertim in macilentis, vel Febre alba pallescentibus. ibid.
- ubi discesserit a parte adfecta, tenebritudinem in ea relinquit, ac si ipsa verberibus fuisset perita. 27. 89. 142.
- Hysterica Adfectio, siue Vaporum, siue Convulsionum particularium partium, ratione agat, eodem modo solvuntur Phenomena; & pro parte quam occupat Symptomata, isti parti accommodata, parit: unde plerisque Morbos homines vexantes simulat, quamvis sua Natura, unus idemque Morbus sit. 27.
- in Materie viridis, Bili Poraceae similis, excretionem, tam vi quam odor, agros saepe incitat. 90. confer. 89. 90. Hoc tamen, Morbum in humores, horumque acrimonia, residere non magis indicat, quam Vomitus per similes, navigantibus in irrequieto mari, vel Infantibus in Paroxysmis Convulsivis, supervenient, illud indicaret. 90. Nec magis sequitur quod viride est acie esse, quam quod acie est viride esse. ibid. Hysterica & Hypochondriaca Adfectio non a Menstruo sanguine, aut semine, corruptis, halitus excitantibus; nec a Succorum depravatione; nec ab humoribus acerbis, enascitur. 91. Quod si verum esset Purgantia, Vomitoria, Haemorrhagiae & alia, quae Morbum inuicant, potius eum fugarent. ibid. confer. 90.
- Causas Procatarticas, seu externas, agnoscit, α. Corporis & animi motus vehementiores. ibid. Sic & in Puerperis tenerioribus, nimis cito e lecto surgentibus, invitat. 94. β. Stomachi vacuitatem ab inedia. 90. Quae & a Carnium abstinentia saepe invitat. 91. 105. confer. 91. Unde & Carnium usus hocce Morbo adfectos restaurat. ibid. γ. Evacuationes nimias, siue Sanguinis, siue humorum per Emetica vel Cathartica. 90. Sic a Sanguinis iactura ingenti, corpus debilitante, excitat. 108. Item Purgantibus allicitur. 109. 108. Sed violentius Vomitoriis advocatur. 109. Si vero Morbi fomes in aliqua involveretur Materia, tum Evacuantiis, ut Haemorrhagiis, V.S., Purgantibus, Emeticis, non invitat. sed contrarium foret. 91. confer. 90.
- Hysterica Adfectio ex Uteri proidentia, post partum laboriosorem. 95. Quomodo curetur illa Proidentia. ibid.
- Causas Προγενεας seu internas efficientes ex ἀταξία Spirituum Animal. in hac illamve partem, nimia copia, & nimio impetu, ruentium, unde tum Symptomata producantur, deducit. 90. confer. 94. 27. Et quod ab huiusmodi inordinato motu, potius quam ab humorum aliquo vitio, licet ipsos inficere valeat, producat Morbus, Causae occasionales probare videntur. 27. 91. Et Argumentis pluribus firmatur. 90 ad 91. Istius ἀταξία originaria causa debiliior evasit Sanguinis. 93. Et praesertim debiliior crasis, siue nativa, siue adfectiva, Spirituum; unde facile dissipantur aut perturbantur hi. 90. 91. Eorum systemate fracto & debilitato. 94. 108. 115. Et hinc Hystericae febre omnes de subsidencia Spirituum congenerunt. 89.
- ex Spirituum debilitate, non nativa, sed adventitia, oritur, si Mensum fluxus fuerit immodicus, siue in Puerperio siue extra. 95. Quid agendum si in Puerperio. 94. 95. Quid si extra illud. ibid.
- Hysterica Adfectio diuturna Humores corporis inficere valet, licet ipsa ex iis non immediate pendeat; eodem modo ad Quartanadiuturnior. 91. Et quoniam Morbi ab hac humorum depravatione. ibid.
- periculo per se vacat, nisi perversa cura exasperetur. 27. Hinc non letalis sua Natura, sed vi malorum subsequens, aliquando necat. 94.
- curatur, imminuendo prius humores vitiatos diuturnitate Morbi, si agri vires concesserint; sum corroborando Sanguinem, quae praecipua est Indicatio: sed si Symptomata, ut Dolores, Vomitiones, Diarrhoea urgeant, nec inducias ferant, Anodynis sopiendum, priusquam aliquid peragatur. Symptomata leniri solent mediis, fastida exhalatione Spirituum impetum reprimantibus. 90. 142.
- V. S. & Catharsin quando exigit. 91. 142. Chalybem, quandonam expositules, & qua ratione hie adsumatur. 92. 142. Theriacam Andromachi non denegat pro roborando. 93. 142. Corticem Peruvianum auxiliatricem novis. 93. Foetidis quomodo delectetur; quoniam illa sint. 143. 93. Clysterum frequentem usum renuit. 32.
- Chalybe si curari nequit, Aquae Minerales addeunda. 93. 142. Quae si necdum juvant, Aquis Sulphureis calidis utendum. 93. 142.
- Lacte solo, omnibus aliis frustra tentatis, saepe curata fuit, in semperamento bilioso ac tenui. 92. 142.
- Hysterica Adfectio levior, sine V. S. Catharsi, Chalybe, sed solis Pilulis Hystericis, saepe curatur. 92.
- extra Paroxysmum quomodo tractanda, ut causa originaria occurratur. 90. 93.
- in Paroxysmo quomodo tractanda. 93. 94. 142.
- Hystericae aliquando ita abhorrent a Medicamentis Hystericis, ut ex iis in vitae periculum conjiciantur: quae sum omittenda. 92.
- In Hysterica Adfectionis Curatione quibusnam Formulis Remediorum usus fuerit Auctor. 92. 142. 143.
- Hysterico Morbo Adfectum Classi Rheumatismus Scorbuticus fere referendus videtur, nisi ipsum remediis Hystericis minime cessasse comprobatum fuisset. 93.

I.

- Alapa vix in Gonorrhoea Virul. saepe sola Pauperibus profuit. 78.
- Ichor in Gonorrhoea virul., qui mans praesertim, urina ardore & stillicidio disparentibus, in summitate colis, digito compressi, guttatim adparet; non est a debilitate, ut vulgo putant, sed a reliquiis contagii, minima occasio, uti post nimiam potationem, exercitium validius, novas traxerat excitationibus. ibid.
- in Variolis Confli. loco Puris, si sanguis exstet, adparet. 86.
- Icterus ex Colica Hysterica, nullis Catharticis, vel solo Rheobarbaro, curandus; & quare. 27. Si persinaciter adhaereat, quomodo curandus. 28. 148.
- Icterus, a lecto, nimis quam par est, abstinendo, in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. aliquando, sed raro, & in declinatione Morbi, oriebatur; hinc sum potius lecto desumbat eger; & quare. 29.
- ut curetur. 28. 148.
- Idiosyncrasiae in Adfect. Hyster. Curatione, ratio habenda. 93.

- Ignis Sacer qualis Morbus apud saniores Medicos. 22. Fere ut Pestilentia invadit, ibid.
- Latinorum, Pestis imago non obscura videtur. ibid. Suspectus de malignitate Auctoribus, ut ex methodo tractandi liquet. ibid. A Peste quomodo differat. ibid.
- Natura ope discutitur in corporis partem quamdam externam, specie Tumoris (vel eo deficiente macula rubra Rosa dicta) ad alas & inguina, haud secus ac in Peste, sicque solvitur Morbus critice. ibidem.
- Ileus seu Iliaca Passio quid sit, & quomodo fiat ex Intestinorum inverso motu. 7. 146. Huius Inversionis causa duplex; vel Obstructio scilicet; vel Irritatio. ibid.
- duplex ponitur, verus scilicet, tum Iliaca Adfectio notha. ibidem.
- Ileus verus tamquam Febrium Continuar. Symptoma, quomodo excites. 7.
- totius tractus Intestinorum, a Ventriculo, choream ducente, ad majora Intestina usque, inversam motum ponit. ibid. Hinc Clysteres per Os reficiuntur. ibid.
- Ileus verus habetur Sydenhamo, qui ex humoribus acerbis, primo Ventriculum invertentibus, nascitur. ibid. Eum curandi Methodus nulla fere cognita Auctori habebatur. ibid.
- qua Methodo ab Auctore tractetur. ibid.
- ex usu Argenti vivi & Globulorum, plus mali quam boni accipit. ibid.
- Colicam biliosam insequent. 26.
- a Calefactibus, in Febre nova Epid. quomodo excites. 114. Non ut de Torminibus ventris distum (ibid.), tractandus ac ipsa Febbris: nam ultra unam V. S. progredi nequit Medicus, & Cathartica Emetica fiunt. ibid.
- hicce curatur, si post V. S., Clystera ea fumo Nicotianae exhibeatur, tamquam optimum. ibid. Quo non juvante Purgans fortissimum exhibendum. ibid. Sublato morbo, quamdiu a Purgatione abstinendum. ibid. Paregorica quando exhibenda. ibid. confer. 147.
- In Ileovo primo, erit corroborandus Ventriculus, quam exhibendum Catharticum, quod alias Emeticum sit. 7. 26. 147.
- Capulus vivens nudo ventri quamdiu accumbendus. 7.
- Iliaca adfectio Notha vocatur Sydenhamo, illa, quae ab Obstructione sit; quia in hoc casu motus contrarius ingestorum, potius, quam intestinorum, est habendus. ibid. Non totius Intestinorum ductus, sed illorum tantum, quae supra sedem Obstructionis sunt, inversionem ponit. ibid.
- ab Hysterica Adfect. in laxis & crudis habitu, vel factum grandiore enixit, Ictero quasi solvitur, subsequente desperatione de recuperanda sanitate. 89. confer. 90. Hic adfectus docet Morbum ex ἀταξία Spirituum ortum. ibid.
- In Iliaca Passione Cathartica Medicamenta in Emetica transeunt, nec non E. nemata. 7. 26. 147.
- Imaginationis laese per Cardiacam restituta Exemplum. 11.
- Indicationes Curativae bonae, ac certa, non ex Speculatione Natura principii corporis, sed ex observationis exquisita παρρησία Morborum, & eorum quae ex Juvantibus & Ludentibus sequuntur, tum & Remediorum, atque Medendi Methodi, qua utimur, tandem in se diligenter collatorum, petuntur. 108. Hinc ad Phenomena Naturalia Morborum diligenter advertendo, maxime eliciuntur, & vera. V. Adeoque Symptomatum peculiarium perceptione, deprehenduntur. VIII. Et quidem ex minutissimis Morbi circumstantiis. IX.
- ex Causis conjunctis & proximis, quae sola a nobis cognosci possunt; non ex remotioribus, quae inscrutabiles, sunt mutuanda. XII. Quod demonstratur. ibid. confer. ibid.
- genuinas plus praestit solertes veros Medicos expiscari, quam Remediis excogitandis inhæere. XV.
- Indigestio illa Morborum Chronicorum quid sit, in corpore ipsam considerando. 102. Quod Argumentis stabilis. ibid.
- Humorum Podagra primaria causa. 100.
- Infantes Convulsi Materiem biliosam vividam, similem isti Hystericarum, & vix xai xoto rejiciunt. 77.
- Infantes Convulsi Corticem Peruvianum quomodo adsumere possint. 41.
- Evacuantiis vexati quomodo restaurandi. 91.
- Febre, siue Tertianae Autumnali, siue Quartana, laborantes, sanguine depuratione sua defuncto, sponte sanantur sepiissime. 9. Et senelli de Febre Quartana in euneis saepe triumphans jacet. 8.
- Purgantibus, in Tumore Abdominis, saepe repetitis, quamplurimi interempti. 92. Huius Tumoris, & duritiei, medela, per Linimentum. 10.
- ubi Spasmi corripiuntur, qui a densatione non amplius procedere possint, de Variolis, Morbillis, aut Febre Scarlatina, cogitandum. 86. 145.
- in Variolis multum dormiunt. 87.
- Confli. quali sustentantur Dieta. 18.
- Diarrhoea adficiuntur, uti Salivatione Adult. 16. 18.
- Diarrhoea tamen non ita certo ac Salivatio discruciat. 16. Licet certo satis. 18. 145.
- Discretis eruptis, Epilepticis Paroxysmis ubi adficiuntur, semper Variolas boni moris, & majores, indicantur. 15. 145.
- Sudoribus, ut Adult. nequitam venantur. 15. 145.
- In Infantibus V. S. aque tusa, & necessaria, aliquando est, atque in Adult. 25.
- Inflammati Tonfillarum. vid. Tonfili. Inflamm.
- Inflammati specialis Variolas constituit. 16.
- Inflammati in Variolis, in interstitiis Pustularum, octavo die incipiens, bonum; si cito recedit, malum. 15. 16.
- Infusio Croci Metallorum, in Hydrope, praesentissimum Medicamentum, in iis, qui agere purgantur. 107. Ad quam dosin exhibenda & iteranda. ibid. ad 108. confer. ibid. Quomodo operetur. 107. Quoniam ipsi Purgantia nonnumquam, & quando, admiscenda. ibid.
- Infusum Corticis Peruviani, cum Vino Rhen. 41. 143. Huius Zjv. Corticis in substantia drach. unius viriditatem continet. 41.
- Rad. Serpent. Virgin. contra Tertianas, cum Vino albo. 143.
- Ingravidatio saepe habetur, quod nisi nisi vel Carneae excrecentiae in Abdomine, vel Flatus distendentes, praecipue in viduis, vel sero nubentibus, sunt. 107.
- Injectiones in Gonorrhoea virul. praesertim acies, ab Auctore non commendantur. 79.
- Inquietudo, in Variolis Discretis, & Vigiliis, Phrenitidem minitans. 18. Paregorica ibi indicantur, & juvant. ibid.
- Infantia ex Lochiorum suppressione, ab Hysterica Adf. in Puerperis teneris, nimis cito surgentibus. 94.
- Intercurrentes Febres. vid. Febres Intercurrentes.
- Morbi Acuti. vid. Morbi Sporadici.
- Interstitia Pustularum, in Variolis Discretis, die octavo, inflammantur, & colorem Rosarum Damascen. emulum exhibent; si e contra albescent, malum. 15. 16. confer. 31. 145.
- Intumescencia Faciei & Manuum in Variolis, frigore nimio decedit. 31.
- Faciei ac Manuum in Var. nigris pessim. 1674. itidem salutaris. ibid.
- Inunctio in Lue Venerea ad Salivationem excitandam, ex quibus & quomodo, at quamdiu, fieri debeat. 79. 80.
- Juliapa refrigerantia Salivationem in Febre Variolosa inferunt. 19.
- Julapium in Apoplexia. 146. Cardiacum. 141. Roborans in Choreae Sancti Viti. 114. 146. In Dysenteria, Cardiacum. 22. In Febre hiemali. 110. In Febre Tertian. dupl. corroborans. 9. In Febre nova Epidem. unum & alterum. 113. Ex Cortice Peruv. in Febre nova Epid. pro Infantibus. 114. Ex Cortice Peruviano pro Infantibus in Febre Intermit. 100. Diaphoreticum in Pestilentiali Febre. 14. In Febre Contin. Variol. 20. In Haemorrhagia Nervium quale debeat esse. 38. In Hysterica Adfect. 92. Cardiacum in languore Febrii. 5. Ad Lochia suppressa ex Hysterica Adf. 94. Adstringens in Menstruum Fluxu immodico. 95. In Mictu cruento. 88. Adstringens in Mictu sanguineo in Variol. Confli. 131. Perlutum. 141. In Pleuritide. 35. In Pruritu ferino. 37. In Rheumatismo refrigerans & incrassans. 36.

Juniores aetate Febrem Quartan, quomodo ferant. 87.
Juscula Avenacea omnibus anteposita Auctor. 5.
— & Hordeacea in Lebr. Contin. ibid.
— in Variolis Confl. 87.
— farinosa non cornea in Morbillis conducunt. 25. In Morbill. Anom. An. 1674. commendanda. 30. In Rheumatismo proponuntur, carneâ rejiciuntur. 36.
Juscula in Dysenteria, ex Ovinis carnibus. 22.
— in Febr. Tert duplici qualia exhibenda. 9.
Jusculum in Cholera Morbo. 21.
— Avenacem in Podagra non regulari tempore Paroxysmi commendatur. 105.
— in Podagra, idem fere prestat, ac Lactis solius usus. 103.
Juvenes Athletico habitu, & Sanguinei, in Febribus, illico Venæ-sectione, ne periclitentur, indigent. 4.
— diuturno morbo confecti, Pueri, Senes, Venæ sectionem in Febribus vetant. ibid. Et quare. ibid.
— Hydropem sibi, ut Febribus Autumn. usu nimio, & inconsulto, Cathartico- rum, accersere possunt. 10.
— Podagra genuina non adficiuntur; licet qui ex Podagricis nati, illa aetate aliquid præsentiant. 101.

K

D. K Endrink Auctori amicissimus. 95.

L

L Ac Cerevisiatum, vid. Zythogala.
— crudum tepidum, in Dysenteria quando exhibendum. 23.
Lacrymæ ex Hysterica Adf. sine ulla sepe causa. 89. Etiam in Viris. 91.
Lactea Diata in Hysterica Adf. quando usurpanda, in temperamento bilioso & tenui; & ubi Narcotica sepius repetita; ubi recidiva fit Colica Hyst. non amplius juvant. 93. In quibusnam non conducas. ibid. In Podagra 103. Quare ratione magis obest quam prodest. ibid.
Lactis Natura & Proprietates, respectu Nutritionis & inflammationis. 93.
Lactis serum. vid. Serum Lactis.
Laudanum nimis repetitum Digestiones vitiat, & Functiones naturales debilitat. 94. Ubi frequentius exhibetur, intra singulas doses, solum spatium intersciendum, ut quid prior præstiterit, ante noscamus, quam aliam repetamus. ibid. Ejus Usus non immediate Nervis nocet. ibid.
— ad Corticis Peruviani vim purgativam sistendam. 40. In Infantibus. 41.
Dysenteriam ex Terminibus ventris, in Febre nova Epid. obortam celerissime, & certissime, sistit. 114. In Dysenteria Epid. prius Evacuaciones instituenda. ibid. In Hypercatharsi, a nimia purgatione, certissimum est Remedium. 107. In Hysterica Adf. Paroxysmo, ubi dolor urget, quam cum circumspectione exhibendum; & an ipsi Evacuaciones præmittende vel non, & quando, 93. 94. confer. ibid. 142. Ubi Vomitus enormis, illico exhibendum, pro ratione Symptomatis. 94. Exhibendum semel, continuandum in ejus usu, donec excitato Symptomate revocetur. ibid. In Nephritico Paroxysmo post V. S. & Enema. 132. In Podagra inveterata, si dolor intolerabilis. 106. In Podagra inveterata Paroxysmo, ubi Mortis metus ex recessu materia. 105. Podagra Paroxysmum a Purgantibus oborturum reprimis: Quod Auctori in mentem nondum venerat, dum Tract. de Podagra scripsit. 131. Ad Vomitus compescendum in Corticis Peruviani usu. 41.
Laudani liquidi Auctoris descriptio. 23. Quare aliis formis sit præferenda. ibid. Hujus guttæ xvj idem valent ac Syrupi de Meconio 3j. 87.
— In Infantibus dosis. 86.
Laudanum liquidum, ad Diarrhoeam in Salivatione Mercuriali. 80. In Variolis ad Epileptic. adfectus Infantum. 86.
Laudano liquido Auctor tandem anteposuit Syrupum de Meconio, in Variolis. ibid. Laudanum liquidum tamen propinandum, si Syrupi frequentior usus nauseam creaverit. 87.
Laudanum solidum Londinense, quare anteposuit Laudano liquido, & Syrupum de Meconio. 131. Illius dosis. ibid.
Lecti calor non prodest in Usu Corticis Peruviani pro fuganda Febre. 106.
— Febres Intermittentes in Continuum speciem transmutare valet. 40. 41.
— Et Corticis Peruviani salutarem effectum turbat. 41.
— nimius in Febre Erysipelatosa rejicitur. 37.
— quomodo sanguinem exagitet, & in caput mistat. 113.
— in Variolis Morbum ferocem reddit. 86.
Lectio in Angina quotidie abstinere quare debeat æger. 38. In Comate Febrili abstinendum, vel cum vestibis incumbendum. 113. In Hæmorrhagia Narium, quotidie per horas aliquot abstinendum. 38.
Lectio Defixi ægri, Febribus continuis laborantes, post Purgationem adsumtam, non amplius detineantur. 5. Ex eo surgendum quotidie in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. & si debilitas vetas, vestibis indutus, ei incumbendum, capi, se elato. 29. Si nimis tamen abstinere, præsertim in declinatione Morbi, quid fiat. ibid. Hinc caveant, ne nimis pro una vice surgant. ibid. In Febre seu Nova Epidem. incaverandi ægri: Non sine periculo etenim detinentur in eo. 112. confer. 111. ibid. Miliæ eruptiones exinde nascuntur. 112. In Febre Scarlatina perpetim non adfigatur æger. 34. In Febre Variolosa non continendus æger. 20. Licet Sudoribus æger vexetur. ibid. Fæmina illico addicenda simulat Lochia suppressa. 94. In Mictu sanguineo abstinendum. 88. In Morbillis quando & quandiu æger adfigendus; non tamen præter modum restus sit. 25.
— in Morbillis An. 1674. addicebantur. 30. Indefinenter adfigi, præsertim astate, in omnibus Morbis inflammatoriis, per V. S. & Refrigerantibus, curandis, nocuum. 25. In Phrenitide instante, vel jam calefacientibus invitata, in Febre nova Epidemica, abstinendum, vel cum vestibis decumbendum. 113. In Pleuritide quotidie, pro Viribus, eximendus æger; quod plurimi momenti, quin alias Medicamenta vix proficiant. 35. In Pleuritide, præsertim astate non continendus æger. 25.
Lectio in Rheumatismo. præsertim astate, non continendus æger. ibid. Sed aliquot horis de die abstinendum. 36. Abstinendum in Tussi Epid. quotidie ubi Febris &c. adfuit. 32.
— in Variolis primis diebus Lectio non adfigendi ægri. 85. 18. Et illi non addicendus æger ante Eruptionem Pusularum, & priusquam hæc integre sese in conspectum dederint. 84. 86. Lectio ante diem quartum pertinaciter addicere ægrum, æque malum, ac inemptive Cardiacæ ingerere. 17. Junioribus præsertim, nimis cito illi adfixis, Symptomata letalia, ut Mictus Sanguineus, Macule purpureæ, oboritur. ibid. Sed eo primis diebus abstinere Moleculas purpureas & Mictum sanguineum præcaveat. 85. confer. 17.
— in Variolarum initio, quibusnam Symptomatibus præsertim abstinere cogatur æger. 86. Quid tunc agendum. ibid.
— in Variolis abstinendo primis diebus, Eruptio, negari nequit, utcumque impeditur, que tamen sufflaminatio, & Symptomata inde sequentia, tutius feruntur, quam mala, ex Pusularum & inde subsequentiis puris abundantia oboritur. 85. confer. ibid. Lectio in Variolis adfigere ægros Incautioribus necesse videbatur ideo, quia sudores, ipsi preclives, inde plus manantes, Febrilem æstus levabant; quod tamen ipsum letalitatē sepe causa fuit. ibid.
— in Variolis, post V. S. ægrum committere pessimum. ibid.
Lectio in Variolis quo die addicendus æger. 17. 34. 84. 86. In Variolis, initio, etiam ante Eruptionem, quandoque addicendus æger. 86. Infantes primis diebus tutius committuntur, ubi Convuls. præcedunt; quia, post eas rariomul- tum confluent Variolæ. ibid.
— commissi qua ratione ibi se gerere debeant, respectu motus vel quietis, copie stragulorum, atque sudoris. 87. 145.
— In Variolis Anomalis Discretis, quandonam addicendus. 26. Quare addicendus. 30. Lectio quandonam adjudicandus in Variol. Anom. nigr. pessimis.
— in Variolis Confl. primis diebus, non adfigendi ægri. 84. 850. Et ubi, initio, eas Confluentes fore prævidemus, non nisi nocturno tempore committendæ, Opera Medica.

tendus æger: & quare. 86. Atque, ut minori copia prodeant, & coeant; non nisi Sexto die ab invasione, ægrum addicendum, quomodo Natura digestio monstrat. 84. 130. Nec abstinere die sexto ægri amplius valent. 88. A die sexto in eo se continent, usque ad decimum septimum. 145. Infantes in Cunis nunc jaceant, nunc istinc auferantur. 19.
— æger adjudicandus, tam ad promovendum manuum & faciei Tumorem, quam Pusularum elevationem &c. sed modice tegatur, & corpus hinc inde transferat, ad Sudores vitandos, præsertim exeunte morbo, adpetente jam Febre Maturationis, 18. confer. 145.
— in Variolis Discretis oborituris, an primis diebus abstinere vel non, idem erit. 85.
— Lectio surrectionem quam contra indicant. 86.
Lectuli, initio in Variolis, nimis usus quomodo Morbum exacuat, & Pusularum numerum adaugeat. 18. 84.
Lectulus in Podagra inveterata Paroxysmo Exercitii defectum aliquatenus supplet. 105. Quandonam, Exercitio dimisso, æger in eo fovendus, adhibita tenui Diata. ib. Quandonam vero ipse ille Decubitus enecat. ibid.
Lectum Podagrici hyeme mature petant. 104. Hoc enim, bruma præsertim, Solis vicem gerit. ibid.
— Puerperis tenerioribus quodnam emelumentum adferat. 94.
Lepra Morbus est ex iis, qui olim exstiter, jam occiderunt, vel aetate confecti exolvere, & raro comparent. 31. Apud Medicos depingitur, ac si esset Lues Venerea, respectu crustularum latiorum partes occupantium. 78.
Lienis regio Infantum, in Febr. Autumn. intumescens Febris fugam prænunciat. 10. Intumescens hujus descriptio. ibid.
Linctus in Febre Hyemali. 110. In Pleuritide essentiali. 35. 144. In Tussi. 151. In Crassant. 141. Ad Tussim in Morbillis. 25.
Lingua nigra & sicca in Febr. Contin. 1661. &c. 3. In Febre hyemali alba. 110. Arida, si male tractetur. ibid. In Febre nova hyemali, quomodo se habeat. 112. In Febre Variolosa qualis. 19. 22. In Febre Variolosa a Regimine calido quantum mutata. 20. In Variolis Regularibus incipientibus similis ac in Febre Variolosa. 19. sed vide ibid.
Linimenta in Hydrope, Abdomini illinisa ad discutiendum, nec obsunt, nec profunt. 109.
Linimentum in Pleuritide ad latus inungendum, superimponendo Brassicæ folium. 35. 144. In Pruritu ferino. 37. 144. In Rachitide. 10. 149. In Tumore Abdominis Infantum, ex Rachitide vera, vel ex Scrophulis. 92. Hoc etiam Axillis adficandum. ibid. Ad Ulcus Glandis, vel Præputii, Quæmory creans. 79. 149.
Linteamina Lecti, pro Phthibicis Equitantibus, calefacta esse debent. 93.
Linum crudum in Podagra ad partem affectam leniter ustulandam, idem præstabit ac Moxa. 105.
Liquor in Febre Erysipelatosa parti lese adplicandus. 37.
— niger in Variolis Confluent. loco Flavi humoris, si sanguis exstuer, effluit. 86.
Liquores generosi in Hydrope, modo non sint Spiritus destillati, Morbum incipientem sepe solvi curant, præsertim si Aromaticis imprægnati fuerint. 109.
148. Liquores refrigerantes & tenues, licet ægris ob sitim grati, quare non concedendi. 109. Et si eorum usui indulgendum sit, porce iis utendum. ibid.
— Spirituosi in Tussi Epid. 1675. vitandi, 32.
— in Variolis Anom. temperantes, & Salivationem promoventes. 25. 26.
Lochia supprimuntur per Hystericam Adfect. in Puerperis tenerioribus excitatam, quod nimis cito e lecto surgant. 94. Suppressa per Hystericam Adf. divissima Symptomata, cum magno vitæ periculo, inducunt. ibid. Quomodo occurrendum. ibid. confer. 148. Quibus Indicationibus tum satisfaciendum. 280. Medicamento fortiora non usurpanda, nec in miorum usu perseverandum. ibid. Ubi Emplastro Emmenagogis, Pægoricis, Enemate, adplicatis, non redeunt, nihil amplius agendum; sed tempore res committas prudens Medicus. 94. 95.
Lochiorum fluxus nimis quomodo sistendus. 148.
Lock (Johannem) Elogiis quibusnam dignum censuit Auctor. VII.
Lutianus in Τεχνη δὲ ὀφθαλμοῦ Podagra Personam introductus eos adloquentem, qui Arcana habere jactant. 106. Tum & eos, qui cum eo Morbo diu conflixerunt. ibid.
Lues Venerea, ex India Occidentali, An. 1493. primum in Europam adpulsa, antea cognita non erat. 77. Endemius Morbus Americanis putatur: sed Auctor potius e regione aliqua Nigritarum Guinæ conterminorum ortum putat; quia Morbus illis populis, Luis nostræ simillimus, & forte idem, Yavus dictus, Endemius est. ibid. Hinc Hispani in America videntur hanc contraxisse ex Africanis ibi delatis. ibid. 78.
— non ea celeritate ac ante grassatur; quod si foret, extincta brevi esset Gens humana, vel in Nofocomiis langueret. ibid. Sed instat Fegetabilis transplantata, Europæo solo non letata, languet in dies. ibid.
— in initio Symptomatis quibusnam prodierit. ibid. Gonorrhææ virulentæ specie, ulcusculis in pudendis aliquando concomitantibus, a centum retro annis, se primum ostendit, per quam, ni virus probe ejiciat, sanguinem inficit. ib.
Lues Venerea propagatur vel per generationem; vel per Contactum, quod aut lactatione, aut concubitu in eodem lecto, præsertim in Infantibus, raro in Adultis; tum coitu, fit. ibid.
— oritur sepe a Gonorrhæa virul. diuturniore; vel a Materia virul. adstringentibus inemptivis coercita. 78. 79. Facile illos ægros adortur, quorum corpora, ubi Gonorrh. laborant, Catharticis fortius obstrunt. 79.
— Crustulas & Porrigines in variis partibus, sed flavescens, & aliquando latiores, uti Lepra describitur, habet. 78. Et quo majori copia adfuit, eo dolores in corpora minores. ibid. 149.
— Dolores, in initio, quosnam, ejus præsentiam designantes, habeat. 78.
— Dolores, progressu temporis, quales habeat. ibid. 149.
— Exostoses, excrecentiis in sibi Equorum similes, habens. 78. 149. Ulcera Phagedenica, temporis progressu, quænant, & ubi, habeat. ibid.
— Symptomata quænam in summo gradu habeat. ibid.
— cujus Naturæ, quam essentialem vocant, sit, ignorat Auctor. 207. Videtur inflammationis particeps. ibid.
Lues Venerea quomodo curanda veniat, non nulli indicare æquum non æstimant. 78. Auctor contrarie est sententia. ib.
— Vacuantibus curari vult; qualem quoque vim possident, quæ huic curandæ primaria. ibid. Et ut a Gonorrhæa adhuc longe distat, sic Evacuatio qua hæc ejicitur differre debet. ib.
— per Salivationem ab Hydrargyro tantum extirpari posse, ubi confirmata, putat Auctor. 79. Hæc autem quomodo instituat. 79. 80. 149. Si Gonorrhæam comitem habet, prius Salivatione tollenda Lues, tumque Gonorrhæa facilius curatur. 80.
— Specificum nullum habet Remedium, cujus ope sine evacuatione curetur. 78. Hincque sudorifera quælibet æque valent ac Ligna illa exsiccantia: Et si aliud Medicamentum daretur, quod Salivationem moveret, pariter ac Mercurius ad sanandam Luem valeret. ibid.
— quare in Gallia facilius sanetur, quam in Anglia. 80.
— non sanatur Mercurii aut Sarsaparillæ virtute specifica, sed vi evacuandi. 12. 13. 78.
— Recidivam unde habeat. 79.
Lumbago Rheumatica Rheumatismi Species est, licet vulgo non credatur. 36. Describitur. ibid. Ejus Curatio, eadem ac Rheumatismi. ibid. &c.
— Nephriticum Paroxysmum mensiur, excepta vomitione. ibid. Ejus dolor imponit Medico tamquam Sabulum vel calculus adfuit. ibid.
Lumbago causam materiam Rheumatismi inflammatorium, eas solas partes urinem, agnoscit. ibid.
Luxus Animo & Corpori quantum ledat. 103.

M

Maculæ Gonorrhææ virul. initio, vid. Pusula.
Maculæ in Febre Scarlatina, quales & ut a Morbillis differant. 34.
— purpureæ, unde. 115.
— Petechiæ, tum Virium subita prostratio, signa habentur Malignitatis, quæ Phenomena solvantur ab Auctore. ibid.
— Februm augentur Calefacientibus, & contra. 31. 32.
— In Febre nova, Hyemali, a Calefacientibus. 112. 113.
— In Febre Scarlatina, quando. 84. 85.

- In Febre Variolosa, Ptyalismo disparent. 20.
 — In Morbillis quando. 84. 85.
 — In Morbillis V. S. & refrigerantibus sublatæ. 25.
 — Pectus sub adventu. 115. 116.
 — In Peste præsentaneis inseritis nuntiis, raro sine Febre contingunt. 12.
 — In Peste vera, Bubonibus retrocedentibus succedentes, certissimi mortis indices. 13.
 — In Peste ob V. S. non satis iratam, cur erumpant. 14.
 — Maculæ in Variolis, interpersæ Pustulæ, Mortis prænuncia, æque ac in Peste. 16. 84. 130. Confluentes ut plurimum comitantur. 84.
 — In Variolis Confl. ubi Mictus sanguinis vel Sputum sanguineum, adesse solent. 130. Aliquando, vix adhuc adparentibus, vel paucis modo Variolis, comparent, & præmaturam Mortem accersunt. 84. In Variol. Confl. An. 1681. Eruptionem sepe præveniebant. ibid.
 — Mict. Sang. in Variolis unde. 85. 115. 116. Causa harum vel Constitutio aeris favens. 16. 84. Vel a Lacti sepe calore, præsertim in junioribus. 17. Vel ex Regimine calido. 19. 84. Tum ex Sanguine inflammato. 115. In Variolis a Regimine calido, præsertim ætate, & in Juvenibus. 84. Quomodo fiat. 85. In Variolis An. 1681. ex Siccitate Anni inaudita. 84. Avertuntur V. S. tempestiva; Vel Regimine temperato, 19. 85. 115.
 — Mictus Sanguineus, Regimine temperato, non curantur amplius, ubi jam adsunt. 84. 85.
 — Magnitudo Morbi, in Variolis Confluentibus, pro quantitate, & move, Variolarum, quæ Faciem: non quæ reliquum corpus, obsident, æstimari debet. 15. 16. 145.
 — Malignitas in Morbis, quid. 32. 33. confer 115. In Epidemicis plerisque satis conspicua, & cum Veteribus tum etiam Neotericis notata, quomodo ab Auctore intelligatur. 32. 33. Hujus quænam signa haberi soleant. 115. 116.
 — Malignitas Morbi non in omni specie per Sudores eliminatur, licet in Peste propter subtilitatem partium fieri queat; nam in Morbis ubi sunt minus subtiles, & crassioribus involuta, Diaphoreticis adgravantur mala. 32. Quilibet in Morbis, Evacuatione eadem, quæ Morbus ipse Epidemicus, cui inhaeret, tollitur; siue id fiat per Sudores post concoctionem, ut in Autumn. Inverni. vel Continuis; siue per alias vias ut in Variolis per Abcessus, siue per Artis præsidium Evacuationes fiant. 32. 33.
 — Morborum in quibusdam partibus, quæ in propriam indolem, illas quæ obsistunt infleuntur & adsimulant, consistat. 32.
 — aliquando plus a Therapeia perperam administrata, quam a venenosa morbi indole, proficiuntur. 5. 6. 11. confer 110. Hujus rei ratio. 11.
 — per Sudorifica, aliaque calida Medicamenta, non nunquam augetur. 32. 115. Et sepe contemperantibus edomatur. ibid.
 — Malignitatis notio vel verbum, ab hominibus inventum, ipsi, Pyris pulveris inventionem, letalium fuit. 115.
 — præsentiam Medici petunt vel ex Maculis purpureis & Petechiis, vel ex Virium prostratione, ubi Febris Symptomata non vehemensiora. 115. 116.
 — Malthus, Pharmacopola, Rheumatismo laborans, Sero Lactis curatur. 43.
 — Mane corpus magis firmum & robustum cur sit. 104.
 — Mania communis. 11. 150. In Vegetis hominibus oritur. 11. Causa ejus nimis exaltata & vivida sanguinis crasis. ibid. 150. Curatio hujus diversa longe ab illa alterius speciei a debilitate. 11. Quomodo instituenda. Absolvitur a. Evacuationibus, ut humores a capite derivarentur. 11. 150. Sed b. Quæ cerebrum ac Spiritus roborant non omittenda. 11. Hiuc Roborantibus utendum. ibid.
 — Mania peculiaris ac sui generis, a debilitate, post Febris Intermitentes, Quarant. præsertim ex perversa medela, Evacuationibus nempe, nimis diu protrahatur, aliquando nascitur, in Stultitiam non nunquam degenerans. 8. 10. 150. Hujus apud Auctores nulla mentio. 10.
 — Ejus a Mania communi differentia respectu cause plane opposita. 11.
 — Evacuationes, ut V. S. & Carbasin, uti alia Amenitæ species non fert. ibid. Verum ab illis vires sibi acquirit. 10. Imo ex solo Enemate & Lacte Saccharato sepe sanata recrudescit. ibid.
 — Ejus curandæ Modus. 150. 11. Metus hic a Febre, ob Regimen calidum, vanus. ibid. Quomodo aliquando pro ratione Virium incrementi recedat. 16.
 — Mania particularis altera, debilitate, Febris non prægressa, ex frigido, & infirmiori temperamento. ibid. Curatur eadem Methodo ac altera particularis speciei. ibid. Exemplum in Gravida. ibid.
 — Manna quid sit. 131. Lithontripica vi quare prodita existimetur ab Auctore. ibid. In Calculo purgans lithontripicon; in Podagricis tamen non innocuum, nisi insuper Paregoricum adsumatur. ibid.
 — Manna quomodo adsumta in Mictu Sanguineo a Calculo, ab Auctore. ibid.
 — in Aquis Mineral. Catharticus adsumta, in Calculosis, quomodo noceat. 132. Cum Sero Lactis & Succo Limonum, in Calculo, usurpatur ab Auctore, cum levamine. 131. Et ad mense singula hebdomade iteratur; dein bis in septimana adsumitur. ibid.
 — Manus, in Variolis Confluentibus intumescere solent, tum Faciei tumor & Salvatio cessant. 16.
 — Mapletost Med. D. Auctoris in medendo socius. 31.
 — Mares Hypochondriacæ Affectio minus obnoxii sunt quam Fæminæ. 93. Ratio hujus redditur. 90.
 — Martialis vid. Chalybeata seu Chalybs.
 — Materia Febrilis in Intermitentibus quando adgregetur. 40.
 — excreta, post febrilem commotionem, vitiosa esse potest, licet Sanguis antea bonus. 3. Expellitur quoque, quia Natura ejus consorsium ferre amplius non potest. ibid.
 — Materie Febrilis concoctionem promovere quid reipsa sit. 5.
 — concoctæ signa post dies tredecim vel quatuordecim adparent. 42.
 — Materia Medica cur adeo immensa. XI.
 — Morbi in Podagra irregulari, in Paroxysmorum intervallis, nunquam perfecte dissipantur. 100.
 — Materies viridis Bili porraceæ similis, in Hysterica Affect. sepe rejicitur. 89. 90. Et licet Purgantibus fuerint deterfa Intestina, tamen Paroxysmo ingruente, talis subsequitur materies: imo quo frequentius hæc fuerint exhibitæ, uti & Vomitoria, eo uberior istius materiei seges. 90.
 — Maturatio Variolarum Discretarum Regular. octavo die incipit, & quibusnam cum Symptomatibus. 15.
 — Maturatio Febris seu Secundaria vel & Putrida dicta, in Variolis Confluent. 18. 26. 130.
 — Meatus cæci, ex Abdominis cavitate in Intestina, dantur. 108.
 — Medica Ars, vid. Ars Medica, vel Medicina.
 — Medica Praxis si scribendi vel docendi ordinem respicias, ex Hypothesibus orta licet videatur; nihilo minus ipse Hypotheses, si modo Regule certæ ac solide fuerint, Praxi originem debent; quod Exemplo confirmatur. ibid.
 — Medicamenta præstantissima a Natura præcipuas vires accipiunt, quum ipsa illas suo igne elaborat, atque evehat; quod docent Cortex Peruvianus, & Opium. 91. 92.
 — Specifica quænam intelligenda juxta Auctorem. XI. Quo simpliciora eo meliora. 102. Specifica nulla, uno Cortice Peruviano excepto, cognita. XII.
 — ad Morbum magis insignium curationem, in patrio cujuscumque solo, data, verosimile videtur. ibid.
 — ex Plantis desumpta, reliquis, uti ex Animalibus nimis similibus, vel ex Mineralibus nimis distantibus, præmam præcipiunt. ibid. Ex alia Tribu desumpta prodesse tamen possunt. ibid.
 — Medicamenta simplicia adeo tradit Auctor, ut ad Materiam Medicam vix possint referri; & ab Hippocratis Methodo in eo non deficiat. XV.
 — simpliciora a levioribus tantum ingentis vili penduntur. 38.
 — vilissima quoque habita Homini, ab Orci faucibus liberandis, quomodo inservire queant, si Medici solertia dirigantur, Exemplo comprobatur. ibid.
 — optima Chemicorum nimis officiosa sedulitate enervantur sepe. 91.
 — calidiora, in Febris Continuis, quando concedenda. 5.
 — Concoctionem Materie febrilis promoventia, Medicis dicta, non intelligit Sydenham. ibid.
 — Refrigerantia & Clysteres in causa aliquando sunt, quo minus Despumatio Februm spatio 107. hor. h. e. 14. dierum, persolvatur, sed in longum evagetur. 9.
 — Febris Continuum, ad diem decim. quare. solutam, in vigesimum diem & ultra, protrahunt. 5. 6.
 — Hysterica roborantia. 26. Hysterica foetida quænam dicantur. 91. 93. Dum roborantia adhibentur inserina exhibenda. 91.

- Quædam sunt Naturalia ex Plantis & Animalibus; quædam Artificialia, ut præsertim spir tus fermentes, ex Animalium partibus, qui omnes Creaturæ ignis sunt. 93. Medicamenta Hysterica, ubi Fæmina ab iis nimis abhorrent, sunt omittenda. 91. Diutius agunt si forma solida, quam liquida deglutiantur. ibid.
 — Medicamenta roborantia in Hydrope loco Purgantium, quando necessaria. 109.
 — Medicamenta in Morbis Chronicis, Digestiva, sunt tam Pharmaca, quam vietus ratio, Exercitatio, & similia. 102. 103. Quæcumque fuerint, plus præstant, quam quis existimare possit. 103.
 — eadem sunt quæ in Podagra. ibid.
 — in Chronicis plerisque, æque ac in Podagra, ex calefacientibus quæ amare. scunt, vel linguam leviter feriunt, quare conducant. 102. confer 103.
 — Pharmaca, stricte dicta, sola Morbos Chronicos, & Podagram non curant, sed vietus ratio concurrere debet. ibid.
 — Medicamenta in Podagra Digestiva quænam. 102. &c. Qua Cautione, ne fomes Morbi irriteretur, in eorum usu procedendum. ibid. In Paroxysmorum intervallis, & quam fieri potest longissime ab infecuturo, in usum revocanda. 318. Constante & assidue usurpanda, quia corporis habitus omnis alio traducendus est, atque homo integer quasi nova incude refingendus, ut Coctionum robur & firmitudo partium pedetentim reducat. 103.
 — externa in Podagra an dentur. 105. 106. Aliquando nocent, prosumt nunquam. 106. Si Refrigerantia & repellentia fuerint, periculosa. ibid. Ubi ex. periunda, sub initio Paroxysmi sunt tentanda, non sub declinatione ejus, ne fucus nobis fiat. 105.
 — Medicamentum externum in Podagra Paroxysmo quod solum bonum fuit, quale. 106.
 — Medicamentum ex pluribus Simplicibus mistis constans, quandonam potentius operetur. 102.
 — Medici in Morbis depellendis non satis lense festinant. 29.
 — Medici fama in Variolis tractandis, ubi de caloris gradu Expulsionis tempore applicando agitur, in angustio versatur, ob vulgi non modo, sed & ipsius artis Professorum, calumniam. 17.
 — Medicina jam multis seculi ante Esculapium Egyptium, qui mille annis Græcum antecessit, quare necessario excoli debuerit; licet ejus natales, uti & aliarum Artium, inditari nequeant. VIII. Quam antiqua, haud minus ac Nili fontem investigatur; cum ab initio existeret, jam diligentius, jam frigidius exculta. ibid. Variæ exculta etiam fuit, pro vario tempore & varia regione; & dein pluribus mediis ampliata. ibid.
 — quomodo ulterius promoveri queat, Auctor Tract. de Morbis Acut. post longas Meditationes, ac fidam plurimorum Annor. Observationem, in medium proferre decrevit. ibid. Incrementum, duobus mediis, nempe, Historia Morborum graphica & naturali, tum Methodo curandi, seu Praxi, stabili ac consummata, capere potest. ibid. confer XII. His vero tertium accedit, Specificorum Remediorum scilicet inventio. ibid. Primum traditur. VIII. IX. Alterum traditur. ibid. XII.
 — Chemia utilia Medicamenta non nulla, debet; sed errant, qui Medicinam nulla re magis, quam Chemicorum inventis, promoveri posse, volunt. 108.
 — Non deficit in eo, quod indigeamus mediis, Indicationibus satisfacere aptis; sed quod Indicationes quibus satisfaciendum est, ignoremus: Hocque non nisi ab exercitatio, pari certitudine nascitur. 100. Quomodo vero hæc cognitio acquirenda. 108.
 — Medicina cur uti reliquæ Artes incrementa sumere potest, sine priscorum Hominum injuria, quidquid dicant illi, qui prætextu reverentia pro Antiquioribus, ab iis discedere nolunt. ibid. Duplici hominum genere in progressu suo impeditur; primum est eorum, qui nullum symbolum ad artem suam conferentes, aliis, qui vel minimum conferre videntur, succensent, ac si ab Antiquioribus, specie reverentia, discedere non audent; Alterum est eorum, qui Speculationes, ad Morborum curationem nihil facientes, moleste ingerunt, & sic ignibus fatuis Medicos in errores ducunt, potius quam ipsis viam præmonstrant. ibid.
 — ad Experientia leges & normam nisi exerceatur, exulanda potius. 42. Cum laude non exerceatur, si ad subtiliores in Praxi minutias non attenditur. 88. Non rectius quam ad ipsius usu addiscitur. VIII.
 — accessionem Practicam quantulumcumque longe pluris facere debet, quam inanem subtilium Speculationum pompam. 14.
 — ubi Methodum quædam certam, vel levissimum Morbi debellandi prodidit, majoris felicitatis est, quam Tantalus vel Cræsi Thesaurum accumulasse. 39.
 — Practica in Indicationibus genuinis expiscandis, non ita in Remediis exco-gisandis, præcipue stat. XII.
 — Medicina in Variolarum genere, ubi Exanthemata pauca & discreta, nullius est momenti. 86.
 — Medicinæ Pompa, & dignitas, non tam in Formularum elegantia, quam Morborum Curatione censitur. 110.
 — Medicus & Chirurgus structura humani corporis probe gnarus quare debeat esse. 108. Tamen Morbis tneft ti & ceteris quod ex ejus contemplatione indagari nequit. ibid.
 — curam omnem in expiscanda Morborum Historia, & adhibendis Remediis quæ Magistra Experientia indicat, debet collocare, rejectis Speculationum commentis. 40.
 — & Formularum Præscriptor toto cælo differunt. 87.
 — peritissimus æque probus, ubi aliquando nihil ager, & alio tempore efficacissima adhibebit Remedia; licet a vulgo ignaro negligentia vel ignorantia tum reus habeatur. 33. Bonus ac probus ubi fuerit, suo pulchre defungitur munere, tam in Acutis, quam Puerperarum Morbis, cum, ubi de successu certis non fuerit, nihil potius sentiat, si ager de die in diem pejus modo non habet, quam quod ægri in gemitum discrimen, cum ex ipso morbo, tum ex suo experimento, conjiciat. 94.
 — ad Hystericas Affect. a Morbis essentialibus partium distinguendas, sagax, & arte peritus, si oportet. 89.
 — in Variolis Discretis nihil habet, quod agat, nisi sibi & aliis imponat: si vero jactet, tum in Variolis Confluent. sentet, quantum in Arte valeat, præsertim, in Juvenibus, & vino potatis. 88. In Variolis incipientibus, in eo tantum ægro suppetias ferre potest, ut Pustularum numerum coerceat, ne confluant. 84.
 — Medicus in Variolis, ubi sanguis educendus, vel aura frigidior applicanda, ad conscientiam suam potius, quam ad incertam famam, se componat. 19.
 — Meditationes nimia Podagricis nocent. 103.
 — Melancholia Podagræ, præ ceteris comes semper adhæret: & profundas cogitationes producendo, hic ledit. 104.
 — Melancholici quo animo sint constituti. 89. 90. 91. Ingenio ceteris præstant. 90.
 — Membra in Rheumatismo, motu omni, cessatis jam doloribus, ad mortem usque sepe privantur, digitorum articulis inversis. 170.
 — Menses in Hydropica quinquagenaria, easdem diu non passa, quasi flumine denovo erumpunt. 109.
 — quo tempore ætatis definire soleant. 102.
 — Mensium Fluxus immodicus, sæpissime fæminas invadit, paulo ante tempus, quo Menses omnino cessaturi sunt. ibid. In Puerperis, post Partum plerumque laboriosorem natum, brevi quoque se proripere solet. ibid.
 — Hystericam Adf. quam Vapores vocant, excitare valet. ibidem.
 — Quid agendum si in Puerperia contingat. ibidem. Quid, si extra illud, 95.
 — in Variolis Anomalis, tempore non solito superveniens, quare periculum inferat. 26. Et Calefacientibus, Cardiacis, adstringentibus, sæpissime letalis Morbus factus. ibid. Mne temperantibus & diluentibus tractandus. ib.
 — Mensium Suppressio ea Methodo ac Hysterica Adf. sanatur. 92.
 — Mensura Venæ sectionis, in Febris continuis. 4.
 — Menthe aqua still. in Ileo vero. 7.
 — Mercurius, in Lue Venerea curanda, evacuando forte potius, quam vi Specifici, agit. 12. confer. XIII. Vm Specificam, ad debellandum Luem Veneream, non majorem habet, quam scalpellum Chirurgicum ad Pleuritidem sanandam, vide 80. Specificum mediatum in Lue Venerea tantum dici potest. ibid.
 — dulcis ad salivationem excitandam, in Lue Venerea, ibid. Ad Salivationem sustinendam, quando usurpandus. 79.
 — Metastasis Podagricæ materia in Pulmonis lobos, ex frigore in Paroxysmo susce-

pro, aliquando, licet raro contingit: in quo casu Podagra ulla ratio habenda, sed Morbus tamquam Peripneumonia curandus. 105.
 Methodus vera Artis Medicæ tradenda, vid. Medicinæ.
 Methodus medendi vera est, quam recta ratio, non speculationum commentis, sed iusto & naturali cogitandi modo innixa, distat. 110. Et vera ex Historia Morbi sola peti potest. 42. confer ibid.
 Auctoris ad Morbos curandos fuit, ut diligenter & accurate ad Phænomena Morborum Naturalia adverteret, indeque Indicationes Curativas eliceret. VI. Exemplum in Observat. circa Febres & Methodo has curandi. ibid.
 Methodus Hippocratis medendi, Caussarum conjunctarum, & immediatarum, cognitioni superstructa, Artis Medicæ damno, delevitur, dum remotioribus Caussis speculatores vani incumbunt. X.
 ab Auctore quæcumque iudicia, non cerebri quoddam figmentum, in musæo excogitatum, sed constanti pragmatica stabilita. XII.
 medendi certa, ac consummata, quænam sit. X. Confirmata undique, in quovis Morbo, stabilire difficile. ibid. Quænam præferenda in Curatione Morborum sit, quomodo dijudicetur. 116. In Morbis Acutis ea ad sanationem maxime confert, quæ Evacuationis modo, quæ Natura statuerit, opem fert. XI.
 curandi Febres per V. S. & Purgationem, in Febribus quam plurimarum Specierum, plus præstabit, quam alia quædam Methodus. 115. Præsertim quæ illa per Diaphoresin, quæ admodum incerta, ac dubia. ibid.
 Pestilentialia Febres, ab Auctore reposita post Pestem, adeo salutaria fuit, ut ex suis ægris nullus desideratus fuerit. 14.
 diversa ab ea, quam hætenus cum successu usurpaverat Auctor, novæ Febri cuidam de in Festum est reposita ac adaptari debet. 13.
 Febrem Variolosam præ cæteris optima, Auctori videtur Regimen temperans & refrigerans. 20. Contraria Methodus, licet sæpe resurgant ægri, magnum inferi Discrimen & Symptomata auget. 102.
 Methodus curandi Variolas, & Historia ipsarum vera, ex Variolis Constitutionis. An. 1667. ad 1669 est desumenda, quæ Regulares, & in suo genere omnium perfectissime, fuerunt. 15.
 ab Auctore proposita, non ipsius iudicii auctoritati innisitur, sed Phænomenis præstatis, postquam sedulo fuerit observatum, a quo Regimine mitius aut. sævius Variolarum genus producat, superstructa fuit. 85.
 Auctoris in Variolis Confluentibus tractandis, Symptomata pessima præoccupat, & benignum reddit Morbum. 19.
 Variolas Discretas tractandi, ab ea Auctoris diversa, quænam Symptomata producat. ibid.
 Methodus Naturæ varia & accurata, quam ad Morborum generationem adhibet, a nemine hætenus pro rei dignitate satis observando est adsecuta. 2.
 Maligna Pestiferum vel immediate, vel mediate, suscipitur. II.
 Miasmata Epidemicos Morbos producentia, oriuntur, vel a Vaporibus e Terræ visceribus, mutationes quasdam passis, aerem inquinantibus; vel ab Atmosphæra alteratione propter corporum quorundam caelestium Conjunctionem. 102.
 Mictus Sanguineus a Calculo Renibus impati. 131. 146. In Calculosis curru vendis per vias, lapidibus stratis; quomodo præcavetur. 132. Ex Calculo Renum pest ambulacionem suborsus. 131. Morsu Curvus, excitatus. ibid.
 quomodo tractandus: & quali Dieta in eo utendum. ibid. &c. confer 146.
 Plurima Remedia sine successu adhibet Auctor. 111.
 Mictus Sanguineus Mannæ usu curatur in Auctore. ibid.
 in Febribus plerumque lesale. 88. In Febre Scarlatina quando. 84. 85.
 in Morbis Acutis unde, & quid indicat. 88. In Culcitra corio tecta æger dormiat. ibid.
 in Morbillis; quando. 84. 85.
 in Variolis Confluentibus æque ac Discretis, quare Adolescentibus, Vegetis, & Vino potatis, consingat. 16. Sub initio Morbi, sæpe nullis, vel paucis hætenus, erumpentibus Pustulis, plerisque adhuc latitantibus, prodit, & egrum ante plenam Eruptionem e medio tollit. 84. confer 115. 130.
 unde. 85. A Lecti sæpe calore, si nimis cito ei adfigantur, præsertim juniores ægri, excitatur. 18. In genere, Regimen quodcumque calidum illum provocat. 84. 85. Quomodo hoc fiat. ibid.
 incurabile plerumque malum, Mortem prænuncians. 19. confer. 16. 84. 85. 130.
 quomodo præveniendus Regimine temperato, ex Sydenhami Methodo. 32. 85. V. S. tempesta sæpe præcavetur. 18.
 & Maculæ purpureæ, Regimine temperato non amplius curantur, ubi jam adsunt. 84. 85. Quomodo adhaec curari possent. 130. 131.
 Millares eruptiones, in Febre novæ, hæmali, Morbillis non absimiles, nisi quod rubeant magis, & squamulas furfuraceas non relinquunt, a Cardiacis & Lecti calore. 112.
 Millington Medicus Doctissimus una cum Sydenhamo ægrum Variolis nigris infectum vixit. 26.
 Minera Ferri, ignem nondum passa, in Hyster. Adf. & Chlorosi, ipso Ferro an plus præstaret. 91. 92.
 Mineralia, in usum Medicum applicata, Indicationibus potentius, quam Vegetabilia vel Animalia, quare respondeant. 15. Specificæ tamen non medentur. ibid.
 Minutæ subtiliores in Praxi indagandæ, sine qua Medicina cum laude neuti- quàm exercetur. 83.
 Mistura Cardiacæ in languore Febrili. 5. In Tertian. Autumn. Sudorifera. 9.
 Morbi ab omni ævo eor adfuerunt. VIII.
 regnant hisce temporibus quidam, aliquando interituri, & novis cessuri speciebus. 31. Sic & existere olim, qui vel ætate pene confecti exolevere, & raro comparant; vel occidentes penitus novis cedunt speciebus. ibid.
 species novas, prioribus extinctis, cur habere possint. ibid.
 ad certas species, ubi eorum tradenda Historia, quare revocandi. VIII.
 Complures, sub eodem titulo, citra speciei distinctionem tractati, dissimillima sunt indole. ibid.
 facie sæpe variant, pro vario medicandi processu; adeo ut non nulla Symptomata non tam Morbo sæpe, quam Medico, debeantur. IX.
 qui certum aliquem typum agnoscunt, ut v. g. Febr. Quartana, sub quo genere comprehendatur. XI.
 Tempestates Anni, nec pauciores, sequuntur, oculo quodam Naturæ instinctu; non nulli sunt omnium horarum. IX. Huiusque rei notitia Medico in quibusnam multum prodest. ibid.
 Morbi alii Acuti, alii Chronici, duobus principiis sibi invicem contrariis, dantur. I.
 Acuti & Chronici in quibusnam differant. ibid. 102. Quomodo essentialiter differant, & quænam sint specificæ humorum depravationes, quæ, in his ab indigestione tanquam causa generali, in illis a sanguinis inflammatione, tanquam universali causa, pendet, ignoramus; & in extimo Morborum cortice tantum hæremus. 109.
 Morbi Acuti us plurimum Deum Auctorem habent; Chronici nos ipsos. 86.
 quænam vocentur. I. 102.
 plus quam duas serias Morborum partes comprehendunt. 108.
 vel ab aeris inquinamento, vel a particulari corporum anomalia, gignuntur. I. Hincque distinguuntur in Epidemicos, & in Intercurrentes seu Sporadicos. ibid. 102.
 pro causa externa quam plurimum, Vestium præmaturam abjectionem, vel refrigerationem post incalcescentiam ab Exercitio, habent. 34. Quique sum specie varia, pro Anni Constitutione, vel humorum Dyscrasia, exoriuntur. ibid. confer ibid. Et ab his duabus caussis plures, quam Peste, Gladio, fame, simul sumtis pereunt. ibid.
 Morbis Acutis omnibus, & Chronicis plerisque, & Oïon inest, quod, ex Consideratione exactissima corporis humani, indagari nequit. 108.
 In Morbis Acutis Medendi ratio non comprobatur ex eo, quod feliciter cedat, (nam Multivascularum temeritate aliquando curantur) sed quod suapte genio quasi recedat Morbus. 24.
 Morbi Chronici quænam vocentur. I. 102.
 & Acuti in quibusnam differant. I. 102. confer 109.
 non Aeris ica immediate, ac Acuti, suam originem debent, sed Humorum Indigestioni; ad quam causam universalem eandem omnes referri debent. 102. Quæ quomodo concipienda. ibid. 103. Quodque Argumentis stabilitur. ibid.
 non facile describuntur, quia apud Auctores (Hippocratem & paucos alios si demas) nulla reperiuntur vestigia ad iter faciendum; horumque subsidia potius oberrare faciunt (quoniam Hypotheses tantum, & lascivientis ingenii lusus Sydenham Opera Medica.

xuræ, sunt) quam quod mentem, in genuina Naturæ Methodo indagantem, dirigant. 77.
 Scorbutum sæpe, quamdiu vel adhuc nascuntur, neque Typum certum cuderunt, vel pro parva fugati, neque omnino debellati sunt, existimantur esse. 36.
 Hyeme potius quam Æstate gignuntur. 103.
 ut curentur, Habitus totius corporis, uti in Podagra, immutari debet; hinc Remedia diu continuanda, & corporis exercitium quotidianum præprimis colendum. 103. 104.
 & Podagra, Medicamentis solis non curantur, sed Fidis ratio concurrere debet. 103. Herbis excalescentibus cur sanari decessant. ibid.
 Morbi Epidemici sunt illi Morbi Acuti, qui durante arcana quadam aeris Constitutione, hominum corpora inficiunt, gignuntur, & laceffere pergunt, plures adicientes, neque alio ullo tempore invadentes. 1. confer. 11.
 a Causa generaliori, siue externa, ex aere pendente, h. e. ex aeris occulta quadam diathesi, siue arcana alteratione, non a peculiari Humorum crasi, nisi, quatenus ab aeris Miasmatis inficiuntur hi, pendens. I. 2. 11. 24. 102. confer 33. 34. Causa hæc Productiva, Conditio certa recondita, & inexplicabilis Constitutio, dicitur, quia hanc dispositionem plane ignoramus. I. 11. 24. 184. Quæ ratione Aer ita inficiatur, ut Effluvis, Morbos hosce Epidemicos, alicujus singularis Constitutionis, producentibus, scateat. 30. 31. 102. 112.
 varii, quæ de causa in eandem Constitutionem incidant. 24.
 ab Aeris occultis Qualitatibus licet magis pendeant, quam a manifestis (I. 17. 24. 39) Tamen pro tempore in eos talem habent potestatem hæ Manifestæ Qualitates, ut illos intrinsecus vel excludant, varia tempestate, pro ut ipsi favent, universali Constitutione inserim prorsus eadem manente. 24.
 quidam, quoad Symptomata non nulla, ab aeris quoque manifesta Diathesi pendere solent. 39. Exemplum hujus asserti, Morbilli: & Cholera An. 1675. tradunt. ibid.
 Morbi omnes ea maxime tempestate grassantur, quæ cum eorum indole magis facit; & aliena tempestate adpetente, iis Epidemicis cedunt, quibus illa magis favet. 84.
 faciem sui plane dissimilem habent, non tantum respectu Anni tempestatum, sed & respectu Constitutionum diversorum Annorum, a quibus pendunt, ab invicem discrepantium. 1. Longe plus ab invicem diversitatis ex diversorum Annorum Constitutione, quam ex variis Anni tempestatibus, habent. ibid. Externa quadam specie, & non nullis Symptomatibus, licet incursionibus convenire videantur, interim, sum ratione Symptomatum, sum medendi modo, discrepant, & alienæ sunt indolis. ibid. Hæc disparitate diversorum ab invicem annorum Constitutiones, a quibus pendunt, referunt. ib. Constitutionem hanc generalem si respicias, adeo diversi reperiuntur diversis Annis, ut qui jam hæc Methodo ab iis, puta Febribus Continuis, liberantur ægri, aliis Annis eadem Methodo forte e medio tollantur. ibid. Hinc in initio Constitutionis, aliquando visa prima periclitantur ægri, donec Morbi gentium perspectrum habeatur. ibid.
 Plures uno eodem Anno grassantur; sed Unus eorum prædominio reliquorum potitur; illis tunc parvis sequebantur, cum hic augetur, & vicissim. 2. Et hujus Vicitudinis aeris semperis, huic illi favens, in causa est. 2. 24. Unde in eadem Constitut. hic Morbus aliquando se exserit, alteri locum cedens, prout aeris sensibilibus qualitates, hoc illo tempore, illud destinare: Sed Constitutio universalis eadem manet, siue Epidemici, ad illum, qui eo Anno regnat, adinvenit, aeris quadam manifesta qualitate, promoveantur vel retardentur, hac illave tempestate 24. confer 2. Exempl. in Febre Stationaria Conflis An. 1669 ad 1672 hæc Julio propter calorem aeris sevis, & Autumno, Morbo magno, a quo insignitur Annus, Dyssenteria se. cedit. 24.
 Morbi ab invicem ut clavus a clavo pelluntur. 21. Qui sament cedunt non omnino evanescunt, sed rarius invadunt. ibid.
 alii continua quadam serie, seu factio circulo, alios an semper excipiant? an vero omnes indiscriminatim nulloque ordine, pro o culta aeris diathesi, mortales incessant? vix unius hominis brevis ætas perquirat. 1.
 Quo ordine se excipiant, ut dignoscatur, quadam Auctori commoda videatur Methodus. 3.
 quibus annis varia specie grassantur, tamen omnes, modo quo adgrediuntur, atque invadunt, consensunt. 2. Nam Morbi ea tempestate prædominant, genio typico se accommodant, quosque illo Anno invadunt. ibid. In generali vero Causa, singularum specierum productrice, quamvis quoad Typum &c. differant, omnes conveniunt. ibid. Nam Constitutio singularum specierum materiam ita effingit, & format, ut in pluribus congruant. ibid.
 Morbi Epidemici quilibet suos habent Periodos, Augmentum, Statum, & Declinationem. 21. Sed Morbi diversi, tempore diverso ad statum perveniunt. 2. omnes emergentes e Naturæ sinu, subtilioris principii sunt, quam ubi adolevere: & quare. 22. 28.
 initio atrociora quam ubi Constitutio adolevit. 22. 25. confer 21. Exempl. in Peste & Dyssenteria. 22. Et cum ad æquæ pervenerint licet plures adficiant, tamen Symptomata eorum mitiora sunt, quam in principio; ut in Dyssenteria Conflis 1669. &c. consigit. ibid. Ubi jam statum suum transgressi, quoad Symptomatum vehementiam, & ægrorum numerum imminuuntur. 25. confer 21.
 multo plus quam unius Medici ætatem, priusquam eorum species, Characteres, medendi ratio singularis, &c. rite percipiantur, exigunt. Et quare. 2.
 a Natura elegant & subtili artificio in variis suis exornantur, ut patet in Cholera Morbo, qui alio ræse quam Augusto, non invadit, licet eadem dentur cause; ac si in aere illo mense aliquid, quod specificam hanc alterationem producat, resideret. 22.
 alii sunt Regulares, & ex his Epidemicorum Historia ediscenda est; Alii Anomali nulli Typo adstricti, tam quoad Symptomata, quam medendi Methodum, & mali moris sunt. 2. Unde illa disparitas. ibid.
 Morbi dantur vel Autumnales, vel Vernaes: quique alia tempestate subnasci videntur, ad eam tamen relegantur, quam proxime contingitur. ibid. Hinc de ipso Æquinoctio, ubi dicitur, statim ad amissum non intelligendum. ibid. Nam aeris quadam temperie ita allicuntur aliquando, ut maturius invadant; & e contra. ibid.
 Autumnales, intra duorum mensium spatium & nomen, & Epidemicorum naturam, omittunt. ibid. Exori Augusti mense, sæpe intra unius mensis limites concluduntur aliquando, ut Cholera; non nunquam ad Hyemem excurrunt, ut Dyssenteria, Quartana, &c. ibid.
 Vernaes quo tempore se ingerant, & cursum absoluant. ibid. Maturæ h. e. Januario invadentes, circa Æquinoct. Vernalium ad statum perveniunt, dein imminuti circa Solstitium æstivum, fere evanescent; ut Morbilli & Tertiana Vernaes, quæ licet serius paulo, ut Februario, emergant, tamen circa Solstit. Æstiv. pariter se subducunt. ibid.
 Alii interim Vere orsi non nisi sub Æquinoct. Autumn. statim adipiscuntur, nec ante brumale frigus vertuntur in fugam, ut Pests & Variolæ. ibid.
 Morbi Epidemici varii Annorum 1661. ad 1675. vid. Constitutionum Genera quinque.
 An. 1677. ab Auctore propter Morbos ipsum eo tempore cruciantes, non describuntur. 40.
 Morborum Epidemicorum Historia ex quonam eorum genere addisci queat. 2.
 Morborum Variorum, qui a specificis aeris alterationibus oriuntur, species tradere impossibile. 3.
 Observationes aliquos annorum succedentium, quo fine, in humani generis emolumentum, ita tradiderit Auctor. ibid.
 In Morbor. Epidemicorum generatione Natura quomodo ludat. 15.
 Morbi fientes dicuntur Auctori, qui nullum adhuc certum induerant Typum. 37.
 ab Humoribus depravatis, ex Spirituum ἀταξία, in Hysterica Adf. diuturna. 91.
 Infantum. 110.
 Inflammatorii plurimi, verno tempore, Lond. Ann. 1665. post hyemem frigidam, & siccum gelu, grassantur. 11.
 Morbi Intercurrentes seu Sporadici vocantur, qui non a causa adeo generali, sed ab hac aut illa peculiari sanguinis inflammatione, ex particulari corporum ἀνωμαλία, seu intemperie, producta, oriuntur, plures simul non corripiuntur.

ut Epidemici; nullo non tempore, quo Epidemici grassantur, indifferenter invadunt, & Annis fere quibuslibet occurrunt. 1. 102. confer. 33. 34.

aliquando sunt Essentialiales; aliquando Februm Stationariorum Symptomata, five Affectus quidam hos Morbos omnino referentes, & Febris Stationariis supervenientes, modo sunt. 34.

distinguntur quatenus Essentialiales vel Symptomati, quo Hi talia habent Symptomata, qualia Febris Stationaria, quarum Accidentia sunt, habere solent. ibid. x. Illi vero quolibet Anno pari modo adgrediuntur, nec ali quid commune, cum Stationariis istius temporis, habent. B. Symptomata habent perspicua, nec aliis natura quatuordecim obscurata. 7. Sui Invasionis tempore tandem quoque dignoscuntur. ibid.

Morbi Essentialiales si fuerint, & aliquis eos eadem Symptomata tantum esse voluerit, considerari modo poterunt, ut Symptomata Februm ad quas spectant proprie, & quae semper ac necessario talia Symptomata producant. ibid. Exempla in Angina & Pleuritide. ibid. Essentialiales a peculiari sanguinis inflammatione cum pendere videantur, curari poterunt eundem refrigerando & comperando, cum materiam morbosam eliminando. ibid.

Symptomata si fuerint Stationariorum, aliquam Constitutionem spectant, tum ex his Febris per accidens tantum, & non necessario, producant. ibid. Symptomati si fuerint, curantur ista Methodo, qua Febris cujus Symptomata sunt: si enim ad Anni Febris curationem non attendamus, cum egrum di- scrimine ingenti erramus. ibid.

Morbi Intercurrentes ut Pleuritis, Angina, &c. Febrim pro Morbo primario habent: & reliqui Affectus, a quibus hi Morbi nomen mutantur, tamquam Symptomata considerandi, quae, pro materia Febrili modo criseos, parte in quam materies ruit, variant. 33.

Morbi Historia. vid. Historia Morbi.

Natura non ex speculatione naturae principii corporis, sed ex Observatione ex- quisita quatuordecim Morborum, & eorum, quae ex Juventutis & Ledenibus sequuntur, tum & Remediorum, atque Medendi Methodi, qua utimur, tan- dem diligenter inter se collatorum. 108.

Morborum causas generales binas putat Auctor; particulas nempe Aeris sangui- ni peregrinas, ipsique admittas; cum humorum fermentationes, nec non Pu- trefactiones humorum, ultra modum retentorum. 1.

Curaciones non ad Essentialiam eorum naturam, sed ad causam ipsorum magis generalem, a nobis dirigitur; curandi Methodum variantes, vel pro indicio Naturae spontaneo, vel Experimenti filium insequentes: Et fit hoc, quoniam essentialiam Morborum differentiam ignoramus, & communem causam, quae in Acutis sanguinis inflammatio, in Chronicis indigestio est, ean- dem cognoscimus, nequaquam Specificam humorum depravationem, ex hisce pro- gramam, percipere idonei. 129.

Historiae, eorumdem Phenomena continent, ab Auctoribus ex Hypothesew officina deducuntur, maxima parte. 77.

Acutorum Historia quare ab uno homine, imo decem, non facile tradatur. ibid.

Phenomena, an a curandi Methodo, an a Morbo ipso, perscrutandum est. 42. 43.

Species quaelibet, aequae ac animalium aut Vegetabilium, affectiones sibi pro- prias, ab essentia sua promanantes, sortitur. 12.

Morbili ex Epidemicis Vernis Januario plerumque invadentes, circa Aequi- noct. Verni statum adque, ingravescentes, adpetente Solstitio Aestivo, fe- re dissipant. 2. 39.

Morbili Infantes plerumque adgrediuntur, & qui iisdem morbiis includuntur omnes. 24. confer. 28. 145.

periculo omni vacat, si modo perite tractentur; sed Calfacientia plura mala inferunt. 24. confer. 25.

a Variolis ex Eruptionis die discerni possunt. 26.

Symptomata quanam habeant ubi ingrediuntur. 104. 145. Quenam die se- cundo. 24. Lacrymarum in Oculis effusio ingruentis Morbi certissimum signum. ibid. Maculae rubrae in pectore altera certissimum indicium praebent. ibid. Sternutatio eruptionem praecedit. ibid. Diarrhoea subivida in Infantibus den- tibus accedit. ibid. De quarto non nunquam quinto erumpunt. ibid. Eru- ptionis tempore Maculae rubrae ubinam & qualesnam adpareant. ibid. Sym- ptomata tum non delinuntur ut in Variolis, excepto Vomitu. ibid. ad 25. 145. Die sexto quid fiat. ibid. Die Nono jam in facie & undequaque dispa- ruere, delinquentes ubique quasi farinosum quid. 25. Cum Octavo die fere evanuerint, putat vulgus deceptum, quia Variola diutius manent, eos intropel- li, praesertim cum Symptomata quaedam tum temporis superveniant, ut Fe- bris, Dyspnoea, Tussis molesta. ibid. Symptomata haec a Calfacientibus pro- ducuntur, & praesertim Peripneumonia, quae plures jugulat, quam ullum Sym- ptoma. ibid. Regimen calidum autem quanam mala ultro inferat, vide. ibid.

Morbili quomodo curentur. ibid. ad 25. 145.

An. 1670. ingrediuntur Januario mense, & aucti usque ad aequinoctium vernum, omnes infantes infestant, & iisdem sensim gradibus recedentes, Ju- lio mense evanescunt, nec tota vigente Constit. nisi semel parumper compa- rent. 24. 21. Hi Variolas Anomalias Constitutionis Dysentericae, introduxerunt. 21. 25.

An. 1674. initio Januarii, specie diversa, ab iis An. 1670. ingrediuntur. 30. Omnes familias, praeter ceteris Infantes, adficientes. 28. Usque ad Aequi- noct. Vernale incredebant, dein paulatim recedentes, elapso solstitio Aestivo, evanescunt. 28. 30. Anomali magis & Typum minus servantes, respectu E- ruptionis, quam An. 1670. erant. ibid. Et utraque species Variolas nigras in- troduxit. 28. Die quarto erumpunt. 30. Differentia insuper erat, quod illi faciem primo, hi vero humeros & ceteras partes prius occupabant. ib. Des- quamatio farinosa hic quoque, ut in aliis, non aderat. ibid. Febris & Dysp- noea, recedentibus Morbilibus, accedentes, peiores erant. ibid. Periculoses erant, si male tractarentur. ibid. In reliquis, cum Morbilibus An. 1670. con- veniebant. ibid. Horum Curatio, eadem ac Morbillorum An. 1670. quod Hi- storia probatur. ibid.

An. 1676. non adeo Epidemici, longius tamen solito procuriebant, & ad Aequinoctium ferme Autumnale pertingebant; quod forte a calore istius An- ni. 39.

Morbili An. 1675. curabantur, ut alii. ibid.

In Morbilibus Symptomata ex Calfacientibus nata, quomodo tractanda. 25. Sym- ptomata, Infantibus ex Calfacientibus supervenientia, quomodo V. S. curan- da. ibid.

recedentibus Symptomata quanam, ex calfacientibus producta, superven- iant, & quomodo V. S. curanda. 25. 145.

Nigredo Exanthematum Adultis modo contingit, ex Regimine calido, eos- que interficit, nisi succurratur V. S. & temperantibus. confer. ibid.

Morbus quodam Naturae conamen, ab Auctore, ponatur. 113.

quomodo detegendus, ut ad suam familiam relegatur, quando post vela ir- regularium Symptomatum latet. 36. 37.

idem facie saepe variat pro vario medicandi processu. IX.

indole saepe emina invertitur, ultra consuetum morem, alia medendi ra- tione temere instituta, quam Natura sibi ad Morbi solutionem proposuerat. 11.

Epidemicus dicitur, qui unus idemque, certa aliqua tempestate, plures ho- mines simul adficit. ibid. Idem in eadem Constitutione, facie diversa pro ra- tione principii, status & declinatione, se ostendit; quod notare magni mo- menti. 2.

Princeps Anni vocatur, qui sub Aequinoctio Autumnali, dominium arri- pit. ibid. Circa Aequinoctium Autumnale maxime furens, Constitutioni An- ni istius nomen impertit, & reliqui tum grassantes Morbi, huius ingenio, quantum possunt, se accommodant: Exempl. in Variolis & Febre Variolosa, &c. 2. Autumno invadens, hyemis frigore pressus recedit; & Epidemici sub eo merentes tum ingravescent, donec Anni Princeps eorum vires denuo frangat. ibid. confer. 24.

Morbus novus in fine An. 1679. ex manifesta aeris crasi oboritur. 42.

Malignus qua ratione in aliam transferatur. 32.

Specificus qualis Affectio habetur. X.

Morice M. D. Febre Variolosa laborat. 20.

Mors ex Febre, cum Naturae molientis vires, Materia morbosae virtute sup- presse, fatiscunt. 1.

in Variolis Confluent. plerumque, Undecimo die, ubi ex hoc Morbo moriun- tur, contingit. 16.

Salivatione suppressa, quibusnam eum Symptomatibus contingat. ibid.

Discretis, plerumque, die Octavo, si ex hoc Morbo moriuntur, con- tingit. ibid.

Morsus Canis rabidi. 150.

Motus violentior in Gonorrhoea inflammationis Scroti saepe causa. 73.

Moxa in Podagra ad partem adfectam leviter ustulanda, ut comitigetur do- lor, Indiis Orientalibus acceptum refertur, & Europaeis novum Remedium genus habetur, licet Hippocrati jam ante bis mille annos vulgare fuerit, cum Lino crudo ad hoc uteretur. 106.

non plus praestabit, quam Linum Crudum Hippocratis. ibid. In Podagra vero incipiente tantum prodest, non ubi inveterata, vel perversa cura intus repulsa. ibid.

Mulierculae Puerperam V. S. intempestiva jugulans. 94.

Sciolarum Arsem in hominum perniciem, quam non didicere, saepe exercens. 18.

in Variolis, Confluent. Diarrhoeam sistendo, Infantium millia necarunt. ibid.

Musculus Indicis. vid. Moxa.

N

Narcotica, vid. Paregorica.

Natura Sydenhamo habetur complexus naturalium causarum, quae sic a su- premo Numine fuere dispositae, ut ad Opera destinata se certo quodam ordine, atque methodo, adtingant. 15. Generationes Rerum certissimis ubique legibus, ac artificio sibi soli intellecto, exsequitur. 66. Hec omnia altissimis tenebris obvelat. ibid. Quo profundius intuetur, eo plures ejus lusus, ingens varietas, & divinum artificium operationum ejus, quae captum nostrum superans, con- spiciuntur. 22. In Operationibus suis subtilior, quam alia quaelibet Ars. 42. Quid faciat, & quibus in Operationibus utatur Organis, quamvis deprehen- damus; modus vero quo operatur semper latebit. 89. Noctes aequae dies nostris rebus invigilat, consulitque, & sponte sua machinatur, quo egrum a Morbo reliquiis tueatur, ac muniat, 109.

optima Morborum Medicatrix. X.

Artis adminiculo ubique non indiget, ut probatur. 29. 30. In Morbis sa- nandis aliquando paucissimis, aliquando nullis Remediis indiget. X. Sed, ubi deficit, ei succurrendum; ubi effrenis coercenda, juxta Hippocratis Regu- lam, in Arte Medica primariam. ibid.

Natura in Morbi causa expellenda, saepe invita in aberrationes dilabitur, ut doctae ab adficiente Medico ei subveniatur. XI.

in Acutis Morbis producendis adeo multiplex, incerta, & delicata, ut unus hominis, imo decem, non se eorum Phenomena Graphice depingere. 77.

in Chronicis Morbis non habet Methodum tam efficacem, ad materiam eji- ciendam morbosam, ut cum eadem manus jungentes Morbum debellare valea- mus. XI.

in Febris non minus, quam ubique, methodo quadam certa, atque or- dine, progreditur. 7.

a materia febrili eodem modo exhorrescit, ac a toxicis deglutitis. 46. Sym- ptomatibus quibusnam eamque remediis, licet ingratiss, utitur, ut mate- riam peccantem, &c. excludat. 1. Quod opus, ab ignavis, saepe incerturba- tur. ibid. Quo munere aliquando nunc tardius, nunc celerius, fungitur, pro varia, qua nititur, methodo. ibid. Particularum, quae semel exercere, & exterminare, in Febris, caput sanguis, consorcium cur amplius ferre neque- at. 3.

repurgat sibi permissa, in Febris Continuis aequae ac Intermittentibus, Massam Sanguineam, spatio 107. horarum. 9. Cardiacis in debilibus adju- vanda, ut Febris spatio 107. hor. h. e. 14. die. depurationem suam absol- vans. ibid.

cum Materiam morbosam, vi sua, crasse nolie solvere, sequitur ex Febre Sanitas. 1. Si, viribus Materia morbosae suppressa, fatiscat, Mors ex Febre sequitur. ibid.

Natura in Epidemicorum Morbi. generatione quomodo ludat, 15. Et in eorum productione, quodam artificio, (manifestis aeris qualitatibus scilicet) trium- phat. 24.

in Febris Intermitt. Autumn. a Medico sublevanda, ut negotium per- gere possit. 9. 10.

plus festinare, & tempora materiae Morbi subigenda, & despumanda, ci- tius, quam in aliis, percurrere videtur. 43.

per Coric. Peruvian. quo minus materiam febrilem, tempore atropaeae adgregatam, Paroxysmi impetu eliminet, quandocum impediat. 40.

Natura Podagrae est Morbi fomitem semper in Articulis rejicere. 101.

Natura, in Variolis, per se maxime valet Morbum suo ordine ac via praesertim in junioribus & vegetis, tum secernere, tum etiam expellere. 17.

Naturae conamen quodnam Morbus dicatur Auctori. 1.

ductum in Morbis curandis, at nequaquam in Peste, sequi debet Me- dicus. 13.

intentio, qua Morbos ea solvere cupit, si alius medendi rationis institutio- ne temeraria, uti saepe contingit, invertitur, mutatur integre Morbi fa- cies, & ultra consuetum ejusmorem accidentibus stipatur anomalis. 11.

Judiciorum veritatem superflua, non nisi cum ipsa Natura intercedent. 108.

Naturae Methodus varia & adcurata, quam ad Morborum generationem adhi- bet, haerens a nemine pro rei dignitate satis observando est adsecuta. 2.

Needham (Gualtero) M. D. Auctorem ad Observationes de Morb. Acut. e- dendas instigat. 6.

Nephriticus Paroxysmus ex Hysterica Adfect. seu Spirituum nimio impeccu ver- sus Renes, omnino par & similis videtur illi, qui ex Calculo vel Arena; tamen diversa omnino Methodo uterque curatur. 94. 146. Ex Hysterica Ad- fect. quomodo dignoscitur ab eodem ex Calculo. 89. Eum aliquando mentitur Adfectio quaedam Lumbago Rheumatico dicta. 36.

Nephritis quaedam Febris Intermitt. Constit. An. 1678. &c. aliquando exci- piens, ut ipse Febris curari debebat, & V. S. aut aliis evacuationibus exas- perabatur. 76.

in Podagra inveterascente, in statu vel declinationis, Paroxysmi generalis, vulgare Symptoma. 105. Quid tunc agendum. ibid.

Nicotianae fumus, in Ileo, inflatus specie Enematis, praestantissimum reme- dium. 114.

Nigredo in Morbilibus. 25.

in Variolis Anomal. Constit. An. 1670. in subiecta carne, sub Vesiculis ni- gris quasi ambugis, conspicitur. ibid. Superatur malum in Nobili agra Hy- drogala, Vino Canarino, & Paregoricis. 26.

An. 1674. tanta, ut Pusula fuliginem aequarent. 30. Sed usu Spiritus Vitrioli diluti malum superatur. 31.

Discretis An. 1760. in externis crustis, ultimis diebus adfuit. 25.

Nigredo in Variolis Regularibus An. 1767. in Pusularum summitate, acicula capitis instar, inter Symptomata Anomala, adfuit. 16.

Nodus narius applicandus in Hysterica Adf. Puerperarum, ex immodico Mensum fluxu. 95.

Nutrices in Variolis, quam saepe errant, nemis officiosa, ubi caloris gra- dum, Expulsionis tempore, requisitum definire voluit; cum res illa ea- rum judicium superet, propter ea, quae consideranda, & sagacem Medicum expostulent. 87.

O

Objectiones Dogmaticorum ab Auctore solvuntur, de egris Lento, in Vario- lis, primis diebus adfigendis vel non. 85.

Observationes Morborum Epidemicorum, aliquos Ann. succedentium, quo fine, in humani generis emolumentum, ab Auctore traditae. 13.

sive Calus. vid. Historia singularis.

particulares, in Medicina, non magnam adferunt utilitatem, praesertim quae ad fidem Medicamentis quibusdam conciliandam, instituta. X.

Obstetrix rudis, vel iactabunda, quomodo Puerpere ledere possit. 94.

Obstructiones Mulierum dictae, ea Methodo ac Hysterica Adf. sanantur. 92.

Odontalgia ex Hysterica Adf. 89. 90.

Oleum Amygdalarum dulc. quasmam habeat Facultates. In Febris sine noxa potest adsumi. ibid. In Peripneumonia notha. 36. In Pleuritide post V. S.

36. Praestantissimum, in Tussi Febrili, medium. 6. Et Bechicis aliis an- ceponendum. ibid. Parce autem, sed frequenter adsumendum; & quare. ibid.

Variolarum aridarum crustis illinitur. 19. Viribus attritis subvenit. 6.

Oleum Lini seminis recens, expressum, in Pleuritide post V. S.

Ophthal.

Ophthalmiae Curatio. 146.
Opiata, vide Conditum.
Inter Opiata quoad vim ipsam nullum fere est discrimen. 38.
Opium egregia virtus & mirandi Effectus non artificis singulari, quam vocant, preparationi, sed naturae ipsius Plantae bonitati, debentur. 23.
Opium adeo praestans Medicamentum, sed in hominis periti manu, ut sine eo claudicat Medicina. ibid.
— Opiata in tribus Affectibus indicantur; in vehementi dolore; in Vomitu vel Dejectione enormi; in Insignioribus Spirituum Animalium Affectibus. 40.
— Cardiacum est, ornatum fere in Natura praestantissimum; neque tantum somno conciliando, demulcendis doloribus, ac Diarrhoeae sistenda inservit; sed majora praestat, quam ab ullo Remedio facile speratur. 23.
Ordo quo Morbi Epidemici Constitutionis An. 1661. &c. Tertianae Febres sci-
licet, Variolae, Quartanae Febres, & Continuae se mutuo insequuntur. 3.
Os exulceratum post salivationem Mercurialem, nullis Remediis leniendum. 80.
Et quare? ibid. Sic & sponte evanescent, ubi quare liberiori commissus ager.
ibid. Si tamen ferri nequeat, quid agendum. ibid.
— Os exulceratum est Symptoma totius curae Salivationis molestissimum. ibid.
— Oscitatio matutina in Podagrycis jam multum eam passis, quid efficiat. 109.
Ovaria Foeminarum, vid. Testes.

Palpebrae in Variolis Discretis jam maturantibus, ita instantur, ut ager luce aliquando privetur. 15. Quod & ante hoc tempus non numquam, ob numerum Pustularum, contingit. ibid.
Palpitatio Cordis ex Hysterica Affectu, quassam praepressis vexat. 89.
Paludosa loca Febrem Quartanam procurare possunt. 121.
Panatella in Dysenteria. 22. 23.
Paracanthesis, in Hydropse, non minus, quam Vesicatoria, periculi infert. 109.
Paralysis ex Vini usu immodico. 103.
Paregorica in Affectibus tribus indicantur. 39. 86. Ubi exhibenda, Remedii vis & repetendi vices, cum Symptomatis magnitudine sunt conferendae; & quare. 39.
— quoniam modo sutissime exhibenda, ut definiatur dos. 86. 87. Ubi frequenter exhibentur, intra singulas doses, tantum spatii interjiciatur, ut, quid prius praestiterit, ante noscamus, quam aliam repetamus. 39. 86. 94. 147.
— nimis saepe repetita Digestiones vitiant, & Functiones naturales debilitant. 94.
— exhibenda plerumque post Purgantia, cum, vel mississima haecce, tumultum excitent. 10.
Paregorica in Cholera Morbo post ventriculi ablutionem. 21. Quid, in initio, mali praestet. ibid. Post horas X. XI. Vomitus & dejectionis, frigiditatis extremis, Medicus acerbissus illico exhibeat: atque mane & sero aliquamdiu in iis continuandum. 21. In Cholera Morbo An. 1676. fortiora, & frequentiora solito, requirebantur. 39. In Chorea Sancti Viti post Catharsin. 113. 145.
— in Colica Biliofa Cathartico, ubi Vomitus tanta, ut purgans retineri nequeat, sunt praemittenda; & certo temporis intervallo. 26. Post Catharsin, & quolibet die a purgatione libero, mane & sero exhibenda. 26. Post V. S. 26. 147. Post Vomitorium ex Zythogala, quando. 26. Quandonam, aliis quibuslibet omissis, praemittenda. 27. Rei Exempl. traditur. ibid. Continuanda adhuc post usum Cathartico, sed largiore dosi mane & sero, donec cessavint Dolores; nec ulro adsumere tutum. ibid. Et nisi dolor summus adsit, sufficit mane & sero adsumere; si plus requiritur, qua ratione caute perendum. ibid. Ad dolorem recidivum expellendum. XI. In Colica Hysterica, Ad moderandas Spirituum perturbationes omnino requiruntur quavis vividis vomitu rejiciatur materies. 27. Ubi Evacuationes praemittenda erant, minori dosi efficiunt post has, quod prius majori non valebant. 27. 93. 147. Coma, quod a tumultu, quem Purgantia in Febricitantium sanguine excitant, amovitur; de quo Auctor nondum cogitaverat, cum Febre Comatosa Enemata praescribebat, Purgantia exhibere non ausus, 112. In Comatosi Affectibus Variolas praecedentibus. 86. In Diarrhoea. 23. In Dysenteria, in principio. 22. Infantibus qua dosi exhibenda. 23. Diu hic usurpata, non nocent adeo ac in expertis credunt. ibid. Diebus a purgatione liberis, mane & sero, quare exhibenda. 22. Post Cathartica singula, sed temporis, quam aliter, quare exhibenda. ibid. In Dysenteria praestantior, quoties de die exhibenda. ibid. In non Epidemica, omissis Evacuantiis, tuto exhibetur. 23. In Dysenteria Febris novae Epid. ex Torminibus ventris orta, quomodo exhibenda. 114. In Febr. Contin. post Vomitorium. 4. In Febre Dysenterica, Purgationibus interjecta, nocent. 24. Ea curata, languentibus viribus, ut praestem in Hysterici, quare conducant. ibid. Quoties vero & quando exhibenda. ibid. In Febris Epid. An. 1673. ad 1675. non facile in usum erant revocanda, ob stuporem comitem, nisi Diarrhoea periculum inferat. 30. In Febre Epid. nova ubi Tormina ventris & vomitus adsunt, post Cathartica, qualia. 114. Diacodium tamen praestetur. ibid. Si Purgantia non adsumta, hora somni non danda; & quare. 112. In hujus exitu, ad expellenda Symptomata leviora, ab evacuationibus repetitis excitata. 115. In Febribus Intermitt. p. Cathartica quare exhibenda. 10. In Febre Scarlatina Infantum quando exhibenda. 34. In Febribus turtius & certius, post Purgantia, officio suo funguntur. 115. Post Emetica in Febribus Vernalibus danda. 8. In Haemorrhagia Narium, quando, & quare. 38. In Hydropica, ad tumorem Abdominis, post aquas expulivas superandum, qua ratione exhibita. 108. 109. In Hysterica Affectu, si Chalybis usus corpus perturbet. 92. Curationis hujus initio, quare & quando. 91. 93. Ubi Dolor vel Vomitus, Paroxysmo urgente, quamcumque circumspiciunt exhibenda; & an ipsi Evacuationes praemittenda vel non, & quando. 93. In Vomitu enormi illico exhibenda, pro ratione Symptomatis. ibid. Forma solida, potius quam liquida, quare exhibenda. ibid. In Vomitione hac ubi adsumuntur, quiescendum summopere. ibid. Post Vomitionem superatam, mane & sero post paucos dies continuanda. 94. Post V. S. & Catharsin, si haec requiruntur, multo minori dosi efficiat, quod prius majori non perfolvisset. 93. 94. 28. In Ileo, ante Purgantia, quando exhibenda. 114. Purgantibus exhibitis. horum operationem deorsum, licet paradoxon videatur, adjuvat. ibid. Casu confirmatur. ibid. In Lochiorum suppressione ex Hysterica Affectu, sanda senel, ubi alia non juvant. 94. Et Emmenagogis addi possunt. ibid. Sed non ulro repetenda, ne nimis obstipens. ibid. Verum ad Emmenagogos redeundum. ibid. In Mensium Fluxu immodico omni nocte sumenda. 95. In Morbillis omni vespere, ad Tussim Infantum qualia. 21. In Nephritico Paroxysmo, post V. S. & Enemata. 132. In Nephritide ex Hysterica Affectu fere sola conveniunt. 94. In Nephritide ex Podagra diuturniore. 105. In Phrenitide non in initio, sed quo tempore, & quam larga dosi, propinanda. 6. Formula horum. ibid. In Phrenitide a Variolis quibuslibet. 145. In Podagra inveterata si dolor intolerabilis. 106. Post Purgantium usum in Podagrycis Calculo laborantibus, id efficiunt, quod haec Cathartica tuto adsumantur, contra quod ante censuerat Auctor. 131. In Rheumatismo, vespere post Purgationes, quare exhibenda. 36. 43. In hoc Morbo frequentioris Vene sectionis causa esse possunt, quia figant Morbum, non tam facile dein Vene sectioni cessurum. 36. Hinc vitanda per omnem Morbi cursum, quamdiu Vene sectione tantum curatio expectetur. ibid. Neque in vigore Morbi Affectu promissam praestant. ibid. At tamen tempore didici Auctor quoque, ipsa Morbum non figere, si Cathartica saepe iterentur, post tertiam V. S. 43. In Tussi Epid. 1675. non sine periculo exhibebantur. 31.
Paregorica in Variolis, ubi Alvi fluxus, Dolores atrociores, Spirituum motus inordinatus Vomitus enormis adsunt, praecipue sunt exhibenda. 87. Adultis tantum. Infantibus autem non, exhibenda. 18. 31. Infantibus equidem non ita conducunt, quia somnolenti &c. nisi periculum adsit. 86. confer. 18. Quando ergo exhibenda. 86.
— Anomalis nigris exhibenda. 26. 31. Omni nocte quamdiu exhibenda. 31.
— Confluent. adeo Specifica, ac Cortex Peruv. in Febribus Intermitt. 86. — glenham Opera Medica.

Et quare. ibid. Spiritus consopiant aliquando, licet non dormiant agri, & hoc sensu profunt. ibid. Sed ad Spiritus compescendos non juvant, ni ager e lectulo eximatur. 87. Pacato sanguine. 19. Eruptionem perficiunt. 18. Somnum conciliando Phrenesin avertunt; Tumorem partium requisitum, ut Faciei ac Manuum praesentem, promouent & protrahunt, ac certiorum illum, & diebus requisitis majorem, praesent. 87. Salivationem pra aliis promovens, nec non suppressam revocant. 18. 19. Et si haec ad horas aliquot iis quasi sistitur, mox felicius & magis cocta resurgit. 18. 87. Et salivationem licet suppressarent, tutius esset illud ferre, quam a Narcoticis abstinere. 87. Post V. S. in Mitsu, vel spuo sanguinis in hoc Morbo requiruntur. 13. Adultis utiliter sed moderate, post plenam Eruptionem, ad Morbi finem usque exhibentur. 18. 145. Missa necessitate alio tempore exhibendi, sexta nocte ab invasione danda, & sic omni vespere ad decimum septimum diem, & ulterius. 87. confer. 145. Ratio hujus. 87. Hora vero sexta, vel septima, vespertina sumenda. 18. Undecimo die temporis, h. e. hora quinta, quare propinanda. 87. Aliquando bis de die, aliquando ter, ea exhibere opus. ibid. In Infantibus non modo non conducunt, sed & Diarrhoeam iis necessariam, suppriment. 13. confer. 146. 147.
Paregorica in Discretis ubi inquietudo, & vigilia, Phrenitidem minuant, usu veniunt. 18. 145. Faciei subsidentiam & inter Pustulas pallorem, ex calefactionibus, & sudoribus nimis, ortum, tollunt. 19.
Paregoricum Auctoris in Dysenteria. 22. 23.
Paroxysmi Februm Intermittentium descriptio. 7. Ejus tria diversa tempora. ibid.
Paroxysmorum Februm Intermitt. reduplicatio ex duplici causa, quarum una efficit, ut adventitius antevertat primum; altera ut primum insequatur: & quare. 8.
Paroxysmus in Febribus Intermitt. redit, quia, eliminato per sudores ultimi Paroxysmi haecce, quod diebus liberis accumulatum fuerat, de novo adgregari talis materies incipit, diebus liberis, donec eam Natura Paroxysmi impetu iterum eliminat. 40. confer. 41. Qua de causa revertatur statim temporibus. 7. Sed cur in una Febre Interm. plus temporis, quam in alia exigat, antequam revertatur, ignorare se, cum aliis, fatetur Auctor. ibid.
— Corticis Peruviani ope sensim, non illico, opprimendus. 9. 10.
— Podagrae cur ab Evacuantiis excitetur. 101. Non est unus, sed ex serie Paroxysmorum constans Paroxysmus. 100. 102. 105. 150. Et brevior aut diuturnior est pro aetate agri; jam ad quatuordecim dies, jam ad duos menses ascendens, jam non nisi astate recedent. 100.
— Irregularis quomodo, ab Regulari, differat. ibid.
— Regularis major recedens, pruritu vix ferendo, furfurum decidentia, & desquamatione, pedem adficit. ibid. Quo mitior fuerit, eo citius redibit, & si sevir fuerit, non nisi post annum revertitur. ibid.
Particulæ, quas seculi excernere & exterminare capitis Sanguis, cur a Natura ferri amplius nequeant. 3.
Partus laboriosus in Apoplexia Speciem Puerperas Hystericas haud infrequenter conjicit. 89.
Passio Hysterica, vid. Hysterica Affectio.
Pauperes a Gonorrhoea virulenta saepe liberati fuere sola Jalapii radice. 78.
Pectoralia Medicamenta vulgaria Tussim quare non curare possint, quin potius iis tempus teratur, & Tabes aliquando inducatur. 42.
Pedes in Podagra Materie peccantis sedes sunt genuina; haecque si alias occupat partes, quid indices. 100. In Podagra irregulari Paroxysmorum intervallis, vix unquam doloris sunt expertes, & ubi ambulatio minus dolentes fuerint redditi, morbi fomes Visceribus periculosius imminet. ibid. In Podagra Paroxysmi recessu, pruritu vix ferendo, furfurum decidentia, & desquamatione, adficiunt. 99.
Pellicula in Variolis Anom. Confluent. An. 1670. alba, resplendens, undecimo die faciem obtegens, describitur. 25.
Penis curvatura, vid. Curvatura Penis.
— Dolor. vid. Dolor Penis.
— Tumor in Lue Venerea quomodo discutendus. 149.
Πεπτιχα Remedii idem ac Digestiva.
Peregrinatio in Regiones Australes cur plures Morbos sanat. 102. 103.
Periculum in Variolis pendet ab Exanthematum multitudine & e contr. 84.
Ratio. ibid.
— Periodus Februm tum Continuarum, tum Intermittentium, comprehendens effervescentiam, qua Natura eam materiam expellere solet, eadem est. 9.
Peripneumonia Notha est Febris Intercurrentis Species, Symptomatis Peripneumonici pluribus ditata; quotannis emergens, initio Hyemalis, vel saepius ea exeunte, nascente Vere; usque ad Ver altum persistens, si Morbi materia copiosa fuerit. 35. 110. 144. A Febre Hyemali, ut ex causa & Symptomatis liquet, non nisi gradu differt. 110. Habituosae ac crassae, virilem aetatem adsequuntur, sed praesentem praetergressas, Spiritus Vini multum addictos, adgreditur. 35. 36. ejus ratio. ibid.
— oritur a Colluvie pituitosa in sanguine adgesta & in Pulmones determinata. 36.
— cum Asthmate sicco in glutibus conveniens, in multis tamen differt, ut Febre, qua in Asthmate adest. 36. 144.
— cum Febre incipit, quae ex frigore & calore nascitur. 35. 36. Verum. Rarior, & inflammationis signa minora ac obscuriora, quam Peripneumonia vera habet. 350. 144. Aliquando ob arctatos Pulmones non percipitur haec. & abesse videtur. 35. Febris pro Morbo primario habenda; & reliqui Affectus, a quibus mutatur Morbus, tamquam Symptomata, quae a materia febrili, a modo crassos, a parte in quam haec eruit, pendunt. 33. 35. Hinc consideratur tamquam suae Febris Symptoma ex Materia febrili in Pulmones deposita; quo sensu ita gradu majori a Pleuritide differt. ibid.
Peripneumonia Notha Symptoma quoniam habet, exponitur. ibid. Qualia Signa habeat Pathognomonica. 112. 144.
— Curatur. V. S. ut Sanguis a Pulmonibus revellatur; sed in omnibus non est repetenda. 35. Quomodo in lecto potius instituenda. ibid. Tum, sicut ac in Peripneumonia vera (36.), Catharsis post V. S. crebrior, in iis praestetur, ubi non repetenda V. S. 35. confer. 144. 105. Dieta refrigerante. 35. 36.
Peripneumonia Vera a Pleuritide tantum differt, quod Pulmones universaliter adficiat. 36.
— & Pleuritis essentialis eodem modo, V. S. scilicet & refrigerantibus, curantur, non adhibita tamen Catharsis, ut in Peripneumonia notha. ibid.
— in Morbillis, lethalis magis quam ullum Symptoma, a calefactionibus inducitur. 25. V. S. curanda etiam post Morbum. ibid.
Peripneumoniae, desinente Vere, unde. 8. Verno tempore, Lond. An. 1665. post Hyemem frigidam, & siccu gelu, grassantur. 11.
Pertussis seu Hooping Cough. Infantum V. S. plus quam ullis Pectoralibus, juvatur. 25.
Pestilentialis aeris Constitutiones, vid. Constitutiones Pestilentialis aeris.
Pestilentialis Febris, vid. Febris Pestilentialis.
Pestis, & Anthraxis, nec non plerique alii Morbi, Natura Medicatricis Instrumta sunt. 1.
— Epidemica ubi invadit, ex Anni parte, quae inter Per & Aestatem ambigit, h. e. surgente Anno, exoritur. 11. Et quare. ibid. Crescente Anno in. valet, ut circa Autumnale equinoctium exulso attingat; dein collabescit, & Brumali frigore evanescit. 11. 12. confer. 2. Raro alia tempore ingreditur, aut tum non multum debacchatur. Hinc ubi Sporadicus modo Morbus existit, nullo tempestatis discrimine paucos adffigit. 11.
Pestis cujus Essentiae sit Auctor ignorat. 12. Sed ab Inflammatoria dicitur ortum suum ducit; quod argumentis evincitur pluribus. 11. 12. Videturque Febris peculiaris ac sui generis, ab inflammatione particularum Spirituum Sanguinis. 12. confer. 13. Et pendet ejus ferocia a majori, vel minori, subtilitate hujus inflammationis. ibid. Ubi inflammatione minori existit, Pestilentes Febres producit. ibid.
— ab occulta plane aeris quadam crasi pendet. 11. Sed ut excitetur & propagetur, non modo aeris dicitur, seu causa communis, verum & alia procatartica nimirum praeterea susceptio, a pestifero aliquo corpore, accedat oportet. ibid. & 12. Quin alias vicina loca haud ita immunia se praestarent. ibid. Ubi vero locum quemdam devastavit, non amplius vel fomite, vel personali consortio indiget; verum quemlibet vel semotum, modo corpus ad adflatum excipiente paratum habeat, aer, tum laborantium halitibus, tum mortuorum cadaveribus, contaminatus, inficere valet. 11.
— tem.

tempore Invenienti ac Declinationis sua habet. 12. E genere Epidemico-
rum Vernaliū usque in brumale frigus protrahitur. 2. Frigore brumali do-
matur. 11. 12. Neque unquam hujus Morbi durescit finis, si Anni Vicissitu-
dines, & aeris mutationes in ejus virus nihil imperii exercent. 12.
Pestis Britanniam vix frequentius, quam post Annorum circiter quadraginta re-
vulsionem, summo vigore, adorsus. 11.
Italiam occupans, excepta Hetruria. 12.
An. 1665. Londini debacchari incipit, circa exitum Maji & initium Junii
postquam Febris Pestilens jam a Mense Martio grassata fuerat, & invale-
scens quotidie circa Aequinoct. Autumnum statum attingit, sumque sensim reced-
dens, brumali frigore fere delecta, circa Ver An. 1666. omnino suis abolita,
remanente adhuc Febre Pestilenti. 11. Et, quod notandum, idem An-
nus mississimus & saluberrimus fuit; qui nempe a Peste immunes erant,
numquam saniores fuerant; & qui ab ea sanati, postea saniores quam ante
erant. 12. Hujus exortum praecesserunt, per aliquot septimanas, Pleuritid An-
gin. aliaque Adfectiones inflammatoriae. ibid. Unius septimane decursu circi-
ter 8000. hominum delevit. 11. confer 14.
Pestis cur tam cito necat, si Natura non concedatur tempus febrilem motum ex-
citandi. 12. Sed non nisi circa initium ejus, vel incrementum seu statum,
tam subito necat. ibid. Et quare. ibid. At non nisi in ejus popularis, ac
funeste quidem, exordio, hoc contingit. ibid. Primis enim mensibus, dicta
Pestis omnes inopinantes fere exstinguerebat; adolescens vero non necabat, nisi
Febris prius & aliis Symptomatibus laborasset. 22.
Pestis ingruens Symptomata quanam habeat. 12. Raro circa Febris praesentiam
ingruit. ibid. Aliquando tamen Tumores erumpunt, Febre non praegressa; li-
cet Auctor suspicetur semper horrorem praecessisse. ibid. Febris quoque aliquan-
do non adparet, dum perit aeger. 32. 33.
non nullos adeo leviter aliquando adficit, ut per publicas plateas ambula-
re queant. 12.
Curatur vel Natura, vel Arte. ibid. Natura alia ratione Pestem veram,
alia ratione Febrim Pestilentem, curat; quos modos nos quoque insequi
oportet. 13. confer 10. Si sua Methodo Natura pergit, nec aberrat, Pestem
veram per Abcessum, & Febrim Pestilentem per Diaphoresin, sanat. 13.
Abcessus illi sunt Tumores Glandularum, Bubones dicti in suppurationem ab-
euntes. ibid. Sed hunc Curationis modum sequi non possumus, quia illa A.
postemata. ante nostra, excitare nondum valeamus. 13. 14. Cardiacis enim tu-
moribus non tentatur. 13. Sudores quoque multum obsunt, licet post illos in
confectum aliquando veniant Bubones, cum inde saepe retroPELLANTUR incepti
bi Tumores. ibid. Et sic Sudoribus extorris plures jugulati. ibid. Nam huc
materie retropressioni, forte imputari posset, quod Malignitati adscribitur.
ibid. Hinc alia plena res hanc tentare Methodum, quana Natura sola perfice-
re potest, si non perturbetur. 13. 14. Quare, in Peste curanda, Naturae du-
ctum non sequi, ut in aliis Morbis, sed ei renuntiare debet Medicus; cuius
Effatus neglectu Pests Tumulus non parum fuit adausus. 13.
Pestis Artis, non Naturae, Methodo ubi curari debet, dupliciter id fieri potest;
vel per V. S. vel per Sudores. ibid. Pests equidem Alexiterium proprium in
Natura sine additu adhuc delitescit; quare eadem nisi ratione quadam Me-
chanica tolli potest. ibid. Per Venae sectionem Curatio. ibidem. Haec, ubi insti-
tuitur, debet fieri in Lecto, & quare. 14. Debet dein fieri nondum adparen-
te Tumore. 13. 14. Et tandem debet esse larga; psica enim, vel tumor jam
conspicuo, ubi instituta, semper damnosa fuit, & Phlebotomia, ita perverse
administrata, contrariae sententiae Patroni, inter quos Diemerbroekius, argu-
menta sua debent. 10. Plures Doctores V. S. hic instituendam, jam pridem
consueverunt, qui recensentur. 13. Sed cum uno L. Rosalio totum Curationis
negotium, in copiosa V. S. collocavit Sydenham. ibid. Et hujus Methodi E-
xemplum singulare in Castro Dunstari. ib. Et in Peste Lond. quoque, nisi li-
beralior foret V. S. potius nocebat. 12. Curatio per Sudores, si per V. S.
anteferenda videtur Sydenhamo; tum quia non eque vires proferunt, tumque
Curationis modum infamiae periculo non obicit. ibid. Sudor spontaneus qui-
dam valde salutaris. 14. Quare hic Morbus Sudoribus facile curetur, & alii
Morbi maligni peiores fiant? 32. Quomodo dirigenda illa Cura Sudatoria.
14. V. S. prius semel, instituenda. ibid. Sudor continuus & prolixus requiri-
tur, non interpolatus. ibid. Reselluntur Diemerbroekius & alii, quod Dia-
phoresin interpolandam suadeant. ibid. Notatu dignum Auctor habet, quod,
diaphoresis, materia morbosica versus ambitum corporis exporrecta, illico Excre-
tiones Venetriculi sedentur, adeo, ut Medicamenta adsumpta retineantur: quod
Historia confirmatur. ibid. Per Sudorem cura quasnam adhuc dum habeat dif-
ficultates. 13.
Pestis & Febris vere Maligna specie non, sed tantum gradu discriminantur. 11.
ab Igne Sacro quomodo differat. 12.
Pestis Historiam Auctor scribit, quod alii qui adjuvant toto tempore Medici,
de eo nihil divulgabant. ibid.
ad Pestis Prophylaxin non conducens calida, ut deprædicatur; imo Vinum, &
fortiora, Alorbum advocant. ib.
in Peste, Bubones quomodo fiant propter materiam Morbi subtilissimam, &
maxime inflammabilem. 20. Ubi erumpunt bonum. 12.
Materia Morbi a Sanguine segreganda subtilissima & maxime inflamma-
toria est. 20. confer 12. Tamen Alexipharmaca, calidiora licet, auxilium præ-
stant; quatenus scilicet diaphoretica sunt. ibid. Verum illa ipsa, si sudorem
forte non moveant, pessima. ibid.
Maculae purpureae, malum signum. 12. 13.
Tumores praeumpere bonum. 13.
Sudores artificiales an Apostemata desiderata provocent? 12. Quandonam
saep funesti. ibid. Horum eruptio sine Sudore magis fuit salutaris. ibid. Ad
magnum equidem Sudorem Bubo non nunquam dispar. ibid. & seq.
In Peste per Apostematum murationem, Curatio admodum incerta ac fallax.
14.
Petechiæ & Maculae purpureae, tum Virium subita prostrata, Malignitatis si-
gni habentur, in Morbis; & solvitur ab Auctore, unde fiant. 115. 116.
in Febre nova hyemali a calefacientibus. 112. 113. In Febre Variolosa.
19. 20. A Regimine calido aucta. 20. In Morbis Acutis unde, & quid in-
dicent. 88. Pests sub adventu 154. ad 157. In Variolis Confl. unde. 115. 116.
130.
Petechiarum & Mictus Sanguinei singularis Casus a D. D. Goodall. communi-
catus. 88.
Phænomena in Hysterica Adfectione eodem solvantur modo, siue ipse Morbus
tamquam Vapores elevati, siue tamquam Convulsiones partium particularium
consideretur. 27.
Morborum Accidentalium, a Methodo curandi saepe pendet. IX.
Naturalia, qui recte perceptoris, ille Indicationes Curativas veras cli-
ciat. VI.
clara ac naturalia, utrumque minuta, Hypothesebus sepositis, ubi illorum
Historia tradenda, accuratissime notanda. IX. Hoc autem fecit Hippocra-
tes. X.
peculiaris & perpetua seorsim ab accidentalibus, & adventitiis, enren-
tur. IX. Et quare hoc ita fieri debeat. ibid.
Vid. Morborum Phænomena.
Philosophia in Medicina quid mali adulerit. 89.
Medici quanam esse debeat. 110. Moralis quid sit. 40. Naturalis specifi-
cam differentiam nullam enadere potest. ibid.
Philosophus Empirico, in Medicina, quod famuletur, demonstratur. 108.
quare nemo mortalium evadere possit. 110.
Phlebotomia, vid. Venæ sectio.
Parentitis Cardiacæ non admittis praesertim ante usum Narcoticorum. 13.
in Febre Epid. An. 1674. quomodo curanda. 29. 30. Vitrioli Spiritus hic
primas tenet. ibid.
ex Febre nova hyemali a calore lecti. 112. 113. Immo non nunquam per
se, ac non ita vehemens, ac in Variolis vel aliis Febribus, ut potius lenis sit
Delirium. 112. Ubi invaluit, nulla restant Febris indicia, sed pulsus tandem
pessimus fit. ibid. Et Appetitia adesse videtur, si lingua albedinem excipias.
113. Quomodo regimine refrigerante & abstinentia a lecto, avertatur. ibid.
Calefacientibus induta, curatur regimine refrigerante, Capillorum Abrasione.
ibid. confer 19. In Febre Variolosa ex sudoribus nimis a Regimine calido.
19. 22. Sudore coacto, in Febribus, quandonam excitari queat. 33. A Venæ
sectione neglecta in Febribus, quando. 3. Tamquam Symptoma Febrim
Continuandū oriatur: quanam ejus signa; qui curetur &c. 6. Ex Lochiis
suppressis per Hystericam Adf. in Puerperis tnerioribus nimis cito surgentibus,
nascitur. 94. In Pestilenti Morbis, inferri potest, nimia vi ad sudores pro-

liciendos excitata, in iis qui difficulter sudant. 13.
Phrenitis in Variolis frequens Symptoma. 19. Sed anomalum, ex nimio San-
guinis calore. 16. Et plerumque ex calefacientibus ortum. 17.
Confluentibus, nata ex calefacientibus, Methodo contraria ut praecave-
ri, sic etiam tolli, potest. 19. Paregoricis quomodo cohibeatur & praecavea-
tur. 18.
Discretis, copiose manante Sudore, & Sponte sua repulso, oboritur. 19.
Infans meruitur ex inquietudine & Vigiliis; & tum Paregorica juvant. 18.
Mortem indicat in propinquo, ubi egritudo vehemens, urina pauca ac fre-
quens, simul adsunt. 19. Curatur unice vehemens ubi fuerit, V. S. larga,
aura frigidiore, narcoticis, ibid. V. S. quod exigit docent Hemorrhagiae na-
rium subisaneae. ibid.
omnibus, V. S. non semper indicat; sed in Distincto tantum genere, ubi
facies tumet, Pusulae magne sunt, & Regimen calidum suis adplicatum,
praecipue, ibid.
Phthisis duos fere Trientes eorum, quos Morbi Chronici jugulant, interficit. 93.
Describitur. 151. Hujus Curatio. 151. & seq.
Hydrops causa, Evacuantiæ aëvi seu καὶ τοῦ, prohibet. 109.
Phthisici Equitatione saepe sanantur. 93. Estque in iis primum Medicamen-
tum. 151.
Phymosis quomodo curanda. 79.
Pululae Chalybeatae, in Hysterica Adfectu, duplicis generis, 92.
Pululae Cochlearum laudantur. 26. 27.
Ad Diji, exhibitae semper alvum laxans. 114. In Febre nova. Epid. ubi Re-
machus Potionem non fere exhibende. ibid. Potio tamen praefenda. ibid.
Tempore quo sudor, in Tertiana Autum. provocatur, dande. 9. In Tussi
Puerorum convulsiva dantur. 42.
ex Cortice Peruviano. 40. 41.
ex Elaterio & Pil. ex Duob. in Hydrops. 107.
foetentes Hysterica. 92. Tales Ventrem minime turbantes. ibid.
Marthei loco Paregorici in Nephritico Paroxysmo, post V. S. & Eng-
ma. 132. In Nephritide ex Podagra diuturniore. 105.
Paregorica & Emmenagogae in Lochiorum suppressione. 94.
purgantes finis Apoplexiæ Paroxysmo, exhibenda, 146. In Colica biliosa,
quanam optima. 26. 27. In Fluore Muliebri. 41. In Gonorrhoea virul. 41.
78. In Hysterica Adfectu. 92. In Ileu, ex Torminibus ventris, in Febre nova
Epid. 158.
Plantæ Materia Medica omni palmam praeripuit, & omnium maxime de Re-
mediis, ad insigniores Morbos, inveniendis spem facit; & hoc quoniam A-
nimalium partes cum nostro corpore nimium conveniunt, Mineralia nimis dis-
sident: Hincque Plantæ magis explorato nobis innoscere deberent. XIV.
Plebs, a Variolis, cur minus trucidatur, quam Divites. 18.
Pleuritides, Anginae, aliaque sanguinis inflammationes Adfectiones, frequentis-
sime fuere, per aliquot septimanas, quæ Pests Londin. exortum antecesserunt,
12.
Pleuritides post Febr. Continuas, circa Veris finem, & Aëstis initium, saepe
grassantur. 13. Verno tempore Lond. An. 1665. post hyemem frigidum, & sic-
cum gelu grassantur.
desinente Vere, unde. 8.
Pleuritis Essentialis, vera, Morborum frequentissimus, describitur juxta Phe-
nomena. 34. 35. 144. Quo tempore Anni praecipuis infestis, & grassetur.
32. 37.
Quoniam, pra reliquis, adgrediatur. IX. 13. 34.
Febris pro Morbo primario hic habenda; & reliqui Adfectus a quibus no-
men mutuatur Morbus, tamquam Symptomata, quæ a materia febrili, a mo-
do criseos, a parte in quam materia vis. pendunt. 33. 35. Initio cum horro-
re, & ceteris Symptomatibus adest. 31. Cum aliis Symptomatibus progredi-
tur, & ab his, quæ ex illa prius nata, adaugetur. ibid. Et tandem pro va-
tione liberioris expectorationis, ana cum reliquis, ægri salute, minuitur. ibid.
Sed redit Heftica specie si res in Apostema vergit. ibid.
Dolorem puncturum, quo tempore adquirit, & quo Thoracis loco. ibid.
Tussim qualem habeat. ibid. Diarrhoeam unde habeat. 19. 20.
Expectoratione spui suberuenti plerumque sensim solvitur, nullo redeunte
Symptomate. 34.
In Suppurationem quandonam aberr. ibid.
Sanguinem post primam saltem vicem eductum, instar sevi liquati in su-
perficie, purulentum quasi, habet. 34. 144. Cuticula hæc tenax in sanguine,
si hinc recto fumine non profuerit, haud ita adest, & minus tum etiam le-
vaminis a Venæ sectione persenscitur. 34.
Pleuritis Inflammationi sanguinis propriae, de specifica, ortum debet. ibid. Ex
Sudoriferis, in Tussi exhibitis, An. 1679. oborta quoque est. 143. Ubi tana-
quam Symptoma Febris, ad quam proprie spectat (34.) consideratur, ex præci-
pitatione (35.) materia sua Febris in Pleuram isidem oritur, ut docet sanguis
eductus. ibid.
a subito calore, intensum frigus subito exipiente, saepe oritur. 2.
periculosior aliis Morbis, facile vincitur, & tam cito ac tam brevi tem-
pore, quam alius quidam, debellatur, si perite tractetur; quin contra, inter
potentissimas orci januas recensenda. 35.
Indicationes curativas quales admittat. ibid.
Curationis spem praecipuum ponit in Venæ sectione. ibid. 35. 36. Larga V.
S. isidem non nocet. 35. Et Diarrhoea, hic aliquando superveniens, eadem
V. S. sistitur. ibid. Haec autem quomodo instituenda, & iteranda, & ad quam
dosin, tum in Adultis, tum in Pueris. ibid. 144. Levatur V. S. ultima, si
non ante; tumque Catharticum exhibetur. 35. Notandum interim, quod Pleu-
ritis vera & Essentialis, qualibet Constitutione indifferenter infestans, repeti-
tam V. S. indicat; non vero si alicujus Febris Symptoma est, sed ratione istius
Febris tum, reiteranda modo. 32. confer. 34.
per Expectorationem materia cocta quare non vult, ut curetur, uti per V.
S. Auctor. 35. Et Pleuritis sicca ab Hippocrate quamvis damnetur, tamen
per V. S. potius quam per expectorationem Pleuritidis Curationem instituendam
suadet Auctor. ibid.
Pleuritis Dietam qualem exigit. ibid.
Medicamenta quanam ferat. 35. ad 144. Enemata non admittit, aut lenis-
sima tantum; & quando. 35.
Lecti Calorem nimium vetat; adeo quidem ut, nisi ex eo quantum potest
eximatur aeger, nec V. S. nec refrigerantia, multum proficiant. ibid.
Pleuritis a Peripneumonia vera gradu minore differt tantum, quod hæc Pulmo-
nes univrsaliter adficiat. 35. 36. Eodem tamen modo, V. S. scilicet, & re-
frigerantibus, curantur, excepta Catharsi, quam Peripneumonia vera renuit,
sed Peripneumonia notha admittit. ibid.
Pleuritis Symptomata, per accidens Febrili superveniens quibuscumque, ori-
tur ex materia febrili, adhuc cruda, in Febris initio, ad separationem debi-
tam nondum præparata, in Thoracem præcipitata. 34. confer 32. 34.
infertur saepissime ex usu Calefacientium intempestivorum, in Febribus ex-
hibitorum. 34. Vel ex Sudore, initio Febrim coacto, praesertim tempestate,
& ætate faventibus. ibid. Vel a V. S. in Febribus neglecta. 3. Aliquando ex
aëris manifesta alteratione, materiam febrilem in Pectus deponente. 32.
An. 1575. Tussi superveniens, maligna erat quam maxime. ib. Neque V.
S. praesertim iterata, ut aliter solet, ferre poterat. ibid. Nec, ultro eam ad-
mittebat, quam requirebat Febris, cujus Pleuresis hæc symptoma erat; uti
semper contingit, ubi Febris Epidemica, ex repentina aëris quadam manifesta
alteratione, in Pectus materiam deponit, ipsa eadem interim remanente; hinc
si Febris repetitam V. S. respuat, nocebit & eadem in hac Pleuritide. ibid.
confer 34.
Pleuritis An. 1675. curabatur ut Febris Constitutione, hujus, in pectus determi-
nata. 32. & confer 34.
Podagra Articularis Morbus etiam vocatur. 100. Fomitem Morbi quoque semper
in Articulis rejicit, ex sua Natura. 101.
Quoniam invadere solet, tam respectu vitæ generis, quam habitus & stru-
cturæ corporis, nec non ætatis, ac labis hereditariae. 99. Juniores admodum
occupans, initio nec Regularis, nec crudelis; sensim tamen castra metatur,
typum sibi format, & ferocissima fit. ibid. Divites plures interemit quam
Pauperes, plures Sapientes quam Fatuos. 100.
Insipientes paucos occupat. 104. Fœminas raro adficit, nisi Vetulas vel Vir-
gines. 100. 157.
pendere videtur a Concoctione, seu Digestione, tam in partibus, quam suc-
cis corporis, praecipue Nervosis siue Spiritibus, labefactata. 101. confer 103.
Caus-

Caussam habet duplicem juxta Auctorem; nempe Caussam antecedentem, quae est humorum indigestio a calore & Spirituum defectu orta; tum Caussam continentem, quae proprie fomitem Morbi constituit ortam a mora humorum in corpore (quae mora ab incoctione dicta pendet) eos aciores & quasi putridos reddente, unde calentes & exsurgentes Paroxysmum constituunt. 101. 102.

Podagra ex Vini usu immodico, oriri potest. 103.

Regulares & Typum servans quo tempore Anni, diei, ingruat, quoniam praemissa incommoda; qualem Pedis partem primo occupet; & quo ordine dein laessere pergat; describitur. 99. 100. 157. Primo unum Pedem adficere solet. 100. 157. Raro utrique Pedes in initio simul adficiuntur. 100.

Seniores ubi adoritur, nec tam immaniter saevit, nec tam statas habet Periodos, quam si aetate Juniores occupaverit; & hujus rei ratio. 99.

Paroxysmum habet vel breviorum vel diuturniorum, pro aetate aegri, vel diuturnitate Morbi; & qua ratione hoc differat. 100. Paroxysmus hujusmodi major, seu generalis, dicitur, qui quasi unus ad duos, tres, menses extendere se videtur: sed non est unus Paroxysmus, verum ex serie Paroxysmorum se mutuo succedentium, & quorum posterior quilibet prioris, & mitior, & contraxior, semper est. 100. 101. 104. 105. 157. Hoc tamen ubique servant quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur. 100. Recedente tandem Paroxysmo Pes adficitur pruritu, furfures decidunt, & desquamatio fit. ibid. Tandem evigila aegri, & adspiciunt, redeunt. ibid. Si iam vehemens fuerit Paroxysmus, non nisi post annum revertitur. ibid.

Podagra regularis Dolores habet inclementiores, quam Irregularis Podagra, verum hinc quoque Paroxysmos breviores, & Intervals inter eos longiores, & magis perfecta. ibid.

nec Juvenes nec Pueri adficiunt; sed Juvenes, qui ex Parentibus Podagricis nati, aliquid modo praesentium istius Morbi. 100. 101. confer. 157.

Podagra non Regularis seu Anomala vocatur, cujus Phenomena diversa a Regulari. 100.

salis sit vel ob perverfam Medetam, vel ob subjecti debilitatem, propter Morbi diuturnitatem. 99. 10.

describitur. 100.

Paroxysmos particulares, majorem constituentes, multo longiores habet, non ad unum vel alterum diem, sed per quatuordecim, perdurantes. 100. 157. Symptomata, diversa ab istis Regularis Podagrae, qualia. ibid.

In Paroxysmorum Intervallis jam non, ut Regularis, valetudinem concedit; sed plura mala aegrum vexant; quae mala exponuntur. 100. 157. Tandem, Natura materiem ad extremitates relegare non amplius apta, Symptomata quoad dolorem sunt mitiora, sed Paroxysmi longiores; & artuum dolor loco articulorum aegritudo quadam, cum quadam propensione ad Diarrhoeam, vexant: quae omnia ubi Articuli dolores vigent iterum recedunt; hocque alternatim. 100. Interim Morosi sunt Aegri, animo etiam contagio adfuso, sibi aliisque graves. ibid. Et ultimo, visceribus inscriptis, Materia ad extrema non amplius pulsa, vitam cum morte commutans. ibid.

Podagra quomodo curanda. 101. 106. 157. 158.

a nomine radicaliter extirpari hactenus potuit; sed Remedium adhuc inventum iri, credit Auctor. 106.

ergo, una cum ejus tractandi Methodo, ab Auctore, quoniam curare se posse non jactet, cur traditur? ibid.

quae non adgredienda tempore Paroxysmorum, sed in eorum Intervallis. 105. Nam Fomitum, seu materiam talem morbosam, habet, quae Naturae inviolabili lege semper in Articulis rejici debet, nec inde sine discrimine revellitur, aut alia Methodo, quam ea quae Natura praemonstrat foras ejicitur, cui soli permittenda, cum ipse omnino Opus sit, quod sua Methodo sola peccat. 101. 102. 105. Adeoque ipsa Materiam peccantem suo modo extirpat; in Articulis deponit, & per insensibilem transpirationem diffuset, quare nobis non licet eam, vel V. S. vel Cathartici, vel Sudoribus, ejicere. 101.

non curaretur etiam, quod Symptomata ejus coercerentur ac removerentur, cum contra Curationi hoc adversaretur. 105. Sed illis Symptomatibus occurrendum tamen est, quae falsa medendi Methodo productis. ibid. Tum & istis, a quibus leger de visa periclitatur. 105. 158. Adeoque Symptomata quaedam tamen habet, quibus in Paroxysmo occurrendum; ut propriis sunt Ventriculi languor, Tormina ventris. ibid. Sic non Podagra Regularis, sed quae mala cura exacerbata, in Paroxysmo tractanda: & quomodo. 105. 158.

Podagra incipiens per Morx, vel Lini crudi, Urtionem, tantum levatur; sed non attingit hoc caussam Morbi antecedentem, b. e. Indigestionem; nec in Morbo inveterato, aut perverfa cura intro repulso, juvabit. 105.

ubi radicaliter curanda, Cognitione indigestionibus subtilis, propriis consulendum; ita tamen, ut interim, data occasione, quae humores acres leniunt, iidem adhibeantur. 102. 126. confer. 158. Hinc curatu perdifficilis, quia duabus Caussis, admodum contrariis, ut quae huic proficiat alteri obstat, obviam eundem est; nempe Antecedenti, seu Indigestioni humorum; cum Continenti, seu Humorum calori & exsurgenti, quae proprie fomitem Morbi constituit, dum Articulus obsidet, vel quae post Paroxysmum adhuc in sanguine delitescit, separationi inepta. 101. 102.

ergo ubi sananda, exigit Concoctionum restaurationem; sanguinis, & partium, roborationem; quae omnia totius corporis Habitus, immutationem & reintegrationem semper ponunt. 101. 103. 104.

Evacuantibus non attingenda, & quare. 101. 102.

Vena sectio quantum noceat. ibid. ad 101. Cathartici quantum laedat. ibid. Verum in istis qui Mictu cruento eu Calcule Renum laborant, Manu omni Septimana est concedenda. 131. 157. Sudorifera quomodo obfint. 101. 102. 157.

Podagra ut curetur, Corporis habitus omnis alio tradendus est, atque homo integer, quasi nova incude, reficiendus; hinc diu, constanter, & assidue, in Digestivorum usu continuandum, ut Coctionum robur, & partium firmitudo, pedetentim reducatur. 103. confer. 104. 107. Digestiva haec, quid sint. 107. Quoniam salu suppeditet Materia Medica, & qua ratione usurpanda. ibid.

Pharmacis solis non curatur, sed Dieta seu victus ratio concurrere debet. 103. Haec in Podagrae intervallis, Cibi Quantitatis, Qualitatis, Temporis, respectu, qualis. 103. Respectu Lactis solius usus. 103. Respectu Potus, ut Cerevisiae, Vini, 103. 104. Aquae purae. 103. Potus Dietetici seu Decoctionum ex Lignis. 104. 104. 158. Somni, & Vigiliarum, temporis. 104. Animi adfessus. ibid. 104. 158. Respectu Motus & Quietis. ibid. Respectu Veneris usus. ibid. 158. In Podagrae Paroxysmis, respectu Cibi & Potus quantitatis, ac qualitatis, tum Exercitii. 105. 158. Ubi aegri suam attigit Morbus, ob Paroxysmi, primo insule, atrocitatem, Exercitium, ceterum adeo salutare, vetatur; & decubitus in lecto, ad certum tempus, una cum tenui Dieta requiritur. ibid. Quandonam vero, in Podagra inveterata Paroxysmo a lecto abstinendum, ut Mors vitetur; molestiam potius relaxationes sustinendo, & dolorem, amarissimum licet Naturae remedium, ferendo? ibid.

Podagra inveterata Diarrhoeam excitat, si materia in Artus non eliminatur; quomodo tum occurrendum. ibid.

q Cathartico, etiam leni, accersetur. 131. Minutans vero sum Paroxysmus, ob Purgantia data, Laudano reprimitur: Hocque nondum animadvertit Auctor, cum Tractatu de Podagra scripsit. ibid.

per Metastasin aliquando, licet raro, materiem Morbi in Pulmones deturbat, cujus caussas Tussis brumalis, ex frigore in Paroxysmo suscepto: in quo casu nulla Podagrae habenda ratio, sed Morbus tanquam Peripneumonia curandus, Sudores, hic nocuos, caute vitando. 105. 157.

retroessa quomodo cognoscatur. 131. 132. Et quomodo, a periculo inde imminente, se liberaverit Auctor. ib. Retrocessio hujusmodi materiae morbose periculosa admodum. 12. 13.

Scorbutum quandonam mentiat. 37.

Podagricis Cogitationes nimiae admodum obfiscunt. 84. Hincque plures, indebita Meditatio, quam ipso Morbo, fure perempti. 106.

Pompa Remediorum in Moribundis saepe male collocatur. 43.

Porrigo seu Furtur Capitis. 150.

Sydenham Opera Medica,

Porrigines in Lue Venerea vid. Crustulae.

Potestum. vid. Zythogala.

Potatio nimia in Gonorrh. virul. recidivam quando producat. 78.

Potatores Hydriopici, aliis frequentius, fiunt. 107.

Pectus Cardiacum in Variolis, ubi Symptomata ex nimio frigore vel Evacuationibus indebitis. 19.

Potus purgans Auctori. 5. 141.

purgans in Colica biliosa, aliis anteferenda. 26. In Febr. Continuis. 5.

In Febre nova hyemali. 112. Quando iteranda. ibid. Ad subducendam materiem revulsam. 110. Quando iteranda. ibid. In Hydrope, pro robustis in quibus alia non operantur, una & altera. 107. Simul calefaciens inter purgandum & corroborans, alia. ibid. Purgans & Vomitus citius. 108.

vid. Haustus.

Potter Capitaneus Londini Cortice Peruviano occisus. 40.

Potulentorum, in Podagra Regularis Paroxysmo, tertia pars tantum per vesticam redditur. 100.

Potus in Dysenteria qualis. 22. 23. Frigidus in Dysenteria qualis. ibid. 23. In Febre Dysenterica. 24. In Hydrope conceditur ab Auctore ad 18. vel 18. singulis diebus. 103. 109. In Hystrica Adfect. Puerperarum a nimio Mensium fluxu. 95. In Podagra optimus, qui non nimis Vinosus, nec nimis Aquosus, ut Cerevisia tenuis Lond lupulata vel non; vel Aqua cum Vino, praesertim in mitiori. 103. In Podagra, vehementiori, & prevefcente, omni Spirituositate careat, & Potus Dieteticus propinetur. 103. 104. Hic palato quantum fieri potest gratus fit. ibid. Appetitum plus faveat aliis liquoribus. ibid. Et hoc commodi habet, quod illi, qui eo utitur, concedat liberiores in cetero vitam. quam si Vino vel Cerevisia uteretur. ib. 32. In 18. Epid. 1653. absente Febre, &c. ibid. In Variolis Anom tempore, & Salivationem promovens, qualis. 26.

Præputio si Glans contegitur. vid. Glans.

Praxis Medica unica vera in Observatione Operationum Naturae fundatur, hoc est. Indicationes ex ipsis Morborum Phenomenis elicite, dein Experientia firmat; ut fuit Hippocratis illa. 42. Lapis Lydius eorum qui Medicinam profitentur, est 108. Apud plurimos Auctores ad Posulata quaedam ex Hypothesibus & laesivis ingenii luxuriis, deducta, non ad rei veritatem, componitur. 77.

in Variolis, Eruptionis tempore, ubi de caloris gradu applicando agitur in incerto, ac lubrico loco constituitur. 17.

vid. Medica Praxis, vel Medicina.

Prognosis, in Variolis, Mortis vel Vitae pendet a multitudine, vel paucitate Exanthematum. 84. Ratio hujus. ib. Bein Προγνωστικ in Variolis Confirmando fallax, & bonum, ex Tumore Faciei & Manuum Salivationi subsequente, deducendum. 16.

Prostat in Gonorrhoea virulenta adeo tempore adficiuntur, ut in Cadaveribus effusio ulcere depasta, reperta fuerint. 78.

Protuberantiae, in Rheumatismo, ad digitorum internas potius, quam externas, partes excitantur. 36.

Pruritus terribis quomodo curandus. 37.

In Pruritu sereno Sudor. omni mane qua ratione provocandus. ibid.

Vena sectio, ante Remediorum usum, quare exigatur. ibid.

Pituita in Peripneumonia notata. pro Potu. 36.

in Pleuritide essentiali pro Potu. 36.

Ptyalismus. vid. Salivatio.

Pueri, Senes, Juvenes diuturno morbo confecti, Vena sectionem in Febris vident; & quare. 3.

Podagra non adficiuntur. 100.

Pueri Febris Intermit. laborantibus calidiora exhibere periculosum. 10.

Puerperae Apoplexia Hystrica, quandonam frequenter satis adficiuntur. 89.

teneriores lecto decubentes, quidam emolumenti inde habeant. 94.

Puerperae teniores & Vaporibus obnoxia, ante diem decimum, a lecto se non conveant. ibid. Si nimis cito surgat, Hystrica Adf. ex qua Lochiorum suppressio, cum divi & localibus Symptomatibus, adficiunt. ibid. Vix decima moritur, ex defectu virum, vel ex doloribus, a partu; sed inde plerumque, quod lecto cito nimis surgat. ibid.

Pulsus in Febre nova hyemali sanorum non dissimilis. 110. 112. Languidus & inordinatus, si male tractetur. 110. Qualis, ubi Phrenitis adest, & Mors instat. 112. In Hypochondriaca vel Hystrica Adfectione similis sanorum est, ut ut strangulari videantur. 90. In Variolis Confluent. die undecimo vix percipitur, adeo obruitur a Pure sanguis. 110.

Pulvis adstringens in Mictu sanguineo & Sputo sanguineo in Variol. Const. 129.

Cardiacus in languore Febrili. 5.

ex Cortice Peruviano in Febr. Interna cum Vino rubro, aliis modis antefereendus. 41. Nec obest Vinum licet ad Continuarum speciem vergant. ibid.

Patrum. vid. Cortex Peruvianus.

Pulvis Pyrius inventus non letalior fuit hominibus, quam Malignitatis viri in ventio. 115.

Punctura Tendinis dolorem duodecim horas post V. S. modo insert, qui circa Axillos praecipue reperitur, tumore vix majore. Avellana suborto; ex orificio interrim ichore effluente, quod primum signum. 35. 150. Quomodo curetur. 150.

Purgantia quilibet Naturae quare inimica dicantur, ab Auctore. 107. Vel mitissimo quoque tumultum plerumque in corpore excitant. 10. Repetita sapienter, in Adfectibus fere quibuslibet, praesertim in imbecillibus, & Infantibus, plurimum obfiscunt; & Tumores in infimo ventre horum excitant. 91. 92. Facilius vel difficius operantur, pro corporis Idiosyncrasia; quare cautus sit semper Medicus, de aegri corporis, ad Cathartica ferenda aptitudine, vel ineptitudine; nam hujus neglecti Hypercathartes a levioribus etiam Purgantibus quandonam obort. 107. Si Correctiva dicta admitti habeant; Cathartici redditur laboriosior. 79. Leniora in Robustis aliquando plus praestant, quam validiora: Sic etiam Aliquando teneriores homines fortissimis purgantibus aequo cedunt. 103. Post V. S. omnium maxime refrigerant. 112. Patefacit viam sternunt. ibid. Et istis adjuvari possunt. 114.

in Angina, lenitiva quandonam, post Vene sectionem, exhibenda. 38. Et quandonam in postremum diem rejicienda. ibid. Cum Chalybe, & Chalybeatibus, vel ipsorum usus tempore, quare non exhibenda. 91. 92. confer. 92. In Chorea Sancti Viti. 92. 113. 145. Quoties & quando repetenda. ibid. In Cholera morbo dammantur. 21. In Chronicis Morbis ante usum roborantium vel Digestivorum exhibenda. 103. Et ubi semel Corroborantia & Digestiva adhibentur, non intercalanda. In Colica Hystrica, quandonam. 27. In Colica biliosa quando. 25. Ad tertiam vicem non numquam repetenda. ibid. Quandonam augenda. 27. In Febricitantibus Coma quomodo inducant; illudque, Patefacit exhibitis amolitur; quod si Auctori in mentem antea venisset, non Enemata tantum, sed ipsa Purgantia, in Febre Comatosa An. 1673. ausus dare fuisset. 112. In Comate Febrili, Calefacientibus excitant, nocent. 113. Purgantia, & V. S. alternatim iterata Contusiones rursus curant. 106. Corticis Peruv. usum ne precedant. 9. 10. In Diarrhoea, qualis. 22. 23. 147. In Dysenteria, & quoties iteranda. 22. 23. 147. Ultra tertiam vicem Methodo Auctoris raro exigebantur. 22. 23. Quandonam usum Laudani praecedere debeant; & quando non. 23. Post Febres Autumnales magis, quam post Venerales, necessaria; & quare. 5. In Febris Continuis quando, & quare, tempestiva. ibid. In Febre Dysenterica. 24. Quoties instituenda. ibid.

Purgantia in Febre Epidemica quacumque, non exhibenda, in principio status Morbi, nisi V. S. praemissa: quod probe observandum. 112. In Febre nova Epid. V. S. quare, & quandonam iteranda. ibid. Et hic non nocet, ut quidam putant, sed requiruntur, quia post V. S. propinata, summe refrigerant, & Narcoticis viam sternunt. 115. In Febre Erythelatoza qualis esse debent. 37. Et quale Patefacit aliquando, hora somni, insuper exhibendum. ibid. In Febris Intermitentibus Diabete senibus quandonam inferebant. 41. Febres Intermitentes, in Infantibus, ac aetate florentibus, longiores, ac pejores, reddunt. 9. 10. 40. Provectiones aetate in mortis periculum conjiciunt. 9. 10. Et in lebito celebrata Febris Intermit. Venerales prolongant. 8. Non nisi certa conditione in Febr. Intermit. Autumn. tentanda. 9. Post Febris Intermit. Autumn. penitus sublata, nec ante, ut periculosiores insecuturi Morbi, praesertim in provisoribus aetate, vitentur, necessaria admodum. 10. Eadem vero prius exhibita Morbum consumacionem reddunt: & quare. ib. Hydriopem quoque accersunt; neque eam natam tollunt. Exhibenda proin tantum mense uno elapso, cum scilicet non modo Paroxysmi, sed etiam ea alteratio, quae diebus istis in quos incidere debebat Paroxysmus, persensitur, prorsus evanescunt. ib. Qualia, quo tempore, quibus intervallis, adsumenda; quoties repetenda. ib. Si per Corticem Peruv. curata fuerint, non exhibenda quin inde Recidiva atfi. 41. In Pestilentiali Febre post Vene sectionem & Diaphoresin, quare exhibenda. 14. In Febre Quartana aequa fere nocet ac Vene sectioni; non tamen usque adeo, nisi crebro repetatur. 9. Qualia post Febr. Scat. lat. O 4

latinam. 34. In Febre Stationaria. 143. Sudoriferis mista, ante Paroxysmum exhibita, in Tertiana. Autumna. commendantur. 9. Sudoriferis, in Tertiana duplici non admiscenda, & quare. ibid. In Febre ex Tussi male praesta nata, per tres dies instituta sufficiebant. 42. In Gonorrhoea virul. Remedia sunt, in quibus Curatio omnis Cardio veritur. 78. Hydragoga praeter ceteris conducunt. ibid. Diu continuanda; si enim nimis cito relinquuntur; reperta mane adhuc gutta Ichoris in summitate colicis, redibit Morbus. ibid. Si ab egro sumi nequeant, vel si iis pertinaciter refragatur, facile Lues oritur; & quomodo tunc succurrendum. 79. Post Luem Salivatione sublata, quamdiu vitanda. 80. In Haemorrhagia Narium quandonam exhibenda. 38. 157. Lenientia nisi exhibeantur, post Haemorrhagiam immodicam, recidiva metuenda. 7. In Haemoptoe, praesertim repetita, Tabem inferunt. 38. Hydragoga dicta in iis, qui egro purgantur; vix aliquid efficiunt; & si aucta dosi exhibentur tumulum Sanguinis promouent, & plus augent; hinc, ut bene operentur, leniora Cathartica iis admiscenda. 107. Per triplex quae agunt, in Hydrope, Tumorem potius adaugent, quam minuunt. ibid. In Hydrope praeter ceteris Morbis, validissima requiruntur & celerissima; ut Aqua maxima celeritate, quam egri vires ferre queant, exantentur. ibid. Quae vel segnius vel mitius operantur quare efficiunt magis quam profunt. ibid. Hinc Curatio cardo in Hydrope pendet ab exacta inquisitione, num eger facile, num difficile Catharticus cedere soleat. ibid. Fortiora, & nimis moruosa, iusto debilioribus sunt preferenda, quia Laudano occurrere hodie certo possumus. ibid. Singulis diebus exhibenda; & quas ob causas. ibid. Non numquam vero dies unus aut alter intercalari potest. ibid. In Hydriopis prompte Cathartici cedentibus quoniam. ibid. Varia plura. 149. Duo Palmaria, pro iis qui egro purgantur, ceteris doctoris, sunt Elaterium & Infusio Croci Metallorum. 107. Ubi per roborantia, vel & laxantia curamus, exquisitae vitanda: revocant eadem illico jam recedentem tumorem. 109. Frequentiora in Hysterici id modo efficiunt, ut Materia biliosa vividis, uberior enascatur seges; & quare. 41. Hysterici Adf. sepe invitant, ubi contrarium foret, si ejus fomes in materia aliqua involveretur. 91. confer. 90. In initio quare & quando. 91. In leviori specie omittenda. 92. In Hysterici Adf. Paroxysmo ubi Dolor urget post V. S. quandonam instituenda, ante usum Laudani. 93. 94. In Iliaca Passione sunt Emetica. 7. 26. Licet fortissima, Intestina non permeant. ibid. In Ileo vero non exhibenda prius, quam roborato ventriculo, quin alias Emetica evadunt. 7. In Ileo ex Torminibus ventris, in Febre Epid. nova, fortissima exhibenda, quoniam. 91. Si evomantur Paregorica prius exhibenda. ibid. Ope Paregoricorum retinentur, & operationem suam deorsum sistunt, licet paradoxon videatur. 114. Pro Infantibus optima quae ex Rhabarbaro cum Cerevisia. 115. In Lue Venerea quare non exhibenda ad corpus pro Salivatione preparandum. 79. In Mictu Sanguineo, a Calculo, post V. S. 131. In Nervosis Adfectibus repetita, sepe congrua; ut in Chorea Sancti Viti. 113. In Peripneumonia notha post V. S. crebriora, praesertim ubi haec reiterari non debet. 36. 144. Quo die iteranda. 36. In Peripneumonia vera non conducunt. ibid. In Phrenitide, ante Narcotica, assumenda. 6. In Phrenitide a Calefacientibus inducitur, nocent. 113. In Pleuritide Symptomata ad finem. 32. In Pleuritide Vera post V. S. 35. In Podagra cur Empirici quibusdam, eadem celantia adhibere, existimationem conciliant cum damno agrorum. 101. Ad Materiam Morbi efficiendam, neutiquam conducunt. ibid. ad ibid. Sed Materiam ab articulis intus repellunt, & Morbum retrocedere faciunt. ibid. Hinc Podagricis ledunt. 102. Adeoque nec in Paroxysmo, nec post eum, neque ante ipsum, neque Vere vel Autumno, exhibenda. 101. Paroxysmum sepe accerunt, etiam lenia; nisi Laudanum insuper adjungatur, tum non nocent, ut tempore observavit Auctor. 131. Inter V. S. exhibenda, quando Metastasis materiae ad Pulmones adest. 105. Exhibenda quoque Manna ubi Mictus Sanguinis adest. 131. 157. In Rachitide ex Febre Autumna qualia esse debeant? Non vero nisi Febre fugata exhibenda, & quare. 12. In Rachitide vera quandonam laqueum habeant. 92. In Rheumatismo qualia. 43. 144. Post diem octavum ab ultima V. S. qualia exhibenda. 36. Post tertiam V. S., sepius iteranda, ut Sanguini pareat, & Paregoricus locus daretur, satius fore, quia tum ab his non igitur Morbus, Auctor tempore didicit. 23. Post Salivationem Mercurial. in Lue Venerea non exhibenda, quia Recidivae causa esse possunt. 80. In Tussi convulsiva Puerorum, quomodo juvent. 42. In Tussi Epid. 1679. continuanda donec convalescat. 42. 43. In Tumore Abdominis Infantum nimis repetita, horum plurimos interfecere. 92. In Tumore Abdominis Infantum, post Febres intermittentes diuturniores, indicantur. 10. In Tumore Abdom. Infantum, ex Rachitide vera, non nisi semel vel bis, ante usum Alterantium, admittant. 92. In Variolis, initio an conducant. 17. Et quid mali producere possunt. ibid. Sanguine nondum inquinato, Variolas distinguas reddunt. 85.

Purgantia In Variolis Anom. ibid. Post Variolas Confluentes curatas. 88. Purgantibus aere (79.) Salivatio etiam Mercurialis aere plerumque instituitur. 80.

Purgantis Omissio post Morbos Autumnales, plus quam ulla causa, multorum Morborum fons est. 5.

Pus in sanguinem quomodo resorbeatur & Febrem excitet. 84. Post Pleuritidem essentialem Thoracis cavo quando recondatur. 35. In Variolis in sanguinem copiose regurgantibus, in fine Morbi suffocant. 85.

Pustula in Gonorrhoea virul. initio, dein in Ulcus Aphthosum abiens (a Shanker. 78.) in non Recutitis, quomodo incipiat & protegat. ibid.

Pustula in Febre Erysipelatosa non vulgari Urticarum puncturatur referunt. 37. In vulgari adparent, ac si apes aut vespe aculeis suis lacerassent, & aliquando in Vesiculas attolluntur. ibid.

— Variolosa, si Maculas purpureas interspersas habent, letale. 16.

— in Variolis, pauca omni saluti spem constituunt; & e contra. 84. Hujus Ratio. ibid. Ergo non propellenda, ut densa sint, cum ab horum numero discrimen pendeat, sed potius coercenda. ibid. Intempestive autem & nimio opere procedentes, quos malorum causa. 85. Profusissime vero sunt; vel propter naturam aeri calidioris; vel ob Calefacientia intempestiva; propter in lecto decubitus nimium & praeternaturam. 84. Ne copiose nimis sint quomodo praecavendum, aere libiore &c. 85. Ex frigore nimio flaccescere solent. 30. In Infantibus sepe non prodire, quia Epileptici adfectus Discretas praecedere soliti, praesentibus adfectibus evacuationum ope fuisse tractati. 86.

— in Variolis Anom. nigris Confluent. An. 1670. initio ab Erysipelate vel & Morbillis, vix, nisi Eruptionis die, alioque signis, discernantur. 25. Pustulae nigrae augebantur pro ratione Calefacientium, & contra. 87. Materiem evadentem nec flavam nec fuscam, sed rubro saturato concretum sanguinem imitantem. 25.

— An. 1674. nigredine fuliginem aequabant; & perpusillae erant, ubi numero. 30.

Pustulae in Variolis Anom. Discretis An. 1670. quomodo ab iis generis Discreti Regularium, determinabantur. 25. Nigrae itidem fiebant, diebus ultimis. ibid.

— An. 1674. paucae ubi erant, non erant minores quam in aliis generibus, & rarissime nigrae. 30.

— in Variolis Regularibus subflavam colorem naturaliter habent. 16. Nigredinem, quod Symptoma anomatum est, in summitate aliquando habuere, sed haec Regimini temperati ope, sensim per fuscum in subflavum colorem transibant. ibid.

— Confluent. An. 1667. naturaliter quales; & quid de iis dicendum habuerit Auctor, vide. 15. 16. Copiosiores suture, quod patet, ex facie, primis diebus, ad instar pulvis & limatura acicularum undique respersa, praedicunt Mortem vel undecimo, vel decimo quarto, vel decimo septimo, involuturam, utut eger & sibi, & adstantibus bello habere videatur. 84. Majores in manibus ac pedibus, quam reliquo corpore; & quo plus ab extremis distat eo minores. 16. Causticam qualitatem, unde Cicatrices fiunt, si Regimine temperato tractantur, non induunt. 19. Crustis factis halitus puris a materia purulenta in Sanguinem resorpellunt. 13. Deprimuntur naturaliter, nec mali quid hoc portentat. 19. Sed tamen ignaros deterret, qui etiam in Distinct. Variolis augmentum expectant ante diem, non gnari temporis, quod

Natura destinavit. Unde natus Rumor, de crebra Pustularum retrocessione. ibid. Depressio ex frigore vel evacuationibus indebitis, quomodo superanda. Pustulae in Variolis Discretis An. 1667. magnitudinis Pisi grandiusculi fuisse. 15. Maturescentes, die octavo in Facie, ex levibus atque rubris, asperiores evadunt & subalide, & tandem magis flavae; ubi in Manibus & reliquo corpore, progressu Maturationis minus asperae, & albae magis, conspiciuntur. ibid. Desquamazione in facie & reliquo corpore, disruptione vero in manibus, abeunt. ibid. Post mortem aeri, quandonam eleantur adhuc & rubescunt. ibid. Repercussae ex frigore, vel evacuationibus indebitis, qui tractanda. 19. Putrefactiones humorum ultra modum retentorum, ut & Fermentationum varia genera, Classem unam caussarum universalium, Morbos producentium, constituunt. 1.

Quaestio, qui Morborum medela administrabitur, dum eorum causa latens? solvitur. 12.

Quartanae Febres, vid. Febres Quartanae.

Rachitides verae variis occurrunt, nisi Intermittentes Autumnales, ex Constitutione Epid. praedominium habeant, quod notatu dignum. 10.

Rachitis vera, ejusque Curatio. 149. Post Febres Autumnales nata, qualis; ejusdemque Curatio. 10.

Rachitis quomodo curanda una aut altera Purgatione, Linimentis, Vino & Cerevisia medicatis. 92.

Rationis Momenta adeo varia & subtilia, ut Theoria quaecunque plausibilis, iis innitens, a quodam pulchre stabilita ab alio, tumque iterum ab alio, majoris adhuc verisimilitudinis specie, invertatur; quod tandem fiet, donec ultima humani ingenii potentia consummata sit. 115. 116.

Recidiva in Dysenteria, reiterationem Methodi Auctoris expetit. 23.

— Febris, notatu digna, post usum Clysterum & Cathartorum, quae Febrem prius quasi profugaverant. 5. Quid sum agendum. ibid.

— in Febr. Intermitt. Cortice Peruviano curatis, ab Evacuantibus, Cathartici, Enematis, indulta. 41. In Febr. Quartana post Corticis Peruviani usum rarior, quam in Quotidianis ac Tertianis. ibid. In Gonorrhoea virul. ex Decocto Lignorum sepe fit. 79.

Recutitus seu verpus qui non est, Gonorrhoea virulentae initio, sepe Maculam vel Pustulam, instar Morbilli erumpentis, in glandis quadam parte habet, in Ulcus mutandam, a Shanker dictam. 78.

Refrigerans summum est Cathartis post V. S. 115.

Refrigerantia in Morbis acutis quid efficiant boni. 32. 33. In Febribus Mali. gnis propria conducunt, licet ibi errantes Medici per Calefacientia & Alexipharmaca sua Venenum suum, ita dictum, per cutis poros eliminatum velint. 115. In Phrenitide instante, ut & calefacientibus inducitur. 113. In Podagra, ut Liquores refrigerantes, quare vitanda. 103. Externe adplicata periculosa. 105.

Regimen Calidum, & Sudoris provocatio, in Febre Variolosa licet prodesse posse videantur, tamen, docente Experientia, nocent. 20. Methodo Auctoris plane oppositum, licet cum eo aliquando resurgant aeri, magnum inferat discrimen, & Symptomata vehementer augeat. ibid. Sudores extorquens Phrenitidem inducit. 19. Sepe Symptomata producit, post Sudores extorcos nascentia, quae Morbi malignitatem falso ascribuntur. 20.

— in Variolis quomodo noceat. 85. Quam mala Symptomata in Constitut. 1674. producebat. 30.

— vide Calefacientia & Cardiaca.

— calidius in Variolis tempore Expulsionis, quid efficiat, vide Calefacientia.

— temperans & refrigerans in Febre Variolosa videtur. Auctori Methodus praeter ceteris optima. 20. Pyralismum adjuvat. ibid. Non metuendum, quamvis Sudores copiosi adfint. ibid.

— in Variolis Confluent. Symptomata duo pessima, Mictum Sanguineum & Maculas purpureas, antevertit; Quae duo ni praecaveantur, ubi jam adsunt, non curantur. 85.

— minus adcuratum, in Variolis, Plebi quam Divitibus, illi Variolas aequiores reddit, quam his. 18.

Regimen in Variolis quale conducatur vel obiciat, non ex Opinionibus, sed ex Praeticis Observationibus, deduci tantum debet. 85.

Regula, in Variolis, Venae sectioni & Evacuationibus, quam obiciant, a Circumferentia ad Centrum non esse movendum, nullus est; & quare. 17.

Remedia, vide Medicamenta.

Remediorum seu Formularum ingentem Sylvam quare non tradat Auctor XIV. Formulae in Praxi magis familiares. 141. 142.

Renes dolore quoniam, nascente Calculo, sensim adficiuntur. 131.

Repellentia in Podagra, externe adplicata, periculosa. 106. Quid mali prestent. 105.

Res 6. non Naturales peccantes corpora nostra, ad hujus illiusve Morbi Epidemici generationem, non minus ac manifestae aetis qualitates, magis minusve disponunt. 2. Qui Morbi tum Varii extoruntur pro Constitutione Anni & humorum dyscrasia. 34.

Respiratio, in Pleuritide Essentiali metu Tussis ab egro reprimatur. ibid.

Rheum-barbarum in Dysenteria sine alio purgante leni exhibitum, quare non conducatur. 22. 23. Cum Cerevisia in Infantibus purgans optimum. 115. Quomodo paratur. ibid.

Rheumatici Dolores nimium a lecto, in Febribus Epid. abstinendo, praesertim in declinatione ovari possunt; & quid tum agendum. 29.

— quidam pro Scorbuti Symptomata habentur, incautis. 36.

Rheumatismus omni tempore, sed maxime Autumno, incessit, & aetate florentes praecipue adficit. ibid. Hic morbus a Scriptoribus secundo pede tractatur, vel quod eum pro Arthritide habuerint, ubi sine Febre adparebat, licet examinanti multum differre conflet: vel, quod de novo ad reliquam Morborum Iliada accesserit. ib. Frequentissimus nihilo minus est; & licet, Febre depulsa, raro occidat, tamen ob dolorem insignem & diuturnitatem, notatu dignissimus. ib. 144.

Rheumatismus inflammatorium causam agnoscit, ut patet argumentis. 36. Ex frigore subitaneo post calefactionem plurimum oritur. ibid. A calore lecti intenditur. ibid.

— incipit cum Febre ejusque Symptomatum caterva. ibid. Quae sensim evadens manente dolore, sepe recrudescit, & quando. ibid. Febris pro Morbo primario habenda; & reliqui Adfectus, a quibus nomen mutuatur Morbus, tanquam Symptomata, quae a materia febrili, a modo criseos, a parte in quam Materia ruit, pendens. 34.

— non eodem vigore, Febre depulsa, sed, ad instar Arthritidis, subinde lac f. fit. 36. Et licet, tum Mortem quidem non inferat, quare tamen non contemnendus. ibid. confer. 144.

— Protuberantias in digitorum interna potius, quam externa, parte excitas. Et membra motu omni, cessatis jam doloribus, sepe ad mortem usque privant, digitorum articulis inversis. 36.

— sponte sepe tandem desistit. ibid.

— Podagram in Foeminis gracilioribus adolescentibus, vel constantioris aetatis, aliquando mentitur. 131.

Rheumatismus Verus quomodo curandus. 36. 43. 144. Indicationes Curativae. 36. Venae sectio in latere adfecto illico instituenda. ibid. A sola V. S. Curatio nem sumi debere censet Auctor. 36. 103. Quoties haec iteranda, & quando. 36. 144. Calefacientia exhibita Venae sectionis frequentioris causa esse possunt. ib. Enemata & Lacte Sacchar. diebus a V. S. liberis, injiciebantur. 36. 144. Medicamenta incrassantia, refrigerantia, & simile Regimen, nec non Dietam adequatam, ex Decoctis farinosis, Jusculis carneis tenuissimis, commendabat. A lecto de die per aliquot horas abstinendum volebat. 36. Sed vidit, tempore, Auctor hujus Methodi per V. S. frequentiores incommoda. 43. Hinc eam mutavit. ibid. Et per Dietam tenuem, ut Serum Lactis, curare cum successu tentat, in quibusdam. ibid. Sed in aliis post secundam, vel ad summum tertiam, V. S. jam Cathartica & insuper Paregorica exhibet. ibid. Et sic incommoda a V. S. praecavet. ibid.

— in Rheumatismo Paregorica quodam tempore vetabat Auctor, utut se vires dolor, si per V. S. solum curatio exspectabatur, quia, ut putabat, Morbum figebat; hincque V. S. frequentiores postulabant, neque in vigore Morbi a ratione promissa praestabant. 36. 43. Hinc ipsa non nisi, octo diebus elapsis, post Cathartica, sed lenitiva, exhibita, propinabat; & quare. 36. Verum, ubi Methodum mutavit citius Paregorica quoque exhibere jubet, ubi citius Cathartica exhibentur. 43.

— in Rheumatismo Dolores Venae sectionis imminuti, non tamen omnino evanescent; sed tantum ubi Vires resarciat; maxime aetate subsequente. 36. Verum, si eger perverit, Methodo forte tractatus, tum Dolores vagi, per omnem vitam sepe agrum discruciant, qui incautis Scorbuti Symptomata habentur. ibid.

inveterato P. S. iterata, Fontanella, & Spiritus volatilis, cum Vino Canarino omni mane & sero adsumti, Curationem absolvent: sed longius spatium, inter Venæ sectiones restitendas, est interponendum. 37. Venæ sectione illa iterata Morbus hicc eruitur, vel eo deducitur ut aliis facile curetur. ibid. Rheumatismus Scorbuticus quidam datur, licet inter verum Rheumatismum & Scorbutum discrimen intercedat; & quare ita vocetur. ibid. Describitur cum sui differentia a vero Rheumatismo. ibid. Protuberantia tales ac Perus, in partibus raro excitat. ib. Faminas præ reliquis adoriunt, cum Viros imbecilliores. ibid. Hinc fere videtur species Adfectus Hysterici, sed Hysterici remediis non cedit. ibid. Corticis Peruviani longiori usui ortum saepe debet. 27. 40. Chronicorum præcipuorum ad instar, in diuturnitatem longam aliquando se protrahit. 37. quomodo curandus, ibid. Ritus ex Hysterica Adf. sine ulla saepe causa. 89. 91. Roborantia, & Cardiaca, in Febrib. Intermitt. Autumn, ad Naturam sublevandam, quando, & cur, convenient. 9. 10. Roborantia in Hydrope eadem sunt, quæ in Podagra, paucis additis, tradita. 109. Quando & quare convenient, ibid. In Hysterica Adf. curatione, post Evacuantiâ, dentur inter hæc præmarium Chalybs. 91. 92. Rosa, in Igne sacro occurrens, quid vocetur. 12. Rubedo, in Variolis, in interstitiis Pustularum, instar Rosar. Damasc. octavo die incipiens, bona, si cito recedit malum. 15. 16. Ructus nidorosi, in Podagræ irregularis Paroxysmorum intervallis, vexant. 100. Rumor, de Variolarum retrocessione crebra, unde ortus, 19.

S.

SAL Abinthii cum succo Limonum, ad Vomitum, in Ileo vero. 7. Salia lixiviosa, in Hydrope, ad Diuresin movendam, præ ceteris optima. 109. Saliva in Variol. Confl. viscida est undecimo die. 16. Quibusnam succurrendum. 19. 145. 146. Cardiacis diffis præpropere incassatur ita, ut perniciem inducat. 87. Vid. Salivatio. Salivatio, in Hysterica Adf. similis ac ex Mercurio. 91. In Febre Dysenterica raro juvabat, uti in Febre Variolosa solebat. 23. confer. ibid. Febrem Variolosam, uti ipsas Variolas, placide solvere solebat. 20. Et Macule purpureæ hæc ope evanescebant. ibid. Quomodo hic sub finem Morbi excitatur. 19. 20. Estque hic critica excretio; cuius defectus, nisi aliam artem suggerat, ad aliquot septimanas perseverat Morbus. ib. Numquam non salutaris quoque hic; hinc ubi adest cavendum a P. S. & Enematis. ibid. Aliquando, per ipsam Naturam, in Diarrhoeam vel in Sudores profusos, pervertebatur. ibid. Salivatio Mercurialis, in Lue Venerea confirmata, omnem numerum absolvit, juxta Sydenhamum. 79. Sed Gonorrhæam non valet sanare. 32. quomodo instituenda. 79. 80. Ad præparandum corpus, Cathartici, Balneis, P. S., non indiget, & quare. 79. Sustinetur melius, si nihil prius agatur, quam si evacuantiis, ante ptalium, quasi incisi sint Nervi. ibid. Quoniam Unguento fricandæ partes ad eam excitandam; & quanam fricandæ. ibid. 80. 149. quomodo & quando incipiat a Frictione. 149. Et si non procedat, quæ ratione per Turbith minerale provocanda. 80. 149. Antequam bene adsurgat, sapissime oritur Diarrhœa, quæ Opiatis reprimenda. 80. Difficilius in iis, qui difficulter purgant (79.) excitatur. 80. Et non nimis obstinate tum urgenda, quin Dysenterica dejectiones modo fiant, aliæque horrenda Symptomata. ibid. Quomodo tum procedendum. ibid. certis gradibus modificanda, ne ægrum in periculum conjiciat; & ad quamnam copiam evehenda. 79. 149. Linthea, ubi permittenda, sunt prius usitata. 79. Si violenta nimis, Cathartico reprimenda paulum. 80. 149. Si languescat nimis cito, quomodo Mercurio dulci exstimulanda. ibid. Ubi per Diarrhoeam enervatur, quid agendum, ut revocetur. ibid. Salivatio Mercurialis Diætâ qualem exigit. 80. convalescente ægro, non cito cohibenda, sed leviter sustinenda. ibid. Et Oris post eam exulceratio sibi tantum concedenda. ibid. Vide Os exulceratum. Methodo Auctoris instituta, vario de nomine expeditior, itidem minus periculosa, recidivæ minus obnoxia. ibid. Salivationis Mercurialis effectus, qui debilitati & exhausti in Galliam cur sepe migrare cogantur. ibid. Salivatio in Variolis Anomalis Confluent. An. 1670. major erat adhuc, quam in aliis. 82. Discretis An. 1670. adfuit æque ac in Confl. in hac specie. ibid. Quid inde concludatur. ibid. nigris pessimis An. 1674. itidem salutaris adfuit. 31. Hic vero, ante undecimum diem, sine periculi metu, quomodo fisti poterat. ibid. Regularibus Confluentibus, in Adultis Symptoma genuinum, non minoris momenti, quam Pustulæ, ac parim Tumorem, est; & semel tantum ipsam abfuisse norit Auctor. 16. Harum individuis comes esse debet; & quare. 84. 145. Et certius vexat Adultos, quam Diarrhœa Infantes. 16. 145. Omni non sistenda, sed Nature committenda. 118. Eliminandæ quippe Materie morbificæ inservit. ibid. Est enim, in iis, e præcipuis Nature Evacuationibus, & in locum istius, quæ per Pustulas majores in Discretis contingit, substituitur. ibid. confer. 16. Et in tuto ægrum ponere solet. ibid. Salivatio in Variolis Regularibus Confluentibus prodit Eruptionis initio, aliquando post. 16. 18. 145. Cessat, vel saltem, saliva spissa facta, minuire & decrescere incipit; undecimo die, licet adhuc dum utrumque perduret. 16. 18. 37. 145. Sed Tumore Faciei ac Manuum compensatur. 15. 16. 18. 37. 145. Ubi integre cessat, Faciei quoque evanescit tumor, sed Manus tum intumescunt. 16. Aliquando, sed raro, postquam cessavit, recrudescit. ibid. ne sistatur ante diem undecimum cavendum; periclitatur enim tum æger & quare. 16. 18. Si desinit sponte sua, undecimo die, neque facies intumescat; aut ejus loco manus intumeant, aut hi tumores ejus vicem subeunt, evadant, moritur æger. ibid. Quibusnam verorum Symptomatum. ibid. Promovenda Cerevisiæ tenuis, & liquorum temperantium usu. 16. 17. Sustentanda Narcoticis, præ aliis quibuscumque. 17. 78. A Paregoricis licet parum imminuatur, tamen non penitus cessat; sed, intervallis ab adsumpto Anodynis remotis, melior resurgit: tum quia vires ægri resauriunt; tum quia hoc modo me-

lius saliva excoquitur. 87. Protrahenda Narcoticorum itidem ope, quod aliquando ad diem decimum quartum, & ultro, fit. 18. Supprimitur calore nimio, calefacientium usu, & abstinentia a liquoribus Sanguinem diluentibus. 18. 26. Tum a pure resorpto quoque sistatur. 84. Revocanda, si iusto citius suppressa, itidem Narcoticorum ope. 18. Suppressa ex Salivæ visciditate, ut æger in suffocationis sitometu, Emeticum juvare solet, & fortius. 19. Tamen certius in hoc casu adhuc medium desideratur. ibid. Salus in Variolis pendet ab Exanthematum paucitate; & e contra. 84. Ratio hujus. ibid. Sanguinea massa repurgatur ordinario, in humano corpore, si Naturæ negotium permittitur, spatio 336. hor. h. e. dierum 14. aut circiter. 9. Sanguinis jactura major Apoplexiæ speciem Puerperis Hystericis, aliquando infert. 89. Sanguis Spirituum Fons & Origo. 91. Per se imbecillior in pueris. 3. Spirituum copia destituitur in declivore ætate, atque in Juvenibus diuturno morbo confectis. ibid. purus in Dysenteria quando. 22. in Pleuritide vera, V. S. eductus, instar sevi liquati spissus, in superficie quasi purulentus, post primam saltem Venæ sectionem. 35. 144. Esecta vena si recto flumine, ob orificium angustius, non profiliat, cur Cuticulam albam non contrahat, ignorat Auctor. 35. Et tum hujusmodi Sanguis eductus levamen quoque non infert ac aliter. ibid. Recens extractus, digito si agitur, crustam illam tenacem, albam, non contrahit. ibid. Sanguis Pleuritico Sanguini V. S. educto similis, respectu cuticulæ alba, reperitur, in Dysenteria inveterata. 23. In Febre Epid. Confl. 1673. ad 1675. in initio. 28. 29. In Febre Erysipelatosa, plerumque semper. 37. In Febre nova Hiemali 110. 112. In Febre Pestilenti. 13. 14. In Hæmorrhagia Narium. 38. In Peripneumonia notha. 35. 36. In Pestiferis; ubi simul calorem Sanguinis Pleuritico & Rheumatismo laborantium, quoque habet. 14. In Podagra. 103. 104. 105. In Rheumatismo, ubi tam similis ac ovum ovo. 36. In Variolis Confluent, ante Eruptionem. 83. Post Variolas Confluentes, ibid. Post Variolas vehementiores. 19. Sanguis in Febre Contin. Epid. 1665. a Pleuritico Sanguine differebat. 11. Sanitas ex Febre, ubi Natura vi sua Materiam morbificam superans critica eam norit solvere. 1. Sarsaparilla, in Lue Venerea curanda, evacuando forte potius, quam vi specificâ, agit. XII. 12. Scientia intuitiva non datur, qua fructus Principia quis queat subternere, quibus mox superstruat; sed humanæ nature abjectior conditio, intra angustos cognitionis, quam de quinque sensibus haurire potest, limites coarctatur. 108. 109. Scioli, in speculationibus spem omnem ponentes, majorem edunt stragem, quam Morbi, eorum auxilio destituti. 42. Scorbutica Symptomata, non nunquam, vocantur Dolores a male curato Rheumatismo superstites. 36. Scorbutus non tam frequenter, apud nos, occurrit, ac quidem vulgo putatur; hoc enim si foret, in immensum cresceret, & omnem fere Morborum numerum absolveret. ibid. Verum istius nomine plurimi donantur Adfectus, qui vel Morborum Fientium effectus; vel infelices reliquæ Morbi non perfecte curati, tantum sunt. ibid. Dein illa, quam saepe Medici Scorbuto scribunt diuturnitatem Morborum, ipsorum tantum perverſæ curæ debitam. 5. 6. Scorbutus quanam habeat Symptomata. 151. quibusnam curetur. ibid. Scorbutus ubi desinit, ibi incipit Hydrops, vulgaris Regula quomodo accipienda. 36. 37. aliquando Febris Quartanæ Symptoma est. 8. Seroti inflammatio & tumor, in Gonorrhœa virulentæ adfectione, oritur vel a motu violentiori. 78. 79. Vel ab adstringentibus, quorum referuntur Aquæ Minerales. ibid. Curatur Forti emolliente, Cataplasmate, Cathartici, & refrigerantibus; tum & V. S. si tumor & dolor urgent. 79. Senes, in Febribus Interm. Cathartici debilitati saepe in paroxysmi primo rigore diem obeunt. 9. 10. Morbis Chronicis quare Juniores magis obnoxii. 103. in Podagra, sine exercitio, nunquam levamen obtinent; sed a materia inconcoctili, eorum naturam Viribus superante, tamquam a Veneno enecantur. 107. & Senescentes Febrem Quartanam difficile ferunt. 8. Juvenes diuturno morbo confecti, Pueri, Venæ sectionem in Febribus vetant. 3. Et quare. ibid. Serum Lactis in Dysenteria frigide adsumitur, & repide per Clystma injicitur, Constitutionis 1669. & 1672. initio 23. 147. In Febre Variolosa, Diarrhœa vexante, usu veniebat. 20. Ptyalismum quoque hic promovet. ibid. In Rheumatismo magna copia usurpatum, loco P. S. præsertim adeo frequentioris, substituit Auctor. 43. Sed in iis, qui ætate proveciores, vel qui Vino & spirituosius potati, nocet multum ac Hydropem infert. ibid. Serum Lactis in Morbis pluribus quam Rheumatismo, P. S. loco substitui posset, ni obstarent præjudicia vulgi, quod Remediorum pompa decipi gult, qua ipsos moribundos, ceu bestias immolandas, ornari cupit. ibid. Dysenteriam curavit exhibitum in lecto, cum determinatione ad Sudores, per 24. horas. 23. a Shanker Ulcusculum est in pudendis ex Lue Venerea, primum Morbi indicium. 78. In quibusnam contingat, & in quibusnam non. ibid. Siccitas & Sudatio, in Febribus, hoc illoque tempore, species harum præcipue distinguunt; si modo Febres, sibi permixtæ, incongrua Methodo non fuerint perturbatæ. 33. Exempla vide ibid. parium externarum, in Febre Contin. 1661. qualis fuerit. 3. validissima An. 1681. Vere & Estate invaluit. 84. Hæc Variolas istius Confl. acutiores quam reddiderit. ibid. Singultus, tamquam Febrium Continuarum Symptoma, considerandum. 6. Senibus plerumque accidit, post evacuationes copiosas; & saepe mortis prænuncius. ibid. Sape extrahis ac tumultu, ab asperioribus Medicamentis, ortum ducit: tum semine Anethi, aliisque, quasi specificis, non curatur; Diascordii vero larga dosi tollitur, quod Naturam adjuvat, per se non aptam sedare tumultus. ibid. In Febre quadam qualis fuerit, & quando recesserit; si non nimis Remediis excitaretur. 112. Aliquando Corticis Peruviano curatur. ibid. Sitis intensa in Hydropicis, unde. 107. Quomodo fallenda. 109. Somnolentia in Variolis Regul. Discretis, proditur jam, in Infantibus præsertim, præcedere solet. 15. Somnus in Podagricis placidus tempore Paroxysmi conciliatur refectione in curru. 105.

Spasmi Epilepsia per similes ex Hysterica Affectu, in quibusnam famulus oboriantur. 89
 — ex Lochiorum suppressione post Phrenitidem, lethales. 94
 — Infantum, vid. Epileptici affectus.
 Species Febris Continuæ quomodo ex aliis expiscetur. vid. Febres Continuæ.
 — Februm, Sudatione vel Siccitate, distinguuntur, vid. Siccitas & Sudatio.
 Species Morborum quid constituant æque ignoramus, ac quid Equum, vel quid plantam quandam constituant. 12.
 — Morborum unde. 21.
 Specifica Differentia, vid. Differentia Specifica.
 — a Nugivendulis, in Morbis Typo indutis non tantum, sed & in minimis formatis, ut lesionibus externis, itidem deprædicantur. 106
 — neque in Acutis neque in Chronicis habemus; & quare. 109.
 — in Contusionibus decantata, id efficiunt, ut vera curandi Methodus divertatur. 106 Talia sunt Sperma Ceti, Tegula Hybernica, &c. 106
 Specifica Medicamenta, vid. Medicamenta Specifica.
 — desideranda in Morbis Acutis, tam ad evitandas Evacuaciones, quas Natura indicat; quam ad præcavenda mala seu aberrationes, in quas sæpe dilabitur Natura. xii. In Morbis Chronicis requiruntur ad Speciem Morbi destruendam. ibid.
 — ad Podagram non novit Auctor, ac ea Promissores quoque ignorare veretur.
 Specificum in Febribus Intermitt. est Cortex Peruvianus. ibid.
 — in Lue Venere, esset, quod sine Evacuatione eam curaret. 78.
 Sperma Ceti in Contusis non est Specificum. 106
 Spinæ Cervinæ Syrupus, in Hydropicis, facile purgantibus, Aquas solus sufficienter educit. 107. In difficile purgantibus, summa dosis nihil agit. ibid. Huius in hoc Morbo facultates, sitim tamen excitat inter operandum. ibid.
 Spiritus Vini ut in Chirurgia tantum usui veniret, optandum esset. 39. In Ambustis, omnibus remediis anteposendus. ibid. Quomodo adplicandus. ib.
 — Nunquam in aduetsis, subito ac derepente est interdicendus, sed sensim ab eo abstinendum, ne Hydrops fiat. ib.
 — Ufculatus in Tussi, An. 1675. & Spiritus non modo Pleuritidem & Peripneumoniam invitabant, sed mortis periculum inferebant. 32
 — Vitrioli, vid. Vitrioli Spiritus.
 Spiritus Volatiles ferentes, ex Animalium partibus, facultates habent, quæ subiectis suis haud primitus merant; sed Creaturæ ignis sunt, easdem possidentes virtutes, ex quacumque etiam parte procedunt. 93
 Spiritus excitans in Apoplexia. 146
 Spirituum atrag. vid. Atrag. Spirituum.
 — copia destituitur Sanguis in Senibus, ac in Juvenibus duntaxat morbo confectis. 18
 — debilitas Hystericam Adf. causans aliquando adventitia est. 95
 — Fons & Origo Sanguis. 91
 — Subsidentia in Hystericiis plerumque occurrit. 89. 90
 Sporadici Morbi, vid. Morbi Intercurrentes.
 Sputum in Pleuritide essentiali, suffiendo, initio redditum, tenuis & parvum; sæpe particulis sanguineis intermixtum. 34.
 — Progressu copiosius, magis coctum, & Sanguineum. 34.
 111. Et pro ratione liberioris expectorationis sanguineum esse cessat. ibid. Aliquando vero tenue remanet, (reliquis Symptomatibus non remittentibus) ad momentum interitus ægri usque. 34
 — Sanguineum in Variol. Confl. quomodo adhucdum curari possit. 130. 131. Ex Pulmonibus letale Symptoma, sed rarum; initio cum Variol. Confl. Pustulis nondum erumpentibus, vel plerisque adhuc latitantibus, contingens, & indubitato mortem præsumit. 15. 19. 116. 130
 Squamæ, in Febre Scarlatina, furfuracea ad instar farinæ, bis terve redeunt. 35
 — in Variolis Confluent. eo lentius abscedunt, quo Morbus atrocior. 15. 16. Et furfuracea, indolis corrosivæ, foveas excavant, quas prius obtegunt; dein deturpatur inde vultus. ibid.
 Squamæ in Variolis Discretis, succedentes Pustulis in facie, foveas implent, & impediunt quo minus, primis diebus, cutis inæqualitas adpareat. 15
 Stationariæ Febres, vid. Febres Stationariæ.
 Status, in Variol. Regul. Confluent. præcedens Eruptionem, ib. Tempore Eruptionis. ibid. Eruptioni subsequens. ibid. Tempore Desquamationis. ibid.
 — Discretis præcedens Eruptionem ib. Eruptionis, die quarto. 15. 16. Maturationis incipientis, die octavo. 15. Maturationis progredientis. 16. Maturationis peractæ, die undecimo. ibid. Desquamationis, die decimo quarto vel quinto, & ultro. ibid.
 — Separationis in Variolis, quid. 16. Si velox nimis, quid mali inferat. 17. Quare longius tempus ad suum opus exigat, Separatio, quam Expulsio. 16
 Sterilitas Mulierum ab Hydrope Testium, ex Hysterica Adf. diuturna. 91
 Stillecidum in Gonorrhæa virul. quale. 78.
 Stipticus Liqueor Sydenhami ad Hemorrhagiam Nasum, & partium externarum. 38
 Stragula in Variolis ne obruant ægrum. 18. Modica esse debent, ut in sanitate solet. 83. Si calefaciant nimis, & auferantur, inde Eruptio sæpe acceleratur. 17.
 Stragulis in Morbillis An. 1674. non obruendierant Infantes. 30
 Strangulatus Uteri docet Hysterica Adf. ex atrag. Spirituum ortam. 90. Est Epilepsia, ex Hysterica Adf. caput obsidente, in Fæminis sanguineis, & Viraginibus fere, quæ describitur. 89 Unde excitatur. 90
 Structuræ corporis humani cognitio quo usque pertingat. 108
 Studia Podagricis nocent. 101. 104
 Studio adfuit nimia Melancholicos sæpe reddit homines. 90
 Stupor, in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. in Infantibus major erat quam Conflit. præcedenti. 29. Uterque nullis remediis debellari poterat; & Natura se committeretur, sensim recedebat. ibid. Confirmatur Historia. 29. 30
 Stygmata in Variolis, vid. Cicatrices.
 Succus Limonium cum sale Absinthii, ad Vomitus in Ileo vero. 7
 — Plantaginis, & Urticæ, in Mensum Fluxu immodico. 95
 Sudatio vel Siccitas, in Febribus quid nos doceant. vid. Siccitas & Sudatio.
 Sudor Natura Methodus genuina & admodum utilis, quæ Febrilem materiem digestam, per corporis habitum expellit; quod

tamen Ars imitari non audeat, sine discrimine, ob plures rationes. 101. 115.
 — artificialis in Contusis adeo extortus, loco quod prodesset, ægrum in periculum vitæ conjicit. 106
 — in Febribus quibusdam elici potest, in aliis non. 11. 33
 — tum artificialis, tum naturalis, nec non spontaneus noviturnus, & similis, quid boni, quid mali præstiterit, in Morbis, ac quomodo provocantur, in Febre Epid. nova. 110. 112. 113.
 In Febribus Intermitt. 40. In Febre Pestilentiali. 13. 14. 19. 20. In Febre Variolosa. 33. 20. 33. In Podagra. 101. 105. In Tussi Epid. spontanei boni, alii letales. 32. In Pruritu sereno. 37.
 Sudor coactus, in Febribus, Phrenitidem, & Pleuritidem Symptomatic. infert. 35
 Sudores vel Critici sunt, vel Symptomatici. 29
 — in Morbis non tuto arte Medica, sed Natura tantum ductu eliciuntur, P. stem si derias; quia adsequi non possumus, quantam materiam pars excretioni illi obediendæ est parata. 101
 — ante materiam coctionem, sine periculo non expelluntur. 115
 — Quam Coctionem sola Natura novit, non ars. ibid. Et Morbos, vel Febres, levantes, ii sunt, qui a prævia digestionem, fatisciente Morbo, fluunt, non qui primis diebus erumpunt. 29. Qui Februm initio prodeunt sunt Symptomatici, unde liquet quam inopportune Sudores initio Februm exprimentur. 115.
 — Anomali copiosiores Dysenterias, ac Febres Variolarum Anom. concomitantes, cur nullius fuerint emolumenti. 33
 — In Febribus suo genio permittis, eos non expellentibus, temperarie extorquentur. 29. In Juvenibus, calidioris præsertim temperamenti, ægrius proliciuntur. 13
 — in omni Malignitatis specie non conducunt ad eliminandas partes morbosas. 32
 — Nocturni in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. reconvalescentibus superveniens, quomodo superandi. 30. In Hystericiis, unde. 92
 Sudores in Febre Dysent. 1669. rari, sed capitis Dolores frequentiores. 23. Adolescentibus hic initio extorti, Delirium iis inferunt stupidum. 24.
 — in Febr. Intermitt. Paroxysmum finientes, materiam febrilem fere totam eliminant, quæ diebus liberis accumulata fuerat. 40 confer. 40. 41. Quomodo, & quando, in Tertian. Autumn. provocentur. 9
 — In Peste & Morbis Pestilential. quare sanent. 32 Vomitus & Diarrhæam hic illico sistunt. 14. Aliquando vero adeo funestæ, si Bubones retroPELLUNT, ut vix tertius exadat. 13. In difficile sudantibus. Exanthemata pessima quare advocent. ibid. In facile sudantibus Bubonum introcessum causant; & si nimis tamen cito abruptantur, quid mali hic parent. ibid. Continuandi per 24. horas ut omnem Bubonis materiem dissipare valeant. 14.
 — In Variolis, a calefaciente Regimine excitati, quantum ledant. 17. Primis diebus nimium expulsi, impediunt ne Pustula bene erumpant, neque probe maturationem adquirant. 13. 18.
 — Regular. Confluent. inopportune extorti omnia mala parant. 16. Vitandi ergo, quia lenem humorem, quod diluendæ sunt Variolæ, amendant. 18. In initio, nimis expulsi quomodo ledant, & Mortem advocent. ibid.
 — Discretis ante Eruptionem in Adultis tantum, copiose; in Infantibus nunquam ab Auctore sunt reperti. 15. 16. Atque eo tempore Discretas futuras prænuntiant. 15. In Eruptione interdum; & aliquando in tempus Maturationis usque, Adultos vehementer vexant. 19. Vitandi, quantum potest, Eruptionis tempore, cum non sine ingenti periculo promoveri possint. 18. Prompti per se satis, cur tam avidè ab ægris, eorum damno urgeri soleant. 16. Copiose manantes, & sponte sua deficientes Phrenitidem inferunt. 19
 Sudores in Variolis Regular. Discretis calefaciente Regimine, calidis, ubi urgentur, Pustularum & faciei tumorem, quæ octavo die adesse debent; tum Interstitiorum inflammationem quare impediunt. 16. 19. Et nimis propulsi quare Mortem inferant. 16
 — evanescentes, octavo die, calefacientibus, eos nimis urgentes adhibitis (ibid.) quomodo revocentur. 19. aliquando nulla arte, instante jam Morte, revocari possunt. 16
 — Malignis Conflit. 1661. ad 1664. octavo die abrupti revocari non poterant. 11
 ad Sudores in Variolis ut ad sacram Anchoram Famine confugiunt. 87
 Sudorifera a Petulis, & Medicamentis quotidie inopportune exhibitæ, pluribus ledunt. 120
 — Methodus ad Curandas Febres quantum Methodo per V. S. & Purgationes, periculosa, & magis incerta, pluribus argumentis stabilitur. 115. In quibusnam Febribus profunt, in quibus noceant. 8. 29. 40. 42. 115.
 — Purgantibus mista ante Paroxysmum exhibitæ, in Tertian. Autumn. commendantur. 9. Sine Purgantibus sunt exhibenda. in Tertiana duplici. ibid. Et quare. ibid.
 Sudorifera quacumque in Lue Venerea æque prodesse possunt, quatenus evacuant, quam Ligna Exlicantia. 78
 — in Malignis quibusdam Morbis pessima, in Peste bona. 32. Horum, in Peste tractanda, incommoda, ac difficultates solvit Sydenham sua Methodo curativa. 13.
 — in Phrenitide a calefacientibus inducenda nocent. 113
 — in Podagra ad Materiam Morbi ejiciendam, neutiquam conducunt. 101. 102. Tamen obficiunt minus quam V. S. vel Purgantia. ibid.
 Suppuratio in Pleuritide essentiali, neglectu Vena sectionis, vigente inflammatione, contingit. 35. Quenam eum sequantur. ibid.
 Syderatio Rusticis etiam dicitur Febris Erysipelatosa. 37
 Symptomata quædam media sunt, licet ingrata admodum, quibus Natura materiam peccantem &c. excludit. 1. Quod Opus aliquando, ab ignavis, interturbatur; ibid. Et sæpe haberi solent hæc confusi Naturæ, de statu suo dejectæ, Effectus; hinc ea exquisitè adnotare opera pretium non videtur; unde Historia Morborum adnotata hæcenus deficit. x.
 — non nulla, in Morbis, aliquando non tam Morbo, quam Medico debentur. 14.
 — irregularia ubi Morbum aliquem obvelant quomodo hinc eruendus, ut ad familiam suam relegatur. 36. 37
 — peculiaris distincte percepta in Causarum morbosicarum, & Indicationum curativarum cognitionem deducunt. x.
 — vehementiora sunt in Morbis, si Natura, materiam morbosicæ vi oppressa, fatiscat. 1.
 Symptomata seu Effectus ab essentia alicujus Speciei &c. vid. Humores, Speciem &c.

Febris Cont. 1661. ad 1664. singularia. 3. Quenam in his Febris Emetico, mire, tollantur. 4. Februm Intermitt. Autumnalium diuturniorum, pessima quenam. 8. Febr. Intermitt. Vernaliu respectu Autumnalium, in declinatione, pauca. 10. In Paroxysmo Februm Intermitt. vulgaris. 7. Februm Tertianarum An. 1661. quenam fuerint. 3. Februm Stationarium, aliquando differentiam duplicem admittunt. 24.

in Lue Venerea, ope Salivationis per Frictionem, quando minue-
re incipiant. 79

Morbilis decedentibus supervenientia quenam, & quomodo V. S. curanda. 25

Podagra Regularis, & Irregularis, vid. Podagra.

Symptomata Genuina Variolarum Regularium, tam Confluentium quam Discretarum 15. 16. 145

in Variolis tempore invasionis quenam, & unde. 84. Variolis Discretis eruptentibus, sua fonte cessant. 86

Variolarum Regular. pessima, & lethalia, tempore Eruptionis, Venæ sectione, in quibusdam hominibus; prævertuntur. 18

in Variolis, quenam ingentem materiam Variolosa copiam, & discrimen, a Pusculis exitum certatim querentibus, hasque brevi confluentibus, indicant. 86. Quid tunc agendum. ibid.

Symptomata Anomala in Variolis Regular. Confluent. æque ac Discretis, Morbi quolibet statu, communia. 16. Fiunt vel a calore nimio, vel a frigore, aut frigidiusculo ac debilitato sanguine. 16. 30. In Confluentibus undecimo die, & Discretis octavo die, occurrentia tamquam magni momenti expendenda; & quare. 16

in Variolis Regular. Discretis, ex mala harum tractatione oriuntur. 16 Quenam sunt. 19. confer 17

Variolis Reg. Confluentibus & Discretis, quenam singula-
ria. 16

legitima in Variolis Regular. Confluent. cum Discretis, ini-
tio, communia quidem, sed atrociora sunt; & præterea in Confluent.
propensio in Sudores multo minor. 15

Variolas Regul. Confl. solas, ante Eruptionem concomitan-
tia aliquando, Eruptionem non nunquam, sed non sæpe, reprimen-
tia, has quoque Confluentes futuras indicant, ibid.

in Variol. Regul. Confl. hisce jam eruptentibus, ut &
etiam Febris, non evanescunt, ut in Discretis, ibid.

Variolarum Confluentium duo, non parvi momenti, in Adul-
tis Salivatio, in Infantibus Diarrhoea, quorum prius certo magis,
concomitantur. 16

pessimi generis, Paroxysmi instar, vesperti ægrum vexant. 18.
Que Paregoricis præveniuntur. ibid.

Lethalia, ubi Salivatione jam cessante, 11. die, exstinguitur æger.
16. Lethalia in Variolis ut Mictus sanguineus, Maculae purpureæ,
in Junioribus præsertim, quod lecto nimis cito adfigantur, nascuntur.
17

Symptomata Variolarum Regul. Discretarum quibus ab initio, in
Adultis æque ac infantibus, stantur, quenam 15

in Variolis Regul. Discretis Mortis præsentia, quenam. 11.
16. 145

Variolarum Discret. malignarum Constit. An. 1651. ad 1664.
grassantium. 11

in Variolis Utriusque Generis a materie Repercussione ex Fri-
gere nimio, vel Evacuationis inopportunitis, quenam sint, licet op-
pido rara, & quomodo tollantur. 19

in Variolis a calido Regimine, eadem que a nimia inflammatio-
ne pendere solent. 29

a Regimine frigido nimis, Faciei ac Manuum intumescen-
tiam impediunt, & Pusculas flaccidas reddunt. 30

que ex Figure nimio, vel Evacuationibus indebitis contin-
gunt, rariora multo, quam que ex Calfacientibus & Cardiacis,
licet Pusgus hecce minus culpet, quam illa 19

Syrupus Chalybis quomodo fiat. 91. 92

de Meconio qualis præferendus aliis 104. 105. Præfertur etiam tan-
dem ab Auctore suo Laudano. 85. Qua dosi exhibendus. ibid. Uni-
ca j. huius idem valet quod Laudano liquidi gutt. xvj. 87. Tamen ali-
quando ferri nequit, tuncque Laudano utendum. 92. In Variolis ad
sesquialteram una vice exhiberi aliquando debet. 87. Ad Unc. jss.
una vice, in puro exhibuit Auctor, iterata vice. 87. In Variolis
Confluent. Juveni, sexto die, ad Unc. j. propinatur. 88. Decimo
die ad Unc. jss. Die undecimo mane & vesperti iterum ad Unc. jss.
singulis vicibus. ibid.

Syrupus Spinæ Cervinæ. vid. Spinæ Cervinæ Syrupus.

T Abacus in Ileo, fumo inflatus specie Enematis, præstantissimum
remedium. 145

Tabellæ, Apoplexiæ Paroxysmo finito, exhibendæ. 146. In Tussi Epid.
1675. absente Febre &c. ubi a suscepto frigore, exhibendæ. 32

Tabes. 150

Tabes Abdominalium partium, in Infantibus sæpe excitatur, nimis
frequenti Purgantium repetitione. 92

ex Hemoptoe, a repetito Cathartico, nasci potest. 38. a Medi-
camentis Pectoralibus quomodo sæpe fiat. 42. Ex Pleuritide essentiali
quandonam. 35

deplorata Equitatione, tamquam Specifico, curatur. 93

Tacitus (Titus) quid obrectanti Metello regeat. vii.

Tegula Hybernica in Contusis non est Specificum. 106

Tempestas calida, vid. Calida Tempestas.

frigida, vid. Frigida Tempestas.

Morbis, inflammatorie diathesis, producentis maxime idonea,
est illa inter Ver & Æstatem ambigens. 11

Tempestates Anni Morbos haud pauciores, Naturæ instinctu, proprios
habent. 1x. Huiusque rei cognitio Medico, in quibusnam quam plu-
ribus, multum prodest. ibid. Huic minus plus illi, Morbo favent;
& quare ipse notande Tempestates. ibid. In quibusnam, Ægritudi-
nes intruere consueverunt, cur non melius notantur Medici, cum adeo
necessarium illud sit, miratur Auctor. ibid.

Tempora, in uno Intermittentium Paroxysmo, tria spectanda sunt. 7.
Horum ratio. ibid.

Tempus Eruptionis, vid. Eruptionis Tempus.

Tendinis Punctura, vid. Punctura Tendinis.

Terebinthus est adfida desidendi cupiditas. 23. 145. In Dysenteria,
quando. 22. In ea non est ab ulcere Intestini recti, sed quod mate-
ries morbosa in ipsum devoluta, viribus ipsius expelli nequeat.
23. confer 22. Adultis exitialis, Infantibus benignus, licet a men-
ses perderet. ibid. Frustra Topicis, ut Clysteris, Fotibus &c. curatur,
quia parti applicata, plus debilitant. 23. Sed curandus per ea, que
corpori in genere vires addunt, ut Dieta analeptica, & Cardiacis;
unde sæpe tolerandus, donec ea pro lubitu ingeri queant. ibid.

Terebinthina Cypria in Gonorrhœa Virul. 79

Terræ effluvia Morbos Epidemicos variis gignere possunt, infecto prins
aere. 30. 31. 102. 112.

Tertianæ Febres, vid. Febres Tertianæ.

Testes Faminarum in Hydrope quomodo adficiantur. 107

Testiculorum rotatio quædam, Gonorrhœæ Virul. initio percipitur. 78.

Testis tumor, in Gonorrhœa, unde, & quomodo curandus. Vid.
Scroti tumor.

Thamesis Nobilis fluvius, An. 1683. prevalido gelu ita compaginat
fuit, ut & currus & officinas, solidi instar pavimenti facile susten-
taret. 112

Theologia Naturalis quid sit. 40

Theoria Rationis Momentis innixa, quam lubrica, & facile inver-
tenda. Vid. Rationis Momenta.

Hippocratis, qualis Medicorum vera debet esse, Naturæ exquisita
descriptio fuit. x.

Therapœia perperam administrata, Malignitatem in Febris dictam
aliquando potius producit, quam Venenosa quædam Morbi indoles. 11

Therapeutica solertia Veteribus debetur.

Theriacæ Andromachi in Hysterica Adfect., tum in aliis pluribus ma-
lis, summe commendatur. 93. In Febre Pestilent. feliciter usurpatur.
14. In Podagra præ cæteris ubinam conscrat. 102

Thomas M. D. cum Auctore Operis socius. 11

Tonillarum lethalis inflammatio unum ex gravissimis Symptomatibus
Intermittentes Autumnales, diuturniores, insequentibus. 8. Quando-
nam in his mortem præ foribus denunciat. 9

dolor & inflammatio quandonam mortem imminetent præmon-
strent. 10. Et quenam Symptomatis huius causa. 9

Tophaceæ Concretiones Cretam vel Oculos Cancr. amulantes, ad Ar-
ticulorum digitorum, curam destruentes, in Podagra irregulari, 100. 104

Tophi in Podagra ex quanam materia enascantur. 104

in Podagricis Exercitio corporis constantiore, præsertim Equitatio-
ne, considerandis, ab incremento inhibentur, non solum, verum &
veteres, si modo curam non destruxerint, solvantur. ibid.

Topica Medicamenta in Hydrope. Vid. Hydrope Topica &c.

Infantium corpora facile penetrant. 92

Tormenta Ventris sine dejectione, nullis sc. excretionibus stercorosis
vel mucosis subsequenter, in Constit. Dysenterica An. 1669. &c.
quomodo Autumnæ grassari incipiebant, & Torminibus istius temporis
Dysenteria respondebant, imo Dysenterias numero fere superabant,
21. 22. confer 114

hec curabantur ut Dysenteria Constit. istius, 22. 114. Quomodo,
tamen Curatio primi Anni ab ultimorum Annorum, diversa esse de-
buerit. 23

in Febre nova Epid. ubi præcipue Morbum constituebant, ut ipse
Morbus, curabantur. 114

Tubera ossium seu Exostoses, in Lue Venerea, qualia. 78. Quomodo
curanda.

Tumor Abdominis in Fœminis duplex, ad Hydropem non spectans;
unus a Carnium in Abdomine excrecentia præternaturali: alter a
flatibus, Ingravitationis signa producent, plerumque in viduis, vel
in iis, que sæpe nupere, & ipsis sæpe imponens. 107

in Abdomine, Infantibus sæpe contingit, Purgantium nimis fre-
quenti repetitione, qui eo plus augentur, quo plus purgatur; Donec
istarum partium Tabes & putredo insequatur. 91. 92. Ex Rachitide
vera, Purgantia quando exigat. 92. Sive a Rachitide vera, sive a
scrophulis, quomodo curandus, ib. Reliqua. vid. Abdominis Tumor.

Tumor Crurum in Febris Intermitt. Autumn. diuturnior, harum
sæpe decessus signum, in Adultis. 10

in Cubitis, ex Podagra irregulari albus, dein ruber inflammi-
tus. 100. In Variolis Confluent. jam curatis, molestus superueniens,
iisque familiaris, qui curandus. 19. 20. confer 15

Faciei ac Manuum, in Variolis non adeo requiritur, si Pusculæ
perpaucae fuerint, 16. Ceterum Evacuatio, insignis admodum ha-
betur. 16. 18. Nec non minus, suo tempore hic requisitus, quam
Salivatio. ibid. Absens autem peioris est omnis quam si Ptyalismus
interceptus fuerit. 87. Primo in Facie, præsertim in Variol. Discretis,
excitatur; dein Manuum & Digitorum insequitur. 15. 145. Ab
octavo die usque ad undecimum reperiri solet, tuncque cessante jam
Salivatione, subsidere, & minui parum, in Facie solet, incipiente
jam tumore Manuum, moriente aliter ægro. 16. 87. Nec tamen o-
mnino, illo diem, in Facie, sed post diem unum aut alterum, recedere
modo debet. 16. In Manibus tum Tumor succedit illico. ibid. Que
proxime a Facie intumescunt. 145. Ab undecimo die illo, usque ad
Pustularum, in iis, maturationem, persistat. 87. Et ut serius adhuc,
quam illa Faciei, recedat, plurimi momenti est. 18

Tumor Faciei ac Manuum conservatur contemperantibus ac diluenti-
bus; Calidis & Cardiacis vitatis. 26

Promovetur Paregoricis non modo, sed ad debitum terminum sub-
fulcitur & protrahitur. 18. Tum Contemperantibus Sanguinem, &
aura frigidior. 19

Tumor Manuum in Variolis, vid. Tumor Faciei.

Pustularum & Faciei, in Variolis Discret. tum Interstitiorum In-
flammati, cur a Sudore, hic naturali, nimium expresso per cale-
facientia, impediatur. 16

Suturam, Hydropis licet primum signum, præsertim in Viris, ta-
men sæpe, in his, tum & in Fœminis, fallit. 152

Hydropicorum similis, in Viris Asthmate diu vexatis, & dere-
pente abeunte, oboritur; hyeme, & humido aere, invalescens magis,
atque ad mortem usque eos concomitans. ibid.

Tibiarum ex Hydrope, quomodo differat, ab eo ex Hysterica
Adf. 89. Tibiarum, & aliarum partium, in Variolis Anom. quo-
modo incipiebat; & tandem in Suppurationes, & Apostemata, de-
sinebat. 30

Tumores Externarum Partium quasnam præcipue adoriuntur, in Hy-
sterica Adf. 89

in Peste vera, laudabili vita erumpentes, nisi Sudoribus inop-
portunis perturbentur, boni. 12. 13. Non prægressa Febre, exorti, vix
nocent adfecto, neque cum a communibus vitæ muniis abstrahunt. 12

Tumulus Pestis, quomodo fuerit adfectus. 13

Turbith Minerale, in Lue Venerea, ad Salivationem promovendam,
quando, & quomodo usurpandum. 79. In Gonorrhœa Virul. facile
primas fert, & quomodo exhibendum. ibid.

Tusses hyeme qualibet, & sub ejus adventu sæpe adfligunt. 31. 42.
84. In Febre nova Epid. eo citius recedebant, quo remotius ab Hy-
eme invadebat Morbus. 107

Tussis quo citius curatur, eo minor insecutura Tabis metus. 42

Quomodo curanda. 151

Convulsiva Puerorum Febrim comitem non habet. 42. Curatur
V. S. & Catharticis, repetitis, sed lenibus. ibid.

Februm Continuarum Symptoma, unde fiat, quomodo corrigenda.
6. Post Febrim, in Senibus, non tam periculosa, ac existima-
tur. Quomodo curanda. 5

Epidemica An. 1675., ex subito frigore calorem suscipiens, orti,
nemini parcens. 31 Numero, non modo, singularis erat, sed peri-
culosa. ibid. Si Febris & Pleuritis se ipsi admiscebant, quenam præ-
cedere solebant. 32

causam habet ejus Materiem antea in caput, jam in Pulmones,
depositam; Febre interim eadem manente, iisdemque mediis cadente;
31. confer 32

curatur hæc, ut & que ab eadem causa nascuntur mala, V. S.
Clysteribus, abstinentia a lecto, & refrigerantibus. 32. Operam dando
simul, ut Febris, que huc paratissima est, occurratur. ibid. Quomodo
occur-

- occurrendum. *ibid.* Si Febris nondum accersita, curatur Tussis, sine V. S., modo calefacientia & spiritus calida non dentur, quae sine periculo, vel Pleuritidis, aut Peripneumoniae, invitatione, hic non exhibentur. 80.
- Tussis leniter & non hostili manu, ut copia Remediorum, V. S. iterata, ac similibus, tractari volebat. 32. Catharsis, finito Morbo, exhibebatur. *ibid.*
- Si Pleuritis essentialis adesse videretur, curabatur tantum ut Febris istius Constitutionis. 31. 32. Unde liquet Pleuritides, & Peripneumonias, cum enatas, Febris istius Constitutionis Symptomata, & accidentalis Tussis soboles esse. 31.
- Tussis Epidemica An. 1679. ex aeris manifesta crasi, cum novus Epidemicus Morbus, mense Novembris infertur; & quare 42 Vomitus & Vertigines inducit. *ibid.*
- Sicca prius, humidior dein paulo; & a Tussi convulsiva Puerorum, non nisi Febre, dissidens. *ib.* Si imperite tractaretur accedebat Febris similis isti Hiemali, An. 1675. sed quae ut Tussis curabatur. *ibid.* 43.
- Curabatur V. S. Epispastico & Catharsi. *ibid.* 43. Aliquando sponte sanabatur. 42.
- Hysterica, non frequens, pituitosas exagitant, a Convulsiva quomodo differat. 89.
- in Morbillis, fatigat, sed non periculosa, nisi post Morbum. 25. confer. *ibid.* Quomodo tum tractanda. *ibid.* In Morbillis Anom., An. 1674. quomodo curanda veniebat. 30.
- in Pleuritide essentiali, crebra affligit, & valde cruciat; hanc ager pra dolore inflammatorio coercere tentat. 34. Pro ratione liberis expectantibus, sensim minuitur. *ibid.* Sed, Venae sectionis neglectu saepe supprimitur, suffocanti Dyspnoe dominum cedens. *ib.*
- Tussis in Podagra, materiam in Pulmones alliciens, Metastasin ibi, licet raro creat; in quo casu, Morbus tamquam Peripneumonia tractatur; & quomodo. 118. 158.

V

- V** Apores, siue Convulsiones, promiscue vocari possunt Hystericae Adfectionis effectus seu Hysterica Passio, 27. 94.
- a Vomitoriis plus invitatur, quam a Purgantibus. 108.
- Variolae Hippocratis & Galeni tempore, quod cognita non fuerint, unde constat. 31. Adcurate ab Auctore per plures Annos observatae, quare evolvuntur. *ibid.* Harum essentiam ignorat Auctor cum reliquis hominibus. 16. Inter Morbos calidos cum sint recensenda, hinc minus peccatur frigore, quam calore, in iis. 16. 19. Inflammationem singularem a ceteris, ponunt, cujus particulas Natura primo digerit, coquit, tandemque formae Abscessum eliminat. 16. 89. A quorum ergo Natura non abludunt; nam & eorum varios status percurrunt. 16. Hincque per Abscessus, hic, uti in Peste per Carbones, ac Bubones, ejicitur materies. 20.
- Febris, Phrenitidi, Maculis purpureis & similibus, pra aliis Morbis obnoxia sunt. 30. 115.
- ab aeris quadam crasi, Constit. Epid. producente, ut ceteri Morbi Epidemici, oriri videntur. 11.
- Variolae Epidemicae, & iis Annis, quibus Epidemicae Constitutionis praedominium obtinent, si Regulares & mitiores, circa Aequinoct. Vernalium invadere solent. 2. 15. Et tandem invalescentes, sub Aequinoct. Autumn. statum adipiscuntur, coque praeterlapso, in brumale frigus usque perdurant, quo tandem vertuntur in fugam. 6. 7. Si Anomala, seu Irregulares fuerint, quo tum & periculosiores, maturius nonnunquam quam mitiores, h. e. Januarii mense, invadunt. 15. Hyeme aliquando oboriuntur, ut An. 1680. post Febrem Epid. sed non Epidemicae tunc erant. 84.
- Epidemicae factae nemini parcent, nisi prius hoc Morbo adfecto; nec tamen sufficit adulterino quodam Variolarum genere, quod ad hunc Morbum nihil adinet, laborasse. 15.
- pro Constitutione peculiari, quae incessant, haud secus ac Febris Epid., vario se habent modo, ac peculiaris Generis sunt: hoc Anomali serie aliam, aliam alteram, Speciem referentes, uti interim juxta Phaenomena communia convenire videantur. 11. 15. 33. Ad quendam singularem fuerit referenda, a die, quo erumpunt Pustulae, ab harum magnitudine, atque colore, &c. experto facile constabit. 33. Quolibet porro, quod notatu dignum, quo mitioris sunt Speciei, eo citius earum Pustulae ad maturitatem, & Morbum ad finem, perducunt. 30. Sed eo tardius tum quoque erumpunt. 15.
- periculi plus, vel minus inferunt, pro Pustularum numero, quarum paucitas omnem salutis spem constituunt; & e contra. 84. confer. *ibid.* Hinc ubi copiose prodeunt, unicum est, in quo suppetias Aegro, initio Morbi, adferre potest Medicus. *ibid.* Aetatis & Sexus respectu, periculi plus, vel minus, inferunt. *ib.*
- Variolae pro diversa Constit. quoniam etiam diversum periculi terminum habent. 30.
- in Anomala seu Irregulares, & in Regulares seu Genuinas vel Legitimas, ab Auctore dispeci solent. 15. 19. Regulares & Genuinae quare ita vocatae. 15.
- in Confluentes, tum in Discretas siue Distinctas seu Interstitias, iterum dividuntur tam Anomale, quam Regulares. 15. 116. 145.
- Confluentes & Discretae licet essentialiter non differant, & quaedam Symptomata habeant communia (15.); tamen ab invicem immaniter differant, & tanto intervallo distant, ut per illustriora quaedam Symptomata facile discriminentur, licet hoc vulgus non animadvertat. *ibid.* confer. 18. 84. 130.
- Methodo nova a Sydenhamo tractantur, quod aegre ferri non posse existimat, cum non videretur, sed Modernorum tantum Curationibus adversetur. 31. Solebant diro calidiorum, tum Regiminis, tum Remediorum, usu, tractari, imo & aliquando curari; contraria tamen hic, ac plane opposita, Methodus, temperata ac refrigerans, feliciter cedit; quomodo itaque dijudicari debeat, quoniam optima sit. 116. confer. 18.
- Variolae triplicis Generis praesertim, ab Auctore, hoc Opere describuntur, juxta tres Constitutiones diversas, per quas gradibus se ita illae promovebunt, ut posterius Genus prius semper exsuperaret respectu puritatis, & materiae incoercitatis. 30. confer. 84.
- Variolae Constitutionis. 1661. ad 1664. quare non describantur a Sydenhamo, sed de iis tantum pauca tradantur. 11. Divis Symptomatibus breviter jugulabant haec. *ibid.*
- Variolae Regulares Constitutionis 1667. ad 1669. illae sunt, ex quibus tanquam in sua genere omnium perfectissimis, Variolarum Historia vera, & Methodus Medendi, sunt desumenda. 15.
- seu Legitimae, postquam durante Constit. Pestilent. ferè delinquant, circa Ver An. 1667. incepere, & auctae, sub Autumno Epidemicae factae sunt; sed, superveniente brumali frigore, parcius lacebant; proximo Vere iterum invadere, earum impetu Hyeme iterum coercito; tertio demum, Vere surgente, increbrescebant, sed minori impetu; atque Augusto penitus intercedere, surgente Dysenteria. *ibid.* Benignae erant, plures infestantes, & paucos jugulantes. 15. Haec comitabantur Febris Variolosa, & toto tempore. 15. 19. 20. Et Diarrhoea, ultima astate. 15. 20.

- Discretae quaedam, Phaenomena Naturalia seu Genuina habent; inter quae, Statu, seu tempore, Invasionis, notata digna sunt, in Adultis, ingens in Sudores propensio. 15. Hocque Variolas minime confluentes praenuntiat. 15. 145. In Infantibus Stupor & Somnolentia. 15. Tum & aliquando Epileptici motus; qui boni moris, atque eas in prociectu esse, & non confluentes, indicant. 15. 86. 145. In utraque aetate, uti & Specie, a primo insultu, Febris praecipue dominatur, ad Eruptionem usque; inde dat inducias ad Maturationem; quo elapso desinit. 16. 145. Dolor, in Scrobiculo cordis, admodum magnus. 15. 19. 20. 145.
- Variolae Notandum interim, quod in laxioribus temperamentis, aliquando, sine insigni aegritudine praegressa sensim, atque gradatim, ad Eruptionis periodum pervenire.
- In Eruptionis Statu (qui tardior quam in Confluent. 18.) Quarto die ab Invasione, si primum etiam includat, raro citius, non nunquam serius (15.) contingente, erumpentes Pustulae considerandae veniunt. 15. 17. 145. 25. Symptomata prioris Status minuantur. 15. 18. 145. Sudores in Adultis persistunt. 15. 16. 18. Faucium dolor cum Pustulis surgit & augetur. 15. 145. In Maturationis Statu, exordientis octavo die, dies in hac Specie fatalis, Pustulae, praesertim in Facie (nam in reliquo corpore aliter habent) laeves & rubrae, asperae jam, per album in flavum, pro maturacionis ratione, habent colorem illis tum genuinum, & in eum, quo mitior fuerit Morbus, magis vergentem. 15. 16. 26. 27. Tumque maturae haec tandem, similem luteum liquorem vomunt. 15. 25. 145. Intervall. Pustul. in Facie, prius alba, interim, & quo mitiores Variolae magis, rubent instar Ros. Dam. inflammata, tensa, dolent, tument unum cum Palpebris, quae si Pustula copiosa citius quidem tument. 15. 16. 145. Dein & Manus, ac Digniti, intumescunt, quod aequae salutaris ac Pustularum eruptio, si haec numerosa. 16. 17. In Excrecentiae vel Decidentiae Statu, Suppuratione, undecimo die, ad summum evecta, Pustula maxima facta, exarescere & decidere incipiunt, recedente Faciei tumore. 15. 145. Die decimo quarto vel quinto funditus disparent, in Facie, in reliquo corpore nondum. *ibid.* Et in Manibus disrumpunt, ac in Facie, & reliquo corpore, desquamatione, recedunt. *ibid.* Denique Cicatrices oboriuntur, quae tamen in hac specie rare, nisi confluant. 15.
- Variolae in Eruptionis Statu Phaenomena Anomala, ipsis singularia & perversa tractatione habent. 16. Occurrunt die Octavo. & bene expendenda sunt, quia moriuntur illo die, qui ex hoc Morbo pereunt. *ibid.* Mortis hic praenuntia quoniam. *ibidem.* Finit praepriis ob Cardiacorum & Regimen calidum, quibus Sudor per se promptus satis, nimis exantlatus, subito cessat, nullis mediis revocandus; unde tumor partium requisitus denegatur; hinc plura mala, & quae tumere, rubere deberent, pallent & flaccescunt, Pustulis interim rubentibus atque elevatis, etiam post aegri mortem. 16. 17. 19. 145. Non enim moritur ager ob retrocessum Pustularum, sed quod Facies non turgescat. 19.
- Anomala cum Confluent. Variol. communia, quolibet Morbi Statu occurrentia, habent. 16. Et producantur ex Calore Sanguinis proprio, vel ex causa externa; & sunt Phrenitis satis frequens, Coma. 16. 145. Tum Maculae purpureae, leti nuntia, Pustulis interspersae. 16. 84. 145. Pustularum subsiditiae & flacciditiae, cum maculis nigris in harum summitate depressa. 16. 145. Mictus cruentus in Adolescentibus, quibusdam, & Sputum Sanguineum, quod tamen raro; bina Symptomata mortis certa praenuntia, initio Morbi plerumque contingunt, Pustulis nondum vel vix erumpentibus, & in tali Specie occurrentia, quae in maxime Confluentes adolesceret; nisi ante morerentur. 16. 19. 145. Urinae suppressio, praesertim in Juvenibus, & in Discretarum declinatione. *ibid.* Dein ex Frigore Sanguinis, ab aere, vel V. S. inopportuna, aut Catharsi nimia, indurto; quae mala rariora, quam quae a nimio Calore. 16. 19. Attamen Pustularum retrocessus, una cum Diarrhoea, Adultis periculosa, & partium detumescencia, aliquando ex eo consequitur. 16. 19. 30.
- Variolae Regulares Confluentes quaedam Phaenomena Naturalia & Specialia, habent; quaedam cum Discretis Communia, & haec praepriis habent Tempore Invasionis. 15. Sed ea vid. supra. Haecque atrociora ubi reperiuntur, quam in Discretis, ut Febris & alia, de Confluentibus futuris tum constet. *ib.* 86. Sudor Spontaneus tantus, non adest, ut in Discretis. 15. 145. Tam Specialia ipsis, non multa, tamen quae quo graviora, eo certius indicant eas Confl. fore, nec sine magno periculo. 15. 16. Diarrhoea Eruptionem praecedens, & aliquando protrahit post illam. 15. Unde oritur. 18. Tum Dolor acutissimus, in lumbis, latere, artubus, venterculo, Pomitus enormis, Anxietas, Aegritudo, Vertigo. 15. 16. 86. 145. Tempore Eruptionis, nunc Erysipelatis, nunc Morbillorum, ritu prodeunt, quod fit ut plurimum tertio die, aliquando citius, raro tardius, licet aliquando post contigerit. 15. 16. 88. 145. Et quo citius ante illam, eo magis confluent. 15. 145. Si ad quartum vel quintum diem defertur, atrox Symptomata est in causa, hinc periculosa futura. 15. 16. 145. Haec Variolae erumpentes, vix a Morbillis nisi a tempore Eruptionis distinguuntur. 16. 145. Post Eruptionem Symptomata priora non desinunt, & Febris ad multos dies adhuc exercuit, & vix desinit ante Maturacionem. 16. 18. 145. confer. 16. 145. Et, si vehementior fuerit Morbus, sub vespere, cum aliis Symptomatibus exasperatur. 84. Praesertim diebus intra undecimum & decimum septimum. 105. Pustula non in molem aucta, ac Discretarum. 16. Et de profluentibus multo sunt, quam in illis; unde Medicorum error aliquando; & falsus de Pustularum retrocessione rumor. 19. Pellicula quasi vesicula rubra, dein in album abiens, ex imolicitis sibi invicem Pustulis conflatur, nec multum elevatur. 19. 145. Haec post diem Octavum exasperatur, & in fuscum, non flavum, abit. 16. 145. Sed quo propius ad subsuscum vergit, eo peiores Variolae, & magis confluentes. 145. Quo in flavum magis vergit, eo mitior Morbus. 16. Pustulae Manuum, ac Pedum, majores quam Faciei & reliqui corporis, & quo altius ab extremitatibus ad Truncum itur, eo minores. 16. 145. Magnitudo porro Morbi, & periculi, pro Pustularum in Facie numero, tantum aestimari solet. *ibid.* 84. Tibi quoque tument in hac Specie. 30. Symptomata interim duo, non parvi momenti, & in hoc genere adeo necessaria, quam Pustulae vel Faciei ac Manuum tumor, adfunt, quae Adultis Salivatio, in Infantibus Diarrhoea. 16. 18. Illa, si faciem excipias, Ptyalismo a Mercurio excitato similis est. 16. Cur adesse debeat, quando incipiat, desinat. vid. Salivatio in Variol. Regul. Confl. Ubi incipit desinere, Undecimo die, quoniam adfuit Symptomata. 100. 145. Facies quoque detumescit, sed ejus loco Manus intumescere solent, aut debent, ob Pustularum exiguitatem. 16. 18. Diarrhoea vero, licet certo satis, tamen non tam certo discerniat Infantes, ac Salivatio Adultos. *ibid.* Verum ubi adest, salutem his adfert non periculum. 20. Nec adeo matura eos invadit, ac Salivatio; & ubi ingruit, ni arte fistatur, singula Morbi stadia percurrit. 16. Quare necessaria haec sit excretio. *ibid.* Tempore Desquamacionis, praeterlapso die Octavo, Pellicula in Facie, fusciore adhuc, desquamatur, & aliquando post vicissimum diem separatur. 16. 145. Quo fusciore eo lentius abscedit. *ibid.* Humeri, & dorsus, Cuticula aliquando etiam deperditur. *ibid.*
- Variolae Regulares Confluentes Phaenomena Anomala specialia, ex perversa

versa tractatione, adipiscuntur. *ibid.* Occurrunt hic Undecimo die, & bene expendenda, cum eo die qui ex hac Specie intereunt, pereant. 16. confer 87. In crudiori adhuc genere moriuntur decimo quarto die, in erudissimo decimo septimo; aliquando, sed raro, non ante vicissimum moriuntur. 145. Horum causa Sanguinis nimis fervor, vel Sudor nimis extortus. 16. 26. 84. Primarium est Salivationis subita suppressio, nec Faciei tumore persistente, aut Manuum, istius vices supplente, subsequente. 16. 18. 145. Hoc Symptoma solum omnes fere jugulat, qui in hac specie moriuntur. 19.

Variolæ Regulares Confluentes Symptomata Anomala communia cum Discretis quænam habeant. *Vid.* Variolæ Regular. Distinct. & c. confer 84. 86.

Variolæ Anomalæ nigræ Constitutionis 1670. ad 1672. per Morbillos introductæ, & una cum Febre Dysenterica, & Dysenteria, grassantes, sed his Autumno primas cedentes, Januario mense jam ingressæ, a Variolis Regularibus Phenomenis insignioribus, discriminabantur, atque ad aliam Classem reducendæ omnino videbantur. 21. 25. 26. 30. Et eadem, quod notandum, ut Epidemici solent, primo atrociores, ultimo Anno, remota sævitia, & nigredine, induta flavedine, Benignæ sunt factæ, respectu generis. 25. 26. 30. Cur Variolæ Constitution. Dysentericæ vocatæ. 21.

Phænomena quæ habent Singularia, non quæ Communia, exponuntur. 25.

Discretæ discriminantur a Regularibus Distinct. Eruptionis Tempore. *ibid.* Pustularum mole, asperitate, colore. *ibid.* Ptyalis. mo, qui ut in Confluent. at non semper, aderat: unde constabat ad Confl. naturam magis accedere, & inflammatorias magis esse. *ibid.*

Variolæ Anomalæ Confluentes discrepant a Regularibus Confl. admodum. 25. 26. Nam Die secundo vel tertio erumpunt. 25. Febris inflammatoria major quam in aliis. 26. Pustulæ in facie instar Erysipelatis; reliquo corpore congeries ex Pustulis constata. 25. Quomodo a Morbillis, & Erysipelate distinguebantur. 26. Vesiculæ inter Pustulas, in femoribus, in nigredinem abeuntes aderant. 25. Has brevi mors insequatur. 26. Pellicula albavirescens, undecima die, primo in Facie, atque maturitate in nigrorem fuliginosum abibat. 25. Qualis ex ea stillabat singularis materies? *ibid.* Agri ad Salivationem procliviores. 26. Discrimen, (ni vesiculæ inter Pustulas, instantem Mortem designantes, aut Calidis mors præcipitata,) die decimo quarto aderat: aliquando decimo septimo expectabat; quo die elapso nullus moriebatur. 26. 30. Furfures diu adhærebant; & Stigmata sædiora in cute. 26. Notandum, Dysenterici tum regnantibus, has Variolas, calido Regimine excitatas, per Dysenteriam sæpe sibi viam parasse. *ibid.*

Variolæ Anomalæ, Nigræ, Pessimæ, Constitut. 1674. & 75. istis An. 1670. adeo similes, ut eadem renatæ viderentur. 30. Pluribus tamen, ut Putredine (hic longe maxima. 31.) tum incoercibilitate, diffidebant. 30. Hinc Species nova videtur ex præcedente suborta. *ibid.*

Variolæ Pustulæ immaturæ erant fuscæ; si vero maturæ & numerosæ, quia tum pusilla, Nigredine fuliginem æquabant. 30. Si pauciores essent, non minores tum, quam in aliis generibus, & raro nigræ. *ibid.* Salivatio, nec non Faciei ac Manuum tumor, hic quoque salutare. 85. Fætores, ubi maturæ, omnes fugabant adstantes. 30. Periodum suum tardius absoluebant, & diutius hærebant, quam ulla species nota. *ibid.* Dies fatalis ne quidem decimus septimus, sed post vicissimum adhuc trucidabant. *ibid.*

Confluentes plures orco dabant, quam ulla species, & Pestem perniciem ægrorum fere æquabant. *ibid.* Nec tamen nisi maturæ necabant. *ibid.* Si Discretæ aliquando forent, non peiores erant aliis. *ibid.* Et satis benignæ. 31. Tumores quidam, si ægri evaderent, quod raro, enati in Apostematâ ibant. 30.

Confluentes pessimæ An. 1681. Epidemice fiunt Lond. 84. Hyeme incipiunt, An. 1680. pergunt usque in Annum sequentem, ubi Æstate incrementum, tandem Erysipelatibus facta, stragem ingentem edunt. *ibid.* Siccitate inaudita istius Anni acutuntur vehementer. *ibid.* Eruptionis tempore, Exanthematibus nondum plane expulsi, Maculæ purpureæ exoriuntur, præmaturam Algetem accensentes. *ibid.* Horum confluentium iterum incitabatur aeris intemperie, eadem ratione, qua Scio-li ac Medicastri, Regimine calido & Cardiacis suis, illud ipsum facere solent. *ibid.* Post Eruptionem Corpus, ac in primis caput, copia Pustularum calefiebat adeo, ut æger, nisi Insans, Vigiliis & inquietudine vexaretur. 86. Quo sedatior erat Sanguis, eo majores & minus confluentes Pustulæ; contra: hinc quo tumultuatio magis, eo tardius ad separationem pertinebant, tumque & ichor, loco puris, fiebat; & Nigricans humor quidam, loco flavi coloris Pustulis continebatur. *ibid.*

Variolæ curandæ ubi veniunt, Indicationes seu Methodus medendi cuiusdam Fundamento superstruendæ. 16. Sed Indicationes contrarias plane suggerit hic Morbus, nam calidum, æque ac frigidum, nimis iusto Regimen obest. 30. Et quod præcipue hic agendum requiritur, præsertim in Speciebus vehementioribus, erit, a. ut Sanguinis ebullitio compescatur, b. Tum ut Pustularum elevatio, atque Faciei & Manuum Tumor præcuratur. 31. Notandum enim est Morbum hunc, duobus habere Tempora; primum Separationis est; alterum Expulsionis. 16.

Indicatio Tempore Separationis, (in quo Natura Ebullitione febrili, per tres vel quatuor dies, partes inflammatas seligit, congregat, & relegat, quod citius etiam persolvitur, quam sequens. 16.) Curatur ne Ebullitio illa exorbitet, neque nimis langueat. *ibid.* ad 17. Quo enim separatio tardior, modo non langueat, eo melius illa absolvitur. *ibid.* Natura enim sibi permessa, in Junioribus præsertim, per se dives, & satis edocta, materiam debito ordine, ac via secernit, & expellit. *ibid.* Sic Variolæ primo non erumpentes, minus timendæ, quam quæ præmature retrocederent. 17. Cavendum itaque sollicitè, tum a Regimine iusto nimis calido, siue fuerit ex stragulis lecti: ex acre loci calefacto; ex Calidis nimis & Cardiacis Mediis; præsertim vigente ætate, in Plethoricis, vel ætatem inter & ver. *ibid.* Ex his Variolæ nimis protrusæ, & separatione tumultuario procedente, conflunt. *ibid.* Vel Sudores sunt ingentes opus turbantes. *ibid.* Vel alia plura mala, opposita Methodo nunquam observata. *ibid.* confer 16. 17. Cavendum itidem a Regimine refrigerante nimis, ut per Evacuantiâ instituta, ne Ebullitio nimis langueat. *ibid.* Inde enim Pustulæ quasi repressæ detumescunt. 31. Et quare. *ibid.* Si vero Confluentium metus adsit minimus, non modo P. S. sed & Emeticum proponendum 17. 145. Præmissis his Evacuationibus, aliquando tum melius erumpunt. 17. Indicatio Tempore Expulsionis, curat, ut Abscessus excitati suos modos bene percurrant; unde Curationis summa pendere solet. *ibid.* Ergo præstandum, ut Pustulæ debito modo sustineantur, quo rite atque ordine destinatam Periodum adsequantur. *ibid.* Hoc tempore, plus adhuc alio, cavendum a Regimine calefaciente. *ibid.* Quomodo vero hæc noceant. *ibid.* Quæ mala producant. 16. 17. 30. Porro vid. Calefacientia, vel Regimen calidum. Quando nam vero Cardiacæ convenire possint. 17. Exquisite tamen vitandum, ne ægrum Frigoris injuriis exponendo Eruptionem impediamus. *ibid.* Hinc Caloris Gradus optimus, naturalis est; qui ab hoc deficit, huncve excedit, periculosus est. *ibid.* At hunc definire Gradum ardua res! & quæ prudentem ac sagacem Medicum exposulat, propter plura quæ pensanda, & Nutricum, inde sæpe errantium, iudicium superant. *ibid.* Quare in hoc casu tum Morbus tum Praxis Medica, in incerto, ac lubrico loco sistuntur; atque Medici fama in angusto versatur; & quare. *ibid.*

Variolarum Curatio Generalis ante Eruptionem. 17. 18. Aura libe-

rior interdicitur. 17. Dieta ex ceptis, & temperatis, dempto potus frigore, commendatur; nec improbatum rustica ex lacte cum pomis cocto. *ibid.* Calefacientibus & Cardiacis ne acceleretur Eruptio, ut ante diem quartum sæpe satagunt. *ibid.* Sæpe hoc illi potius quasi obex; vel, quod malum, Confluentes factæ sunt, quæ per se Discretæ fuissent. *ibid.* Quo tardius prorumpunt eo melius. *ibid.* Nemo enim interit, quod ocys prodierint Variolæ, nisi Calefacientia impediverint; hinc ubi earum suspicio, non illico propellendæ. *ibid.* Lecto addicere ante diem quartum, æque malum, ac Cardiacæ intempestiva. 17. 18. Cardiacæ sed Paregorica si Eruptio, ex voto, procedat, quare exhibenda, & quando. *ibid.* P. S. quandonam instituenda. *ibid.*

Regularium Discretarum Curatio specialis, post Eruptionem. 18. Discretas fore unde constet. *ibid.* Omni prorsus periculo vacant. *ibid.* Regimen calidum abest. *ibid.* Dieta vero tenuis, & temperans. 17. 18. E Lecto quotidie quando, & quare, surgendum. 18. Si ei incumbendum; Stragula ut in sanitate sint. *ibid.* Quomodo vitandi Sudores nocui in eo. *ibid.* Focus an exstruendus. *ibid.* Cardiacæ suppurationis tempore, quænam, quando & quare. *ibid.* Dieta cur tum Cardiacæ paulo. *ibid.* Paregorica quænam suadeant. *ibid.* P. S. in hac specie per se nocens, quandonam concedenda. *ibid.* In hac Specie, opposita Methodo tractati tot perire, ut pudeat in tam levi Morbo. *ibid.* Ratio cur ex Plebe, in hoc Morbo, pauciores pereant quam inter Divites. *ibid.*

Variolarum Regularium Confluentium Curatio specialis ante Eruptionem innotuit, ut Pustularum, nimis frequentia prævertatur, tum ab hac Multitudine vel paucitate, dependeat discrimen aut salus. 84. Post Eruptionem. 18. 19. 84. ad 86. & c. Hæ periculosa admodum. 18. Paregorica undecimo die temporis h. e. hora quinta exhibita, inopinatio, Mortem sæpe anteveriunt. 87. Vulgus harum & Discretarum male Curationem ex æquo prædicat. 18. Hæ Medici artem vere occupant, non vero Discretæ, nisi Medicus sibi & aliis imponat. 88. Hinc vera Medela duobus his innititur; ut initio Morbi præcaveatur, ne materies, nimis fota, seu nimis adsimilata, exorbitet, & Pustularum ingentem frequentiam procreet. 87. confer 84. 86. 87. 88. Tum ut Spirituum inordinatus motus, ab inflammatione externarum, & puris acrimonia, excitatus compescatur. 87. confer 84. 85. 86. 87. Quas has Indicationes qui persolvit, jam ut Medicus satisfaciat, quamvis nondum ut Formularum Prescriptor. 87. Hinc Curationis exitus pendet a modo, quo æger fuerit tractatus. 86.

Variolarum Regularium Discretarum & Confluentium, Symptomatum Curatio, ex Methodo, diversa ab illa Auctoris, enatorum. 19. Symptomata ex Regimine refrigerante & frigore externo, quomodo tractanda. 19. confer 16. Pustularum depressio in Confluentibus non timenda, cum nihil habeat, præter Morbi morem. 19.

post Pustularum recessum Curatio. *ibid.*

Anomalæ nigræ Curatio. An. 1670. ad 1672. Curatio. 26. Regimen temperatum, per liquida æstum mitigantia; præsertim Maturationis Febre vigente; tum Hypnotica, opus persolvunt. *ibid.* Hi liquores quid faciant, & qui Ptyalismum adjuvant. *ibid.* Hi sæpe etiam Variolas Confluentes futuras, in boni moris Discretas transmutant. *ibid.* Mensium fluxus insolito tempore, hic frequens, qui tractandus. *ibid.*

pessimarum Constitut. 1674. ad 1675. Curatio. 30. 31. Methodum, in aliis Var. Confl. optime cedentem, hic non profuisse, queritur Auctor; & plures interibant. 31. Unde concludebat præter temperantiam etiam, quæ Putrefactioni vincenda paria, requiri. *ibid.* Hincque Vitrioli Spiritus, tamquam specificum quid, reperitur. *ibid.* Quæ ratione exhibetur. *ibid.* Ejus porro doses. *ibid.* Ex eo Saliva undecimo die non ita suffocabat, sed aliæ dejectiones, ut Diarrhæa vices subibat, quæ tum vel sponte, vel Hydrogala, vel Narcoticis, sanabatur. *ibid.*

Variolarum Regularium Confluentium Pessimarum Curatio. 84. 89. In iis Vitrioli Spirit. 86. 88.

In Variolis pauci moriuntur, quia tardius erumpunt; ubi contra plures letho dantur, quoties Pustulæ intempestive, & nimio opere, exiguntur. 85.

Confluentibus Medici solertia quid valere potest; præsertim in Junioribus, vel Vinò deditis, patet. 88. Et in hac specie perlet Curationis exitus a modo, quo per primis diebus, fuerit tractatus. 86. Perum exquisitè notandum, quod cum periculum a Pustularum frequentia, mole, pendeat, quod hæc omni ope sint coercende. 84. 86.

Discretis vix refert, quæ Methodo utatur, qui medebitur. 86. 88. Nam Medica ope non indigemus, & sponte sua, & Nature vi se solvunt. 116. 88. Sed perversa cura tamen lethales fieri possunt. 130.

a Lecto abstinentia quantum prosit, pluribus indicatur. 17. 84. 86. confer 84.

Vegetabilia ad Podagram Digestiva, qualia sint: Mitiora acrioribus præferenda, ne stimulus Morbi fomitem adaugeat. 102. Horum aliquot Species permittæ, plus faciunt, quam ex iis unum simplex; ac si quoddam Tertium inde foret. *ibid.*

Vena, in Podagra, membri vexati, vigente dolore, tument. 100.

Vena Sectio, in Infantibus, æque tuta, & necessaria aliquando, ac in Adultis. 25.

lecto decumbente ægro, facilius multo fertur, quam erecto corpore. 36.

Vena sectio in Angina, eodem die iteranda, sine Catharsi, ni Febris & dolor P. S. minuantur. 37. 38. In Apoplexia, qualis esse debet. 146.

In Chorea Sancti Viti. 113. 146. Quoties, & quando, repetenda. 113. 146. In Colica biliosa largior; & aliquando post Emeticum. 26. 147. In Colica Hysterica quando. 27. In Convulsionibus Infantum dentitionum specificum est. 25. Corticis Peruviani usum ne præcedat. 9. 10. In Diarrhæa non exigitur. 23. Sed in Diarrh. Variolosa. *ibid.* In Dysentericæ initio. 22. 23. In inveterata iteretur. *ibid.* In Febris semper Catharsi præmittenda. 115. In quibusdam Febris prodit, in aliis nocet. 3. In Febre Acuta cum Alitibus cruento & Petechiis. 88. In Febris Contin. aliquando non prodest. 4. 19. 30. Si ex Intermitt. Aut. nata, nocet. 4. Aliquando non necessaria. *ibid.* Ejus mensura. *ibid.* Quando vero, & in quibus iteranda. *ibid.* Emeticum, ubi utroque indigemus, præcedere debet. *ibid.* In Febre Dysenterica. 24. In ea Const. An. 1661. & c. Pueris & Senibus non conducebat, sed in Junioribus, Athleticis, plura mala ejus neglectu, ut Pleuritidis & c. inferuntur: qua copia. 4. In Febre Epidem. nova, tantum ubi signa Peripneumonice nothæ adessent. 112. Fit tum ad revellendam materiem; & iteratur. 110. In Infantibus qualis instituenda. 115. In Febre Erysipelatosa, & quando iteranda. 37. In Febris Intermitt. Autum. nocet, & Morbum protrahit. 9. 40. Vernaes itidem prolongat. 8. Infantibus has Febres peiores reddit: seniores in mortis periculum conjicit. 2. In Febre Morbillofa non ferebatur. 30. In Febre Pestilens. necabat si Tumores jam adparebant, nisi ceteri sub conditione. 14. Ceterum largissima juvabat, ut in Pleuritide; pericior nocebat. 13. 14. Methodum tamen mutat Auctor. 14. In Febre Quartana, Junioribus & Senioribus nocet. 9. In Febre Scarlatina, cur rejiciatur. 34. In Febre Tertianâ quid efficiat. 3. In Febre ex Tussi male curata. 42. In Febre Variolosa quando mox necessaria, & iteranda. 20. Quando vitanda. *ibid.* In Gonorrhæa Virul. ad temperandum; & in iis, qui difficile purgantur. 79. Tum ubi scroti tumor & dolor ingens. *ibid.* In Hæmorrhagia Nasium, in brachio. 38. In Hysterica Adfect. quare & quando in initio. 91. 92. In leviori specie omittenda. 92. Quandonam & in quibus ante Catharsin & Laudani usum,

usus, quod tum certius agit. 93. 94. Hanc Adfectionem saepe invitat; & quid inde deducatur. 90. In Lue Venerea, ante Salivationem, non instituerenda. 79. Mania aliquando causa. 12. Et in eadem, nimis repetita, stultitiam infert. 11. In Mensum immodico fluxu, extra Puerperium 95. In Mictu cruento a Calculo. 131. Ex Febre Acuta. 88. Ex variolis Confl. 130. In Morbillis & ipsis Infantibus, quare, & quando iteranda. 25. In Morbis Chronicis, aliis saepe praemittenda. 103. In Morbo Epidem. quolibet, recenti, ante Catharsin, contra Methodum vulgatam; quare. 42. In Nephritide ex Calculo quandonam, & quando omittenda. 132. & quare. 94. Si Morbus ex Hysterica Adfectione, omittenda. 94. 27. In Nervosis Adfectionibus repetita saepe bona. 113. In Peripneumonia Notha, quandonam iteranda, quando non. 35. 36. In Peste & Febr. Pestil. ante Bubonum eruptionem, & in Letho, quod diaphoresin tutiorem reddit, instituenda. 14. Larga & plus semel iterata nulli funesta fuit, in Peste Londin. 13. Et totum Curationis negotium in ea copiosa P. S. cum L. Botallo, collocat Sydenham. ib. Atque ea in Castro Duntar Milites servantur, ib. Parca vero, & adparente timore, institui solet, necat, quod plures deterruit. ibid. In Phrenitide, quando. 6. In Pleuritide essentiali, qualibet Confl. indifferenter infestante, Curationis praecipuum fere sufficiens, & omnem numerum absolvens, si calida non ingerantur, & pro necessitate iteretur. 32. 35. 36. Nec larga quid damni inferat. 35. Qua copia instituenda & quoties iteranda in Adultis, & in Infantibus. 35. 144. In Pleuritide Symptomatica saepe non ferri potest. 32. In Podagra quomodo ingenter noceat. 101. In Juvenibus vero vino excalescentis institui potest. Nec non ubi Metastasis materiae ad Pulmones. 105. 158. In Pruritu ferino, quandonam 37. 144. In Rheumatismo in latere adfecto, ilico instituenda, ante Catharsin. ibid. Repetenda praesertim in Juvenibus. ibid. Tertio tamen celebrata sufficit, & Cathartica potius iterentur, ut Sanguini parcatur, & Paregoricis locus detur. 43. Eius minori repetitioni supplet Serum Lactis, in quibusdam. ibid. In Rheumatismo inveterato, quo modo iteranda, & quid faciat. 37. In Scroti tumore & dolore vehementi, a Lue. 78. 149. In Spuit Sanguin. in Variolis Confl. in Tussi Epid. An. 1679. requisita, & repetenda. 42. In Variolarum initio, non in omni, sed ubi Symptomata graviora eas Confluentes fore indicant. 17. 31. 86. 145. Tum ubi Phrenitis quia facies non tumet. 19. Tamen, in hoc Morbo, minus quam aeris contemperatio, vel Catharsis iterata, Morbi violentiam cohibet, nec ita, ac Auctor prius censuerat, Pustulas intra justos limites coercescit. 85. In initio, ubi celebratur, sit praecipue, ut Mictus Sang. Maculae purpureae & alia vitentur. 18. 31. Male, in quodam casu negligitur ab Auctore. 31. Cum Evacuandis, in initio, quomodo nocere possit; & an vitanda. 17. Si inopportuna fuerit, Pustularum recessum, nec non Faciei ac Manuum detumescentiae causa esse potest. ibid. Si iusta, in Confluent. erumpere Pustulas aliquando facit. ib. In Var. Discretis potius nocua. 18. At tamen instituenda, ibi, si perverso zelo calefacientibus curatum voluerint egrum ib. In Regularibus, si Morbus fuerit vehementior, pustulis jam deciduis, quare instituenda. 19. Post Variolas Confl. pessimas curatas quare. 88.

Vena sectio & Purgantia, alternatim iterata Contusiones tuissimae curant. 106. 150. In Febre Epid. nova, in Adultis, tum in Infantibus, quoties repetenda. 112.

Vena sectionis non congruentis, in Febris, Effecta, sanguinem debilitare, ut despirationi impar sit, quod damnum Cardiacis refarciendum. 3.

Venenum Medici supposuere in Febr. Malignis, hocque per Calefacientia, & Alexipharmaca, per cutim expellendum putarunt errantes; cum contra in illis tum Refrigerantia omnino conducant. 115.

Venter induratus unum ex gravissimis Symptomatis, Intermitt. Autumni. diuturn. insequentibus. 8.

Ventris Tormina, vid. Tormina Ventris.

Tumor, vid. Abdominis Tumor.

Ventriculi debilitas Symptoma Podagrae inveteratae sequela, quomodo tractanda. 105. In recenti spirituosius excitatur. ibid.

Venus in Podagricis cur noceat. 104. Praematura, & nimia, cur Podagram advocet.

Verpus, vid. Recutitus.

Vertigo, in Variolarum initio, has Confluentes praenuntiat. 86.

Verulamius de Historia Naturali qualis tradi solebat, quid censeat. viii.

Vesicatoria in Apoplexia nuchae applicanda, 146. In Comatosi Adfect. Variolas praecedentibus. 86. Comate febrili, Calefacientibus excitato, nocent. 113. In Febre, ex Tussi male tractata, nuchae. 93. In Febre Epid. nova. 111. In Hydrope Gangrenam facile invitant; & quare. 109. In Phrenitide a Calefacientibus, nocent. 95. In Tussi Epid. quare nuchae applicanda. 42. In Variolis Confl. perampla & acria quandonam applicanda, ut die undecimo suum effectum edant, materiae peccanti exitum praebendo, Tumori & Salivationi subveniundo. 87.

Vesiculae, in Variol. Confl. An. 1670. inter Pustulas, sero limbo distinctae cum subiecta carne nigra. 25.

Vestimenta consueta non sunt deponenda, nisi mense uno ante Solstitium aestivum: nam ab horum praematura abiectione plurimae Febres enascuntur. 34.

Vetulae Sudoriferis suis quam saepe nocent. 115.

Vibices seu Maculae in cute nigrae quomodo excitentur. 13.

Victus ratio, vid. Dieta. Incrassans in Mensum fluxu Puerperarum immodico.

Vigiliae post Catharsin, & P. S. omnium maxime Vires subruunt. 104. Et vespertinae plus nocent, quam diluculo surgere. ibid. Post Febres Aqua Rosfrigida consuepiuntur. 6. In Variolis Discret. quid indicent. 18.

Vini Spiritus, vid. Spiritus Vini.

Vino aduerti, in senio, aquam aut aquosa sumentes brevi internecantur. 103. confer 104.

Vinum immodicum corpus laxat & emollit, ac coctiones subvertit; unde bibaces plurimis Morbis obnoxii. 203. Modicum autem & Cibi eupepti, ubi Cortex Peruv. nihil amplius efficit, rem saepe absolunt. 41.

Antidotalis instar Postem potius accersit, quam praecavet. 12.

In Cutis Eruptionibus quibusnam concedendum. 37. In Febris Intermitt. licet in Continuar. speciem vergant, cum Cort. Peruv. exhibitum, non nocet. 41. In Gonorrhoea Virul. vitandum. 79. In Hydrope conducit, tum modo, ubi meatus reclusi & portae aquis data. 109. In Podagra haud concedendum non obstante adagio: nam fomes Morbi excitat & c. 103. 104. In aduerti tamen repente ne interdicatur; praefertendum tum Hispanicum. 104. In Variolis Confl. quando exhibendum. 87.

Vinum Canariense & Hispanicum in Diabete. 41. In Dysenteria ex Tormin. Ventr. 114. In Hysterica Adf. vel solum vel aromatizatum, omni nocte, horae somni, mira facit. 93. In Infantibus purgantibus debilitatis, cum herbis roborantibus. 92. In Podagra quandonam concedendum, sed cum exercitio. 104. 105. In Variolis Anom. semicoctum quando conducit. 26. 31.

Malazanum vel Falernum sive Muscatum, in Tussi post Febr. Contin. 38.

medicatum in Chorea Sancti Viti roborans. 114. 146. In Diabete. 41. In Febr. Tert. Vern. pro pauperibus. 42. In Fluxu Muliebri. 41. In Hydrope. 109. Pro Divitiis. ibid.

Vir prudens quare quis evadere potest, Philosophus autem nemo Mortalium. 110.

Viri Hydrope, etate praesertim ingravescente, adficiuntur. 106. Seditarii tenentur, ut Femina, Hysterici Adf. sic dictis. 89.

Vires subito prostratae, Maculae purpureae, & Petechiae, in Morbis, Malignitatis signa habentur; quorum ratio redditur ab Auctore. 115. 116.

Virulenta Materia in Gonorrh. per Glandis substantiam penetrans. 78.

Viscera debilia & putrefacta in Hydrope Evacuantia vetant. 101.

in Podagra irregulari, si ambulando ex pedibus materies dissipatur; periculose adficiuntur. 100. In invertebrata adeo infarciuntur materia, ad extremitates non amplius explosa, ut Mors insequatur. 102.

Vitri incensorii actio Spirituum exorbitantium impetussitati, in Hysterica Adf. comparatur. 90.

Vitrioli Spiritus, quia stipticus, non convenit in Morbis, quorum Curatio Purgationi innititur. 113.

cum Cerevisia tenui vel Decocto vulnerario in Febre Acuta cum Mictu cruento, & Petechiis. 88.

in Phrenitide Febris Epid. An. 1674. unicum remedium. 29. 30.

In Variolarum initio ubi, ex Symptomatis, Confluentes eos praevidemus. 8. 145. In quibusnam omitti possit. 86. In Variolis Anom. nigris, pessimis, ingentis usus. 31.

Ulcera Phagadenica, in Lue Venerea, quaedam. 78.

Ulcus Glandis, a Schanker, in Gonorrh. Virul. in non recutitis, vel qui numquam eo Morbo laborarunt. ibid. Ubi Phymotin excitat, quid agendum. 79.

Vesicae quomodo cognoscatur, & curetur. 150.

Underwood, Senator Londinensis, Cortice Peruv. occisus. 40.

Unguenta purgantia, in Hydrope, Hypercatharsin insanabilem excitant. 109.

Unguentum in Pleuritide essent. Brassica folio imponendo, quale. 35.

Ad Salivationem excitandam, ex Mercurio, quibus partibus adplicandum. 79.

Vomendi propensio Emeticum indicat absolute; nec sine agri periculo, Medicis molestia, omittitur. 4. 13.

Vomino in Peste Diaphoretica rejiciens, Sudoribus brevi sistitur, qui certa ratione excitandi. 14.

Vomitiones ex Hysterica Adf. Medicis imponunt, aliorum Morborum praeseferentes speciem, ut Nephritidem, vel Colicam bilios. 94.

Virides, non semper talem humorum depravationem denotant, cum hic color a Spirituum inverso motu excitari queat. 27.

Vomitoria ex Croco Metallorum, infra adolescentiam constitutis non propinanda: Adultis vero non nocent, si copiose diluantur, ope Zythogalae. 4.

in Hydrope, ex Croco Metall. Aquas aëre & xāto potenter evacuant. 108. Non ita prompte Aquas expellunt, ubi levis tantum Abdominis tumor, quam ubi ingens harum copia adgesta. 108. 109. In Hysterica Adf. Paroxysmum saepe invitant; quod non foret, si Morbi fomes in Materia aliqua involveretur. 91. confer 46. Sed praeterea Materiae biliosae viridis ubiorem copiam excitant. 41. In Podagra idem praestant ac Cathartica. 101.

Vomitorium in Apoplexia quale. 146. In Colica biliosa, ex Zythogala, quando conducit. 26. 27.

Diarrhoeam in Febris, vix adstringentibus obedientem, fugat. 4.

Eandem in Febris Contin. quoque ardet, neque nisi raro, aliter evenit. 6. 7. Sed in Febris inflammatorii tam potius excitat. ibid.

Hinc in Febre Pestilenti, nondum cognita Emeticum, plane contrario eventu, propinavit Auctor.

Vomitorium in Febre Contin. quando exigatur, ni etas aut debilitas contraindicent. 4. Quanam harum Symptomata, praeter Diarrhoeam, mirifice eruat? ibid. An initio neglectum postea exhiberi queat? ibid.

Vena sectionem semper insequatur, ubi utroque indigemus. ibid. Omni tempore Febris, si occasio jubet, modo vires dentur, adsumendum, & quare. ibid. Qua hora diei adsumendum. 4.

in Febris Intermitt. Vernal. quando adsumendum. 16.

in Tertianis Vernal. An. 1671. quale. 41. 42.

in Variolis initio Morbi an conducatur? 17. Ubi Symptomata eas Confluentes fore indicant, initio egrum resocillet. 86. confer. 88.

Hinc in iis, simul una cum P. S. ubi harum suspicio adest, praescribendum. 145. Dein, ubi Saliva spissa facta, undecimo die, quasi suffocat, propinandum. 19.

Vomitum & Alvum moventia simul, in Hydrope, proponuntur. 108.

Vomitum Capitis motu, ubi dispositio adest, praeter ceteris provocatur. 94.

Corticis Peruv. usu quomodo compefcendus. 41. Ex Febre Epid. nova, astate, quomodo tractandus. 114. Ex Hysterica Adf. cum refectione materiae viridis, sed sine dolore, quandonam. 89. Si enormes sunt, Anodynorum usum, horumque dosin saepe repetitam, forma praeprius solida, exigunt. 94. In Peste, una cum alvi profluvio Sudoribus curantur. 14. In Variolarum initio, si enormes, Confluentes eas fore praedicant. 86.

Urina designare potest operantem Naturam, dum impuras a puris partes fecernit, h. e. dum concoctionem Materiae Febrilis, in Continuis praesertim, & in harum declinatione persolvit. 5. Crassa, vel & tenuis, Cruditatis indicium. 3.

cruenta a Calculo, ambulatione, vel unctione, excitatur: quomodo se habeat, ubi subsidet. 131. vid. Mictus Sanguineus. In Diabete qualis. 41. 42. 149. In Febre Contin. An. 1661. & c. qualia Cruditatis praebent indicia: & quandonam prodibant, in ea, Coctionis signa? 3. In Febre hyemali, turbida & intense gubra fuit. 110. In Febr. Intermitt. plerumque rubro saturata, ut Ictericorum, cum pulvere lateritio praecipitato. 41. In Febre Variolosa fallax. 19. 20. In Hydrope suppressa penitus, post Emeticum, saepe iteratum. 108. In Hydropicis parca, unde. 106. In Hysterici & Hypochondriaci limpida semper & copiosa. 89. 90. In Nephritide nigra, ac sabulosa, P. S. vetat. 132. In Peripneumonia notha turbida est & rubens intense. 35. 36. In Podagra irregularis intervallis, similis ac eorum, qui Diabete laborant. 129. In regulari Paroxysmo qualis. 100. In Variolis Malignis frequens & pauca, paulo ante Mortem. 11. In Discret. Regular. frequens, & pauca, Paregorica indicat. 19. In Regularibus incipientibus similis ac in Febre Variolosa. 19. 20.

Urinae ardor in Gonorrh. Virul. qualis. 78. 148. Eius suppressio ex Hysterica Adf. 89. Suppressio in Variolis Confl. in junioribus familiaris. 16. 88. & unde. 19.

Ustilatio in Podagra per Moxam, vid. Moxa.

Uteri proidentia quomodo curanda. 95. 146.

Hysterica Adf. saepe infert, post partum laboriosum. 95.

Strangulatus, vid. Strangularius Uteri.

Uterum Sexcentarum arumnarum auctorem statuit Democritus. 90.

Y AUWS, in Insulis Caribes Morbus Endemius, nostrae Lue Venereae simillimus; & uti Lues nostra, sanatur salivatione Mercuriali, licet Guaiacum & Sarsaparillam, integris ibi Viribus, obtineant. 77. 78.

Z Ythogala Emetici actionem faciliat. 4.

in Cholera loco iusculi ad diluendum. 21. In Colica biliosa, ante alia, si Morbus a fructibus, ad diluendum. 26. 147. In Dysenteria. 22. 23. In Febre Acuta, cum Mictu cruento & Petechiis. 88. Cum Salvia incocta, in Febris Intermitt. Autumni. sudoriferum. 9. Cum rad. Alth. incocta, in Nephritico paroxysmo. 105. 106. 146. Cum Salvia alterata in Pestilentialibus Morbis, ad Sudorem continuandum. 14. Cum rad. Atth. in Podagra, ubi Nephritis adest. 105. 106.

GUILHELMI
MUSGRAVE

MEDICI DOCTORIS,

Incliti Medicorum Londinensium Collegii , &
Regiæ Societatis Socii,

DISSERTATIONES DUÆ,

I. DE ARTHRITIDE SYMPTOMATICA,

Αγαθοῖσι δὲ Ἰατροῖσιν αἱ πλάναι καὶ ἀπορίας . Hippoc.

II. DE ARTHRITIDE ANOMALA, sive INTERNA:

Καὶ τὸτο εὖ Ὁμοίότητες εἰδέναι χρὴ , ὥτε Δύετε ἢ Νῦσος , ὥτε Μεταπίπτει εἰς ἑτέραν Νῦσον . Hippoc.

EDITIO NOVA ACCURATIOR.

MUSGRAVE
GUTHRIE M I

MEDICAL DOCTORS

Regist. Medical Practitioners, College, &
Regist. General Practitioners

DISSEMINATING

OF THE LATEST AND MOST IMPROVED

AND MOST EFFECTIVE

OF THE LATEST AND MOST IMPROVED

OF THE LATEST AND MOST IMPROVED

OF THE LATEST AND MOST IMPROVED

E L E N C H U S

PRIMÆ DISSERTATIONIS

DE ARTHRITIDE SYMPTOMATICA.

Cap. I. D E Arthritide Symptomatica generatim. pag. 227	VI. De Arthritide fixa <i>Scorbutica</i> . 234
II. De Arthritide <i>Rheumatismo</i> supervenien- ti, Symptomatica falso appellata. 228	VII. De Arthritide <i>Lui Venereæ</i> succedenti. 237
III. De Arthritide ex <i>Chlorosi</i> , & ex <i>Men- sum suppressione</i> . 229	VIII. De Arthritide <i>Asthmatica</i> . 239
IV. De Arthritide <i>Hydropi</i> supervenien- te. 230	IX. De Arthritide <i>Febri</i> succedanea. 240
V. De Arthritide <i>Melancholica</i> , <i>Hypochondria- ca</i> , & <i>Hysterica</i> . 232	X. De Arthritide ex <i>Colica</i> . 242
	XI. De Arthritide <i>Morbis</i> quibusdam <i>Cu- ticularibus</i> subjecta. 243
	XII. <i>Corollaria</i> & <i>Spicilegia</i> quædam habet, cum <i>Epilogo</i> . 245

E L E N C H U S

SECUNDÆ DISSERTATIONIS

DE ARTHRIDE ANOMALA SIVE INTERNA.

Cap. I. D E Arthritide Anomala genera- tim. pagina 248	Arthritica. 269
II. De <i>Ventriculi Affectibus</i> Arthriticis . 250	XII. De <i>Phthisi</i> Arthritica. 271
III. De <i>Colica</i> Arthritica. 255	XIII. De <i>Angina</i> Arthritica. 273
IV. De <i>Diarrhœa</i> Arthritica. 257	XIV. De <i>Capitis Dolo</i> re, & <i>Vertigine</i> Arthri- tica. 276
V. De <i>Dysenteria</i> Arthritica. 260	XV. De <i>Apoplexia</i> Arthritica. 279
VI. De <i>Abcessu Intestinatorum</i> Arthritico. 262	XVI. De <i>Paralysi</i> Arthritica. 281
VII. De <i>Melancholia</i> Arthritica. 263	XVII. De <i>Doloribus</i> in Corpore vagis, fi- xis; de <i>Ophthalmia</i> ; de <i>Erysipelate</i> ; & <i>Achoribus</i> Arthriticis. 284
VIII. De <i>Syncope</i> Arthritica. 265	XVIII. De <i>Epiphora</i> , & <i>Dolore Dentium</i> Ar- thritico. 285
IX. De <i>Calculo Renum</i> Arthritico. 266	XIX. <i>Corollaria continet</i> , cum <i>Epilogo</i> . 286
X. De <i>Asthmate</i> Arthritico. 267	
XI. De <i>Catarrho</i> , <i>Tussi</i> , & <i>Peripneumonia</i>	

P R Æ F A T I O.



Uotcunque inspexi de *Arthritide* scribentes, in eo sunt ad unum omnes, & quidem elaborant, ut tantummodo morbi istius, quæ *Exquisiti*, *Genuini*, *Legitimi*, suoque ordine *Primarii*, Doctrinam excolant, & disciplinam edant: ea videlicet illius notitia, quæ ex ipsa manat, vel elicitur, contenti, de *Larvata*, sive *Symptomatica*, *Arthritide*, num quæ sit, aut qualis, aut quanta, aut quota, aut quam a se diversa, aut *Arthritida Primigeniam* quam mimice & quantum imitetur, (etiamsi hæc ad illam illustrandam exponendamque appime conferunt) parum, vel in minimè solliciti.

Quid ab his hominibus studeatur, & in isto genere quousque proficiatur, non est hujus instituti, exquirere. Impræsentiarum nos, experientia duce & præside, proponimus, in iis affectionibus, quæ *Podagræ* & *Arthritidos* regularis appellatione passim insigniuntur, explicandis sanandisque, (ut, a Medico quod suscipitur negotii, luculenter id tractetur; & ad ægrotorum commodum & sanitatem, quod amplissimum fieri possit, id demum agatur) primum, in *Arthritida Primigeniam* & *Symptomaticam*, earum divisionem; tum *Symptomaticæ* in suas partes distributionem, constantissime ante omnia religiosissimeque conservari.

Quanto ille, & quam digne, risu exciperetur; qui, dum artem exercere professus sit gemariam, omnes illos, quotcumque circumferuntur (ita vulgo nominati) *Adamantes*, tanquam legitimos & veros æstimaret; atque adeo acciperet? Annon *Artificem* potius deceret, quid *Adamanti legitimo* proprium sit, investigare; eoque posito, tanquam regula & norma, de *Pseudo-Adamantibus*, & eorum a *Vero* dissimilitudine & discrepantia judicare? Nonne etiam delectaret *Falsorum* varietatem, magnam utique & multiplicem, ut a *legitimo* alii quam longissime removen- tur, ementiti, factitii; ut ad eum alii propius accedunt; alii *Colore* translucido æquiparant; alii *Duritie* tantum vincuntur, a *Vero Adamante* non nisi ab *Artifice* peritissimo distinguendi, diligen- ter expiscari?

Non minus fixum aut immobile fundamentum in experimentis habet *Arthritidos* illa in *Primigeniam* & *Symptomaticam*, & *Symptomaticæ* in suas *Species*; quam habet *Adamantis* hæc in *Legitimum* & *Falsum*, & *Falsi* in *Partes* suas, divisio distributioque.

Quanti vero intersit hæc notari, & hisce perquirendis quam egregie locetur res & sa- lus *Arthriticorum*: ex eo constat, quod, iis prætermis- sis neglectisve, jure merito verendum, ne dum uni eidemque tantum morbo, nempe *Arthritidi*, videamur; revera nos, quodque est certissimum, multis, iisque longe inter se diversis, & diversa ratione impugnandis, ob- sistere contingat, id est, ancipiti prorsus eventui, prælium, ne in tenebris committamus.

Eum recte curaturum credunt, qui *Rationalem Medicinam* profitentur, quem prima *Origo causæ* non fefellerit: neque curari id, quod ægrum est, posse, ab eo, qui quid sit, ignoret. Sed cujus rei non est certa notitia, quod ejus opinio certum reperire remedium non potest. *Celsus, Præf. L. 1.*

Hujus quidem modi distinctionem, a clarissimo *Mortono*, in *Phibsiologia*, fuisse jampridem docteque lucubratam esse video; & istius opera, morbum omnino difficillimum explicari, gravissimum curari. Sed, in chronicis plerisque aliis, ab *Auctoribus* celeberrimis, aut pe- nitus omis- sam, aut aride nimis & jejune proditam: quam tamen, & in aliis perutilem, & qui- dem necessariam fore, ideoque multum desiderari, diu sum arbitratus: in *Arthritide* vero quamplurimum; eo certe plus in *Arthritide*, quo diutius illa cæteris affectionibus, quo crudelius humanum genus acerbiusque infestavit; & in illo, quo frequentius *Symptomatica* reperitur.

Qui, quod insignissimus *Baglivius*, magnum *Italiæ* decus & ornamentum, hac in parte *Ομόλογος*, graviter errare Medicos existimat, qui putant nonnullos morbos esse *Primarios*; ab iisdem causis productos: eandemque etiam medendi methodum exposcentes; eum, per repetitas gravissimorum Medicorum observationes, certo constiterit, eos esse *Secundarios*; a diversis causis pendere; *Specie* differre: propria habere symptomata, propriasque metho- dos exposcere. Et inter præcipua artis desiderata illud merito reponit, Ut scilicet singuli quique morbi in tot species subdistinguantur, quot sunt morbi primarii a quibus foventur, aut causæ vehementes constantesque quibus producuntur. *Praxeos Medicæ Lib. 2. Cap. IX.*

Posita ergo hac *Arthritidos* divisione, & in præsentii misso, tanquam *Postulato*, diviso- rum membro priori, scilicet *Arthritide Primigenia*; posterius aggredior, nempe *Symptoma- ticam*, hoc consilio & spe fretus, si prius copiæ debellentur hæ *Auxiliares*, hostem postea facilius depelli & evinci posse *Principalem*.

Dicam itaque *Arthritidem Symptomaticam*, & in ea *Species*, quotquot usquam mihi inno- tuere, comprehensas: ut illius *Ratio generalis*, & harum *Descriptiones* & *Distinctiones*; ut, a morbis suis *Primariis*, earum *Ortus* & *Emersiones*; ut, in *Arthritida Primigeniam*, earum *Migrationes* & *itinerata*: in statu maxime degeneri & peregrino; ut earum *Facies* & *Proprie- tates*, (variæ, Jupiter) ut *Ομόλογες Arthriticae* usquequaque aperiantur: *Curationes*, & meden- di *Intentiones* earum singulis accommodatæ, & (quoad potero,) congruentes, ut elician- tur: postremo, totum id quod dicimus, ut *Historiis*, optima fide traditis, tanquam tot *Testibus*, stabiliatur, confirmetur. Hoc *Libelli* hujus *Opus* & *Argumentum* est.

Lectorem autem illud admoneri decet; quoniam ea, quæ a *Nobis*, nullius *Sectæ* affectis, imo *Sectam* omnem fugientibus, & *Historicam* (ea quidem una exercenda, vindicanda) *Medicinam* colentibus, sistuntur & in medium proferuntur; aut eventa habet, aut ex iis ultro nata, vel facillime ducta; ista vero eventa colligenti maximam partem præbuit *Damnonium* hocce *Oriente*; quod idcirco *Medicina* hæc (ea vero ejus pars præcipue, quæ de *Scorbutica* est *Arthritide*) quodammodo *Provin- cialis*, & hujus *Populi Propria* esse videatur. Utinam sane tanto & tam nobili populo par inveniatur.



DISSERTATIO PRIMA. DE ARTHRITIDE SYMPTOMATICA GENERATIM.

CAPUT PRIMUM.

Art. I.



T morbi recte dignoscantur, videndæ sunt, (quod docet (a) Hippocrates, ὅσαι ἐξ οἷον οἱ σὶα διαδοχαὶ νοσημάτων: h.e. Quæcunque sunt Morborum vicissitudines, & ex quibus in quo succedant. Vertente clarissimo Mediomarico, pariterque textum in hunc modum interpretante: Morborum Successiones, vicissitudines, & exceptiones, esse inspiciendas; ut facilius de toto

eorum exitu existimes. Et, Hæc oportere omnia ad eam Morborum Transmutationem transferri, quæ solutionem quandam præ se fert, & Naturæ Benignitate alio Morbum ablegat. Quibus præfatis, ex divini senis oraculis, ad gratiam, & fidem, operi nostro conciliandam, (quod ad ea se conformari, frustra quidem, & ambitiose nimis, exoptavit,) ipsam rem aggredior, ex illoque sancto quasi fonte nostra omnis manabit oratio.

II. Præter istam Arthritis, quæ causam habet continentem propriam, & peculiarem, quæ suis viribus pollet, & est ex se sufficiens: ideoque Exquisita audit; nec ab affectu quovis alio, perfecto, mutuatur, sive ducit, originem; unde Primigenia (quæ quidem in præsentia, postulati loco ponenda:) alia est Arthritis, quæ a morbo aliquo antecedente profuit: quæ alteri morbo debet ipsum id, quod nascitur, &, quod existit: & (a Primario illo) Derivata, Secundaria, Symptomata uti, (præ Arthritide Exquisita,) Mendax, Simulata, Falsa, jure merito nominetur.

III. Fusius dicam: Arthritidis Symptomata cum Primigenia, si primas earum facies conferamus, & illa quæ sunt exteriora spectemus, in plerisque convenit: (par etenim ratio paroxysmorum: iidem utrinque typi, similes causæ, & principia, nec non effectus, seu reliquæ, sive fructuosæ, sive contrariæ:) proindeque generali nomine Podagra, & Arthritidos, utrisque communi comprehendæ magnam partem ἀσθενείας sub eo delituere; morbus idem esse, judicatur. At, a vero quantum id abhorret, iis facile innoscet, qui earum αἴτιος ὃς ἴσθις penitus scrutabuntur. Arthritidis enim Primigenia, morbus exquisitus, γνήσιος sui ordinis princeps, peculiarem & sui generis conjunctam habet causam; proprio utique Marte agentem; vel per se, vel procatartica carum stimulo, paroxysmos facientem; a nullo vero affectu alio, aut primitus acceptam, aut in operibus dependentem. E diverso, Symptomata morbo alteri succrescens, vel materiam, (id est causam continentem,) vel minimum materiæ in hujusce generis Arthritis μεταρρυσμὸν, illi Primario, quo (directe vel oblique ortus ejus promovetur, refert acceptum: itaque tum morbi, unde fluxit, primarii; tum Arthritidos, quam æmulatur, exquisitæ, de natura, tanquam hybrida, participat.

IV. Symptomata, quas hoc terrarum tractu vigere comperimus, sunt ex rheumatismo Arthritis, ex chlorosi, & mensibus suppressis, ex hydrope, melancholia, scorbuto, lue venerea, asthma, febre, dolore colico, affectibus cutaneis: per plures sane, dignæque omnes quæ in Luciani Drama prodeant Τραγῶπὸς ἀγρικὸν: quarum tamen catalogum haud dubie augebit industria posterorum.

His affecti, eos qui in Arthritide sunt Exquisiti, numero videntur, (si recte calculum ponas,) exæquare; imo quidem, (mea sic est ratio,) vincere: ut Damnonio nostro Arthritidos pars dimidia, sine ulla dubitatione, sit hodie Falsa.

V. Symptomatarum ratio generalis in eo locari reperitur, quod, cum morbi sunt ab Arthritide Primigenia diversi, & intervallo quodam distantes, stationes suas Primarias relinquunt, & erga Arthritidem moventes, ei sensim appropinquant: simili fere modo, ac in hypothesi Copernicana, planetæ apogæum (sive punctum illud ellipticos, quod a sole remotissimum) deferentes, versus solem inclinant; donec hypogæum (sive punctum ejus quam proxime solem) pertigerint.

De appropinquandi modo ut rite cogitemus, non solum ex arthritidos Primigenia symptomatibus aut pluribus acceptis, aut diu Sydenham Opera Medica.

(a) Ἐπιδειμῶν ἀτμήμα τρίτον.

tius servatis, is existimandus: ne hoc, utrumque, judicium fallax, & incertum: imo potius a primario plus minusve exuto, (ut in sequentibus patebit) addiscendus. Verum enim vero Primarii exuvia simul cum usurpato Arthritidis Primigenia vultu, Symptomata omnium certissime commonstrant.

Specialis harum est conditio, quod a stationibus Primariis quo celerius, quo longinquius, ejusdem classis Symptomata deflectunt, eo rarius ad eas revertuntur: hoc est, quo plura morbi Primarii symptomata deposuerunt, eo insolentius resumunt; eo celerius Arthritidos puræ symptomata usurpant; eo constantius retinent.

VI. Secum dissentiant Symptomata, si earum externa respiciamus; quod aliæ, εὐτοκίᾳ; aliæ partu difficili, eduntur: aliæ a Primigenia ægrius; aliæ libentius, decedunt; aliæ ad parentem cito regrediuntur; aliæ vix unquam, aut ne vix quidem; aliæ sæpius; aliæ rarius, παραξυνοῦνται.

Harum autem Paroxysmos si attenderimus, sunt illi profecto longi, breves, acerbis, mites, abnormes, idonei, continui vel intermissi, eadem plane varietate inconstantiaque, qua sunt Arthritidos exquisitæ paroxysmi; & reliquias sive fructus habent (sicut illi) quæ cujusque ferocitati & magnitudini, plerumque respondentes.

Partus istam diversitatem facit diversa Primariorum indoles, & in Arthritidem propensio: nam, quo cujusque Primarii materia virus Arthriticum magis refert; &, materiæ Arthritidem facienti, quo plus favetur, eo certe vividum magis Arthritidos simulacrum, eo magis solidum emergit Εὐκρυσταίον. Et e contrario.

VII. Sed, (quæ cum primis ad exponendas hæc Symptomata, conducit differentia;) Alia improprie, ex vulgi tantum opinione, sic appellatur: quippe quoniam paroxysmos, ad normam Arthriticam formatos, & compositos, habet omnino nullos; nec materiam, ei quæ est Arthritica, (quantum ex utriusque signis judicare licet) ulla ex parte comparem. Hujusmodi una est, quæ rheumatismo superat, quæque Symptomatarum nomine, quoties de iis verba fecerimus, a nobis ea re excluditur. Alia magis proprie dicta, quæ de morbo alicui Primario manifeste & palam ἐπιγινώσκου, Primigenia ritu, per se vel aliunde stimulata, & adjuncta, paroxysmos celebrat.

VIII. Illa etiam duplex est. Altera generatione, quæ dicitur Ἐκφυσιῶν, voca, procreatur. Gravi quodam morbo laborat æger; eoque partim, vel penitus subacta, natura, sui demum juris & vegetior facta, miasma Arthriticum in sanguine occultum, sanguinem & quicquid intus virium est depascens: (maxime vero si pharmacis ea proutetur) ad πᾶσι γὰρ appellat; itaque (præter spem & expectationem omnem sæpe) gignit Arthritidem. Huc pertinet Arthritis ex chlorosi, & ex hydrope; quæ quidem, accurate si dixerimus, Secundariae potius, quam Symptomata, censeantur: ut infra ostendetur.

Altera, quæ μεταρρυσμὸς Symptomata, eandem cum Primario (contra quam modo dicta,) sed mutuam, & ab eo, derivatam, habet materiam, vel ipsam, vel aliqua ex parte alteratam: vel integram, vel cum alio quodam mistam; sed in aliam corporis regionem, quæ transvehitur; aliaque ratione (id est Arthritice,) quæ operatur. Nam, ei quod ineptum est eliminando, per morbos hunc vel illum, pro inepti ratione & corporis constitutione, varios, dum incumbit natura; (unde horum morborum φύσις ab Hippocrate dicuntur ἰσχυροί,) sæpe quidem fit, vel propter eos nimis remissos, & instituto impares, vel ob materiam parum tractabilem, & δύσλυτον, quod illius pars in corpore, necdum istis molitionibus exturbata, resister. Hanc natura, prælium redintegrans, secundo aggreditur; &, quoniam ausis prioribus exciderat, alia jam methodo conficere, alio morbo, scilicet Articuli, proscribere contendit. Atque hunc in modum oritur Arthritis Symptomata; cujus species sunt Arthritis melancholica, scorbutica, quæ hi venereæ, quæ asthma, quæ febre, quæ dolori colico, quæ morbis cuticularibus succedit.

IX. Hoc autem minime celandum, quod raro illa, quæ maxima proprie Symptomata est, Primarium sequitur nisi multorum dierum, veterem, & ab ætate quasi venerabilem, chronicum: &, quod illa, serius quam Primigenia, nec nisi grandiores, invadit;

eos scilicet, qui, cum affectu *Primario* diu conflati, cum eodem simul inveterascunt. Id quod de altera ista *magis propria* parte, confirmari vetant experimenta; quippe quæ, robustioribus, quæ junioribus, congruere hanc, evincunt.

X. Verum, ut ultra distinguam *Symptomaticas*, earum quæ sunt *idiotæ* morbi primarii, (a quibus derivata sui generis materia, quæ in *Arthritide* modum agere conatur, hæ singulæ potiuntur,) cum valide inter se discordant; *Symptomaticas* item hæc, utcumque prima facie confimiles habeantur, specie tamen, pro ipsorum materia, pro illa primariorum diversitate, inter se differre, non est improbabile, peculiarem habent sigillatim omnes naturam; proprium *idios*; & curationes exigunt proprietatibus suis accommodatas. Nam,

XI. In exercenda medicina, quoties occurrit *Arthritis Symptomata*, morbi *Primarii* ratio, & modus omnino investigandus; therapia probatissima diligenter expiscanda; & ex his, una cum *Arthritidis Primigeniæ* doctrina, studiose considerateque penitatis, eliciatur, & in quadrum redigatur, optima medendi perfectissimaque indicatio.

(a) Neque enim credant, (qui *Rationalem Medicinam* profitentur,) posse cum scire, quando Morbos curare conveniat, qui, unde hi sint, ignoret: Neque esse dubium, quin alia curatione opus sit, si a lue Venerea; alia, si a melancholia; alia, si a scorbuto; alia, si ab hydrope; alia, si a chlorosi; (& sic de cæteris affectibus, toto, quod dicitur, cælo distantibus, & secundum illam differentiam diverse medicandis) *Arthritis* oriatur.

XII. Etsi vero *Symptomaticæ* ratio composita, ab utroque parente (tam eo qui genuit, quam eo qui adoptavit,) ætiologiam, therapiam, ex parte accipit; tamen non id indiscriminatim, & æquali factum est mensura; sed modo, & proportionem, prorsus singulari. Nam in paroxysmo ab *Arthritide*, therapia maximopere; extra vero paroxysmum, in ejus vacatione, prophylactica quæ codatur, a morbo præcipue *Primario*, haurienda.

XIII. Quæ quidem prophylaxis, & in ea quæ est medicina vel late sumpta, cum, ad morbos, veteribus chronicis, iisque gravioribus, secundarios, & malum *δυσαιδέος* (*Arthritidem*) æmulantes, evertendos, excolatur; diutius quidem, & contentius, ad menses aliquot ducenda: sæpe etiam per annos, statis temporibus, repetenda est: ut nempe morbis ita pertinacibus, inveteratis, sanatu difficillimis, curatio par & æqualis adhibeatur. Ista vero prophylaxeos diuturnitas alias longior, alias brevior, ordinanda, pro singula curationum singularum difficultate: quod in sequentibus speciatim, & pressius, exponetur.

XIV. *Arthritidis Symptomata* a *Primigenia* diversitas, inque membra partitio, ab artis professoribus non satis observata, id effecit, ut ætiologia *Arthritica* hodieque trunca, debilis, imperfecta, perturbata, minime constet; nec cum ægrorum symptomatibus concordet. Neque enim aliter fieri potest, cum, quæ una, & simplex, æstimata fuit affectio, varia prorsus esse deprehenditur, & multifariam composita.

XV. At, quod magis dolendum, & in humani generis incommodum (ut nequid gravius dicam) cessit immane quantum; id etiam fecit hoc *παράρρημα*; ut, quæ non uno endemque modo construi, quin potius variari, & pro morborum differentiis, discrepantia, diversitate, aliis aliisque indicationibus passim muniri, debuerat therapia, angusta nimium, manca, & delumbis, esse reperiatur; utpote *Arthritidis* unius *Primigeniæ* basi, & fundamento, nimis arctato superposita; cum Medici, tum ægroti, spem, & vota, decipiens. Infelices *Arthriticos*! & eo quoque nomine miserandos, quod, dum adversus morbos convulsivos; adversus phthisin; adversus febres intermittentes; aliasque quam plurimas; dum, adversus graves & Herculeos affectus, medendi intentiones aptas, solertes, commodas, excogitavit ætas, in *Arthritide* sananda, pellendaque tam parum profecit.

XVI. Prædictas *Symptomaticas* hac methodo discutiam; Primum nempe remotissimam, & ab *Arthritide Primigenia*, quam longissime disjunctam: deinde reliquas, eo ordine, quo sunt, in sua cuiusque ellipsi, minus remotæ dum ad illam denique pervenero, quæ ab *Arthritide Primigenia*, vel abest quam proxime, vel ipsa est: per totum hunc decursum, & universum percurrendo *Systema Symptomaticum*, habito respectu, quoad ejus fieri potest ad accessum, & proximitatem: quæ quidem hoc tempore potissimum advertenda. En! opusculi partitionem;

Arthritis

Symptomata

Primigenia.

Falso sic appellata, quæ Rheumatismo,

Minus proprie dicta, quæ

Magis proprie dicta, quæ

Chlorosi,
Hydrope,
Melancholia,
Scorbuto,
Lue Venerea,
Asthma,
Febri,
Colicæ,
Morbis quibuscumque Cuticularibus,

Supervenit.

(a) Celsi Lib. I. Præf.

In ipsis partibus tradendis, primum, morbi cuiusque *Primarii* stationem dicam: tum, ejus in *Arthritidem* progressum: deinde *Secundarii*, jam facti, & in aditu maxime propinquo sistentis, diagnosis qualemcumque: post, a cognatis *Secundariis*, & *Arthritide* exquisita, illius differentiam: tum, morbi, ejusque symptomatum, in primis urgentium, curationem: deinde, isthæc illustrandi ergo, historias: hæc autem, non eadem ubique *ἀνεβέβη*, quanta tamen opus est, scriptura persequar.

CAPUT II.

De *Arthritide Rheumatismo Supervenienti, Symptomata* falso appellata.

Art. I. Priusquam ad *Veras* aggrediamur *Symptomaticas*, omnino necessarium est, *Arthritidem* ex *Rheumatismo* ortam, ita falso nominatam, propter ejus cum *Veris* similitudinem, & ne istam in illarum numero ponentibus, operi nostro deesse, videar, expediri; eaque re, de ipso *Rheumatismo*, mendosæ hujus *Symptomaticæ* affectu *Primario*, paucula quædam præmitti.

De *Arthritide Vaga*, quatenus *Rheumatismo* referat, & illius appellatione se occultet, alius loci est differre: de *Rheumatismo*, quam ille *Arthritidem* imitetur, ac quasi vices rependat, hujus & temporis, & loci est.

II. *Rheumatismus* ille, cui quidem uni quantum Ego rescivi, succrescit hæc *Symptomata*, (nam a *Scorbutico* minime unquam, nedum alio quovis *Rheumatismo*, prognatam memini) semper incipit a frigore, causa hujus affectionis evidenti fidelissima: ex qua celerissime sanguini, præcipue vero ab exercitationibus incalcenti, Lentor inducitur; qui, in musculis & membranis, infarciens capillaria, circuituri fluminis meatus obstruit; dolores, & interdum tumores affert. Quæ inest sanguini, pituitæ, sive feri crassioris massa, horæ paucarum aliquando *Sexagesimarum* spatio, momento temporis, fere tota lentescit, & (uti cera per syringem injecta,) ductus implens exiguos, impedimenta, moras, oppilationes creat, pro ipsius crassitie plus minusve pertinaces.

III. Qui fiat tanta, tamque subita *γλισχρότη*, (haud explicata facile problema) professores Medicos, optima quidem ingenia fatigavit. Sunt, qui lac acescens, si admoveatur igni coagulatum cito contrahere perpendentes, & lac immixtum venis statim coagulati confirmantes, binis hisce positis, sibi videntur rei summam explicasse, dubique vim in totum diluisse: at quo jure, quæ *ἀπέλεγε*, (præfatio virorum de Republica bene meritorum honore,) paucis expendam.

Primum, experimentis *Boyllianis* manifesto constat, acidi, præter salis marini, vel ejus æmuli, quantitatem perexiguam, atque huic coagulationi producendæ minime sufficientem, nihil natura sanguini inesse; neque de horum experimentorum fidem, per *Vicussenianam*, dicam? an *Chiraccianam*? quicquam (a) derogatur.

De altero argumenti membro, etsi, apud magni nominis (b) anatomicum, tanquam experientia præditum, lac immixtum venis illico densari, perferibatur; tamen, quod vacillet hac in parte, non tam auctoris, quam (ex ea, qua versamur, rerum caligine) eventus fides & testimonium, ideoque dubium æstimetur, habeo dicendum. Cum enim, varias olim, *Oxonii*, injectiones, & quidem hanc ipsam lactis vaccini, quantitate satis locupleti, exercendo, sanguinem inde ne vel minimum coagulati, sive concrecere, tamen si hac illac agitata, accurateque spectatum, deprehenderim; virum clarissimum, professorem eximium, aut animal minus sano, aut acescenti lacte, fuisse usum; haud injuria suspicatus sum.

IV. Deinde, non solum ab acido fieri in sero animali coagula, testatur id (c) *Boylei*, per *Oleum Tart. per Deliquium* illi adjunctum, perque *Spiritus vini* probe rectificatum, coagulati serum asferentis. Quinetiam, ut symbolum meum conferam, *Rheumatismo* laborantis serum, per calorem, & exinde quam citissimum frigus; (utrumque scilicet impensum,) in gelatinam admodum lentam, viscidam, firmam conciliari & cogi nobis experimento patuit. Hoc enim brevi evenit; quando, hujusce rei tentandæ gratia, istiusmodi serum, cochleari contentum, & subjecta lucerna calefactum, aqua frigidissima ad cochlearis marginem immergeretur.

Ab acri vero sale alcalico, quam ab acido, Lentorem fieri, longe probabilius: sagacissimi enim (d) *Baynardi*, Collegæ Nobilissimi, experimento liquet, *Rheumaticorum* urina, salis alcalici ejus, quem habent sani bonaque utentes valetudine, partem quasi trigesimam, nec quidem supra, destillando elici. Unde conjicitur, saltem istum acrem, pungentem, asperum, acutum, in sanguine retentum; pituita (foran adjuvante oleo, veluti in sapæ compositione,) irritari involvique & ad viscidum in *Rheumatismo* faciendum, ad dolores, & tumores inferendos, opere quidem maximo contribuere.

At, quod rem absolvere videatur, *Rheumatici* cuiusdam ægri vena pertusa, sero *Syrupum Violaceum* instillavi; unde mixturæ, brevi temporis spatio, Color viridis: Et ejusmodi sero, *Sublimati solutione*, parce quidem & tantillula quantitate, addita, quam citissime ad fundum se demisit concretum *Albissimum*.

Ipsi porro pelliculæ, sanguini *Rheumatico* innatanti (ut videlicet, in ea salis quid dominetur, anquirerem) *Solutionis* dictæ guttis aliquot affusus, ejus superficiem ex hinc *Albere*, cum plerisque aliis astantibus hujus experimenti testibus, notabam.

Siqua igitur hisce probationibus fides, vel a calore frigoreque vehementibus & continuis, vel a sale alcalico intus retento, vel utroque lentorem hunc oriri, verisimile est.

V. Quoties e viscido redemptus, præca gaudet *ἀποία* & more naturali circumagitur sanguis, evanescit tumor, quiescit dolor, convalescit æger: contra vero, affectu male tractato, id est perseverante, viscido, nondum victo correctoque, nonnunquam oritur *Arthritis* ista, quam dico, *Symptomata*. Nempe, cum abundat το *γλισχρόν*, quæ visciditate, qua acredine, vehementiores, pariter ut *Arthri-*

(a) Hæc de re, qui plura voluerit, adeat clarissimi *Piscarnii* Dissertationem Med. ultimam: ut & almi Coll. *Romanorum* Archiatrorum ad Cl. *Vicussenium* Responsum.

(b) Vid. Cl. *Lowerum* de Corde, Cap. 2.

(c) vide *Humani Sanguinis Historiam*, Partem 3.

(d) Acta Phil. Lond. N. 215.

Arthritis ipsa, profert distensiones, dolores, tumores, aliosque non paucos effectus utrique huic vitio communes.

Frigidam vero *Arthritidem* æmulari gestit hic affectus, illiusque partes sustentare: Nam, neque dolor æque acerbis; nec inflammatio perinde contumax; neque declinatio similiter propria, ac in illa *Arthritide*, quam appellamus *Calidam*. Nihilominus fatendum est, quod, si *Rheumatismo Scorbutico*, aut *Venero*. *Arthritis* ista superveniat, (posse vero supervenire, nullam recipit controversiam) ob asperum aliquid, ac stimulans, interfusum, & dolorem magis acutum, & inflammationem magis insensam esse.

VI. Autumnio maxime intenduntur hi dolores; eo videlicet tempore, quod fluxionibus favet, (quanquam & alias anni tempestates iis prorsus immunes esse, nequaquam affirmandum,) & diu, nonnunquam ad totum hyemale spatium, ubi morbus inveteravit, excurrunt; sæpe quidem intercisi, at a levissimo frigore recidivi; quod diuturno familiare *Rheumatismo*. Turgent articuli. Fartura extante, & in tumorem albidum, & tanquam *Oι γυναικείον*, cutim elevante. Unde digitorum motus semper impeditus, interdum abolitus: Huc illuc digiti torquentur: manus nonnunquam retroagitur; sicque cubitus, ut pars ejus interior jam emineat.

Cum *Arthritidis* personam qualemcumque capeffivit *Rheumatismus*, raro quidem exiit; ad vitæ usque terminum plerumque perferens. Si modo sanum id, quod intus, & incolume totum est, extremam aliquando senectutem, sed digitis, sed artubus multatus, æger adipiscitur; *Podagram* interea, tanquam humani generis pestem & perniciem, tanquam malum, vel ipso teste experto, acerbissimum, (qua tamen genuina fortasse nunquam est affectus) increpans acerrime.

VII. Quamvis enim nonnulla *Frigidæ Arthritidos* Symptomata gloriatur hic affectus: tamen, si rem attentius perspexerimus, cum ea parum convenit. Cutis sanguini (sic, ut in *Rheumatismo* solet esse) densa, & quam in *Arthritide* multo densior, post quietem supernatans, hoc abunde arguit: confirmat id, quod gelatina, quamdiucumque commissuris immorata est, nunquam in tofos indurefcit, quodque commissuris minimè contenta, cum internodiis eas pari fere proportionem premit: tum vero omnium maxime, quod nullo cardiacorum, utut *Actu* vel *Potentia* calidorum, abusu; vel quavis alia de causa (contra quam *Arthritis* omnis, sive *Primigenia*, sive *Symptomatica*, sive *Calida*, sive *Frigida*) in paroxysmum, qualis est *Arthritidis*, vel levissimum, evehatur unquam *Species hæc Adulterina*.

VIII. Ad hæc *Rheumatismi* reliquias, duras equidem & pertinentes, prævertendas, valet ea, quæ morbi istius curationem habet, quæ sanguinem attenuat, medicina, ab auctoribus, illam ex instituto tradentibus, haurienda. Cui tamen unum, ut mea memoria est, ab iis prætermisum, adjiciam; nempe, quod, ad dolores *Rheumatismi* minuendos, ad sanguinem alterandum, & τὴν γλίσχρότητα devincendam, conducit, supra quam quis expectaret, vomitio; sed vehemens, sed iterata. Quod unde efficitur, sanguinem exagitando, concretionem inhibendo, motumque illi novum expeditoremque tum intestinum, tum periodicum, imprimendo; an quovis alio modo fiat, in medio relinquam.

Hoc autem gratis dictum, ne quis existimet, fidenter affirmare possum, sola *Infusione Croci Metallorum* ad quatuor vices, quantitate bene magna, tot diebus continuis, ab athletico quodam & multarum virium ægro, contra *Rheumatismum* hausta, unde cum *εὐφορία* toties evomit; *Rheumatismum* gravem, & permolestum, me novissime penitus & radicitus extirpari. Cujus quidem historiam mentionem non ideo feci, quod tristem & severam, ne dicam periculosam, hanc curationem, vix centesimo cuique tolerabilem, in communem indistincte usum, inducere conarer, aut in animo haberem; (quæ enim hæc temeritas!) sed tantum, ut emeticum ab hoc affectu per se considerato, non ex omni parte respui, seu vetari, submonerem; imo quadantenus indicari; & quoties vires, & quæ sunt ægri cætera consentiunt, posse ministrari.

IX. Ad easdem reliquias præsentis extirpandas, requirit indicatio, quæ quidem unice attendenda, ut tollatur iste lentor, ut crassa, pertinax, & viscida materia, quæ juncturas obstruit, & in tumores cutim earum effert, causa videlicet conjuncta, corrigatur emendeturque, cujus gratia, e *Regno Vegetabili* depromantur *Antiscorbutica* quæ dicuntur, sale volatili referta; qualia sunt *Radices Armoracæ, Cerpæ, Ari, Allii &c. Folia Cochleariæ, Nasturtii Hortensis Indicique &c. Semina Sinapios, Cochleariæ &c.* Quæ quidem omnia, recte & artificiose comparata, debitoque more data, viscidum incidant, tenuent, resolvant, perque renes demum expellant quicquid alienum est, & indoneum.

Huc, eodem fere nomine, respiciunt *Spiritus C. C. Urinæ, Fulinis, Salis Armoniaci, & id genus alii Volatiles, sive simplices, sive oleosi*.

Quid per *Oleum Terebinthinæ*, medicamentum mire penetrans, & deobstruens, (pulmonis illud solvit pituitam, in catarrhis pertinacibus farturam ejus allevat: in tingendo marmore, colorum illud optimum laudatissimumque vehiculum est:) Quid, inquam, in lentore *Rheumaticorum* reducendo per illud præstatur, quando hoc hortatur analogia, fiat periculum. Profit autem tum interne sumptum, tum externe applicatum, e.g.

24. Ol. Tereb. gutt. iv. ad vi. vel si Febris Suspicio nulla fuerit, plures. Conf. Anthus ʒj. Syr. de Rubo Idæo q. s. f. Bolus, hora somni deglutendus, cum Julapii Haustu.

24. Aq. fol. Ari, Angelicæ, Ulmaricæ aʒv. sp. Croci ʒij. Sambuci q. s. cum Marg. ppt. & sacch. f. Julapium.

Balsamo Sulf. Terebinthinato artus motu privati, cum frictione, bis die, superillinantur; vel etiam Vernice Terebinthinata.

Camphoræ sapor acris & pungens, odor aromaticus penetrantissimus, igni comprehendendi facilitas eximia, sed præcæteris quibuscumque in auras abito celerrima, partes ejus subtilissimas tenuissimasque ostendunt. Ideoque nunquid ægrotantibus hisce nostris, ad incidendum & tenuandum in eorum capillariis lentum illud viscidumque, & quantum ab illius auxilio sperari possit adjuvanti, merito exquiratur. Dari possunt ejus Grana v. vel vi. Oleo Amygd. dulc. soluta, cum Conf. flor. Borag. ʒj. Syr. Cort. Citreor. q. s. (ut f. Bolus) cum Jul. Haustu, hora somni, quod quidem tempus exhibendi præfero, quoniam per noctem insequentem (noctu vero, quam Sydenham Opera Medica.

interdiu, in his ægrotis, ad superficiem corporis sanguinem magis efferi verisimile est) una cum sanguine ad π γλίσχρον appulsam majori cum impetu, favente flumine rapidiori, in id arietet. Quinetiam *Epithemata Camphorata* possunt externe partibus affectis ad moveri.

X. Sin hæc e *Regno Vegetabili* frustra esse reperiantur, & operi impatiæ, e *Regno Minerali* conducatur optime *Mercurius*; illo nempe pacto sanguini commistus, & obstructionibus advectus, ut incidendo dividendoque viscidum illud attenuet, solvat, colliquet. Quare ptyalissimum hoc in casu levem institui, diuque proferri, (modo per ægri vires, & alias res licuerit) e re futurum arbitror. Nec non ad eum finem *Mercurium* partibus iisdem læsis, per unguenta, per emplastra, posse cum fructu superponi.

At si ista non sentiat, quæ juncturis inest, gelatina, *Suctu* frequenti validissimoque, per fistulam ad eam rem fabricatam & orificio prius facto immisam, evocetur. Hoc in *Arthritide* vera laborantibus fieri, vulgare jam & pervagatum est: multo vero tutius in rheumaticis posse credibile est. Hæc autem operatio non nisi recens affectis, & dum liquida est materia, promittit sanitatem. Articulus gelatina per suctionem inanitos, *Vino ustulato* sapius fovere, & *Emplastro* quodam (*Stomachico* puta *Magistrali*) a gangæna defendere tutarique oportebit.

Istam medendi legem, secundum morbi indolem & genium delineatam, ut in ejus initio probabilem, adduco; sed nullo quidem experimento (fatebor enim) confirmatam. De morbi historia plus satis constat; & etiam nunc in vivis sunt, qui hujus veritati fidem faciunt, & assipulantur; de medicinæ vero hujus usu, & victoria, nihil habeo, quod dicam. In affectu inveterato, cum viscidum id induruit, quod tenuetur, minus verisimile est.

Omittendum vero non est, quod, τὴν γλίσχρότητα rheumaticorum sanguini accedentem putrefactione sola tenuari dissolvique posse opinatus, Medicus perillustis, clarissimus (a) *Floyerus*, (cujus hoc est argumentum, quod ovorum albumina, quæ quidem gelatinam hanc nostram cumprimis referunt, putrefactione liquefunt) ad eam, his in corporibus non minus quam in tassi laborantibus, promovendam, emollientia, maturantia, collquantia, (qualia sunt e *Rad. Glycyrrhizæ, Sarsæ, Chinæ, Iræos, &c.* ex *Hordeo, Passulis, & ejusmodi aliis comparata*) non sine multa probabilitate præcepit. Utrum hæc, quæ in liquando solvendoque pulmonis phlegmate, tot ab annis, tanrarum virium & *εὐεργετίας* esse merito prædicantur, in artuum illo rheumaticorum valeant, operæ pretium esse experiri.

De *Symptomatica* falso, & ex vulgi tantum more, sic appellata, quæ habebam, effunduntur: Itaque iis, quæ ad *Veras Symptomáticas* aditum præcludere viderentur, de via dimotis expeditisque *veris* jam attento.

CAPUT III.

De *Arthritide ex Chlorosi, Alba, & ex Mensum Suppressionione*.

ART. I. EX *Symptomáticas* ita καλεῖται appellatis, illæ primum expromendæ veniunt, quæ ortu, quod dicitur, *Æquivoco* generantur: quarum e numero principatum postulat *Arthritis* a *Chlorosi* nata. Quod autem uspiam ita nascatur, quod adolescentulæ, virgineo dudum morbo languentes, necdum illo prorsus liberatæ restitutæque doleant *Arthritide*, a nonnullis idem habeatur, ac si *Lucam Borem* (ut in proverbio est) *Locusta* pariat; id est, *Αδυνάτω* in. Sic a morbo, hilce puellulis parum congruenti, immunes eas reddere, incolumes præstare, videatur, tum ætas præmatura, tum affectio dissimilis. Ita vero sentientibus, ut ne calculum adjiciam, indubitata fidei cogit experientia; nec istam ætatem, nec hanc affectionem, illas ab *Arthritide* penitus tueri comprobans.

II. Ut autem dicam, qui fieri potest, quod, ex morbo sic dispari, morbus sic dispari oriatur, advertendum est; quod *Arthritis* eas tantum modo pallidas (quantum mihi observare licuit) aggreditur, quæ miasmata hæreditaria supra modum vitiatæ & imbutæ, ad istud mali naturæ inclinatione pervicaci, momento maximo, pronæ sunt, & diriguntur.

De cujus rei veritate satis, ut opinor, ex eo liquet, tum quod illa, quæ ad *Arthritidem* inducendam more agunt usitate procatartico, (qualia sunt crapula, satietas, Venus immoderata, lues veneræ &c.) virginibus hisce imputari minime posse cogitandum est: tum etiam, quod *Arthritide* hujus classis stirpe sunt cum primis *Arthritica*.

III. Exinde patet, quod *Arthritidos* ex *Chlorosi* procreatio, non eo sensu capiendæ, quasi hanc quæ fecit, illam etiam faceret, eadem Numero, vel Specie, materia; sed nova ratione, agens, nova perpetrans παρόλως; (quod tamen in plerisque *Symptomáticas* usu venire palam est.) Nostra quidem alia res est. *Chlorosi*, sive sanguinis Μόλυσσι, abituræ supervenit, & simul cum vultu colorato, cum robore, cum mensibus, ne multa, cum sanguinis Μειγνέσµω horum societati se immiscens, ex accidenti profilit *Arthritis*, peculiarem habens materiam, causam propriam continentem, a *Chloroseos* illa, multum abluentem.

IV. *Symptomática* hæc *Arthritis* interdum *Vaga* est; Artus hinc inde subsultando peragrans; dolore pungenti, & rodente gravans; aliquando *Rheumatismi* nomine delitescit: alias, articulis inhæret, & affixa est.

Vagæ Diagnosin incerta, & tenebrosa; uti *Arthritidis Vagæ primigeniæ*. Lucem tamen afferat, de parentum morbis, numnam illi pedibus doluere: & an ægra *Rheumatismi* causis evidentibus, præsertim frigore, paulo ante subiecta fuit, quæstio. *Fixa* vero, teneritudine juncturarum, dolore, rubore, primum molli, deinde successu temporis lapidescenti, & rosacæo, se ostendit.

V. Hæc cum morbi ratio sit, in eo ponenda indicatio, singularis, & præcipua videtur; ut, a peccante materia, jam nunc *Arthritidem* moliente, per muliebria, primo quoque tempore, sanguis expurgetur; & sic *Chlorosi*, sic *Arthritidi*, simul semelque occurratur. Omnium maxime conducet, (dummodo res annuerit familiaris, & iniri nuptias permiserit) *ἐν γαστρί ἔχειν*. Quum, partu naturali, quo in utero, tanquam in sentinam, universi corporis inquinamenta secluduntur ad inanenda, & vacuanda foeminarum corpora, nihil efficacius valens, certe hippiatris illud notissimum, & multiplici comprobatum usu: nec, cur hominibus denegetur hoc consilii, video. Procul dubio laborantes isti medicinæ generi minime refragabuntur;

O 3

quin

(a) Vide *Humorum Animalium statum præter Naturam*. Cap. xi.

quin medico, naturæ tam ministro, facile obtemperabunt. Medicinæ vires, & mirificos effectus confirmabunt, suarum gratia, matronæ.

VI. Sin nulla fuerit nuptiarum opportunitas, ad menses, (qui hac in parte secundas vendicant) omni auxilio, omni ope, & industria promovendos adnendum est; ea spe, & fiducia fretis, *Arthritidos* materiam, & causam continentem, per eos facile commodeque posse perturbari. Atque hunc in finem *Martiatam*, sed, (ut illorum vires, & potestates, ad uterum recta collineentur,) aptissime cum *Emmenagogis* copulata, vel artificiose interposita, fructum ingentem, mensem amplissimum, pollicentur.

Si menses omnino nulli sunt, ex iis concreta, & composita, ad tempus diuturnum & continens, cum exercitatione & purgatione debitis, adhibeantur. Si fluunt, sed diminute, illi, interlunii tempore, bis die, *Martem* usurpari proderit; sed illo, quamprimum menses institerint, neglecto; ea dari, quæ hos ciendo naturæ rem (qua nihil efficacius, conducibiliusve) suo ipsius more, promovebunt. *Martem* nullum aptius vehiculum, quam *Aquæ Martiatæ*, per urinam exeuntes; nec uno tantum nomine, *Pallidis* his *Arthriticis* conveniunt, coctionem integram; sanguinem exaltant; æstuque exundanti, virus *Arthriticum* abluunt abripiuntque; tum *Arthritidi*, tum *Chlorosi*, simul adversantes.

Horum autem usui, & præmitti catharsin expedit, & septimo quoque die circiter interponi, ne ab aqua in corpore alicubi restante, aut ab alvi tarditate, aut a sanguine roborato, nimis evecto, exaltatoque (quod sæpissime solet accidere) sit periculum. Cujus quidem modi catharicos intercalationem, ab antiquis summo consilio præceptam, & diligenter institutam; non sine ægrorum incommodo, & discrimine, dudum ab aliquibus omitti video.

Quæ vero reliqua generalem morbi hujus curationem respiciunt, & materiam *Arthriticam*, par renes expellentia, siye ortum ejus & incrementum inhibentia, complectuntur, ex *Arthritidis Primigeniæ* prophylaxi non inutiliter ducantur. Atque hæc de *Arthritide*, quam, quod *Albarum* esse reperiatur, appellamus *albam*.

VII. Alia est *Arthritis Symptomata*, priori propter affinitatem adjungenda, quæ adultas, (ut jam dicta juniores,) quæ steriles affligit, & catamenias, aut omnino nullis, aut aliquanto paucioribus, donatas. Hac affectæ crassiori plerumque habitu sunt, viragines, sedentariæ, voce gravi, neque semper imberbes; Morbus, *Arthritidi Frigidæ* appropinquans, negligenter, & languide *Παροξυσμῶν*; Junctionas denique recrementis explet, motu privat.

Occlusa nempe, quam charam, quam utilem, quam amicam habuit naturam, per catamenia sanguinem expurgandi, via, materiæ vis in eo constructa & coacervata est: quæ, graves & periculosos inferendo morbos, æconomiam crebro miscet, turbat, evertit omnia. Sin materiam natura vincit, porta hac vel illa, eam expellit, nec raro in articulos trudit, Dædala rerum conservatrix.

VIII. Ista vero, non nisi corporibus *Arthritidi* perferendæ (malitia vel acquisita, vel hæreditaria,) præparatis, obtingunt; & illa potissimum ætate, quæ provectior, & ingravescent, per methodos succedaneas naturæ defectus ambit quodammodo refarcire.

Et quoties a landabili desideratissimoque *καταρδισμῶν* desciscens, natura *Arthritidem* molita est, raro utique pressus retro agit, raro catamenia renovat; quin *Arthritidi* imposterum insistent, illius beneficio vitam quam potest longissime, quamque beatissime producit.

IX. Cum mali hujus partu allevandi spes omnis frustrata, & a catamenias obscuræ est, & tenuis; eam medendi legem optime posse fructuosissime servari judico; quæ, per *Cathartica*, materiam peccantem, in sanguine congestam, & res novas affectantem, expellit. Ut autem illa ægrarum conditioni quadantenus accommodentur; primum eligantur ea, quæ sanguinem fundendo, & a sese illius partes separando, mensium movendorum expectatione Medicum accedant; (hoc autem modica dosi, potius quam magna, fieri certissimum est,) Tum, ad eundem finem, *Emmenagogis* implicentur, & fiant *Purgationes*, quæ dicuntur *Hystericæ*. Postremo, omni tantummodo mense alterno, (nec quidem amplius, ne purgatione nimis libera & frequenti, materia alio ablegata, mensium spes interrumpatur) eaque lunæ quadrante, qua præcipue sanguis *ζυμωσθαι*, & se attollere cœpit, vere & autumno, iterum sæpiusque repetantur: nec, quæ earum vires infringendo retundant, aut motum sanguinis intestinum sufflamment, admittantur, hora somni, post purgationem, paregorica, e. g.

24. *Calom. quinquies sub. gr. xv. specier. Conf. de Hyac. Conf. Ros. rubr. aa ʒi. Syr. de Symp. q. s. f. Bolus, sera nocte deglutendus.*

24. *Pil. de succino ʒi. Aloes Rosat. ʒss. Assæ fœtid. Pul. Castor. scammon. aa gr. v. Bals. Per. q. s. f. Pil.*

Si isto ritu purgatio, in hujusmodi *Arthriticis* celebretur, de catamenias postliminio restituendis spes affulgebit aliqua, (modo atas, & naturæ ordo consentiat) aut, si votis & expectationi non respondeant ista, capiti tamen, & partibus internis, per catharsin certissime cavebitur, ne a pleuritide lædantur; quod quidem minime spernendum, atque adeo studiose laborandum.

X. Si mensium spes sefellit omnis, neque restat ulla illius anchoræ fiducia, majori quantitate catharticum (*Aloeticum* autem esto; vel *Decoctum amarum purgans*) illoque mensis tempore, quod solebat esse eruptionis, *εὐκαίρως* adhibendum: Tum, ano materiam quod emittat, itaque mensium vices suppleat; tum etiam *Arthritidis* (quæ hominibus hisce auro contra, & cum vita æque, pretiosa,) spei quod indulgeat. Quæ quidem regula, tam illi commoda, tantique (si apposite observetur,) est momenti, ut nihil supra.

Hisce porrò ex usu erit fonticulum aperire; aut, ne vetus excisetur, inspicere: Et, si quod per fluorem album, vel aliud quodvis, *παρὰ λόγον*, erat excrementum; ut permaneat, perduretque vel etiam in ægrarum commodum augeatur, eniti.

XI. Corollarii vice, memoria tenendum, in isto pari *Symptomatarum* impugnando (Dii Væque!) quantum intersit; altera purgationem non nisi levem, & raram eligit, altera, tum fortiolem, tum frequentiolem; altera eam, non nisi alterantibus, (id est, principali auxilio) viam præparantem; altera, tanquam ipsum principale; altera Chalybem desiderat, & in eo fere spem ponit omnem; altera eundem metuit, fugit, ut fatalem abhorret. Brevi dicam, altera sanguinem augeri *μικρῶς ζεῶσαι*; altera minui, & deduci, postulat. Adeo nempe contraria *Symptomata* hisce therapeja; imo, ut fieri potest, in eodem corpore.

Historia Arthritidis Vagæ, Fixæ, ex Chlorosi, fugatæ.

V Eteris *Arthritici* Filia, duodeviginti annorum, ventriculi dolore quasi colico, cum fastidio, nausea, vultu pallido, respiratione molesta, mensium defectu, aliisque symptomatibus *Chlorosin* ostendentibus, afflicta est. Post annum, materia quædam artuum commissuras, earum autem intervalla magis, occupavit, diu, misereque cruciavit. Teneritudinem, torporem inibi, doloremque peperit, acerbum: aliud ex alio. Cessavit interea ventriculi dolor: perduravit *Ἀρογία*, *Ἀσπενσία*.

Dum ita se res habet, primo emeticum, tum catharticum, meo consilio, datum est; & deinceps iteratum. Ob atroces, & fere continuos artuum dolores, sanguis detrahitur. Post quas evacuationes, ad appetitum acuendum, ad sanguinem evehendum, & menses ciendos, (quem mihi scopum hac in re palmarium proposui,) *Martis Nutriti*, ʒss. cum vehiculo convenienti, bis die deglutit. Et omni mane aquarum ferratarum, *Totonesii* in suburbis, ʒij. exhaustis; cum sp. vol. Oleas (ad *Διέρεσιν*, & calorem augendum,) guttis circiter triginta. Hac methodo menses per plurimos, interposito subinde lenienti, observata: dolor iste rheumaticus: (sic habebatur,) & teneritudo primum mitigantur, demum in totum fere devinuntur. Viget appetitus & digestio. Aliqua sunt catamenia. Facies colorata fit & vivida. Scintillant oculi. Salus ex omni parte perfectior & integrior; nisi quod tumoribus albis, molibus, teneris, & (ab iis) *Ἀσπενσία* juncturæ artuum infestentur. Quæ quidem accidentia tempestate pluvia plus solito sæviere.

A *Rheumatismi* (sic perperam dicti) exitu, triennio vix elapso, tumores indurescunt, & nodi sunt tofacei, tum numero plures, tum magnitudine conspicua; sed & diversa, & longe dissimili: alii namque granum triticeum; alii pisum; alii nucem æquant avellanam, digitorum articulos, eorumque regiones tumefaciunt; in articulis, permanentes; sed in eorum interstitiis, evanidi, inconstantes. Erat dextri summitatis cubiti cæteris major; nuci juglandi par; initio mollis; sensim exinde lapidescens. Juxta cubitum sinistrum, tumor albus eo tempore digito cedens, in tosum abiturus. Adhæc pruritus artus, & quidem molestissime; & emittunt pustulas. Per biennium ista *Podagre* tulit symptomata, sed lenis, sed benigna; neque toto hoc tempore, vel semel unquam, in paroxysmum evectæ. Ab ejus ortu, ventriculo, & iis quæ sunt intus, bene; ob illam artus aggredientem, procul dubio melius. Menses, per universum hoc biennium, mediocres.

Anno incipiente 1700. præter ista, quæ memoravi, *Arthritidos* symptomata, de ventriculi (præsertim a pastu) dolore, inflatione, aliisque *Ἀσπενσίας* indicibus, porro quiritatur. Ut therapiam, tum ad ista præsentem, tum prophylacticam, instituerem, Auctor eram (*ἀπὸ τῆς κατὰ* sapius præmissa catharsi, & primis viis uti par erat exoneratis,) ut, per quatuor menses, omni mane, sextam inter & octavam, aquarum ferrat. ʒij. (quarum ʒss. foliis *Theæ* alteranda) ebibat. Decima sequenti, haustum infusi.

24. *Summit. Trifol. palustris. Pug. ii. Aq. Pluvie bullientis ʒss. Infunde ad Amaritum sufficientem: Colatura Coch. v. adde sp. Junip. ʒi. Tinct. Aurant. gutt. x. f. Haustus.*

Quarta pomerid. Bolus e Conf. Trifol. palustr. Flavæ. Aurant. aa ʒi. Millep. pp. ʒss. Chal. Nutriti gr. v. Syr. Caryoph. q. s. cum leni Cathartico subinde repetendo.

Interdicta, per totum hunc Decursum, Cerevisia, Potui dabatur Ordinario Decoctum. 24. Rad. Chinae Sarsæ aa ʒss. coq. in Aq. fontis Ferratæ ʒiv. ad ʒj. Colatura adde spiritus Juniperi, cum sacchari Crystallini, q. s. f. Decoctum.

Vescebatur εὐκαίρως, εὐχρηστικῶς, & Sanguinem temperantibus, seminatibus scil. Beccabunge, Nasturtii Aquatici, & Hortensis, Urticæ, Rapa, Batata, Piso, Pastinaca, una cum Agnina, Pullina, Vitulina, & istiusmodi aliis.

Harum rerum observantia diligenti, sedulaque corpus ægræ *νεοτελεῖται*. Nodi partim minuantur, partim evanescunt. Pruritus cessat: tolluntur pustulæ: augetur appetitus: coctio perficitur: sanguis, expulso per renes utrumque inimico, fermentationem, & *Πυρματῶσιν* acquirit naturalem; quam monstravit *εὐχρηστικῶς*. Quod auspiciatissimum judicavi, recte postea fluxere catamenia, & quo rectius, eo certius fugatur, cum satellitio suo, *Arthritis*. Ut, neque pustulæ, neque pruritus; neque Tumor; neque dolor; jam, per annos per plures, ex eo tempore, reverterentur. Quod quidem indubitandum, optimæque fidei Argumentum: Per *Emmenagogæ* &c. posse hujusmodi *Arthritidem*, etiam si *Nodosam*, & *Hæreditariam*, auferri depellique.

C A P U T IV.

De Arthritide Hydropi superveniente.

ART. I. AD alteram illam e *Symptomatibus* minus propriis, ex recensione principio dicta properamus; nempe ad *Hydropis επιέννημα*: eoque libentius, quia crebro hoc occurrit, & uti spero, in hujusce populi commodum & tutelam explicetur.

Quod *Arthritidi* succrescat *Hydrops*, est facile perceptum, & ordini, quem in hominibus e medio tollendis, servare solet natura, maxime consentaneum est: At, e contrario, quod *Hydropi Arthritis*, etiam si aliquando accidit, tamen, naturæ methodo quasi inversa factum, inter ejus *Ἀσπενσίας* non inique censetur.

II. Ut de re tam utili, tam jucunda, tam explicatu digna, pro ejus dignitate, quantum potero, dicam luculenter; advertere oportebit, quod ab hepate, aut viscerum aliquo nobiliori, siye scirrho, siye alia quavis indomita labe vitato, quicunque sit *Hydropicus*, ratio is *Πόσος*, & quo nobiliori, eo rarius: Hoc enim in casu, sic in pejus ire solent omnia; sic corrue; ut; si qua olim emicuit *Arthritis*, a morbo graviore, & magis imperioso, (totas ægri vires totum hominem exertente & fatigante,) ei plerumque officiat, tanquam majoris morbi auctoritate victæ, & paroxysmum raro unquam recte facere contingat: Verum in corpore taliter affecto corruptoque rarissime omnium exoritur, & nascitur *Arthritis*.

Sin ea fuerit *Hydropis* ratio, quod, salvis visceribus, aut parum læsis, ab una paruum sanguinis *ἀμεινία*, & malo ejus habitu, (ad viscera

scera contaminanda, quantumvis apto, & proclivi) ducat originem; ex eo, præsertim medicato, exoriri posse *Arthritidem*, iterum & sæpius observavi.

III. In eo sanando, sive *Anasarca*, sive *Ascites* sit, cum aquæ quod abundat jam prius emissum est, amaris & chalybeat, tum ad corrigendum sanguinem eumque roborandum, tum mehercule in primis ad eximendam *Ανσιξη* *Hydropi* familiarem, ex usu medico, insistimus. Quæ quidem medicamenta in exaltando sanguine tanti sunt momenti, tantarum virium, ut, si æger nec ætate neque morbis fuerit debilitatus, idemque seminium habeat in sanguine *Arthriticum*, exulante eo & in articula menta misso, ex *Hydrope* in *Arthritidem* persæpe recta progrediatur.

Imo quidem ita fieri potest, & aliquoties evenisse novi, ut, ubi consistent vires, & *Arthriticum* miasma in sanguine copiosum, effica, & jam ad *ακμην* evectum, insit, absolutis quæ ad *Hydropa* exsiccandum opus erant, evacuationibus, & salvis naturæ viribus, sine dictorum, vel istiusmodi alterantium usurpatione, *Podagra* quidem afficiantur.

IV. Utcunque fuerit, natura (sive per se, sive medicamentis adjuncta,) novos init operandi modos, novam ambitionem. Spiritus, qui in œconomia animali tuenda sustinendaque indefinenter occupati, omnem absolvunt operam, totum opus perficiunt, mala vitæ ratione dudum oppressi, & fero fere submersi, *Chalybis*, cæteraque *Alterantium* vi suo tempore (hoc est, remotis impedimentis) exhibita, tandem incitati emergunt, denique *Αίματωσι* promoveunt genuinam; appetitum, & coctionem emendant; materiam e sanguine pellunt alienam; itaque eam instaurant, depurgant, & longe reddunt vegetiorem.

V. Dum in his versantur, si seminium intus latuerit *Arthriticum*, (diu vero, & silentio latuisse, sæpenumero comperimus, nec in paroxysmum evehi,) ad illud amoliendum, expellendumque iisdem hi urgentur medicamentis. Hinc in sanguine primum discordia; tum, ea paulatim glicente, (ut in veneno, si quod demissum fuerit, eliminando,) orgasmus, supra naturæ modum, (qui lenis usque & placidus esse solet) supra tenorem ordinarium, vehementer, & cum impetu. Ad exturbandum inimicum, summis undique viribus & copiis, omni industria, contenditur. Hic labor, hoc opus. Post aliquot dierum luctam (est ut citius) iste fugatus, & loco cedens, qua data porta viam capessit. Articulum aliquem externum petit: dolorem, aliaque profert, *Arthritici* quæ sunt paroxysmi signa *Παθονομονικά*.

VI. Bono quidem omine, in conspectum venit huiusmodi *Arthritis*. Est, quod ovans exclames, *Arthritice!*

Χαίρεις, Μάκάρων πολυπραγμάτων.

Morbum enim vix ausim appellare. Descendens cælo, te salutatur, *Diva Arthritis*: (Feret hæc *Latinitas!*) Tum Annos elargitur, tum valetudinem, si non integram, & omnibus numeris beatam, certe desiderabilem: & medentium, & dolentium encomiis celebratam: divinam hospitem, fac, grate accipias; fac, colas.

Ita natura, priori sanguis *δυσκράσις* ferme obruta, *Hydropis* edit symptomata; at brachia secundo agitans, & sese colligans, aliam rerum faciem, aliam inducit symptomatum catervam, atque adeo *Arthritidem*.

VII. Ex prædictis sequitur, quam nulla hic loci necessaria, quæ adversus hanc *Arthritidem* (speciose, scilicet!) cudatur, therapia. Quorsum enim ad tollendum morbum medicina, cum ipse morbus sanat; utrique pharmacie armamentario præferendus; *Chimicorum*, & *Galenicorum*, copiis, universæ gentis medicinae consilio major; viribus potentior.

Si recte rem putemus, in eo potius sudandum est, ut *Arthritis* ista non tam obtundi possit, quam ordinari & augeri; utque æger, morbo primario feliciter & prospere commutato, nutriat *Arthritidem*, foveat, tueatur, servet.

VIII. In hunc finem e Regno Vegetabili seligantur *Amara*, & *Antiscorbutica* acriora, *Radices* scil. *Gentiane*, *Zedoarie*, *Serpentarie* *Virg.* *Contrayervæ*, *Ari.*, *Armoracie* &c. *Summitates* *Agrimoniae*, *Centuarii* min. *Trifolii fibrini*, *Cardui* ben. *Absynthii* utriusque *Salviae* tenuifol. *Verbenæ*, *Chamædryos*, *Scordii*, *Marrubii alvi*, *Marricarie*, *Cochlearie* &c. *Flores* *Salviae*, *Chamæmeli*, &c. *Semina* *Cochlearie*, *Cardui*, *Sinapios* &c. E Regno Minerali, (quod instar omnium erit,) *Ferri* *Præparata*; præcipue *Mars* cum *Sulphure* præp. *Martis*, *Alcohol*. sive *Pulvis subtilissimus*, ejusque *Tinctura*. Quæ quidem *Singularia*, cum eorum similibus, sunt in hisce auxiliis; & forma convenienti composita, & quantitate & methodo rectis exhibita, summo erunt præsidio, tutelæ optimæ. En brevem curationis Scenographiam.

IX. Sumat Æger, (*Hydrope*, *Medicina propria*, & peculiari, prius sublato,) omni mane, *Canarini* *Simplicis*, vel *Rhenano*, si usus fuerit, diluti, *Rad. Gentiane* summit. *Agrimoniae*, *Centuarii* min. *Cort. ext. Aurant.* alterati, coch. vi. cum *Tinct. Martis* gutt. xx. & (si videbitur) sp. vol. oleos. gutt. xx. Quarta pom. Bolum, & Pul. *Rad. Ari* C. Conf. Fol. *Abs.* 2℥. (vel *Flor. Salviae*) ana ʒi. *Alcohol. Martis* ʒss. cum *Syr. Garioph.* q. s. Hora decumbendi, Pulv. *serp. V.* & *Zedoarie*, (vel *Contrayervæ*) aa ʒss. cum *Syr. Abs.* *Simp.* q. s. ut f. *Pilule Bolo*, & *Pilulis*, superbibat *Julapii Coch.* quatuor, vel quinque.

2℥. Aq. *Cardui*, *Gent. Comp.* Cin. hordeat. aa ʒv. *Abs. Comp.* ʒi. *Marg. pp.* ʒss. *sacch.* q. s. f. *Julapium*.

Quibus insistat, menses binos, vel etiam ternos; cum *Purgatione*, *Septimo*, vel *Decimo*, quoque die intercalanda. Eaque prout opus fuerit, exinde repetat.

Ad nauseas & ægritudines subitas, quibus ventriculi vitiis, istiusmodi homines, præcipue poculis si indulgent, non minus quam a conceptione mulieres, affliguntur; quoties pernecessum erit, *Canarini* *Zedoaria* medicati momentum: quod nempe viribus suis reficiat ventriculum, & focillet: quantitate vero nimia non exurat.

Cerevisia *Rad. Armoracie*, *Summit. Trifolii fibrini*, *Marubii albi*, vel *Salviae* tenuifol. siccata. *Seminibus Cochlearie*, vel *Sinapios*, *Infusis*, alterata, in potum ordinarium ministratur.

X. Quinetiam, licet abdominis lacus, tibiurum tumor extiterit omnino nullus; ad *Hydropa*, quasi furca, propellendum, artiserit, in corporibus ei recipiendo pronis, vere & autumno præcipue, bis terve, alvo, debitis ex intervallis, aquam detrahare; itaque ne crudescat *Hydrops*, efficere.

Sydenham Opera Medica.

Porro, ad eundem scopum oculum manumque dirigens, in eligendis, tum ad *arthritida* invocandam, tum ad intercalarium, *hydropa* propulsandum, medicamentis; cum, *Arthritidem* inferri, spes & consilium est; e re futurum arbitror, drasticum & stimulant (quo in paroxysmum sanguis citetur) leniori cuivis & mitiori, utut iterato longe præponere. Quo circa *Tinctura Sacra* ʒ. ad iii. aut *Pil. e Duobus ʒi.* ad ʒss. aut *Aloes rosat.* ʒss. *Ref. jal.* gr. v. ad hoc *Negotii præferre soleo.*

Sed & de liquidis ægrum quam maxime sollicitum esse conducet; abdicataque si quam antea complexus est, inutili libertate, neque plus, nec aliud bibat, quam coctioni, & nutritioni, quod sufficiat. Quantitatem potus diminutam compenset generositate.

XI. Adhæc, in ruinis sarcindis quoniam occupati sumus, nec ad propositum faciens vel minutulum quodvis, ex prudentia medica, præteriti decet, e lecto mane, pro anni tempestate, quam primo urgeat æger; ut motus, ut aprici fructus, & utilitates, decerpant, & in prandium magis esuriant. *Vesperis* mature cubet; ut spiritibus fomno alendis reparandisque sit tempus opportunum.

Quinimo, dicta medicamenta quo profint magis tum etiam alias ob causas, apprime confert, ut æger, bis die, sub Jove, corpus exerceat, ad calorem usque vel certe, quam enixe vires ferent. Unde motus sanguinis tum intestinus, tum periodicus, intendatur; humores efferti, & emeriti amendantur; spiritus animales recreentur; appetitus ad vigorem pristinum & latratum naturalem reducat; & œconomia ratio usqueaque renovetur.

Quæ quidem res a nobis eo lubentius in præceptis ponitur; quod ab *Hydrope*, seu potius ipsa morte, beneficio *Podagræ*, quos ego novi redemptos, horum pars major, laboriosis illud exercitationibus aliquatenus acceptum retulere.

XII. Ab *Hydrope Arthriticorum* quotquot dictam methodum meo hortatu ire, recteque percurrere commemini, nemo unquam misere, nemo, (quantum intelligere possum,) calamitose doluit. Deinde, quamvis alius liquidis, neque paucis, neque probatis indulgeret: alius ad *Hydropa* maxime proclivis cerneretur; nemo tamen horum, eo, jam per annos complures urgetur recidivo: Non pauci integre satis, & alacriter egere. Aliqui vero sic, *Arthritida* si demas, ut raro unquam melius. Quod quidem, notatu dignissimum, *Arthritidi* potissima ex parte deberi, agnoscendum est.

Has ob causas, nullis certe elogiis hanc *Arthritidem*, ejusque in accessu, opportunitatem, in paroxysmis, clementiam, in *Hydropicis* sublevandis, perpetuitatem, in defendendis, constantiam, optima promerentem encomia, digne me, & uti par est, prosequi posse existimavero: multiplici usu, variisque doctus experimentis, eam *Hydropicis*, præsertim senioribus, esse summam, & securissimam spem, columnam, & tutelam.

Quanta vero adversus *Hydropem Arthritidis* est potentia; tantæ profecto medicinæ, quæ *Arthritidem* primo novam introducit; quæ postea tardam accessit; quæ denique segnem & languentem excitat (pace vestra liceat dixisse) vires & utilitates.

Si *Arthritidos* hujus symptomata, perpeffu graviora, medicinam postulaverint, *Primigeniæ* doctrina deprimi potest.

Hist. 1. De Arthritide, Hydropi probe curato, feliciter accedente.

Nobilis quidam apud *Damnonios*, a nativitate obesus, nondum annos affecutus viginti quinque primum quierit plus solito indulgit (quod a corpulentia fuisse credebatur.) Deinde sensim levi quavis de causa, frigus contraxit: tussi creberrime gravatus est; catarrhis subinde pene obruitur. Sub idem tempus sompolentia tristi & periculosa, paulatim obrepente, tenebatur; ut mensæ accumbens, vel cibi capiendi, vel ludi gratia; aut rebus quoquomodo arduis implicatus brevi temporis spatio, nec absque casus periculo, nutaret. Hisce circiter diebus, pedes late accepti, & deinde venter, retento intus sero, gradatim extumebat. Pedes impressionem digiti facillime accepere. Venter (quod ipse non sine quadam admiratione sum expertus) pugnum fere dimidiatum. Hypogastrium occupavit externum aliena quædam materia, partes cuticulares tumore duro & inæquali, variato, plus minus purpureo, & postea nigricante sic obducens, ut gangranam præ se ferre judicaretur. Porro sitis, & respirandi difficultas (ob ventris *όγκος*, & diaphragma in thoracem elatum,) impenissimè urgebat. Urina interim exigua, subrubra, turbida, vultus ægri demissus, pallidus; vox humilis, tremula, languens. Ægre tulerunt familiares, virum, ortu præclarum, gentilitii nominis principem, patriæ decus, & ornamentum, ipso ætatis flore, morte tam inexpugnabili, tam immatura, surripi: Quod tamen in fati esse putabatur, & percrebuit.

Cum pectore laboravit, & difficili spiritu, *Tinct. Sulf. gutt.* xii. ex *Syr. Bals. Coch.* i. deglutiit, simul *Julapii cum Perlatis* *Haustu.* Quo præsentissimo remedio, spirandi spatium & anacatharsis multum & æqualiter augebantur. Contra vitium abdominis, atrox certe, terribile, *Decocto sequenti* lanea, per expertissimum Dominum *Jac. Jenkinson*, Chirurgum hujus civitatis ordinarium, immerguntur: & liquore expresso, calidissime creberrimeque imponuntur.

2℥. *Summit. Abs. Rom. Menthae*, *Cardui* ben. *Abrotani* aa *Mii Bacc. Lauri* vulg. sem. *Fenic. dul.* *Carvi* ana ʒi. Coque in *Cerevisiæ* fort. lbvi. ad iii. adde postea sp. vini vulg. lbj. Forti isto tempore adhibito, venter restituitur.

Ad *Hydropa* tum me, aliquanto post, accingo. Huic ut occurratur, quam primum tuto fieri potuit, *Pil. Rudii* ʒss. *Ref. jal.* gr. v. cum *Bals. Per.* q. s. mane deglutiit; & ex voto quoniam pilulæ operabantur, ad vices octo vel decem, a bidui vel tridui intervallo illas repetiit; eo nempe usque dum feri, quod erat nimum, omne deturbatum est. Eundem etiam in finem *Tinct. Diuretica* gutt. xxx. cum *Vini albi* haustum, bis die, purgatione liber, assumpsit.

2℥. *Millep. siccata*. & pul. ʒii. *Coccinellæ* Pul. & *N. M.* ana ʒi. sp. *Juniperi*, & vol. Oleos ana ʒi. Misce, & Vitro artissime clauso, Igne *Arenæ*, per noctem, digere; Mane, per *Emporeticam* filtra *Tincturam Diureticam*.

Cerevisiam dedimus libere medicatam.

2℥. *Summit. Cochlear.* *Miss. Radiculæ*, sem. *Sinapios* ana ʒii. *Coccin.* *N. M.* ana ʒi. misce infunde in *Allæ mediocris* lbii. pro potu ordinario, usus tempore colandæ, & cum simplici *Allæ* temperandæ.

Absoluta hoc modo *Hydropis* curatione, ad ejus prophylaxin animum applicui, ea præcipiendo quæ sequuntur.

24. Conf. Flor. Salviae, Flaved. Aurant. ana Zvi. Pulv. Rad. Ari Comp. 3ss. Salis Martis Riveriani Zii. Syr. Garyoph. q. s. f. Elect. Zi. bis die, cum Haustu Julapii. Nonnunquam, ejus Vice, Tinct. Martis gutt. xx. cum eodem vehiculo. Singulis autem diebus quartis quintisque, ad sex vel octo vices, ne abundet serum, & Syrupo sequenti Catharsis iterata est.

24. Diagrid. Zvi. Pul. Cinnam. Zii. Sp. Vini 15ii. Ustulando coque ad dimidium; Colaturæ adde Sacchari Crystallini 15ss. f. Syrupus. Dosis Zi.

Hiscæ diligenter usurpatis, non ita diu post dolore primum convexi pedis, tum vicini calcis, postremo, digiti majoris articulum majorem mordente, afficitur. De contusione, & ad limen nescio quod illusione (qui istiusmodi affectionum mos est) initio questus, de Podagra tandem minime dubitavit. Partim evacuantibus, partim cardiacis, ad paroxysmum effertur miasma Arthriticum, quod ad eum usque diem in obscuro positum, ne hilum quidem micuit. Paucos aliquot dies duravit paroxysmus; (ideo forsan pauciores, quod humorum ano tanta vis ejiceretur;) omni hyeme, & autumno, jam per quadriennium elapsum, ad unam circiter hebdomadam, constantissime redux. Ad tollendam Αγρυπνίαν, & dolorem minuendum, Frictione utitur, manu molli, tenerrime peracta, qua sola quies, & somnus illi conciliatur.

Ab ista medicina, vix concipi potest, quantum ægro est emolumentum: Primum, a Catarrho plane liberatur; tum a Gangræna (medius fidius) imminente; tum ab Hydrope; & dira ejus symptomatum Cohorte; tum a Somnolentia pertinaci gravissimaque; tum denique ad ea profliganda omnino omnia, inducitur Arthritis; felici quidem omine, auspicio saluberrimo, nam, a prima ejus accessione, Catarrhus, & Somnolentia, prorsus evanuerunt; Hydrops effugit.

Vere & autumno, in majorem cautelam, septimo quoque die, ad tres vel quatuor vices, Mannæ Ziii. Aq. Aldfordensis (summit. Abs. Rom. parum alterata) 15ii. solutas, hosce per dies, ingerit. Medicinæ vero præterea nihil.

Corpus hodie præcrassum expedite movet: equo identidem exercet. Ab hoc affectu, uxorem iterum tertioque gravidam fecit Arthriticus, & quidem nunc primum, etsi jam pridem maritus. Una Arthritide, sed nec ea gravi, affectus, vitæ spem præbet tum multæ, tum incolumis: Damnonium vovet.

Hist. 2. De Arthritide, Asciti, ejusque Remediis auspicato agnata.

Vitæ quidam ætate constanti, cum, ex mala vitæ ratione, ventriculus læderetur, coctio depravaretur, siti permolesta inextinguibilique urina pauca, & lixiviosa, corripitur. Quibus supervenit tumor primum pedis infimi, & cruris; deinde femoris, & demum abdominis; serofus, & digito cedens; Ascites scilicet. exquisitus, omnibus numeris perfectus.

Ad affectum ancipitem, & ubi primum mearcessivit, inveterascentem, quin & jam diu rationalem medicinam eludentem, extirpandum, cum in primis necessarium erat, ut humores, in lacum confluentes, vel catharsi, vel diuresi, amandarentur; tum, ut appetitum quæ exacuunt, coctionem instaurent, sanguinem corroborarent, ea exhibendo, Tumores arcerentur; per Vini scillit. 3i ss. Per extracti Eustach. 3ss. Res. jal. gr. v. (Calom. gr. xvi. ad xx. alternis vicibus adjectis) cum Syr. Domestici q. s. ut f. Pil. utriusque generis facta est Purgatio; & vespere, post utriusque vices singulas paregorici beneficio, Quies. Postea, quoniam vires ex εὐφορίᾳ consensere, Pil. vice, Bolum ex Elaterii gr. iiii. Diagrid. 5ss. Conf. Viol. 3ss. Syrup. Res. solut. q. s. deglutiit. Diuretica Chartulis seponuntur, & aliæ mediocres, in potum ordinarium modica quantitate detrahendæ, totidem ampullis infunduntur.

24. Baccar. Junip. Milleped. siccat. & Pulv. Sem. Dauci, Pul. N. M. ana 3ss. Summit. Abs. R. Zi. misce.

Catharsi crebro, & donec aqua omnis educla est, diebus primum alternis, deinde tertis, quartisve, repetita, ad alteram indicationem, ea quæ sequuntur, adhibeo.

24. Tinct. Myrrhæ (Liquore Nitri fixi prius solute; tum Spiritu Vini rectificato extractæ,) 3ii. Pul. Gent. 3ii. Macera per noctem; mane f. expressio Tinct. Stomachicæ. Dosis gutt. xx. cum Tinct. Martis totidem, & Vini Haustu, horis duabus medicinalibus Catharsi interpositus. Post Catharsin ut Digestivis sedulo insistamus, manc. Tinct. Martis. Hora ante prandium, Canarini, & Rhenani, paribus mensuris, Gentiana alterat. Haustus. Quarta pom. Bolus Chalybeatus, cum Jul. Haustu.

Quibus continenter ad menses aliquot usurpatis, & ex intermissione quadam sæpius repetitis, Eccropotico nonnunquam intercalato; quinimo crebrius sub Jove exercitationibus, liquidorum irem imminuta quantitate, debitoque Sex naturalium usu, æger appetitu, & coctione recta de novo poritur. Vires redintegrantur, cum bono corporis habitu, cum εὐχορίᾳ & εὐταρχίᾳ.

Post Hydropa fugatum, en brevi Arthritidem, dolore, tumore, pedum articulos occupante, conspicuam. Ægrum illa jam primum adoritur: Posthæc sæpiissime. Rictus sub accessum acidus, fidum usque symptoma, præcurrit, & de receptione monet.

Profecto minime dubitandum, quin Arthriticum in hujus ægrifanguine seminum, ante paroxysmum, ad tempus aliquod, detulisset; forsan etiam Hydropi, licet occulte, symbolum contulisset: Neque veri minus simile, quod a dictis alterantibus Arthritis exciretur: quodque ex ea recte se habente, anni posthæc ægro quam plurimi, per eosque sanitas obveniat.

Huc etiam addam, (rei tam lætæ infaustum absit omen) quod ex frigido viri hujus temperamento, & in serum abituro, sequitur; cum demum eum vires deficient, & ingruet senectus (& γὰρ ἔρχεται μόνον) quamvis Hydrope jam per annos plures sit immunis, nec denique succumbat illi, cavendum est. Sed, ut quam potest diutissime se defendat, Hydragogum sæpius sumat, vitam agat temperatam, coctionem, ipsam utique saluris summam, tueatur religiose, moneo & exhorror.

Demonstrat Historia (cum præcedenti) posse Arthritidem Hydropi supervenire, posse istius remediis suscitari.

Hist. 3. Podagra Asciti, per Naturæ Vires, suborta.

Dominus D. vivo & alacri vir ingenio, summæ spirituum ὀρεῖς, neque Venerem, neque Bacchum nimio plus abhorrens, ætate media, siti immodica, urinæ exigua, crurum & abdominis tumore, signis Asciten ostendentibus, afficitur. Ut affectu tam ancipiti se liberet quam celerrime, Cathartica & Diuretica præscribunt, donec humor nimius pertinaci illorum usu, exulat: itaque fauste primis diebus ægro succurritur.

Natura onere sublevata, sui que iterum arbitrii facta, aere aprico, equiratione crebra pernicipique adjuncta, rebus suis serio incumbit, & quidem bonis avibus. Brevi enim Arthritis tum primæ eluxit: Quæ semel bis stans anni temporibus recurrens, sanguine quod alienum erat expellens, eundem purum & inquinamento liberum præstabat.

Huic ego (naturæ ut succurram, & opituler) commendavi Chalybis & Amavorum Compositiones. Utramque Xerano mistam, menses quotannis plurimos, sed interpolatos, & secundum varias anni τροπὰς idoneos, usurpavit. Hinc avidius appetiit; perfectius coxit; rectius & commodius doluit.

Multos ille annos, gaudio & dolore variatos, ad usque senium, ætatem prolongavit; optimo sane cum eventu Arthriticus; Hydrope per Arthritidem, adeo posthæc immunis, ut tametsi liquidis tenuioribus plus æquo indulserat, nihil hinc tumoris, nihil Hydropi, suboriretur.

Convincit historia, (sublatis impedimentis,) vel ipsius naturæ viribus, Arthritidem Hydropi posse superaddi.

Hist. 4. De Hydrope, & per Diuresin & Abstinentiam victo: cum Arthritide, per Amara, & Chalybeata famulante.

Quidam, e regione Sancti M. poculis & otio nimium indulgendo, vitata coctione, congesto Κεκοχυία: gurgite degenerumque plenitudine, succorum cum vix ætatis medium excesserat, Hydrope corripitur. Facies illi pallida, spiritus difficilis, sitis importuna. Urina parca & lixiviosa, venter inrentus. Ut malo occurrat medicus (certe ingeniosissimus) & laborantem sublevet; primum, ab inutili libertate (ne quid gravius dicam) abstinere suadet, utpote morbi fontem quod exlicet, neque potionem ultra vult, quam ut vitæ satisfaciatur, neque aliam quam diureticam. Cinerem ideo Geniste dedit, Potui cum Abs. Rom. summit. admiscendum. Obtemperavit æger, neque plus libra, nec quidem interdum plus selibra, nycthemeri spatio, sorbillavit, per omnem abstinentiam, quam cum congiunt quotidie exhaust, nihilo magis sitienter. Urinam hinc ubertim excrevit, aliquanto forsan uberius quod indies equitavit; quod quidem exercitandi genus haud parum ad διέσπασιν conferre, pervulgatum est. Seri facta supervacui expulsionem, digestivorum ope cœpit de novo esurire, concoquere, nutrir. Cibus, ita modica portione solutus, εὐνοῖαν & μετεωρισμὸν acquirit longe perfectiorem, quam immodica cum immergeretur. Brevi post dolore pedis afficitur, & genuino more ποδάγρα, deindeque sæpiissime Natura, (quæ semper τὰ δεινὰ ποιεῖ) Hydrope liberata, & suarum rerum potita, Arthriticum miasma, clam in sanguine detentum, amolitur; idque quoties se contumacius extollere, aut cristam illud erigere conatur.

Quando mecum, de salutis statu servando, sermonem habuit, temperantiam ejus laudavi, morborum victricem, expultricem optimam, saniratis obsidem fidelissimam, & illius usum, laudando, commendavi. Quo ventriculi servem εὐταρχίαν, necnon, in senium vergente ægro, labefcentem sustineam; Auditor sum, a prandio Canarini Haustum, omniumque mane Infusamari alterantis Coch. sex cum Tinct. M. gutt. xx. bibat. Hac & ejusmodi methodo, multos ille annos vitam protrahit, Ascitico omni tumore vacuum. Qui pedum erat exinde rumor, brevi, semper Arthriticus, evanuit. Uni ille Arthritidi & abstinentiæ debuit, quod senuerat; & præter spem humanam, quod valuerat.

C A P U T V.

De Arthritide Melancholica.

Art. I. Expeditis Æquivoci Ortus Symptomaticis ad eas species, quæ sunt Univocæ, quæque materiam, cum affectu primario eandem, sed alio ritu operantem, alia γαίονενα edentem, præ se ferunt, id est, ipsam operis partem potissimam, accedo.

Harum e numero, primas obtinet Melancholica; quippe quæ, tametsi puram Arthritidem eo usque æmulerur, quo ad Symptomata, (Κεκοχυία sic dictæ,) rationem & partes sustineudas opus sit; tamen ei dissimillima est, & in ellipsi sua distat Univocarum omnium longissime.

Ut vero rem occipiam, præter istam animi depressionem, quæ, genuinæ Arthritidos symptoma, paroxysmos ejus pene omnes, & quo majores eo major, antecedit (alibi explicanda) alia est, Melancholice nomine insignita, quæ ad menses, ad annos, sæpe perducta, arthritidem, insultus recte & creberrime facientem, introducitur.

II. Melancholia, quæ Arthritidem progignit, (de latius sumpta dicere, in præsentī ἀποδιόρυσσον) duobus pendet. Quorum prius spirituum animalium a natura debilitas & renerisudo. Revera, constitutio illorum delicata, ut perceptione homines & acumine, ut ingenio & consilio præclaros reddit; sic ærumnis, sic etiam morbis subijcit. Ex eoque factum est, quod alias levi de causa in ἀνάγια illi gravissimas adigantur; quod alias humilirates, & depressiones patiantur afflictissimas; quod diutius inordinati Melancholiam ostendant non raro immedicabilem.

Ista vero illorum a natura debilitas, sæpe studiis impensioribus, otioso vitæ genere, & nimis sedentario, nonnunquam morbis, inedia, vigilia, & aliis ejusmodi sexcentis, augetur & intenditur. Atque hæc spirituum debilitas, Melancholice non inepte προηγουμένη audit.

Posterior, quicquid spiritus per se infimos (sive extra, sive in intermixtum) afficiendo, Melancholiam parit προκαταρκτικῶς.

Hujus autem ordinis sunt humores pravi & vitiosi; vermes, aliæque res permultæ, primis viis, utero, hac vel illa corporis cavitate, collectæ, animi perturbationes, & in sex non Naturalibus errata quam plurima.

III. Hisce natus originibus, affectus iste (sive *Melancholia* dicatur, sive *Morbus Hypochondriacus*, sive *Hystericus*) aliquando *Arthritidem* imitari, & ejus ritu pedibus, manibus, ægrum privare nititur. Hoc est, inimicum id, ac alienum, quod ante, (in fistula plerumque alimentaria spiritus urgendo) *Melancholiam* peperit; natura, novas agendi methodos, nova ineunte consilia, in articulos truditur, & *Arthritida* producit *Symptomaticam*.

Esse vero hanc *Arthritida* puram putam *Symptomaticam*, ipsa *Melancholice* causæ continente & proxima, generatam, satis (ut opinor,) eo constat, quod illa quoties exoritur, & ad gradum elevatur quantumcunque rata hæc & perpetua proportionem deducitur. Quia quidem re, ad exponendam istius *Arthritidis* naturam, eamque in *Symptomaticarum* numero collocandam, nihil poterit persuadere magis, vel evincere luculentius.

IV. Interea vero temporis, non est reticendum, quod hæc *Arthritidis*, præ aliis suæ tribus *Symptomaticis*, fere clementer se gerit, & junctam habet cum severitate lenitatem. Quod *Melancholicorum* sanguini, supra quam aliorum *δυσμεταβλητό*; an eorum spiritibus segniter, & in materia separanda dimittendaque otiose se gerentibus; cuicunque demum causæ debeatur: de re sic in aperto acta, tenebris sic obscurata, nullus ausim disceptare.

Sin *Melancholicos* indulgere Baccho aut Veneri (quorum alterum usitatissimum, alterum nimine novum) aut etiam ad *Arthritidem* hæreditario propendere, contigerit; itaque habitos ea multum infestari, crudelius extorqueri: Nihil inde propositioni nostræ derogabitur, neque ex eo vacillabit illius veritas. Cum ista morbi acrimonia causis peregrinis adventitiisque oriatur, nec sit hujus qua *Melancholici*.

V. Ex miti hujus *Symptomaticæ*, (& uti solet esse) nimis leni ingenio, factum esse censeo, quod ea qui tenentur, in antiquum statum redeunt, *Melancholia*, cum cito recidiva, tum magnopere sævienti, creberrime conflantur. In ea videlicet delenda perimendaque, non multum facit *Arthritis* tam ignava, tam languens, tam socors vix sublevando affectui primario, nedum auferendo, par.

Ut *Symptomatica* hujus diagnosis apertius intellecta planius exponatur, de conditione pristina, de morbis ægri veteribus exquirendum. Quæ per se difficulter, ex hac indagine palam & facillime dignoscatur: e. gr. si æger diu melancholia, demum arthritide, laboraverit; & hac quo magis, eo remissius illa, maxime, si hoc iterum sæpiusque comparuerit; quin *Arthritis* ista sit *Melancholice*, nihil (ut existimo) dubitandum.

VI. *Melancholice Essentialis*, sive delirii cum tristitia, metu, &c. in *Arthritidem* migrantis, therapia, nondum usu confirmata, unicum enim morbi istius exemplum adhuc notavi, (idque imperfectum, & omne genus medicinam respuens) nobis hoc tempore prætermittenda est. *Arthritide*, Morbi *Hypochondriaci* sive *Hysterici*, sobole, cum affectorum vis abundat, ejus curatio paucis explicanda.

In hujus *Symptomaticæ* prophylaxi (nam in paroxysmo ejus, ultra quam veræ & genuinæ sanando, nihil habeo quod dicam) maxime juvabit alienum id ac inimicum, quod, in primis viis, (antequam sanguinem ingreditur,) morbi causa extat *Hypochondriaci*, sed e sanguine expulsum, & articulis suffusum, paroxysmum facit *Arthriticum* amandare, dimovere, amoliri; tum, ejus incremento, & regenerationi obviare; posteaque, depressos spiritus, medicamentis ex proposito datis, directe allevare, languentes suscitare, & erigere; itaque morbo huic universo, (qua primario, qua secundo) simul semelque occurrere.

Atque hunc in finem impedimenta, siqua fuerint in coctionis *Εργασίῳ* (nulla vero non esse maxime probabile est, primo quoque tempore, per catharsin, (alteram, vel utranque) tollere, ad *εἰς τέρη* depurganda, aliud *Stomachicum* (Pil. puta *Stomach. cum G. Dec. Amarum purgans*, vel *Aquas Purgantes*) seligere; ad inimicum, in sanguine contentum, foras eliminandum, aquas haurire diureticas; cum iis, *Alcohol Martis*, semel bis die, deglutire; omni hebdomada, ventrem movere; menses binos, his insistere; ad annos aliquot, repetere; cavendo alvi tarditatem, ex *Marte*; febrem, & *Arthritidis* paroxysmum.

VII. Ut horum nonnulla fusius edisseram; profecto tanti est, in hoc affectu, ventrem (ut dixi) crebro movere: & ab *Απεψίας* reliquiis immunem præstare, ut, veleo solo, *Aquis præcipue purgantibus*, *Tartaro Laxanti*, & *Manna* peracto, (*Arthriticum* ex *Melancholia* non unum, egregie salutis prospexisse, noverim. Tempori proturbatur id, quod illico spiritus, ventriculi & intestinorum fibras incoherentes,) adoriendo, mororem affert *Hypochondriacum*; vel, in articulos effusum, *Podagræ* paroxysmum.

Cum primis autem prodest hujusmodi affectis antedicta *Solutio*, quod blande alvum, quod leniter, quodque certissime, subducatur; iis, qua *Melancholicis*, qua *Arthriticis*, (neutro enim nomine, fortiora, & *δραστικώτερα* convenient) aptissime.

Sed nec *Aquarum Diureticarum* vim (quales sunt *Bathoniensis*, *Astropensis*, *Bamptonensis*, aliæque pernultæ) adversus hunc affectum, satis prædicare valeo; vel, ut decet, laudem illis deferre. Coctionem illæ conciliant, digestionem: illæ confirmant: illæ sanguinem expurgant: illæ spiritus permulcent: illæ *Melancholicis*, & *Hystericis*, solatio: illæ *Arthriticis* incolumitati.

Quibus nulla suppetit *Diureticorum* copia, usui sit *fusum Theæ*, aqua pluvia comparatum, a *ιββ.* ad *j.* bis die, potum. Nam per renes sanguinem, modo diu satis usurpetur, eluit; &, ad *Vapores* (qui dicuntur) relevandos, ad *Hypochondriacos* flatus sopiendos, confert mirifice.

Quæ per tot sæcula *Melancholicorum* medicina fuit, e *chalybe præparata*, ea quidem, ex *Melancholia* sive *Hypochondriaca* sive *Hysterica* *πυρρῶς*, potiori jure convenit: modo præmissa catharsi, artificiose selecta, & dosi & methodo rectis, adhibeatur. Spiritus enim animales incitat, exaltatque; in radios vibrat acutissimos, *εὐεργετικῶς*, tum etiam, miasma *Arthriticum*, (modo exigua dosi fuerit exhibitum) blande ad *πῆξιν* emittit; &, in partes internas neu relabatur; spiritus animales neu obscuret; tenebrasque iis offendar, efficacissime operatur.

Quibus autem nec *Aquæ*, nec in forma sicca *Ferrum*, mederi poterit. Eos interdum adjuvat *decoctum Corticis*, simplex, vel (pro re nata) *Chalybeatum* roborat ventriculum *εὐπερίστα* insert; &, ad spiritus stabiliendos (quod *Hypochondriacis*, & *Hystericis*, lucrum pergrande,) summorum virium & momenti est. Multum

valet, hac in parte, simplex; propter id, quod habet cardiaci & nervis propitii: multo vero magis armatum; medicamentum, si quod unquam, *Πολύχρηστον*.

Sed nec omittendum, quod aliquando cerevisia, utut defæcata, tantas ventriculo parit cruditates, in *Arthritidis* materiam postmodum abeunt; ut, una hac objecta, &, *Aqua fontana* cum vini paulillo; vel, e *Sarsa*, *China*, &c. *Decocto*; vel *infuso Theæ*, cum lacte vaccino, in ejus locum suffecto, ægris exinde melius successerit.

Hist. 1. De Arthritide, Melancholice diuturnæ succrescenti.

Clarissimus D. erectiori vir ingenio, in Medicis ævi celeberrimis, (antecefforem, hac in urbe, compotem, & sanum, utinam æquis passibus sequi daretur;) *Melancholia* sensim obrepente, ætatis flore, exiit de potestate. In hujus morbi genium, & morem, ut diligenter inquirerem, & de eo curiæ renunciarem, prænobilis *Eveshamii* magni *Angliæ* Cancellarii (cui apud nos, hujusmodi affectorum, a Rege cura est commissa) per literas mandato, Dec. 18. 1697. laborantem visitavi.

Fuit ille (liceat tanti viri memoriæ, tamque literati infortunio, paulisper immorari,) tum temporis septuagenarius: vultu constanti, & augusto: capite orbiculato, neque, si corpus spectamus, aut ingenium, magno: voce suavi, & canora: gestu corporis decoro.

Veterum doctrinam, ut erat *παλαιότροπος* excusserat; ad medicinam conversus, eam de proprio ditaverat. Primus enim *Respirationis usum* primarium detexit; detectum, contra præclarum impugnantem, pertinacissime defendit; acutissime vindicavit. Nemo unquam Medicus illustrior, neu qui arti plus tribuerat.

Nonnullorum vitia, me audiente, leviter & quidem argute perstrinxit; at viros sapientia, nobilitate, virtute præcellentes digne prosecutus est. Clarissimi *Bigodi* sagacitatem, & in diagnosticis peritiam; *Davei* lenem, at solers ingenium; *Dikei* literas, & acumen admirabile; singularem *Entii*, nuper adversarii, semper amici, humanitatem & doctrinam, elegantem, variam, paratam; nobilissimi *Courtenæi* (quanti vero, & quam magnifici viri!) celsum & sublimem animum, stemmati suo, quod est regale, parem, multis laudibus efferebat. Sed omnium maxime *Cantabrigiam*, alma materem, *Athenas* hujus regni alteras, pie grateque, *λόγοις ὑψίστοις*, prædicavit. Quin &, agnovit filium, mater.

Hæc cum, a quoquam proferri, aliquis audiverit; Annon, eum, animi summa rectitudine, judicio acri & perfecto, aliisque plurimis virtutibus, plane invidendis, insignitum existimaverit. Ita profecto fuit; jam alia res est. Quæ protulimus, ea præbuerunt *Lucida* (sic appellantur) intervalla; tum rata, tum brevia, densissimis nubi- bus, & interdum animi concitationibus (tanquam fulgore, & tonitru) discreta. Audivimus *Ακρόμαται*, summo dignissima Philosopho, quæ sunt iis maxime contraria, simul & semel coram dicentem. Pigit, doluit eruditionis optimæ reconditissimæque fragmenta, (tanquam *Sybillicæ* folia, vento agitata,) cum astricis, numero soluta; cum latinis, Græca; cum physicis, Ethica; cum veteribus nova; cum profanis, sacra, misceri, perturbari, confundi. Nullibi gentium tot tantarumque disciplinarum chaos. Dii vestram fidem! Quam pusilla res homo, vel literatus. Dudum ille noster temporis volumina præsentis præteritque, & in eoquæ sunt omnia, dudum ille terram, cælum, sidera, vasta universi sistemata, spatia pene infinita, animo est complexus; hodie, ne sui quidem compos.

In causis hujus affectionis, primum ponenda est, tanquam *προηγμένη*, ad eam a natura diathesis, quam utique perspicere phylognomon, & animus commoveri aptus. His adjici oportebit cœlibatum, sive nimiam castitatem. Tum, in procatasticis, casu e plaustro, cranium, annis olim puerilibus, læsum: (nudato capite cicatricem aperuit.) Deinde, studia nimium flagrantia. Post, *Decoctum Coffeæ*, plus satis potum. Ad extremum, animi perturbationem, spei frustrationem.

Causæ tantarum virium evidentes, antecedentem a natura cœptam, malisque moribus adauctam irritantes, morbum peperere, per se magnum, sed tempore qui roboratus, medicinam respuere, curationis spem excludere, cerneretur.

Quod vero ad rem nostram maxime pertinet, digitorum articulos ostentavit, tumefactos, inflammatos; *Chiragra*, multos annos, per intervalla, sed languenti, neque satis importuna, tactos. Procul omni dubio, si plus *Articulis*, capite minus ægrotasset. Fuit tamen, gravi & diuturnæ *Melancholice*, *Arthritidem* suboriri posse, quod abunde comprobaret.

Hist. 2. De Morione, Melancholia Hypochondriaca, & Arthritide interempto.

Sunt qui morbum *Hypochondriacum*, uti etiam *Arthritida*, sapientia solum professores, ingenii dotibus præcellentes, infestare, iisque, tanquam ad tanti muneris temperamentum, sortito dari confirmarunt. Eorum opinionem, *ἢ τὸ πολὺ* probabilem, a perpetua veritate longe abhorre, constat. Habet *Damnionia*, quod perpetuitatem perimit. Novi egomet haud ita pridem (attendite Philosophi!) *Morionem*, multos annos flatu, *βροβερυμῶς*, aliisque *Melancholice* sexcentis *Hypochondriacæ* symptomatibus, demum etiam (ætate propemodum affecta,) *Arthritide* conflictatum, adeoque graviter (ne de acrimonia quæstio sit,) ut ætate constanti diem obiret supremum, his affectionibus interemptus.

Hist. 3. De Arthritide Hypochondriaca, Purgantibus præoccupata.

Veteri quidam amicitia mihi conjunctissimus, post homines natos maxime *Melancholicus*; mali accessiones alias ab animi pathematis, alias a cibo crassiori, *δυσπείπτῳ*, vel potu immoderato; hæc carnis æstu notabili, illas algore; hæc pulsu tum majori tum crebriori, illas raro & humili: utrasque spirituum mira dejectione *Μακροψυχία* non vulgari, ejulatu miserabili signata; habuit. Sub ingressum senectutis, *Arthritide* tenebatur: ea, quæ *Melancholiam* perturbationibus procreatam, ne semel quidem excipit;

cēpit; alteram autem (id est, intemperantiæ sobolem) frequenter. Raro cuivis unquam mortalium fortunatius cessit dolore. Nubes illa supercilii dissipatur; spiritus se expandunt; ut materiam, in primis viis congestam, (*Hypochondriaci* causam mali continentem) in artus ejici liqueret. Ad eam initio præcidendam, & utrumque morbum anteverendum, *Aquis purgantibus*, (*Sale Cathartico*, & *Tartaro Laxanti* additis, interanea purgavit. Usum purgationis creberrimum suadebat utilitas.

Cum, *Arthritidos* cippo forte detentum, ad diem statum iter conficere, voluit professio, partibus tumefactis, & dolentibus. Hirudines admove, sicque causam mali conjunctam evocari, jubeo. In re arctissima, summæque necessitatis, hoc artificii valuisse, certo certius est compertum.

Hist. 4. De Morbo Hypochondriaco, cum Arthritide agnata, Aquis Astropensibus subactis.

Nobilis quidam apud *Dobunos*, affectione *Hypochondriaca*, ventriculi inflatione permolesta, cogitatione inquieta, spirituum tremore, confusione crebra, & ex illa sudore, cum repentino, tum vero abundanti & profuso, diu afflictatus, ætate provectior, *Arthritide* correptus est, quam in *Melancholicis* observari solet, sæviori, longeque immaniori, quippe paroxysmos puræ & genuinæ κατὰ λέγον, quæ profuderit.

Cum eos secuta erat singulos, primis statim diebus, animi protenus sudum & serenum, *Hypochondriaci* affectus intervallum; materiam ejus productricem, & primis viis inhærere solitam extrorsum pelli, omnino cogitandum erat.

Contra par malorum δύσπορον & δύσκολον, ut duos simul liniam parietes, nihil antiquius judicavi, quam dyspepsiam, quæ utriusque fundamentum erat, pro mea parte, corrigere; tum simul, alienum & factiosum id, quod *Arthritidis* causa est conjuncta, foras eliminare. Quocirca alvo, *Pil. de succino Crat. Si. Tart. Qu. ʒss. Res. scam. gr. iv. & Aq. Astrop. ʒi. hora post ingestis*, prius subducta, iterumque septimo quoque die soluta, aquas haurit *Astropenses*, diebus oriosis, ad ʒi. ad dies sexaginta.

Ut Πέψις emendetur; dum *Martiatum* aliquid præcipio, (quod ægri res volebat, non nolebant aquæ parum *Ferratæ*) ipse decipior. Tanta ægro sive ιδιοσυγκρασία, sive spirituum teneritudo, atque minerale istud digerendum nescio quæ impotentia; ut ex eo, tamen modica quantitate sumpto, statim inciderit in diarrhœam, animi depressione, spirituum dejectione mira, stipatam.

Aquas autem *Astropenses*, blandas, præcellentes, benignas, tum *Hypochondriacis*, tum *Arthriticis*, & tenerrimis plerisque omnibus convenientes, omni ætate, (magnum ad beatam vitam præsidium nactus,) per annos quam plurimos repetit; earumque beneficio & tutela, senectutem (uti audio) lætam, & desiderabilem, adipiscitur.

Hist. 5. De Gonagra miti, Hysterica, Chalybe &c. concitata.

Placet, *Arthritidem* minutulam, & (uti videtur) artificiosam, memoriz committere. Mulier lætissima, cum primis delicata, fragili constitutione, patre orta *Arthritico*, nondum ætate media, ἐν τοῖς γυναικείοις bene habens, ἀπορῆξις καὶ δυσπεψία gravi diutinaque *Melancholia*, spirituum insolita depressione affligitur. Horum omnium causa esse videbatur materia quædam mali moris, ventriculū aggravans, & per œsophagum linguam omni mane feriens. His ut occurratur, purgato primum hac illac corpore, *Amaræ Chalybeata* cum levi subinde ecoprotico per menses aliquot usurpavit. Ex horum usu symptomata profliguntur ad unum omnia. Esurire, cibare, lætari, missis tristitia & metu in mare *Creticum*. Genu tantummodo alterum, debilitate, & dolore acri pungente, sed tolerabili continenter impeditum; ut e sella assurgendo, gradus scallares, vel acclive quodvis, ascendendo, vix fit. Erecta firmo stetit talo. Mitissimus hic affectus erat, neque rubore, neque tumore insignitus, qui tamen ἑδος *Arthriticum* præ se tulit: lanceis partem affectam involvi jubeo: calide vestiri: & *Melancholia* si recruduerit, cum *Amaris* iterari *Chalybeata*. Morbi istius hæcæ reliquias percepit; hosce fructus, quod (*Arthriticorum* more) ex paroxysmo vegetior, quod alacrior, evasit, & diu perseveravit.

Hist. 6. De Arthritide Hysterica.

Nobilis Matrona, molli & præter cæteras delicato habitu, *Hysterica*, blande nimium misericors (ut omnia fere omnium infortunia deplorans, & alieno mærore mærens,) decies enixa, annis procedens, sine causa ulla evidenti, cœpit macrescere, & languere, potius quam ægorare. Hoc a familiaribus in malis positum, in lethalis alicujus chronici prognosticis: At in bonum, omni spe votoque majus, aliquanto post mutatur. Dolet, tumet, rubet pedis articulus ex *Pedagra*. Corpus ortu persanum, ab omni labe hæreditaria, quantum inaudiverim, immune, tot partibus, aliasque τοῖς Γυναικείοις expurgatum, taliter occupari, profecto demiratus sum. Mali vero causa tanto sufflamine major. *Arthritidem* boniesse ominis, & in ægræ commodum cessuram, existimavi. Hospitem grate, & benigne, (suo more) accipiat, hortor: calefaciat, vestiatur, &c. ut in *Arthritide Primigenia*.

Paroxysmi re absoluta, ad ea, quæ tum morbum *Hystericum*, tum *Arthritida* prævertant, speciatim ad *Digestiva*, propero: *Præmissio* (e *Pil. Stomach. cum G. ʒss. Scam. pul. gr. viii. Ok. Cin. ch. gutt. i. El. propr. q. s.*) *Lenienti*; cui vespere, loco *Narcotici*, ægre admodum inimici (quippe spiritus deprimere, & nimio plus pessundare, solebat,) *Bolus*, e *Pul. Cantian. ʒss. Conf. Anthus ʒi. Syr. Melissoph. q. s.* sufficitur cum *Jul. Haustu Hysterici deglutendus*. Tum, ad roborandos alendosque spiritus, *Decocti Corticis Martiatum* haustum, horis duabus medicinalibus, in mensem usurpandum, & *Theæ infusum* (quod, ad eos permulcendos, & vapores sopiendos, ex ulu diuturno, commodissimum experta est; quodque sanguinem per renes expurgare aptum,) in dies singulos, præcepi. Partim medicamentis, partim *Arthritide*, blanda & perbeata, fideliter recurrente factum est; quod, per hosce dies sexagenaria, εὐχρηστος, & εὐσχετος conspiciatur; ex *Arthritide*, jam vetula, melior. Nos enim pedum tumores (an arthriticos, an hydropicos?) hodie molle fert, cætera bene habere.

Hist. 7. De Arthritide Melancholica, cum ventriculi, &c. Affectione, per Arthritidem levata.

Quidam mediæ ætatis, ad *Isca* ostium, *Melancholicus*, ventriculi distentione, βαρυσφυμοῖς aggravatus, flatu emisso sublevatus, appetitum pronuper intercidi, ventriculum mane moveri, & biliosum ejicere, respirationem impediri, carnem absumi, conqueritur. Hisce postea supervenit dextri coxendicis dolor, qui ad genu brevi se transfert, ibique tumori locum facit, pallido, frigido, seroso. Ab hoc tempore ventriculo, & iis quæ intus sunt, melius, imo μὲν ὑγία, quam miserabilem, & degenerem, æger subjerat, ab *Arthritidis* conspectu, minuitur. Eatenus *Melancholia* sanatio *Arthritidis*; eoque magis, quod supra quam in *Arthritide* frigida, supra quam in *Melancholicis*, solet fieri, extumescit.

Ego, naturæ famulari contentus, & rerum ejus promovendarum satagens, in *Arthritide* firmanda, medicos adhibeo conatus, quantos possum maximos. Primas ergo vias leniente subtraho; vespere, post purgationem (quo humor extra propellatur) *Bolum*, e *pul. Cant. Ther. Androm. & Syr. Pap. Errat. cum Haustu parum Diacodiato, sumi præcipio*. Dein, eodem, *Pul. Rad. Ari. C. & ʒ. Alchol. Martis ʒss. cum Jul. Haustu, bis die per mensem, cavendo alvum obduratam. Panno Wallico, Aqua Reg. Hung. & sp. Lavendulæ consperso, vestiatur pars affecta. Cane pejus & angue, vitentur rebellentia*. Horum ope remediorum, æger auspiciato Πόδαγχα; animo nempe alacri, sanis visceribus, & ob *Podagram* tutioribus.

C A P U T V I.

De Arthritide Fixa Scorbutica.

Arr. I. *Melancholia* proxima est *Arthritide* ea, quæ *Scorbutum* excipit, sed longo proxima intervallo; quippe *Primigenia* similitudinem quæ multo plenius apertiusque referat, ad eamque multo propius accedat: morbus certe, apud nos, ingenio & natura valde peculiari; quique evolvatur, & diligenter explicetur, aptissimus. Ut de illo dicam enucleate, & dilucide, de ipso *Scorbuto*, ex quo emanat, prius dicendum est.

De *Scorbuto* ea, quæ ab *Eugaleo*, aliis ejus fere affectis, dedita opera produntur literis, vel omnino prætermittam, vel leviter tangam: & illa potius (ex scripti hujus instituto) quæ nostræ ditionis sunt, & in hac regione mali istius in *Arthritida* metamorphosin patesciunt, studiose persequar.

II. Anni sunt haud ita multi, cum apud *Damnonios* (quod, a senioribus indigenis, iisque fide dignissimis, & in medicina diu multumque exercitatis, accepi,) *Scorbutus* sic grassabatur, ut per illos artem qui *Exomæ* (nobiles sane) Medici factitarunt, in hujus unius morbi curatione, quod præscriptis passim ageratis testatum fecerunt, non parum occuparentur; & grandiores hodie nihil æque ac *Scorbutum* crepent. At diebus hisce nostris rarius observatur hic affectus, & tantummodo σπανίως. Cujus quidem mutationis ratio, suo statim loco, declarabitur.

Sed nec qui nunc dierum est *Scorbutus*, illi qui vicinos *Belgas* (populares meos) imbuat, id est, genuino, & vulgari, per omnia consimilis invenitur. Cum agri *Somersetensis*, uliginosi magnam partem, & depressi, (aerem crassum & humidum trahentes incolæ, maculis subnigris, ulceribus malignis, crurum dolore, respiratione difficili, lassitudine spontanea, nervorum debilitate, hydrope, gangræna, & istiusmodi aliis) *Scorbuti* exquisiti signis, creberrime divexantur. Quæ apud *Damnonium*, tractum inæqualem, siccum, optime ventilatum, aere subtiliori puriorique gaudentem, neque stagnis inquinatum, raro visuntur.

III. Qui vero *Damnoniorum* est *Scorbutus*, in imo ventre βαρυσφυμοῖς habet, præcordiorum inflationes, ructus, oris vitia quamplurima, gingivarum scil. tumores spongiosos, sanguinem vel levi suctione, vel alia quavis facili de causa emittentes, interdum etiam Ἐπιδιδά; dentes sæpenumero laxos; vacillantes, cariosos; & primores, ipsa nonnunquam adolescentia seu deciduos, seu exesos; salivam acrem, fœtam, pariterque copiosam; anhelitus fœtorem, (putredinis indicium) ut rectissime morbus iste Σπομμάκη audiat. In cute maculas, sæpe rubicundas, interdum flammatas; parvas identidem, & rotundas, aliquando majores; papulas item densas, scabras, asperas, irritabiles, cum margine purpureo, catervatim, in cubito præsertim orientes; quæ ad eminentiam & contractum quandoque notabilem elatæ, & demum exsiccata, squammulas emittunt, tenues, subalbicantes, furfuraceas; quibus deciditibus locus apparet ruber & inflammatus. His adde pruritus, isti fidem eruptioni comitem, & partium affectarum ætium, ab unguum vulnuculis impenissimè urgentem: volas porro aridas, æstuentes, duras, sæpe etiam callosas, contra diapnoen oclusas, nec ullo eam labore admittentes. Quibus adjici oportebit crurum tumore admodum insignem, maxima ex parte calidum, & acri sero exsudante prurientem.

Ista præcipue notæ sunt indicia *Scorbuti* per hosce tractus hodie serpentis, & *Arthritidi* alludentis. Neque *Scorbuticum*, nisi tali fere modo affectum, pedibus unquam hic loci dolere recolo: Ut calido unice *Scorbuto* (cujus ista signa sunt Διλωτικὰ) hac in regione suppullulet *Arthritis*.

IV. Utrum hujus *Scorbuti*, scil. *Calidi*, sit ubique sui generis materia, sive innata, sive adventitia, quæ causæ continentis obeat negotium, & dicta pariat symptomata; sic, ut ex ea sola pendeat morbi hujus ratio Αἰτιολογία. An interdum modo hoc fiat, & in hac affectione præcipue malo alicui contagioso secundaria: sed alias ea vitiozæ sanguinis ζύμωσις (quod doctissimis quibusdam placere constat) ascribenda: Tametsi præsto sunt, momenti ponderisque haud exigui, quæ prius suadent argumenta; cum in utranque partem disputari possit, nec id agatur hoc tempore; in medio relinquam.

Audacter autem, opinor, affirmare possum, non ab cæli solique sive siccitate, sive humiditate, sive alia qualicunque facultate, nec ab ullo in *Sex non naturalibus* errore, suos ignes, suas flammæ, *Scorbutum* hunc nostrum, proxime, & omnino omnes recipere; Verum ab alia potius causa, in obscuro posita, paucis observata, & ab alio fonte, derivare.

V. Hoc ut innotescat, advertendum est, quod, ante centenos hosce annos, (ex esu piscium, uti verisimile, nimio insulforum,) *Damno-*

Damnonio lepra quam atrocissime grassaretur, & in populum sæviret, forsitan non minus, quam in *Judea* olim, endemia.

Utrum ob eam templum illud extrueretur, quod e veterum monumentis, optima fide auctor, nobilissimus *Careus*, in *Cornubia* per-lustrata, tradidit, Anno Mundi 3172. a *Cunedago* ibi fuisse positum, & Apollini (medicinæ inventori & præfidi) sacratum; etsi ita esse non improbabile videatur; res est antiquitate nimio plus obscurata, quam de qua decernam, aut disceptem absolute.

Certo vero certius est, quod ante sæculum *Nosocomia*, quibus ab integris secluderentur corrupti, tam hac nostra *Exonia*, quam alibi per universam usquequaque *Damnoniam*, incolarum pietate condita, extiterant quamplurima; Quæ quidem eorum frequentia tum morbi crebritatem, tum item acrimoniam, abunde monstrat.

VI. *Lepra* ista, quæ, ut clariss. denunciat *Careus*, circa sæculi novissime lapsi initia populum miserrime laceffivit; dum ætas labitur, & dies diem docet; partim ex salis communis usu, partim etiam tabacci (quorum ille optimum, modica quantitate, receptissimumque condimentum, sanguinem tuetur, putredinem arcet: Hoc autem, vulgi delictum, sive ore masticatum, sive tubo haustum, salivam movet, putres evocat humores,) cicurata, pertinax illud *πὸ Ἀγέως* adeo deposuit; ut sæculo superiori circiter medio, in *Scorbutum* degenerasse, comperiretur, antecessoribus nostris facefentem negotium.

Verum, ex quo *Damnonii* remediis prædictis *Pomaceum* addiderunt, & usitate potarunt; morbi istius vis & ferocia tam magnopere subigitur, ut hodie, quam olim, multo rarior, sicut etiam multo mitior, observatur: Ita nempe, contra *Scorbutum* mali moris, contra inveteratum *ferinum*, & in plerisque hæreditarium, id est, crudelem, magnum, & difficilem, egregie valuit pomorum succus.

Atque hujus fere generis & profapix est, qui his temporibus in *Damnonio* *Scorbutus* se exercet. Hinc illæ frequentes papulæ; cutis ille pruritus intolerabilis; color ille flammeus, fervor importunus; exanthemata; lichenæ; squammulæ; veteris scilicet lepræ reliquiæ; ignis nondum penitus extincti scintillulæ.

VII. Prius vero, quam de *Scorbuti* hujus in *Arthritida* migratione & excursionem verba facere occepero; de ipsa *Arthritide* pauca proponere, & a se ut discedat illa, notare, necessum habeo: prius, illa *Arthritidos* in vagam & fixam distinctio recolenda, & morbo præsentī accommodanda.

Arthritis vaga *Scorbutica*, *Westphalorum* & *Guelderorum* morbus endemius, qui tum adolescentum, tum adultorum lumbos, dorsum, artus, vicissim occupare & multum infestare solita est; uti locum hoc in tractu talis, qualis passim ab auctoribus depingitur, quod nunquam sciam, nullum acquisivit; ita nec hoc in scripto requirit ullum.

Et quamvis aliquando *Scorbutus* iste noster, *Vagam* eam *Arthritidem*, quæ nobis observetur, æmulari videatur; tamen frequentius, & quidem præcipue, *Fixam Arthritidem* imitari gessit; & quoties corpus (vel a natura, vel malis moribus, & vitæ ratione perperam ordinata) appositum, ad tempus aliquod affixit, nono vel decimo plerumque lustro, pedum (maxime) articulos invadit, dolorem infert; tumorem, cum ardore, aliisque *Podagræ* calidioris symptomatibus. Ex intervallis paroxysmos iterat, genuinæ instar; sique una demas *Scorbuti* indicia, *Genuina* existimetur.

VIII. Nec cui mirum illud existimandum, quando in utroque patet affectu (tam nempe *Scorbuto*, quam *Arthritide*,) partes, primum easdem obtinere causas remotiores, (victum, utputa, salum, & crassum,) tum etiam *ἀναιμία*; dein acre aliquid, aut saltem alienum in sanguine, eumque valde inquinans, & corruppens, tum habere *Scorbutum*, tum *Arthritida*, postremo, naturam utrobique grave aliquid eliminare & expellere conari; hic, per glandulas extremitatum articulares, unde paroxysmus *Arthriticus*; illic, per salivarios, & cutis *Miliares*, unde prædicta, & cutis, & oris symptomata.

Scorbutum autem adeo (sive causas, sive materiam, sive ipsam morbi rationem, & symptomata maxime fida & constantia, spectemus,) *Arthritidi* persimilem, eam etiam *πὸ τῷ Παροξυσμῷ* æmulari & referre, ut observatu facile, sic neque intellectu difficile.

IX. Mitiores autem paroxysmos habet hæc *Arthritis*, (ut illius aliquam diagnosin expromam) quam vel exquisita & calida, vel lvi secundaria, neque dolore tam acerbo conjunctos: lenitatem explet diuturnitas.

Ut vero pressius dicam, hujus *Arthritidis* omnium maxime proprium est, quod affectus primigenii non pauca symptomata constanter retineat; ita, ut ex *Scorbuto* *Arthriticus*, scabie, maculis, gingivarum vitis, renitente licet medicina, & exevate paroxysmo, adhuc infici, (tametsi minus forte, quam ante natam *Arthritidem*,) aspiciamus.

Hoc autem in iis potissimum teneri arbitror, qui ex *Scorbuto* cæteri, confirmatoque *Παροξυσμῷ*; nam, a recenti & evidenti causa fuscitato, & ad dicta usque symptomata evecto, qui laborant, (uti posthac exemplo patefiet) iis nonnunquam aliter obtingat, & durante *Arthritidis* paroxysmo *Scorbuti* lateant istius symptomata.

X. Quomodo vero *Calidus* unice *Scorbutus* (quod supra comprehensum est) *Arthritidi* gignendæ sufficere videatur; nec a frigido vel semel ortam memoria tennerim; huic respondet, quod ea, calido quæ suboritur, *Arthritis* semper reperitur *Calida*, *τὸ Πατρὸς πὸ Πατρὸς*.

Sed nec omittendum est, quod, uti *Scorbutum*, huic *Arthritidi* primarius, in eo potissime versatur, ut inepti aliquid per glandulas exterminet cuticulares; & *Arthritis* ei secundaria, per articulares; ita, tam huic, quam illi, obsunt repellentia: quippe quoniam humoris ad *τὸ ἔξω* amandationem relegationemque a natura designatam, utilem profecto, caram, & vitæ cum primis necessariam, derepente interrumpunt & internarum partium mala gravissima, sæpe ipsam mortem inducunt.

XI. in paroxysmo, (quæ medendi optima *Intentio*) materia articulis impacta, blande foras elicienda; quem in finem extrinsecus imponatur tumori lene quoddam attrahens; quare videlicet *Ceratum illud viride* ex quo sunt petasothecæ; vel *Brassicæ Folium*, fibris crassioribus purgatum, & ad mollitionem contusum. Tumori post noctem, (modo calide, quod juvat, artus involvantur laqueis)

adhærere solet vapor, per invisibilia foramina emissus, & in rorem condensatus. Ab ejus usu dies aliquot producto, doloris sedatio tum fida, tum etiam tuta, subsequitur. Quæ quidem artificiosa *Διαπνοή*, ea forsitan de causa magis liberalis, quod materia per habitum corporis sua natura pronior, & aptior sit, quæ expellatur.

Quinimo, per totum paroxysmum magnopere caveant ægroti, ne materia, protenus eliminanda, retro agatur; quod ob eorum sanguinem (quod veresimile,) vitiosum, & conragio *Scorbutico* corruptum, raro (uti liquet) his humoribus, *Arthritide* detentis, impunis error; sæpe etiam lethalis.

Sin pravo externorum usu, aliave quavis de causa, materiam jam fugentem, quasi clausis foribus repelli, vel sisti obtigerit; ad fores quam primum aperiendas, eam & extra evocandam, aut in balneum pedes calidissimum immergantur, aut fotu imbuantur, aut articulo dudum affecto, vel proxime illui, applicetur epispasticum, vel cucurbitula: Er, interea temporis, ut ab interioribus extrudatur humor *Arthriticus*, cardiacum aliquid e *Pul. Cantian.* *Lapide Goano.* *theriaca Androm.* *Elect. ex Ovo.* vel *Sp. C. C. Succinat. gutt.* aliquot cum idoneo vehiculo, ægro stragulis cooperto detur, & prout opus fuerit, repetatur.

XII. Extra paroxysmum, evacuantibus materiā peccans e corpore *κατ' Ἐπιτροπὴν* amandetur; alterantibus corrigatur; digestivis illius augmentum, & regerminatio, inhibeatur. Hæc e diversis classibus selecta, in ordines, sive series, ut artis est, pro ægri constitutione, malique more, formari, pro annique tempestate variari, oportebit.

Ad domandam morbi hujus malitiam, maximopere valet *Mercurius*; cujus præparata mitiora, (id est, *Calomelas*, & *Mercurius præcipitatus albus*) causam ejus continentem impetendo aggrediuntur, & per aliud aliudve excerniculum, pro ipsius quantitate, & ægri corpore vel ad purgationem, vel ptyalismum, ad *Διέσπιν*, vel *Διαφύσιν* proclivi, eliminant exterminantque. Et tametsi hujus ea materię ferocia, quæ vel ptyalismo laudabili diutinoque non ex toto ubique cedat, & se se submittat; (nam post diutinum, & ex omni parte laudabilem, nonnunquam recrudescere hunc affectum in propatulo est) ex hoc remedio, alienum illud acre, morbi materiam continentem, quam maxime obtundi; sanguinem eximie purgari, morbum quam plurimum mitigari, constat. Quare si ætas, vires, cæteraque quæ sunt ægri, annuerint, nihilque repugnaverit, ptyalismum lenem, sed prolixum (ut tempore lenitudo expleatur) fieri suaderem.

Ubi ptyalismo, vel ægri moribus vel animo, *πὸς ἑα ἑμὴν*, nihil loci superfuerit, sequentem methodum ingredior. Vere & autumno, (facta prius in plethoricis venæ sectione) proderit, *Per Calomel. sera nocte. Pil. Eustach. & Ref. Jal. mane seq. quinto, vel sexto quoque die ad tres vel quatuor vices, vel, per Salem Catharticum, Manna, & Tartarum lux. Aq. hordeat. solutum, diebus alternis tertiusve, ad sex vel octo vices, purgare: Neque Medicinam interturbet Articularis, si oriatur, Dolor; quin pertinaci potius Purgatione sæpiusque iterata vincatur.*

Deinde *Antiscorbutica*, quæ dicuntur, cum *Antiarthriticis* maritata, usus erunt eximii. Sumat æger, omni mane, post dictam purgationem, *Infusi* seq. haustum.

24. Summit. Trifol. fibrini sicc. pug. ii. Anthus p. i. funde in Aquæ font. fervescat q. s. ad Alterationem modicam, Colatura ʒiii. adde Salis Martis gr. iiii. Tinct. Aurant. gutt. xx. Sp. Menthe Haustus. Quarta pomerid. Pulverem, vel Pilulas deglutiat.

24. Pul. Fol. Theæ sicc. ʒss. Salis M. gr. iij. Pul. N. M. gr. v. Sacch. albiss. gr. xv. f. Pul. vel cum Syr. Melissoph. Bolus, vel 24. Conf. Flor. Salvie, Æthiopis Min. ana ʒj. Syr. Garyoph. q. s. f. Bolus.

24. Cerussæ Antim. ʒi. cum Extr. Gent. f. Pil. vel 24. Pul. Zedoar. ʒss. Alcohol. Martis gr. viii. vel x. cum Extr. Gent. f. Pil.

Hic singulis Vehiculum sit Julapii, vel Infusi, Haustus. 24. Aq. Ulmarie, Fol. Ari. & Succis ana ʒv. Sp. Juniperi ʒii. Marg. pp. ʒss. Sacch. q. s. f. Jul. vel ex Summit. Salvie tenuifol. & Aq. font. comparatur Infusum, Sacch. Dulcandum.

Quibus Alterantia prædicta minus arident, placeat pro sitque Succos Herbarum Martiatos, semel bis quotidie potare. Quod sequitur magnarum virium est, & sæpe a nobis usu probatum.

24. Succo Cochlearie partem unam, duas vel tres (pro Ægri Constitutione plus minus Calida.) Succo Limon. p. i. Misce, per digestionem Clarifica: Dosis Coch. i. cum Salis M. gr. iij. Sacch. q. s. ex idoneo Vehiculo, per Mensem, post debitam Evacuationem.

Horum Usui interponatur, septimo quoque die, vel Solutio Cathartica, vel Pil. Tart. Bontii, vel Stom. cum G. ʒj. ad ʒss. cum Scam. ge. aliquot &c.

Erit autem perutile; si initio æstatis, locum habeant Aq. Ferratæ Diuretice; quibus, ad ʒiij. omni mane, inter sextam & oct. haustis, circa decimam Vinum aliquod Stomachicum, Amarum (si placet) Alteratum, supponatur: persistatque æger ad hebdomadas sex, octo, vel x.

Vel, ad urinam domi movendam, itaque sanguinem a spurcitie vindicandum, valet Infusum Theæ ad ʒi. omni mane, potum; unde leniter, idoneo liquore, per renes, id quod alienum abluatur.

Pomaceum his hominibus sanguinem contemperat; sed periculum est, ne ab eo *Arthritis* augeatur. Si secus fuerit, (tuto enim nonnullos eo poculenti genere gaudere certissimum est) in potum ordinarium, præsertim æstate, ministretur. Hyeme *Cerevisia* si extrudi respuerit, Rad. Oxylap. Milleped. Summit. Hed. ter medicata esto.

XIII. Ut ad Symptomata transeam, obiter hic notandam, quod *Crepitus Ossium*, qui (ut alibi dicitur) *Arthritidis* hac in regione symptomata pervulgatum est, neque *Scorbuto*, (forsitan ob originem & genium ejus peculiarem) neque *Arthritidi* regionis hujus *Scorbutica*, quoad observavi, unquam accessit.

Quæ ad oris vitia, cæteraque *Scorbuti*, quo tempore *Arthritidem* mentitur, accidentia spectant, cum non huc proprie referantur, ex Auctoribus de *Scorbuto* passim in unum depromantur.

De uno *Pedum Tumore*, eo scil. qui Symptomata huic *Arthritidi* quodammodo proprius esse videatur, verbum superaddam.

Cum *Pedum Tumor*, tum *Scorbuto*, tum *Arthritidi* familiaris sit; quod *Arthritidis* *Scorbutica* succedat, minime mirandum. Certe seniores, crassis, & obes, *Scorbuto* veteri in *Arthritidem* mutato laborantibus, sæpe licet notate pedes & crura, non solum

tumescere; verum etiam cutis rubore, pruritu ferino, post digitorum vulnera quantumvis levia colore plane flammeo, nunc item fluxu dierum aliquot ichoroso, immane quantum affici, a scalpendo manus si ad tempus aliquot æger abstinerit, (abstinere vero perdifficile est) cuticula suboritur paulo albidior, ardens, renuis, in ulcuscula rursus ex unguum sulcis confestim abitura. Qui hoc modo affliguntur, etsi paroxysmos graves, duros, immittes *Arthriticos* olim perpeffi sunt, articulis his diebus & minus & rarius dolent; materia scil. *Arthritica* partim in cruribus deposita, & faris stagno diluta, partim per glandulas cutis miliares *admodum* exsudante. Eo sæpe usque ingravescit hoc symptoma, ut aliquando rationem *τὴν πρὸς τὸν* sustineat; ut dolorem, pruritum, *Ἀπυρρίαν* creando, turbas ægris & negotium quam molestissimum facessat; ideoque medicum enixe postulet auxilium.

XIV. Requiritur indicatio, ut intolerabilis illa humorum acrimonia citissime tutissimeque mitigetur. Hoc autem optime fit evacuationibus per anum & renes factis, tum etiam per humorum alterationem; externe vero balneo, foru, illorum ferociam temperanti. Quorum omnium, ut & reliquorum huc pertinentium, una connexorum, quando exemplum statim subjungam, lectorem illuc (brevitatis studio) remittam. Hoc autem addo, quod in celebranda catharsi summa utique cautione, summo opus erit consilio; ne forte; *ἀτίχως* instituta, humoris ille fluxus, & ad arriculaamenta *πόρῃ*, quæ ad istorum hominum vitam & tutelam, omnino necessaria est, in eorum incommodum, ærumnam, perniciem interpellatur.

Hist. 1. Ab Arthritide Scorbutica, ulcus male tractatum: Unde Visus Abolitio, deinde Abscessus, & demum Mors.

A Gricola *Devoniensis*, sexaginta circiter annorum, crassus, obesus, *Scorbuto* papulis in capite & manibus insignito, plus quinquennium inquinatus, contra affectum pertinacem, & Medici, (quem consultorem habuit) doctissimi præscripta eludentem, *Evacuantes*, *Alterantes*, *Mercuriales*, *Antimoniatis*; e regno *Minerali*, rum e *Vegetabili* quam plurimis a nobis instruitur. Cum circa utrumque æquinoctium, eandem medendi viam, usu diutino comprobata, iterum ac sæpius esset emensus; & jam, more usitato, bolum *Mercurialem*, detracto prius sanguine, demississet; multus inde sanguinis orgasmus; dejectiones haud paucæ: atque adeo copiosæ, tumor, haud ita diu post in utroque malleolo magnus, submollis cum dolore, rubore, lævore, diu persistens, plane *Arthriticus*.

Ut ægro prospiciam, quieti illum indulgere, materiæ, quam *Medicam* vocant, diætâ uti; & ut a fæctura & recrementis, ossium juncturas vindicem, & defendam, tumoribus *Epispastica* admoveam, laqueis eos involvi; calide vestiri jubeo. *Epispastica* succedit *Ulcus* hic illic superficialium, ex ichoris acrimonia molestum, sed bene coloratum, expletu facile neque periculosum. Equo ferat illud animo exhortor, quippe quod e re futurum, & lucro ægrum majori, si non inturbetur ipse, remuneraturum.

Contra ille stomachari, de neglectis rebus suis deplorare; & citissimæ curationis spe allectus, *Agyrræ* nescio cui auscultare. Hic autem, protinus, medendi qua pollebat arte, omisiss universalibus, carne ulcus obduxit, cicatrice textit. Hinc æger capite, facta materiæ in illud translatione, subito percussus; visus hinc imminutio, & brevi abolitio. Congestis aliquanto post humoribus, in regione lumbari fit abscessus; ex quo imperire tractato, ulcerato, & parres vicinas (ut accepi) corrode, diem supremam obiit misellus.

Hist. 2. Scorbuti Calidioris Soboles Arthritis.

Quidam e *T.* vir blandus, comis, generosus, a victu lauto dapsilique; dum esset juvenis, *Scorbuto* afficitur; cui, ætate progrediente, accedit *Podagra*. Numeravit annos quinquaginta, cum utroque gravatus me primum consuluit. Hujus paroxysmum habuit plerumque anniversarium, nisi si genio nimium indulgeret, vel alio aliquo in *Sex non Naturalibus* errato, sæpius accerseret. Illum autem ostendebat gingivarum tumor, & papulæ, cubiros summo opere fœdantes, cum prurigne & apicibus innumeris, acutis, confertim oriundis Materia nunc ulcuscula formavit, paulo post siccata in squamas abire solita subalbicantes; quæ ut deciderunt, locus apparuit ruber, a fricando statim flammeus.

Ut utrique malo pro virili parte occurrâ, tum ea, quæ materiæ apte exprimant peccantem, tum quæ potenter alterent, adhibeo. Principio *Calomelane* (catharsi, ne deorsum illud elabatur, prius peracta) salivam moveo: eoque quoties saliva parciore exigebat iterato, ad sex hebdomadas praxialissimum profero; Posteaque *Cinnab. & Cerussæ Antimon.* ad \mathfrak{ss} . Pul. Rad. *Ari Comp.* \mathfrak{ss} . Syr. *Melissoph.* q. s. ut f. Bolus horis tribus medicinalibus sumendus, impetro, cum Infusis seq. coch. v.

\mathfrak{ss} . *Summit. Trifol. palud. Sicc.* Mi, *Aq. Lactis Alex.* \mathfrak{ss} . *Sp. Junip.* \mathfrak{ss} . *misc.* & ad Alterationem idoneam Infunde: Colatura adde Tinct. *Aurant.* \mathfrak{ss} . f. Infusum. Perstet autem menses binos, interposito septima quaque die *Eccoprotico*. Efferam hanc materiam ut ultra subigam, aquas æstate sequenti *Diureticas*, hortatu nostro sesquimenssem haurit, cum *Salis Martis & Nitri purificati Præparatis*, quantitate, vehiculis, & methodo convenienti.

Hac medendi arte, morbi materia, non parum mitigata, diu sane conticet: cum vero, annis aliquot post, sævire iterum, *Ὀπρίαν*, & de novo tumultus inchoare coeperat; consilio jam mutato (quoniam pedes jam tumeant, vesperi præcipue, digitum admittentes, & seniori & computatori hydropa minitari videbantur; tumores autem aliqua ex parte *Scorbuticos* esse, tum inflammatio, tum etiam maculæ comprobarunt) per *Calom.* & *Pil. Eustach. ana* \mathfrak{ss} . e *Duo-bus* \mathfrak{ss} . *Purgationem* instituo; & deinceps, & altera vel tertia quaque post die, per *Solutionem cathartica*; & sicque vicissim repeto.

Hiscæ medicamentorum ordinibus, non sine aliqua formularum mutatione, vere & autumnis, sæpius renovatis; addito insuper, ad alterandam in potum ordinariæ cerevisiam (e *Rad. Oxylap. Summit. Trifol. palud. Sem. Bardan. Bacc. Junip. Flav. Aurant.*) *Sacculo*, & *Martis Sale cum Conf. Trif.* & repetitio; *Ægrum Arthritide Scorbutica* graviter oppressum (levibus subinde hujus paroxysmis, veluti ad salutis rem facientibus, ex industria provocatis) ad senectutem, & quidem lætam perduxit.

Hist. 3. Morbus Articularis, Scorbuti Alumnus, cum Vomitu Biliofo, Ἀρροξία, & Volarum Ariditate.

Quinquaginta vir annorum, gracilis, tener, acri & bilioso sanguine donatus, *Scorbuto*, & ei supernata *Arthritide* diu conflictatus est, cum *Ἀρροξία*, nausea, ventriculi inflatione, ructu sæpe acido, vomitu frequenti & cholericis, capitis dolore, & a pastu somnolentia, cute arida, densa, nec ad *Διάρρυσιν* idonea, squamulis hic illic catervatim obstita, in manuum volis dura callosaque Pollicis pedis sinistri majorem, dextrique brachii articulum infestare solita est *Arthritis*; sed neque tumore, neque dolore vehementi; quin levi potius, in tempus diuturnum projecto, inæquali, & creberrime interciso, diuturnitate pensata levitas. Paroxysmos omnium certissime pomaceum accersivit, idque vel parce sumptum; sic, ut ex poculo communi semel iterumque siccato pes doleret. Plures ille methodos, easque probabiles, a Medicis celeb. præscriptas expertus, hanc commodissime, & idcirco sapissime, profecurus est.

In paroxysmo, *Brassicæ Folium* tumori impositum acre seruni elicit, dolorem mitigavit. Extra paroxysmum, ad prophylaxin, præmissa per *Aqq. Aldorfenses* (alvum hæc subducunt) ter quaterve cathartici, *Bathoniensis*, omni mane \mathfrak{ss} . decima seq. *Infusi amari Alterantis* haustum usurpavit: quinta pom. *Bolum e Chal. Nutrito &c. deglutit*, superbibendo julapii perlati coch. aliquot; interponendo identidem lene quoddam emolliens, & alterantium usum ad hebdomadas sex vel octo quotannis præferendo.

Hac, inquam, methodo anniversaria, ad artus, ad ventriculum, præcipue ad vomitum quod attinet, maxime levatus, a malo tam *Scorbutico*, quam *Arthritico*, graviori, se jam multos annos immunem præstitit: hodieque illani ad senectutis principia perductus, non impune negligit, usque vero mansit ista, quam modo dixi, volarum ariditas, callositas, ut opinor, usque mansura.

Hist. 4. Scorbuti Suborta, & ejus Eruptionibus adjuncta, Arthritis.

Dum in hisce verfor, Fullo me appellat *Exoniensis*; vir robustus, athleticus, ætate media, constitutione sanguinea. Frontem illi, tempora, atque faciem propemodum omnem fœdarunt, turpiter infecerunt pustulæ, sobrio certe & temperanti, (tanquam ebrioso) magnæ rubicundæque eum intervallo coccineo, flammeo. *Æstus* & pruritus erat universalis, maxime vero partium obsessarum; noctu per stragulas ingravescens. Turgebant venæ, & sanguinem plus solito *ζυμίζοντα* & ebullire, commonstrabant.

Hæc cum acceperam, virus in sanguine *Scorbuticum* efferri & cælo (quamvis instabant rum temporis saturnalia mirissimo, & effervescentiæ provehendæ apto) favente proscribi, sum opinatus: neque enim alio de affectu vel somniare erat. Sanguinem mitti jubeo, deinde alvum molliri, alia deinceps suo quæque loco præcepturus. Sanguini cremor impurus, sebaceus in cyathis quiescenti, post aliquod tempus innatavit.

Ex *Ref. Jalapii*, *Extracto Eustach. deglutuntur Pil.* quibus inanitur alvus. A cathartico, sanguine commoto continuatoque, ægrotans *Ποδάγρα* adeo nempe naturæ perinde erat, humorum vitiosorum *Δυσκρίσις* & *Ἀρρόσιν*, per articulos, atque per cutim, exterminare; & tam levi de causa, ad illam ab hac evacuatione, discedit illa digrediturque catharsim, quam quidem amplius destinaveram, ad *ὑγίαιαν* prorogo; ne videlicet, nimium subtrahendo, inrecedatur res articularis, & prorsus abscindatur. Ad eam e diverso confirmandam augendamque lenem interdum ambulationem, cothurnos laneos, quibus in pedes humor demittatur, invitetur, impetro; repellentibus interdico.

Extra paroxysmum, ad *Arthritidos* hujus puræ putæ *Scorbuticæ* prophylaxin, ut sanguis corrigatur, ea præcipio, quæ sequuntur.

\mathfrak{ss} . *Succi, & Nasturtii Aquæ. Summitatibus expressi Partes iv.* *Succi Limonum p. 1. per digestionem fiat clarificatio.*

\mathfrak{ss} . *Conf. Fr. Cynosbat. Zi. Salis Martis Riverian. gr. iv. Syr. de Corall. f. q. s. f. Bolus.*

\mathfrak{ss} . *Aq. Ulmarie, Melissæ, & Succis ana Ziiv. Linac. Lunbr. Marg. ana Zi. Marg. pp. Zi. Sacch. q. s. f. Julapium.*

Præmissa Venæ sectione, & per Vinum & Oxymel. Scillit. Vomitione; perque *Salem Cathart.* Manna, & Tartarum lax. Jusculo *Avenaceo* solutum, Purgatione; & deinde septimo quoque die repetita: sumat, diebus otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum cum Jul. Haustu; bisque indies *Sacci Clarificati* coch. i. cum *Seri Lactis*, vel *Posseti Haustu*, idque per mensem unum alterumque, cavendo Alvi Tarditatem.

Hist. 5. Pedum Tumor Scorbuticus, Arthriticus, cum Pruritu ferino.

Dominus E. generosus, agricola *Devoniensis*, ætatis flore *Scorbuto*, & deinceps *Arthritide*, tentabatur: illius fluxu dolores *Arthriticos* sensim mitescere, sed & eodem tempore pedes tumescere; percepit. Inguente senectute; corpulentus & obesus. Pedem utrunque tumefactum moleste tulit. Cutis admodum distenta est, rubicunda, gravate pruriens, post levem aliquam digitorum injuriam flammea, ichorem salum & acrem ad dies aliquot exudans: Ob pedes æquo grandiores & extensos sollicitum, *Hydropis* timor cruciavit; sed de *Hydrope* tanquam instanti, aut præ foribus, (cum urinam satis copiosam, probeque coloratam excerni; neque sitim intendi; sed e contrario appetitum a tumoris initio magis latrare deprehenderim) non esse quod se tantopere afflictum haberet, pronunciavi.

Quo auxilium adhiberem medicum, in eo laboravi, ut humoris acrimoniam, indefinenter acerbam, evacuantibus alterantibusque quam celerrime reprimerem. Hunc in scopum, rebus usquequaque collineatis, conceptis hisce verbis præcepi.

\mathfrak{ss} . *Calom. quinquies sub gr. xv. Spec. Conf. de Hyacinth. Conf. Ros. v. ana Zi. Syr. de Symp. q. s. f. Bolus, sera nocte sumendus: mane seq. Pilulas e Rudii Zi. Ref. Jal. gr. v. Ol. Junip. ch. gutt. i. Bals. Per. q. s. deglutiat, cum custodia. Quarto vel quinto quoque die, ad quinque vel sex vicēs, utrunque repetat diebus otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum e Cinnab. & Cerussæ Antim. ana \mathfrak{ss} . Cort. Citreor. Cond. Zi. Syr. Garyoph. q. s. Hora somni Pil. ex Æthiopis. Mix. (cum Mercurii crudi, & Flor. Sulph. ana p. æ. sine igne facti) Zi. Syr. Me-*

Melissoph. q. f. assumat cum Jul. Hanst. Potui vero sit Infusum seq.

24. Calcis viva Devonienſis, (id est, fortissima) ℥ss. solve in Aq. pluviae ℔xxiv. ad xii. coquendo evaporatis. Post Clarificationem leniter detrahe liquorem, eique adde Rad. Sarsae, Chinae, L. Sassafras. ana ℥iii. Cort. ejusdem, Baccar. Junip. ana ℥ss. Milleped. siccat. No. 200. Coccinell. ℥ii. Uvar. passar. exacin. ℥vi. Infunde clausa, Balneo Arenae, per noctem; Colaturae adde Tinct. Aurant. ℥ss. f. Infusum, per se, vel cum exiguo Canarini loco Cerevisiae usurpandum. Externe vero, Desiccantibus Repellentibusque Cane pejoribus & Angue vitatis, Fotum adhiberi jubeo.

24. Summit. Malvae, Althaeae, Lauri vulg. ana Mi. Flor. Chamem. Sambuci ana Mss. coque in aq. font. ℔iv. ad ii. sub finem adde Lactis Vaccin. ℔ii. Immergantur Lanae, Pedibus, quoties Pruritus instigaverit, applicanda. Utroque denique Brachio Fonticulus aperitur.

His obtemperando ager multum profecit; pruritus huic ferinum mitigavit; ad diuturnum tempus delevit, & quoties reverteretur, hisce praesentissimis auxiliis; perſugio, & praesidio salutis certissimo, creberrime propulsavit.

CAPUT VII.

De Arthritide Lui Venereae Succedenti.

Art. I. **Q**uod immoderata Venus ad Arthritidem inclinet, eamque crebro introducat, ab antiquo positum est, ab omni saeculo decantatum; sic, ut in ejus Προγυμνασίου haud injuria cum primis habeatur. Similiter notandum, quod postremis his temporibus, cum isti luem (forsitan ad humanum genus monendum deterrendumque) adjicere, rerum Auctori, Rectori, placuit, ab illa utique in Arthritida, tam facilis migratio, ut ætate nostra, quæ suis imperium longe lateque dilatavit, frequenti populo stabilivit, tyrannida confirmavit, ab affectu, quem resciverim, nullo, facilius quæquam aut usitator.

II. Istam rem incipienti, & ejus rationem perpendenti extra controversiam videtur, primum, quod hoc commune cum Arthritide (ut taceam alios affectus) habeat Paturſa, nempe invictum (a) & ἀνεπιδεικνύμενον τὸ, massam inquinans ac corrumpens sanguineam, utriusque morbi causam esse proximam & continentem: deinde, quod Paturſa etiam miasma, non minus quam Arthriticum illud, cum extollit se & ingravescit, e sinu suo ejicere, & sanguine expellere, vim operantem det natura: Ad hæc, quod virus Venereum, e sanguinis flumine jam expulsum, solidisque partibus inhærens, non pauca faciat Symptomata, cum Podagra Paturſae communia; membranis scil. dolores; ossibus, cariem: cuti, ulcera: unde denique conjectari licet, istorum affectuum miasma simile, & alterum alteri tanquam germanum, existere. Eccei vero novum videatur, quod, in materia simili tractanda ejiciendaque, natura (quæ nihil temere, nihil oscitanter, sed norma & consilio semper agit) evacuatione utatur simili, porta eadem, id est, articulis?

Has ob causas & hujusmodi alias, quæ est hodie Arthriticorum pars haud exigua, ab Lue incipientes, ad Arthritida perducuntur, nec grillatorem usquam vetereni, aut decrepitem quæpiam, & admutilatum obtuemur Arthriticum, quin apud vulgus suspicio de infauſta olim militia confestim oriatur.

III. Nemo autem hominum (quantum auribus, vel oculis accepi) a recenti Lue & nuper contracta, natam unquam Arthritidem detexit; neque nasci posse facile concedam: motu sanguinis non minus intestino, quam periodico, cum eo commisceri intime; corpusculorum illius varie figuratorum appulsu frequenti, mutari egregie, atque ita tanquam mutari & evehi diutius miasma Venereum prius oportebit, quam articulis illidi, & ad Podagram inducendam impingi potuerit.

Hac de causa raro grandiores, & ætate procedentes (serius scil. quam Primigenia) invadit hæc Arthritis, id est, ex sola Lue derivata; juniores vix quidem, at nullo modo adolescentes; quippe quibus evehendo miasmatis nondum tempus sit idoneum.

IV. Sed e diverso, nec a veteri Paturſa, terra, horrida, carle & ulceribus spurcata, Arthritidem generari vel folere, vel etiam posse, cogitandum est: id quod minime ex istius defectu, quin potius naturæ, quæ debilitata, fracta, enervata, hosti fugando, Arthritidi moliendæ, impar reperiatur.

Hisce medii generis Paturſa, Arthritidos genitrix, causam habet, sanguini per minima insinuatam, ac quasi municipem, potius quam hospitem, ob affectatas res novas exulantem, & præfractæ & cum lucta, licet ex naturæ mandato, per articulos abeuntem.

V. Lui Venereæ sua natura ad Arthritidem inclinant & tendenti, manus affert adjutrices, calcar addit, Empiricorum mos ille perniciosissimus, quo, in curanda gonorrhœa, puris suppressioni propere nimis insistent hi Ardeliones; neglecta interim vel remissa facta, quæ maximopere, quæ studiosissime præmitti debuerat, purgatione. Ita enim intus hostis retentus, sanguinem integrior, & fortior subintrat, partesque primum Paturſae agit principes; demum ævo labente Arthritidos speciem præ se fert: & ab hac istorum Περιτοξία potissimum, ex Lue tot ubique Arthriticos esse, jure merito suspicemur.

VI. Illis de Affectu Primario præmissis, de ipsius ægri corpore jam proxime dicendum est; quod utrum Arthritidem (secundario) adsciverit, an secus, ex illius ad eam propensione pendet quam plurimum: Quo major erga Arthritidem a natura corporis proclivitas, eo planius ab ea (mendaci) absorbetur.

Porro intelligendum est, quod etsi ista Lues in Arthritidem μεταβάλλει sæpiissime sit in eodem corpore, tamen nonnunquam diversa complectatur: cum a mariti Lue, Arthritis in uxore per concubitum accendatur, & illam iste incestet. Hujus rei, ut nova credatur, historias omnino luculentas & excæptione qualibet majores, quando plures in adversaria retulimus, unam itemque alteram huic Capiti subicere non gravabor.

Nec quidem hanc Arthritidem improprie Lui secundariam, tamen corpus aliud exerceat, appellari posse existimo, quandoquidem ex Lue γυναικείας oriatur, illiusque naturam, εἶδος ἃ ἡδὸς, nihilo certe minus quam si in eodem corpore sit, participat. Neque

magis novum aut peregrinum hoc habendum, quam quod, in gnatos aut alumnos, oculorum Epiphora, seu quid aliud morbi a parentis aut nutricis Lue, derivetur: quo quidem nihil magis in vulgus notum, aut pervagatum.

VII. Qui hac Arthritide conflictantur, sæpe macilenti sunt, tænes, vultu quodammodo subidenti, & ipsius præsertim margine, lurido; oculis retractis, quodque eorum album esse debuerat, interdum subluteo; voce fusca, & cum roncho edita: verum non naturæ, sed morborum opera. Nimirum duram, hi homunciones servitutem serviere; primum Deæ Blandæ obsecuti, deinde Lue, postremo Arthritide, laborantes.

VIII. Morbi hujus dolores vagi & erratici (sive præcurrentes, sive ejus accessionibus interpoliti) a Rheumatismi doloribus eo distinguantur, quod hi posteriores a frigore tum ordiri, tum reverti, soleant; a vagæ Arthritidos, ut & a Rheumatismis istis, quod illi, origine nati Venerea, nocturni magis sint: deinde quod, ipsius paroxysmi hac in Arthritide, dolores, quam alia quavis, ceteris paribus, (ob acriorem causam continentem) atrociores sentiantur: Raro enim videas immanius vociferantes, quam a Paturſa qui dolent articulis. Hoc, inquam ceteris paribus, quatenus ad sanguinem, ad animales spiritus, & ea universa quibuscunque doloris sumus plus minus patibiles, respiciamus. Quin etiam (præmissis, e Primigenia doctrina, quod dolor quo vehementior, eo paroxysmus regularis brevior, eo plerumque rarior) nulla unquam Arthritis paroxysmos habet adeo acri dolore stipatos, tam cito reverſuros, tam simul longum duraturos.

Hæc sunt hujusce affectus certæ quædam conditiones, in eo illustrando signandoque usus & momenti haud exigui: quas si fides optima deficiat, neque semper illæ morbum oculis ex voto subjiciant, quicquid in diagnosi desideratum est, ex Lue percurrenti & ejus vestigiis percunctando adimplendum.

IX. Quousque se laudabiles ostendant paroxysmi, suum habent commodum, suas utilitates; quam autem primum interciduntur, aut multum illi remittuntur (ut aliis Arthritidos speciebus) non hoc nihil periculi. Si intercisis hæc nulla fuerit eruptio cuticularis, nulla aurium suborta humiditas, nullum usquam ulcus, hæmorrhagia nulla, Congestio nulla; sed e contrario, in muliebri sexu sistantur etiam menses, & partus omnino cesset; Diis hoc iratis accidit. Porta jam obturata omni, & occlusa fugæ via, in caput transferri solet hoc casu materia νοσηρὴ, & vel apoplexiam, vel motus convulsivos, ægro fere fatales, excitare. Cujus quidem eventus, iterum & sæpius a nobis observati, mentionem idcirco feci, quod ex eo prognosticum haud inutile, tametsi mæstum, identidem eliciatur.

X. In hujus Symptomatiæ paroxysmo, ad doloris impetus solito majores quodammodo sedandos, & ex aliqua parte permulcendos, hypnotica dari prodest, pro rei necessitudine (caute tamen, ne illorum abusu materia morbi nervis impingatur) dimittenda. Reliqua, quæ ad paroxysmi therapiam pertinent, ex alio fonte (Primigenia scilicet Arthritide) ducta, ad hoc negotii facillime accommodantur.

XI. Quæ vero pars curationis Προφύλαξιν habet, & in accessionum intervallis exercenda est, a Lue Venereæ mutuatur indicationem. Nam Antisiphyl. (cum evacuantibus, tum alternantibus) a miasmate causa morbi conjuncta, sanguis tuendus. Hæc loci e Lignis, ex Antimonio, e Mercurio, comparata, quæ quam alia quavis Arthritide, in series ac methodos artificiose digesta, commodissime proponantur. Certe Mayernus, (b) experimentis & usu longe nobilissimus, Mercurio (penitissima corporis subeunte, instar viverræ, jugulum morborum petente, Fermento eorum adorto) Arthritidem veneream certo curari, non dubitavit asserere. Si per vires liceat, & nihil adverteatur, usus hic eximii Salivatio; quæ tametsi in Arthritide Primigenia & ægroti & medici votis sæpe excidat, in hac Arthritide Symptomatiæ, ab ipsa Lui ipsissima profluente causa, magnarum esse virium, virtute singulari, æstimanda est. Quæ vero Saliva optima movendæ ratio, quis modus obeundus? utrum spissus ille, paucis aliquot hebdomadis sed jugi rivo, qui absolvitur; an potius rarus, sed ad tempus diuturnum qui excurrit; utrum continuus, an intercisis eligendus? id, ex ægri rebus omnino decernendum est.

De tempore Ptyalismum instituendi maxime opportuno, ut verbum addam; æstas a nonnullis præfertur, eo forsitan nomine, quod durante illa sanguis scilicet evehctus huic operi paratior habeatur; tum quod a frigore minus ea tempestate periculi: contra facit spiritum languor & impotentia, æstati propria, quæ ad ptyalismum inhabilis redditur ægrotans; & media profecto hyeme, quæ firmiores sunt ὀρμῶντες, & longe vegetiores, quam æstate, qua fatiscunt, expeditius stadium hoc percurri constat. Ver autem ego malim, & hoc incipiens, quo æger per se ad hoc officii promptus, & tempore, ut ad salivam protrahendam, sic ad vires exinde resarciendas, diutino fortunatus.

Qui Sputum horret, Calomelana per anum exturbari patiatur. Dentur idcirco gr. ejus v. cum Astringentibus, bis die, per triduum, vel quatrimum. Postea Catharticum, quo Mercurius, cum pravis ab eo subactis & devictis humoribus, expellatur. Huic autem muneris Catharticum, quod ventrem leniter, at certo vacuet, sanguinem minus agitet (ne videlicet Arthritis irritetur) imprimis seligendum: conducunt Aquæ Purgantes cum Manna haustæ, post Extracti seq. ℥ss. ad ℥ii. horas ante aliquor deglutitos.

24. Agarici, Hermodact. Helleb. N. Epithymi, Turpeti, Mechoac. ana partes ii. Salis Tart. p. i. cum Spiritu Vini digerendo; exprimendo; tum Scammon. pul. partem unam addendo; dein evaporando, f. Extractum. Repetenda vero hujusmodi purgatio, cum præmissis Calom. quarto vel quinto quoque die, tantisper dum materia νοσηρὴ, vel tota proflus expelli, vel evacuando enervari, jure merito credatur. Sin ex ulceribus, & saliva, os affectare Mercurium advertas, ad eum subtrahendum, veluti frequentius, sic etiam copiosius, adhibenda Catharsis: Et quidem hæc per Salivam, per Sedem, excrementis, optime omnium perfectissimeque miasma hoc eliminari posse cogitandum est.

In sanguinis crasi redimenda, & veneno (si quod intus delituerit) cicurando, nusquam quidem non oportet Decoct. L. Sui. Sassafr. cum utriusque cortice, forte & efficax, pro anni tempestate, per hebdomadas aliquot, ne dicam menses, assatum quotidie, post usum Mercurii, miscere.

Aque

(a) Vide φυσικῶτατον Listerum, Colleg. Doctissimum, de Lue Ven.

(b) In Prolegomenis ad Tractatum de Lue Venereæ.

Aquæ porro *Diuretica*, quales sunt *Bationenses*, *Bamptonenses*, (valentissimum potentissimumque sanguinis *Καθάρσιον*) recte diu- que perpotæ, ad eluendam morbi hujus materiam non parum pro- mittunt. Cujus quidem rei amplam & luculentam historiam, huic Capiti subiectam licet perlegere.

XII. Quinetiam posthæc, ad majorem cautelam, aut *Aquæ* (si conveniat) omni æstate repetendæ, aut omni vere, & autumno per *Merc. d. & Aq. Purgantes*, primum purgare corpus; deinde per *Alterantia* (qualia sunt *Cin. & Cerussa Antimonii*, *Eriops Min. Panaceæ Hartmanni*) humore ejus corrigere juvabit. Imo quidem iis, qui, vel constitutione infirmiori, vel annosiores, salivam, ven- trem, & urinam, moveri respuunt, *Antisiphyl.* prædicta, cum *e Lignis Decocto*, summi erunt adjumenti.

Hist. 1. De Arthritide impura, Aquis Diureticis subacta.

Fœmina quædam e *Brigantio* integerrima, viro dissimili juncta, post annos aliquot dolores sensit, per musculos & membranas exteriores fere omnes, erraticos, rodentes. Caro inter hæc tabescit: vultus pallor: vires enervantur. Currente media ætate, (id quod auspiciato incidit) sæpius enixa est. A quodæsiat *ὡς ῥασει ἔχειν*, *Rheumatismus* (quod dicitur) ingravescit, doloribus nocturnis, iisque peracutis stipatus: præter quos, externarum partium interno- dia lacescentes, per septimum & octavum ætatis lustrum & quod ex- currit; artuum alii juncturarum erant pene omnium, fixi, & per- manentes; cum earundem tumore, rubore, ardore, cæterisque quod est paroxysmi *Arthritici Παροξυσμικόν*. Verum, in muliere sangui- nis parum calidi, temperante, morboque fatigata, tumores nec in eam molem efferuntur; nec æque rubent, nec pariter dolent, nec quæ alia symptomata sunt, similiter urgent, ac in *Arthritide* cali- da maximeque recta; imo ad *Frigidam* propius accedunt, tempus in diuturnum procurunt, & cito revertentia *Arthritidem* quasi con- tinuam, & perpetuo *Παροξυσμικὰ*, indicant. Quo tempore multan- tur artus, viscera, & quæ intus sunt tuta omnia. Cum ad tempus, etsi paucillum, isti liberantur, (quod utique non sine summo dis- crimine plus semel obtigit) illa statim afficiuntur. Tumoribus, gelatina turgidis, ætate fugiente, succedunt tofi, numero complures; granum nunc hordeaceum, nunc fabaceum æquantes. *Antimonii Mer- curisque Preparati* longum utebatur; at *Aquis Diureticis* (quas, ad libram unam alteramque omni mane, plerumque per dimidium ani- ni, aliasque in potum ordinarium perpetuo fere adhibuit) omnium maxime profecit. Jam quadragenaria major, & (quod dictu neces- sarium) matrimonio paucis annis soluta, faciem sic satis colora- tam, *Rheumatismum* (ita loqui amat humanitas) mitiorem, ro- bur adauctum, aliaque naturæ revirescentis signa, læte gloriatur. Ob partus aliquam multos, & menses ordinate juges; ob materiam per artculos pulsam, *Arthritida*, si non rectissimam, tamen uti- lem; ob medicinam opportune & diligenter adhibitam, vitam hæc Matrona piissima, venerabilis, etiamnum agit vitalem, ætura (quantum hac in re conjicere datum est) diuturnam.

Probat historia; ex *Lue*, alio corpore existente, posse alio, per concubitum, suboriri *Arthritida*; tum etiam *Aquis* præsertim *Di- ureticis*, posse permulceri.

Hist. 2. De Arthritide, Luis Sobole, a *Δυσεντρίας*, irritata, Febrim excitante, Caput aggressa.

Paturfa quidam adolescentia tactus (cujus perperam tractatæ, qua sanguine, qua vultu, ad senium usque passus est reliquias) vertente nono & decimo vitæ lustris, ex macie pristina corpulentus & habitior factus, *Ποδάγρα*. Plures ille paroxysmorum vices subie- rat, tristes sane & calamitosos, (sed rectos & idoneos) cum, ex crapula cibo difficili & inepto avide ingesto facta, *αἰώ & κέρω* af- fatum ejecit: capitis hebetudine, & vertigine correptus; pulsu celeri: æstu universali. Quando in febres istius tempestatis (erant enim alius plane indolis) affectionem istam *πυρετώδ* referre neutiquam valuerim, & *Arthritidos* insultus cum multiformes, tum etiam (tanquam lupi in fabula) semper huic ægro, minima quavis ex causa evidenti, paratos esse recoluerim; ex ea, sed *αἰώματος* se fundente, illam optime derivari posse, una cum ægro, & qui as- tabant aliis harum rerum haud ignaris, judicavi: eique fundamento firmiter innixus, hunc in modum (profecto, quam in febre *essen- tiali*, vel capitis morbo quovis idiopathico oporteret, longe diver- sum; imo in horum plerisque contrarium) curationem ordinavi.

Ut *Arthritidis* materiam, capiti impactam, illinc excitem, & in artus partim expellam, partim invitem, pulverem primum e *Chel. C. C. & Purp. quarta quaque hora, cum Jul. Haustu, exhibeo*. Deinde *Phanigmos* (e *Sem. Sinapios, Summit. Ruta, Raf. Radicu- le, Halecis fumo indurati ana part. 1. Fermenti vet. p. iv. cum A- ceto vini Albi, ad Consistentiam Cataplasmatidis*) componi & appli- cari jubeo. A Pulvere suscitantur *Spiritus*, oritur diaphoresis; a *Phanigmo* malleolis (ea solebant, in hoc corpore, *Arthritidos* stati- va esse) admoto, & quoties refrixit, quoad tumor hinc inde oria- tur, renovato, caput omnino sanum & incolume redditur, idque præsentissime. Tumoribus, ad majorem cautelam, (ut ne in san- guinem, quod evocatum est, relabatur) epispastica superaddi ju- beo; unde ichoris *Arthriticis* fluxus ad dies aliquot jugis, ad aliquot annos salutaris: mitior enim aliquandiu post *Arthritidis*, quod affe- ctionem hanc *Arthriticam* esse ab eventu comprobavit. Cum jam lucuscula per se exsiccarentur (ne quidem antea, ne fluxum tam felicem, tam blandum, tam ex omni parte benignum beatumque quodammodo abscondere videatur) ventriculum, me hortante, movit: diebusque posthæc otiosis *Trifolii Paludosi Infusum*, *horis medicinalibus*; *Menses binos, bono cum fructu quotidie potavit*.

Historia confirmat *Arthritidem*, *Luis Venereæ* progeniem, posse *Δυσεντρίας* irritari; posse caput invadere.

Hist. 3. Luis Venereæ succrescens, Caput impetens, Arthritis.

Sub hujus sæculi initium, fœmina quædam, ortu incolumis, piissima, lectissima, nec uno nomine spectabilis, marito jam olim paturfa, nuper *Arthritide*, diro morborum pari, multato, & miserrime cruciato, annos circiter viginti nupta, semel bis pepere- rat; exinde diu catameniis recte est potita. Postea *Scabiem* habuit

aliam in cubiti summitate, siccam, subfuscā, multiplicem, cum interstitiis & ambitu purpureo; aliam in capite subalbidam, squam- matim decidentem: in femore, & latere, impetigines, & mali mor- ris maculas: his adde capitis; in tota parte sinistra, & colli poste- rioris, dolorem nocturnam. Ad hæc hallucis articuli: majoris pri- mum teneritudo, deinde dolor acutus & pungens; tumor item, & rubor supervenit; quæ quidem ita sunt accidentia, ut *Arthritidem* ostendant. Certe dolor ad integrum usque mensem aliquoties man- sit, alios atque alios digitorum articulos, pedum etiam plantas, identidem torquens, a cathartico improvide ingesto exacerbatus; sic ut de *Arthritide Luis* succrescente minime dubitandum.

Ut eruptiones tolleretur, ex refrigerantibus nescio, quid temperatum clam obliiivit; unde brevi caput tremere, manus & pedes *Παραλύεσθαι* cœpere; nec erecto corpore stare, nedum ambulare, potuit. Hisce circiter diebus menses supprimuntur, quæque vitia nota & manife- sta erant, ab eorum una suppressione nasci putabantur. Caput in- de plus solito afficitur, magis enim magisque tremit, vel ex im- becillitate antrorsum inclinatur. Cum oculi somno conniverant, hor- ror ingruit universalis, & ex improviso totius subita corporis exul- tantia. Fugiente somno, brevis stupor, & motus sæpe convulsivi, tum labii superioris, tum oculi sinistri, tum etiam totius capitis. Oculi porro dolor, visus obscuritas, & caligo: Sub hæc utriusque genu, sed occipiti maxime frigus intolerabile; faciei rubor erat; al- vo, soluta refectio: cum ingravescerent symptomata, nec quo il- lis occurreretur, a quoquam unquam, quod sciam, quicquam ad- hibitum, (ex prima enim morbi origine, rem ejus totam pertina- cissime occultavit) tandem, fallente lingua & tertiatibus verbis, sum- mum enarrat, & implorat (heu! post bellum) auxilium. Nam insultu gravissimo, motibus convulsivis, & *Αναιδρυσία* comitato, brevi tempore morbus absomit ægram, meliori fato (si Deo visum esset) dignissimam.

Hoc casu miasma *Venerum*, quod & *Podagricum*, intra sangui- nem aliquandiu retentum, neque partu frequenti, neque medica- mentis, aut diminutum, aut satis cicuratum, naturam aggravare cœpit; cum inimico illa colluctatur; & ejus eliminandi satagens, *Arthritidem* molitur. Cum autem (ob sanguinem forte *Δυσμετέλλετον*, vel alia aliqua de causa) ad *Arthritidem* ægra minus sit proclivis; cumque per cutim, virus parce expellatur, & jam menses suppressi sint, adeoque fugæ via omnis occlusa; caput illud aggreditur, & genus nervinum, itaque laborantem opprimit.

Monet historia, *Paturfa Podagram* æmulatæ materiam, in aliud corpus aliquando per concubitum infundi; in illo, veteri sævitia procedere; caput denique obstructis exeundi viis, adoriri.

Hist. 4. Arthritis Luis επιρρομένη, victu, Digestivis, & Equitatione moderata, tandem Intestina invadens, Sanguinis αἰώ & κέρω Missionem pariens.

Cupidinis in castris, a prima juventute versatus, miles quidam, *Mollior*, (quod ajunt) *Anseris Medulla*: ejusque præliis haud parum contusus, circa mediam ætatem *Arthritide* corripitur; quæ, omni fere anno, suapte sponte, accessiones iteravit; a malis autem moribus sæpius, supra modum invitata. Cum annos æger nondum habuit quadraginta, in *Ascitem* incidit, durum (Jupiter!) & an- cipitem, quem demum eluctatus, curæ meæ aliquanto post occur- rentis, se commisit, ut adversus *Podagram* (ipso consistente reo) minime *Primigeniam*, item adversus *Hydropa*, prophylaxin obse- crans. Claudum aspicio, emaciatum vultu, præsertim ipsius margi- ne, lurido; sed oculo flagranti, sed animo alacri vividoque.

Et medicinæ, & aquis mineralibus hostem internecinum horror, quod illis tentare non liceret, diætæ & exercitatione, quoad ejus fieri possit, conficere conetur: Ideoque equo, sæpe, & multum, se oblectet; de victu maxime sollicitus, non nisi *ὑπερτοίς* nutria- tur, & a prandio semper Rubellum (quod vini genus ventriculo erat gratissimum, & usu diutino probatum) hauriat: mature se in lectum det, parce, vel non cœnatus. Nec quid adhibui medi- camentorum, præter *Infusum Gentianæ, Zedoariæ, & Cubebarum*, eodem vino paratum, omni mane usurpandum, & *Pil. Stom. cum G*, omni mense, ad tuendam servandamque coctionem, *Arthritide* permittente, assumendas.

Horum adjumento (vitandis simul iis, quæ obessent) diu vixit ille, *Arthritide* non nisi recta, quantumvis *Symptomata*, sed acri, (forsan ob peculiarem ejus materiam, magis) sed acerbo dolore comitata prægravatus.

Verum ad senectutis principia perductus, *Febre* cum *Diarrhœa* laboravit, & alvo restricta abdominis secuta est inflatio, ventriculi & intestinorum dolor; austeræ postmodum materiæ, deinde san- guineæ per os, brevi vero nigræ (pariter sanguineæ) per anum missio. Ab ingruente *Dysenteria Arthritidis* *ὡς τοῖς ἐξωθεν* nulla. Ut his opitularer, per literas rogatus, primo *Leniens præcepi*, *Sennæ & Rhab. Xerani infusorum, Tum Bolum astringentem & Cardiacum*, (eo nempe, quo in artus expelleretur *arthritidis*) ter die cum *Infusi amari Haustum deglutendum*.

Istius hominis initio *Lue*, mox *Arthritide*, tum *Hydrope*, iterum *Arthritide*, qua recta, qua reflexa & *Dysenteriam* inferente, iisque suo genere gravissimis, affecti, robur & patientiam sæpe demiratus sum: Hæc enim universo animo præsentis, forti, & illis omnibus majori toleravit: spiritu nempe animali firmo, alacri, & elastico donatus; equitando summopere levatus; nam, ex podagra fractum, imbecillum, languidum, eo solo certissime citissimeque frequenter restitutum, observavi. Si flatus postulaverit, nec *Arthritidis* vetue- rit paroxysmus, bis terve hebdomada injiciatur enema.

24. *Flor. Chamæ. Mi, Sem. Fenic. d. Carui ana ℥ii. Coq. in Aq. font. ℔i. ad ℔. Colaturæ adde Canarini ℔℔. Ther. Andem. ℔℔. Sac. rubri ℥iii. f. enema.*

Et in tormina *Decoct. e Carminantibus*, vesica inclusum, & ven- tri admotum; aliasque pannus *Wallicus* abdomini imponendus.

Diu illum *Dysenteria* superfuisse audio, & tandem emaciatum, morbis & ætate confectum, diem supremum obiisse.

Historia significat *Arthritidem Luis venereæ* procreatam, victu ido- neo, digestivis, sed præsertim equitatione, non parum sublevari, *Dysenteria Prodnetricem* auferri.

Hist. 5. Arthritis, Lue Venerea superveniens, melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulsionem universalem, & demum Mortem, inducens.

O Ccurrit e plebe viri cujusdam historia, natu integri, Lue, dum adhuc adolesceret, corrupti. Huic affectui, multum ope medica retuso, nequaquam extirpato, constanti jam ætate, supernata est *Arthritis*; quæ, lustris minimum tribus, recte agens, & omni anno semel iterumque redux, tandem in *Anomaliam* degeneravit: sesquiannum nulla fuit. Exinde æger melancholia, gravitudine, caligine, sensum est afflictus; uti etiam vertigine, eaque gravi adeo, ut in notos & familiares sæpe inscius irrueret. Cum iter aliquando intempestive faceret, ex frigore, primum visu, deinde sensibus internis omnibus, ipsoque judicio læso, per dies aliquot deliravit. Arthriticos hos errores esse, quando mihi persuasissimum erat, (& tribus ab incurfu mali primo mensibus, cum recurrere immatiorem, cum, auditus gravitate præmissa, vultus pallore, flatibus æno & κατω creberrimis, urina limpida copiosaque, spiritu difficili; & demum *Αναίτησία* accedentibus, deprehenderam) quæ medendi ratio plurimum profecit ita se habuit: ut capiti succurratur, sanguinem mitti jubeo; ventremque per enema, per catharticum, subduci; & ad hostem in artus evocandum, utrique malleolo (solebat æger illis dolere) *Phenignum* applicari, tumoribusque hinc inde ortis *Epispastica*. Humor effluxit ichorofus copiose; magis vero, quod *Cardiaca*, (*Pul. Gascon. Vinum Hispanicum rubrum, Sp. vol. oleos.*) promota in auxilium, & quotidie exhibita, ad τὰ ἐξωθεν materiam expulere. Porto, in *Prophylaxin* crebra fit per *Pil. Rust.* sed lenior, *Purgatio*: Et, utroque latete spinæ, inter homoplatas, fonticulus, sex pisorum capax.

Atque hisce artibus, laborantem, & tanquam animam agentem, ab ipso orco eripui. Verum materia, propter naturam refragantem, neve satis evocata, neve paroxysmum, utut tentatum, faciens tegularem, caput, dudum enervatum, iterum aliquandiu post adorta, ægrum media nocte post somnum placidissimum, *Spasmo* universali correptum, brevi temporis spatio interemit, & indicio fuit, eam, quæ *Arthritidos* est a *Paturfa* natæ, jam non amplius expulsam, interdum παλινδρομῶν, cetebum adorti, convulsionem universalem, eamque lethalem, ægro afferte.

C A P U T VIII.

De Arthritide Asthmatica.

Att. I. *Asthmati* succrescit *Podagra* creberrime pituitoso, sive ei quod a phlegmate pulmoni inharere, & bronchia infarciens, sicque spiritus meatum obstruente, factum est: Hoc in causa morbi hujus idiopathici, proxima & conjuncta, ponitur; dum in primis iis stibularis saburra, & sanguis in canaliculis ad plethoram actus, sociam aliquando opetam adjungit, & ad hunc effectum confert κατὰ συµμάθουσαν.

Spiritu hac de causa difficili laborantes, interdum per se, alia ex medicina, nono & decimo plerumque ætatis lustro, tato quidem maturius, Ποδογῶσι. Si, per visum inordinatum, δυσπνέειν, aliasve causas antecedentes vitium copiose alitur, & in sanguine congeritur materia, *Podagra* effectrix, proprio illa marte potest, & per se, in Paroxysmum erumpere; verum multo facilius patatiusque, si medicina fuerit extimulata.

II. Sunt autem stimulo, huic *Arthritidi*, uti aliis plane permalitis, cujuscunque fuerint generis, *Cathartica*: quando eorum beneficio, ad amoliendum hostem, eumque in articulos extrudendum, natura promptius & habilis operatur; tum, ad hoc operis, e catharticiis δρασιώτερα, præcipue faciunt; quando sanguinem exagitando, (quando ante dixi) novum affertunt orgasmum, quem e vestigio sequitur alieni ἐξχρῶν.

Valent hac in parte *Alterantia*, ad debellandum *Asthma* vulgo adhibita, quotquot uspiam a naturæ partibus stant cardiaca, & in fugando hoste ei opitulantur: quæ quidem alterantia, *Antiasthmaticorum* maxima, vel saltem immensa, portio putanda est.

III. De *Arthritidos* hujus materia, minime recentem illam esse, sed in corpore quod diu paroxysmum extiterat, in eo se occultans, vel hac de causa merito, suspicari licet, quia nemo repente Ποδογῶσι. Imo quidem verisimile est, quod in corpore phlegmatico, tussis agitato, pituita involvatur, simulque cum ea, pulmoni commissa, per sputum illa κατ' Ἐπίκρασιν excernatur.

Quod ad amplectendam hanc sententiam me impellit, eique confirmandæ stabilizandæque unum sufficere videatur, non leve pondus argumenti, hoc est, (hujusce *Arthritidis*, prout observavi, Χαρακτηριστικόν) nempe; quod aliis omnibus *Arthritidis* qua veræ, qua symptomaticæ speciebus, eo nomine dispar, æstate lætetur. Cum *Arthritis* reliqua omnis sua natura hyeme, vel minimum Sole infra æquinoctium vergente; hæc nostra, eo, supra, imo ipsum circa Cancri tropicum aliquando erecto, suapte sponte, neque ex causa ulla evidenti Παροξύνεται.

IV. Illud tamen nequaquam ita capiendum, ac si hæc *Arthritis* omni omnino hyeme prius obdormire, neque per illam tempestatem quicquam unquam moliri soleat. Contra φαινόμενα hujus ætiologiam, eo locari censendum est, quod hyeme, quo quidem profecto tempore cutis densatur, fallit δὲ πρὸν, & in pulmonem mittitur pituita, cum eadem in eum miasma etiam *Arthriticum* abripatur, æstate vero cum superficiem & ambitum corporis humidum evocetur, extra idem tendat & artus appellatur. Ut hyeme ab *Asthmate* vincatur, sub ejusque vultu & persona delitescat, æstate propria eluceat.

V. Propterea quod *Arthritidis* hujus materia frequenti expulsionem magnam partem eliminatur, profluere autumnio, quod illius paroxysmi, utut dolore, tumore, rubore, aliisque symptomatibus, satis ad diagnosin signati) raro utique infestissimi cernantur, aut ex eorum numero, qui rosis, qui ulceribus, qui ossium caræ, cæterisque fructibus istiusmodi acerbissimis, vel etiam nodis, doloribus diutinis, & id genus mitioribus, affligunt ægros, sed tolerabiles, & æquo animo ferendi sunt.

Cum autem istud sive paroxysmorum tempus, sive eorum clementia, non eo usque huic *Arthritidi* propria est, ut ex eorum al-

terutro, vel utroque possit illa internosci, quo aliquod *Διαγνωτικόν*, in medium promam, quotiescunque *Asthmati Pituitoso*, præsertim gravi & diutino; maxime vero omnium, quoties usitate, & ex more subjicitur *Arthritis*; hæc ipsa est, quam ego *Asthmaticam* appello; primigeniæ, si paroxysmos, eorumque symptomatica circumspiciamus, certe persimilem, successione luculentius, & fere sola agnoscendam.

VI. Ex dictis sequitur, quod *Arthritis* hæc *Asthmatica*, tametsi puram materiam & puram *Arthriticam* habere, per seque omnino veram esse concedamus; (quod tamen itane sit, an secus haud definitum facile) quando quidem *Asthmati* submissa est, ipsaque ejus materia gaudet, in *Symptomatis* censenda est; habita, videlicet, morborum successione, & tam primarii, sive genuini, sive spurii (*Asthmatis*) quam secundarii (*Arthritidis*) ratione.

Ex eoque patet, quam sit ea sui generis ἐν τῷ πράπτειν æstimanda, quam modo peculiari expugnanda; a vera *Arthritide* separata, quoniam nulla hæc successione præ se fert, nullum agnoscit morbum primarium, a cæteris vero *Symptomaticis* quibuscunque, quoniam *Asthmate* subnata, ab eo pectoris, spiritus, tussis, sputi, considerationem deducit, necessarioque comprehendit.

VII. Ut hæc apertius exponantur, quoties de epicæne hujus *Arthritidis*, nunc pulmonem, nunc artus infestantis ὑπάρχῃ, constitit, & curationem meditabimur, haud dubie prodest in priori statu (tametsi *Pituitosum* existimeretur *Asthma*) rem *Arthriticam* non negligere; quin ad *Asthma*, quoties ingravescat, depellendum, in externis, simul atque fieri potest, dolorem excitare; quo nempe facta materiam ad articulos *Διαδοχῇ* levetur pulmo. In eo certo operam locari commodissimam; in eo intentionem utilissimam, non inani conjectura, sed experimentis ex medio usu depromptis, & (ut opinor) ratione fretus, habeo persuasissimum. Hoc igitur spectans, *venæ sectione* vel prorsus abstineo; vel, quam in simplici pituitoso *Asthmate*, sanguinem minori quantitate detraho: ne scilicet natura, missione nimia & improvisa debilitetur, enervetur, & *Arthritidi* potrudendæ impar reddatur.

VIII. Catharsin per *Aloetica*, sive quævis illa, quæ tum alvum moveant, tum etiam sanguinem exagitant, & in orgasmum adigant, instituo. Novi quendam *Asthmaticum*, *Arthriticum*, qui *Spiritu Cochlearia Aureo Purgante*, (cum *Scammonio*, *Julapio*, vel fortasse *Gambogia* comparato) ad guttas circiter triginta, ex vehiculo convenienti, felicissime creberrimeque utebatur: satis enim hinc deiecit, nec ita diu post optato doluit. Potionem ego sequentem, hujusce classis, sed magnarum vitium *Arthritico*, secundis avibus, semel iterumque propinavi.

24. Fol. Sennæ ʒss. Fibrarum Helleb. nigri, Turpeti ana ʒi. Coq. in aq. font. q. s. ad ʒiij. Colaturæ adde Syr. e Spina, Elix. Salutis ana ʒss. f. Potio.

Catharses ea quidem *Asthmaticis* utilitas, ut, præterquam alvum, etiam pulmonem exonerent, quandoquidem pituitam ab ea tenuari, discutite, sputum abundantius exantlari vulgarissimum est. Atqui purgatione jam semel instituta, non opus erit, ut de illius repetitione (quæ, a pituita simplici *Asthmatici*, per neque *Podagram* medendis, sæpe necessaria) nisi ex intervallo quodam, & urgente nova intus saburra, sumus solliciti: ne scilicet nimium exhaustiendo, naturam, *Arthritidem* rectam & regularem impense desiderantem, alio infauste divertamus.

IX. Ad ea potius progredior, quæ, ut debelletur *Asthma* & (illius gratia) commoveatur *Arthritis*, validius connituntur: ideoque omni mane, haustum *Infusi amari Chalybeati* misceo, *Bechicis*, ne ventriculo, per se nimium languenti & obtuso, officiant, ad tempus pomeridianum relegatis. Tum vero, quarta circiter hora, iterumque nona vespertina *Bals. Peruviani*, vel *Chiliensis*, vel *Sulf. anisati*, vel *Tinct. Sulf. Dosis majusculam*, (*Tinctura puta gr. xv. ad xx. & de Balsamis simili proportionem*) ex Syr. *Balsamici*, vel e *Succo Erysimi*, *Coch. i.* cum allæ fortioris, vel decocti pectoralis clarificati, haustu præcipio.

Post dies aliquot hisce medicamentis collocatos, quamprimum iis efferetur sanguis, & pulsus digitorum fortius repellat, statim, extra, loco sapissime dolenti, admoveatur *Ceratum viride*, vel *Emplastrum Cephalicum*, cum *Picis Navalis* pari quantitate: vel; (si placuerit) *Phenignus*. Tumori demum facto, si locus erit, vel, si in digitis sit tumor, carpo, vel malleolo vicino *Epispasticum*, ut evocetur *Arthritidis* materia, nec in sanguinem repelli permittatur.

Altero vero statu, quo propria persona agit, & artus invadit *Arthritis*, ei studiosius insistendum, per amara, per *Chalybeata*, per idonea cujuscunque generis *Cardiaca*, si placuerit, excitandæ, per involucria, per crepidam, cæterumque mundum articulare, si vigerit, tuendæ servandæque. Rata enim esto, & indubitata fidei norma, naturam *Asthmati* descripto per *Arthritida* occurrere, medicari, & in ejus paroxysmo, conciliando præstandoque opottere illam adjuvari.

X. Interea vero temporis, si istius ordinis sit *Asthmaticus*, qui sputo carere nequit, tametsi dolet articulis, ad illud sive retinendum, sive revocandum, *Bechica* vel e præscriptis in minori quantitate, vel leniora quædam, ut *Balsamum Gileadense*, seu *Lucatelli*, vespere præsertim, ex vehiculo jam scripto, assumantur: quorum beneficio, mane sequenti sputum egregie projicitur, nec ad meridiem usque (quod ab illis, mane demissis, solet evenire) obtundet appetitus.

Et si dolor & vigilia, comites *Arthritidis* importuni, premant ægritantem, hypnotica tamen, quæ in *Asthmatis* speciebus aliis plerisque omnibus, tum etiam in *Arthritide*, nonnunquam ope sunt eximia, virum pene divinarum, in hoc affectu, dosi aliqua notabili non sunt temere largienda; quippe quæ, cum multum *Asthmati* pituitoso, tum etiam non parum *Arthritidi*, sua natura vix satis asperæ, repugnent. Ad invitandum somnum, artes exerceantur, ut minus nocivæ; quales sunt *Leclio*, *Friclio*, *Palpitatio*, & ejusmodi alia.

XI. Simul ac castra in externis partibus metata est *Arthritis*, ibique fixit; abolefcit corporis universi gravitas, spirituum hebetudo, respiratio angusta: tussis magna ex parte discutitur: pituita quod vesiculis inhaeret pulmoneis, ejicitur; perque *Arthritida*, jam denum regularem, cantum est, ne quid supra modum in eas infundatur: verum in iis, quibus *Pituitosis* ex consuetudine opus est sputatio, persistit ea usque, sed diminute.

Solet hujus *Symptomaticæ* paroxysmo adungi (qui, cum *Asthmati Pituitoso*, tum ita *Arthritidi* veræ interdum a satellitio) *pedagogus*.

umor serofus, digitum accipiens, ægro sæpe metum hydropis incutiens; qui tamen brevi temporis spatio, ambulatione, & motu corporis leni & idoneo aufertur. Hujus item pellendi ergo, frictio, bis die peracta, cum linteo crassiori, adhibeatur.

XII. Qui nuper hac *Arthritide* defecerunt, in regionem eos apertam, & ventilatam quam primum migrare, equitatione crebras exerceri, convenit: movetur enim inde, quod in pulmone reliquum est pituitæ; & simul is sanatur, & tono restituitur: quini-mo spiritus eo reficiuntur animales, redintegratur appetitus, instauratur œconomia. Et quidem hunc in modum tractatos, ex hoc affectu vegetiores, & quam ante aggressionem longe tutiores observavi, donec otio, satietate, victu dapili & opiparo, eidem iterum tradantur.

Cui quidem malo ut quodammodo occurrerem, e re futurum arbitror, cibi potusque rationem aptam accurate prosequi; ventriculū digestivis roborare, *Απερσις* fæces, & reliquias ecoproticis identidem subducere; itaque tum *Asthma*, tum *Arthritidem* opportune præcavere.

XIII. Sicco nonnunquam *Asthmati*, exquisito, dicam, an notho? certe idiopathico, nec inflationibus nato, subnectitur *Arthritis*. Spirandi premuntur organa, per humores quantitate nimia illis commissos, neque vero in vesiculis pulmoneis simul depositos, & spiritus pro causæ hujus magnitudine plus minus est difficilis: inflicula est, anhelatio: & pectus interdum maxime gravatum. Nullos hoc *Asthma* (quantum ego rescivi) aggreditur, nisi partium insigni conformatione, vel inclinatione hæreditaria, ei qui proclives sunt; & autumno illos, & euro increbrescente (pro more pituitosi) maximopere infestat.

Cum aliquandiu sæviit, interdum ei se adjungit *Arthritis*, tam cito secuta, & ea spiritus levatione, quæ humorum *Μεταστροφῇ* in externas partes; eoque harum dolore, qui *Arthritidem*, aut genuinam, aut eam probe simulantem, abunde monstret.

XIV. In *Arthritide* hac *Asthmatica* per venæ sectionem, & purgationem materia pectore detrahenda, tum iis, spiritus animales quæ diffundant; quæ per fibras longe projiciant; quæ motus eorum regant; maxime vero omnium, quæ in artus materiam pellant, ibique figant, omnino insistendum est. Neque enim inhibeat *Arthritis*, multo minus supprimatur repellaturque atque adeo intendatur, in ægri salutem augeatur. Minime vero dubitandum, quin ægri vita & incolumitas per *Arthritida* recte moderatam conservetur, fangiatur.

Arthritidis Asthmate, qua sicco, qua pituitoso natæ, exemplum mox subijciam. *Asthmati* ab inflatione (per nobilissimum *Floyerium*, graphice depicto) nulla unquam, quod meminèrim, est subnata.

Historia I. De Asthmate Pituitoso, per Arthritida mitigato.

Vetus quidam e proximo, triginta annos *Δυσπνοΐδος* laboriolim assuetus, nuper ob ætatem emeritus, ideoque crassior, & oberior factus, difficiliter spiravit. Hyeme, Anni 1696. (quo quidem tempore, propter autumnum humidiorē, & frigus inde impensissimum, grassabantur *Catrhari*) multum laceffabatur ea *Asthmatis* specie, quæ (a materia) *pituitosa* nuncupetur. Pectoris enim oppressione, spiritu sublimi laboravit, & deinde tussi, primum arida, postea pituitam exantlante, crassam & tenacem. Neque spiritum sine anhelatione traxit, neque cervice nisi noctu erecta; eo vero facilius, quo pituitæ plus emissum.

Ut opem feram, ex curatione *Asthmatis* familiari, ventrem ter quater, diebus semper quatuor interpositis, subduco, majorique deinceps intervallo: *Anacatharsin* ad augendam, *Massæ pillularis* *Ἰ. ex Linctus*, *Cochleari*, quarta pomeridiana & hora somni, deglutiit, cum vini medicati haustu: omni vero mane, quæ ventriculū tneantur *Infusi amari Alterantis*, *Xerani compati*, *Coch. aliquor.*

24. Balf. Lucat. 3℞. Flor. Benzoin 3i. Balf. Sulf. Anisati 3℞. Succi Glyocr. 3i. cum pice liq. f. Massa pillularis.

24. Syr. e Succ. Erysim. Ol. Amygd. d. r. ana. p. a. cum Sacch. Cryst. probe temperando, f. Linctus.

24. Allii incisi 3℞. Sem. Anisi, Croci ana 3℞. Infunde in Xerani 1℔i. post debitam Alterationem coletur Infusum.

Post aliquod tempus (ut mutatione Medicamentorum a Nausea caveretur) Tinct. Sulf. gut. xii. ex Syr. Balf. Coch. i. pilularum loco assumpsit.

Ægro hisce sublevato sic, ut Προϋλαξιν aggredi jam liceret, ad eam præstandam, *Xerani Rad. Gent. Summit. Abs.* 24. Cent. M. Marrub. albi, & Fr. Cubeb. alterati, haustum, omni mane Senex potavit, idque per menses multos.

Horum ideo remedium mentio a nobis facta, quoniam iis prospere utebatur, tum ea hyeme, tum post sæpissime. Nam cum *Asthma*, per reliquum vitæ, sub brumale solstitium, semper recurreret, ad hæc ille, certissima præsidia, recurrere solebat.

Anno 1698. vertente vere, cum insultum *Asthma* vice jam tertia, tristem & severum renovasset, ægro in hunc usque diem *Arthritide* (quod putavit) immuni, neque de illa somniantiquidem, dolet halli pedis sinistri articulus major: inflammatur, rubet, ardet, more pertinaci & plane *Podagrigo*. Gratulor vicino, de morbi tam commodi, tam salutis, adventu. Contra ille obmurmurare, dolorisque impatiens, ex dolore periculum metiri. Ego vero exhortor, pulmionem eo liberari, anhelationem minui, contendo, & *Asthma* per *Arthritidem* oportere vinci.

Hyemem Anni 1700. telerabilem habuit, ver insequens periculosum, sole enim supra æquinoctium evecto, spiritus admodum gravis, imo quam per anteauctum sesquiannum gravior; ægritudo universalis: appetitus prostratus: nausea & sitis erat permolesta. Cum ita diu valetudine quadam obscura teneretur, solstitio instante æstivo, tempestate fervidissima, paroxysmorum, quos unquam perpeffus erat, omnium gravissimo, correptus est *Arthritico*. Per universum pedis convexum extensa est inflammatio, elata, ardens; ad calcem, ad tibie medium tumor; pulmo ab incipiente eo tutior, expeditior; ventriculus avidior. Placuit novam rerum faciem obtueri; per jucundam humorum *Μεταστροφῇ* contemplari; ad eamque promovendam Tinct. M. & Elix. propriet. d. ana gutt. xx. cum Xerani Amaris alterati Haustu, bis in die, sumendas imperavi. Porro vini istius (quando jam ætate grandiori delitium erat, neque ventriculo ingratum) 1℔. quotidie bibendam, quo nempe, miasmate *Arthritico* in pedem exulante, sanguis purgaretur; defenderetur pulmo.

Menses circiter binos duravit paroxysmus, & ægrum usquequaque beatorem fecit, vegetum nempe, acutum, alacrem, ventriculo præter modum avido & latranti, ut decennio novissimo nunquam magis. Unus illum pedis tumor gravatum habuit, qui tamen commodum suum, & utilitatem tædio longe majorem attulit; cum a materia pedi affixa pulmioni melius cessisse, minime indubitandum est.

De hujus ægri *Arthritide* nequaquam prætereundum, quod aliis *Speciebus*, quæ Anni dimidio hyemali sua natura παροξύνεται ad unam omnes, hac ex parte multum ab similibus, æstatem amat: hyeme ne semel quidem in externis; partibus, sole citra æquinoctium versato, jam ter emicuit, & paroxysmos totidem perfectissimos exegit.

Paroxysmi, modo tam memorabili, tam præter morem reduces, istius *Asthmatis* naturam indignant, exponunt; & in *Arthritidem* illud ex facili migraturum esse, & diebus saltem hisce postremis, a puro *Asthmate* pituitoso non multum abhorreere monstrant.

Hist. 2. De Arthritide, Asthmati ex Plethora, feliciter adjuncta.

Vir nobilis, crassus, plethoricus, decennio labente sexto, *Asthmate*, cui ex thoracis brevitate, abdominis prominentia, præcordiorum distensione, pronus erat, afficiebatur. Quo me tempore primum accersivit, afflictum ægrotavit; pene suffocatus, spiritum traxit sublimem, & ob organa constricta laboriose: tussiendo nihil excrevit.

Spiritus impedimenta, per catharsin & venæ sectionem deduco. Deinde, quibus coctio perficiatur, itaque flatus pervertatur, quibus roborentur *Ὀρμῶντες*, dilatentur, expandantur, adeoque modo omni augeatur respirandi spatium, ea præcipio quæ sequuntur.

24. Conf. Abs. R. Pul. Rad. Ari C. ana 3i. Chal. Nutrit. 3℞. Syr. Melissoph. q. s. f. Bolus.

24. G. Ammon. Bdellii ana 3i. Flor. Benzoin. Extr. Croci aa. 3℞. Balfam. Lucat. q. s. f. Pilul.

24. Aq. Rutæ, Hyssopi aa 3xii. Pæon. C. Bryon. C. aa. 3iv. Marg. pp. 3℞. Sacch. Cryst. q. s. f. Jul.

Sumat Bolum omni mane, Pil. quinque omni nocte cum Tulap. Haustu, eique instillentur Tinct. Cast. gutt. xx.

Quod liberius spiravit, id *Evacuantiæ*; quod adhuc multo magis, id ex proposito fecerunt *Alterantiæ*, sed diutius usurpata. Isti vero libertati par, novum exoritur malum, si modo ita possit appellari, quod in vitæ tutelam, quodque ægro auspiciatissimum evenit: Quippe compositionum jam dictarum & istiusmodi aliarum opera factum est, quod humeri dolor, tumor, rubor, ne plura, quod *Arthritis* emicuit; quod per artus, ex eo tempore quam plurimos peragravit: quod frequentem in eos crudelitatem exercuit: quod exinde pectori pari mensura longe melius. Constat enim, & omni majus est exceptione, quod ab *Arthritidis* exortu spiritui pulmonique longe felicius cessit: ut ægro jam fere unicum restet tempori tam *Arthritidos*, quam *Asthmatis*, causas remotiores prævenire; aut deinceps *Asthma* per *Arthritidem* curare.

De Arthritide Febri Succedanea.

Art. I. *Arthritides* chronicis oriundas hucusque dedimus; de illis Febre, qua *Continua*, qua *Intermittente*, morbo acuto, quæ nascuntur hodie sermonem faciemus.

A *Febricula* quadam *Arthritidis* paroxysmum ferme omnem exordiri, manifestum est. Differt autem illa, brevis scilicet parva, symptomata, quæque ad Tribum, aut *Februm* perfectarum classem ullam referri nequit, ab ea, quæ a nobis hoc tempore dicenda, exquisita, & in genere suo consummata est.

II. Cum *Febris* nonnullius speciei ratio, & essentia in eo poni videatur, quod effervescentia sit, ob *επιρροήν*, & indomitum aliquid, in sanguine contentum, eumque perturbans, (illius nempe expellendi ergo) concitata. Aliæ vero *Febres*, quod ab auctore (a) nupero argute propositum) de obstructis glandulis, & inæquali, quæ deinde sequitur, enormique fermentatione, oriri censeantur. Immo quidem omnes, cujuscunque generis sint, hoc inter se commune habeant, & in quo conveniant, quod sanguinis motum, & orgasmum ægrotanti talem faciant, qui supra naturæ tenorem, (mitis ille & benignus esse reperitur) immodicus, vehemens, & morbosus est: palam esse reor, quicquid horum respicias, quemcumque fontem adeas, *Febris* in *Arthritidem* abitum & Παρέμβασις, ut naturæ, sic rationi consentaneam, deduci posse per facile.

III. Ut enim hisce singulis parumper insistam, quoties a miasmate, (quod prius dixi) *Febris* occipit; nec incomprehensibile, nec explicatu difficile est, ab eodem primum concito, & debacchanti, *Febrem*, ab ipso postea lenito, subactoque, *Arthritidem* accersiri; sic, ut eadem sit utriusque causa (quæ dicitur) conjuncta, sed diverso modo longeque dissimili agens; nunc iracunde omnia, supera, & infera, conturbando, pacate nunc, & leniter, rem gerendo.

Cui quidem opinioni favet id quod sequitur, cum experientia maxime conveniens, esse nempe virus *Arthriticum* sanguini movendo, *Febri* concitandæ valde per se appositum; quodque raro ut paroxysmus (integrum volo, & numeris absolutum,) sit ἀπύρετος committat. His autem addere proclive est, quod idem, quoties exulare arduum est, orgias in sanguine pertinaces, id est *Febrim* accendat, quoque magis arduum, eo magis pertinaces. Itaque materia, sive *Febrilis*, sive etiam *Arthritica*, utrumque post affectum, tam videlicet *Febrim*, quam *Arthritida* progignere.

IV. Sin a glandulis obstructis (quod aliter loco confirmavi) *Febris* oriatur, miasma tamen *Arthriticum*, in sanguine quiescens, & obstrutum, sive per hanc, sive per aliam quamcumque *Febrilem* effervescentiam, in paroxysmum adigi posse, & impelli, nihil utique vetat, quin etiam verisimile est. Quando per æstum ambulando, equitando, aliore quovis exercitationis genere, adscitum, sive etiam diaphoreticis, interne sumptis, sanguinem exagitantibus, paroxysmum effici posse certissimum est, & frequenti constat experimento.

V. *Arthritidos* hujus a Febre descendens ortum, & natales, quam quæ maxime, illustrant ea, quæ a nobis de *Angina Arthritica* in *Anomaliis* sunt perscripta. Quanquam enim *Angina* illa videatur,

(a) Vide *Synochorum Theoriam Novam*, addam etiam Αἰτιολογικάτω, impressam Londini Anno 1721.

at manifesto sit *Arthritis Anomala*, (quod suo loco divulgabitur) ideoque infra debeat exquiri; tamen in præsentia notari potest, hanc *Arthritidem* non nisi *Febre*, eaque magna, & gravi præcedente, esse.

Ratum igitur esto, & persuasissimum, *Febri*, id est, morbo acuto, non minus certo, quam hydropi, quam lvi venereæ, quam scorbuti, quam morbo hypochondriaco, quam alii cuiusvis affectui, chronico, & diuturno, *Arthritidem*, tamen forte rarius, supervenire.

VI. Ratione paroxysmorum, una est *Arthritis* ex *Febre* nata; quandoquidem illi (ut istam rem video) & inter se, & ab *Arthritidis primigeniæ* paroxysmis haud multum discrepant. Ratione vero ortus, non uno nomine diversa est, & a se dissentiens. Alianum *Arthritis* ex materia *Febrili παροξυσμική*; alia ex tranquilla, & dormiente; alia ex ipsa *Febris* materia; alia ex diversa, & a febrili distincta; sed per *Febrim* in paroxysmum casu & fortuito evecta, procreatur; alia habitudini *πυρεκτική* in *Febrem* crebro erumpenti, sed tandem intercisa; alia *Febris* insultui subijcitur; alia *Febri* continuæ; alia intermittenti; alia denique usitate, & ordinis quadam perpetuitate; alia semel tantum, & quasi casu. Harum ego exempla statim exponam, & ea quæ dicuntur confirmabo experimentis.

VII. De curatione monendum, quod quæ febrili, sive *Ενωχῶ*, (cujus exemplum est insigne) sive *Ενωχῶ*, subijciatur *Arthritis*, sic, ut ea gliscente, & ferociam exercente hæc in conspectum se det, omnidiligentia, summo, quo possumus, studio promovenda est; quo nempe per illius augmentum minuatur *Febris*. Et quidem omne illud, quod, in curanda hujusmodi symptomatica, notat dignum & diligentius persequendum invenitur, in ea provehenda collocatur. Cujus quidem rei, qua perfici possit, methodus, quando toties hoc scripto enarratur, non est, hoc loco quod de illa speciatim agam.

Verum in hujusce *Arthritidis* prophylaxi navanda est opera, ut *Febris* illius, cujus ea symptomatica fœtus est & germen, habeatur ratio. Si habitudine, uti dixi, *Πυρεκτική* *Arthritis* oritur; in eolaborandum, ut istam tum habitudinem, tum *Arthritidem*, efficiens materia, *Venæ sectione*, *Cathartici*, (*lenientibus*, & blandis,) *Aquis Diureticis*, *Dieta Lactea*, & istiusmodi aliis, in *Arthritide Calida* præscribi solitis, exterminetur, corrigatur, prævertatur.

Si *Febri Ερυσιπελατώδε* supervenire, eique crebro (in constitutione cholericâ, quod aliquando exploratum) subesse, gestiat *Arthritis*; cum utrumque morbum, naturæ (sui defensionem molientis, & alienum nunc per ambitum corporis, nunc per articulos expellentis) opus esse cogitandum est, eniti oportebit, ut, dum insultus sit, utrique faveatur; *Febri* scilicet per diaphoreticâ, *Arthritidi*, per cardiacâ, causam utriusque continentem expellendo; & dum vacatio fuerit, causa utriusque antecedens *Aquis Diureticis* eluenda, *Lacte Asinino*, & mediæ materiæ diæta, permulcenda.

Simili fere modo procedendum, si ab ulla alia *Febre* ortum habet *Arthritis*; illius scilicet prophylaxis secundum morbum antecedentem omnino instituenda, & in affectos studiose derivanda.

Hist. 1. Arthritis Synocha - Secundaria.

Mercator Exoniensis, suavissimis moribus, & leni vir ingenio, vultu florido, & constitutione sanguinea donatus, Cereri & Baccho (quod quidem illius temperamenti hominibus familiare) per ætatem mediam indulgendo, favente etiam corporis ad *Arthritidem* inclinatione, hæreditaria, septimum, vel octavum agens ætatis lustum, illa corripiebatur.

Dolor hujus affectionis signum prima acie luculentum, per annos plures *πλανητικός*, hos illos artus pervagatus est, rehenmaticus esse visus; neque prius quam articulis est affixus, arthriticus censebatur. Hic autem dolor, hæc *Arthritis* ita obfirmata est, ut æger, annos habens vix quinquaginta, membra permolestè traheret, gravia scilicet, *δυσκίνητα*.

Catarrhis item, autumnio & hyeme fauces usitate obsidentibus, infestabatur; qui materiam forsitan *Arthriticam* ex aliqua parte dimitterent, & imminuerent.

Sexagenarius prædium petiit suburbanum, ubi ob aerem apricum & bene ventilatum, victu pleniori se implevit. Exinde per biennium, articulis parum doluit; sed coloratior, sed habitior factus est. At, vix arthriticis crassescitibus! Dum ita res erat, & ad morbum aliquem magnum & gravem corpus paratum, ex frigore, mense Octobris 1701. febricitavit, & quidem paulo posthæc infestissime. Algor erat, sopor, lingua subfusca, tussis, dolor lateris, qui sanguinis missionem suadere videretur: febrium mos, per illam tempestatem epidemicorum malus, dissuasit: pulsus ægri languidus & inæqualis, cum voce tremula, suspirio frequenti, spirituum inconstancia repugnarunt.

Ego certe rem mecum volvens, materiam *νοστή*, seu *Febrilem*, seu *Arthriticam*, in ambitum corporis oportere, & quidem commodissime per cardiacâ & diaphoreticâ posse extrudi, febremque optime judicari opinatus, sic præcepi.

℞. Pulv. Lapid. Contray. ℥i. Conf. Lujulæ ℥ss. Syr. Melissoph. q. s. f. Bolus, quarta, sta, vel sta quaque hora (ea scilicet frequentia, quæ ad excitandam diaphoresin suffecerit) assumendus, cum Jul. Hausu.

℞. Aq. Melissæ, lactis Alex. ana ℥vi. Theriac. Epidem., ana ℥iii. Margar. pp. ℥ss. Sacchar. q. s. f. Julap.

℞. Rad. Petasit. ℥ii. Scorzon. Cond. ℥i. Hord. mundat. ℥ss. Coq. in Aq. Font. ℔iv. ad ii. Colature adde Sacch. Crystal. q. s. f. Decoctum Nycthemeri spatio ebibendum.

Ex horum usu sudor extillavit, emanavit; & inter hæc emicuit dolor pedis articularis. Partium mearum esse duxi naturæ obsecundare, & pro virili dolorem intendere, tumorem excitare, materiam artubus infigere. Quocirca *Phenigmm* ex Raf. Radicula, Sem. Sinapios, &c. pedi affecto applicavi. Hinc paroxysmus *Arthritidos* absolutus, dolore vehementi, tumore, ardore; &c. notabili signorum globo stipatus, progrediente paroxysmo, & quidem pro ejus progressu, declinavit febris. Facta denno *απυρεξία*, propter animales spiritus, qua *Febre*, qua *Arthritide*, debilitatos, & pessundatos, propter appetitum debilem, & prostratum, instaurandum, *infusi amari alterantis* haustum bis quotidie potavit.

Tamen omnis *Arthritidos* paroxysmus *Febrim* habet, in prima acie flammam excitantem, & quidem in plethoricis & sanguineis si.

Supplem. ad Sydenham.

mili fere modo, & utriusque mansura, ut qui multum doliturus sit, multum ante febricitet, & contrario; non adeo tamen accendi solet evehique, nec ita perseverare, febris ista *Arthritidis* paroxysmo præludens, ac quæ modo a nobis declarata est. Ideoque febrem istam *Essentialem* esse, tandem in *Arthritida* desinentem, pro certissimo habendum.

Tanti esse judico, isthæc commemorare. Primum, ut ostendam *Arthritida*, non semper ratione totius morbi, sed & unius ratione paroxysmi, posse esse aliquando secundariam.

Deinde, hujus nostræ symptomaticæ paroxysmum, quam maxime possumus, esse promovendum, augendumque, ut illius augmento de morbi primarii, de *Febris* acrimonia & viribus derogeretur.

Hist. 2. De Arthritide Habitudini πυρεκτική Subiecta.

Vixit jampridem apud nos spectabilis & illustris fœmina, vultu vitali, temperamento post hominum memoriam maxime sanguineo, patre prognata *Arthritico*; quæ, dum media ætas ageretur, *Febre*, eaque magna, creberrime revertenti, & raro annum amplius absenti, laceßita est. Quicquid inidonei & naturæ proposito alieni, in sanguine coactum, per illam magnopere, temporibus stas, deturbatum est; sanguis expurgatur; atque adeo res salutis facta testis, & ad tempus aliquot immunis. Cum vero, progressu ætatis, sanguis imbecillior, & efferri minus proclivis erat; *Febris* intercidit, ex eoque tempore (quamvis ægra sæpissime enixa est, nec adhuc fessellere, quinetiam more prorsus salutari fluxere, catamenia) desubito profilit *Arthritis*; non ea quidem frigida, segnis, ignava, lento gradu propens, paroxysmum habens languentem, at diffusum, & ad temporis spatium excurrentem, (qualis solet esse fœminarum) sed e diverso vegeta, sed acuta; quæ calorem habuit universalem intensum, partis affectæ inflammatum; quæ ruborem plane igneum; quæ tumorem insigniter protuberantem; quæ dolorem acriter mordentem; quæ paroxysmi cujusque symptomatica difficilia, gravia, rapidiori gyro exacta; quæ denique paroxysmum brevi circuitu redeuntem, & animi alacritatem articulorum nodos tofaceos, cæteraque *Arthritidis* calidissimæ consummatissimæque vestigia relinquentem est amplexa. At (quod hoc capite præferim observandum) a *Febre* ad *Arthritidem* tam propere, transituque tam exiguo, abripietur ægra, ab incunabulis affecta, ut materiam in sanguine latentem, primum per *Febrem*, ea vero cessante per *Arthritidem* ejici, sine ulla dubitatione statuendum: Sic, ut *Arthritis* superveniat *Febri*, & (quod in præsentia discutiendum) ex istius, quasi cineribus exoriatur.

Hist. 3. De Arthritide, cum Febre Ερυσιπελατώδε vices exercente.

Nobilissimus senex, hypochondriacus, *Arthriticus*, paroxysmos habuit olim frequentes; per biennium ante quam hæc scriberem, nullum. Delinquente verum *Arthritide* regulari, simili proportionem ingruit vertigo; & interdum *Αναισθησία*, ut, his affectibus procedendo longius, æger in humum persæpe caderet; & ne cum damno præcipitaret, summum erat periculum. Quinetiam, membranz, & ligamenta cervicis, per acceptum miasma *Arthriticum*, dolore multum affecta, spasmus identidem riguerunt. Nuper item ventriculus ægrotavit, acidum, ærosum, cholicum ejiciens. Hoc ego tempore accersitus, & hosce capitis affectus, meras esse *Arthritidis* nuper occultatæ anomalias advertens, quæ ad materiam ex capite ducendam, & vel e corpore, vel in artus, sollicitandam, per venæ sectionem, & catharsin, erant necessaria, persequi destinaveram; cum (eccam!) ultro se transfert *Arthritis*: ejus vero, tanquam clavo trabali, sistendæ figendæque gratia, *Phenigmm* in præscriptis dedi.

℞. Fermenti veteris partes iii. Raf. Raph. Sylvestris, Sem. Sinapios. Fimi Columbini ana P. i. cum aceto vini albi ad Cataplasmatibus consistentiam temperentur super linteo duplicato pars calida extendatur, totis utrisque pedibus applicanda; laneis cingenda, cum refrigerit repetenda, donec usque tumor augeatur.

Si ex doloribus Syncope suboriatur, Sp. C. C. gutt. cum Jul. Cardiaci Coch. quatuor vel quinque assumantur.

Horas post duas tumuit utrinque malleolus; ex eoque caput, supra quam dici potest, allevatum. Diu manebat inflammatio; oculi vigor restitutus: capitis tutela est. Istam autem historiam, (aliis certe inscriptionis, si modo dicta perpendamus) huc loci retulimus, quod, de hoc affectu, cum ægroti Medico familiari & domestico, quo tempore nobis sermo intercederet, nuntiavit vir præclarus, omnem hanc *Arthritidem* ex *Febricula* pendere; quæ, eruptionibus quibusdam in cute miliaribus sociata, commode, & cum sanguinis depuratione, vigere, & insultus anniversarios agere solet; nuper autem intermitteret: ea carere cum nequireret æger, sic, ut dictum est, *Arthritide* laboravit.

Hist. 4. Quartanam, Cortice suppressam, Arthritis sequitur cum Arenulis.

Nec continuæ tantummodo, *Febri* etiam *Intermittenti*, pedisse qua est *Arthritis*: Cujus rei historiam, luculentam (Hercules!) & notabilem, ad hæc admiscere non gravabor. Etiamnum in vivis est ob præclare acta vir insignis, qui, ante decennium & quod excurrit, de valetudine, tum præterita, tum eo tempore præsentis, certior me sermone fecit. Fuit illi, robusto a natura & atletico, nec adolescentiam prætergresso, ob tabem forte veneram, (hoc enim subolebat) corpus summe fœdatum, *Κροχουμική* mire inquinatum; sub qua *Προηγμένη* *Febre* primum *Quartana* correptus, eaque tum gravi, tum diutina, conflictatus est: donec cortice (quem *άνω ή κάτω* præcessit catharsis) Peruano levaretur. Nondum hebdomada quartanam siluit, cum inopinato doluit, tumuitque, & quidem tum temporis primum pedis digiti majoris articulus. *Podagra* erat, signis suis diacriticis satis superque manifesta. Ut morbus non tam perimi & deleri, quam sopiri; non tam extirpari, & de medio pelli, quam vultum mutare videatur. Hoc autem casu fieri ne quis existimet, urgente, non ita diu post, eadem necessitate, *Quartana* scilicet recidiva; *Febrifugum* idem cum repetere necessum erat, idem iterum evenit, præclara etenim per

Quartanam exturbandi hostem methodo, natura ejus auxilium molitur, & quidem derepente, (sic, ut prius) per *Arthritidem*.

Cum *Arthritis* ægrum deferuit, depravato sanguine & humorum *εὐχρασία* penitus everfa, substituit sibi alterum in ægro exercendo quasi collegam, *Calculus*. Materia per renes partim expulsa, & eo loci in arenulas coacta, & concreta, vomitum, *εμετῶν*, dolores acerbissimos, cruciatus intolerabiles, induxit, eosque tam frequentes, ut rara sex mensium ab his vacatio; quin affectus hujus vel illius esset insultus; & eorum fere alternatim. Longe hinc agentem quando ita voluit per literas suasi, ut debita præparatione, per venæ sectionem, per utramque catharsin, præmissa, aquis diureticis sanguinem purgaret. Vino, quoniam ei inimicum erat, & per raro impune haustum, penitus abstineret. Quid horum factum sit, quave utilitate, mihi per distantiam omnino latet.

Hist. 5. De *Quartana* in *Arthritidem* mutata.

IN morborum successione & derivationibus explicandis, nullius momenti videatur id, quod de *Quartana* in *Arthritidem* mutata, altero jam exemplo, proferetur. Vitam hoc tempore apud nos urbanam sequitur, insigni probitate, nec quo melior est, homo; qui, cum media circiter ætate esset, per autumnos septem ex aliis aliis, ut ab ipso audivi, laboraverat *Quartana*: exeunte Anno 1696. misere torquebatur. Ut ægro natura imbecillo debili que primo quoque tempore Medicus subveniret, per *Decoctum Corticis*, & *Opiata*, morbum sufflaminavit, *paroxysmos* ejus suppressit: quæ ad auferendam, & expellendam morbi materiam opus essent, iis ad tempus opportunum & magis idoneum necessario dilatis. Non defuerunt, qui *paroxysmis* liberato, & immuni, ut a reliquiis *Febribus* eum tuerentur, certissimum probatissimumque hac in re auxilium, *Acidulas* proponebant, & tantum inducias, non autem pacem, inire morbum, acriter urgebant. Hisce vero posthabitis vitæ genus quietum, neque laboriosum satis agens, ab *Arthritide*, quam antea parvam, & mediocrem tulit, gravi nunc & molesta non ita post defecit. Recurrit *Arthritis Quartana* copiis adjuncta, tum multo fortior, tum item frequentior: variis postea symptomatibus signata, morem varium affecuta, donec æger *Arthritide*, *Quartana* viribus adaucta, depressus, nec ab imbecillitate ei vel tolerandæ, vel curendæ par, e vivis excessit.

C A P U T X.

De *Arthritide* ex *Colica*.

Art. I. **A**ffectio *Colica*, sic a veteribus ab intestino *Colo* nominata (quamvis *Cæcum*, & *Tenue* quodque intestinum, imo *Ventriculum* eodem affici certissimum est) hisce regionibus adeo grassatur, ut in morbis hujus populi pervagatissimis, tanquam vernaculus habeatur.

Prætermissa vero *Colica*, cum fortuita, tum symptomata, tum hysterica pure dicta, aliisque ejus speciebus, quæ ad Dionysum nostrum nequaquam pertinent; ut de illa tantum, quæ *Arthritidem* præcurrere, in eamque (falsam & mendacem) mutari solet, faciam sermonem, est illa diuturna, alvo plerumque dura, creberrimis interdum *Dejectiunculis* soluta, dolore potius constanti & obtuso, quam acri & acuto signata; nec non eos potissimum invadit, quibus *Intestinalis* fistula mucro parum oblita, vel quibus illius fibræ tenuiores, vel spiritus hæc incolentes sunt teneriores; citoque irritabiles. Quique ad hoc morbi homines a natura proni sunt, ex pravo victu, frigore vel *Δυσψία*, causis hac in re procatarteticis, in eum præcipitant.

II. Quoniam vero *Colica*, quæ *Arthritidem* antecedit, natura multiplex & diversa est, ut de hac aperte & luculenter dicam, de variis illius membris omnino aliquid differendum.

Alia igitur, a materia peccante, *Biliofa* dicitur, & ei qui proclives sunt ætate adulta, maxime vero si natura *δυσπραγχοί* sunt, & cœli æstus, aut iniqua victus ratio præcessit, torminibus primum, deinde nausea, sapore ingrato, amaro, & vomitione postmodum *Cholerica*, premuntur. Alvus his diebus astricta, at incommoda. Urina rufa; faciei, sed oculorum præcipue, quod album esse debuerat, fit luteum. In bilis per os ejectione peculiare aliquid notandum, quod in scrupulis positum nonnunquam ægrum male habet: a sumpto quippe emetico, nifus & conatus inter robustissimos, bilis sæpe ne hilum ejicitur, quæ tamen prompta alias & absque stimulo libere solet exterminari. Bilis hæc incerta per os emissio, ejus in duodenum vel saltem in ventriculum impulsio flumini similiter incerto, videtur respondere. Cum intestinis inhærendo ea diu laceffivit, ab alvi duritie suppressa & retenta, sanguinem redux per lacteas subintrat, eumque tam incedit, ut hoc tempore febriculam, æstu sitique immodica, urina ictérica ex luteo rubenti, cute arida & densa, pulsu frequenti, & elato, manifestam, liceat observare, per sanguinem materia ad caput usitate fertur, & *ὕπερῶν* atrocissime impetens, aut ægrum apoplexia percussum derepente interimit, aut in nervos se insinuans eos resolvit.

III. Hoc, inquam, morbi hujus *ἄσος* & *ἴσος* ordinarium est, verum aliquoties, certè plus semel notavi, post istiusmodi, quam modo dixi, dierum aliquot febriculam, dolere, tumereque, interdum etiam ardere, partium extremarum articulos; idque, signorum sive complexum ponderibus suis, sive ordinem examinemus, more prorsus *Arthritico*.

Qua vero proportionem fulget efferturque hæc *Arthritis* normam per artus & articulos extollens, eadem plane caput defenditur. Ut ea quam fausta quantaque ægri cum utilitate oriatur, illis solum innotescit, qui ex hac parte *Arthritidis* mala, tametsi gravia, tolerabilia tamen; ex illa vero bilis caput invadentis sævitiam; ad eaque hujus periculum, intime perspectum habeant; qui, inquam, hæc cum illis opposita conferant, æquaque lance perpendant.

Quin etiam de capite conservato quæ a nobis traduntur, de intestinis item proponi poterunt; eatenus certe, ut, quemadmodum materiam peccantem artus suscipiant, ad eandem modum ea liberentur intestina; & ex eadem translata, & pro ejus mensura levetur *Colica*; quoque plus ægri dolent articulis, eo minus interaneis.

IV. *Colica Biliofa*, cum *ἐπιγύρεται* *Arthritis*, in eo medicam locari decet operam, eam præferri indicationem, qua externis quibuscunque materia foras ejectionetur. Quæ ad hanc rem auxilia, nostris

hominibus explorata profuere, per ea, toties hoc scripto passim memorata, non est hoc tempore ut percurram. Sed, quæ hujus curationis quadam proprietas est, cardiaca interna, utut aliis curationibus ad paroxysmum conciliandum idonea, hic loci vel prorsus omitti, vel caute admodum usurpari par est; ne, incitata febre, & mutata simul inclinatione materiæ, confertim ea in cerebrum impellatur. Quem utique impulsu eo magis perhorrescas, quod huic affectui primario (*Colica* nempe *Biliofa*) jure quodam avito proprius esse reperitur; tum quod istius materiæ in artus expressio non ita familiaris sit, aut morborum ordini tam conveniens, immo potius fortuito facta, & facillime abscindenda.

V. Alia vero *Colica*, apud *Damnonium*, ex pomaceo immiti & acido, nimis usurpato, derivatur, id quod ex eo liquet, siquidem illos solum infestat, qui potioni isti assuevere, eademque ratione quæ sunt assueti: sic, ut iis tempestatibus, quæ pomaceo abundant, crescat & in vulgus ea grassetur. Contra vero, Pomona copiam negante, rarius obversetur.

Septimo & octavo ætatis lustro sæpe *Colica* tentantur ii, qui vinum hoc indigena potare soleant, itaque pergræcari: Et, ubi illa confirmatur & jam inveterascit, non raro *Colica* suppullulat *Arthritis*, cum articulorum *ὀδὸν* & *ἔλεον* dolore, tumore, cæteroque apparatu, ad puræ & genuinæ *Arthritidis* faciem ordinato.

VI. Istam metamorphosin, in iis corporibus, quæ *Arthritidi* parata jam olim habuit, natura per se nonnunquam molitur, sæpe vero numero per causam aliquam evidentem & procatarteticam, virus irritantem & extra propellentem. Hujus autem generis esse solet perdrastica, & supra modum elateria, purgatio: illa enim corpori inimica, non tam peccantem, & pravum expellunt humorem, quam universum sanguinem exagitant, & perturbant: cui demum motui & perturbationi (pari propenodum more, atque de *Asthmatica*, de *Hydropica*, aliisque pluribus symptomatibus, supra declaratum est) creberrime substituitur *Arthritis*. Et ab hisce pharmacis *ἀρίχνης* sumptis, aliquam multi *Colici* *Πόδαγρον*.

Nonnunquam usu venit, ut ex cardiacis (*Aqua* puta *Mirabili*, *Ufquebac*, *Theriaca Andromachi*, *Zinzibere*, *Chalybe*, aliisque id genus) actu vel potentia calidis, adversus *Colicam*, vel præsentem permulcendam, vel quiescentem abigendam, adhibitis, ex ventriculo & intestinis in artus amandetur aliena sanguini materia, & in iis munus & officium colat usquequaque *Arthriticum*.

VII. Habet hæc *Arthritis* dolorem, præ quod in aliis plerisque *Symptomaticis*, acutum; sed ab *Arthritide* recta, & genuina, tum item omnibus *Symptomaticis* eo primum distinguitur, quod in *Colicam* ex facili revertatur, iterumque *Arthritidos* personam capiat, iterumque deponat. (Enim vero materia *νοσέει*, intestina, & artus vicissim premens, morbos hosce, *Colicam* & *Arthritida*, mutuo se excipere facit & alternare:) Deinde articulorum oppilationes, steatomata, abscessus, tofi, ulcera, quæ exquisitæ *Arthritidi* crebro *Secundaria* hujus nostræ raro accedunt: quod, ex materia partim per anum expulsa, partim intestinis dolore inurente, sicque articulis parcente, fieri credibile est.

VIII. Est & alia, *Podagra* gignendæ apta, quæ a *Dyspepsis* emanat, *Colica*. Qui ad tuendam alendamque vitam ingeritur victus, etsi nec qualitate, nec quantitate peccet, propter vitiatam coctionem, in massam turpem degenerat; in virosam, & inimicam: deest cibi ventriculo sine tumultu concoctio sive liquatio, tranquilla, facilis, & perfecta: deest ejusdem in putredinem versi, motus per intestina lenis, certus, æquabilis: defunt, inter duras & liquidas dejectiones figuratæ, hora consueta exclusæ, nimirum laudabiles: quæ, naturæ rectum agentis semper comites, ejus œconomiz monstrant integritatem. Sede contrario adest a cibo gravitas, inflatio, rufus: massæ adest inutilis, spumosa, & cruditatibus plenæ, tum acrimonia, tum ab ea *σπόροι*, vel contorfiones interaneorum ærumnosa: adfunt denique dejectiones, vel plures, vel pauciores, nunc liquidæ nimium, nunc coactæ, naturæ modum hac vel illac excedentes; cum defurgendi cupiditate importuna, doloreque ani; & aliis accidentibus, quæ coctionem depravari, & ejus officinam a κατὰ φύσιν descivisse, planum faciunt, & magnopere probant.

IX. Qui sunt hujusmodi *Κατὰ φύσιν*, provecta ætate, aliquando tandem *Arthritide* vexantur, ea, quæ jam delineatam opere quam maximo repræsentat; ab aliis vero *Symptomaticis* distat longissime. Illius instar *Colicam* exceptat, quoties catharticis fortioribus, vel cardiacis, ad exteriora mali materia protruditur; tum a *Colica* excipitur, quoties materia, vel ad intestina retroceditur, vel in primis viis de novo generatur: quorum alterum sæpe, & ex facili fit; alterum quotidie.

X. Si quis autem *Arthritidem*, *Colica* hujus vel istius profapia supervenientem, non tam *Symptomaticam*, & *Secundariam*, quam *Primigeniam*, esse contenderet; ipsamque *Colicam* (aliter atque prima facie videretur) *Arthritidem* esse, sed anomalam, & demum regularem; profecto quidem hac in parte neque difficilem me inveniet, neque vehementer repugnantem; ut neque temere concedentem. Dubium esse fateor, vel Apolline dignum, & nodum *Æsculapio* vindice. Nihil habent symptomata, quod λόγος ἀνυπακίστος alterutrinque fidem hac in re conciliet; atque adeo, dum ista silent, præcise aliquid statuere temerarium habeatur. Utunque sit, haud minori jure *Symptomatica* esse confirmetur hæc *Arthritis*, ac contra negetur: immo quidem majori; propterea quoniam *Colicam* manifeste insequitur, eamque sæpe veterem, & (quantum hac in re perspicere datum est) genuinam, & exquisitam: verum utut res se habeat, in arte factitanda eodem fere recidit; nam dubiæ hujus *Arthritidos*, nunc intestina, nunc artus infestantis, pro duabus istis sedibus, & ab altera ad alteram illius migrationibus, curatio propria ac peculiaris excogitanda est; nec in hac *Arthritide* sananda depellendaque medicinam uti decet, quis exercuerit, nisi *Colicam*, cui ea subjicitur, ob oculos posuerit, & ex hujus consideratione illam vincere tentaverit.

XI. Hanc ad normam agenti consentaneum videtur, sive a pomaceo, vino subacido, cerevisia veteri, vel a dyspepsia proficiscenti. *Colica* *Arthritis* subnascatur, quod paroxysmi ferme eadem, ac in *Arthritide* exquisita, medendi ratio; prophylaxeos autem alia atque alia, est, pro causæ remotioris diversitate: verum, ac in *Colica* *Arthritica*, nequaquam alia. Ubi in poculis erratum, mos ille perniciosissimus primo quoque tempore abruptendus: tum quod intus alieni, iterata catharsis deducendum. Hunc in finem aquæ purgantes, per se, vel,

vel, cum *δυσλυσία* postulaverit, per salem catharticum adjuncta; conducunt egregie. Quotiescumque vero *Colicam* a dyspepsia sequitur *Arthritis*, coctionis *Εργασίαν* bene & frequenter purgari, coctionem digestivis stabiliri, pari fere ritu atque in *Arthritidos Exquisitae* prophylaxi, oportebit.

XII. Novissime corollarii loco addam, hujus tribus *Symptomatis* præter cæteras sui generis quascumque, præter *Arthritidem* exquisitam, omnibus hoc commune esse, quod istarum paroxysmi per eccoprotica subin iterata maxime, vel præcaventur, vel saltem minuuntur.

Histor. I. *Arthritis Colicæ Biliosæ Secundaria.*

Fœmina quædam, constitutione post hominum memoriam maxime *Cholerica*, nunquam ei τῷ γαστρὶ ἐχυσσά, sub ætatis flexum, *Colica* pertinaci *Biliosa*, cum ingrato sapore, *Δυσκοπεία*, vomitu bilis frequenti, dejectionibus raris, & parum coloratis, urina rufa, ore luteo, & lenta quadam febricula premebatur. Horum autem malorum procatasticam habuit errorem in victu assiduum, ut puta crassorum, & *δυσπύπτα* estrix. Ubi alvum inanientibus (præsentissimo illi remedio) plus semel levaretur *Colica*, ex bilis incremento, constantiaque & acrimonia, menses post aliquot, iterum & sæpius, recidiva est. Fugiente sæculo superiori, cum affectui gravi tollendo tempus aliquod apud nos impenderet, præter *Colicam* memoratam, pedum item orta est debilitas; quæ primo aspectu paralyticam, hujusmodi *Colicæ ἐπιπύρριμα* familiarissimum, prædicere videretur. Quo per anum bilis exularet, neque se in nervos insinuare permetteretur, catharticum adhibui. Iteratum inscutus est utriusque (sed potissime dextri) pedis tumor, malleolum, & pedis convexum, hallucem autem præcipue, distendens; quem comitabatur hujus majoris articuli tenerritudo mirifica, dolor pungens, rubor, ardor revera *Arthriticus*. Per æqua vero proportione increvit *Arthritis*, qua minuitur *Colica*. Cum de suis exinde interponerem, matre admodum *Cholerica*, & demum *Arthritica*, fuisse prognatam, veterique *Arthritico* diutius junctam accipi, sic, ut vitium partim hæreditarium, partim contagiosum esse suspicari liceat. Recte se habent muliebria; & cum *περὶ πόδα*.

Ad medicinam morbi genio accommodandam, in eo fui, ut materiam, quo possim artificio, extra dimoveam; ideoque internis eam protrudentibus, externis eam invitantibus, diversis scilicet diverso modo idem operantibus, insisto; ut & toti malleolo, & dextri pedis summitati, *Epispasticum* imponi; sinistram pedem laneis involvi, calideque vestiri: & paulo postea soccos, ex cerato illo viridi, quo fiunt petafothecæ, perpetuo gestari jubeo. Unde exudavit humor, nec inutiliter: quandiu enim perduravit iste fluxus, recessit usque *Colica* & visa est declinare.

Erat autem ista, per articulos, crisis imperfecta; quod reliquum erat materiam, finita re *Arthritica*, & ejus spe fallente omni, a vitos intra limites se recepit, moreque proprio agens caput est adortum: ideoque de hujus ægrotæ malo non est quod amplius addam: unum istud volui, ex *Colica Biliosæ* posse *Arthritidem* exoriri.

Histor. 2. *Arthritis Colicæ ex Pomaceo ἐπιπύρριμα*.

Vir amplissimus, animi & fortunæ dotibus insignis, natu integerrimus, ætate constanti, venatione aliisque exercitationibus otiose, & raro se fatigans, poculis plus solito indulgere cœpit. Ex temperamento sanguinis præfervido, in deliciis habuit pomaceum, vinum indigena; propterea quod, (defæctum modo, & tenue) absque sanguinis immodico fervore, pro illius natura potionis, hilaritate animum perfudit. Nondum ita diu indulsit, cum, dolore *Colico*, & annos aliquot deinde post *Arthritico*, teneretur, utroque interdum magno, sed tolerabili. Sic se habuerunt hi affectus, ut semel quidem unquam concurrerent; ut nec vices, aut periodos remeandi certos unquam exercebant; contra, nullo ordine (pro materia, vel in intestinis, vel in sanguine ex causa evidenti congesta, & ad ἀκμήν evecta) ægrotum alter, & alter occuparet; interea temporis notatu erat facillimum, *Arthritidem* hanc, ab ipsissima *Colicæ* materia, in artus translata, haud dubie fieri. Itaque se rem habere in propatulo fuit, tam ex eo quod *Arthritis* sæpenumero *Colicam* exciperet, eamque (sic, ut duratio paroxysmi erat) mitigaret; quam etiam, ab eadem ægrotum quod ad tempus aliquod defendere cerneretur.

De vitanda morbi hujus utriusque προφάση vir nobilis non nimis sollicitus, solito ex more egit. Prophylaxin autem utilem, efficacem, simplicemque Deus illi fortunavit. Quoties enim dolor intestinorum ingrueret, inter ipsa ejus initia ut occurrat, *Syrupi Domestici* præter propter unicam idoneo vehiculo temperatam, hauriendo; morbum ei καὶ πρὸς præcidit; contudit, fregit. Quid? quod eo ipso causam *Arthritidis* προπύρριμα primis viis avulsit. Ceterum, vere & autumnino, aliasque quoties intestinorum inflatio, æstus corporis universalis, & plethora (quæ materiam recrudescere, & gliscere indicavit) exigere videretur, aquas *Alfordenses* in se ingurgitando, fistulæ intestinali proluendæ satagebat: adeoque *Colica* causam conjunctam, *Arthritidos* remotam, amovendo, utriusque sævitiam magna ex parte antevertit.

Neque mitti oportebit, quod ex frequenti materiam *πλεονεξία*, & *Arthritidos* paroxysmis (qui per annos plus viginti creberrimi fuerunt, ut & regulares) tametsi articulos hodie corruptos, recrementis *Arthriticis* distentos (neque temere) quibus expectare potuisset, vir hic egregius aliter multo pedes, manus, habiles exercet; eorum usquequaque compos impræsentiarum est, & quantum præsentione possum assequi futurus.

Histor. 3. *Colicæ, ex Dyspepsia diuturna, Gonagra superveniens.*

Matrona quædam *Colico* dolore, annos pene viginti conflictata est, ut raro mensiem immunis ageret; ut indies propemodum gravaretur. Torquebantur intestina, & post vermiculationes unius circiter horæ *αἰεττωμα* quoddam acre & pungens, non sine dolore sphincteris acutissimo, quantitate modica dejici solebat: dejectiones secuta est spirituum submissio, sive languor, incredibilis; unde in lectum se projicere, quocumque fors permetteret, medio interdum itinere, donec ægra somno, vel quiete, vires integraret, identidem necesse habuit. Deficienti maxime profuerat cardiacum, vel *acta* *Sydenham Opera Medica*.

lidum aliquid pytissare. Post breve deliquium, vitæ munia sicuti prius, repetiit. Cibum sic satis sumpsit, & quamvis eo, ut dixi, more crebro lacescita est, vires & colorem retinuit. Plures illa Medicos (doctos, Jupiter! & exercitatos) hac de re consuluit; quibus, ut ipsa mihi renunciavit, communis erat, quæ & maxime probabilis, sententia, *Colicam* hanc a *Dyspepsia* proficisci. Sub finem anni supra quam moris erat, urgebat *Colica*, & hysterica affectione sociata dominam valde emaciata, debilem, languentem pene confecerat. Nihil potius illius causa volui, quam alvum aperientibus expurgare materiam, turbas illic concitatas, & inquietem paregoricis sopire, & componere; cumque restituissem, ut tenerem quem cœperam locum, & ægram fido tuerer prophylactico, *Decocti Corticis Martiati* haustum, bis vel ter in singulos dies propinavi.

Habet illud *Decoctum pul. patrum*, & *Limaturæ Ferri ana ℥j. in Aquæ pluvie ℔viii. coquantur ad ij. per pannum Wallicum fit Colatura*; Cujus ℥ij. adduntur Aq. Hysterice Londinensium ℥ij. Tinct. Aurant. gut. x. Syr. Garyoph. q. s. fit in usum præfinitum Haustus. Remedium hoc, ad menses aliquot, ad congios plures usurpatum, magnum attulit momentum. Melius inde perfectiusque concoxit ægrotæ; rarius & tolerabilius doluit; bonis erat viribus.

Æstate proxima, majoris utilitatis spe allecta, ad aquas se recepit, quas antea commode adversus hunc affectum hauserat, *Tanbri-genses*. Martiatorum, quæ præparatorum, quæ naturalium, usu, partim etiam curus agitatione millaria quadringenta brevi spatio mentientis (quod hercle vero proximum) in artus statim ab itinere, propellitur materia *πύρριμα*. Erat utrumque genu natura imbecille, nec ad motum, maxime ad declivem, idoneum satis. Utrumque obtorpebat, nec absque dolore fletebatur: dolori adjunctus est utrinque tumor, cum mira debilitate, & motu læso; rubor autem nullus, ex temperamento corporis (quod opinor) frigido, neque ardor ullus apparebat, sed tumor, qualis solet esset frigida *Arthritidis*; Interea temporis πῶς ἐντέροις adeo prorsus integra est, ut nunquam magis.

Ut *Gonagra*, morbo *Colico* hunc in modum ἐπιπύρριμα, pro facultate mederer; utriusque affectus habita ratione, *Aquam* adhibui *Spidanam*; cujus ampullam modice tepesactam, instillatis cuilibet ℔℥. Sp. vol. ol. gutt. aliquot horas inter sextam, & novam, omni mane exsiccavit.

Decima seq. *Vini albi Lusitanici* Haustum, *Gentianæ Zedoariæque* Infuso alteratum; *Quarta pomæ* *Decocti Cort. Martiati* Haustum, cum Hibernorum *Ussquebach* pauxillo. Quinimo, septima quaque die (quoniam illud *Tormina*, subinde recurrentia, postularunt) Catharticum e *Calomel.* ℔℥. Extr. *Eustach.* ℔j. Scam. pul. *Castor.* *Assæ* foetid. solut. ana gr. v. diluculo sumendum. *Vesperis Bolum e Ther. Androm.* ℥℥. *Zinzib.* in Indiis Cond. Conf. Fruct. *Cynorrhod.* ana ℔℥. Syr. *Aurant.* q. s. cum *Aquis idoneis* & *Diacod.* ℥℥.

His auxiliis, quæ per renes, quæ per anum, emissæ est causa *Gonagra* conjuncta; utriusque genu tumor subsidit: *Colicæ* item materiam, cum emolumento ægrotæ lauto & locupleti, tum ejici, tum ex parte aliqua præcaveri constat.

Non est autem reticendum, quod ex dyspepsia brevi tempore recurrente, denuoque materiam ministrante, *Colica* recruduit; & femoris dextri internodium menses inde post aliquot infestavit dolor; idem fere ac si *Rheumaticus*; vagus certe, quippe qui ad acetabulum coxendicis sensim ascenderet. Hunc comitabatur ejusdem *Pedis* (late sumpti) totius debilitas: qui tamen dolor &c. non alius esse jure potiori censeatur, quam *Arthriticus*, ex materia recens orta partem nuper affectam, & eo nomine debilitatam, occupante.

Hisce vero diebus, anno nempe 1702. *Gonagra*, & omne genus *Arthritide* immunis ægra, affectionibus interdum *Colicis*, at frequentissime hystericeis, quibus olim per *Gonagram* utriusque liberabatur, afflicta, aquis prædictis usa est, & fructum ex ea re ingentem retulit.

Hist. 4. Ex *Colica Paralytica, Arthritica, Inunctione trucidatus.*

Dominus R. propter viam *Apsamensem*, ætatis flore, *Colica*, quam *Pistoniam* appellant, aliquandiu gravatus, ex more & progressu istius mali ordinario, incidit in *Paralytin*, artus exinde marcidos, graciles, ἀκίνητος habens, per reliquum vitæ clinicus, *Paralyti*, sub ejus initium, accesserunt dolores erratici, incerti, horum illorum artuum internodia cruciantes, autumnino & tempestate pluvia maximopere sevientes, & tam ad amussim *Rheumatismum* simulantes, ut æger eo morbi plus decennium ægrotasse (Medico, nec indocto, nec inexercitato, tota cum vicinia consentiente) passim haberetur.

Cum ætas præcipitavit, dolor iste vagus in fixum mutatus est articulo-juxta positorum, & nova symptomatum cohorte stipatum; id est, tumore, rubore, lavore, &c. quæ cum *Arthritidem* eo loci jam esse *Fixam*, cum a decennio fuisse *Παρυρικήν*, vel luce clarius ostenderunt. Materia in articulos impulsæ, & *Arthriticis* ibi paroxysmos faciente, perrarum aliquod, notatuque dignum, observare licuit; artus scilicet eosdem ex *Paralyti* flaccidos, macerrimos, tantum non emortuos; ex *Arthritide* floridos, inflammatos, vegetæ & vitalis vitæ indicia commonstrantes.

Cum eo loci res erat; perfectæ (videlicet;) consummataque curationis spe deceptus, circumforaneo cuidam, hominum impudentissimo, nec quidem vulgi stupore nobili, se vitamque suam commisit. Hic factum tectum protinus ut ægrotum redderet, membrorumque omnium omnino compotem, *Unguento* illa nescio quo (*Mercuriali*, ansecus,) oblinivit. Quid exinde factum est? Qui per annos aliquam multos, si vitæ momenta perpendamus, sic satis habuit, (bene enim appetere, concoquere, dormire, generare; similiaque eum officia recte obisse, certo certius est) ista inunctione absque ulla concurrente causa, tanquam *Asthmate*, suffocatus, animam agere cœpit, & aliquanto postea expiravit.

C A P U T XI.

De *Arthritide*, Morbis quibusdam Cuticularibus subiecta.

Art. I. Quæ suppressioni *Gonorrhææ* virulentæ subijcitur *Arthritis*, ad luem ea pertinet veneream; cujus quidem mali

illa suppressio in causa est, & cui *Arthritis* illa proxime succedit. Quæ scabiem *Scorbuti* flammeam, quæ *Patursæ* siccam, quæ *Febris Eruptionem Miliarem* sequitur, ea non tam horum symptomatum, quam ipsorum est morborum *Επιρρημα*: nec ea re huiusce loci. Quæ *Achoribus*, quæ *Hæmorrhoidibus*, quæ *Ulceribus*, aridis & siccatis superest, illa hoc capite perstringenda est.

II. De affectibus huius *Symptomata* primariis generatim acceptis primum observandum est, quod multa naturæ opera & labore, illi (uti *Arthritidum Symptomatarum* morbi primarii plerique omnes) materiam, quam habent ineptam, inidoneam, & alienam, in ambitum corporis expellunt, ibique exterminant. Quo quidem nomine, cum *Arthritide Primigenia* recta, & legitima ad amissum concordant.

Tum, de his notandum, quod, quoties eorum materia, seu vitio pleno & immoderato, sive otio adaucta, per excernicula priora minime expressa, in sanguine cumulata fuerit, ex ea sanguis discordiam, & turbas subit, supra naturæ modum vehementes, atque his succedit alieni per articulos expulsio, id est, ipsa, quam dicimus, *Arthritis Symptomata*.

Deinde advertendum, quod *Arthritico* durante paroxysmo primariæ maxima ex parte conquiescunt affectiones; sistuntur evacuationes istæ morbosæ, latentes isti exiccantur: eo vero ad exitum perducto, scaturiunt denuo, & quidem tantisper, dum nova repullulante, & urgente materia, prælium redintegretur, & *Αῖψις Arthritica* revertatur.

III. Ex eo vero, quod *Symptomata* hæc nostra morbo semper alicui externo submittatur, primum est conjicere, eadem illa, cum primario suo, sed aucta, sed in orgasinum majorem evecta, & per excerniculum insolitum, id est, articulos expulsa, gaudere materia: necnon exinde tum a reliquis *Symptomatis*, tum ab *Arthritide Primigenia*, vel prima facie distingui.

Sufficiunt enim, ex Institutis nostri ratione, morbi huius derivationes successionesque, propter quas in *Symptomatarum* numero ille censetur; tametsi concedamus (quod tamen non concedimus) materiam ejus cum pure *Arthritica* revera *Specie* convenire. Et quæ res est, ut plane & latine dicam, ex huiusce morbi ortu & metamorphosi quam facillima, ex ejus concordantia, & similitudine cum *Arthritide Primigenia*, vel eandem his utrisque esse materiam, alio corpore in ano, alio in tibiis, alio in auribus, *αὐτομάτως*, postea vero in artubus, *ὁπθώς*, se gerentem; vel *Symptomata* huius nostræ materiam esse, *Arthritica* illi longe simillimam, & germanissimam, existimandum est. Et quia hæc *Arthritis* vel ipsa est *Primigenia*, vel ei quam simillima, idcirco de illa postremo hoc loco differuimus.

IV. *Symptomata* tam peculiaris subjicienda est curationi quodammodo peculiari. Etiam si enim in ejus paroxysmis eadem mendedi ratio, & in eorum intervallis idem visus, ac in *Arthritide Primigenia* valebit; in iis tamen alia locum merebitur, immo vindicabit, quæ huic affectioni propria est medicina, mirum quantum a prædictarum methodis varianda.

Nihil enim ægro per vacationes paroxysmorum commodius, aut quod adjumenti plus contulerit, quam ut morbus, quicumque fuerit primarius, sustentetur, alatur: ut e. g. *Ulcus*, siquod extiterit *Cuticulare*, ne carne obducatur aut arefiat, per *Cathetica* sive carnem modice rodentia, eniti. Placet hunc in finem *Aqua Viridis* exedens *Barbettiæ*.

Ad *Achores* revocandos *Epispastica* prope aures applicentur; vel lenia quædam *Attrahentia*, quæ humorem illuc peccantem & vitiosum invitent, eliciant.

Ut *Hæmorrhoides* aperiantur usui esse possunt *Aloetica* interne adhibita, externe vero *Hirudines*.

Quemadmodum salutare sunt evacuationes, per *Ulceræ*, per *Achores*, per *Hæmorrhoides*, hæc prædictæ, ideoque promovendæ, ita quidem, si hydrops, colica, tussis, apoplexia, vel siquid aliud mali, ex earum suppressione oriri videatur, omnino necessariæ sunt, & primo quoque tempore consciscendæ.

Atque ista volui de *Arthritide Morbis his externis* supervenienti, quæ pro eorum numero multiplex habenda, & diversa: Hoc autem capite, propter eorum convenientiam & *Arthritidum* iis enatarum vicinitatem, ac si una tantum esset, explicatur.

Hist. 1. De Arthritide Aurium Achoribus subiecta.

Currente sæculo priori, *Damnonio* hoc *Orientali* florebat ordine equestri gens, humanitate, opibus, & pietate insignis, illoque tantum nomine infelix, quod ea tota, tam fœminæ quam mares (erant autem illæ quamplurimæ) *Podagra* miserrime torquerentur.

Harum una, articulos non adeo graviter affectos habens, dolore, artus alios aliosque perreptante, multos annos est afflicta. *Rheumatismi* nomine, pro vulgi more, malum isthuc appellatum est, quod tamen potius *Arthritis Vaga* æstimandum. Decedente eo tussis exoriebatur, facta in pulmonem materiam *μεταπτώσις*, & phthisi paulo post occubuit.

Huius *Arthritica* filius jam quadrimus aurium morbo tentabatur; ex omni parte tumuerunt illæ; præcipue vero *Helix*. Tumor initio ruber & *φλεγμονώδης*, brevi exinde tempore subalbicans. Serum illud acre, quod intus contentum, in tumorem cutim extulit; fibras autem cuticulares fodiendo, spiritusque earum incolas irritando, pruritum immanem, perpetuum & fere intolerabilem excitavit; in crustam posthæc albidiorum condensatum est; quæ quidem crusta, demum exarefacta, & in squamulas divisa, decidit; relicto loco, tanquam a variolarum frustulis, inflammato. Confertissima erant huiusmodi excrementa, & quidem adeo crebra, ut propemodum perpetua viderentur. Veteri subito nova messis successit; pro materiæ peccantis abundantia, & cæli humiditate (quæ ad huiusmodi *ρύσεις* contribuere notabatur) major *Ichor* autem, quando largiter profluxit, non sine fœtore erat gravissimo, naribusque ingratisimo: ea spes amicorum erat, ut ætate progrediente listeretur iste fluxus, & quidem tuto; ex eoque annis puerilibus ita profuso, melius & tutius augeretur quod vitæ reliquum.

Ineunte quidem adolescentia, forsitan ob exercitationes eo tempore vehementiores, fluxus est remissior: at annorum vix triginta, vir sobrius, neque *Veneri*, neque *Baccho* deditus, *Arthritide* corripitur, post homines natos acerbissima. Per idem tempus aurium il-

la affectio major recurrit, sed cum *Arthritidos* paroxysmis vices habens alternatas. Horum enim vacationibus scaturiunt aures, at natura paroxysmum moliente, ad eumque sese, quasi accingente, siccantur hæ; & ab his siccatis, instantis paroxysmi non leve ortum est indicium.

Hæc sunt, quæ de huius *Arthritidis* ortu & derivatione dicenda habui; quæque si recte judico, illius generis eam esse ostendunt, cujus materia partim per *Achores*, partim per *Articulos* expellitur: eaque ratione, quod ordinario, priorilla sufficiat evacuatio, quamprimum autem *ὕπερ μέτρον* in sanguine cumulata & congesta fuerit materia, itemque ad exilium parata, paroxysmum illa conciter *Arthriticum*. Sic, ut materiæ ad hanc vel illam partem determinatio, ex ejus quantitate & naturæ nisu fortiori, prorsus pendeat. Si vero ipsam spectemus materiam, esse illam, utrique harum pari fere mensura propensam, & æqualiter faventem.

Sunt autem alia, quæ cum aliis quibusdam *Arthriticis* huic nostro communia, memoratu digna censeantur. Primum, præter labem hæreditariam modo dictam, causam huius & *Arthritidos* & *Achores* autecedentem esse procul dubio *Dyspepsiam*: Cibo enim difficili (porcina, bubula, & istiusmodi alii) nimium delectabatur; is autem ventriculo minime confectus, simul cum corpore morbum alere judicetur. His addendum ægri genus vitæ otiosum, neglectis scil. exercitationibus, quibus juniores satietatis mala seu prævertunt, seu refarciunt. Otio facta est (quod tertio notandum) perspirationis diminutio; cuticulæ universæ, manuum vero præsertim, ariditas unde humores intus retinentur; unde malorum ilias, urina huic ægro in paroxysmo pro doloris & inflammationis ratione rufula, alias straminea, semper autem pro quantitate poculenti larga. Ingruente pluvia semper ille venarum distensionem, sanguinis orgasum, corporis hebetudinem persensit. Complures ille periclitatus est, per *Aquas Bathonienses*, per *Cathartica*, sanguinem expurgandi methodos. Nulla vero profuit. Adeo illi sanguis intractabilis, & *δυσμεταβλητός*. In cibo *δὲ χύμα* & *δὲ πύρρον* parce sumpto, quo morbi causa præpediretur, spes sita erat prophylactica. Ille vero Cereri indulgens, & quicquid gratum erat, utut difficile cocto, denittens, bis terve anno ferme omni desedit *Arthritide*.

Unum adjiciam, quod huic ægro proprium esse videatur; *Arthritida* nempe aliquando dextram invadere patellam: drachmæ occupare spatium: per dies aliquot durare: paroxysmum autem insequentem, diuturnum esse, gravem, genuque labefactare, & valde imbecillum reddere. Ob genu imbecille factum est, quod gradus scalares multos facilius expeditiusque sursum, quam seorsum iret: quando in descendendo necessum, ne corpus antrosum rueret, summis illud viribus cohiberi. Hoc autem silicerniis, & deponstanis fere omnibus commune.

Hist. 2. De Arthritide Ulceribus subolescenti, Epispasticis alleviata.

Ulceribus, quæ cutim mordent & exedunt, *ἐπιγυνομένης Arthritidis* varia præsto sunt exempla; ex quibus uno, quod ob oculos rem hanc omnem plane & perfecte repræsentabit, contentus ero.

Vixit etiamnum apud nos, ætate adhuc constanti vir, cujus ut in ipsis *Arthritidos* paroxysmis, ita non minus in eorum originibus, occurrunt plurima notatu longe dignissima.

Ingruente paroxysmo præmitti solet fastidium, symptoma creberrime prænuncium; tum urinæ tenuis & pallidæ, tanquam in *Hysterica affectione*, profluvium: nonnunquam etiam mandibulæ dolor, quasi propter imminentem *Ὀδονταλγίαν*: spinam autem ischiæ offis inter acetabulum, usitate dolor acutissimus, pariter ac ab affectu illo molestissimo, quem idiomate nostro a *Crick* appellamus: ab illo vero diversus, eo quod vagetur, & spinam perreptans ad homoplatarum usque intercapedinem ascendat. Eo loci quam diu iste viget, spiritum æger difficillime trahit, ac si *Asthmate* pene suffocatus. Hoc in statu, pomaceo liberaliter ingesto, sæpe ille ad tempus aliquod paroxysmum protelat: Grallator alias artuum exinde compos. Hæc vero tantum induciæ sunt, eæque breves & infidæ. Die enim postero, qua pedibus, qua manibus, soler universæ & quidem acerbissime dolere. Cum deferbuit sanguis, in carne musculosa tumores facere materiam *νοσηρίν*: duroque & longos, rectis in modum, excitare; & per artus alios aliosque *πλανητικῶν* articulos aggravare, constat.

Quemadmodum *Febris* & dolor accedunt & intenduntur, urina magis flammea & rubra est: iste vero rubor remittit simul cum dolore, idque ejus proportionem. Veteris jam *Arthritici* summitatem cubiti sinistri tumor occupat *Ὀιδηματώδης*, nuci jugulandi par, tofos habens intermixtos, duritie & mobilitate distinguendos.

Hæc sunt, ad huius *Symptomata* paroxysmos quæ præcipue spectant; eorum vero de origine considerandum est, quod æger hic noster *Ulcusculis*, quorum alia minora erant, pisi majoris secti basin exæquantia, alia ad diametrum Thaleri largiora, omnia vero tibiis obsidentia, ante multos annos afflictatus est. Quibus cum *Arthritis* subjiciebatur, quamprimum huius cura mihi demandata est, nihil prius habui, quam ut, naturæ methodum imitando, ejusque vestigia reprimendo, materiam per cutim elicerem. Ideoque *Vesicatoria*, quibus id negotii perficiatur in usum proposui; quin & malleolo, carpo, cæterisque articulis dolore cruciatis, vel eos quam proxime, nunc plura, nunc pauciora, prout exigere videretur ægri res, admovi.

Hæc autem eo cum successu acta sunt, ut acris feri fœtidique admodum, uncias sæpe quatuor, identidem sex, nonnunquam octo, unum idemque extraheret *Emplastrum*: Unde vicini dolor articuli statim mitigatus, & paulo post sublatus. Artificiosis hinc colis adeo delectabatur æger & profecit, ut quoties dolor recruduit, ac si esset *αἰώσαντος*, ipsius sæpe numero *Epispastica* superponi juberet; ut eodem tempore, sex septem interdum gereret.

Ex eorum dolore & fluxione macescit æger; caro illius impendio absumi, vires debilitari & pessumdari solent; sed cum emolumento & fructu certe amplo locupletique. Quamprimum enim *Ulceræ* exsiccantur, somno & fame postliminio restitutis, cibo multum idem reficitur: vires reparantur. Hisce vero adaugendis non parum conducit aer apricus, & pomaceum; quorum alterum mirifice appetitum acuit; alterum animales spiritus fovet recreatque.

Cum miasmate *Arthritico*, sive per paroxysmum, sive per epispas-

epispastica, liberatur æger; nemo unquam hominum vegetior, nemo hilarior. Ut coctio recta sit, *Infuso amaro Chalybeato* me hortante utitur; nonnumquam etiam, ad sanguinem instaurandum, *Aquis Germanorum Spadanis*; utroque certe, eventu non infelici, imo felicissimo. Redit exinde *Ἑσπέρια* sanitasque sic, ut horum in paroxysmorum intervallis uxorem quotannis gravidam faciat, valitudine, si unam excipias claudicationem, factus integerrima: donec cibi abundantia, & satietate corpus ample nutritum, & nimis sit impletum; inque artus denique erumpat humor, iterumque *Παροξύνεται*.

Huiusmodi cyclus, paroxysmum simul cum vacatione continens, quotannis in annos singulos ter quater repetitur. Solet autem paroxysmus nunc unius mensis esse, nunc duorum, interdum etiam trium, pro materia plus minus cumulata & eveni.

Ulcera, quæ ab *Emplastris* sunt *Cuticularia*, brevi tempore sanantur; maxime vero quoties *Aqua Calcis vivæ* abluuntur.

Cum aliquando pedes tumescerent, ad detrahendum, miasma *Arthriticum*, una cum sero in iis depositum, amici cujusdam hortatu catharticum & fortioribus assumens, malo id eventum fecit, adverso *Æsculapio*. Si evacuationes spectemus, instar omnium erant, in paroxysmo, *Epispastico*, in vacationibus, *Diuretica*. Horum autem usus uti perrarus fuit, illorum vero creberrimus; illis potissimum deberi agnoscendum est. Quod, dolore æger etiam si acerrimo subinurgeretur, tamen ei sustinendo tolerandoque usque par existeret; neque per decennium nuper elapsum, etiam si tot tristissimis accessionibus comitatum, si præcipuè notæ viscera, si vitæ pondus attendamus, enervaretur, aut multum debilitaretur.

Hist. 3. De Arthritide (cum Febre Intermittente) ex Hemorrhoidibus oclusis.

His affinis illa *Foresti* observatio, de *Hollandiæ* præside quinquagenario, qui, cum *Hemorrhoidibus* affici soleret; ex iis oclusis in *Tertianam* incidit, & paulo post in *Podagram* & *Chiragram*, adeo vehementes, ut per dies viginti læto affigeretur.

Huius mali causam esse, vir clarissimus existimavit, non solum phlebotomiam ac cartharsin prætermittam, sed (cum aliis quibusdam) & quidem maxima ex parte *Hemorrhoides suppressas*: neque vero perperam; ratus enim id, quod erat, per lenientia, ventrem inanivit. Quo subducto, & dolore cataplasmatibus mitigato, in excrementis denuo conspicitur ex *Hemorrhoidum* apertione sanguis. Hoc viso, sanitatem Medicus pollicetur, & quidem brevi admodum æger *Arthritide* liberabatur; neque annis post sex dolores *Podagricos*, *Chiragricos*, aut *Articulares*, etiam si illa jam ætate quæ ad hosce prona & proclivis, sensit.

CAPUT XII.

Corollaria & Spicilegia quedam cum Epilogo.

Art. I. *Symptomaticarum* isti, quem protulimus, censui *Corollaria*, quæ ex his recognitis sive omnibus, sive pluribus, inter se comparatis oriantur, & *Spicilegia* quedam, quando ad illas amplius illustrandas utraque nonnihil conferant, jam denique superaddam.

Ex omnibus, gregatim sumptis, omnino liquet, quod *ἰδιωτῶν* iis, quæ puræ & germanæ *Arthritidi* sunt vicinæ (id est, *Arthritidi Colicæ*, & *Morbis Cuticularibus* supervenienti) maxime consentire cernuntur illæ, si, missa morborum primariorum consideratione, & ab iis *Symptomaticarum* emanatione omni, illarum *Materiam* tantum intueamur, quæ *Chlores* & *Hydropi* *ἐπιγυνομένην* *Symptomaticæ* minus propriæ nominantur. Iste vero consensus ex illarum simili materia proficiscitur. Vicinis illis *Speciebus* magis propriis materia, vel *Arthritidos* genuinæ ipsa, vel (uti supra declaravimus) ei quam simillima est, (sicut, e diverso, magis propriis, sed remotioribus, pro distantia, dissimilis) jam vero *Symptomaticis* minus propriis materia, (quod item ostensum est) pura puta est *Arthritica*: unde elucet dicti veritas. Ex quidem ob istam minus propriarum cum *Exquisita Arthritida* convenientiam, magis propriis postponi illæ poterant, imo (ut ordinem hac in parte corrigam) lebuant.

II. Secundo: De *Symptomaticis* magis propriis advertendum, quod nihil me movebit, si quis e perspicacioribus & nimio plus iubilibus, eadem materia morbos oriri posse diversos, eosque *Specie* distinctos asserens, *Luis* ex. gr. materiam, non *Arthritida Falsam*, & *Mendacem*, sed *Exquisitam* & *Genuinam* parere contendit: itaque *Symptomaticas* (aliter quam a nobis statutum esse videatur) & inter se, & cum *Arthritide Exquisita* congruere, pro certo habuerit; nihil, inquam, istuc me movebit.

Primum enim, morborum *Materia*, sive *Causa Coniunctæ*, revera sunt in obscuro; & quis atomorum globus, sive *χηματισμός* ex. gr. *pestem*, quis *Variolas*, quis *Hydrophobiam* & ita affectum quemcunque contagiosum, aut exigua materia, quasi fermento natum, afferat & producat, Deo soli cognitum & perspectum est: nec quis unquam mortalium hæc in operto naturæ fabricata fideliter repræsentaverit, aut palam exhibuerit. Ideoque de *Symptomaticis* hisce nostris, utrum germana sunt *Arthritidis*, an ejus tantummodo *Simulacra*; cum in utranque partem disputari potest & quidem frustra; ex *Eorum Materia per se considerata*, non est temere decernendum, quia philosophis magis oculatis, *λεπτοτάτων λήρων* *ἐπεισόσι*, missum illud faciemus.

Tum, de illarum materia, secundum *phenomena*, si sentire & judicare liceat; certo certius est, primum, diversis illas primariis affectibus, iisque *Specie* distinctis, exoriri. Deinde, eorum materiam, signis suis diacriticis usque manifestam, propriisque remediis impugnandam, in statu peregrino illas retinere. Et quoniam morborum *Specificatio* a nulla alia reducenda magis, quam ab illorum materia peculiari, signis suis diacriticis ostensa: his consequens videtur, illas *Symptomaticas*, pro affectuum diversitate primariorum, *Specie* distinguui, propriasque postulare medendi methodos; ut & propria vocabula.

Neque enim, tertio, siquis eas *Arthritidis* nomine comprehen-

derit, earum mutabit naturam, aut curationes; sed, nimis lata significatione, vocem eam, morbum singularem exprimere solitam, reddet *Æquivocam*; morbos longe disjunctos, eosque non paucos, complectentem, qua quidem re, *εἰ τὰ ὀνομαστοποιεῖν* nihil magis fugiendum.

Nos certe opus practicum moliri, & hos affectus eo modo tractare studuimus, qui ad eos tollendos, aut mitigandos, maxime conducant: quem in finem, ut in superioribus *Arthritides* alias *Genuinas*, in *Secundariis* & sensu laxiori *Symptomaticis* censuimus; quod *Chlorosi*, quodque *Hydropi* subijciuntur; ita hic multo satius esse duximus, tametsi veræ sint omnes hæc *Arthritides* (quod tamen ita esse, nec a quoquam unquam probatum, nec a nobis concessum) ut *Adulterinæ*, interque se diversæ, & magis propriæ *Symptomaticæ*, habeantur: Quoniam hæc positio, ad earum curationes & aptius lucubrandas, & feliciter exigendas, usus est immensi.

Perimetrum circulare ad suam diametrum in ratione *Tripla-sesquiseptima*, sive ut 22. ad 7. esse statuunt, & quidem omnium consensu recte statuunt, *Geometæ*: Quamvis id non tam ex rei veritate, quæ profecto nulla est, quam ex positæ commoditate & in solidis dimetiendis utilitate, factum est.

III. Unum adhuc restat, quod quidem me sollicitum habet, quodque Lectorem moveri par est, non eam huius scripti mentem esse, quæ *Melancholia*, *Scorbuto*, *Lue*, vel alio quovis morbo e primariis supra dictis laborantem, *primigenia* simul *Arthritide* laborare posse diffiteatur: quin e contrario (quantum video) posse ita fieri, (ut illorum altero qui ægrotet, *Podagra* similiter ægrotet *primigenia*) lubens agnosco. Mihi vero cum hisce solum morbis negotium, qui statum pristinum vel partim vel omnino deferentes, sub falsa *Arthritidos* imagine laceant ægros.

IV. Præter has *Imagines Arthriticas*, quæ suo quæque genere perfectissimæ, & omnium, quas ego notavi unquam, maxime sunt elaboratæ: aliæ cernuntur minus perfectæ, neque tam ex amussi ad exemplar illud ingens, *Arthritida* videlicet *primigeniam*, forinatas. Sunt illæ fetus naturæ, sed abortivi; sunt illæ conamina, sed languida, & frequenter vacua. Habent tamen nihilominus dolorem; aliæque tumorem, aliæque etiam ruborem, breves habent plerumque paroxysmos, neque ex stadiis omnibus perfectis conflatos; atque adeo intercisos, interruptos.

Harum *Abortivorum* causa, ex naturæ imbecillitate, & ad *Arthritidem* eluctandam impotentia; vel ex materiæ defectu peccatricis; vel ex sanguine *δυσμεταβλήτῳ*, & ad *Arthritida* subeundam minime apto & proclivi, ut intelligo, petenda est: Certe tanta illarum *Ἀπειρία*, mos ita dubius, ut ad hæc nostras *Symptomaticas* nihil esse censeantur, neque sermone longiori persequendæ.

Minime vero tacendum, quod hæc *Abortiones* nunc, ut aliorum morborum aliæ non paucæ, (quod jampridem detexit clariss. *Sydenhamus*) apud vulgus *Scorbuti*; nunc etiam *Rheumatismi*, facti, vel imperfecti, nomine insigniuntur; & passim curationi, pro hoc vel illo nomine, (quam autem auspicio conjectari facile est) subijciuntur.

V. Postremo addam, quod *Articulares Glandule*, quæ tantopere in statu corporis secundo & naturali, per secretam mucilaginem, (a) articularum motui, immo vitæ animali conservandæ; in statu ejus vitioso adversoque sanguinis depurationi & purgationi, pari modo inserviunt: quando per has exprimitur venenum, in alio corpore *Ποδάγειον*: in alio, *Melancholicum*; in alio, *Scorbuticum*; in alio, *Venericum*; in alio, *Febrile*; aliud videlicet aliudque longe diversum, summe perniciosum. Ut dictæ *Glandule*, ex incerniculis totius corporis celeberrimis sint: neque per *catarrhos*, infantum; neque per *Rheumatismum* muliebrem, sceminarum; neque per *Hemorrhoida*, provectorum; quam per *Πύον* hanc *Articularem* seniorum vita, salus, & incolumitas magis sustentetur.

EPILOGUS.

Ita demum absolvimus *Systema Arthritidum Symptomaticarum*, eas *Species* percurrere omnes, non quas imaginatio peperit; non quas opinio commenta est, vel auctores, scripta sua compilantibus, sunt elargiti; sed quæ nobis usu & experimentis; quæ observatione & exercitatione medica occupatis, sese prodiderunt.

Harum modos & proprietates expiscari fuimus conati, medendique rationes & indicationes singulas, quam possimus aptas idoneasque, earum singulis accommodare. Nunc *Calcar* adhibendum, & *Arthritidem* in nonnullis omni industria promovendam; nunc contra, *Freno* opus esse, & morbos artificiose sisti sufflaminarique oportere: materiam nunc per *Locos Muliebres*; nunc per *Renes*; nunc per *Ambitum Corporis*; nunc per *Anum*, nunc per *Os*, evacuare; nunc, emissâ evacuatione omni, alterari; nunc & alterantibus & evacuantibus neglectis, tantummodo præcaveri, in ipsoque ortu supprimi, debere demonstravimus.

Si, in ponendis hisce indicationibus, isque designandis, errasse nos constiterit, (in re vero tam multiplici, tamque intricata, nihil errare, plusquam humanum est) certe suam cuique *Symptomaticæ Arthritidi* propriam esse, ex derivatione propria, naturam; tum item harum singulis, pro sua cujusque derivatione & natura, curationem excogitandam esse propriam & peculiarem, omnino comprobatum est.

Jaeto isthoc fundamento, quæ mediocriter (pro earum dignitate, si quidem mediocriter) a nobis aperiuntur *Symptomaticæ*; tum eas amplius explicare; tum eas illustrare; tum earum numerum explorare poterit observatio posterorum, quibus in medio relinquam *Scrofule*, *Rachitidos*, *Psoæ*, *Diabetis*, *Icteri*, *Dysenterie*, aliorumque complurium chronicorum erga *Arthritidem* inclinationes & demigrationes, si quæ sint, & qualescumque, evolendas: esse vero plurimorum; easque longe inter se diversas, & discrepantes; ex jam prolatis, quæ a nobis, ut dabatur occasio, perpaucis annis spatii coegerentur, abunde verisimile est.

Animus erat, de *Arthritide Anomala* quæ habuimus dicenda, his subnectere; sed, in præsentia, manum hac de tabula, & spatio jam exacto, sistentes (anhelantium more cursorum) paulisper respiremus.

(a) Vide Clarissimi *Haverii Osteologiam novam*, Diatribam De *Glandulis Mucilaginosi*.

F I N I S.

Δόξα τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ.

DISSERTATIO SECUNDA. DE ARTHRITIDE ANOMALA. SIVE INTERNA. PRÆFATIO.



IN Dissertatione non ita pridem edita, de morbis iis sermonem fecimus, qui ab *Arthritide Primigenia* distincti, natura & indole plus minus remoti, stationes suas deserunt; ad illam appropinquant; ejus ritu paroxysmos agunt, *Artus* affligunt: quoniam vero, præter *Arthritidis*, sive *Symptomaticæ*, sive *Primigeniæ* paroxysmos eos, qui in artibus omnino locum habent, & a me *Idonei*, *Recti*, & *Regulares* appellantur; alios adhuc insultus faciat *Arthritis* utraque, & interdum *Trunci* partes has illas, sedes, & regiones intret alienas, atque illas sæpe mulcet gravissime, hos utriusque *Arthritidis* errores, has obliquitates, & *Ἀνωμαλίας* hoc loco exponere decrevimus.

Dari vero sibi postulat hæc *Dissertatio*, (& quidem optimo jure postulat dari) suos esse *Arthridi* cancellos, suos limites certos, & definitos; quibus se quandiu continet, tandiu *Regularis* illa judicari potest; quotiescunque vero eos excedit transilitque, toties *Anomala*. Dicam planius & apertius *Arthritidis Subjectum*, unos *Artus* esse *Regulare*, proprium, & suum hanc illos vendicare; domicilium in illis collocare: contra vero, organicam *Trunci* partem aliquam, sive *Provinciam internam*, non nisi *deviam* usurpare; non nisi *Anomalam* invadere. Quæ quidem harum in corpore regionum designatio partitioque, non ex arbitratu nostro fieri, vel opinionis commentum esse, verum, e diverso, in natura stabile, & fixum habere fundamentum usu, & experientia confirmatum invenietur.

Quotusquisque Medicorum *Impetiginem*, e. g. virus in *Cutim* effundentem, squamas (sic, ut moris est) præ se ferentem, animo perpendens, *Cutim* illi propriam esse sedem, non existimaverit? quotus etiam quisque est, qui, relicta *Cute*, si materia vitiosa *Pulmonem* ingrederetur, & *Tussim* faceret; non, hanc illius a suo in alienum locum aberrationem esse, judicaverit? Quis hujusmodi *Tussim*, a vulgari & exquisita dissidere, multumque discrepare, non libenter affirmaverit? Quis, alia medendi methodo, quam quæ *Tussi* conducatur exquisitè, tractari eam oportere, vel secum dubitaverit? Immo quidem istiusmodi *Tussim*, etiam si *Bechica*, reliquaque remedia *Pulmoni* dicata, minime respuerit; tamen, per materiæ translationem in corporis superficiem, in sedem illi usitatissimam, (unde *Pulmoni* cautum esset, donec e corpore prorsus expellendæ ejus daretur occasio) id est, per renovatam *Impetiginem*, modo renovari posset, apposite curari, quis in arte nostra prudens abnegaverit?

Quæ hic de *Impetigine*, mutato nomine de *Arthritide*, narretur fabula; pari enim modo, atque illi ambitus corporis; huic artus, *Subiectum* & sedes est exoptatissima. Quod vel eo liquet, quoniam hos suapte sponte adit *Arthritis*; hos incolit; hos invita, plerunque exacta, linquit; hos celerrime revisit; *Truncum* autem, nisi coacta, raro premit; causa nempe fortuito aliqua naturæ consilium mutante, rationem morbi conturbante, morem alterante: unde jure merito, quæ artuum est *Arthritis*, habeatur *Regularis*; quæ reliqui corporis, *Anomala*. Simili etiam modo, atque de *Tussi Impetiginosa* diximus, quæ e. g. *Tussis* est *Arthritica* (quandoquidem ex miasmate *Arthritico* fiat) a vulgari & primigenia *Tussi*, si rectè comparetur illi, primum differre existimetur. Postremo, ut in *Impetiginoso Tussiente*, nihil hac *Tussi* laborantibus conducibilis, nihil *Arthritidi* huic *Anomala* magis aptum, quam ut in viam ea, quæ quæ possit arte, reducat, & fiat. *Regularis*, id est, in artus ut ejiciatur.

Præmissa hac *Arthritidos* (in *Regularem*, & *Anomalam*) divisione, tanquam hujus scripturæ basi, de *Arthritide Anomala* differere non jucundum modo, verum etiam utile; sed & difficile cogitandum: Est enim illa, primum, perobscura, tenebris occultata, neque perpetuo animadversa; maxime, si ex primo ejus aspectu, nempe symptomatum concursu, (qui vulgi mos est) diagnoses statuuntur. Partium quas invadit, morbos, adeo examulsi illa proprios & vernaculos, imitatur; ad eorum modos se tam accurate comparat; ex eorum vultu, suum tam mimice componit; ut a Medicis omnis seculi omnino omnibus, aut prætermissa, aut tantum leviter tacta; a nemine unquam hominum, quod sciam, explicata fuerit; nedum a quoquam, uti par est, impugnata.

Deinde illa ita numero (veluti erroris alias natura) multiplex est; ut raro ullam in *Trunco* regionem; ea prorsus immunem; nullam fere, quam non aliquando ingrediatur, animo liceat comprehendere, ut *Trunco* quot partes sint organicæ, tot propemodum *Arthritica* sint earum *Anomalie*. Porro tam a se diversæ sunt, ut malorum, quotquot undique corpus humanum infestent, eorum omnium vix ullum magis, vix ullum observare licet æque *πολύτροπον*, *πολύμορφον*.

His adde postremo, importunam semper eam esse, (sed ratione valde dissimili, & inæquali) imo quidem non raro summe periculosa; quoties nimirum miasma *Arthriticum* viscus aliquod e nobilioribus, & ad vitam maxime necessariis ingressum illud sic, ut assolet, corrumpat. Hoc autem crebro fieri, hæc nostra *Dissertatio*, nisi quid me fallit, manifestum & testatum reddet. Testatum, inquam reddet, *Arthritida* non solum (*Regularem*) artibus dolores, tumores, tofos, aliaque istius generis mala (quæ *Arthritidem* omnino omnem indicare, vulgo fuere judicata) inferre; verum etiam (*Anomalam*) modo *Ventriculo Nauseam*; modo, *Intestinis Tormina*; modo, *Renibus Nephritida*; modo, *Pectori Asthma*; modo, *Pulmoni Tussim*; modo *Faucibus Anginam*; modo, *Cerebro Apoplexiam*; modo *Nervi Paralyzin*; & quod *Trunci* partes, affectibus indigenis satis superque afflictatas, usque novis & peregrinis aggravet; usque miseros mortales excruciet; tunc, ut sæpe accidit, maxime crudelis, quando minime suspecta.

Tantæ pestis & tam funestæ impetum, ut Ego pro virili sisterem; harum *Anomaliarum* Doctrinam, & disciplinam attentavi: Quos in *Trunco* locos adeat *Arthritis*; quibus in corporibus, quæ præferat *Diverticula*; quæ *Latibula*: itaque quos illa, generatim; quos, speciatim, *Meandros*, *Anfractus*, & *Obliquitates* amet: quibus de causis eas incipiat; qua velocitate percurrat; quo eventu terminet; quodnam item *Anomala* cujuslibet *Ἔδος*; quæ *Accidentia*; qualis, a morbo partis affectæ proprio *Differentia*; qua demum arte præcipue quam peculiari, & privata, qualibet oppugnari, quaque præcaveri debeat, tradere conatus sum.

Circuli, curvarum linearum perfectissimæ, natura & proprietatibus explicatis; ea re minime contenti Geometræ parvam & tantum inchoatam istiusmodi linearam mathesin, esse putavere; nisi etiam curvæ minus regulares enodatae fuerint: atque ideo *Ellipticam*, *Asymptotas* aliasve curvas, *Circulari* minus perfectas, suscipere, & in iis extricandis operæ multum impendere; tam sibi met ipsis, quam aliis, utile & jucundum.

Quæ vero me ad opus hoc aggrediendum impulerunt, in primis duo sunt. Alterum, quo *Damnonios*, Populum nobilissimum, & de me optime merentem, *Arthritide Anomala*, perinde atque *Recta*, multum urgeri vexarique, jam diu observaverim, illaque multo plures, quam hac occidere; ut *Arthritis Anomala* morbus non immerito *Lethalis* habeatur; uti, quæ *Recta*, *Salutaris*: raro enim hæc ægrotum interimit, nisi *Anomala* prius facta. Quibus tamen hominibus, cum plerisque aliis, morbi illius facie misere deceptis, de vero ejus ingenio, nempe *Arthritico*, raro unquam ulla fuit suspicio. Et tantopere sub aliena larva debacchatus est in eos hic affectus, ut, ex iis qui *Ἀνέριξ*, qui *Colica*, qui *Syncope*; qui *Phthisi*, qui *Asthmate*, qui *Apoplexia*, (ne dicam alios affectus, utique complures) exquisita, pura, & genuina perimi, & e medio tolli censerentur; revera *Arthritide*, unum eorum aliquem æmulante, & larvam induente, non pauci, atque adeo (quod verissimum est) permulti fuerint sublati: non solum morte, sed & ignota ejus causa, infelices. Quas tamen eorum *Arthritides Anomalas*, methodis hisce nostris opportune adhibitis, quam iis, quæ continentem, & Proximam earum causam minime attigerint; nec quidem unquam respexerint: facilius cedere potuisse, conjectura ducor ad suspicandum.

Quod vero præterea calcar, atque animum, ad scribendum dedit, altum erat illud de *Arthritide Interna*, sive tollenda, sive dignoscenda, apud Auctores medicos silentium. Etli enim patet, eam, ut, & periculum, quod eam infe-

quatur, non esse novum, aut artis professoribus ignotum; tamen, quia neque illud periculum, neque ipsa *Arthritis*, multo minus ejus curatio, dedita unquam opera, vel pro ejus dignitate, & momento, fuit a quoquam unquam exposita, nec, quod sciam, inchoata; idcirco ejus Doctrina, quatenus diagnosin, & therapiam ejus comprehendit, inter artis Medicæ defectus, & desiderata, non immerito censeatur.

Ne vero quis, ex eo medicinæ consultorum hac in re silentio, *Arthritidis* hujus in dubio ponat. Ὑπάρχειν, & de morbo, non tam gravi periculosoque, quam commentitio imaginarioque, disputare me coarguat; Operæ pretium existimo, veterum, quorum autoritate morbus ille (*Arthritis* scil. *Interna*) confirmari possit, e multis aliquot testimonia proferre.

Annos certe millenos abhinc septingentos (i. e. sub *Augusti* Cæsaris Imperium) *Arctæo* ille *Cappadoci* innotuit, ita de *Arthritide* verba (a) facienti, Τισὶ δὲ νέμεται ἐς τὴν τῶ πάντες σκλήρος ἀειδόν. Id est, Quibusdam in omnis Corporis ambitum vagatur. Et deinceps, Ἡ δὲ μετὰ βασις ἐς τὸν τῶ μῦας, ἢ Θώρακος. Ἀπίστον, εἰς ὅσον ἔργον τὸ Κακόν. Σπόνδυλος ἀλγέσει ραχίος τῆς καὶ ἀνέχεται, ἢ ἐς ἄκρον ἐρείδει τὸ ἱερὲ ὄσσε. i. e. *Transitus* quoque in *Dorsi Thoracisque Musculos* fit: *Incredibile* est, quam late *Malum* (i. e. *Arthritis*) serpat. *Vertebrae Dorsi*, *Cervicisque* dolent, & in *summo Sacri Ossis* *Dolor* inhaerescit. Et paulo post Τέροντες, Ἀδένες, Μῦες ξυὺ ἐν τῇ αἰτίᾳ ἀλγέσει. Ἐν ἁδόν, ἢ Κροτίφον μῦες νεφρῶν καὶ κύστιος ἢ ἡδονή. ἢ τῶ Θώρακος. i. e. *Tendines*, & *Musculi* cum distentione *Dolorem* patiuntur, nec non *Maxillarum* & *Temporum Musculi*. Item cum *Renibus*, & *Vesica* communicatur. O Rem admirabilem!

Secundum hunc *Galenus* apertissime, Satiis, inquit, est, ut *Humores pravi relictis Principalioribus partibus* in *Ignobiliores* ferantur, quam quod ab *Ignobilioribus* in *Principes* impellantur. Aspeximus etenim saepe in his, qui *Articulari Morbo*, aut *Podagræ* obnoxii erant, quod, repulsis ab *Artubus* *Humoribus* eo delatis, illi in *Principem* aliquam *Partem* contententes, *Homini* interitum attulere: cui ea sola relinquebatur *Spes Salutis*, si iterum possent ad *Artus* revelli. (b).

Paulus etiam *Agineta* nonnullorum meminit, qui *Aures*, *Dentes*, *Guttur*, & nonnunquam *Jecur*, *Lienemque*, *Arthriticis* *Doloribus* conflitari pronunciant: A quibus, nisi desubito *Vitium* in *Artus* sese recipiat eructetque, periculum brevi tempore *Laborantes* occupaverit. (c)

Adhæc *Ætius* (d) (*Jano* interpretante *Cornario*) Qui vero, ait, extreme ab hac affectione (nimirum *Arthritide*) apprehenduntur, his & *Spinae Vertebrae*, & *Costarum Juncturae*, & *Gena* dolent: aliquibus autem & *Iris*, sive *Corona pupillam Oculi ambiens*: neque est aliqua *Ossium Connexio*, quæ ab hac *Affectione* sit immunis.

Quibus animadversis *Trallianus* (e) sapienter monet, Ne astringentibus & repellentibus in affectis *Partibus* utendum esse, nisi totum prius *Corpus Recrementis* liberaveris. Nam quod *Articulis* influit, ne ad *Principales Particulas* recurrens, *Suffocationis* causa fiat *Ægro*, periculumque *Mortis* adferat, metuendum est. Et in sequentibus, Multos attonitos, inquit, fieri conspiciamus, ubi *Pedes* tentari desierint.

Quid? quod *Demetrius*, inter recentiores *Græcos*, *Pepagomenus*, *Michaelis Palaologi* *Medicus*, his assentiatur; *Libro* (istius *Imperatoris* jussu) de *Podagra* scripto, Non tantum, inquiens, in manus, pedes, omnes articulos tales ferri fluxiones: verum etiam in cerebrum, jecur, atque adeo ipsum cor. Easque teterrimas esse liberatuque difficillimas. (f)

His accedunt ætate nostra *Sennertus*, *Sylvius*, *Etmullerus*, *Sydenhamus*, & complures alii: ut, tametsi *Arthritidos Internæ*, qua late patet, diagnosin certa & fidelis, supersit nulla; nedum ejus ulla curatio propria; morbum tamen eum, *Medicorum* omnis fere ævi opinione, revera esse; eumque magnum, & ancipitem esse, omnino constet: & quidem mirari aliquando subiit, in morbo, toties a veteribus significato, per tot sæcula genus humanum affligente, explicando curandoque; ab eorum temporibus ad hunc usque diem, progressum adeo parvum fieri; adeo nihil agi: Utinam, quæ a nobis hanc ob rem in medium feruntur, proposito respondeant.

Illud denique adjiciam, unde *Lectori Hippocratis* æmulo, (id est, *Præceptoris* in medicina optimi *Discipulo*) *Dissertatio* nostra, uti spero, commendetur, & gratiam ab eo ineat: omnem hanc *Arthritidum Anomalarum* disciplinam, sive ætiologicam, sive therapeuticam, cum medicina *Hippocratica*, quantum in me est, convenire; & (posthabitis hypotheseis, naturæ vero judiciis tum avide investigatis, tum etiam diligenter examinatis) ad ejus normam & legem componi. Nec enim ille parum auspiciato medicinæ operam dat, qui id aliter facit, quam *Natura* duce, & comite *Ratione*: Hoc autem minime omnium illi videntur facere, qui, neglectis phænomenis, *Naturæ* nomine venditent *Opiniones*; itaque sibi, suique similibus fraudi, aliis sint ludibrio.

Quare, de humorum *Transitu Migrationeque* & ab artubus in partem aliquam internam *Recessu*; de eorum in ea parte *Receptione*; deque eorum medicamentis ore sumptis, in artus *Expulsionem*, extra vero applicatis, *Revulsionem*, creberrime nobis sermo. Sunt autem ista plane *Hippocratis* Μεταστάσεις, Διαδείξεις, Ἀποκρίσεις, Ἀντιπαραστάσεις. Imo quidem, hanc nostram medendi methodum, verbis generalibus, ipse divinus senex proposuit, præcepitque: Πρæcepit enim Ἀντιπαραστήναι, ἢ μὴ ἢ δεῖ ῥίπειν. ἢ δὲ ὅκνη δέ, ταύταισι δὲ σομῶν, οἷος ἑκάστα ῥίπειν. Id est, Revellenda ea, quæ quo non oportet, repunt: Sin autem quo convenit, iis *Viam* sternere oportet, ut singula eo vergant. Quo quidem aphorismo, (tanquam oraculo, *Apollinis* instinctu edito,) tum *Anomalæ*, tum *Primigeniæ Arthritidos* curatio tota brevi comprehenditur.

Morbi *Hipocondriaci* diversitates & morborum innumeras aliorum imitationes, quæ per omne ævum *Medicis* fucum, ægrotantibus molestiam fecerunt; a clarissimo *Sydenhamo* graphice depingi, solertissime curari vidimus. Utinam etiam *Arthritidis*, morbi similiter multiformis varietates, simulationes, flexiones, *Anomalias* qui exprimeret, & pro rei dignitate, & amplitudine describeret, par esset *Sydenhamo*. Hisce vero desperatis, huc spectantia, quæ a me fuere assiduum observata, lubens in medium fero; ea spe fretus, etiam si non perfectas & absolutas, tamen nonnullas harum *Anomaliarum*, per hæc nostra qualiacunque, fieri tum *Historias*, tum curationes.

Habes, *Lector*, instituti rationem & consiliū: utrique fave.

(a) Lib. 2. Cap. xii. Ed. in Fol. August. Vindel. 1603. per Henischium.

(b) Ἀπὸ γὰρ τῶν Κυσσιωτέρων μοσίων εἰς ἀκυρώτερα μετίσταται τὰς λυπέντας χυμῶς, ἐκ τῶν ἀκυρώπατων εἰς τὰ κυσιώπατα, βελτίον ἐστὶ Πολλάκις δ' ἰδὴ πεθεάμεθα, τῶν ἐπὶ τὰ κῶλα φρομένων ὑμῶν ἐν ἀρθείᾳσι τε καὶ ποδάγραῖς ὑποκρεσθέντων ἐκείθεν. εἴτ' ἐπὶ τὴν Κύσειον ἐλθόντων, ἀποθανόντα τὸν ἄνθρωπον, ἢ τὸ μίαν ἐλπίδα σωτηρίας, ἐὰν δυνάμει αὐτῶν ἐπὶ τὸ Κῶλον αὐτὰς ἀισπᾶσαι. In *Hippocratis* *Librum de Natura Hominis*, *Commentario* II. ad *Textum* quintum: Editione *Parisiensi*.

(c) Τισὶ δὲ καὶ ὥπα, καὶ ὀδόντες, καὶ φάρυγξ, καί ποτε καὶ ἦπαρ. καὶ σπλὴν, τῶν ἀρθρευτικῶν μετεχόν ἀλγυμάτων ἐφ' ὧν μὴ ὅλα τὰ χυμοὶ ἐν τοῖς ἀρθροῖς ἢ μεταπτώσει ἐγίνετο, Κίνδυνος ἐν ὀλίγῳ κατελάμβανε τὰς Κάμνοντας. Libro 3. Cap. 78. Editione *Aldina*.

(d) Vide ejus *Tetrabibli* tertiz *Sermonem* quartum, Cap. vi. Editione *Frobeniana*. Basileæ MDXLII.

(e) Εἰ γὰρ δὲ ἐμὴ, μὴδὲ τοῖς σὺ φέρεται ἔκ ἀπὸ κρείσθαι δυνάμενός ἐπὶ τῇ πεπονθότῳ ἐλεῖν κεχρησθαι, μὴ πρότερον ὅλον ἀσθέντον ἐργασαμένον τὸ σῶμα. Τὸ δ' ἐπὶ ῥίπειν ἐν τοῖς ἀρθροῖς, δέος ἐστὶ, μὴ πρὸς τὰ κύρια μόρια καλινδρομῶν, αἰτίνῃ γνῶσι τε τῇ καταπληθύνῃ, καὶ κινδυνεύσαι θανάτῳ τὴν πάσχοντα. Εἰ πολλὰν ὁρῶ μὲν πληγμὴς ἐπακολουθούσας, τῶν ποδῶν ναυσαμένων τὰ ῥύματα ἵζεσθαι. Vide *Alexandri Tralliani*, Lib. II. Cap. I. Basileæ MDLVI.

(f) Οὐ μόνον δὲ εἰς Χεῖρας, καὶ Πέδας, καὶ εἰς πάντα τὰ ἄρθρα γίνονται οἱ τοῖστοι Ρέματισμοί, ἀλλὰ καὶ εἰς Ἐγκέφαλον, καὶ εἰς ἦπαρ, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν Καρδίαν, αἰνὰ τισὶ δεινότητά, καὶ δυσπαλλακτικότητά. Cap. v. Editione *Parisiensi*, per *Chariterium*.

D E
ARTHRITIDE ANOMALA,
G E N E R A T I M.
CAPUT PRIMUM.

Art. I. **C**um materia peccans, & aliena, quæ *Arthritidos* sive *Primigenia*, sive *Symptomatica* causa proxima, continens, & conjuncta est; post aliquam in sanguine moram, naturæ demum molesta, ideoque expellenda, jam exilio patata est; permagni sane refert, quas in corporis partes ea mittatur; quibus in locis deponatur: Si enim in *Artubus*, maxime vero si eorum commissuris; sicque ut de ejus in sanguinem reditu nullum sit periculum; profecto quidem hoc est ipsum naturæ propositum, quod in sui defensionem omni illa studio, summis viribus attentat: hæc morbi hujus solutio fida, accommodatissima: hæc *Arthritis* exoptatissima, quæque jure merito nominetur *Regularis*.

II. SIN aliter acciderit, & ad corporis *Truncum*, sive aliquam ejus partem, materia fuerit appulsa, & in ea malum more suo machinata; longe alia rerum facies, alius est eventus: nam aut nulla morbi fit solutio, aut saltem inepta, naturæque votis minime respondens. Novus ex eo morbus exoritur, isque sæpe periculosus, sæpe perniciosus; indole, & ingenio propter materiam ab *Arthritide* ductam, admodum singulari. Atque hæc istius materiæ, in ea quæ intus sunt, e sanguine ablegatio, & in iis commoratio; quandoquidem ex primo naturæ instituto (quæ semper *Regularem* præfert, & quoad fieri potest, molitur *Arthritida*) minime peragatur; verum multo aliter ex illius errato, vel defectione: hæc, inquam, *Arthritis* a nobis appellatur *Anomala*; ea vocis istius significatione, qua apud veterem (a) Etymologum legitur *Anomalia*, id est, extra *Regulam*.

III. *Arthritidum Anomalarum* *Διαγνώσεις* difficultatibus quamplurimis involutæ, tenebris densissimis obscuratæ sunt; ut autem excudam, & ante oculos ponam earum rationem aliquam generalem, omnino distinguendum est inter eas *Anomalas*, quæ *Regulari* nullo præcurrente paroxysmo sunt; & eas, quæ regularem *Arthritidis* paroxysmum insequuntur.

Illæ quidem partium, quas afficiunt, morbos tam mimice legitimos & exquisitos imitantur; ut internoscere illas, & ab hisce caractere proprio discriminare, prorsus *ἀδύνατον* existimetur. Quis enim, e. g. morbosam istam affectionem, quæ in corpore, ad hoc usque tempus immuni, neque *Arthritidis* paroxysmo regulari vel semel unquam tentato, vel ei (quantum apparet) proclivi locum habens, anginam inducat; eamque anginæ legitimæ tam similem, ut neque ovum ovo similis: quis, inquam, istuc malum? quis hanc anginam, *Arthriticam* esse somniaverit? quando nulli testes, symptomata nulla, vel minima quidem ex parte id arguere videantur? Nihilominus tamen *Arthriticam* esse posse hanc Anginam, omni dubio procul usu medico confirmatum est. Quare prætermittis hisce, quæ, ut nunc sunt symptomata, & eorum interpretationes, supra captum humanum esse censeantur; ad eas progrediar *Anomalas*, quæ, paroxysmum *Arthritidis* regularem a tergo secutæ, *Diagnoses* habent probabiliores.

IV. HÆ vero *Diagnoses* non ex caterva sive globo symptomatum, simul semelque concurrentium, (quod in affectibus plerisque locum obtinet) expectandæ; sed ex symptomatum serie, vel ordine, in longum producto, capiendæ sunt. Ut autem istæ catervæ, *Συμφοραὶ* ab antiquo *παθολογικαὶ* fuerunt nominæ; ita quidem hi *Ordines*, *Παθολογονικὸν* non inepte nominantur.

Qui quidem *Ordines Arthritidum Anomalarum* *Παθολογονικὸν*, pro istarum *Arthritidum* diversitate, diversi sint, oportet, & quidem alias conveniunt, alias inter se magnopere sunt disjuncti. Conveniunt in eo, quod ad unum omnes ab *Arthritide regulari* sumant initium; quandoquidem, de *Anomala Arthritidos* *ὑπαρξίς* minime unquam constabit, nisi de *Regulari Arthritide* præcurrente prius constiterit. Atque hæc istarum *Διαγνώσεων* pars prima est.

Discordant eo, quod, eodem loco incipientes, diversas omnes ingrediantur vias; uti radii ejusdem circuli, ab eodem puncto, nempe centro, incipiunt; sed in varia peripheriæ puncta desinunt. Ut hoc exemplo clarius ostendatur, *Dysenteria*, v. g. *Phthisis*, & *Apoplexia Arthritica* consentiunt in eo, quod ab *Arthritide regulari*, & in artus sæviente, exordiantur omnes: verum, quoniam miasma nunc ad intestina appulsum est, ubi loci *Dysenteriam* facit; nunc ad pulmonem, ubi *Phthisin*; nunc autem ad cerebrum, ubi *Apoplexiam*; idcirco *Arthritica* hujus *Apoplexia*, *Phthisis*, *Dysenteria* *Diagnoses* ex cerebri, pulmonis, & intestinorum, nempe ex locorum affectuum signis, maxima ex parte sunt eliciendæ. Atque ista locorum, ab *Arthritide* in eos translata affectuum, accidentia, *Διαγνώσεις* harum est quod reliquum.

Quoniam vero hi affectus postgeniti, *Arthritidem regularem* nunc e vestigio sequuntur; nunc ex intervallo, eoque alias brevi, alias longiori; magna profecto, ob hanc rem, earum est diversitas. Alii originem plene & plane continentur *Arthriticam*; alii, utrum habeant, an secus, minime declarant. Adeoque, ut *diagnoses* hæc finiam, hic *Canon* istorum affectuum *Παθολογονικὸν*. Quo certior *Arthritidos regularis* *ὑπαρξίς*, & illius materiæ, in ea, quæ intus sunt, quo postea certior est translatio; eo confidentius *Anomalam*, & quidem in parte jam nuperrime occupata, esse *Arthritidem* possumus statuere.

V. CUM autem *Arthritidem* ea, quæ intus sunt, *Anomalam* infestare dicam; vox (*intus*) ut & alibi (*Partes interne*) uti etiam *τὸ (Anomalam)* & (*Truncus*) sic a me sumuntur, ut *internæ Partes* sint trunci omnes: *Truncus* autem tres ventres comprehendat, & cum artubus (quorum respectu partes ejus dicuntur *Internæ*) constituat universum corpus. Ut autem voces (*internæ*) & (*intus*) & (*Truncus*) sensu largiori, ita vox (*Anomala*) strictiori accipitur: Non enim omnes *Arthritidos* in trunco *Anomalias*, non artuum ulla, tractare propositum est.

VI. HINC *Arthritidem* inter *Regularem* & *Anomalam*, quæ sit

differentia, quod discrimen, explicatu facillimum. Primum enim illa tantum artus invadit, eorumque præcipue articulos; tum humerum, & coxendicem, tum cæteros omnes: Hæc corpus reliquum; cujus partes, nunc *contentas*, nunc *continentes*; aliasque sæpenumero adoritur, multifariam affligit.

Deinde *Arthritidos* regularis, cuicunque articulo affixæ, quoscunque artus pervagatæ symptomata, simul sumpta, inter se consentiunt, similiaque faciunt *Παθολογονικὰ*, & (quod de similibus triangulorum lateribus solet dici) *ὁμολογοῦσι*. Nam in *Arthritide* regulari fixa; dolorem fere perpetuo, tumorem creberrime, ruborem sæpe, neque raro ardorem & tofos cernimus: & in vaga dolorem, unde ipsius nominis ratio, vagum; cui nonnunquam accedit tumor albus, & tanquam *οἰδηματώδης*. Contra vero *Anomala Arthritidos*, uti in locis ea longe plurimis est, ita longe plurima & diversa sunt symptomata; in ordines ejus *Παθολογονικὸν* & numero plures, & valde dissimiles (secundum partes ab hac *Arthritide* tentatas & affectas) disponenda, & digerenda.

Postremo *Arthritis* regularis est a natura potissime petita; maxima ex parte tuta, perpetuo desideranda, crisis; ut ad vitam servandam in primis necessaria; neque alium quemvis (nisi id casu fiat) morbum gravem, & ærumnosum habens supervenientem. Hæc contra ortus est sinistri, & ex naturæ frustratione; raro absque ægroti periculo, interdum summo comitata, exituque crebro fatali. Adeo nempe a *Regulari* distinguitur *Anomala Arthritis*.

VII. Id autem memoria tenendum, non solum exquisitæ *Primigeniæque Arthritidos* esse has *Ανωμαλίας*, verum etiam *Similiter Symptomaticæque*; easque esse *Arthritides Symptomaticas*, quæ *Primigeniam Arthritida* non tantum modo recte agentem, sed etiam deviam, sed *Anomalam* sequantur, & in rebus permultis æmulentur. Hujus autem verbi vis, & interpretatio non ita intelligenda, ac si omnes *Symptomaticæ* ad *Anomalias ἀδύνατον* omnes æque proclives essent; e contrario, has illis sæpius, & longius excurrere, & quidem ad alios corporis locos, est exploratissimum.

VIII. At truncum illa universum non æqualiter infestat, aut pari modo lædit; verum, ut in provincia exteriori *Arthritis regularis*, sedem in pedibus principalem ponit; quam creberrime frequentat, habitatque constantissime: aliam secundi ordinis sedem elegit, nempe manus articulos; quos aliquanto rarius, sæpe tamen invisit: alios habet tertii, videlicet genu, cubitum, humerum, & coxendicem; quos articulos adit, quasi invite, omnium rarissime. Ita quidem in provincia interiori, sive corporis trunco, *Arthritis* se gerit *Anomala*. Namque omnium sæpissime ventriculum, & intestina petit, & in iis tyrannidem exercet: hinc *Ανορεξία*, *Δυσπεψία*, *Vomitus*, hinc *Colica*, *Dysenteria*, *Diarrhœa*; hinc interdum *Abscessus Arthriticus*. Sæpe caput, tanquam arcem munitissimam aggreditur; & nunc *Vertiginis*, nunc *Cephalalgia*, nunc *Apoplexiæ* partes sustinet *Arthritica*. Aliquando etiam in nervos se infinuat; unde *Paralysis Arthritica*. Non raro pectoris regionem, spirandique tentat organa; & est vel *Asthma*, vel *Tussis*, vel *Hæmoptoe*, vel *Phthisis Arthritica*. Aliquando etiam fauces invadit, & sub *Angina* vultu ludificat ægrotos. Interdum gingivas, & appellari solet *Dentium Podagra*. Interdum renes afficiendo *Calculum* infert, *Dysuriam*, *Stranguriam*: alias, scil. aliasque trunci partes, viscera, membranas, musculos, glandulas, tendines, ligamenta, ne dicam ossa, penetrat inficitque, ut in omni trunco, quod ea liberum, & ex toto sit immune, vix reperitur.

IX. Ne cui vero *Arthritidi* videatur alienum, tot ei, vel erranti, *Anomalias* obtingere, hincque morbos, si eorum facies spectemus, numero tam multos, natura tam diversos, illam diffindi, & dispartiri; hoc cum animo cogitet. Primum, virus *Arthriticum*, sanguine commistum, una cum eo corpus universum circumvehens, in singulos ventris singuli recessus, in partes corporis omnino omnes immitti, earumque adyta intrare. Deinde, iter ad articulos non adeo recta facere miasma illud, ut in aliis corporis regionibus minime unquam divertatur; verum ex contrario, ad partem trunci aliquam appulsum, in ea sæpe morari, sedemque tanquam propriam occupare. Postremo, illa commoratum, illius affectum aliquem, sed novi moris affectum, sed *Arthriticum* inducere tum posse, tum etiam solere. Ut *Arthritidis* imperium, usquequaque dilatatum, amplum esse constet, pariterque fere atque humanum corpus immensum.

X. Causæ loco proximo perpendendæ veniunt; Eæ vero, uti mihi videtur, ita se habent. Alia est ipsum *Miasma Arthriticum*, vel in sanguinis sinu inclusum, vel ad corporis extremitates amandatum; quod tamen iis minime defixum, aut inhærens, repercussu proclive sit, & in trunci organicam partem aliquam facile repellatur.

Alia in ipsis *Trunci partibus*, quæ miasma depositum accipiunt, inest. Earum enim infirmitas & *ἀστοχία* major, minor; eaque interdum naturalis, alias acquisita, redit eas *Arthritico* plus minus oneri ferendo idoneas. Atque hæc duæ causæ *internæ* sunt, & procatartica, & in *Anomalis* hujusce generis quibuscunque locum obtinent.

Alia est *externa*, & evidens causa; uti emplastra, cataplasmata *Αποκρεστικά*, frigus, & quidem omne, quod materiam, vel a *πῶς* *ἐξωθεν* repellens, vel iis affigi prohibens; ad ea, quæ intus sunt, illam intrudat. Atque hæc causa frequens & pervagata, minime vero constans, & perpetua est. Trunci enim partes aliquando debiles, & *ἀπνοι* nulla omnino urgente vi externa, onus per se recipiunt ultroque sustinent.

XI. DIFFERUNT inter se *Arthritides Anomala*, primo secundum *Locos sive Subjecta*; Alia enim est ventriculi; alia intestinorum; alia pulmonis; alia faucium; alia cerebri; alia nervorum; &c. Et quidem adeo differunt; ut, tot diversæ inter se morborum species, a plerisque omnibus fuerint existimatæ.

Tum, in eodem subiecto, differunt secundum *Causas*. Ut enim illæ varietate magna distinguuntur; ut illæ nunc fortius, nunc remissius agunt; utque hoc illoque modo, *πολυτρόπως* implicantur; *Anomaliarum* oritur *Arthriticarum*, quæ pari gaudet diversitate, vis & copia similiter varia.

Dicam planius, & distinctius; primum *ratione Materiæ*, sive causæ continentis; quam modo puram putam *Arthriticam*, modo alie-

alienam, uti *Scrofulosam*, *Scorbuticam*, vel istiusmodi aliam, habet hæc *Arthritis*; modo materiam recta e sanguine effusam; modo ab extremis partibus translatam; modo in iis partibus sævientem, membranas acriter rodentem; modo mollem, edentulam; modo in iis nuperrime; modo ex intervallo. Unde *Arthritidum Anomalarum* multiplex varietas, discrimen ingens.

Deinde, *ratione Subjecti*, nunc illud a natura debile; (uti sunt glandulæ ferme omnes:) nunc materiæ vitiosæ a sanguine secerendæ natura destinatum; (uti præcipue sunt conglomeratæ:) nunc malis moribus illud debilitatum, (quod in ventriculo sæpissime observatur;) nunc, prægresso aliquo morbo, (quod in hæmopticoorum pulmone,) suscipiendo iniasmati *Arthritico* magis paratum est. Unde etiam harum differentiarum *Anomalarum* pene innumeræ. Alia porro est differentia, ad hunc ordinem referenda: nam ab alio *Subjecto*, uti a faucibus, ad artus facillime, sua quasi sponte adit; expeditissime, promptissime demigrat; ab alio, ut a nervis, non nisi difficillime removetur, & summis medicinarum viribus, remediis, veluti *μοχλικοῖς*; interdum vero ne quidem ullis. Unde etiam *ἐν τῷ διαπνεύειν* harum *Anomalarum* magna diversitas.

Postremo, *ratione Causæ externæ*; nonnunquam mero extremitatum robore, partium internarum *ισορροπὴν* exuperante; sæpe emplastris, cataplasmatibus, unguentis, linimentis repellentibus; nonnunquam aere perfrigido; nonnunquam pedum; in aquam frigidam, vel salinam immersione; alias ligaturis, aut tibialibus nimis angustis fit *Arthritis Anomala*.

Ex hac varietate qua *Subjecti*, qua *Causarum*, *Arthritides* sunt *Anomala* tam variæ, tamque multiformes, & detectu sæpe tam difficiles, ut vel *Æsculapio*, vel *Herculi Medico* facessant negotium.

XII. MEDENDI indicatio generalis est, ut *Arthritide Anomala* pars affecta quam citissime, quam tutissime levetur. Hoc autem fit, materiam in ea depositam partem e corpore evocando, partim in artus transferendo. Evocatur e corpore materia modo venæ sectione, modo catharsi; modo diaphoresi, modo epispasticis, modo apophlegmatismis, modo errhinis: Quæ quidem omnia, sicut huiusmodi cætera, quando *Arthriticis* omnibus *Anomaliis* simili nequaquam modo adversentur; verum e contrario, aliis alia: quæ illorum auxiliorum quibus *Anomaliis*, quaque ratione opponantur, infra speciatim explicabitur.

In præsentia dicam, e corpore materiam evocantibus (quæ primo loco erant) etiam si crebro necessariis, non iis ita crebro solis, ægrum sanari; interdum lædi: *Lædi* nimirum, quoties perperam & imprudenter electa, vel incaute & supra modum ea fuerint adhibita, unde nonnunquam malum augetur, aut alias ægri conditio pejor reddita est. Non autem semper sanari, quia materia, quæ relicta est in corpore, *Arthritica*, tametsi evacuationibus retusa, quando jam maturata & ad *ἀκμὴν* evecta, brevi se attollet, iterumque turgendo cristas eriget, neque nisi propriis externis (id est, glandulis articularibus) ejus fiat excretio, vel minimum artubus appositio, sanguini quies erit. Præmissis igitur, qua par est, evacuationibus, optime felicissimeque curatio perficitur, per materiæ in artus translationem. Hoc enim ipsum est naturæ propositum; hoc illi maxime optatum; quod dum molimur, ei laboranti, neque alienum ex more, & qua via soleat debeat exturbanti, ferimus suppetias. *Ἀδὲ ἀγὼν, ἐκς αὐτῆς μάχης ῥέπει (ἢ φύσις, τὰ πρὶν ἀγῶν, διὰ τὸ ἐμπεριόρτων χάριον*. Hoc est, *Quæ educere oportet, eo ducenda, quo maxime Natura viam affectat, per loca convenientia*, Hippocr. Aphorism. xxi. lib. i.

Medicamenta, huic intentioni apta & inservientia, sunt duorum generum; quæ ore sumpta materiam in artus amoliantur, quæque extra iis admota, eo illam invitent.

Interna, *Arthritidem expellentia*, sive *Ποδαγραγωγὰ*, sunt e classibus cardiacis, & diaphoreticis, magna ex parte, selecta præsidia; uti

Pulveres *Zedoariae*, *Contrayervæ*, *Gentianæ*, *Serpent. Virg. e Chel. C. C. Purpureus Batei*, *Lapid. Goani*, *L. Contrayervæ*, *Species Diambrae*, *Confect. liberantis*; Cl. Fullerii *Pulvis Alexipharmacus*; ejusdem P. *Stomachicus amarus*; Cl. Wilisii *P. Bezoarticus*; *Pulvis Ruber Exoniensis*: *Flores Salis Armoniaci*; & id genus alii. Electuaria, *Theriaca Andromachi*, *Mithridatium*, *Elect. de Ovo*.

Spiritus C. C. *Simp. vel Succinatus*; Sp. *Sanguinis humani*, *Urinæ*, *Volatilis Oleosus*, *Serici*, & ejusmodi alii.

Vinum *Album Gallicum*, *Campanum*, *Mosellanum*, *Rhenanum*, *Burgundicum*, *Burdigalense*, *Lusitanicum*, *Pomaceum*, maxime *subacidum*.

Quoniam autem *Ferro*, ad extrudendam *Arthritida*, nihil potenterius inveni; aut quod ægrotanti sæpius sit auxilio; quod efficax, & tutum; quod annorum usu multorum a me expertum, ejus *Præparatum* accipe.

24. *Limatura Ferri* ʒss. *Sartagine*, vel *Patella terrea*, vitro obducta, *Urinam madefac humanam*, æstivo Sole, vel ad Ignem sicca; iterumque (Spatula Ferri particulas, ne coalescant, bis in die agitando) irrota, donec abeat in *Rubiginem Massâ*. *Exesam*, & *Rubiginem confectam* eam in mortario ferreo contunde: *Tusam*, & in *Pulverem redactam* *Situla*, quatuor circiter Congios *Aquæ fontanæ* continenti, injice. *Pulverem cum Aquâ commisce*. Hora post quadrantem, *Aquæ*, quod summum est, & minus turbidum, leniter detrahe; & ad *Pulveris*, in ea natantis, siccitatem evapora. Quod in *Situla* relictum est humoris, similiter evaporetur. *Pulvis in fundo crassior*, *Urina* irroretur; &c. uti prius. Itaque *Nutritio*, *Tritura*, perque *aquam Separatio*, repetatur, donec omne *Ferrum* in *Pollinem* mutabitur. *Carthæ Emporeticæ*, Coni in formam circumvolutæ, *Pulveres siccatos inde*; *Aquam fontanam fervefactam*, paulatim, & per vices, superaffunde; donec *urinoso sale penitus abluto*, existillabit *Aqua insipida*. *Pulverem denuo exsicca*, & usui serva.

Est illa *Rubigo Ferri* subtilissima, merum *Alcohol*, non solum *Arthritide*, verum etiam chronicis plerisque aliis, ægrotantibus, præcipue teneris & imbecillibus utilissimum. Dosis ʒss. semel, bis in die, pro re nata.

Pulvis Ruber Exoniensis ita præparatur.

24. *Cacumin. Anagallid. Scabios.*

Draconis, Betonicæ, Scordii.

Tormentillæ ana ʒiv. misce;

incisa digere, igne arenæ, horas xxiv. in *Vini albi Lusitanici* ʒiv. Vistro probe clauso. Tunc fiat *Colatura*: & *Expressio*.

24. *Boli Armenæ pul.* ʒbi. *Infuso prædicto in spissitudinem Lini-menti temperetur*; crebro agitur, sole exsicetur; rursus irrigetur; &c. Itaque *Massâ Infusâ* nutriatur: Ac cum ultima ejus semilibra, illi addatur

Mithridatii ʒi.

Diascord. ʒiʒ.

Conf. Alk.

Pul. Rad. Curcumæ ana ʒss. *Serp. Virg.*

Croci Brit. ana ʒii. misce, exsicca; f. *Trochisci*, vel *Placentulæ*, solis æstu durandæ, loco calido servandæ, Dosis ʒi. ad ʒss. vel ʒii.

Ad *Arthritidem* expellendam *Pulveres*, *Boli*, *Pilulæ*, post evacuationes necessarias exhibendæ.

24. *Ferri hujus Nutriti*, sive *Alcohol Martis* ʒss. *Sacchari albiss.* g. xv. *Pul. Nucis Myrist.* gr. v. f. *Pulvis cum vini Haustu assumendus*.

24. *Pul. e Chel. C. C.* (vel *Lapid. Contrayervæ*, vel *Rubri*) ʒi. *Alcohol. Martis* ʒss. f. *Pulvis*.

24. *Ther. Androm.* ʒi. (ad ʒss.) *Alcohol. M.* gr. v. (ad x.) *Syr. Caryoph.* q. s. f. *Bolus*, vel

24. *Pul. e Chel. C. C.* (vel *Alexipharmacii*) ʒi. *Spec. Diambrae*, *Ferri Nutriti ana* ʒss. *Conf. Alk.* q. s. f. *Bolus*.

24. *Pul. Serpent. Virg.* ʒi. *Alcohol. Martis* ʒss. *Ol. Absynth.* *Chym.* gt. i. *Ext. Cent.* q. s. f. *Pil.*

Detur aliquod ex hisce compositionibus, semel, bis, terve in die; uti res ægroti postulet, & patiat; cum idoneo vehiculo, *Vino* puta, *Pomaceo*, vel *Julapio Cardiaco*.

Si liquidum malis, in eundem finem propinetur *Infusum amarum*, cum *Tinctura Martis*; vel ejus *Alcohol*.

24. *Rad. Zedoar. Gentian. ana* ʒii.

Cacum. Abs. Rom. Agrimon.

Cort. exter. Aurant. sicc.

Croci Brit. ana ʒi. misce, & digere, in *Vini rubri Lusitanici* ʒbi. ad idoneam alterationem: Tunc f. *Colatura*. Dosis ʒiij. cum *Alcohol Martis* gr. v. ad x.

Sunt & alia medicamenta, *Arthritidi* protrudendæ apta; quæ *Anomalis* quibusdam singularibus occurrunt, & suis in locis tradentur: hæc autem maxime communia.

Internis hisce *Ποδαγραγωγοῖς*, vel huiusmodi aliis, dies quatuor aut quinque usurpatis; si in artibus nihil excitabitur doloris, ad ea, quæ extra imposita *Arthritidem* ad τὴν ἔξωθεν eliciant, descendendum est. Articulo dolere solito admoveatur *Empl. ex Gummi Caranna* vel *Oxycroceum*, vel *Cephalicum*, cum *Picis Burgund. dimidio*, triente, vel quadrante. Valet *Urticatio*, veteribus in usu adversus dolorem ischiaticum, valent *Balneæ*, sed calidissima, uti etiam *Pelles Animalium* recens detractæ. Vel applicetur *Ceratum illud viride*, ex quo sunt *Petasothea*; vel si vires ægri ferant, & res in dubio versetur, *Phenigmus*

24. *Fermenti vet. partes* ii.

Sem. Sinapios.

Raf. Raph. Sylvestr. Allii,

Cacumin. Rutæ; *Fini Columbini*, ana partem unam; cum *Aceto Vini albi* contunde; ad spissitudinem *Cataplasmatibus* redige.

Admoveatur ejus portio, quam fieri potest, calidissima, cum vestitu apto, laneorum nempe involucris; & quamprimum illa refrigerit; donec tumor erit, usque eo renovetur. Ægrotanti, si inter cruciatus animo defecerit, *Julapium Cardiacum*, vel, quod præferre soleo, *Vinum* aliquod generosum sæpius propinerur. Tumori demum facto, ne sanguini reddatur in eo contentus humor, *Epispasticum*, cujus beneficio is educi possit, applicetur.

Ubi nulla præsentis auxilii necessitas, aut ægrotus debilis, & tener, doloris fuerit impatiens, tibiis, vel cubitis (proût *Arthritis* imos, vel supremos artus solet occupare) primum *Epispasticum* commune superponatur; quo duodecim vel duodeviginti horis post detracto, imponatur id, quod sequitur.

24. *Axung. Porcin.* ʒiij. *Empl. Melilot. f.* ʒiʒ. *Pul. Cantharid.* ʒi. m. f. *Emplastrum*.

Hujus *Epispastici* auxilio, dies sex, octo, vel decem educatur, quamdiu nempe visum fuerit, *ἰχωρὼδες αἶμα*. Quacunque viâ progrediare, salutaris hæc feveritas, inanem omnem clementiæ speciem longe multumque vincens, *Arthritidem* paucis diebus solet allevare. Ita falsum est quod effluit, ut ex eo sæpe pruritus, & partium aliquando vicinarum inflammatio, & tam diuturnum esse flumen observatur, ut ne perpetuum sit, interdum extimescat æger. At, quantum mihi notare licuit, inanis hæc sollicitudo. Nam, ichore supervacuo exulante, concidunt symptomata; ex quo æger vegetior, appetitu avidiori, animo majori est donatus; ab *Arthritidis* accessione nova ad tempus aliquod incolumis.

At Tribum *Arthriticorum* delicatam, mollem, & doloris impatientem instare video; quæ periculum ex dolore meticus, & ex ἀλυσίᾳ felicitatem, omnem hanc *Arthritidis* expellendæ medicinam, illiusque professorem crudelitatis arguit; neque inter hæc tormenta (*Phenigmus* scilicet aliaque dolorem excitantia) aliter, quam in *Phalaridis Tauro*, vivi contendit; neque sine indignatione quadam me objurgat, ac si verbis *Æschyli Prometheus* usa.

Ἐλαφὸν, ὅς τις πημάτων ἔξω πόδα

ἔχει, παραινῶν, νεκρῶν τε καὶ ζώντων

πράσσοντας. Ist est.

Facile, quisquis *Pedem extra mala* habet, *adhortari*, & *monere infelices*. Et, ut verum fatear, querimonias hac de re me plus semel audivisse, non dissimulabo. Pii autem Medici est, dum morbum sedulo & artificiose conatur relevare; quidquid in ea re occurrat impedimenti, studio, & constantia vincere, vel patienter ferre. Exponenda igitur his hominibus est *Arthritidos Anomala* malitia; & quanto melior, & mitior sit hæc crudelitas, quam per misericordiam methodus; illa brevi, & tolerabili dolore sanitarem; hæc quiete, multo detestabiliore, mortem accelerat.

His in genere præmissis, *Anomalas Arthritides* speciatim explicandas, jam nunc aggrediar.

De Ventriculi Affectionibus Arthriticis.

Art. I. **A** Ventriculi & Intestinorum malo, nempe dyspepsia, creberrime potissimeque nasci *Arthritida primigenia*; ex ejus doctrina, luculenta & idonea, liquido patebit. Ejusdem *Arthritidis* ut etiam *Symptomatica* naturam exquirenti manifestum erit, nullam in universo corporis trunco partem, *Ventriculo* & *Intestinis*, eam utramque perfectam antepone; nullam frequentius ingredi: nullam diutius tenere; nullam gravius affligere; nullam sæpius repetere. Quæ quidem res, uti methodi nostræ, ab *Arthritide* eorum *Anomala* incipientis, rationem abunde comprobant; ita quidem merito requirit, ut, quæ sit hujus sævitæ frequentiaque causa, studiose examinemus.

Quo vero clarior & dilucidior *Anomalarum*, hæc partes sic infestantium, expositio sit; de iis, quæ in *Ventriculo* locum habent, hoc capite; de iis, quæ in *Intestinis*, suo ordine postea disputabimus: ut, in quibus ea inter se concordent omnia, & in quibus discrepent ex conjunctis & juxta se positis facilius innotescat.

II. Ut *Ventriculum* *Arthritis* occupet, & in eo commoretur, duo videntur esse necessaria. Primum, in sanguine miasma *Arthriticum*, sive nativum, sive malis moribus acquisitum. Sæpe quidem nativum, huic affectui suo Marte generando, par & æquale reperitur. Sin ebrietate, gula, vel utraque id adaugeatur; fortius inde factum, omnem molitur efficacius accessionem, præcipue *Anomalam*. Neque tantummodo inesse sanguini, & cum eo circumvehi sufficit; nisi etiam in fugam abiturum; nisi exilio; quocunque vult natura, fuerit paratum. Alterum est, ut huic miasmatis accipiendo, in tunicarum vel fibrarum intervalla adsciscendo, *Ventriculus* accomodetur; & ad illud in recessus intimos admittendum, aptus & conveniens sit.

III. ADVENAM illius accipit *Ventriculus*, sæpe propter imbecillitatem ab incunabulis ductam, ipsoque ortu factam, ob quam in illo expellendo arcendoque partes minime possit sustinere.

Et quidem tanti, ad inferendum hunc affectum, momentique tam magni, est hæc imbecillitas, ut ex iis, qui eo laborarunt, antea *Ventriculo* laborare, plerique omnes invenirentur. Illa vero, quam dixi, imbecillitas aliquando subita est, & uti conjicio, ex improvviso. Quoties nimirum Venere absumantur; vel, ex dolore, timore, aliove quovis animi pathemate, recedant spiritus animales; *Intestinorum* membranæ flaccescant; itaque advenæ, sese intrudendi non ad *ισορροσίαν* adversentur, atque adeo viam aperiant. Cujus quidem rei, (*Anomalia*, videlicet, hoc in loco *Arthritica*, a mæiore ductæ) exemplum mox subijciam.

Nonnunquam autem crudum, acidum, biliosum, aliudve aliquod ineptum & vitiosum, in *Ventriculo* coacervatum, miasma illuc allestat, & tunicas ejus irritando vellicandoque, ut in iis illud deponatur, efficit: non alio modo forsitan, quam, in ambitu corporis *Epistastica*, *Phœnigmi*, & id genus *Attrahentia* vulgo dicta, cutim mordendo stimulandoque, serum, & nonnunquam ipsum sanguinem ad se invitant, & quasi attrahunt. Quod quidem usu venit admodum frequenti, sic, ut in causis hujus *Anomalie* procatarteticis nihil, ut opinor, frequentius.

Interdum miasmatis, in *Ventriculum* missi, causa est externa: uti *Cataplasmus*, *Emplastrum*, aliudve quodvis istiusmodi repellen: quo ne extra in articulis maneat, neve in eos emittatur *Arthritis*; verum e contrario, ut in *Ventriculum* pellatur, effectum est creberrime. Atque huc referri frigus oportebit; seu balnei, sive aeris fuerit: & quidem, multum hac in re valere frigus externum, iterum & sæpius observavi.

Ex hisce causis, qua antecedentibus, qua evidentibus; sed ratione, modo, & *ἐν εἰσῳ* alias alia, valdeque inter se diversa operantibus; *Anomalias* notare licet, in *Ventriculo* *Arthriticas*: quarum *ἑξ ὧν ἡ ἰσὸς*, ut ad illa descendamus, plerumque tale est.

IV. Cum *Arthritis* aliquandiu *Regularis* fuit, & in artubus accessiones recessionesque multas ex intervallis iteravit; sæpe quidem videmus, paroxysmum ejus, vel ex *Frigore*, *Emplastro*, *Cataplasmo*, *Unguento*, vel istiusmodi aliquo externo repellente, vel post satietatem, aut crapulam; & in victu erratum aliquod, nunc abscindi abruptique; si nempe esset: Sin nullus fuerit tunc temporis paroxysmus, spatio præter morem excludi prorogarique. Hanc paroxysmi regularis sive interruptionem, sive intermissionem, nonnunquam sequitur *Ἀνορεξία*, cibi fastidium; eique postea se adjungit pectoris gravitas; & deinde ructus, vomitio, & interdum cardialgia. His sæpe additur *Intestinorum* oppressio, dolor, constrictio, & aliquando æstus, respiratio impedita & angusta, oscitatio crebra, cephalalgia, vertigo, & interdum mœstitia, *Σκρόφα*, faciei pallor, & post aliquod tempus imbecillitas universalis, & totius corporis macies.

Esti hæc symptomata fortasse nunquam in eodem corpore simul semel observantur omnia; ea tamen horum caterva creberrime videtur, quæ *Ventriculum* maxime, secundum cum *Interranea*, malo quodam intestino affici, gravarique significet; eique *κατὰ Συναρτήσαν ἐπιγινώσκει*, tum imo ventre, tum medio, tum etiam supremo, cum systemate nervino, ea, quæ recitavimus, symptomata: quod ea singulatim examinari facillime patebit.

Abs quo hæc intus oboriuntur, rara in extremitatibus *Arthritis*. Fixus, vagus dolor, tumor rarus. Qui diu clinicus fuit, nonnunquam, hunc in modum affectus, expedire & prompte ambulat. At, quod externo omni dolore pejus, magis indies intestina mala magisque ingravescent: Sic, ut æger (nisi fortunate *Deus* se interposuerit, & vel tempestate ab immoderata & perfrigida, ad mitem & benignam mutata; vel medicina apposite adhibita, reducta fuerit *Arthritis regularis*) inedia, languoribus, & dolore confectus, e medio sensim abiens, post menses aliquot tristissime actos, mortem denique misellus obeat.

V. Quicunque hæc symptomata, maxime vero eorum ordinem, quo ex aliis emanant alia, judicio rite ponderavit, mecum, ut opinor, sentiet; *Arthritidem*, olim regularem, nunc *Anomalam* fieri, & in *Ventriculum* divertere. Cujus rei probabilitas ex hisce paucis, simul consideratis, omnino sumi potest. Primum, quod nullum unquam hominem, nisi *Arthriticum*, adoriatur hic affectus. Deinde, quod nec eum, nisi miasmatis *Arthritico*, eoque maturo, & volatili turgentem. Deinde, quod neque illum, nisi vel a paroxysmo vacuum, vel eum habentem intercisum, imperfectumque.

Deinde, quod e vestigio sequatur recte *Arthritidos* defectum. Quibus omnibus, uti par est, pensatis, nihil verosimilius videtur, quam quod *Arthritidos* materia, *Ventriculum* appulsa, dictam moveat tragœdiam. Hujus autem opinionis fides ut amplius stabilia-tur, hoc, quo nihil clarius, nihil luculentius optari potest, unum superaddam; nempe quod *Arthritide regulari* denuo inducta; (id est, materia *Arthritica* a *Ventriculo* in artus amandata) nihil huic affectui citius, nihil tutius medeatur.

VI. Senes hac *Anomala* maximopere conficiantur: quorum sanguis, in miasmatis, per ætatem ingravescente; expellendo; quorumque viscera, propter imbecillitatem ætate crescentem, in eodem avertendo, minus valent. Sed non iis propria est habenda; quando in adultos, in illis juniores sæpenumero cadat: Et quidem adeo, ut *Anomaliarum*, quotquot sunt, *Arthriticarum* nulla unquam, quod meminerim, magis. De cujus rei causa, ut conjecturam faciam, nihil magis in promptu, aut verisimilius habeo dicendum, quam istam in victu incuriam; licentiam istam (inutilem dicam, an perniciosam?) qua istius ætatis homines in mala se innumera immergunt. Quod ut pateat, unicum isthuc adicere necessum est, in juvenibus ab errato in potu aut cibo, incipere eam quam sæpissime solere.

De anni tempore, quo potissime gliscat, enunciari potest; etiam si nullum illa non arripiat tempus, nullo tamen magis vigere, quam autumnus, quo, ad spumam omnem *Arthriticam* e sanguine eructandam, vires exerit natura, & ut illam ad se alliciant, per fructus horzorum æstate devoratos, & in ductu suo retentos computrescentesque intestina præparantur.

VII. Hæc cum hujusce *Anomalie* ratio sit creberrima, operæ pretium esse videatur, eam cum *Arthritide regulari* paucis comparare, & utramque, quasi trutinam, examinare. Age igitur, calculum ineamus, & initio, quod in confesso est, ponamus, diathesin in sanguine *Arthriticam* tam hanc, quam illam præcedere. Deinde miasmatis, e sanguine ablegationem similiter utranque anteire: Et quidem, in his duobus, eis inter ipsas convenire.

At, quod altero loco dicendum, in quibus secum dissentiant, sunt quam plurima. Nam in accessione regulari sanguinis orgasmum, pulsum celerem, carnis æstum, eumque aliquando ingentem, naturæ nixum molitionemque plus minus intensam observare licet: contra vero in *Ventriculi* *Arthritide*, nihil horum evenit; at anxietas, inquietudo, languores ægotantem urgent. Illa naturæ vegetæ, vividæque, & magnum aliquod moventis opus; hæc fatigatæ, hæc oppressæ, & oneri succumbentis. Postremo, illa vitam reddit securiorem, hæc mortem imminentiorem. Tantum inter hæc *Arthritides* est discriminis: & tam certo, si earum altera *Regularis*, altera huic contraria est.

VIII. Neque de istarum *Anomaliarum* Historia, vel ejus fide, derogari quicquam arbitror; si forsitan earum aliqua (prout diversæ sunt, & eorum numerus pene infinitus) sine ulla sive e prædictis, sive alia quavis evidenti causa, fiat; vel, si una cum paroxysmo regulari, non autem post eum, uti nos statuimus; vel, si ab ejus interruptione intervallo, quam proposuimus, longiori. Quandoquidem fingi potest, in ipsi hisce *Anomaliis* quædam inesse perfectio; quam in descriptione nuper allata conati sumus exprimere: Et quotquot eam habent *Anomale*, censeantur *ἀκριβῆς*, suoque genere absolutæ; quæ vero carent, & ab ea desciscunt, minus perfectæ: De quibus tamen omnibus sententia, per regulam datam, per *Anomalam* absolutam, facillime ferenda est.

IX. Illa porro symptomata, quæ dicuntur *Hypochondriaca*, notitiam *Arthritidem* in ventriculo *Anomalarum* identidem obscurant, earumque diagnosin interturbant. Nam cum ea senes sæpissime invadant; eosque maxime, qui post madidam, & temulentam juventutem, mutata vitæ ratione, senectutem degunt sobriam & siccam, a vino abstinentia languores fere perpetuos, ructus, anxietates, tristitiam, & nonnunquam dolorem, aliaque *Ventriculi* mala, non raro infert; quæ *Anomalam* in eo *Arthritidem* diuturnam (qualis ea interdum est) non parum æmulantur. Ut autem eam inter-noscatur, & ab affectu hypochondriaco distinguitur; ejus insultus explorare, modos eorum, vehementiam, & intervalla perscrutari, medentem oportebit: unde ab illo istam facile deducet.

X. Hisce libet adicere, perinde fere esse, *Anomalam*, ut per se est, spectemus, utrum artubus relictis in *Ventriculum* materia directo se insinuet; an vero primum in fauces, in partem aliquam contusam aliamve quamvis; & tandem, quasi per circuitum, ineat *Ventriculum*: cum diversa ista progrediendi via, ad naturam hujus *Anomalie* permutandam, ne hilum quidem faciat.

Idem etiam erit, sive *Anomala* *Arthritidem* fixam, sive erraticam sequatur, sive neutram harum; sed miasma, sine ulla in artubus mora e sanguine recta in *Ventriculum* mittatur: Idem, inquam, erit; modo mitti constet. De istarum *Anomalarum* natura, eandem nempe esse omnibus, nihil dubii est; de earum *ὁπάσι* modo certi essemus.

Hoc autem adnotandum, uti ætate provecti, (quod supra pos-tum est) quam juniores: Ita labe *Arthritica* ab ortu inquinati, quam integri: grandioribus, quam maturis parentibus oriundi appetitu malo, quam bono donati, *Arthritide* frigida & languenti, quam calida & acri dolere soliti: *Anomaliis* his assueti, quam iis semper liberi, hac *Anomala* citius, & diutius ægotant.

XI. Medendi indicatio *Ventriculum* quam citissime, quam tutissime levare, & ab *Arthritide*, ei incumbente, liberari postulat; quam in finem, duo semper consideranda, ut & sæpe exequenda veniunt.

Prius, ut per catharsin idoneam, & ægroti rebus convenientem, impura & aliena ista massa, in *Ventriculo* contenta, qua ad eum quasi attrahi, & (tanquam compede) in ejus tunicis detineri solet *Arthriticum* miasma, foras per os, per anum eliminentur.

Posterior, ut peracta catharsi, vel, si nullius usus erit, prætermissa, *Ventriculo* dimoveatur, in extremas partes exulet *Arthritis*. De quibus ordine.

Si respiratio angusta & præpedita, si *Ventriculi* gravitas, & inflatio, maxime vero si ructus, si nausea, si vomitio urgebit; adhibito leni emetico, sed tamen efficaci, modo vires annuerint, & nihil repugnaverit, *Ventriculum* moveri plane opus erit. In emetico seligendo curam & cautionem multam impendi, neque tantam rem negligenter agi oportebit. Ut enim, modo tuta, vomitio necessaria, ita, quæ languida, est inepta, & quæ justo vehementior, est periculosa.

Qui sunt *ἀέμωτες*, iis satis esse solet *Foliorum Theae Viridis*, vel *Cacuminum Cardui Decoctum*, copiose potum, ad quatuor, quinque vel sex egurgitandi vices, ad octo, decem, vel duodecim libras, si cum *ἀέρω* fieri potest, demissum. Quibus segne nimis huiusmodi decoctum, neque satis irritans, conducatur libris singulis, alternis, tertiusve, *Salem Vitrioli* pro re nata adicere. Qui non nisi difficulter vomunt, iis opus esse videatur initio *Vinum vel Oxymel Scillit.* Vel ex eorum æquis ponderibus compositum, ad duas vel tres uncias fumere: & post horam quasi dimidiam, possetum aliquod simplex, vel amarum. Qui vero *Arthritici* possetum, aquam tepidam, vel liquidum aliud aliquod quantitate bene magna, vel nequeunt, vel nolunt bibere; iis ne detur ex officina emeticum, maxime cavendum. Ut etiam aliis id incommodo esset, ita quidem *Arthriticis* præcipue. Ne viz. allesta e sanguine ad *Ventriculum* materia multa, egesta vero nulla, laboret æger. Est ubi nec possetum, neque decoctum, nec medicamentum aliud quodvis exhiberi potest; propterea quod, ex eorum quopiam, torminibus, spasmis cito inutilibus corripiatur æger, in primis vino deditus. Hoc casu, vino affatim, & ad vomitum usque sumpto, sæpiusque repetito, rejectoque, (quod simul & emetici & cardiaci vires habeat) totum isthuc, utur difficile, & plenum opus alea, nonnunquam absolvi, itaque ex fati faucibus ægrum eripui.

Quæ per vomitum evacuari solet materia, nunc biliosa, nunc quæ in *Ventriculo* computruit & coaluit, eruda est, maxime post *Anomalam* ex *Cerere* vel *Baccho* natam. *Respirationis* spatium ex eo dilatari, pectoris gravitas auferri solet: quinetiam ipse vomendi nixus, & quæ ab eo sanguinis agitatio est, ad *Arthritida Ventriculo* excutiendam aliquando non parum facit, & æger statim *ῥοδάρπιδ*.

Hora post finitum vomitum, maxime si pharmaco moveatur, (ut in intestinis quicquid assumptorum manserit, evocetur) enema vulgare injiciendum; eoque, quo reficiantur vires, *Bolus ex Theriaca Androm.* & *Pul. Cantiano*, una cum *Vini ustulati* *Hauftu*, dandus. Tunc infusionis amare *Vino Lusitanico*, vel *Xeresano factæ* *Hauftum*, cum *Pul. Cantiani* *℥i.* vel *℥ss.* ter quaterve in die assumat æger, donec alvo tempus erit inaniendæ.

Si vires ægri patiantur, interposito die uno post vomitum, instituat purgatio: Sin imbecilliores eam veruerint, in aliud tempus differatur: quam autem primum commode fieri potest, eam aggredi juvabit. In ea ordinanda curâ esse oportebit, ut ægri viribus conveniat; ut, in ductu alimentari quicquid insit alieni, tuto illud emitatur; sed neque medicamento tam forti, tanquam elaterio, ut faciat hypercatharsin. Uti hæc ægroto non nisi periculo plena, ita quidem purgans nimis lene exhiberi, malum erit. Hoc casu enim, nisi brevi repetita fuerit purgatio, illuc, ubi peccatum erat, postea, majori cum incommodo, redeundum; & venter iterum movendus. Ratum enim esto, auspiciatissimam huius *Anomala* curationem fore, si a *Ventriculo* & *Intestinis* bene purgatis ordiatur. Mihi solemne est, per *Tincturæ sacre* *℥iii.* vel *iv.* vel per *Extr. Rudii* *℥ss.* ad *℥ij.* vel per *Pul. Warwicensis* quasi *℥ss.* vel per *Manna* & *Salis Cathartici* *Solutum*, addito *Elixir Daffeano*, *Alvum* ducere; & si spatium sex horarum nihil effluerit, clysterem immittere; vesperi post purgationem, (uti post vomitum) bolum exhibere.

Interdum accidit, post utramque catharsin, non nimis parcam aut debilem, nauseam manere importunam; ipsaque medicamenta, quæ sanguini suscitando, *Arthritidique* transferendæ sunt a Medico destinata, ore confestim reddi. Hoc, uti conjicio, fit per acre illud *Arthriticum* miasma, quod *Ventriculitunicis* inhæret. Ad vomitum hunc inanem, imo noxium compescendum, *Laudani* *liquidi* *gutt.* instar *x.* cum *Aq. Cin. fort.* vel *Abf. C.* vel *Sp. Menthe* *℥ii.* quarta, quinta, vel sexta quaque hora misceantur; ea nempe dosi, & frequentia, quæ vomitionem tollat, & in ventriculo *Podagragoga* retineri faciat. *Laudaniquæ* dosibus, post vomitionem aliquantisper compositam, intervallo ea medio interponantur, sic, ut si *laudani* horis sexta & duodecima, remedia *Arthritidem* moventia tertia & nona exhibeantur. Quamprimum ea retinet, *Ventriculus*, tanquam inutile quoddam, ne dicam ineptum, & postea nocivum, omitti *laudani*, & in methodo præscripta progredi juvabit.

Hæc autem omnia circa catharsin a me proposita, de iis tantummodo ægrotis intelligi velim, quibus & purgationis utriusque opus, & ejus sustinendæ vires sunt. Quoties autem ejus nulla in conspectu necessitas; (quod in *Anomala* per mororem inducta, aliisque paucis observare licet) vel quoties eam admittere nequeat ægrotantis imbecillitas; a *Podagragogis*, omissa ea, incipiendum. De quorum usu verba jam proxime faciemus.

XII. Peracta re cathartica, quæ prior erat medendi Intentio, ad alteram illam, quæ *Arthritidem Ventriculo* moveri jubet, & quoad fieri potest in artus mandari, properandum est. Hoc ut effectum reddam, iis utor non modo stomachicis, quæ *Ventriculo* contra inimicum defendendo; verum etiam iis cardiacis alexeteriisque, quæ sanguini, eum in corporis ambitum pellendo, quæ miasmatis exturbando conferant. Quoniam vero istarum classium medicamenta non profunt omnia; selectiora quædam, & huic proposita utiliora, in medium feram.

Possunt illa vel *Pulveris*, vel *Boli*, vel *Pilularum* vel *Infusi* forma exhiberi: Atque hisce pene omnibus *Ferri* (propter ejus excellentiam, & in *Arthritide* expellenda vires mirificas) præparatum aliquod adjiciam.

℥i. *Pul. e Chel. C. C.* (vel *Purpurei*, vel *Lapidis Contray.* vel *Goani*, vel *Rubri Exon.*) *℥i.* ad *℥ss.*

Serp. Virg. *℥ss.*

Chal. Nutriti *gr. v.* misce f. *Pulvis.*

Loco Rad. Serpent. dare licet *Gentiane*, *Zedoarie*, vel *Contrayervæ* tritæ, eandem vel majorem quantitatem.

℥i. *Pul. Rad. Ari C. P. Rubri Exon.* ana *℥i.* *Alcohol Martis* *gr. v.* misce f. *Pulvis*, vel

℥i. *Spec. Diamb.* (vel *Aromat. Rosat.*)

Pulv. Gascon. ana *℥i.* ad *℥ss.*

Chal. prædicti *gr. v.* misce f. *Pulvis*, vel

℥i. *ZZ. in Indiis Cond.* *℥i.* (vel *Piperis in racemis C. gr. vi.*)

Pul. purpurei *℥i.* ad *℥ss.*

Chal. N. *gr. v.*

Syr. Abf. S. q. s. f. Bolus, vel

℥i. *Spec. Diambre.*

Pul. Lap. Contrayervæ ana *℥i.*

Alcohol M. *gr. v.*

Conf. Alk. q. s. f. Bolus, vel

℥i. *Spec. Aromat. Rosat.* (vel *Dianthos*) *℥ii.*

Flor. Salis Armon. *gr. x.*

Syr. Garyoph. *q. s. f. Bolus*, vel

℥i. *Conf. Abf. Rom. Pul. e Chel. C. C.* ana *℥i.*

Ol. Sem. Carvi *gutt. i.*

Chal. N. *gr. v.*

Syr. Cort. Citreor. *q. s. f. Bolus*, vel

℥i. *Theriac. Androm.* (vel *Mitridatii*, vel *Elect. Stomach.* a *Clarissimo Fullero descripti*)

Pulv. Gascon. ana *℥i.*

Chal. prædicti *gr. v.*

Syr. Menthe *q. s. f. Bolus*, vel

℥i. *Camphoræ* *gr. v.*

Pulv. Rad. Contrayervæ *gr. xv.*

Extr. Rutæ *q. s. f. Pil.* vel

℥i. *Piperis longi pul.* (vel *Spec. Diatr. Piper.*) *gr. v.*

Pulv. Gentian. *℥ss.* *Myrrhæ* *gr. v.*

Extr. Cent. Min. *q. s. f. Pil.* vel

℥i. *Pul. Serp. Virg.* *℥i.*

Chal. N. *gr. v.*

Syr. Aurant. *q. s. f. Pil.*

Cum enim *Bolo*, *Pulveris*, vel *Pilularum* dosi, sumendus est *Julapii* *haustus*.

℥i. *Aq. Cardui*, *Menthe*, *lactis Alex. Gent. Comp. Abf. C.* (vel *Cin. fort.*) ana *℥iiij.*

Marg. pp. *℥ij.* *Sacch. q. s. f. Julapium.*

Olea Chymica, *Sacchari* beneficio, in *Julapium* addita, longe illud efficacissimum reddunt. In forma liquida placet huiusmodi *Infusum*.

℥i. *Rad. Zedoar. Gentiane.*

Cacum. Absinth. Rom. Agrimon. (vel *Trifol. Palustr.*) ana *℥i*

Coccinell. *℥i.* *Cort. ext. Aurant.* *℥ii.*

Infunde in *Vini rubri Lusitanici*, vel *Xerani* *℔ij.* ad idoneam alterationem; tunc f. *Colatura.* *Dosis* *℥ij.* vel *iiij.*

Simili modo ex *Aromaticis*, *Cortice Winterano*, *Fruet. Cubeb. Sem. Cardamom. Ex Seminibus Anisi, Carvi, Fœnic. d. Cochlearie* paratur *Infusum*. Quilibet autem *Infusi*, sive *Amari*, sive *Aromatici* *Hauftus* habeat *Tinct. Martis Februanæ*, vel cum *Succo Limoneo* preparatæ *gutt. x.* vel *Alcohol M.* *gr. v.*

Pauperibus *ἀπόρισον* esse potest *Allii*, *Croci*, *Zinziberis*, & *Radicula rase*, cum *Absinth. Roman.* *Cacuminibus* *infusum*. Est ubi nulla in forma sicca placent medicamenta, nec ulla quidem *Infusa*. Hoc casu tum prodesse, tum placere potest *Spiritus Menthe*, vel *Juniperi*, vel *Spiritus Absinthii*. Nonnullis magni æstimatur, & quidem multarum virium est, *Aquæ*, quæ nuncupatur *Hispanorum Arthritica*, cujus hæc est formula.

℥i. *Caryophyllorum Aromaticorum*, *Nucum Myrsic.* *ZZberis*, *Maceris*, *Cinnamomi*, *Piperis nigri*, *Croci*, *Zedoariæ*, *Galangæ*, *Baccar. Juniperi*, *Corticum Cureorum & Aurantium*, *Spice nardi*, *Cubebarum*, *Aloes Hepaticæ*, *Ligni Aloes*. *Calami Aromatici*, *Stæchados*, ana *℥ss.*

Cacum. Salviæ, *Ocymi*, *Rorismarini*, *Menthe*, *Majoranæ*: *Baccarum Lauri* vulg. *Pulegii*, *Ras. Gentian.* *Florum Sambuci*, *Ros. alb. & rubr.* *Chamepiti*. *Chamedryos*, *Calamenthe*, *Molisse*, *Origani*, *Macricariæ* ana *Mii.*

Ficum, *Dactylorum*, *Amigd. amar.* *Nucum Pinearum*, *Nucleorum*, *Uvar. passar. major.* ana *℥vj.*

Mellis Virginis *℔ij.* *Sacch. optimi* *℔ij.* *Moschi triti* *℥i.*

Incisa & confusa indentur *Spiritus Vini Canarini optimi* *℔xv.* Infunde dies *x.* vel *xii.* tunc in *MB.* destilla.

In affectibus stomachi & intestinorum *Arthriticis* valentissima habetur.

Dosis *℥ss.* cum sacchari momento, vel cum mica panis, uti videbitur, repetenda.

Est etiam externi usus, ad *Dolorem* mitigandum *Articularem*; modo calidissima dolenti articulo superlinatur.

Transacta catharsi, vel si nullus ei locus fuerit, prætermissa, ad jam dicta medicamenta; sive iis non multum absumpta, descendo, eaque hoc sumenda ordine præcipio. Mane, horam circiter nonam, *Infusi* *Hauftum* ministro; tertia pomerid. *Pilulas*, vel *Pulverem*; nona vespertina *Bolum*, maximeque *Theriachalem*; & tertia matutina *Pulverem*, vel *Pilulas* exhibeo, cum *Vini Lusitanici*, vel *Julapii* *haustu*, post eorum quodlibet.

Aliquando tridui, vel etiam bidui spatium, interdum citius, huiusmodi remediis, ac methodo datis, exturbatur *Arthritis*, & articulis impingitur; ubi mirum sanguis tener, & tractabilis subito medicamenta sentit, eisque facile obtemperat; Alias non nisi longo tempore, fit translatio; Alias, non nisi aliis insuper remediis in auxilium, & operam fociam vocatis.

Quando biduum istiusmodi *Podagragogis* dicatum fuit; si tumoris, si doloris nihil erit obortum; locis *εἰς τοὺς ἔξωθεν* occupari solitis, admoveatur vel *Empl. Cephalicum* cum equali quantitate *Picis Burgundicæ*, vel *Ceratum Viride*; vel utrique cubito, sive tibiarum *Epispasticum*, quo in artus humor evocetur.

Si remedia tum interna, tum externa, modo dicta, viribus ita junctis, *Arthritidi* removendæ minime sufficiant; intendatur, oportebit, eorum alterum, vel utrumque, & auxiliis (si videbitur) novis & ascriptitiis augeatur. In remediis siccis, *Chalybis Nutriti* *Dosis* ad *℥ss.* in liquidis *Tinctura Chalybis*, ad guttas *xx.* amplificetur. Porro, hora quaque media, remediis præscriptis interponere juvabit *Vini Lusitanici* *Hauftum*; sic, ut ejus *℔ij.* vel *iiij.* nycthemeri spatium, si quantitatem ejus isto tempore, (qua per se, qua cum medicamentis sumpti, universam comprehendamus) ebibantur. Hoc autem in iis præcipue locum habet, qui *Vino* diu consuevere, & sine noxa indulgent; verum, ex contrario, non abstinent sine noxa: quorum e numero non pauci sunt, *Anomala* isthac ægrotantes. Qui *Vinum* hoc modo potare nequeant, ii *Spiritus C. C. succinatis* guttas aliquot, cum *Julapii* *Hauftu*, horis istis interpositis succinant, eo autem usque (ut huic præcepto finem imponam) evehendus, eo continuandus, ore datorum, tam vini, quam pharmacorum usus, si nihil repugnaverit, donec, æstu & orgasmo in sanguine facto, *Ventriculus* allevabitur.

Inten-

Intendenda eodem tempore externa, & quidem eo usque quoad in locum aliquem externum, *Arthritidi* recipiendæ aptum, humor coactus, & in eo tumor excitatus fuerit. Hunc in finem pelle vervecina recens extracta, artus involvantur. At nihil certius hac in re, nihil præsentius, quam *Phenigmm* acrem & stimulantem applicare calidissimum; & dum tumor oritur, tantisper renovare frigescentem. Qui vero auxilium illud, ut graveolens, hoc, quia crudele, abhorreant delicatuli; per laterem, aut ferri laminam calefactam, linteoque inclusam, & loco admotam, idem præstare poterunt.

Ut autem promptius *Arthritis* educatur, vel in lecto, vel cubiculo, se a frigore, per omnem hujus methodi decursum, tueatur æger. *Panatella*, *Gelatina C. C.* *Jusculo pullino*, & ejusmodi tenuibus, concoctaque facilibus vescatur. Si dolor, arte factus, forte fortuna nimius, ad lipothymiam tendat; de eum facientibus, de cutim irritantibus aliquid detrahendum. Si febris exardeat, vel omitenda sunt *Cardiaca*, quæ sanguinem accendant. *Decoctum album* ad arbitrium suum bibat, itaque temperetur æstus. Eo denique modo, peragantur omnia; quo, cum *Arthritis* finem propositum ægrotus assequatur; quoque per tolerabilia semper usurpata, citò tutoque foras *Arthritis*, etiam si non jucunde, eliciatur. Nequis autem, methodi hujus sive novitate, sive insolentia motus, cardiaca tam fortia, tamque larga a me præscripta, tanquam aliquod *ὀνείσμα* actum improbaret; sciat omnino velim, ut hoc semel dicam, copia, quæ rem efficiat, me contentum esse minima: sed neque nefciat, eam (quod profecto non temere dictum) & magnam sæpe oportere, & sine damno, esse. Nam (ut, meos quod attingit, dicam) etsi complures ea medicina ferventes, & ad tempus ejulantes novi: eorum tamen multos, ad sanitatem perductos; neminem vero unquam hoc æstu læsum, quod meminerim observavi. Cujus id in causa esse videatur, quod, quibus illa fortiora, & quasi *Μοχλικά*, sive interna, sive externa, opus sint, iis sanguis plerumque frigidus; nunc malis moribus, nunc ætate debilitatus, nec ad febrem concipiendam aptus.

Quamprimum orgasmo satis vehementi sanguis exagitur, solet ille virus *Arthriticum*, quod in *Ventriculi* tunicis inhæret, & vasis capillaribus continetur, abluere, resorbere, circumvehere; & tandem, quocunque vocant extremitatibus applicata, ibi deponere: Sic, ut unius horæ spatio, post *Phenigmm* admotum, tumor interdum oriatur.

Dum morbus ore sumptis oppugnatur; aliquando ea, quibus ventri extrinsecus impositis, viscera foveantur & corroborentur, non negligenda. Placet igitur, bis vel ter in die, foris sequenti, vel huic consimili, ope stuparum e panno *Wallico*, aliove quovis raro uti.

℞. *Cacum. Abs. vulg. Menthe.*

Flor. Rosar. Chamem. ana ℥℥.

Sem. Anisi, Carvi ana ℥ij.

Pulv. Cinnam. Cubeb. Gargoph. Aromat. incis. N. M. ana ℥j.

Sp. Vini vulg. ℔℔.

Vini rubri Lusitanici ℔℔. macerentur horas tres vel quatuor, vitro bene clauso, in *Balneo Mariæ*: colatura calidissime adhibeatur. Vel *Emplastrum* abdomini admotum continuo geratur.

℞. *Terræ Japon. Balsam. Chiliens. vel Peruan. ana* ℥℔.

G. Galbani ℥j.

Picis Burgund. ℥ij.

Empl. Stomach. Mag. ℥℔.

Ol. Cin. chim. N. M. ana gutt. ij.

Ista vero, post purgationem maxime profutura judico; Et quidem maxime, vel ætate, vel morbo enervatis: quorum viscera topicum postulent auxilium. Ne vero, quod in robustioribus & sanguineis suspicari oporteat, non tam illa *Ventriculum* defendant, quam ipsorum abusu *Arthritidem* allestent, Medico curæ erit.

Tumori jam facto, & ad magnitudinem conspicuam & notabilem evecto, (ne, quod insit humidi, in sanguinem remigret) admoveo soleo *Epispasticum*; itaque serum in eo contentum educere. Salsum illud, acré, virosiusque esse constat; cutim etenim inflammatur; pruriginem facit permolestam. Dies sæpe fluit complusculos; aliquot interdum hebdomadas; & ad libras interdum aliquot: Ut, ipsum *Arthritidos* miasma, ipsam causam continentem una cum sero ejici, non sit dubitandum.

Hactenus occupati fuimus in adducendis *Ποδαγραγώγαις*; verum, ut primum tumor cum dolore factus est idoneus, statim de remediorum interiorum sive dosi, sive frequentia, sive utraque, remittendum est aliquid; neque majori copia jam utendum, quam quæ, *Arthritidi* continuo propellendæ, & ne intus resuat, inhibendæ, satisfaciatur. Huic autem operi pars eorum dimidiata plerumque sufficit. *Bolum* igitur e. gr. duodecima quaque tantum hora, *Chalybisque Dosis* non nisi vicibus alternis & duplo intervallo damus.

Sin eveniat, ut, vel ob aeris inclementiam & tempestatem perfrigidam; vel ob erratum in cibo & potu, aut aliud quodvis, artubus relictis, *Ventriculum Arthritis*, dum hæc aguntur, repetat, (quod quidem minime rarum est) causa ejus recidivæ diligenter exquirenda, & sine mora removenda est. Si novæ in *Ventriculo* cruditates, aliæve impuritates sint collectæ, leniente quodam & alvum molliter inaniente, deducantur. Si ex algore contrahatur cutis, itaque reperiatur humor in tumore comprehensus; per calorem externum, per vestitum, aliaque, jam dicta, applicata, denuo elevatur. Utrouque vero casu, interna plena manu sunt administranda: Ut nempe locum, quo per infortunium, vel ex incuria & negligentia cessimus, cum industria & vigilantia recuperemus.

Et quidem nullo, quod sciam, hujus *Anomalæ* casu (ut tandem hoc argumento aliquando finiam) *Podagragoga* vel fortiora, vel majori quantitate danda; quam ubi illa recidiva est, aut in corpore cruditatibus onerata; propter imbecillitatem minime purgando, longaque morbi obsidione debilitato: illi enim ex *Chalybe*, *Zinzibere*, *Pipere* composita: illi *Spiritu* maxime volatili referta, & quam a nobis dictum est, longe copiosius sumpta, sæpe vix sufficiunt, imo sæpenumero ne vix quidem. Æger enim, misere affligus spirituum inexplicabili dejectione languens, inter remedia, utut ardentia & cardiaca, de *Ventriculi* frigore & depresso animo clamans, e vita, & quidem interdum inopinato, stupente undique astantium multitudine, excedit.

Quamvis id desiderandum, & quidem in primis optandum, ut

articulo *ἐν τοῖς ἔξωθεν* aliquod figatur *Arthritis*: nihilominus interdum satis erit, e. gr. in *Arthritidis vagæ Anomalia*, si ad internodia sua reducat: Imo quidem ex miasmate tantum resorpto, & in sanguine retento, itaque *Ventriculo* immuni facto, ægrum aliquando novi servatum. At in *Arthritidos fixæ Anomalia*, omnium commotissimum, exoptatissimumque erit, si denique in articulo aliquo defigatur.

Id autem observatu facillimum, pariterque visu jucundissimum, quod, quibus gradibus dolor, tumor, aliaque rectæ *Arthritidis* symptomata in extremis partibus oriantur & augeantur; iis plane illa, quæ post vomitum manent *Ventriculo*, levantur, & imminuantur: speciatim, iis omnino passibus *Ἀνοσιᾶς*, ventriculi dolor, cibi fastidium, cardialgia, nausea, &c. vincantur & fugentur; quibus succedit fames, cibi concoctio, oculorum vigor, & scintillulæ, aliaque redemptæ & recuperatæ salutis indicia. Ut ægrotanti denuo rectam in viam reducto, & re sua sit in eadem sedulo & constanter progredi, donec *Arthritidis* materia *ὀρθῶς* emissæ, spumaque omni effusa, tum is alacriori, tum etiam tutiori vita fruatur.

In hujus *Anomalæ* prophylaxi valent *Aque Ferratæ*, diu recteque potæ; quibus adjungi possunt remedia *Stomachica*, famem & coctionem promoventia, cum modice restringentibus; speciatim e *Cons. Abs. R. Flor. Ros. rub. Fruct. Cynosb. Pul. Rad. Ari C. Sale Martis, Ente Veneris, & ejusmodi aliis, lege medica, composita & assumpta*. Danda etiam opera est, ut dyspepsia, frigus, aliæque causæ evidentes, maxime quam primum repullulavit, & in sanguine renovatum est *Arthriticum* miasma, evitentur. Prodest etiam fonticulum in brachio; vel infra genu, prout *Chiragra*, vel *Podagra*, est frequentior, aperire. Qui vero sibi hac in parte prospicere minime curabant, *Anomalam* eos expectare par est, tum crebro, tum graviter recidivam.

Hæc est illa medendi methodus, quam meis utilem & salutiferam, in tractanda isthac *Anomalia*, expertus, si per tenuitatem nostram liquerit, aliis commendare velim, donec ea meliorem dies docebit.

HISTORIA I.

In Ventriculum & Intestina irruens Arthritis, foras expulsa.

Historiarum agmen ducat Venerabilis & Prænobilis Dominus, *RICH. ANNESLEY*, in Ecclesia Cathedrali nostra, *Exoniensis*, Decanus; in *Hiberniæ* Regno Baro *Altham*; Magni Comititis de *Anglesey* Filius: Qui, cum naturæ muneribus eximiis, cum ingenio plane divino, ex Illustrissimo Parente derivatam (Nam, ut dictum est, ad bona cuncta ne quidem *Aganemnon natus*) accepit *Arthritidem*. Id autem huic *Arthritico* bene cessit, quod per annos complures apte, quodque recte dolerent; & quod, in paroxysmis quoties spuma e sanguine effunderetur *Arthritica*, non id cum vitæ periculo, (sic, ut in plerisque solet *Anomaliis*) sed cum ægri emolumento & tutela perageretur.

Ita illi vitæ ratio si non integra, minimum incolumis diu fuerat; cum, ab *Arthritide* aliquando feriatum ultra modum, ex ea tanquam antecedente causa, miasmate *Arthritico* corpus habens *ἑμπίπλυνον*, in malum incidit gravissimum, in summum capitis periculum.

Nam horæ fructus nimio plus devorans, biduo vel triduo post, nempe quam primum in *Ventriculo* computrescentes illum aggravarent; primum, cardialgia, tum animi deliquio, moribus convulsivis, spasmo oris cynico, ut vel ipsam animam agere videretur, est correptus. Statim, atque tragœdia incœpit, arcessitus ad ægrum advolavi, malique tam atrocis, tam etiam repentinis sciscitando causam indagans, eam, quam memoravi, esse inveni; neque nisi vomitione tolli posse judicavi.

Quando vero huic ægroti, medicamentorum minime amanti, propter aliquod ex natura fastidium, *Emerica* abhorrenti, neque sine periculo toleranti, ea, quæ pharmacopolii sunt, *Emerica* non conveniret, vel liceret dare; aliam tentare vim necesse habui. *Vini*, ægro familiaris, rubri, Lusitanici quantitate bene magnam exhibui; eaque ore rejecta, haustum repetii; & quidem eatenus *Vino*, & tam celeriter dato, donec *æro* cruditatum massa omnis ejiceretur; quæ quidem magna erat, impura, acida, graveolens. *Emerici* hujus *Cardiaci* beneficio factum est, ut tum *Ventriculus* exoneraretur, tum etiam eodem tempore a deliquiis æger incolumis servaretur. Tormina, quæ postridie supererant, *Intestina* etiam premi ostenderunt: Et quidem aliter, quam in vulgari *Colica*, ea premi mox constitit. Nam cum æger jam diu ab *Arthritide* claudus fuisset, ea, quæ jam in visceribus congesta sunt, impura, materiam artubus inhære greffuque ægrum privare solitam, ad *τα ἔξωθεν*, ad se vocarunt: Quod vel ex hoc innotuit, quoniam visceribus æger acerbissime dolens, eodem tempore pedum factus est compos; & quidem magis, quam per annos ante multos. Huc enim illuc expedire, & erecto corpore, quasi vinculis solutus, ambulavit, ut ab artubus ad *Intestina* materiam *μετὰ τὰς Ἀρθρίτιδας* minime ambigatur.

Ad *Intestina* expurganda leniens præcepi, & deinceps aliquot post diebus altera vice. Dolor, qui post purgationem utriusque generis satis vehementem mansit, *Intestina* aggravans, naturam mali *Arthriticam* adhuc plenius monstravit.

Ut in artus hospitio novo moveretur hostis, (quod jam proxime faciendum) *Pulvere Gasconio*, & quod in hac re momenti erat maximi, *Vino* prædicto usus est æger. Quorum ex usu, primum dolor, deinde tumor, cum cute lævi & nitente, ortus est, & chiragram indicavit. Tum post longam intermissionem rediit fames, & ex alimento largiori paulatim vires; ut, qui fufurro, languide & debilitate, verba jam diu ediderat, voce iterum nunc viva loqueretur; iterumque gravidam faceret uxorem.

Ægrotanti profuit, quod ea fuit illi spirituum animalium vis, & tam *Elastica*, quanta utique raro observatur, quanta putari potest maxima: Quæ quidem plurimum in eo restituendo valuit.

Annos posthæc alioquin multos exegit vir præclarus, purgantibus, coctionem corrigentibus, & *Arthritidem* expellentibus, ea, *Ventriculum* & *Intestina* multum affligente, cum fere conclamatum esset, allevatus.

HISTORIA II.

Arthritis idonea, Balneo frigido in Ventriculum, & ea quæ intus sunt, repulsa.

Homo adolescens, Καλοκάγαδος, ætate proveſto patre oriundus, eaque de cauſa corpore tenero, ſpirituque animali minus firmo donatus; cum e quinto vitæ luſtro nondum exceſſerat, *Articulari* morbo plus ſemel laboravit. Appetitum habuit admodum languentem, coctionem imminutam; unde ali deſinere cœpit, & inopia conſumi. Cum eo res deducta erat, conſilio certe non optimo uxorem duxit. Adeo nempe verum eſt, infortunia raro ſolitaria mortalibus obvenire. Matrimonio nihil huic hominioni gravius, nihil unquam intolerabilius eſſe potuit. Corpus cito enervatum, & vitæ vix ſufficiens innuptæ, maritali vero impar, æſtus invaſit univerſalis, febricula *Συνεχὴς*; cui poſtmodum acceſſit Dolor *Articularis*, cum tumore, &c. ſignis *Podagræ* *παθόντων μοιχοῖς*.

Ut æſtum mitigaret, dolorem allevaret, aliaque, quæ ægrotum maximopere urgebant, accidentia reprimeret; quando calor invitaret æſtivus, aqua pedes immerſit, in frigida & falſa (nempe marina) conſiſtens. Hic pedum evanuit tumor, rubor, *Podagræ* indicia; ſimul & vomitus & inteſtinorum dolor eſt obortus, iſque diuturnus, ingens, ſic, ut ex eo plane colligi poſſit, materiam ad ductum alimentarem, e pedibus transferri *νοσφελῶς*. Sub id tempus, ut viſcera, quæ multum exæſtuarunt, refrigeraret, reſiceretque, fructus horæ ad gulam uſque devoravit; devoratos, nec eorum, nec cuiuſvis generis cibi tenax, ſtatim eiecit. Cumque iſte victus non unius tantum dieculæ eſſet, verum aliquot menſium, & omni eo tempore *Ventriculi* gravitate, vomituque, & dolore, vel continuo, vel ex brevibus intervallis redeunti, æger afficeretur; & medicinam aut negligeret, aut ea perperam & perſuſorie uteretur; iſto denique ſtatu erat, quo nullum medicina præſidium, nullam operam conferre potuerat.

Uti, ad huius viri interitum, ſociam operam quamplurima dare; ita quidem ex iis aliquo in numero eſſe, ne dicam primas obtinere, *Arthritida* verosimile eſt; quandoquidem materiæ *νοσφῆς*, ſive *Arthritice*, pedibus affixæ, ad ea quæ intus ſunt translatione, tanquam cardine principali, tota res morbi verſa eſt.

HISTORIA III.

Recta Arthritis, & in Ventriculo Anomala, ſe viciffim excipientes, cum Anomalæ curatione.

VIR generoſus, ætatis mediæ, *Arthritide Symptomatica*, ſed & ea languenti, neque ſatis regulari, diu per vices ægrotavit anno MDCCIV. circa æquinoctium autumnale, hallucis articuli majoris, globique infra poſiti dolore tentabatur; poſtea vero plantæ pedis, & deinde malleoli; ſed eo incerto, & vago.

Elapſo vix triduo retroceſſit humor (cuius tamen rei quid in cauſa eſſet, dubium erat) neque amplius pedem momordit. Ægrotantem e veſtigio invaſit alior univerſalis, tanquam febræ præluſus intermittenti. Huic accedebat *Ventriculi* gravitas, peſtoris oppreſſio, naſea, respiratio anguſta, & in ſuprema regione *Vertigo*, & ſomno appropinquante ſubita ſpirituum exulatio.

Anomaliis olim *Arthriticis* vexato, & earum non ignaro, laboranti minime latebat, hunc *Ventriculi* affectum, eſſi prima facie vernaculus appareret, eſſe revera peregrinum; & in *Ventriculum*, relictis pedibus miasma *Arthriticum*, huiusce mali cauſam, mitti. Qua ductus opinione poſſetum hauſit, amari alteratum; ad vomitum uſque copioſum; ad impuræ, crudæ, bilioſæ vomitum materiæ. Ano etiam, injecto ea nocte *Enemate*, ſubducta eſt ejuſdem quantitas non exigua. Cervici admotum erat *Epiphaſticum*; *Pulvis* datus e *Chelis* C. C. Illo multum ſeri elicitum; hoc animales ſpiritus, humiles antea & depreſſi excitabantur. Interpoſito die uno *Tinctura ſacra* levabantur *Inteſtina*, *Bolus* e *Pul.* prædicto, & *Theriaca Androm.* eo veſpere reſecit ægrotantem. Poſthæc, horis tribus medicinalibus, *Alcohol Martis* *Ἰβ.* cum *Conſ. Abſ. R. Spec. Aromatici Roſati*, & *Syr. Cort. Citreor.* forma *Boli* deglutit: cum inſuſi amari, *Vino Xereſano facti*, vel *Vini ſimplicis uſulati Hauſtu*. Pedibus *Emplaſtra*, ex *Cephalico*, & *Pice Burgund.* pari quantitate, applicata, continuo gerebantur. Si caligo, vel lipothymia poſtularer, vel quoquomodo ſpiritus deficerent, in præceptis erat, *Sp. C. C. ſuccinati* guttæ aliquot, cum *Julapii* vel *Vini Hauſtu*, darentur.

Hiſce aliquandiu uſus, æger beneficium inde bene magnum accepit: purgatis etenim *Inteſtinis*, ad τὰ ἔξω amandata eſt *Arthritis*. Pedum factus eſt dolor; tumque brevi tempore cibum capeſſivit æger: melius, quam ſolebat, eum concoxit. Quin illi lætiores eſſe ſpiritus animales, commodiuſque vitæ rem agi, vel ex una oculorum acie plane conſtabat.

Cum eo loci res erat, de validudine reſtituta nimium ſecurus, *Emplaſtra* pedibus abiecit: Hoc autem obſervatu digniſſimum conſequebatur, quod intus cito remeans, materia, ab integro τὰ ἔντερæ invadens, naſeam iterum induxit. *Emplaſtris* iterum admotis, & medicamentis ad menſem unum alterumque continenter uſurpatis, omnia proſpere cedeabant.

Huic ægroto inter alia, tutelæ gratia præcepi, ut, fonticulum infra genū aperiret; & ut quas olim ſummo ſuo commodo potavit, aquas *Bamptonenſes* iterum hauriret.

Habes *Arthritides*, rectam & in *Ventriculo Anomalam*, ſe viciffim excipientes; cum *Anomalæ* curatione, alienum expellentibus & educantibus abſoluta.

HISTORIA IV.

Arthritis ſemel iterumque, in Ventriculo Anomala, toties expulſa.

Agricola ſuburbanus, ætate maturus, *Arthritide*, uti ex intervallis ſolebat, dolens, ex halecuni eſu immodico, materiæ bilioſæ & crudæ vomitu, dolore *Ventriculi*, & *Inteſtinorum* immani, reſpiratione difficili, cordis palpitatione, *Cephalalgia*que premebatur. Magna erat viſcerum oppreſſio, & quaſi conſtriſtio. Tabacci, qui in numero deliciarum erat, uſus jam nullus. Ut primum illa intus ſuborta ſunt mala, deliquit illico *Arthritis* externa, quæcuque fuit articulorum. Nutriculis, & familiaribus palam erat, ab *Ar-*

thritide, membra relinquente, cum *Inteſtinis Ventriculum* impetente, totam hanc oriri malorum *Iliada*.

Medendi intentio erat, purgato prius ductu alimentari, ſuam in ſedem, in artus propellere *Arthritidem*: ideoque *Vinum* exhibitum eſt *Scilliticum*, poſtea *Pulvis Warwicenſis*; unde αἷον καὶ κάρω multum, & cum εὐφορίᾳ purgatus æger: peracta catharſi, data ſunt *Cardiaca*; iſque poſtmodum auxilio erant externa, *Arthritidem* educantia, articulis admota.

Horum beneficio viſceribus remota eſt *Arthritis*, & in artus amandata: Verum, propter erratum aliquod in *Sex non naturalibus*, cum ad viſcera brevi poſt redierit, ea, quæ ſequuntur, in uſum adhibui.

24. *Theriaca Androm.* *ῖβ.* *Pul.* e *Chel.* C. C. *Ἰβ.* *Conſ. Alk.* q. ſ. *f. Bolus*, omni nocte cum *Vini rubr. Luſitanici Hauſtu* ſumendus.

24. *Gentian.* *ῖβ.* *Zedoar.* *ῖβ.* *Infunde*, igne arenæ, in *Vini prædicti* *Ἰβ.* ad idoneam alterationem, tunc *f. Colatura*; Sumat *Colaturæ* *ῖβ.* additis *Tinct.* *Martis*, & *Aurant.* ana gutt. x. horis duabus *Medicinalibus*: cum *Pulv. Rad. Ari.* C. *Ἰβ.* *Chal. Nutr.* *Ἰβ.* *Bis in die* ſumat *Spir. Vol. Oleoſ.* gutt. xv. cum *Vini prædicti* *ῖβ.* *Potui ſit Decoctum atbum*, cum *Aq. cin. fort.* *Utrique Tibiæ applicetur Epiſpaſticum*.

Auctis in hunc modum *Cardiacis*, & majori quantitate, ſed neque nimia, datis, viſcera plane liberata, articulis affixa eſt *Arthritis*, æger reſtitutus.

At ille, ut erat *Δυσπλαγχνος*, & *Arthriticis* pronus *Anomaliis*, iis, ſed diverſis formis, ſæpe recurrentibus affligebatur: de quibus ſuo loco.

Historia proſert *Arthritidem in Ventriculo* & *Inteſtinis* ſemel iterumque *Anomalam*, toties arte medica remotam, foras ad domicilium proprium, ad τὰ Ἀκρὰ pulſam.

HISTORIA V.

Arthritis iterum ac ſæpius in Viſceribus Anomala, toties in Artus ablegata; cum ejus Prophylaxi.

VIR quidam, a prima ætate *Arthriticus*, quinto & ſexto vitæ luſtro, magnos articulorum habuit dolores; ſeptimo & octavo, *Ventriculi Inteſtinorumque*. Cum enim corpore valde imbecillo, ſanguine tenui, cumque infirmis eſſet viſceribus, poſt frigora, ſatietates, & cruditates fere omnes, per hoſce annos, *Arthritidi* rectæ vix ſufficientes, ad ea, quæ intus ſunt, appellī ſolita eſt *Arthritis*. Harum *Ἀνωμαλῶν*, ad rem noſtram conferentes, nonnullas in medium afferre non gravabor.

Menſe Oct. MDCCV. propter cruditates, maxime a fructibus *ῶπων*, in *Ventriculo* & *Interaneis* collectas; omiſſa, qua ad ea tuenda ſolebat uti, medicina, appetitu læſo, naſea, dolore *Ventriculi*, peſtoris gravitate, ſpiritus anguſtia, oſcillatione crebra corripiebatur.

Ut tanto onere, *Viſceribus* incumbente, *Arthritidem* iis impingente, levaretur æger; purgatio per os, per anum, mediocris, & ejus viribus æqualis, adhibebatur. Cum vero, propter imbecillitatem ægri, nullus ei medicinæ, qua ad ventrem inaniendum opus erat, daretur locus; neque *Cardiaca*, ore data, tametiſi fortiffima multum prodeſſent; ire in pejus omnia, conſequebatam eſſe rem, quotquot adſtabant, exiſtimarunt omnes: Nec quidem temere; pulſus enim debilis, membra pendula, & quaſi reſoluta; faciei pallo, corpus ſubfrigidum fidem fecit opinioni.

In hoc miſerrimo rerum ſtatu, *Vinum Luſitanicum*, modica doſi, ſed crebra propinavi: quo, ad libras aliquot ſine vomitu pote: pulſum augeri, vires aliqua ex parte reſci notabam. Utrique tunc malleolo, ubi ſedem habuit primariam *Arthritis*, *Phenigmu* admovi, quam ferri potuit, calidiſſimum, frigidumque renovavi, quoad dolor & tumor exoriretur: hoc vero paucis horis ſpatii perfectum eſt:

24. *Cacum. Ruta*, *Sem. Sinapios Raſ.* *Raph. Sylveſt.* ana part. i. *Fermenti vet.* p. iii. cum *Aceto Vini albi* miſceantur, & fiat *phenignus*.

Tumori, ne in ſanguinem alienus humor retrocederet, *Epiphaſticum* applicui; cuius virtute, quantitas ſeri bene magna eliciebatur. Dies etenim permultos, ne dicam hebdomadas, effluxit; & quidem flumine tam jugi, tamque magno, ut pro certo habeatur, foribus hiſ apertis inimicum in auxilium mitti; cauſam *Arthritidis* continentem una cum ſero amandari.

Huius ſententiæ confirmandæ gratia, duo ſubjiciam, quæ eam maximopere probare, omniſque ſuſpicionem liberare mihi videntur. Alterum eſt, quod, qua proportionem ſerum emanavit, ea plane augeretur reſpirandi ſpatium; ea, rediret fames; ea, *Ventriculi* gravitas; ea, dolor reliquaque omnia ſymptomata tollerentur. Alterum eſt, quod diutorem ab *Arthritide* vacationem, longiorem ab ejus paroxyſmo quietem, ex eo tempore quam per annos ante complures, æger obtinuit, ſanguine nimirum, methodo jam dicta depurgato.

Ut autem extrudatur *Arthritis*, ut evacuatio ſeri tam benigna, tam commoda, promoveatur, utque ei tolerandæ ſuſtinendæque par reddatur æger; vinum ei, jam dictum, quotidie dedi bibere, & quidem aſſatim; *Martisque Alcohol* bis in die ſumendum præcepi: eo quidem cum eventu, quod, uti primæ rerum mutationi conciliandæ multum contribuit *Phenignus*; ita ei continuandæ *Mars*; utraque vero ratione *Bacchus*.

Biennio poſt, cum ex *Ventriculi* gravitate, materiæ bilioſæ vomitu, oſcillatione, pandiculatione, aliſque ſignis iſtius *Anomalie* in hoc ægroto prænunciis, eam in propinquo eſſe præſciverim, *Aquis Purgantibus*, ſemel iterumque opportune datis *Ventriculum* & *Inteſtina* purgavi; malum, eo loci manſurum, anteverti.

Ut contra *Arthritidem* ægrotum, contraque *Anomalam* ejus *Ventriculum* defenderem, *Aquas Bathoniennes* biberet; ea, quæ roborant *Ventriculum*, ſimulque faciant, ut bene concoquat, (*Chalybeata* nempe, *Stomachica*, & *Astringentia*) ſumeret, ægroto inter *Anomaliarum* initia ſuaſi. Et quidem adeo ille ſecit imperata, cumque exitu tam felici, ut, qui claudus antea, pedum vix compoſ, non niſi difficulter incederet, milliaria duo vel tria ambulando jam facile metiretur. Ex eoque tempore ſanior & integrior evaſit, diuque perſiſtit. Negleſta vero poſtea, quam dixi, prophylaxi, vel parce, & indiligenter adhibita, multum ille torquebatur *Arthritide*, nunc recta, nunc *Anomala*, donec ea, multis poſt annis, conſectus & oppreſſus, e vita ceſſit.

HISTORIA VI.

Cum plenitudine Arthritis, partim recta, partim (in Ventriculo) Anomala, Purgationibus Podagragogis allevata.

Civis Iscanus, vitam agens inertem, & desidiosam, ea de causa Plethoricus & Arthriticus evasit. Etate constanti, postquam ex intervallis sæpenuero recteque doluerat, tumore pedis dextri tenebatur eo, qui tum Arthritidem, tum Plenitudinem, manifeste agnosceret. Cum eo simul orta famis imminutio, cibi fere omnis fastidium, similemque habuit cum eo progressum, & vehementiam. De causa malorum istorum altera, communi, nempe Plethora, nemo unquam dubitavit; de altera, nempe Arthritide, pedem afficiente, quando dolor Articularis, cæterumque pathognomonicon, eum monstraret, non est controversum: Sed de ea locum in Ventriculo habente, æger murmurare; & Podagram Ventriculi morbum esse commentitium, & imaginarium, æstimare visus, multa secum amulsiare.

Ego, ut ejus ingenio morem gererem, humanissimum, & priscis moribus, artisque medicæ cumprimis intelligentem, Dominum Doctorem Hele, eo tempore medicinam hac urbe fastitantes, consilium vocari lubentissime consensi. Huic ego totius morbi, sic, ut erat, compositi, historiam enarravi; maxime vero Arthritidem, olim importunam, nuperis diebus nimio plus quietam, explicui. Quibus auditis, propositam ille viam mecum calcare non est dedignatus. Socia igitur opera ægroto antea perpurcato, Chalybis & Pul. Rad. Ari. C. a me datorum usum, sed aucta quantitate, continuantes, hisce verbis consulimus.

2℥. Pul. Rad. Ari. C. e Chel. C. C. Chal. cum Sulf. pp. ana ʒss. Ext. Calami Aromat. q. s. f. Pilul. horis duabus medicinalibus sumenda, cum Haustu seq. Julapii.

2℥. Aq. Menthe Flor. Chamem. ana ʒv. Stephani, Gent. C. ana ʒiij. Marg. pp. ʒij. Sacch. q. s. f. Julapium.

2℥. Sp. Vor. Oleos. Castorei ana ʒij. misce, sumat gutt. xxx. primo mane, & hora somni, cum Julapii, vel Vini alicujus Stomachici Haustu.

Horum usu medicamentorum, maxime vero Pilularum, multo & diligenti, famem æger conciliavit; unaque opera humores Ventriculi tunicis vitiosos exturbavit.

Historia dicit Arthritidem, cum plenitudine conjunctam; partim rectam, & in extremitate corporis agentem; partim Anomalam, & in Ventriculo latentem; sed & eam medicina expulsum, in sanguinem relegatam.

HISTORIA VII.

Arthritidem ex animi perturbatione Anomalam, in viam ducunt Ποδαγραγία.

Domina R. quinquagenaria major, Arthritide frigida diu mulctata, eaque pedem nuper afficiente, propter animi pathemata, & turbas, nescio quas, domesticas, materiam vomitum (intercifo paroxysmo) in Viscera retroactam habuit. Remisere malleoli (id est, partis affectæ) symptomata, dolor tumorque, & simili proportionem intendebatur Ανορεξία; nausea, acidi & pituitosi vomitus, oscitatio, Σιόρροια, cum affectione Ventriculi Idiomate nostro appellata (Waterpangs); Nam œsophagum ascendens, bis vel ter in die, ad ʒiij. vel iv. ab ægrota, tanquam utero gerente, aqua ore ejecta est. Hanc affectionem imbecillitas spirituum, palpitatio cordis, faciei pallor, vox tremula, languens, & inusitata animi dejectione sequebatur.

Ab Arthritide Anomala, & ad ea, quæ intus sunt, inversa, symptomata ista proficisci minime dubium erat. Hoc historia morbi, & symptomatum ordo demonstravit. Utque deviam Arthritidem in locum proprium, artus ducerem, propositum mihi palmarium erat, & medendi indicatio.

Quem in finem, impedimentis, quæ Stomachum & Intestina premerent, per alvi dictionem expurgatis, Infusum amarum Martianum, horis duabus medicinalibus, Bolum Cardiacum; (e Pul. Cantiano, Chalybe Nutrito, &c.) hora somni, cum Jul. Haustu Spiritus vol. Oleos. gutt. aliquot, sæpius in die, cum idoneo quolibet Vehiculo dedi. Unde fructus, brevi temporis spatio, spe omni major, votis par. Restituta sunt viscera, scintillarunt oculi, doluit iterum malleolus, servata est ægra, & quidem una Arthritidos amotione, & in pedes εξαγωγή.

HISTORIA VIII.

Arthritis vaga primo Partibus ex contusione lapsis; deinde Ventriculo hærens, in Sanguinem resorbetur, in Artus emittitur.

Vetula quædam, origine Arthritica, dolores habuit diu per artus huc illuc erraticos; postea, contuso corpore (cum ab equo forte cecidit) læsis & debilitatis partibus inhaerentes. Hi vero deinceps, locis hisce relictis, nescio qua de causa Ventriculum invadere: namque nausea, & vomitus secuta erat permolesta, cum motibus convulsivis, & hystericiis aliquot accidentibus.

Nihil clarius esse potuit, quam quod ea, quæ olim membra infestaverat materia, peccans & Podagrica, primum partibus contusis, deinde Ventriculo committeretur: Atque huic confusus opinioni, principio curandum existimavi, ut vomitu sedato materia Ventriculum aggravans per anum ejiceretur. Præmissis igitur Laudani guttis aliquot, sub ejus præsidio pilulas exhibui purgantes; quarum ope, ut & enematis postmodum immixti, ægrota deiecit impura bene multa. Peracta catharsi, Pulvis e Chel. C. C. & Rad. Ari Comp. ana ʒss. tertio quaque hora, sumebatur; cum Julapii haustu Hysterici, & Sp. Vol. Oleos.

Hisce remediis ex lege usurpatis, notatu jucundum erat, quibus gradibus sanitatem ægra recuperaret. Primum, ut ex istiusmodi Cardiacorum usu solet, calor oriebatur universalis, eique tandem aucto, & magnum in modum evecto Ventriculi successit allevatio; sic, ut a sanguine celerius & rapidius circumvecto, miasma Arthriticum, Ventriculi

tunicis infixum, resorberi, & in sanguinis sinus recondi censeatur.

Ad tuendum Ventriculum, & Arthritida procul emittendam, Tinct. Maris (ex ejus Limatura & Succo Limoneo confecta) gutt. xx. semel bis in die sumendas, cum Infusi amari alterantis Haustu; præcepi. Quorum ope Ventriculo cautum erat, & recte egit Arthritis. Nam ex illorum usu (uti posthæc, ex illis repetitis, sæpe) ægrotavit Anus hæc articulis; at, per integrum jam deceunium, & eo amplius, ne semel quidem, ut observavi, Ventriculo, vel partibus infirmatis. Tanti usus sunt, in ordinanda Arthritide, Chalybeata.

HISTORIA IX.

Multum interesse, qua tempestate laboret æger hac Anomala, ad eamque removendam, tam externa, quam interna; nonnumquam in corpore validissimo requiri.

UT autem pateat, multum interesse quo anni tempore, qua tempestate laboret æger hac Anomala; exemplum hujusce rei magnum adducam. Homo Damnonius, propter Isca ripam agens, Arthritidem habuit a parentibus ductam, autumnus vel hyeme maxima ex parte redire solitam. Hyems erat, cum, nescio qua de causa, Ventriculum Arthritis iniit, eumque crudelissime gravavit.

Cum eo loci res erat, accitus, de morbi ingenio & natura ex symptomatum ordine judicans, Arthriticum eum esse comperi, & in artus materiam amoveri vitiosam quam citissime debere. Atque illuc rursus dirigens, Vini & Chalybis eam quantitatem dedi, eoque cum eventu, ut ex animi sententia pes doleret, Ventriculus sublevaretur: ægri vero rebus favere, & ad educendam Arthritida non parum conferre, inventa est cæli, medio hyeme, clementia.

Sub id tempus, vento, qui aliquandiu mitis fuerat, in aquilonem mutato, tempestas ingruit acerbissima, frigus intensissimum: atque hujus sævitia, ambitum corporis urgente, retroacta est, in ea, quæ intus sunt, Arthritis. Expellentibus altera vice usus sum, & ut materia denuo extruderetur, elaboravi: quod tamen, nisi remittente prius frigore, minime paratum.

Iterum pede doluit ægrotans, & quidem eo usque, donec renovato frigore Arthritis jam tertio Ventriculum invaderet. Huic autem adeo jam per frigus (quo ut terra obrigitur, ita valde constricta fuit ægri cutis, humidumque intus actum) infixa est; ut eo loci dehinc ad ipsum vitæ terminum maneret; neque Vini, neque Ferro, etsi plena manu exhibitio, neque ulla Cardiacorum, etiam si fortissimorum, vi dimoveretur.

Qui per Phanignos, & ejusmodi externa Arthritidem evocantia, fieri potuerit, (quando tyroni, militiam istam nuper ingresso, mihi nullus erat tum temporis eorum usus) nihil habeo, quod dicam. Ex eo vero didici, Ventriculi huic affectum unis ore assumptis, in corpore validissimo, non semper auferri; verum externa, in auxilium & operam iis sociam adjungi, nonnumquam oportere.

HISTORIA X.

Cibi fastidium, & Asthma, ex Arthritide Ventriculum infestante, ea expulsa, sublata; ea denuo repulsa, recidiva.

Senex Arthriticus dolore pedum, cui olim assueverat, aliquandiu liber; appetitu læso, difficili respiratione laboravit: utroque tam urgente, ut in dubio non modo salus, verum etiam vita esset. Tum denique de Medico queritare cepit. Cum illam esse rerum conditionem, mihi denunciatum est, ab Arthritide inversa, Ventriculum, & spirandi organa afficiente, turbas hæc concitari, sum arbitratus; ideoque, quando ægri vires infractæ consumptæque purgationem minime paterentur, primo quoque tempore Bolum, ex Pul. Cantiano, & Theriaca Andromachi deglutendum, una cum Vini rubri Haustu, spiritusque vol. Oleos. gutt. aliquot, dedi, & hora quaque quarta repeti. Cardiacis isto forti & generoso, pro renata, repetito, factum est, ut in artus statim expelleretur Arthritis; ut ab ea dolerent, tumerent articula, felici huic humorum Μεταβολæ debuimus, quod in mediis periculis, in extremo discrimine non omnino spe desitueremur.

Ut eum quem ita nacti fuimus, locum teneremus, Infusum dedimus amarum, Vini Xeresiano factum, modica quantitate, ter in die, potandum. Unde quidem multum æger articulis doluit, multum profecit. Hæc autem æstate acta, & favente cælo vix aderant saturnalia, cum malum recruduit, propter hyemis inclementiam, forsan gravius, & intolerabilius, Chalybe, Cardiacis valentissimis tentata est curatio; sed nequicquam. Morbo, hyeme, senectæ oppressus æger e vita excessit. Qui vero per evacuationes opportune adhibita fieri potuerat, quando earum nulla mihi data fuit opportunitas, nihil ausim affirmare. Iis autem, modo vires annuissent, opus fuisse autumo.

En Asthma & Ανορεξία, & Arthritide Ventriculum infestante: ea vero in artus expulsa, eadem sublata: repulsa denuo Arthritide, recidiva eadem, importuna, mortifera.

HISTORIA XI.

Ex Arthritide Cardialgia, ut & alias Ανορεξία per Catharticum & Humores in Artus expellentia feliciter curata.

Senex honorabilis, a multis annis paralyticus, Arthriticus, sexagenario major, tumore pedum continuo laboraverat tali, qui hydropa antecedere, præque foribus eum esse videretur ostendere. Totum enim propemodum pedem ad genu usque occupavit, digito prementi cessit, ejusque foveam retinuit diuturnam. Jampridem autem, (quod in hoc casu maximi est momenti) evanuit tumor omnis, sive Hydropicus seu Arthriticus.

Erat insuper huic ægroto, quæ quidem paralyticis familiaris, sputatio jugis, sic ut diei spatio semilibram sæpe expueret, & quidem quo plus, (quod observatione longa palam erat) eo illi melius. Nam, cum noctu lecto, cum interdiu cathedræ perpetuo figeretur; itaque exercitatione pene omni, ejusque effecta, tum urina, tum perspiratione liberiori, privaretur, majori salivatione usa est natura, & per eam aliarum evacuationum defectus quodammodo resarcivit. Saliva

autem, hoc tempore suppressa, una cum tumore pedum abeunte, aliisque mali moris symptomatibus in periculo versari ægrum manifestavit.

His adjuiciendum, quod paucis post diebus *Cardialgia* suboriretur; quæ, cum perpetua fere esset, & *Ανορεξία*, cum *Melancholia*; tanquam satellitibus stipata, ægrum adeo confecit, ut simul & caro multum, & una cum ea vires absumerentur.

Cum mihi jam antea daretur, celeberrimi hujus viri rebus invigilare medicis, salutique prospicere; malum illud nihil aliud esse judicavi, quam *Arthritidem* inversam, *Ventriculo* fixam, & quæ ab ejus *Anomalia* fluxerunt accidentia. Proindeque, ut *Ventriculus* & *Intestina* primum exonerarentur, & tunc in artus emitteretur *Arthritis*, conceptis hisce verbis, præscripsi.

℞. Aloes rosat. Pulv. Myrrhæ, Scammon. ana ℥ss. Ref. Jal. gr. v. Ol. Abs. Chym. gutt. j. Extr. Cent. q. s. f. Pil. v. mane deglutiente.

℞. Tarr. Laxant. Div. cum Jusculi Avenacii haustu, circa horam decimam sumendus; si Pil. tardius operabuntur.

Hora somni post purgationem, sumat Pulv. e Cbel. C. C. & Marg. ana ℥ss. cum Aquæ Cin. bord. ten. Melissæ ana ℥i℥. Pconie C. ℥iij. Sp. vol. Oleos. gutt. xx. Conf. Alk. ℥j.

℞. Conf. Abs. Rom. ℥j. Pulv. Rad. Ari C. Alkool. M. ana ℥ss. Syr. Abs. q. s. f. Bolus.

℞. Tinct. Myrrhæ ℥j. Sp. vol. Oleos. ℥ss. Pul. Gentian. ℥. misce, igne arena digere, f. Tinctura.

Præmissa purgatione, sumat Bolus bis in die, cum Julapii haustu; hora ante prandium, Tinct. gutt. q. xxx. ad xxxx. cum idoneo quovis vehiculo.

Pharmacis hisce assumendis, solito diligentius æger, alias pharmacorum osor, incubuit; & quidem eorum viribus *Arthritis*, a *Ventriculo*, & iis quæ intus sunt remota, in artus exulare, dolore articuli, tumere pedes; quodque est hoc amplius, abire *Cardialgia*, redire fames, incolumitasque, pro ægri ætate, cæteraque ejus conditione, magna.

Quando ex quiete nimia, aliisque in sex non naturalibus erratis, vitium alio tempore contraxerat *Ventriculus*; paucis post diebus detumescere pedes; fluere desit saliva. Malum ex eo notabatur ingravescere. Cibi enim omnis obortum est fastidium, *Intestinorum* æstus, & dolor erat: faciei pallor. Ab ore & pedibus, ad πᾶσι τοῖς μέλεσιν, ad *Intestina* humorem *Arthriticum*, & ferosum ejus vehiculum ferri constabat. Per Vinum & Oxymel Scilliticum, perque Solutum purgans, ductum alimentarem exinanivi. Pituita & cruditate omni amota per Infusum amarum, forte & generolum; perque Chalybeata factum, ut *Ventriculo* flames, ut ori saliva, ut pedibus tumor; ut faciei color: Verbo dicam, expulsis, ad τὰ ἐξω humoribus victiosis, ut ægro nobili conciliaretur, quanta maxima potuit, incolumitas.

C A P U T III.

De Colica Arthritica.

Art. I. **P**ost affectus eos, qui in *Ventriculo* sunt *Arthritici*, lata ducente via, ad illos, qui attingunt *Intestina*, descendendum est: Quorum e numero *Colica* dandus est principatus; tum quod ea frequentissime omnium occurrit; tum quod (uti solet evenire) magno cum supplicio laborantium. Hæc autem *Colica*, minime uno contenta *Intestina*, fistulam a *Ventriculo* ad anum omnem, etiam si non eodem tempore, tenet, & in ea sedem ponit. Imo quidem sæpe fit, ut cum *Intestinis* hac *Colica* vexatis, *Ventriculus* etiam, & quidem *ιδιόπαθῶς*, afficiatur, nonnunquam multum affligatur.

II. *Colica* vultum induit *Arthritis* & fixa, & vaga, & regularis, & *Anomala*, & primigenia, & symptomatice. Horum omnium membrorum omnino nullum extat, quod interdum ita non faciat. E symptomatice vero ea creberrime, quæ *Colica* succedit; quæ a *Colica* incipiens, in eam definit. Ea citissime partes has invadit;

Ad limina nota,

Ipsa domus se fert;

& artus & *Intestina* vicissim occupans sedem habet ambiguam. In natu grandioribus, & infirmis (qui *Anomaliam*, ut dixi, *Arthriticarum* mos & consuetudo est) induit sæpissime; in athleticis, & ætatem nondum mediam ingressis, aliquando. Hujus autem metamorphoseos modus & ratio talis est.

Cum æger du recta *Arthritide* per vices doluit, & jam ætate provectus est; vel ex debilitate, vel alia aliqua de causa statim exquirenda. Natura paroxysmos identidem intermittit; & nullos, aut raros, aut parvos & breves edit. Paroxysmorum istam defectionem usitatissime sequitur, ocus aut tardius, in iis, quæ intus sunt, novum quoddam malum; interdum autem caterva symptomatum illa, quæ *Colicam* manifeste indicat. Primum, universi corporis ægrotationem, & *Ανορεξία* æger; non raro nauseam quoque sentit: tum Dolore *Intestinorum*, qui plerumque fixus; & eidem quasi puncto (pali instar) hærens, portionem quandam abdominis tantillum (quod sæpe observavi) præcipue ἐν τῷ ὀμφαλῶν, pungit excruciatque. Huic symptomati aliud fere æquale est, pectoris nempe oppressio; & tanquam ab opere incumbente gravitas, quæ, ut hujusmodi *Colica* afflictiis fere cunctis accidit, ita quidem iis molestissima est. Hæc duo symptomata, (Σπρόφι nimirum, & gravitas pectoris) summa & primaria judicentur; quibus secundo loco annumeranda præcordiorum distentio, Βορβορυγμοί, ructus materiæ ple-runque biliosæ vomitus, alvi segnitie. Tertio loco, accidentia κατὰ Συναπάθεια nata; qualia sunt oculorum languor spirituum defectio, vigilia, animæ remissio, anxietas, & si morbus duraverit, universi corporis imbecillitas & macies.

Et si non semper, tamen sæpe autumnus incipit hæc tragœdia; & nisi opem auspicio medicina fert, per insequentem hyemem ægrum affligit, & quidem miserabiliter. Nam a prima *Intestinorum* aggressionem, statu, tristitia, dolore languet ille & deprimitur; noctu vigilat, interdum lamentatur: dies noctesque calamitosas agit; donec somno, cibo, refectioibus vitæ necessariis privatus; vomitu creberrimo lacessitus, dolore fractus & enervatus, macie confectus, serius citiusve (prout illius vires sunt) vitam cum morte ærumnosissimam commutet.

III. Ex his phænomenis, de morbi hujus genio & natura sta-

tuere, non erit difficile. Quid enim magis in propatulo, quam quod materia ista *Arthritica*, quæ ad τὰ Ἀκρὰ propelli sueta est (Natura novis urgente consiliis, alioque instituto) jam in visceribus deponatur, ibique dictam moveat tragœdiam; illa famem tollit: illa *Ανορεξία* infert; illa vomitum ciet; illa præcordiorum inflationem creat; illa pectus aggravat; illa dolere facit *Intestina*.

IV. Unde sequitur, quod in hoc affectu detegendo, ejusque formanda diagnosi, quamquam prima facie plurimum valere videantur e prædictis aliquot symptomata; Σπρόφι præcipue, & pectoris gravitas; tamen, cum *Colica* huic *Arthritica* illa non sunt tam propria, quin aliis *Colica* speciebus eadem convenient; hanc ob rem *Arthriticam* nostram ut rite dignoscamus, alio progrediendum est. A nullo autem alio fonte melius petenda est illius notitia quam a morbo præcedenti, *Arthritide* scil. regulari: præsertim ab illius nupero paroxysmo; ab ejus silentio, sive intermissione, paroxysmum istum insequente; & *Colica* isti silentio superveniente. Quam quidem morbi historiam, ejusque aliam ex alia partem ordine perspicuo fluentem, quisquis studiose ponderaverit: de *Colica* hujus natura, eamque revera esse *Arthriticam*, ut opinor, minime dubitaverit.

V. Hæc, de causa hujus *Colica* proxima, sive continente, quæ est ipsa materia *Arthritica* τῶν Ἐντέροις infusa: qui vero ea infundatur, sive quæ sint hujus morbi causæ remotiores, loco jam proximo dicendum.

Eæ duum sunt generum, externæ, vel internæ. *Externæ* materiam hanc, extremitatibus sive commissam, sive committendam, intro pellunt, & *Intestinis* illidi faciunt. Cujus ordinis sunt frigus, tibialia nimis arcta, vinctura, emplastra, unguenta, cataplasmata, &c. repellentia. Frigus, uti *Colicam* exquisitam ab omni ævo incutere, & vel ideo in causis ejus evidentibus locum non ultimum mereri; ita quidem *Arthriticam* identidem antecedere, eique producendæ multum conferre, certissimum est.

VI. *Internæ* sunt permultæ; earum vero princeps habeatur *Intestinorum* a natura imbecillitas, sive Ἀνωξία; qua, ad sustinendum humorum in corpore libramentum, imparia redduntur illa, & (secundum leges a mundi principio ratas & stabilitas) oneri nimio tum accipiendi, tum ferendo, prona. Quæ quidem causa, quandoquidem constans, & perpetua est, non modo *Colica* conducit primum afferendæ intendendæque; sed, quod magis est, eidem postea sæpius revocandæ redintegrandæque.

Alia magnæ ad hanc *Colicam* efficacitatis causa, impuritas & cruditas massa est in visceribus cumulata. Res notissima est, ab hepate a pancreate, glandulisque fragiformibus, in ductum *Intestinorum* mitti sanguinis impuritates & recrementa: pari etiam modo notum est, a *Ventriculo* cruditates accipi creberrimas: in *Intestinis* sibi copiosissimas. Quoties vero *Arthritico*, quoties *Ανορεξία* id obvenit, ad progignendam hanc *Colicam* mirum quantum operetur. Aliæ huic massæ contagio & afflatu inficiuntur *Intestina*: & *Arthritis* intro (non aliter quam *Emplastro*, sicut ante dictum, aut *Phenigmo* attrahente pedibus admoto extrorsum) invitata est. Verum, ut hic loci φαινόμενα, sæpe a me notati, mentionem faciam; nullæ unquam impuritates hac in re plus efficere videntur; aut ad *Colicam* gignendam magis valere, quam quæ sunt *Biliose*: quod, ægrotantium excrementis, sive ore, sive alvo redditus, ostendi solet. Impuritates in hujusmodi ægris hac via copiosius e sanguine effundi, id facere videtur; quod, vitam agendo sedentariam, parum ii percutim emittant, humoresque per *Διαπνοήν* expelli solitos, intus ferri, & in *Visceribus* deponi sinant.

Inter hæc causas porro censenda sunt, & quidem merito, aliena ore demissa, ut fructus ὀπάζει, &c. pomaceum nimis acidum, immoderate sumptum; aliaque in victu, præcipue frigido, errata.

VII. Hujus morbi notionem quicumque rectam habuerit, a *Colica*, humoribus, aut flatu orta, a biliosa, hysterica, reliquisque speciebus, quantum ille separat, facile perspexerit. E contrario, quænam species ad hanc nostram maxime appropinquent, & qua in re, ut videamus: Ratione *Originis*, *Colica Humoralis*, quoad a quiete nimia & aeris constitutione frigidiori fiat, eatenus cum *Arthritica* concordat, & eandem habet cum ea causam evidentem, quæ materiam utrobique committat *Intestinis*. Ratione *Materiæ Colicæ* hanc maxime repræsentat ea, quæ pestilens; (qualis ab *Ægineta* describitur (a). Hujus autem *Colica*, ut & *Humoralis* cum *Arthritica* similitudo tam languida, tam mediocris: ut in hac re Medicus, si symptomatum attendat ordinem pathognomonicum, ne decipiatur, non est ut multum vereamur.

VIII. Hæc, ut ab aliis morbis se jungatur hic affectus, jam a se quemadmodum differat, & quod duplex sit, examinemus.

Ratione *Materiæ*, nunc pure *Arthritica*, nunc autem (ut in tribus symptomatice) *Scorbutica*, *Scrofulosa*, &c. differentias habet, cum affinis symptomatice tribus *Anomaliis*, communes.

Ratione *Subjecti*; modo eidem quasi puncto, uti terebrum, infigitur, modo, sed raro quidem, *Intestina* pervagatur; modo etiam *Ventriculum* comprehendit.

Ratione *Causarum Procatarticarum*; alias externa aliqua materiam repellente; alias massa in ductu alimentari coacervata, & eam intus alliciente; alias binis hisce causis conjugatis; alias earum agente nulla, sed mera viscerum imbecillitate, contrahitur.

Itaque licet hic affectus unam eandemque retineat naturam; modos tamen, & ejus accidentia, præ se fert diversa.

IX. *Colicam* exquisitam raro vitæ spatio aliquid demere, magna ex parte periculo vacare, pervulgatum est. E diverso *Arthriticam*, morbum sæpe lethalem esse, semper autem periculosum, habemus exploratum. Si pectoris gravitas, si *Intestinorum* Dolor, præcipue pungens, diu persisterit; malum. Gradatim it in pejus æger, donec e medio cedat. Rata unquam, hoc casu incolumitas, nisi *Arthritide* in extremis partibus apparente; sed neque ea omni, aut semper. Nam si Dolor erit *Articulorum*, manente interea in visceribus sterquilinio; ab isto dolore externo spes evanida, inanis. Intus statim allicitur *Arthritis*, & ægrum sæpe opprimit.

At si *Intestinorum* dolor, pectoris oppressio, alvique tarditas penitus tollatur, simulque sit in extremitatibus *Arthritis*; ea morbi facies hilarior: is status optabilior.

Si vero prorsus fileant eorum, quæ intus sunt, querelæ; si revertatur appetitus, & eodem tempore fulgeat in extremis partibus *Arthritis*; tunc demum æger ἐξω βελῶν; tunc gallum *Æsculapio* litabit. Quod ut fiat, quaque methodo medendi jam p̄ xime dicetur.

X. Quan-

X. Quandoquidem ad hunc affectum interdum febris, a bile orta, se adjungit, in curationis initio id agendum, ut pulsus, ut æstus, ut sitis, ut reliquorum febris indiciorum habeatur ratio; & ad præca. vendam φλεγμονὴν si opus erit venæ sectione, in ipso limine operisea fiat, parce vero, neque supra modum huic symptomati levando necessarium; ne, eum nimis excedendo, Arthritidis posthæc expellendæ tollatur omnis facultas.

Secundo loco videndum, una cum Intestinis utrum Ventriculum ἰδιοναδικῶς afficiatur; præsertim, cruditate & alienis rebus utrum aggraveretur: Hoc casu nihil antiquius habendum, quam ut, epoto Tee, vel Cardui Decocto (neque enim Emetica suaderem valentissima) cietur vomitus.

Postridie vomitus, si vires ægri permiserint, aut interposito die uno, fiat purgatio; vel per Extractum Eustachianum, & Res. Jalap. quibus si placet, adjungi potest Mercurius dulcis; vel per Syr. e Spina, & El. Salutaris, vel, si febris urgeat, per Manna, & Salem Catharticum, Aqua hordeata solutum, vel per aliud quodvis purgans, ad hanc rem appositum. Vespere, tam eo post vomitum, quam eo post purgationem, nihil paregorici (nisi si ὑπερκαθάρσις, aut aliquid improvisum id exegerit) adhibeo, ne illo Arthritidis, in paroxysmum eruptura, tanquam suffamine, retineatur.

Adeo valet hac in re, & tanti est momenti purgatio, ut omnia illa sive negligenter acta, si non mudentur Intestina, perturbata erit curatio; & post conatus in ea varios incassum factos, sæpe illuc redire necessum erit, ubi per negligentiam est peccatum; ad Intestina nempe expurganda. Quare, si purgatio minus perfecta fuit, neque rebus ægri conveniens, omnino repetenda est, & quidem eousque, donec proposito respondebit. Atque hoc casu, diebus purgationi interpositis, nunc Pulveribus Testaceis, nunc Infuso amaro alterante, illis, si acido; his, si bile abundant Intestina, ne plane nihil agam, insisto.

Quibus absolutis, & iis, quæ viam præcludebant, amotis expeditisque, (quo quidem iter quasi medium confici videtur) ad Arthritidem extrudendam, nec quidem citius, incumbo. Hunc in finem faciunt, præter Arthritidem expellentia, (Capite primo memorata) nonnulla remedia Colicæ ab antiquo propria, ut & Aromatica, quæ cum prædictis non nepte complicantur: Hæc autem sunt pulvis Zedoarie, P. Rad. Ari. Com. P. Aurant. C. Cl. Fulleri, P. ejusdem Bezoaricus. Sp. Diatr. Piper. Sp. Calaminth. simpl. Sp. Diambra. Dianthus. Elect. e Baccis Lauri: Mithridatum, ZZ in Indiis cond. cum ejus Syr. Olea Chymica, Bacc. Juniperi, Seminum Cumini, Carvi, Fœniculi dulcis, Anisi, & ejusmodi Carminantium, & Aromaticorum. Vinum Xeresanum, aut Rubr. Lusitanicum simplex, vel amaris & Aromatibus alteratum.

His munitis auxiliis, ad Arthritidem expellendam, & in artus amolierendam, ita progredior. Ægro in lectum dato, Pulverem, vel Bolum, vel Pilulas præcipio.

℞. Pul. e Chel. C. C. ℥i. ℥ii.

Chal. Nutriti gr. v. misce f. Pulvis Comp. vel

℞. Pulv. Zedoar. ℥ss. Spec. Calaminth. Simp. (vel Diambra) ℥i.

℞. Alcohol Martis gr. v. f. Pulvis, vel, forma Boli.

℞. Elect. e Baccis Lauri (vel Mithridatis) Pul. e Chel. C. C. ania ℥i. ℥ss.

Alcohol. M. gr. v. Syr. Aurant. q. f. f. Bolus, vel

℞. ZZ in Indiis cond. Pul. Rad. Ari C. ana ℥i. ad ℥ss. Chal. N. gr. v. Syr. N. M. q. f. Bolus, vel

℞. N. Myrist. cond. Spec. Diambra ana ℥i. Chal. N. gr. v. Os. Junip. Chym. gutt. i. Confect. Alk. S. M. q. f. f. Bolus, vel, forma Pilulari.

℞. Spec. Diatr. Piper.

Pul. Serpent. Virg. ℥ss.

Chal. Nutrit. gr. v. Extr. Ruta q. f. f. Pil.

Hiscæ compositionibus superbibatur Vini Xeresani, vel Rubri Lusitanici, vel Julapii haustus.

℞. Aq. Cardui, Mentha,

Lactis Alex.

Chamæm. Comp. ana ℥iii.

Sp. Juniperi ℥ss. ad j.

Marg. pp. ℥ss.

Sacc. albiss. q. f. f. Julapium, vel

℞. Aq. Lactis Alex. ℥xii.

Sp. Cerevis. Brunsvicensis ℥iv.

Marg. pp. ℥ss.

Sacch. q. f. f. Julapium.

At si forma aridit liquida, Infusi haustus, cum adjecto Marte, detur ebibendus.

℞. Rad. Zedoar. Galangæ, Calami Aromat.

Cacum. Absynth. R. ana ℥ii. Bacc. Junip. Croci Brit. ana ℥i. Infunde in Vini Xeresani ℥ij. ad alterationem idoneam, tunc coletur Infusum.

℞. Hujus Infusi ℥iij.

Alcohol Martis gr. v. f. haustus, ante bibendum agitandus.

Ex hisce, vel hujusmodi medicamentis, sumatur aliquod, quarta, quinta, vel sexta quaque hora, medioque medicamentorum intervallo, Vini, e prædictis vel ejusmodi generosis, haustus, ea quantitate, quam æger tuto poterit haurire maximam. Quæ quidem regula, de medicamentis etiam tenenda est: ea nempe dosi, & frequentia oportere illa dari, quæ non aliam febrem, sive in sanguine organum, excitaret; quam quæ, Arthritidi ad τὰ ἔξω amovendæ, satis inveniretur.

Ita subinde fit, in robustioribus scilicet, aut spiritu animali valde Elastico donatis; ut a Purgatione, maxime si utraque (tam ea, quæ ἔξω movet, quam ea, quæ κατὰ) præcesserit; sive propter agitatum sanguinem, sive propter impuritates (quibus uti dixi, in visceribus retineri solet Arthritidis) expulsi; ea jam suapte sponte erumpat in articulos, & evadat Regularis. Hoc quodcumque fiet, unicum restabit, ut eo loci illa, quicquid iracundiæ permanet, exerceat; quicquid humoris effundendi, offundat. Verum, ut hoc interdum, & quoties fieri contingit, auspiciato fiat; ita quidem, e contrario, antequam illuc perventum, & Arthritidis artubus affixa erit, plures sæpe interveniunt difficultates, plures scopuli deteguntur, qui moras in sanando ægro medenti faciant gravissimas, quibus quasi digito demonstrandis, jam proxime incumbam.

Interdum igitur Intestina torqueri, & spasms ita contrahi manifestum est, ut medicamentum ea purgans, etiam si Δρακινώτατον, non sentiant: multo minus obsecudent, & obtemperent: quorum statum, abdomini Fotum adinovere oportebit, eumque aliquoties repetere.

℞. Cacum. Abrotan. Artemis. ana ℥i.

Rad. Aristoloch. rotund.

Flor. Chamæn. ana ℥ij.

Bacc. Junip. ℥j.

Sem. Carvi, Fœnic. d: ana ℥ss. coq. in Aq. Font. ℥x. ad v. Colaturæ adde Sp. Vini vulg. ℥ij. pro Fotu Ventris calidissimo.

Post omnem fovendi vicem, eo, quod sequitur, Venter illinatur.

℞. Unguenti Martiani ℥ij.

Ol. Tereb. vel Picis liquid.

Rhod. Ch. gutt. vi. f. Linimentum.

Galbanetum Paracelsi, ut apud Riverium est, (Capite de Colica) Linimenti hujus locum implere, & totus eo venter illini potest.

Nonnunquam autem, maxime in teneris corporibus, etiam postquam Intestina fuerint purgata, multæ restant eorum contractiones, multus dolor; nunc continuus, nunc intermittens: qui quidem eorum affectus, cum sit omnino Σπασμωδης, partim Fotu, & Linimento prædicto; partim Enemate sequenti (quod animales spiritus mulcere, delinire, & in ordinem poterit redigere) vincendus est.

℞. Vini Canarini ℥ss.

Elect. e Baccis Lauri ℥ss. f. Enema, alvo diu retinendum.

Est autem, ubi Ferri præparata, propter imbecillitatem, Intestina respuant, & quam citissime ano ejiciant, una cum medicamentis ei conjunctis. His ægotantibus e re esset, omisso Ferro, medicamenta præscripta per se dare.

Alias observare licet non modo Ferrum, sed & aliquando Pul. Testaceos, Arthritidis propellendæ causa datos; duos scilicet difficilesque, descendere, & per alvum reddi. Quoties hoc fiat, astringenda prorsus ea priusque in Arthritide dimovenda, quicquam profeceris: neque enim, fluente alvo, Arthritidis expectanda regularis. Ea vero, Terra Japonica, Creta, Sanguine Draconis, & ejusmodi mollioribus astricta, per Ther. Androm. Elect. e Bacc. per Species prædictas, e Regno Vegetabili sumptas; perque Olea Chymica; illa nempe remedia, quæ minus irritent, progredi juvabit.

Quamprimum medicina, quæ Arthritidem extrudat, ægri rebus est aptata usui ejus interno, per bidui, vel tridui spatium insistendum est; eoque tempore in ea consumpto, si per hosce dies in artubus nulla in conspectum venerit Arthritidis, ad Emplastra, Cerata, Phlegmicos, & ejusmodi Arthritidem evocantia, (Capite primo relata) confugiendum est. Quinimo postquam in articulis apparuerit, Ποδαργαγωγὸς ore sumendis usque uti conveniet; donec articulis hærens, & affixa de suo in Intestina reditu & πάλινδρομῶ, locum ea suspicioni nullum relinquat. Hoc autem punctum cum attigeris, & in rectam Arthritidis viam denique redieris; in ea, cum remediorum portione dimidiata (duplo scilicet eorum intervallo, vel subdupla dosi, ut in capite præcedenti declaratum est) procedere juvabit; & quidem dies quatuor, sex, vel octo; eo nimirum usque quoad alienum sive per extremitates eliminetur, sive in eas adeo protrudatur, ut de Intestinis iterum, intra breve spatium, impetendis nihil metuamus.

Notatu vero hoc dignissimum; atque adeo jucundissimum, quod, articulis quamprimum fixa est, Arthritidis, læto quidem omine, spem & vitam pollicetur. Visceribus statim melius est; quæque intus mali fuerint vestigia, subito tolluntur. Oculorum acies, vultus vigor, fames, & concoctio restituitur, & in vado res salutis est.

Dixta per totum hunc decursum, qualis & quanta esse debeat, ex omni parte κατὰ μέτρον ordinanda est. Nihil admittendum, quo in ea uspiam peccari possit, Panatella, Gelatina, C. C. & Eboris, Panis biscoctus, Jusculum, pullinum, maxime autem Vinum prodest, vel simplex, vel Decocto albo temperatum. Certe Vini assuetis ab eo permagna expectatio, permagna est utilitas: quare iis præsertim illud largiter exhibeo; eam nempe quantitatem, quæ calorem Intestini conciliet; quæ Arthriticum miasma ex iis ad τὰ ἔξω pellat; quæque eo loci id impune figat. Hanc autem operam optime navat: quod e Lusitania rubrum hodie nobis apportatum est; ægro ad ℥ss. ad libram integram, vel etiam duas, nycthemeri spatium, si ad rem propositam opus fuerit, concessum. Alvus si dura, (quod, tum læsto incumbenti, cum Colica, tum Arthritide laboranti familiarissimum) Enemate Oleoso, vel e Jusculo Vervefino, lubricante, diebus alternis mollienda.

Interdum observare licet, ægrum: Arthritide e visceribus expulsa, perque artus exulante, penitus emancipatum; ventris adhuc inflatione, doloreque Intestinorum urgeri; sic, ut exspes & despondens ille, per tanta artis molimina, parum in salute sua renovanda fieri, postque iter procellosum & scopulis plenum, in ipso potu se denique perituum opinetur. Hæc autem flatuum, & naturæ morbo debilitatæ, sunt indicia. Valet hac in re, ad flatum educendos, enemata e Vini Canarini ℥xii. Elect. e Baccis Laur. ℥ss. diebus continuis, vel alternis immisum; valet Infusum amarum, & ejusmodi Stomachica, quæ tum famem acuant, tum etiam coctionem emendent.

Ista medendi methodo (primum nempe vias purgando, posteaque foras Arthritidem mittendo) Colica Arthritica laborantem curare soleo; cumque hanc methodum, huic Colicæ aptam, multoque usu comprobata, & confirmata esse noverim; idcirco lubens in medio eam propono; aliorum meliora, modo proferre dignarentur, sequi paratissimus.

XI. In Prophylaxi enitendum, ut roborentur Intestina, contraque inimicum, ne illuc denuo se intrudat, obfirmetur; simulque, ut reliquæ τῶν Δυσπρετιῶν nullæ, massa impuritate nulla, in iis posthæc collecta, eum ad se alliciat. Qua de causa, hujus classis Arthritidos studere fami, & concoctioni, ductum alimentarem eccoproctico sapius purgare, aliisque Stomachicis, cum modice restringentibus uti, oportebit. Aquas Minerales multis hac in re prodesse novi, tam purgantes, quam Diureticas. Non pauci apud nos huic Colicæ proclives, aquas Alfordenses, vel Salem Catharticum, aut Tartarum laxantem, aqua hordeata solutum, bis vel ter in anno bibunt: itaque cruditates, a Ventriculo in Intestina derivatas, temporari tractantes, Podagræ præoccupant materiam, ano expellunt. Nonnulli meo hortatu commode Purgantibus aquas adjunxerunt Diureticas. Ut autem Aquæ Bathonienses ab antiquo Colicæ, ita quidem ei, quæ Arthritida est, quæ cæteris adversari censeantur. Aquarum usui Diureticarum interponantur ea, quæ ad propositum faciant Alterantia. Hora nempe decima, Infusi amari Vini albo Lusitanico facti, Haustus: quin etiam post prandium quotidie, ejusdem Vini simplicis cochlearia aliquot. Hora quarta pom. Elect. seq. ℥i. cum vehiculo convenienti.

℞. Conf.

24. Conf. Fruct. Cynob.) vel Ros. rub. per Ser. traject.) Abf.
Rom. ZZ. in Indiis Cond. ana 3 lb.

Salis Martis Div.

Syr. ZZ. 3 lb. Ol. Cin. Ch. gutt. v. f. Electuarium vel.

24. Trochisc. Hedych.

Conf. Flav. Aurant. ana 3 lb.

Salis M. Zi. Spec. Diamb. Zi.

Alcohol. M. Zi.

Syr. Abf. f. q. s. f. Electuarium.

Quatenus vero ab externo frigore oriatur hæc Colica, vestitu idoneo, vitatoque aere nimis gelido, illud eatenus fugiendum, hæc cavenda.

Id adjiciam, quod hoc effectu laborantes, quotquot ætate maturiores, & voluptatibus, aut rebus civilibus impediti, Prophylaxin neglexere, raro sine multa id fecerunt: sæpe quidem magno cum salutis, sæpe cum ipsius vitæ, damno.

XII. Placet denique, citato divini senis oraculo monstrare Arthritidis hanc in Colicam, & Colicæ rursus in Arthritida migrationem, Hippocrati non fuisse incognitam. Ita enim ille: Ω' το' Ε'ν-τερον ἐνὶ δεξιᾷ Ἀρθριτικὸς, ἢν ἡσυχώτερος, ἐπεὶ δὲ τὰ τὼ ἰντράδην, ἐπιπονώτερος. Id est, Qui articulari Morbo detentus, Intestini dolore dextra parte vexabatur, levius habebat: ubi vero hic curatus fuit, magis dolebat. (a) Quod de Colico Dolo, in Morbo Articulari obveniente, eumque allevante; postea vero, facta humoris huc illuc transpositione, in Arthritidem iterum mutato, est intelligendum. Sed hæc hæc.

HISTORIA I.

Colica Arthritica male tractata, demum lethalis.

VIR ex Tremulorum secta, probus, & generosus, ingruente senectute, integrum decennium, bis ter quotannis ægrotavit Arthritide; nunc pedem, nunc manum occupante; semper autem regulari. Annus erat vitæ sexagesimus, cum ea primum intermisit, neque more pristino ægrotum visitavit. Istamne vero quietem, & a dolore immunitatem, bonam, optabilem, & commodam existimaverit? Imo potius formidabilem, exitiosam. Doloris enim salutaris, & externi vice, alio intra anni spatium Intestinorum, præcipue πρὸ τοῦ πύλου ὀμφαλὸν acerbis, & constanti, & fixo est correptus. Interea temporis languenti prostratoque ei successit oculorum gravitas, faciei pallor, totius corporis macies & imbecillitas. Ad hæc colerica & cruda, vomitu emissa Ventriculum aggravari ostenderunt.

Incremento morbo, Empirici consilio, Aquæ ferratæ, ut & e Ferro preparata, aliaque permulta sunt adhibita; eo vero cum eventu, ut ab Aquis interanea nimio algore, a Ferri preparatis, utpote concoctis & confectu difficilibus, e vestigio diarrhoea vexaretur.

Ad senem hunc denique accitus, eumque graviter ægrotantem, neque intra cathartico opem (quæ alias essent necessaria) locatum inveniens, ore datis ποδαγραγωγοῖς Arthritidem, educantibus extra applicatis, ut in artus ea transferretur enifus sum. Et eheu! frustra, Visceribus hærens miasma Arthriticum, & coctionem impediens, aliud sibi malum adscivit comitem; nempe Ventriculi, & πῶν Ε'ντέρων impuritates: quibus utrisque depressus æger, viribus sensim inclinatis, post anni dimidium, e vita discessit.

Sæpe quidem mihi in mentem venit, robusto huic ægroto, tamen verulo, fuisse melius consultum; si, Colicæ principio facta purgatione, miasma, per idonea, per stomacho minus gravia, per e Regno Vegetabili sumpta Cardiaca, fuisset expulsum. Illud initio fieri potuisse, vero non est absimile: At oppresso ei, viribusque deficienti, ipsa medicamenta, neque nimis considerate electa, neque nimis scite data, mortem accelerarunt.

Historia narrat Arthritidem diu Regularem: at quæ progressu ætatis, Intestina perturbans, Colicam fecit, neglectaque thetapiæ opportunitate ægroto mortem maturavit.

HISTORIA II.

Arthritis vaga, Colicam mentita, ad regularem Arthritida reducitur, cum ejus Prophylaxi.

PELLIO quidam ad Iscæ ripam, annos habens quadragenos, athleticus, & bene coloratus, patre generatus Arthritico; dolore artuum huc illuc vago; hyeme præsertim, & tempestate pluvia; cum articularum tumore, rubore, nitore crebro recurrente, diu infestatus est. Hujus seculi initio, defubito cessavit artuum dolor, sed intestinorum ortus est obtusus, constans, una cum febre quadam symptomatice, pulsu magno.

Nihil probabilius visum est, quam, in ægroto jam diu Arthritico, materiam alienam Intestina invalisse; quod utique judicium, emissi postmodum sanguinis, superficiem tegens gelatina, crassior certe & albidior (quæ Colicam genuinam raro comitatur, Arthritidi vero familiaris est) abunde confirmavit.

Ut ægro prospicerem, nihil prius habui, quam universum Arthritidis ordinem mutare, id est, Intestina versus sanguinis impetum & inclinationem, arte quanta possem maxima, sistere; & materiæ vitiosæ ad ea, defluxum impedire. Secundo, ut ad ea, quæ sunt extra dirigatur, & ex Arthritide Anomala, fiat illa Regularis.

Ut utrique satisfacerem indicationi sanguinem detraxi, Catharticum, ex Pil. Rud. Scammon. & Calomel. dedi. Vespere post purgationem, ut sanguinis orgasmum incitarem, & simul Arthritidem in artus amandarem, Pul. & Chel. C. C. 3 lb. sexta quaque hora, cum Julapii Perlati haustu miscui: & ordinata re dietetica, discessi.

Quid ex eo fit? Intra biduum recrudescit Dolor articularis; cumque vel adhuc lecto ægrum detineri crederem, domi meæ me salutari, alacris, jucundus, deque noviter reverfo hospite glorior. Dignitatem in pede magni articuli iste, more suo, primum & majorem, plantæque ligamenta potissime momordit. Placuit sane, & pergratum fuit, tam facili ægrotum redimi, durioribus fuetum. Quæ ad Prophylaxin facerent, in aliud tempus, & magis opportunum, distuli.

Sydenham Opera Medica.

(a) Vide Epidem. Lib. vi. Sect. iv. & in eam Galeni & Foesii Commentaria.

Ea vere, mense Majo sequenti, sic erat: Premissa Venæ sectione, perendie salis Cathartici. 3 lb. Mannæ Zi. Aq. purp. 1 lb. Solutas ebibat; omnique hora deinceps hauriat, donec usque reddiderit; itaque diebus tertiis, quartisque, ad tres vices, repetat. Postea omni mane, Aq. ferratarum 1 lb. ebibat; quinta pomerid. sequentis Elect. Zi. cum Julapii haustu sumat.

24. Conf. Flor. Salvia Zi. Pul. Rad. Ari Comp. 3 lb. Pul. Cor. rub. & Chel. Simp. ana 3 lb. Salis Martis Riveriani Zi. Syr. Glycyph. q. s. f. Electuarium. Cerevisia Cacuminibus Hed. ter. Baccis Junip. Sem. Dauci, in potum ordinarium, medicata esto. His in mensem unum alterumque incumbat.

Ex eorum usu, propitio cum Deo, multos ille annos, tum Anomala, tum recta Arthritide immunes, egit; ad medicinam hanc stabilendam, & figendam, exemplar utique luculentum.

HISTORIA III.

Colica, ex Quiete Arthritica, in Arthritida regularem versa.

MAGNIFICUS senex, Arthriticus, paralyticus, aut sellæ, aut lecto complures annos infidens, humoribus vitiosis (qui, non uno exercitationum genere, in omnes membrorum partes, cum eorum Dolo Articulari, solebant exprimi) occasionem dedit, aut in viscera plus æquo immitterentur, ut in iis commemorarentur.

Ex hac potissimum causa, mense Majo, MDCCII. in Dolorem Colicum vir illustris incidit. Interea vero temporis salivatio, quæ diu magna fuerat, suppressa; pedum tumor, qui jam multis annis immensum, imminutus est, facta videlicet humorum ad Intestina translatione. Pectoris fuit totius gravitas, & oppressio, tanquam ab onere quodam molestissime ei superimposito.

Morbi hujus historiam contemplantur mihi perspicuum erat, humores inverti & jam Intestina versus, eorum fieri inclinationem. Quo circa, primum huc incubui, ut facibus, quibus ipsa premerentur, & tanquam retinaculis eo loci detineretur Arthritis Intestina quam citissime liberarentur; ideoque Pil. ex Calom. Ref. Jal. Extr. Eustachiano dedi; quibus satis ex voto deiecit æger impura, biliosa. Purgationem e vestigio secuta est a Vomitu, Colica, & oppressione dicta immunitas; ut etiam in extremis partibus Arthritis. Hujus promovenda gratia Gutta, quæ ab Inventore nuncupantur, Godardiana, & Alcohol Martis, bis in die sumpta sunt. Ita naturæ ferebatur auxilium, aptum quidem, & ejus agendi modo accommodatum: recte enim doluit, & Anaispos, ægrotans. Quid enim septuagenario, motbis & ætate confecto, poterat accidere fortunatus? Cum Arthritide redux est & salivatio, & pedum tumor.

Nihil hujus Arthritidos in Colicam metamorphosi manifestius; nihil hujus Colicæ ad Arthritidem unctione desiderabilius.

HISTORIA VII.

Colica multarum Hebdomadum Arthritida, eadem Methodo curata.

SEXAGENARIUS quidam, ingenio a natura subtili, rebus agendis elaborato, Arthritide, semel bis anno constanter reduce, per decennium afflicta- tus est: quo quidem tempore nonnunquam catharro, fauces invadente, & in tumorem eas elevante sæpe correptus est. Huic catharro se adjunxit, & quasi latus clausit, febricula quadam; itaque Angine speciem præ se tulit. Post dies aliquot, huic affectui supervenerunt indicia Podagræ: digiti nimirum majoris articuli primi dolor, tumor, ardor: & plane indicantur istum five catarrhum, five Anginam esse omnino Arthriticam; & Arthritidem hoc modo deviam, abnormem, Anomalam, demum in rectam conformem, idoneam migrare.

Cum hujusmodi Anomalias iterum & sæpius est pèssus, anno MDCCII. propter usum pomatæ tenuis, acidique, immoderatum, incidit in Colicam, dolore non tam acerbis, quam pertinaci, & constanti comitatum; umbilici regionem, sive potius illius portio- nem tantillulam indefinenter aggravantem. Ab hac Colica spiritus animales multum & oppressi sunt. Crebra hinc hinc inspiria, magna ani- mi dejectio, magna corporis debilitas, σπρόφως auxit frigidorum usus imperitus, improsperus; cardiacis potius, & calidis evincendo. Dum ex Colica decedit æger, in articulis externis emicuit Arthritis; sed quæ, brevi intus se proripiens, vana spe decepit ejulantem.

Quando Colica, binos circiter menses ægrotaverat, & quidem adeo graviter, ut peiori loco res esse vix potuerat: id egi sedulo, ut quicquid alieni, quicquid cholericum (quo maxime se gravari renun- ciavit æger) ductu alimentari inclusum esset, quam citissime per anum ejiceretur: ea scilicet opinione fretus (quod ante dictum est) vanam & frustra Arthritidos regularis in artibus excitandæ, spem & expectationem fore omnem; quandiu Intestina fuerint immunda, facibusque onerata. Quocirca præmissis, qui humorem evacuantum molliret, paratissime redderet exilio Pulvere Alcalisato, mane multo Extrakti Eustach. 3 lb. cum Aq. Cin. bord. Zi. El. Salutis 3 lb. propinavi. Inanitis ex sententia visceribus, iisque, quæ viam obstrue- rent, amotis, ipsum curationis apicem attentavi; nempe ut Arthri- tidis materiam ab intestinis eruerem, & in artus propellerem. Quem in finem, omni mane, infusi cochl. v. cum Tinct. Martis gutt. xv. assumenda dedi.

24. Raf. Gent. 3 lb. Cacum. Abf. Rom. Zi. Cubeb. Zi. coccinell. Zi. infunde in Vini Xerani 1 lb. ad idoneam alterationem; tunc fiat Colatura Hora quarta pom. Bolum, ex Pul. Rad. Ari C. Zi. Alco- hol. Martis, Conf. Abf. R. Cort. exterioris Aurant. Cond. ana 3 lb. Spec. Diatr. Piper. gr. iv. Syr. zz. q. s. Hora somni Bolum, ex The- riac. Andromach. Zi. Alcohol M. 3 lb. Pul. Caniani 3 lb. Conf. Alb. q. s. Porro Vini rubri Lusitanici, meo hortatu, 1 lb. quotidie potavit, Carnibus σπέντροις, & χύμοις, est nutritus.

Ne multis hac & hujusmodi medicina, diligente adhibita, dolor factus est Articularis: levatus est Intestinorum, & cum fere concla- matum esset, ægroti vita & salus in tuto posita quibus, etiam nunc post quadriennium, illum uti, frui, nuper accepimus.

HISTORIA V.

Colica Arthritica, Vomitu, Purgatione, Πόδα γαργαλίζοις extra misso Miasmate, sublata.

Atate nostra Fullo Exoniensis, patre ortus Arthritico, etiamfi adolescentiam vix egressus sæpe doluerat. Erat huius viri Arthritis nunc Anomala, fauces invadens, (de qua alibi sermonem faciemus;) magna vero ex parte Regularis. Exeunte anno MDCCI. pedem occupaverat; per tridui spatium tenuerat; cum, sine ulla ex τὸν ἔξωθεν προσπιπτόντων evidenti causa, abscissam excepit nausea, & dolor Intestinorum, una cum anxietate animi, & pectoris gravitate.

Contra hunc affectum, Manna & Salem Catharticum, Aqua Alfordensi soluta hausit; ea spe & opinione, ut humores alienos, dolorem excitantes, per anum eluendo, restitueretur. Eventus opinionem non respondit. Quare arcessitus, Ventriculum etiam quod a vomendi cupiditate palam erat, opprimi; neque nisi eo, per Emeticum prius purgato, colicam levare posse, monebam. Epoto Cardui decocto (fuit enim δεινός) biliosa multa eiecit. Eo vespere Pul. Gasconic. & Theriac. Androm. ana ℥ss. demisit, cum julapii haustu cardiaci. Postero mane Podagra, pedis sinistri convexum, marginemque exteriorem invasit. Ex quo statim Ventriculo, & iis quæ intrus sunt, bene. Dolor, anxietas, pectoris gravitas sublata sunt. Ut autem opus, tam feliciter inchoatum, medicina perficerem, Chal. Nutriti ℥ss. Pul. Gascon. Conf. Flor. Salvie ana ℥j. cum Syr. Garyophyl. q.s. ut f. Bolus, bis in die, cum Jul. haustu propinavi: ager hac methodo commodissime doluit, morbo gravissimo levatus est.

Arthritis ista primo Regularis, cruditasque, quæ in Visceribus constructæ & coarctatæ fuerant, illecebris attracta, Colicam facit Arthriticam; iis vero per catharsin expulsi, naturæ, & partium medicinarum viribus effectum est, ut in Arthritida regularem illa denuo remigret.

HISTORIA VI.

Colica, una cum Capite aggravato, Arthritica plus semel allevata.

Iscanus artifex, ætatis anno trigesimo quarto, laboravit tertia jam vice pedibus, posthæc humero, cubito, carpo, per quadriennium, bis vel ter in annum: diversas Arthritide commissuras attingente, pervagante; nunquam autem diu assigente. Mense Decembri MDCCI. pedum iste vir dolorem habuit, sed brevem, neque ultra biduum manentem. Abscissam eum excepit distentio Ventriculi, cibi fastidium; dyspepsia, vomitus, Σπρόφι, vermiculatio Intestinorum, & diarrhœa; quam insecta est suffocatio, tanquam hysterica; & a flatibus, κατὰ συμπάθειαν, capitis affectus.

Ista quando jam tres circiter menses, eosque hyemales, pertulerat, ægrum visitavi; cumque humores in ductu alimentari præparantibus, & evacuantibus; materiam autem Arthriticam, ei adhærentem, in artus expellentibus, curari illum oportere reperi, iis suo loco utrisque usus sum: diem nempe unum alterumque Pul. e Chel. C. C. quarta vel quinta quaque hora dedi; tunc catharticum e Pil. Eustach. cum Calom. dein, neglecto post catharsin paregorico, Ferrum præparatum, una cum Pul. prædicto; usque donec Arthritis ad τὰ ἔξωθεν expulsa fuit. Quod ut præstitum, confestim oculorum acies acuta facta, vigor restitutus: viscerum, & quæ intrus sunt eorum omnium querelæ desierunt. Ita quidem ægrotanti opem tuli, simulque, per materiam in artus expressionem, hunc affectum utiliter auferri posse perspexi.

Annus agebatur, aliter quam solebat, Arthritide regulari penitus immunis, eum Mense Aprili, MDCCIII. eundem hominem flatus, ructus, nausea, præcordiorum distentio, dolor Interaneorum, præcipue τὸν Ομφαλόν, est adortus. Quibus sese comites adjunxerunt, ex necessitudine quadam, tanquam eadem stirpe oriundi, & Ομογενῆς, oculorum languor, & capitis gravitas. Hisce omnibus ut earum obviam, primum venæ sectio, tum, per Extract. Eustach. Syr. e Spina, & Elix. Salutaris, purgatio facta est; qua vincuntur imi ventris accidentia pleraque omnia. Posthæc Pul. Gasconio, P. Rad. Ari. C. Ol. Junip. & Cumini Chym. Ther. Androm. Chal. Nutrito, Infuso amaro, & istiusmodi aliis, Intestina roborantibus, Arthritidemque expellentibus; una cum Empl. Cephal. parti sæpissime dolenti admoto, & Decocto interea rubicundo potui dato, affectui gravissimo penitus suecursus est.

HISTORIA VII.

Arthritis Intestina atrocissime invadens, sæpissime expulsa.

Dicam viri nobilis historiam, a me non uno nomine prædicandi, omnium utique cultu & honore percolendi. Erat ille parentibus Arthriticis procreatus, corporis habitudine tenera, spiritu animali emicante & elastico donatus: Unde sæpe numero tum improviso ægrotavit; tum etiam citius spe, & contra expectationem convalescit. Amplo illi, & diviti male id obvenit, quod hæreditas, a longa majorum serie derivata, in tractu non nimium molli sita, aere frigido, & magnam anni partem immiti, perflata esset: quæ quidem cæli solique inclementia dolorem Colicum, atque adeo Arthriticum domino, una cum multis aliis, inferre censeretur.

Ver erat, anni MDCLXXXIV. cum, nescio qua de causa, qui partes extremas solitus est excruciare dolor, eo jam cessante, intus incidit morbi vis, & sibi comitem adscivit pectoris gravitatem, tanquam ab onere imposito, permolestant. Erant tormenta Interaneorum peracuta, quæ ut allevarentur, Cathartics, si Diis placeat, & Opiatis nimio plus elaboratum est. Nam ex nimia Purgatione spiritus (per se agiles, & volatiles) ita perturbati, agitati, & quidem ita profligati sunt; ut jam orbatum somno & quiete, ægrotantem, vertigine mulctatum, menteque captum, vires plane deficerent.

Hoc modo laborantem, rum primum arcessitus, invisi: cumque, ex totius morbi, maxime vero ex gravati pectoris consideratione, appareret, eum esse Arthritidem Anomalam, medicina auctam; ut omnibus ejus medendæ indicationibus simul semelque satis facerem,

(id est, ut somnum conciliarem; ut vires rescirem; ut Arthritidem, ad τὰ ἔξωθεν, amolirer; itaque ægrum in tuto collocarem) Pulveris Cantiani, dosim majusculam, extemplo deglutendam, eaque nocte repetendam, dedi. Ex animi sententia res successit; somno enim recreatum, & tanquam vitæ denuo restitutum ægrum quæ perpeffus erat, eleganter enarrantem, inane postero audivi. Ut autem therapiam perficerem, & humorum mutata inclinatione materiam alienam artubus infligerem, Ferri præparatum adhibui; quod paucorum dierum spatio, eam validissime extrudendo, pectoris gravitatem, Intestinorum dolorem omnino omnem evicir.

Hæc erat hujusce mali therapia. Quandoquidem vero, in corpore delicato, multumque debilitato materia Arthritica, nunc a frigore externo repulsa, nunc a cruditatibus in Ventriculo & alimentari fistula contentis, intus allesta, Colicam hanc Arthriticam identidem revocaret; quibus eam auxiliis, qua methodo, quo dum eventu recurrentem oppugnavi, hisce paucis accipe.

Menses aliquot agebantur, læti quidem & dolore expertes; cum ex fructibus ὁπαιοις aliisque pravis avidè ingestis, & frigore eodem tempore contracto, redintegrata est Colica: Facta vero, per Decoctum fol. Teæ cæw per catharticum mite, κατὰ purgatione; datoque Pulvere Testaceo, & Chalibe Arthritidem expuli, regularem feci.

Cum alias in eodem ægrotante Arthritidem mero frigore repelli, & Colicam mentiri noverim; non nisi purgatis primum Intestinis, adhibitoque tum demum Diaphoretico, in fugam mitti illam, externa solum causa factum, experrus sum. Materiam vero emittendæ nihil in hoc ægroto melius conducere, aut votis respondere magis potuerat, quam Pulvis ille prædictus, qui larga (℥j.) dosi, & quidem crebro (tertia nempe quaque hora) demissus, dolori Intestinorum allevando, partium extremarum illi movendo augendoque maximi sæpe fuit momenti, & efficacitatis.

Cum vero alias hæc invaluit Colica, neque adversus eam Vomitus, Purgatio, Pulveres Testacei, ipsum Martis Alcohol, viribus junctis, vel nihilum profuere, ad Bacchum, miserorum præsidem & consolatorem, Arthritidis averruncum confugiens, ejus auxilio plane divino, materiam in artus commodum ablegavi.

Postremo addam, cum neque medicina, neque vinum huic ægroto, eadem Colica alias affecto, prodesset; languenti, & animam tantum non agenti; cum ruinosa conturbata, conclamata viderentur omnia, (quod quidem omnium expectationem vicir) opem ei, sed madido, sed bene poto, tulit Phenigmus; articulis dolori fueris admotum, aliam fecit humorum inclinationem; ægrum manifestissime servavit remedium præsentissimum.

Ita quidem, multos annos οὐδὲ οὐδὲ πάραυτα viro illustri medicinam feci; & tametsi, propter viscerum imbecillitatem, victus rationem non semper optimam; ne dicam ambulationem, equitationemque, quibus exercere se, & humores vitiosos extra pellere confidevit, intercisas; & prophylaxin omnem aut penitus omissem, aut indiligenter actam, Intestinis ii minima quavis de causa infunderetur: tamen ita factum est, ut in hujus Colicæ accessionibus, & creberrimis & difficillimis, æger semper relevaretur; & quidem eatenus, ut non nisi consumptis & exhaustis viribus, nulla vero Arthritide intus agente, supremum ille obiret diem.

HISTORIA VIII.

Colica Arthritica, cum superveniente Paralyfi.

Moribus honestis & ingenio singulari vir Arthritide per viginti annos, autumnino quoque altero, (is fuit illius hoc in ægroto typus) laboravit. Loci, quem invasit, diversitas ea fuit, ut nunc dexterum, nunc sinistrum, nunc uno eodemque tempore pedem utrumque, sed dexterum maxime lacefferet.

Excipiendum autem est, per hosce annos, quod typum ea semel atque iterum mutavit; quod autumnino illo altero deficiens, insulturno mense Februario fecit. Quibus vero autumnis intermisit Arthritidem, iis semper ægrum adorta est Epiphora; qua ex oculis, per hebdomadas sex vel octo, serum acre & pungens emanavit; & quidem adeo perpetim & constanter, ut Arthritis vicem gerere, & ejus materiam secum ferre, non immerito crederetur.

Autumno Anni MDCCV. cum, in sanguine, & visceribus, sordes & illuviem, otio & satietate, contraxerat, crassior & obefior eo factus, Dolore Colico corripiebatur; eoque, propter iter intempestivum, urgente frigore & imbribus, infirma valetudine susceptum, gravi demum molestoque cruciabatur. Interdum huic adjuncta est diarrhœa, qua cum alvus exonerata fuit, dolor remisit: ea vero sistente, recludit, una cum vomitione, nunc cholericæ, nunc pituitosæ. Ut utrique mederetur æger, clysteribus, emetico, & purgante usus est; ex eoque mala ad tempus allevata, brevi autem ex novo frigore recidiva.

Cum ad ægrum arcesserem, & præter jam dicta in morbi res minutas inquirerem; (tales initio judicantur eæ, quæ facta indagine ad explicandam morbi naturam interdum maxime conducunt;) præcipue, quæ Arthritidos esset conditio; quæque ad præsentem morbum ratio, quærenti patuit. Primum, Dolorem Colicum esse τὰ περὶ τὸν Ομφαλόν afficientem, iis coherentem, vento insuper Intestinorum, appetitu læso, oculorum languore, facile pallida, pulsu debili stipatum: tum paulo ante Podagram fuisse pedis primum unius, deinde alterius; nunc autem talum, nunc pollicis metacardylon; eam invadere, sed edentulam, neque satis crudelem: Deinde, ægrum tabescere; vires ejus enervatas, & (quod præcipue notandum erat) partes externas, non modo διαπνοή, sed & calore sese privatas, ac si vitæ lampas extingueretur, multum frigescente.

Cum ista, maxime quatenus Arthritida respicerent, animo perenderam, Arthritidem esse malum, ea quæ intus sunt, ingressam, & Intestina cruciantem, existimavi. Hoc in homine significavit Arthritico Colica, tam curatu difficilis; Hoc palam fecit ipsa tum temporis, etiamfi mitis, in artubus Arthritis.

Quare id conatus sum, ut e visceribus hostis in artus excutere, & quidem iis, quæ sequuntur. Primo, Catharsis instituta est, per Extr. Eustach. ℥ss. Scam. pul. gr. v. Bals. Per. q.s. eaque nocte Paregoricum cum Bolo Cardiacum datum est. Quando nausea alvi ductionem moneret, vomituque opus esse indicaret; Emetico levi, posseto nempe amaris alteraro, is peractus, ea sublata est.

Catharsi præmissa, Arthritidi protinus expellendæ memet accingo, compositionibus hisce usus.

24. Theriac. Androm. Diascord. ana ℥i. Flor. Salis Armon. ana ℥ss. Chal. Nutriti gutt. v. Ol. C. Nutriti. i. Syr. Garyoph. q. f. Bolus, nona vespertina, tertiaque demittendus, cum Vini rubri Lusitanici tepidissimi, ℥iv. 24. ZZ in Indiis Cond. Diascord. ana ℥i. Pul. Asp. Virg. ℥ss. Chal. Nutrit. gr. v. Ol. e Sem. Anisi Ch. gutt. i. Pul. Macropip. gr. iii. Syr. Z. Z. q. f. Bolus, hora nona matutina, tertiaque pomeridiana cura eodem vehiculo sumendus. Porro, Nycthemeri spatio, epota alia Vini predicti ℥vi. Emplastrum ex diascord. & Emplast. Stom. mag. ana paribus mensuris, cura Picis Burg. q. f. Ventri impostum est.

Horum usui, dies instar octo impenduntur: eoque factum est, ut pulsus, antea debilis & parvus, jam augeatur; & carni antea subfrigida, laudabilis & naturalis aestus concilietur.

Roborato itaque cruore, ad mutandam humorum inclinationem, eamque ad τὴν Ἀσπιδος usque vertendam Phenigmm utrique pedi calidissimum, eoque frigidissimo, ad quatuor vel quinque vices, novum imperavi applicandum: posteaque malleolis ambobus Vescatorium. Hinc acre serum ulcusculis elicitum; hinc Podagra; hinc Gonagra; & pro eorum ratione τῶν Ἐντροσίων indolentia. Qua utique animadversa re, medicamenta, sed paulatim, minuiamus; nunc eorum doses extenuando, nunc assumendi tempora extrahendo.

Interea vero, sorbitiones, ex Jusculo Pullino, Avenaceo, ex Chocolata, & ejusmodi cum tenuibus, tum Analepticis; sæpius in die, sed modice demurrunt. Carnes etiam εὐχρηστοὶς εὐπυργοὶ quam primum per stomachum liceat, apponuntur. Pedis sinistri calcem, dextri astragalum, utriusque hallum occupavit Podagra; rediit vero cum ea fames, & concoctio; rediit oculorum acies, animi alacritas; spirituum robur, & ovatio; aliaque vitæ & salutis indicia.

Cum ita res salva esse videretur & omnium opinione in portu navigarem; alter ecce turbo exoritur, quo in procellosum mare rursus abripimur.

Podagra, laudabilis & invidenda, (ad quam accessit Chiragra, ejusdem generis) aestu mordaci, cum stragulis æger coopertus incalcesceret, eum noctu affecit, qui tamen per sudorem, brevi temporis spatio, magno cum ægri fructu, solitus est abire. Hujus aestus, rationis hujus impatiens ille, ut eam vitaret, raro se in lectum commisit, cathedra totas fere noctes, hyeme frigidissima, consumpsit. Perspiratione multum hinc diminuta retunditur appetitus, brachia παραλύονται & nisi opportune miasma Arthriticum e corpore fuisset emissum, de ægro procul dubio actum esset, lecto ei denique affixo, diaphoreticis morum, aqua Bathoniensi famem restitui. Post menses quinque tristes sane & dubios, summo vitæ periculo liberatus, æger, dicta methodo, (favente verè, Deo consilia nostra fortunante,) convaluit; excepto, quod digiti vehementer resoluti, quamvis iis multum profuit balneatio, ad consuetudinem suam autumnum sequente, quo hæc scribo, minime redierant. Scripsit enim & quidem pristino charactere, lectuque facili; sed litteras vacillantes, neque semper ex æquo ductas: Cætera belle se habuit, & quam morbo primum ineunte, longe melius.

C A P U T IV.

De Diarrhœa Arthritica.

Art. I. Colicam prædictam sequitur ejusdem numeri Diarrhœa; naturam habens, & curationem postulans, quodammodo privatam. Diximus, Arthriticum in sanguine miasma, εὐχρηστον, fere perpetuo renovari, & certo quodam temporis spatio repullulare: Diximus, adauctum & evectum in Intestina sæpe mitti. Hisce positis, advertere licebit, nonnunquam pancreati & glandulis Intestinalium fragiformibus (a Clariss. (a) Listero primum, uti verisimile, detectis; a Clariss. (b) Peyero plenissime descriptis) illud infundi; atque hinc in cavum Intestinalium a natura pelli; & demum, urgente ejus acrimonia, spiritusque animales stimulant crebris dejectionibus e corpore exterminari.

II. Hanc autem Diarrhœam esse revera Arthriticam si symptomata, tum ea, quæ intercidunt, tum quæ alia ex aliis, insigni profecto ordine, emergunt, accurate, & suis ponderibus diligenter examinemus; per ea satis superque declaratum est. Quis enim, quotiescumque veteri Arthritico, mediis in doloribus versato ex causa aliqua evidenti, materiam in Intestina derivante, accipit Diarrhœa, eamque statim excipit doloris, & tumoris externi diminutio; postea vero libertas ab Arthritide diutior: quis, inquam, inficiabitur, hanc Arthritidem, initio rectam, Intestina jam petere perque alvum effugere, id est Diarrhœam illam esse Arthriticam?

Ita certe, Arthritico dolenti quæ hujusmodi obvenit, Diarrhœa est plane Arthritica: Quæ dolore communi contingit, & materiam, adhuc in sanguine latentem, sed in artus abituram, manifeste alio divertit, perque Intestina exprimit; quamvis argumento fortasse minori, certe tamen satis valido, & firmo, non alia, quam Arthritica est habenda.

III. Hic affectus, si consideremus ejus indolem, & causam continentem, est tantummodo unus; quippe qui Arthriticos, per Intestinalium cernicula, perque dejectiones, quam ex consuetudine, frequentiores, fugam comprehendat, oculisque semper objiciat. Si vero illius initia, sique exitus varios evolamus, longe a se diversus est. Miasma in sanguine Arthriticum nunc a natura directe, & quidem eo nomine quod ingravescat, deorsum pellitur; atque illiusmodi fluor paroxysmos interdum Arthriticos antevergens, salutaris esse reperitur. Expulso etenim inimico, clauduntur januæ, pax, & quies restituitur; viget œconomia. Hoc autem in corporibus εὐσπλαγχνούς, id est, fibris robustioribus, firmis spiritibus donatis. Sæpius autem multo, vel assumpto Cathartico, vel a cruditatibus, Intestina irritantibus, Ventrem aperientibus, miasma illud e sanguine elicitur, & una cum illuvie Intestinalium, ano expellitur.

Hujusmodi Diarrhœa incerti admodum eventus est; si enim temporis cohibeatur, neque modum excedat, utilis sæpe invenitur; & quidem Arthritidis materiam, etiam si via non usitatissima, tamen tuta emittere: Cui istud consequens, quod paroxysmus non nisi diu post recurrit Arthriticus. At in iis, quorum Viscera satietate crapula Sydenham Opera Medica.

(a) Vide Aëta Philosophica Londinensia N. 95.

(b) Vide Clarissim. Peyeri Parerga Anatomica.

laque sunt debilitata, cum natura Ventris impetum comprimere, crissique legem imponere nequit; Diarrhœa nimium pertinaci, minimeque tolerabili, illa identidem opprimitur. Non tantum inimicus; verum etiam amici, spiritus scilicet ipsi, vigiles & præsidēs salutis, in exilium mittuntur: œconomia subversio est & plane παραλυσία.

Hujus utriusque casus exempla mox in medium vocabo.

IV. Therapiam hisce casibus ut accommodem, in Diarrhœa ista Arthritica, quæ in sanguine initium habet, nihil inepta sedulitate stultius, dicam, an periculosius? quæ pharmacis perperam ingestis, naturæ opus sæpe inturbet, interdum abrumpat. Suo potius arbitrio ea, patiaris, agat; quodque intus læsurum erat, suo utiliter ingenio effundat; Si vero Diarrhœa nimium excurrat, viresque excedat, adstringentibus sistenda est; cardiacis æger roborandus. Sive per se desit Diarrhœa, sive per medicinam, ejus reliquæ Aquis Purgantibus, Tartaro laxante, & Manna (si opus fuerit) adjectis, post tempus aliquod egerendæ sunt.

Si a Cathartico accidat ista Diarrhœa, similiter, atque casu præcedenti, parum utilis medicina; de Τρεμαδέρσι, tantum cautio sit.

In Diarrhœa Arthritica cruditatibus exorta, quæ omnium mihi periculosissima videtur, alia res est: Hic, Ventriculus sæpissime aggravatur; ideoque, si ita sit, Decocto Tee, vel Cardui, movendus. Postea, (sive vomitu neglecto,) venter leni Cathartico subducendus: tunc ad Adstringentia, & Fluorem cohibentia festinandum. Bolus ex Diascord. Spec. Conf. de Hyac. Croco Martis astr. Terra Japonica, Syr. de Ros. f. quarta, quinta, vel sexta quaque hora demittatur, cum Julapii Cretacei Haustu. In Alvum detur Enema, ex Vino Canarino, cum Gelatina Amyli, vel Diascordio Ventri admoveantur Lanea, Decoct. Rad. Bistort. Tormentill. Balaust. &c. Cerevisia generosiori facto immersa; & sæpius repetantur. Potioni sit Infusum Ros. Rubr. vel Decoct. album: Et ad vires instaurandas, Vinum rubrum ustulatum.

Si pulsus sinet, oprime conducet Opiatum, Laudani puta guttas aliquot, vel potius Opii quasi granum, cum Theriac. Andromac. ℥ss. ℥ii. dari.

Si periculum est, in Dysenteriam ne transeat Diarrhœa, sumatur Emulsum sequens.

24. C. C. C. ℥ss. G. Arab. Tragac. ana ℥ii. coq. in Aq. Oryzata tertia Decocti ℥iiii. ad ℥viii. Colatura Amygd. d. cortice nudatis, & Sem. Pap. albi inter contundendum affundatur; iterum colata; Aqua Cin. fort. aromatizetur; Saccharo dulcetur.

Quæcumque vero vomitum & purgationem excitent, ea non, nisi caute, in usum trahenda; ne quæ auxilio esse debuerant; ægroto imbecilli graviterque laboranti obsint. Quod quidem in monitis ideo præcipue a nobis positum est, quoniam hujusmodi laborantes, fluore multum enervati & depressi catharsi tolerandæ sæpe impares inveniuntur: quo quidem in casu, Cardiacis & Adstringentibus solis utendum est.

Cujuscunque demum originis sit Diarrhœa prædicta, Prophylaxis optime per Aquas ferratas, & quidem jucundissime, patrata est: quibus addi potest, ut in artus eruclatio fiat materia, e Ferro præparatum aliquod; omnium autem optimum id quod Alcohol Martis appellavi.

H I S T O R I A I.

Diarrhœa Arthritica crebra & salutaris.

Matrona quædam, in regione civitatis septentrionali, multos annos Arthritide per vices ægrotavit; initio vaga, deinde fixa; nunc recta, & idonea, nunc anomala. Primum gutture, tum manu dolentem; Angina primum Arthritica; tum Chiragra laborantem, invasit aliquando Diarrhœa: de qua, ut illam suppremerem, cum arcesserem; ejus de vehementia frequentiaque percontanti, mihi narratum est, neque tam urgentem, ut quæ non possit tolerari; nec quidem aliam esse eam, quam quæ commode & utiliter possit; pariterque, alvo soluta, paroxysmumque finiente regularem, non sine ingenti fructu, ægram iterum & sæpius fuisse.

Quæ cum ita esse acceperim; vitatis hinc, quæ Diarrhœam intenderent; illinc autem maxime, quæ contraherent; in eo operam navavi, ut ægra mediocritatem, multo usu comprobata, probatione multa commendatam teneret; ipsamque naturæ, Medicorum Principis in sanando methodum, omnino persequeretur. Nec quidem minus aliquid, imo majus eo factum esse arbitror; quam si inutili, ne dicam ancipiti plane, πειραγῇ, corrasis usquequaque medicamentis, multaque arte compositis, ægra, tanquam corbita, oneraretur.

Hoc autem, in tempestivæ illius negligentiæ laudem, addi insuper oportebit, quod, tametsi ægra sæpius ex eo tempore desedit Arthritide, eaque semper in Diarrhœam desinente, perque alvum exeunte; nihil illa damni propterea tulerit, lucris vero permultum. Cujus quidem rei causa nescio an ulla probabilior excogitari possit, quam quod ægra, spiritibus firmis, constantibus, ad munera sua obeunda paratissimis, (qui nempe tum malum civem prompte expellant, tum eo expulso foribus occludendi subito invigilent) donaretur. Rara autem hæc, Arthritide ἐν τοῖς Ἐντέροις ægrotantibus felicitas, quorum pars maxima, alvo vel liquida nimis, vel nimis dura, observatur. Ægra, post sex hebdomadas ab Arthritide triforimi immunis, sanior & vegetior evasit.

Historia tradit, ex una eademque Febre, ad amoliendum miasma Arthriticum suscitata, diversis posse illud deponi locis, perque diversa excernicula proturbari; nempe per glandulas oris Salivares, per artuum Mucilaginosas, perque Intestinalium Fragiformes; & cum Arthritide regulari, Diarrhœam esse posse simul Arthriticam, eamque salutare.

H I S T O R I A II.

Diarrhœam ex Cathartico, Arthritica opportune suppressa.

Aliam novi generosam, lectissimam, cultu. & honore profecto dignissimam; quæ, cum marito juncta esset Arthritico, ipsa etiam cito laborare cepit. Cubiros, humeros, hos illos in manibus articulos habuit affictos. In cubiti dextri extremitate rursus erat,

a durato steatmate, juglandi par: digitus ejusdem manus longissimus, totis dissentus, motu privatus. Articula menta, præcipue medium ejusdem digiti infarctum. Malleolus item, pedis planta, calcis tendo, & genua laborarunt. Paroxysmi solebant esse gravissimi, dolore multo comitati; mensem integrum, interdum etiam alterum, permanentes.

Nuper autem, cum per hosce sex menses urgeret ægrotatio quædam, torpor videlicet, inertia, una cum vertigine, visu oculi dextri imminuto, dolore ejus, ut & universi corporis externi molestissimo, appetitu depresso, (quæ quidem omnia, neque satis fixe, neque satis recte *Arthritidos*, erant accidentia) sumpto, nescio cujus hortatu, cathartico, sed neque eo fortiori, aut elaterio; vomitu illa, & *Diarrhœa* materiæ viridis præcipitante, corripiebatur; sic ut sex dierum spatium sexagesies minimum dejectet. Sordium hæc *Arthriticarum* erat per ventrem evacuatio copiosa, neque ex omni parte inepta. Nam symptomata hinc collapsa sunt, & evanescere omnia. Digitorum tumores, ob *Arthritida παροξυσμοσιν* eo tempore magni, subsedere: quæque ab ista *Diarrhœa* fluxerunt incommoda, lucro & compendio eam consequenti, facile cedebant. Ab effusis hisce purgamentis, corpus liberum, & ad tempus aliquod incolume.

Hoc pene totum naturæ opus, unum artis erat, *Diarrhœa* nimium ne excurrat, curare, & ægræ vires sustentare. Hoc ego propositum, hanc metam spectans, nihil aliud, quam astringens & cardiacum aliquid, præcepi: illud autem opportune adhibitum, languenti, debilitatæ, pulsum humilem & imbecillum habenti, alvum compressit, vires instauravit.

Habet exemplum *Arthritidos* (cathartico viam monstrante) in fugam se per *Anum* conjicientis; *Diarrhœa* habes *Arthritica* curationem.

HISTORIA III.

Arthritis Vaga Intestina occupans, solo Externorum usu evocata est, & Artubus affixa.

Uodeviginti annorum adolescens, patre inde ab incunabilis *Arthritico* natus, artuum habuit dolores; a longo tempore vagos, & ut amicorum opinio tulit, *Rheumaticos*; cum tumore albo, submolli, articularum intervalla sæpissime, ipsos etiam articulos aliquando infestante. Sanguini, quem identidem & copiose detraxi, cutis usque crassa & densa, brevi semper innatavit. Ut ejus dyscrasiam auferat, æstate anni MDCCV. hortatu nostro, varia periclitatus est æger; *Succum* nempe *Taraxaci* & *Coclearie* depuratum, cum *Hordei*, *Rad. Gram. C. Fœnic. d. Asparagi Decocto*; *CrySTALLUM* item *Minerale*, *Chalybeata*; suoque loco *Lacticia*, & *Aq. Bathonienses*. Ex quibus omnibus utilitates & fructus cepit aliquando multos, observantia pares: intermisit dictus ille *Rheumatismus*.

At post sesquiannum, cum æger sanguinem, uti par erat, minime correxerat, *Intestinorum* tormina, cruciatus subiit immanes, *Diarrhœam* pertinacem, neque medicinæ facile cessuram: unde enervatus, multumque debilitatus æger, neque morbum diutius, neque remedia ferre posse videbatur; sed in ipsa mortis propinquitate versari.

In hoc ancipiti & pene deplorato statu, morbi naturam plane *Arthriticam* animo advertens, methodo, quam in *Arthritide Intestinorum Anomala* interdum non infelicitè adhibueram, uti animus fuit. Neglectis scilicet medicamentis, quibus ore sumendis impar erat ægrotus, externis incumbere. Ideoque iis utriusque brachii locis, quos excruciare solita est *Arthritis*, e *Fermento veteri*, & *Phænigmos* jussi calidissimos applicari, & cum refrigerint iterari; donec oborti fuerint tumores, iis, qui a *Rheumatismo* credebantur esse permixtos. Tumoribus his, ex voto factis, admovi epispastica: unde ichor, ad hebdomades aliquot, jugiter effluxit.

Quantum hinc utilitatis, quæ commoda, quam subita curatio, capi vix potest. Quo tumor est evectus pari certe cum eo passu sublata tormina; suppressa *Diarrhœa*: quinimo novatur appetitus, restituantur vires. Ægroti status, sive viscera, sive artus spectemus, omni dolore paulo post immunis, quam per annos aliquot antea ætos sanior, & quidem multo jucundior evasit.

En *Arthritidem*, artus pervagari solitam, *Intestinis* adhærescentem; cum torminibus, *Diarrhœam* inducentem, solo externorum usu ad πᾶσις evocatam.

HISTORIA IV.

Cruditatibus exorta Diarrhœa Arthritica, Medicinæ viribus inhibita.

Vir amplissimus, antiqua *Damnonii* nobilitate natus, *Podagra* utroque stemmate derivata confectus, ejus impetum bis vel ter in annum constanter est perpeffus. Ad hospitem tam certam, tam fidem, pro utriusque ingenio accipiendam, mundum ille *Arthriticum*, comptum adeo ac elegantem, in promptu, apparatus habuit, ut, e *Ποδαγείων* natione magna & lauta, raro ullus unquam magis.

Annos ille permultos hunc in modum (id est, duriter) exegit; cum ad tuendam concoctionem opera, diligentiaque, quam omni vere & autumno, per catharsin, &c. popere solebat, penitus omiffa, vitæ acta nimis sedentaria; primum, plane conticuit *Arthritis*; neque more suo, in extremis partibus eluxit; mox, in *Ventriculo* & *Intestinis*, sordium massa collecta, compressa est. Hinc *Ανορεξία*, rictus sæpe impuri sapor ingratus, a pastu ventriculi gravitas, præcordiorum dissentio; hinc oscitatio creberrima (symptoma *Arthritidos*, in visceribus latentis, huic ægroto familiare;) dolor a flatu lateralis, pungens: illarum videlicet impuritarum indicia. Hæc subsequitur *Diarrhœa*, qua tum illæ, tum quæ *Visceribus* adhæserunt *Arthritica*, per anum exprimuntur.

Cum autem ista *Diarrhœa* neque naturæ rebus, nec ægroti votis responderet; per *Decoctum Teæ*, ventriculum; per *Rhabarb. Infusum*, addito *Salutis Elixir*, *Interanea* purgavi; itaque facta, quanta opus erat, evacuatione, per *Diascordium*, per *Crocum Martis*, & ejusmodi alia, *Ventrem* cohibui. Aqua, sed cocta, & vino mista, potui daretur; cibi, sed solidi & intus manfuri, paululum caperetur, in præceptis posui. Ut autem appetitum languentem, & pro-

stratum excitem, ut *Arthritica* sanguinis recrementa ad πᾶσις propellam; & in artubus, uti moris erat, deponi faciam, *Aquas Bathonienses omni mane hauriendas*, *Bolum e Pul. Rad. Ari C. Conc. flor. Salviæ, Chal. Nutrito*, *Syrupoque Garyoph. cum Vini haustu dimittendum*, præcipio: itaque in viam *Arthritida* reduxi; ægrum οὖν θεῶν restitui.

Diarrhœam, cruditatibus exortam, miasma *Arthriticum* ad πᾶσις *Εντερά* invitantem, perque anum effluentem, arte curatam, exhibet historia.

HISTORIA V.

Diarrhœa Arthritica lethalis.

Dominus C. tum *Cereris*, tum *Bacchi* cultor egregius, *Arthritidem*, non uno nomine hæreditariam, malis moribus, victu autem inordinato maxime, auxit & exasperavit. Ab ineunte pueritia minime temperatus, adolescentiam vix ingressus, cacochymia factus est *Arthritica* gurgis, neque tam affectu isto tentari, quam ab eo occupari diceretur; anni enim vix dimidium vacavit.

Cum ita materia gravaretur *Arthritica*, eaque de causa in statu esset dubio; casus intervenit, qui exitum ægrotanti fecit non minus severum & tristem, quam improvisum & inopinatum. Ea fuit tempestas, quæ fructibus *ὀπείων* cepit abundare: hos ita devoravit, præcipue (quod maxime appetit) fragum; ut diu nihil aliud esculenti capeffiverit. Vini autem loco, quod τῶν ὀπείων frigidum mitigare debuerat, lac, vel aqua fontana erat, saccharo dulcata.

Gulæ tam insolitæ post impensam circiter hebdomadam, *Diarrhœa* immani æger est correptus; quæ non solum massam *Ventriculo* & *Intestinis* inclusam; verum etiam *Arthriticam*, in sanguine contentam, & exilio paratam, ano ejicere jure merito censeatur. A dejectionibus ita crebris & immodicis, vires adeo prostratæ sunt & pefundatæ, ut ægri res (iis, quæ opportune data auxilio esse poterant, neglectis,) statim in pejus ire cernerentur. Primum enim, pulsu debili, deinde sensu communi vacillante; tum motibus convulsivis, & deliquiis atrocissimis, & brevi tempore revertentibus est oppressus.

Ita quidem ægrotans, qui, dum *Arthritis* impetus fecerat idoneos, etsi vitam non beatissimam, at non temendam, imo tutam egit; *Diarrhœa* (quam quidem solitariam, & *Arthritidi* minime conjunctam, tutius & melius, si non *ἐκπέρας* subire valuerat) hæc exorta, illico una cum morbo, vitam effudit.

HISTORIA VI.

Aliud Exemplum Ægroti Diarrhœa Arthritica occidentis.

Hic consimilis est historia viri, apud *Damnonios* olim notissimi; quæ, quantis in angustiis, qualique discrimine versentur ii, qui fluore alvi laborant *Arthritici*, luculenter explicat. Fuit ille ætate integra laxo & obeso corpore, alvo (quod habitioribus solemne) plerumque liquida. Inordinata victus ratione, quicquid occurrat avidè ingerendo, vomitus assiduus, & *Diarrhœam* arcessivit; quodque temere dimisit, statim ore, vel brevi temporis spatium ventre reddidit. Hoc etiam modo *Arthritidis* paroxysmos quibus in singulos annos affici solebat, regularibus & idoneis, (ejus scilicet materiam ad *Intestina* sollicitando, *Diarrhœa* fere perpetua per anum expellendo) ingruentes absceidit, plus biennium aspulerat; neque ad fastidium aliquod notabile, & observatum dignum, unquam, eo tempore toto evehi permiserat. Postratus appetitus ciborum omne genus fastidium erat; caro assumpta, cutis flaccescens, languentes oculi, faciei macror, quasi ab aurugine, flavescens, urina exigua, & colore rubro, suspiria crebra, animi dejectio miserabilis, pulsus debilis & celer, sitis importuna. Quibus animadversis, non hæc ab una *Intestinorum* imbecillitate (tamen illam esse non negaverim,) aut natura quasi confecta; sed ab aggravata potius, & *Arthritide ἀνορέας* agente oppressa, oriri contendebar; ideoque *Arthritidem*, deviam & palantem, ad externas partes, ad artus expellendam. Cui quidem opinioni cum Medicus ægri ordinarius, & *Συνεργάτης* meus est astipulatus, primum ut sordium massa, quæ *Ventriculo* onerosa, *Arthritidem* eo loci detinere visa est, dimoveretur, Emeticum dedi: *Decoctum* nempe *Cardui*, cum *Vino Lusitanico*, propter Ægroti imbecillitatem, admisso. Phlegma ejectum est, cum *ἀποεξ* copiosum. Nullum eo vespere paregoricum. Postremo mane, respiratio liberior, vigor oculorum vegetior, major animi alacritas, & quod desideratissimum, en etiam manus & pedis dolor, tumor, rubor *Arthriticus*: Qui, in statu tam lubrico, ut augeatur, *Bolu ex Ther. Androm. Croco M. astring. Pul. a Chel. C. C. Syr. de Ros. f. quarta quaque hora sumitur, simul cum Vini rubri prædicti haustu*; cui *Tinct. Martis nutriti gutt. xx. sunt adjectæ. Sp. C. C. Succinatus subinde datur, & Potui Vinum Aqua Fontana cocta dilutum*. Quinimo, ut quem auspicio nacti sumus, eundem caute & diligenter locum tueamur, *Phænigmos* (e *Seminibus Sinapios, Raf. Raph. Sylv. aa. p. j. Fermenti vet. p. iij. Aceti vini albi q. s.*) tumoribus *Arthriticis* calidos admoveri, & quam primum refrigerint, iterari præcipimus, donec in molem illi majores eleventur. Aucta hoc modo utraque inflammatione, ad evocandum illius serum, & materiam simul *Arthriticam Epispastica* super eam imposuimus, quibus ichoris falsi vitiosique libræ minimum duæ, spatium quadridui, sunt elicite. Pallidior hinc paulatim urina, & ab *Arthritide* quies.

Finito paroxysmo, ad instaurandam concoctionem, & robur *Interaneorum* confirmandum, socia opera primo *Lene Catharticum*, deinde *Chal. Nutritum* adhibuimus. Dietam omnem quantitate & qualitate aptis accommodavimus.

Quamdiu κατὰ μέτρον egit, monitis & præceptis his obtemperatus æger, tulit observantia fructum. Cibum avidè satis appetit, tenuit, digessit; raro, neque nisi laudabiliter dejecit: integra & tuta videbantur omnia. Ante vero, quam vires, nupera tempestate labefactatas, resarcire, valuerat, suo se iterum more gerens, & genio indulgens, *Diarrhœa* subito recidiva, motibus convulsivis, &c. stipata, paucarum horarum spatium est surreptus.

CAPUT V.

De Dysenteria Arthritica.

ART. I. Quæ tormina, quæ Intestinorum cruciatus, graves utique & terribiles, ex Arthritica materia illorum tunicis impacta oriuntur, in superioribus tractatum est. Tenemus ultra, & utrum hæc tantummodo, an etiam alia; an his majora miseros mortales interdum non excrucient, & demum morti obijciant, serio expendamus. Quocirca, hoc Capite de Dysenteria Arthritica, & in sequenti de Abscessu Intestinorum Arthritico sermone inferemus.

II. Et quidem hæc res inspicienti palam erit, acrem illam & virosam Arthritidos materiam, & causam continentem, quæ dolores passim in corpore crudelissimi concitantur, quæ membranae velluntur, & exulcerantur, quæ ipsa interdum ossa corrumpuntur, & carie conficiuntur: Intestina etiam aliquando mordere: illius rosione perfodi, & exedi vasa eorum exilia: sicque fieri posse Dysenteriam, quam tradimus, Arthriticam. Verum, ut ab hujus morbi probabilitate, ad ejus *ὑπαρξιν* & experimenta medica transeam, re vera dari hunc affectum explorato constat. Ejus autem *ἔδος* & *ἴδιος*, quantum expiscando consequi valeo, tale est.

III. Gracili & tenero corpore Podagrosos Intestinis præcipue teneris donatos, & *δυσπαλινους* aggreditur. Præire solet dolor colicus, pariter Arthriticus: & cum crebris ejus accessionibus lætæ & corruptæ sunt Intestinorum tunicæ, debilitatæque flaccidæ eorum fibræ; miasma Arthriticum, causa aliqua externa illud intro pellente, vel intus posita eo alliciente, in arterias, (Cæliacæ nempe Intestinalis rami, & utramque Mesentericam) Intestina irrigantes, *ἀδρῶς* infunditur. Hinc dolor Intestinorum mordax, erodens, cum pulsu celeri, & febricula quadam. Si eodem tempore externis partibus Arthritis insit, celerrime omnis evanescit, ad *τὰ ἑντερα* festinat. Vasis sanguine distentis, erosus, ruptus, in fistulam demum alimentarem is exillat; qui, in ejus cavo collectus, alvo, & interdum ore ejicitur. Eniusti quantitas sæpe unius libræ, aliquando binarum pondo. Qui tantum, & humoris tam commodi dispendium excipiunt languores, ab eo cavernæ Interaneorum commissio magni sunt; ab expresso, & e corpore expulso, majores. Collabuntur vires, artus frigescent, frequens est deliquium, plane in dubio vita. Levantur ex hac evacuatione tormenta, & si æger insultum vim & ferociam tolerare valeat, (a) quies sequitur, & a paroxysmi impetu Arthritici ad tempus aliquod induciatur. Materia modo jam dicto per Intestina exulante aliena, non iterabitur insultus, donec in sanguine nova condatur, & coacervetur; quam autem primum illud fiet, tam in artubus citissime, vel Interaneis, iterum expectandus erit.

IV. Observatu facile est, ingenio & natura quam singulari sit hic affectus, & a Dysenteria, quotquot uspiam inveniantur, aliis, quam diversus. Quod ut pro certo habeatur, animadvertendum (præter istam *ἡ ἑντέραν* imbecillitatem, qua dirigitur sanguis, & in ea derivatur) ab una Arthritidos materia in sanguine contenta, affectum hunc, constanti norma & ratione manifesta, dependere: ab ea ebulliente fieri: ab ea minuta, minui; neque nisi ab ea renovata, & in novum orgasmum excitante sanguinem, renovari: Quo quidem argumento, ad confirmandam morbi hujus *Ἀιτιολογίαν*, nihil gravius, nihil, ut opinor, validius afferri potest.

V. Ad hujus morbi exitum, sive prognosin, ut descendam, non semper ille missio sanguinis contentus unica; verum, e contrario, insultus sæpe repetens, Arthriticis illos facit paroxysmis, si typos & utriusque frequentiam spectemus, respondentes & analogos. Ad hæc, vel prima vice, vel postea (secundum miasmatis Arthritici in sanguine incrementum) recurrens, quando videlicet miasma in tunicis Intestinorum adhærescit, aut affigitur, & eas suos more mordet inficitque nunc in ulcus Intestinorum, nunc in abscessum degenerat, itaque notas illis inurit tristissimas, morbos incutit ærumnolosissimos.

VI. Profluente sanguine, commodissimum erit, ut æger conquiescat: ne, corpus nimium agitando; ne profluvium, supra quam ferri potest, intendendo, gravius ille luat: quare lecto, vel cathedra se det, quam primum morbus ingruerit. Nefas autem habeatur ea, quæ, cardiacorum titulo, ubique ad manus sunt matronis, (quæque sua, modo oportune propinentur, non carent utilitate) sic ingerere; ut, sanguinem accendendo, noxam magis augeant, quam ægrum levant. Caute ista, neque largius adhibenda, quam ad spiritus reficiendos, & a deliquio sustinendos, opus esse invenietur. Contra, si profluvium *ἄσπορον* excedat, Laudano illud comprimendum; ideoque linguæ super illinantur, ore teneantur illius guttæ aliquot, (quoniam demissæ vomitione reddi possint) donec cohibeatur. Romanis in curanda, quoties importuna fuit, Dysenteria, aquæ bene frigida, potio in (b) usu erat; quippe quæ astringat, vulnusque fanet: & a (c) recentioribus, unde confirmetur illius in sanando vires, præclara multa referuntur: quorum authoritati inhius, Decoctum album, Dysenteria hac afflictis, non sine fructu & emolumento, sæpius præcepi. Oportet autem modice, sed crebro, laborantem sorbere, & quidem eo, ad tempus aliquod, loco cibi potionisque omnis, solo uti.

Quibus curæ fuerit, ne Intestina nimium aperiuntur, iis, etiam, ut ne astringantur nimium, aut præpropere claudantur, vitium nempe contrarium, est cavendum; & si corpus astrictum, leniter est solvendum. Est enim illa Dysenteria omnino critica, ex alterutra parte, sive major, sive minor æquo, vitiosa; cum mediocris optima. Et virium contemplatione debita, mediocritas illa tum intelligenda, tum item obtinenda.

Post breve temporis spatium expelli solet inimicus, & jam tum pacari & deliniri sanguis: quod si aliter eveniat, & sanguis pertinacius descendat; quæ eum sistant, & vulnus contrahant, expediet dari Tinct. puta Japonicam, Decoct. albo, vel Traumatico instillatam; Sydenham Opera Medica.

(a) Dysenteria solvi posse Arthritidem notavit olim Hippocrates, hisce verbis. *Γόνται τῆρας (Ποδαγρίωντας) ἀριστὰ μὲν Δυσεντερία καὶ ἐπιγίνονται* Sanant hos (Podagrosos) optime dysenteria, si successerint. Prædictorum lib. 2. Sect. xv.

(b) Vide Synopsin Discursuum Magistri Vander Heyden, Impresum Londini, Anno 1653. pag. 53: & quæ sequuntur.

(c) Vide Celsum, Lib. 3. Cap. xviii.

vel Balsamum Lucatelli, cum Olibano, Mastiche, Sanguine Draconis, & Croco Martis astringentis, vel Bolo vera, forma Pilulari; vel cum Conf. Fr. Cynosbat. Rosar. rubr. per setaceum trajeet. Spec. Conf. de Hyacintho cum Syr. de Rosis siccis, forma Boli, ex eodem vehiculo. Tinctura Japonica, solvendo Terram ejusdem nominis, sive Gummi Gatchu, in spiritu vini rectificato, vitro probe clauso, igne arenæ conficitur. Lanea, decocto astringenti, cui adjectum est vinum rubrum, immersa, super ventrem imponantur.

Si prope anum vena dehiscat, ex Gelatina amyli vel ejusmodi *Κολλητικῶς*, Hemorrhagia persistente, immittatur enema, & diutius retineatur. Interea vitentur, etsi astringant, acida; ne (propter eorum stimulum) major ex eorum usu damni metus sit, quam emolumentum spes. Cibus ex Gelatina C. C. Eb. aut pedum Vetulinorum: ex Ovo tremulo & sorbili; ex Lacte, cum oryza ei incocta; vel ex Oryza Cremore, & ejusmodi aliis, quæ simul nutrant, & incrassent, quæque vulnera conglutinent.

A therapia Dysenteria, proprie sic dicta, hanc Arthriticam Dysenteria therapiam multum abludere, quilibet harum rerum vel imperitissimus videbit: quando ista purgationem, eamque interdum repetendam, enixe postulare, & nisi illa esset, raro unquam perficeretur; hæc aut nunquam, aut certe perraro ventrem medicamentis solvi patietur.

Cum ad Prophylaxin accedas, nihil valentius, nihil ex omni parte fructuosius, quam Aquæ Tunbrigenes, sive Bamptonenses, vel istiusmodi ferratæ; quæ, satis diu recteque potæ, Intestinorum adyta ingradientur, vulnera perferant, ulceribus medeantur, fibras constriquant, tunicas corroborant: hæc porro humorem vitiosum per renes efficacissime avertunt, itaque Intestina maximopere defendunt. Hisce vero, ad mutandam humorum inclinationem, & deducendam in artus Arthritidem, non incommode adjiciantur, cum astringentibus, e Ferro præparato.

HISTORIA I.

Tenesmus & Dysenteriam inferens Arthritis omisso Externorum usu, lethalis.

Quum rure Anno MDCC. mense Majo, forte agerem ad Ischanum ostium, me consuluit septuagenarius Arthriticus; qui ita sæpe doluit articulis, & quidem vere tum nuper elapso, ut in rem esse arbitremur. Sub initium Aprilis, nescio qua de causa evidenter, (nisi hoc in numero ponenda, propter res domesticas, quæ illum mire exercuere, animi perturbatio) derelictis artibus, ea, quæ intus sunt, invasit Arthritis. Fames, antea naturalis, ab eo tempore multum imminuta, fere nulla: animales spiritus humiles & depressi. Vidimus, at non sine commiseratione vidimus ægrum, in lecto jacentem, oculis concavis, & retractis, respiratione difficili, cibi omnis fastidio, nausea, ventriculi gravitate pene perpetua, *Ἀρρυθμία* etiam afflictum.

Malis hisce, circa eorum initia, vires & incrementum dedit. Lac Amygdalinum, pessimum omnium eduliorum, & alia istiusmodi frigida. Hæc ille interdum, noctu, demisit assatim; calida & cardiaca (ne videlicet dolorem moverent in articulis) cane pejus & angue, fugiens. Ab ipso victu confirmatum est cibi fastidium, cæterumque malorum agmen.

Puduit sane misertumque fuit ægroti, (hominis alias sapientis, & civili prudentia præclari) in tanti re momenti, in ipsius vitæ re, tam egregie hallucinati. Calidiorum enim egentissimus, frigida calidis præposuit.

Malum indies aggravescens adduxit Tenesmus, & dein Dysenteriam: unde pejus omnia. Ut his occurrerem, primo Theriac. Androm. & Diafcond. ana ʒʒ. Julapii Cretacei haustu dedi; ex intervallo sæpius repetii. Potui dabatur ordinario Decoctum album. Hinc alvulus suppressa, defectiones solidæ, & bene coloratæ.

Hæc vero inducias, quando parum fidas esse suspicarer; nisi etiam Arthritis, quæ *τὰ ἑντερα* jam ipsis nutriculis aggravare visa est, *πρὸς τὰ Ἄρθρα* extruderetur; cum in fine Podagragoga interna (nempe ex Rad. Serp. Virg. Pul. Cantiano, Lapide Contrayerva, Conf. Alk. Bolum) præcepi, cum istiusmodi aliis. Quorum beneficio malleoli, & ad genu usque; carpi, & ad cubitum usque dolor, quaque ratione proportionemque doluerunt artus, liberata sunt Intestina. Erat autem adhuc pectus aggravatum; erat, tanquam a cingulo, strictum abdomen.

Ne vero hisce remediis, sanguinem exagitantibus, in ægroto Dysenterico, nimium insisterem; in Arthritide removenda, quantum operis maximum potueram, externis, Arthritidem educantibus, agere institui. Quocirca, pellem vervecinam, jam tum extractam, artubus applicari, in præceptis dedi.

Ille his gravatus, omnium, quæ dolorem excitarent, osor acerbissimus, eorum usum non admisit, non sine indignatione respuit; ut vel perire mallet, quam dolere. Neque salutis, neque ipsius vitæ consideratio, etiam si ab amicis amantissime proposita, studiose commendata, ut animum mutaret, vel hilum fecit. Rerocessit denuo Arthritis; & æger, viribus infractis, morbo dicam, an pertinacia? periit.

HISTORIA II.

Dysenteria Arthritica in Abscessum migrans.

Doctrinæ hujus *Δυσεντερίας* in superioribus traditæ, fidem conciliat agricola Devonienfis, antiquis moribus, & malo tantum habitu infelix. Fuit ille tener, gracilis, visceribus imbecillis, Arthritide primo per multos annos idonea, tum *ἀνομάτως* Intestina simili frequentia impetente, aggravatus. Post *ἀνομάτως* hujusmodi complures, (quibus sublevandis non incassum ei medicinam fascitavi) per quas effectum est, ut ad Intestina citius & facilius diverteret Arthritis; tandem anno sæculi novissimi postremo, exeunte vere, Arthritide omni jam diu vacans, novum in morem ægrotauit. Prægressa enim corporis plethora, vomitu sanguinis & Dysenteria corripiebatur, adeo vehementi, ut brevi spatio libræ aliquot sanguinis ore & alvo redderentur, & æger animam agere videretur.

His angustiis versato, Bolum astringentem (ex Conf. Ros. v. ʒi. Pul. G. Arab. ʒʒ. Sang. Drac. Boli vera ana gr. v. Syr. de Cymphyt.

phyl. q. f.) bis in die, cum *Julapii Cretacei Haustu sumendum*, praecepi. Potui datum est *Decoctum Album*, & in cibum *Pedes Vitulini*. Ad sanguinem vero quam citissime reprimendum & intra cancellos suo retinendum, *Laudani* aliquot liquidi guttae, bis ter quaterve in die (modo postularet haemorrhagia, & vires aegri parerentur) repetendae. Id enim agendum arbitrabar, ut haemorrhagia, quadam ex parte forsitan necessaria, & hinc aegroti salutari, modum ponerem, naturae rebus convenientem; nec quidem alienum est quandoquidem hac medendi via, ne lethalis ista, ne injuria esset, provisum est. Hisce difficultatibus liberato (qua vulnus sanaretur) *Tereb.* dedi *Vinetam*, forma pilulari, cum *Pul. Dialthaeae*, bis in die sumendam, & quod superbiberet, *Julapium*.

Quando vero posthac, propter restitutas aegri vires, sanguinem instauratum, & *Arthritidem* interruptam, pulsus ille magno, cibi fastidio, *Intestinatorum* aestu immodico, doloreque pungenti, cum aliis mali hujus reverberi notis, urgeretur; brachio sanguinem detraxi, orgasmum ejus mitigavi; *Interaneis* prospexi: utque pacem, quam eo nactus sum modo, confirmarem, *Aquas Bamptonenses*, vivas & de fonte, per mensem biberer, imperavi. Paruit aeger, adjecitque cuilibet, aquarum selibrae, *Syr. Balsamici* ℥℥. & hora somni *Balsami Gilcad.* ℥℥. ex ejusdem *Syrupi* cochli. deglutiit. Recte bibendo, medicamenta recte sumendo, recteque vitam instituendo, quantos ille progressus fecit, vel hinc conjicere liceret, quod fame & concoctione domum rediit laudabili, vultuque bene colorato. Vitae res & salutis caetera, qualis sano, & incolumi solebat esse; & quam dudum, multo integrior.

Nondum annus effluxit, cum *Arthritide* pertinacius silente, nec in artubus nunquam quicquam moliente, materia vero ejus (ut licet opinari) in sanguine congeflo, eadem fere, atque nuper, *Intestinatorum* accidentia, materiam eo loci denuo coire, manifeste ostenderunt: quae quidem mala, methodo pene eadem, qua prius, erant sublata. Verum, ut tutelam aegro certam & diutinam praestarem, eum hoc admonui, ut de plenitudine sollicitum se haberet tanquam morbi hujus genitricis certissima, altrice paratissima.

Quae cum ita praeciperentur, vel aegri incuria, vel morbi magnitudine, & ad renascendum propensione factum est; ut aliquoties, nec opinato, recurreret *Dysenteria*: Cujus accessiones cum jam quatuor aut quinque essent, eaeque omnes, ex intervallo anni quasi dimidii, (quo temporis spatio novam *Arthritidis* materiam pullulare credibile est,) *Dysenteria* tandem in *Abscessum* migravit, suo loco tractandum.

Observatu facile est, primum, ab hoc affectu, pristinis in ventriculo & intestinis *Arthritidos Anomalis* succedenti, licere nobis opinari, eorum locum illum tenere, & quasi numerum explere: deinde quod cum omnes illae *Anomaliae* (qua in hac regione pristinæ; quæ novæ & *Dysenteriae*) rectos & idoneos *Arthritidos* paroxysmos subsequantur, horum paroxysmorum illarum vicem gerant: nihilque aliud sint, quam *Arthritis*, commissa *Intestinis*, & illac exulans: cujus quidem rei argumentum, idque nostra sententia firmum est; quo deferretur aegrum *Arthritis recta*, quo tempore, & qua portione occupavit eum *inversa*, sive *Anomala*; & quod *Arthritidi* rectæ, & *Anomale*, accessionum essent intervalla plane eadem; distantia par, quo nihil magis probare potest, affectus hujus, (si tantummodo vultus eorum intueamur) varios & diversos inter se, ab una eademque propagine derivari; eademque fieri materia, pari semper ratione nata, & quantum in se est, pari modo semper operante; sed, propter aliquod sibi externum, & locos novos ingrediente, & diverso in iis modo agente.

Huc quodammodo referri potest *Dysenteria*; quæ ad *Arthritidem* ex *Lue Venerea* generatam pertinet; cujus olim protulimus (a) exemplum, si placet, adendum.

C A P U T VI.

De Abscessu Intestinatorum Arthritico.

Art. I. **A**bscessus sequitur *Intestinatorum Arthriticus*; hic enim est naturæ ordo, quæ a *Dysenteria* ad *Abscessum* migrare, ut ab *Hæmoptoe* ad *Phthisin*; observatur. Alienum & virosum, & sanguinis sinu expelli, partibus a corde remotis & debilibus immitti, tumoremque iis usitato inferre, passim experientia confirmatum est; ad *abscessum* vero conficiendum proclive, & suapte sponte pronum esse virus *Arthriticum*, vel eo constat, quod in artubus is identidem cernatur; eorum articulos, post duras & iteratas accessiones, quibus materiam multum illiditur, aggravans & extendens; sic, ut veteres *Arthriticos*, (quos omnium frequentissime morbus hic affligit) hac de causa claudos, eorumque pedes manus laqueis obvolutos sæpe tueamur.

II. Virus illud, *Intestinis* a sanguine commissum, in eorum tunica nidulatur; fibras earum corrodit, exedit; spiritus iis inclusos extimulat, in spasmos adigit. Hinc calor interdum acris, pungens, lancinans, quem ut deliniat, & humoris acrimoniam diluat natura, non alio modo, quam in apostemate gingivarum ex dolore dentium, vel alio quovis apostemate, ex aliena & virulenta materia, feri copiam suffundit: Ex his humoribus hoc in loco depositis, constat & efficitur *Abscessus*, qui, serius citiusve, (pro ejus compositione, & calore innato, vel adventitio) maturatus, extensa primum, mox rupta, vel aperta, qua includitur, pellicula, *Pus* evonit. Quod utique, si natura copiose ejicitur, vel arte eximitur, caeteraque curatio recte procedit, aegroti commodum; proscripto malo cive, conciliatur incolumitas; purgato sanguine, salubritas: si vero latice nimis exiguo pus exprimitur, aegroti, propter retentum malum civem, difficultas; propter reliquias intus servatas, affectuum partium durities, & nonnunquam in gangrænam degeneratio.

III. Causæ hujus tumoris manifesto binæ sunt; quarum altera *Intestinatorum Imbecillitas*, sive *Atonia*, quæ ad *Intestina* sanguinem invitat; eumque (prout leges volunt *Hydraulice*) facit inclinare. Hanc autem esse, ipsa morbi natura arguit; evincit id, quod hominibus vel ab incunabulis, vel malis moribus *Δυσπλάχνους*, hic affectus sæpissime contingat. Altera, *Sanguinis Deputatio*, sive miasmatis *Arthritici* (secundum normam, a natura in alienis rebus

exturbandis, observari solitam) expulsio: utque binæ istæ causæ se habent; & majores aut minores sunt; *Abscessus* inde orti accidentia, mores, conditiones sunt, necesse est.

IV. Magnus hic *Intestinatorum Abscessus* esse solet, duarum, trium aliquando librarum materiam capax; contra, quam qui vulgo sunt extremitatum: hi etenim fere parvi. Notandum etiam, nullam totius trunci partem magis, quam alimentariam fistulam, infestare: ut hæc illi regio gratissima; hæc sedes (b) principalis esse censeatur. Tertium, addi potest, (quod huic nostro *Abscessui*, pro ceteris sive artuum *Arthriticis*, sive totius corporis *Abscessibus primigeniis*, primum & peculiare) esse eum creberrime, paucis post mensibus, recidivum. Hæc autem omnia causis modo dictis, alteri nempe vel utrique potentiori, sunt attribuenda.

Quo enim celerius *Arthriticum* miasma in sanguine denuo condatur; quo frequentius natura conditum expellere, & e sanguine conetur in exilium ejicere; quo exulanti, & expulso ei recipiendo, propter imbecillitatem, proniora sunt *Intestina*; eo hi illorum *Abscessus* majores; eo frequentiores, & qui repleantur aptiores sint, necesse est.

V. Si in *Ano* fuerit *Abscessus*, eadem prope curatio, ac in *Abscessu Ani* primigenio. Si in *Oesophago*, *Ventriculo*, vel *Intestino* aliquo; (quæ, extra sensum posita, ortum, & incrementum, vix unquam manifestum esse sinunt;) ante ruptam vomitum & pus evacuatum, ejus sæpe nulla, sive aegroti, sive Medico, vel minima incidit suspicio. *Abscessum* hisce locis oriturum una, quantum video, prædicit *Vomitio Sanguinis*, sive *Dysenteria*, quæ appellatur *Arthritica*: qua prægressa, ejus prophylaxi magnopere studendum: hæc enim adversus *Vomitum*, adversus *Dysenteriam*, adversus *Abscessum*, erit utilissima.

Rupta autem vomica, in lectum se det aegrotans, vel minimum quieti, quoad poterit, indulgeat. Si copiose nimis, supra vel infra, pus emissum fuerit, *Hypnotico* moderanda evacuatio, minime sistenda, *Laudano* madefiant tempora, nares, lingua, donec cohibeatur, & ad *Opœiæ*, ut ne videlicet eam excedat, redigatur. Puris autem diluendi, gradatim & partitis vicibus educendi, ulcerisque detergendi gratia, hujusmodi *Apozematis*, quarta, quinta, vel sexta quaque hora cyathus assumatur.

℥℥. *Hordei mundati* ℥℥. *Rad. Symphyt. maj.* ℥i. *Cacum. Betonicae*, *Saniculae aræ* ℥ii. *Coq. in Aq. font.* ℔ii. ad ℔. *Colaturæ adde Mellis Rosarum* ℥ii. vel ℔. *f. Apozema.*

Julapium præsto sit *Cardiacum*, aut *Vinum* aliquod generosum; cujus, in languoribus summis, cochlearia aliquot hauriantur. Interea temporis (ut *Celsi* verbis utar) *Nihil facere oportet, quominus, quicquid est Puris, exeat.*

Cum vomitus, & diarrhoea, & puris evacuatio desierint, ex usu erit *Tereb.* a ℥℥. ad ℥i. cum *Ovi Vitelli pondere equali temperatum*, vel *Bals. Lucat.* ℥℥. cum *Myrrhæ pulv.* q. f. in *Pil. redact.* bis in die, ex *Apozematis haustu demitti.* Vitentur acida, vitentur acra, & quibus læsa pars exasperetur, quibus noxa augeatur, omnia. Ipsorum *Cardiacorum* vitetur ea vis, quæ sanguinem nimis exagitet, & e foribus jam apertis eum eliminent. *Eboris*, *C. C. Pedum Vitulinarum Gelatinis*: *Hordeaceis*, *Avenaceis*, *Pullinis*, *Ovinis*, *Vitulinis*, & ejusmodi sorbitionibus, vescatur aeger. Si alvus soluta nimis fuerit, potioni sit *Decoctum album*: si dura nimis *Hydromel*.

Prophylaxis, sive in *Ano*, sive intus sit *Abscessus*, *Aquis Diureticis* optime perficitur; quibus adjici potest *Sal* & *Crocus Martis*, *Myrrha*, *Terra Japonica*, cum *Syr. Sydon.* forma pilulari. His enim partes vulneratæ debilitatæque contrahuntur, & defenduntur; quodque maximi est momenti, materia vitiosa per renes emittitur; unde visceribus major, etsi non ubique certa, erit tutela. Conducet item *Vene sectio*, præsertim in corporibus plethoricis, sique nihil repugnaverit. Conducet *Ambulatio*. *Pedum Fictio*, & in aquam calidam immersio: *Purgatio* fugienda.

VI. Unum huic Capiti, veluti coronida, subnectam. Veteres *Arthriticos* non tantummodo colica, aliisque *Interaneorum* morbis, (ut ante dictum) verum etiam morbis *Ani Arthriticis* identidem affligi, nonnunquam misere cruciari: maxime cum ætas exacta est, & vires jam imminutæ, ad miasma in artus expellendum minime satisfaciunt. Ea morbi mutatione, in *Ano* materia deponi *Arthritica*, in eam infundi videtur: cujus utique rei argumentum hoc est, quod quamdiu *Ani Abscessus*, *Fistula*, vel ejusmodi morbo aliquo gravi afficiantur homines hi *Arthritici*, tam illi diu raro articulis aegrotent, ibi vero ea tollantur *Ani vitia*, recurrat *Arthritis*, (quod iterum & sæpius observavi) in extremis partibus regularibus.

VII. Hæc, & hujusmodi alia, cum ab *Arthritide* fiant in visceribus, sexcenta mala, videre licet, quam apposite, quam belle sit a (c) *Luciano*, ex *Erasmi Schmidii* versione, de ea dictum.

H I S T O R I A I.

Abscessus Intestinatorum Arthriticus auspiciato sanatus, recurrendo Lethalis.

Abscessum in visceribus, *Arthritica* fieri posse materia, probat agricola, prædio nudius tertius suburbano agens. Fuit ille corpore pertenui, *Δυσπλάχνος*, annos *Arthritide* permultos, primum *Regulari* tantum, mox etiam *Anomala*, τὰ *Εντέδια* premente, *Dysenteriam* inferente cruciatus:

Dysenterico ei medicinam, ex utriusque nostri sententia, ite-

(b) Vide *Celsi* Lib. v. cap. 28. §. 11.

(c) Σπλάγχνων δ' ἐπ' αὐτῷ δάπτουρον ἀρέχει κακὸν
Διναίσι φλογμῶν σάρκα πυρπολεῖται,
Ὅποια κρητὴρ μεσὸς Αἰτνάει πυρὸς,
Ἡ Σικελὸς αὐλῶν ἀλιπόρος δασφάγος,
Ὅπερ δυσεξέλικα κυματῶμενος,
Σήραρχι πετρὸν σκολιὸς εἰλῆτε κλυδῶν.

*Visceribusque in ipsis ignitum discurrit Malum,
Verticibus Flammæum Carnem ignis more depascens;
Veluti crater plenus Aetnæi ignis,
Aut Siculus Canalis æquorei interstitii,
Ubi confuse fluctuans,
Ob fissuras petrarum, obliquus volvitur æstus.*

(a) Vide *Dissertationem* de *Arthritide Symptomata*, Cap. vii. *Hist.* iv.

iterum ac sæpius feci; ductoque prognostico a vulneratis multumque læsis & debilitatis *Intestinis*, uti etiam ex eo, quod illam jam frequentaret *Arthritis*; de *Abscessu* ægotantem, de eo, tanquam impendente & pertimescendo, monui. Nec quidem aliter evenit: namque elapso ab *Arthritidis* paroxysmo brevi spatio, cum jam repletum esset corpus, & dolerent *Intestina*, (quæ duo accessiones itidem *Dysentericas* solebant antecedere) materiam, rupto in *Intestinis Abscessu* purulentam *æw* $\chi\alpha\iota\omega$ reddidit. *Vomitum* & *Diarrhæam*, ut ne violenta nimium urgeret, *Laudano* compescui; eorum sævitiam mitigavi. Finita puris *Evacuatione*, *Bolum astringentem* (ex *Conf. Bos. rubr. Croco Murtis*, &c.) bis in die, *Pil. Balsamicas*, ex *Bals. Lucat. Pul. C. C. C. hora somni demittendas*, cum *Julapii Hausu* dedi. Potui, quod dilueret puris acrimoniam, simulque reprimeret *diarrhæam*, *Decoct. Album tenue* dabatur, cibus e *Jusculis* & *Gelatinis*, erat *Analeptibus*. Porro, *Prophylaxeos* ergo, decem post diebus, omni mane, *Aq. Bathoniensium* lbii. paululum tepelactas, hausit; singulis selibris adjiciendo *Vini Canatini* cochl. unum alterumve. Per *Elect. Lenientis* dosin, uti opus fuit, assumptam, alvi prævenit tarditatem.

Caro, color, vires ab hac methodo augentur; sic, ut hyeme sequenti, menses inde post quatuor vel quinque, pedibus iterum doleret, & omni periculo liber esse prima facie videretur. Contra vero, ob ipsa hæc indicia salutis, (ita vulgo æstimantur) censenda erat hujusce ægri salus in dubio versari. Quandoquidem illa, tametsi quodam modo salutem, modo longe majori contrarium indicarent, & *Intestina* denovo gravari minarentur, de *Vena sectione*, ut de *Intestinis* mihi curæ sat esse, deliberavi: vetuit corpus a natura tenerum: vetuit male constitutum: morbis multatum, atque adeo *Arthritidi rectæ* vix obeundæ par.

Anni circiter dimidium erat, cum recurrit acris ille & puigens *Intestinatorum* dolor, novum materiam coitum ostendens. Subsequitur, paucis post diebus, puris tenuioris subalbidique, ad tres minimum libras, paucarum horarum spatio, per os, per anum excretio. Vires ægri statim collabuntur, & *Cardiacis* frustra, licet copiose datis, oppressis oculis obductum est $\theta\alpha\pi\alpha\iota\sigma\ \mu\acute{\epsilon}\lambda\alpha\nu\ \nu\acute{\epsilon}\phi\omicron\varsigma$.

Notatu dignum erat, *Arthritidem* ex quo *Intestina* primum est aggressa, nova illa sede adeo delectari, ut intra triennium sexies eam inviseret; & toties vel *Dysenteriam*, vel *Abscessum* eo loci faceret: *Visceribus* scil. a natura imbecillibus, & morbi crebris insultibus enervatis, depositum, immo infusum erat, expulsionem jam tum idoneum, *misalma Arthriticum*. Sed neque præteriri illud oportebit, quod, qua proportionem *Visceribus* inhæserit, ea usque *Arthritis* artubus pepercerit. Quinetiam observari potest, quod ab *Arthritidos* paroxysmis regularibus, per accessiones *Dysentericas* & *Abscessus* hosce *Intestinatorum*, magna ex parte defenderetur æger: quandoquidem hinc crebro revertentibus, illi tum rariores, tum etiam mitiores invenirentur: ut, tum *Arthritidos*, tum *Dysenterias*, tum etiam *Abscessus* causam continentem & conjunctam, eandem prorsus, nonnunquam artus, alias *Intestina*, sed alio alioque modo infestantem, esse constet.

HISTORIA II.

Abscessus Ani Arthriticus feliciter curatus.

Antistes nobilis, ingenio summe prædicando, nisi quod animi magnitudo superaret ingenium, *Arthritide* nativa; (ea prosperarum cum adversis, ea rerum humanarum mixtura) quam & ipse minime tenuavit, est affectus. Diu ille, semel bis in anno, doluit; sed apte, sed utiliter, tandem *Ventriculum Intestina*, & eorum extremitatem, *Anum*, a muneribus suis desciscere compertum est, & novo more affici: hanc humoris nimium recipere, *Hæmorrhoides* extrudere; illam cibum minus recte conficere; istum minus appetere. Hæc autem mala, sive naturæ per se deficientis & debilitatæ, sive *Arthritidos* inversæ signa erant, (cum *Interanea* multum iis enervari confitendum est) rectæ & externæ *Arthritidi* intus vocandæ, non parum contulere.

Hujus procatarseos maleficio factum est, quod, ex errato in re diætetica commisso, materia, (quæ digitos etiam tum extendit, quæ in tumoribus idoneos elevavit) *Arthritica*, intro invitata, *Ano* impacta, *Abscessum* in ea faceret. Primum, ossis coccygos regionem, mense Decembr. Anno 1692. invasit: inde per dies aliquot dolor, & totam pene hebdomadam *Αγρονία* vena, Medici consilio, pertusa est. Nihilominus increvit tumor; dextram, sinistram, partes circa *Anum* omnes comprehendentes, & ad suppurationem tendens. Quo citius maturescat, ei *Cataplasma* admovetur. Horis post triginta sex, cum jam moveretur intus contentum, & fluctuaret pus, phlebotomo per *Jenkinsonium* nostrum est apertus: unde materiam putridissimæ foetidissimæque quasi libra effluxit; mundificantibus ab eo injectis detergitur sinus, fomentis roboratur.

Curatio perfecta, & absoluta esse visa est, cum exeunte Majo, *Arthritis*, quæ tum temporis in artubus emicuit, ob $\pi\rho\epsilon\phi\alpha\sigma\iota\nu$ nescio quam, ad *Ani* regionem, non ita pridem læsam, se proripuit, eamque magnopere corruptit. Pelle ovina, recens extracta, involvi pedes & abdomen ægotantis, imperavi. Hinc suppuratio maturior, atque adeo celerrima, adjuvante *Ung. Basilic.* &c. per penicillum admoto, secto tumoris apice, puris altera quasi libra expressa est. Perjucundum erat notare, non tantum omnia, statim ab emissio pure, symptomata concidere; sed & appetitum, aliquandiu languentem, ex eo tempore vigere, latrare, & (quod eo amplius) ægotantem comesta concoquere.

Quicquid hujusce mali reliquum erat, (hoc autem neque grave, neque longum,) id omne laboranti, non nimium morigero, deberi statuendum est; id etiam brevi sublatum. Nam factus testis evasit æger, neque, tametsi sæpe posthac *Arthritide*, hujusmodi unquam *Abscessu*, de integro laboravit.

En igitur *Ani Abscessum*, in quem, tanquam in sentinam, misa sunt *Arthritica* purgamenta: cujus rei notitia vel eo manifesta, quod ex *Abscessu* faveret artubus, neque iterum, dum nova in sanguine coacervata fuit materia, tantisper in eos sævitum.

HISTORIA III.

De Ani Arthritica, propter Aloeticum, Inflammatione, cum instante Gangræna.

Matrona nobilis, sancta, venerabilis, ob causam alibi dicendam *Arthritica*, exeunte anno 1705. dolorem artuum, huc *Sydenham Opera Medica*.

illuc vagum, & repente nabit, articulos etiam aliquando, more solito, perstringentem. Sub isto rerum suarum statu, & conditione, *Tinctura Sacra* dosin, hortante quodam e vicinia sumpsit; heu! infans omine, & irato *Æsculapio*: *Hæmorrhoidum* enim dolore alias afflicta, tantam earum injuriam, tam grave malum ex eo perulit, quam quod gravissimum.

Magna vis humorum, qui in sanguine jam evecti & exilio parati erant, ut hac vel illac levi ex causa verterentur, *Aloetico* viam ostendente, ad *Anum* pulsa est, & eam distendi maximeque cruciari fecit.

Non ægræ profuit, quod e gallis, aliisque restringentibus, aqua ferrata incoctis, stuparum ope, *Fotus* adhiberetur; contra, malum ex hoc acerbius, ægram inveni, cruciatus inter & tormenta, misere oppressam. Per *Anum* humor nigerrimus, odore cadaveroso effluxit, & de *Gangræna* impendente me admonuit. Paulo post, in *Ani* margine rumore rupto, ram jugiter emanavit humor, ut de ægræ vita pene conclamatum esset, patum aberat, quin opprimeretur. Libræ minimum binæ effluerunt, quibus nihil foetidius, nihil graveolentius. Non nisi *Cardiacis* copiose creberrimeque datis, ægra sustentari potuerat, iisque mehercule vix quidem.

Sistente demum flumine, cisternam ejus immisso stylo exploravi. Ab orificio, quod in dexteri podicis medio propter *Anum* erat, versus os *Coccygeum*, duas circiter uncias sinus intravit: altera vero parte, prope *Intestinum Rectum*, eique parallelus, circa quinque uncias. Tanta vero ejus latitudo, quanta humori contento responderet. Præterea, caro prope orificium ad drachmæ spatium livida, sensuque valde obtuso, $\nu\epsilon\kappa\rho\alpha\sigma\iota\nu$ in propinquo esse manifestavit.

Ut autem ea prohibeatur, eodem tempore sistatur humor, nimium profusus, per *Injectiones* aptas, aliaque topica, Chirurgis adhibita; provisum est: *Turunda* immixta sunt, paulatim breviores; & demum, mensis usque spatium, ne nimis cito occludatur, tanquam fonticuli, os apertum est: postea feliciter reclusum. Ex morbo gravi, & prorsus ancipiti, convaluit ægra, & partum intra breve spatium gessit.

Commonet exemplum, in corpore *Arthritico*, materia ad fugam prona saturato, quam dubia autem, imo quam periculo plena, maxime per *Aloetica*, purgatio.

CAPUT VII.

De Melancholia Arthritica.

Art. I. **P**ost *Ventriculi* & *Intestinatorum* affectus *Arthriticos*, qui appellari possunt idiopathici, (de quibus supra disputavimus) ad eos jam deveniendum, qui locis sæpe remotis & distantibus, semper autem aliis, $\kappa\alpha\tau\alpha\ \sigma\upsilon\mu\mu\alpha\delta\iota\alpha\nu$, inesse deprehenduntur. Hi vero, tametsi plures, & quidem prima facie longe inter se diversi reperiuntur, (uti *Melancholia*, *Syncope*, *Cephalalgia*, *Vertigo*, *respirandi difficultas*, aliique permulti,) quando hoc conveniunt, quod ex causa *primis Viis* contenta omnes exoriantur; eaque sublata, auferantur; eorum curatio, maximam partem, ex prædictis elicienda est. Par autem unum, cæteris prælucens, nimirum *Melancholia* & *Syncope*; cum utrumque ita interdum ingravescat, ut symptoma evadat $\pi\eta\epsilon\gamma\omicron\nu$, & morbi rationem ambiat; hoc, & sequenti capite, speciatim exponetur.

II. Nullos æque laceffit hujusmodi *Melancholia* (ut de ea primo loquar) ac qui molles, teneri, delicati, animi præditi pusillo, vel alia aliqua inclinatione naturali, *Melancholice* sunt ab incunabilis additi. Quamdiu horum *Arthritis* paroxysmos agit regulares, & natura, visceribus parcendo, materiam in artus alienam exprimit, tam certe diu ægotorum prospere res succedunt: & in paroxysmorum vacationibus cor illis lætum: vultus hilaris; sudum undique, & serenum est. Quoties autem hoc salutare opus, sive prorsus intercisum, sive remisse & oscitanter actum est; maxime, quoties *Ventriculo*, & *Intestinis* committitur materia; primum, appetitus, & concoctio depravata est: hinc eo loci massa, brevi spatio putrescens, & inepta, coaceratur: hinc status hypochondriacus, $\beta\alpha\beta\alpha\sigma\upsilon\gamma\mu\alpha\iota$, præcordiorum dissentio, & interdum dolor *Intestinatorum* fere continuus: hinc illi, per consensum, cerebri & nervini generis affectus; illa $\mu\iota\kappa\rho\sigma\upsilon\chi\iota\alpha$, illa *Melancholia*. Turpis scil. illius massæ afflatu & contagione, deprimuntur spiritus, sensui jam motuique obeundo impares. Nihil isthoc hominum genere tristius, nihil infelicius. Neque somnum capeunt, neque cibum. Pœnitet, piget, pudet, ipsos vitæ suæ tædet. Quodque omnium gravissimum est, quæ, in summis calamitatibus, perfugio; quæ ægotantibus, solatio; quæ *Arthriticis*, certissimo esse solet præsidio; hosce plane deficiit spes.

Nullas unquam *Arthritidis Anomalias* hac nostra diuturniores inveni; nec quidem multas temere frequentiores. Nono vel decimo circiter ætatis lustro, ægotantem aggreditur; & per reliquum vitæ (nisi medicinæ viribus depulsa fuerit) eum perraro deserit; quin ex intervallis, iisque crebro brevioribus, affligit. Est autem ad *Arthritidem*, in eodem corpore *Regularem*, (si ad eam comparetur) proportionem, quæ dicitur *inversa*: quandoquidem, quo minor, quo rarior, quo mitior hæc: eo major, eo constantior, eo vehementior illa; & e contrario.

III. Quod autem ita sit diuturna, causam esse puto in præcedentibus enunciatam; *Dyspepsiam* nempe, & *Ventriculi* imbecillitatem: quæ, ut usitate materiam ad *Primas Vias* arthriticam invitare solet, crebramque facit (ut ostensum est) hujusmodi *Anomaliam*, ita quidem usitata major, (qualis his ægotis est) tum invitat allicirque magis, tum etiam arctius complectitur, retinetque diuturnius.

Ne vero, cum *Arthritide Melancholica* idem hic affectus esse censatur, advertere oportebit, illum esse *Melancholiam* puram, & exquisitam, in *Arthritide*: hunc *Arthritidem* similiter genuinam, in *Melancholiam* desinentem; eamque propria materia facientem.

IV. Requirit *Therapia*, in morbo ægrum prementem, *Ventriculum* & *Intestina*, $\alpha\iota\omega$ (si opus fuerit) $\chi\alpha\iota\omega$ purgantibus, primum advertersemur. Ista vero blandiora sunt, necesse est; e *Decocto* puta *Fol. Teæ*, vel *Posseto Carduato*, *Vomitorium*; ex *Rhabarburo*, *Pil. Tart. Bontii*, *Som. cum G.* vel istiusmodi aliquo teniente, *Catharticum*. Statim a purgatione, eo nempe vesperi, omisso *Paregorico*, locum habeat *Cardiacum*; quod materiam visceribus adhærescentem ex-

tra popellat: posteaque, cum ad *Alterantia* descendens, ea quantitate propinentur, sed dosibus idoneis, quæ si nihil repugnaverit, intentioni therapeuticæ (i. e. materiæ *Arthritice*, a τοῖς ἐσθλὸν educendæ, & in artus ablegandæ) satisfaciât.

Vult autem *Prophylaxis*, primum, ut *Aquis Diureticis*, recte diuque potis, e sanguine virus evehatur *Arthriticum*. Deinde, ut *Arthritis*, vere & autumnno, altero nempe vel utroque, si per se quiescat, medicamentis ad eam finem datis, cieatur: regulares paroxysmos, suoque numero perfectos (quoties opus erit) edere cogatur: & ut alias coctionis summa teneatur ratio, in victu minime peccetur. Quare *Eccoproticum* frequenter adhiberi, putres sæpe extrudi reliquias oportebit; & in eum finem usui erunt *Pilule*, quibusdani in pretio habitæ, *Melancholicæ* ab *Exoniensibus* appellatæ.

2℥. *Pil. Macri*, *Stom. cum G. ana* 3℥.

Rudii 3j.

Ref. Jal. 3℥.

Ol. Cin. Chym. gutt. x.

Bals. Per. q. s. f. Pil.

Dosis 3℥. primo mane, omni mense, vel, eodem intervallo, sumatur *Tart. laxantis*, & *Mannæ ana* 3℥. ad 3j. *Aq. purgant.* 8j. soluta. Omni vero purgationi prophylactica succedat, hora somni, *Paregoricum*. Prodest porro corporis exercitatio, præsertim equitatio. Quæ vero reliqua huic affectui medeantur, ex supra dictis hauriuntur.

HISTORIA I.

Melancholia propter Arthritidis accessiones minus idoneas.

Tempus olim nobiscum homo traduxit alienigena, ingenio prorsus singulari: affectu *Hypochondriaco* non parum multatus. Egritudini importunæ permolestæque ut occurreret, *Baccho* ille, non nimium modo, verum etiam intempestive (pernoctando scilicet) indulgit: quo quidem more, *Arthritidos* perniciosissimæ, senectutis tristissimæ posuit fundamenta.

Adolescentiam vix egressus, *Arthritide*, malo hæreditario ægrotavit, quod *Melancholiam* vel primum intulit, vel magnopere auxit. Quandiu paroxysmos edere soleret *Arthritis*, ista regulares, (satis scil. magnos & frequentes) nihil illo homine mutabilis, aut sibi dissimilis; utpote lætitia nunc elato, mœstitia nunc depresso. Quoties enim paroxysmus aliquis finierat, cantu, jocis, salibus effundendis, carminibus aut pangendis, aut recitandis occupato eo, nihil usquam gentium festivius jucundiusve: quamprimum autem *Baccho*, *Cerere*, & ignavia, nova in sanguine cumlaretur materia, & jam expulsiōni parata esset, nihil illo tristius, lugubriusve.

Nondum annos compleverat quadraginta, cum *Arthritis* rarius & remissius agere occipit; & pro illius remissione, ægrotanti evenit male: nam *Melancholia* ingravescere reperta est, & quidem eatenus, ut in eam demum mutaretur *Arthritis*; quibus autem modis, & qua metamorphoseos ratione, (quippe ad explicandam *Melancholiam* hujus *Arthritice* naturam cum primis faciens) narratu dignissimum.

Qua proportionem paroxysmi, sive earum acrimoniam, sive frequentiam spectemus, cessare; ea semper, rata perpetuaque, crevit *Arthritis*, ea *Arthritis*; ea, flatus immodici; ea, dolor & innumera *Ventriculi* querelæ; ea, *Melancholia*: ut materiam ad τὰ ἐξω *Arthriticam* minime propulsam, visceribus infundi, res sit evidētissima.

Chalybem ille, *Amara*, non uniū generis *Cardiaca* initio commode; *Corticem*, cum *Vino*, omnium multo commodissime; postea vero frustra, ingessit. Validus a natura, & athleticus, morbo gravi & arumoso, animum cum corpore pessundanti, impar, ætate adhuc constante succubuit,

Victimam nil miserantis Orci.

HISTORIA II.

Arthritis Melancholico saluti.

Homo *Damnonius* per omnem primam juventutem coctionis pravitate, ventriculi a pastu distensione, flatu, capitis gravitate identidem afflictus, de majori malo adveniente monebatur. Annis aliquot post, exorta *Arthritis*, nunc uni eidemque articulo inhærens, nunc per artus erratica; semper autem regularis, & cum Morbo *Hypochondriaco* (uti cum *Polluce Castor*) vices habens alternatas. Quæ istorum affectuum *Επιδεικνύμενα*, communem utriusque materiam esse, nunc, quæ sunt intus, afficiente: nunc, quæ extra, corrodentem, ostendebat. Gravedo etiam, per hosce dies, humorem multum, & acrem, in vacationibus *Arthriticis*, emittere, sicque capitis gravitatem minuere solebat.

Sub finem anni 1702. paroxysmi, qui lenes semper, & parvi reperiabantur, *Arthritici*, præter morem intermiserunt, neque jam per annum integrum emicuit *Arthritis* ulla, sive fixa, sive contraria: quanto vero ægroti cum discrimine, vel ex eo dici potest quod nausea frequens; quod appetitus exinde prostratus; quod coctio viriosa, neque nisi liquidorum ulla; quod flatus, *αἶμα καὶ χυλὸν* sæpe emissi; quod, eis aliquantisper retentis, auditus ad tempus aliquid omnino nullus; quod dolor lateris pungens; quod spirituum defectus miserabilis; quod marcor, quasi junctis undique copiis, ægrotum pene conficerent.

Considerata istius morbi natura, plane visa est *Arthritis*, quæ diu recte egisset; jam vero, brumæ vigente frigore, sanguinemque deprimente, intus in *Ventriculum*, &c. repelleretur, & dictam faceret *Melancholiam*.

Proposita medicinæ via, ut languentes spiritus fuscitarem, ut inimicum ab intestinis dimoverem, & ad artus propellerem; eum aggredior. *Aquarum Ferratarum*, quæ in propinquo erant, *Tawtonensium*, modice tepesactarum selibram, hora septima matutina, hauriendam; omnique horæ quadrante, ad horas usque duas repetendam; cuilibet vero selibræ *Sp. vol. ol. gutt. x. vel xv.* instillandas; nona sequenti, *Infusi Teæ*, eadem *Aqua comparati*, 1℥. hora deinde post, *Infusi amari alterantis Cocbl.* v. quarta pom. *Bolum Absinthiatum*; hora somni, *Cardiacum* sequentem, cum *Julapii*, aut vini *Xeresani* haustu demittendum, imperavi.

2℥. *Rad. Zedov.* 3j. *Gentian.* 3℥. *Cacum. Agrim.* 3j. *Cocci-nella* 3j. *Cori. ext. Limon. Flor. Rorismar. ana* 3j. *Infunde in Vini Xeresani* 1℔ii. *ad idoneam alterationem; tunc coletur infusum.*

2℥. *Pul. Rad. Ari C.* 3℥. *Conf. Abs. R.* 3℥. *Syr. ZZ. ex Indis q. s. f. Bolus.*

2℥. *Pul. Gascon.* 3℥. *Spec. Diambrae* 3j. *Syr. Garyph. q. s. f. Bolus.*

Carnibus *Διαιτῶν* & *Δι' ὅλων*, pullina sc. vitulina, agnina, & ejusmodi aliis vesci; & loco cerevisiæ, huic ægroti pestiferæ, aquam dari bibere prædictam, cum crusta panis incocta, *Xerano* demum addito, præscripsi. Utrique *Bolo*, paucis post diebus, nempe quamprimum *Martem* ferre valuerat teneritudo *Intestinorum*, adjecta sunt ejus *Nutriti* gr. v. primoque adq. haustui, omni mane, *Tinct. Martis Februiæ* gutt. xx.

Porro, ad caput per nares purgandum (quoniam hoc innuere visa est *Gravedo*) *Pulverem* adhibui *Sternutatorium*, sæpius in die usurpandum.

2℥. *Caulium Tabacci* 3j. *Cacum. Majoranæ, Rorismar. Salvia ana* 3℥. *Rad. Helleb. albi* 3j. *Moschi* gr. ii. & *Siccatis f. Pulvis* 1℔ii.

Ista medicina, vix credibile est, quam celerrime restituta, & quanta ægroti sanitas. Spiritus animales, ab assumpta aqua maxime, & quidem subito recreati: paulo post vigere cœpit, & deinde latrare, appetitus; partim medicamentis, partim victu, sed aqua potissime, vegetior factus, oculos homo fustulit, vultum explicavit. *Arthritide* recta, pedem alterum occupante, postmodum est tentatus. Maximi erat momenti dolor iste regularis; utpote qui materiam, relictis visceribus, πρὸς τὰ ἐξω arceri comprobavit. Medicina eadem, vel simili dies quadraginta usque continuata, met *Exoniæ* visitavit; ex mœstissimo, & tristissimum in modum languente, in sanum & vividum, in lætum & alacrem mutatus. Ego ut morbi recurrentis metum adimerem, & in tuto rem omnem ponerem, ad dies adhuc viginti plures, medicinæ usum protuli. Quinimo, contra *Melancholiam*, aliaque *Ventriculi* & *Intestinorum* mala, ut in posterum se incolumem præstet; de *Arthritide* curet, exhortor, ut ea rectum, & idoneum, semel minimum anno, paroxysmum edat.

Historia narrat *Arthritidem*, intus ad *Ventriculum*, & τὰ ἐξω *Arthritide* missam, ægrotum mirifice lædere; *Melancholiam* gravi afficere; demum medicina ad τὰ ἐξω auspicio pelli.

HISTORIA III.

Melancholiam, & Hydropa Arthriticum, sanat arte comparata, Arthritis idonea.

Aliud dicam *Melancholice* hujus *Arthritice* exemplum, nobile & inusitatum. Vir Reverendus, antiquis moribus, per ætatem mediam, nunc *Arthritide*, nunc *Melancholia* premebatur: hujus sc. accessionibus olim, ante annos viginti; illius nuper omisso tabacci usu, ante sexennium, ortis: hujus perpeffu gravioribus; illius, tum minus molestis, tum etiam raris; at semper commodis, semper utilibus; siquidem *Melancholiam* illi ad tempus diuturnum, ad annum quasi dimidium, semper abegerunt.

Sub finem anni 1702. post appetitum aliquandiu læsum, *Melancholia* ille multum angebatur; *Μηροποχία* & depreffione spirituum importunissima, incredibili stipata. Lamenta, querimonias, ejulatus die noctuque effundentem, tanquam ægrotorum post hominum memoriam afflictiſſimum, audiui. Mehercule! se arbitro, nemo unquam mortalium, nec quisquam gentium æque miser. Paulo post emicuit, qui sævitia longe *Melancholiam* excellere visus erat, tumor pedum; deinde femorum, profundas digitorum foveas accipiens; isque serofus, hydropicus. Umbilici regione exudavit, tanquam e colo, liquor. His accessit difficultas spirandi, debilitas universa, & *δυσκυνία*, brevi tempore, fere paralytica; sitis etiam insatiabilis, urina pauca, & lixiva, potionis nec quadrante plus: Ut, de ægroti plane conclamatum esse, non immerito omnium fere sermone percuberit opinio.

Quo affectui tam periculoso medicinam facerem, idcirco primum ex usu esse judicavi, feri vim minuere, hydragogis amandare; tum, quibus rebus possem, *Arthritidem* (quam horum omnium causam esse suspicabar) evocare, & τοῖς ἐξω infingere. Hac proposita medendi lege, *Pil. Aloeticis* facta semel iterumque purgatione, meo jure sic præscriptum est.

2℥. *Rad. Gentian.* 3j. *Infunde in Vini albi Lusitanici* 1℔ii. *ad alterationem idoneam; Colaturæ adde Tinct. Aurant.* 3j. *misce. Dosis* 3j. *sexta quaque hora, cum seq.*

2℥. *Sal. Martis, Chal. Nutriti, ana* gr. v. *Rul. Serpent. Virg.* 3℥. *Syr. Absinth. simp. q. s. f. Pil.*

2℥. *Sp. Vol. Ol.* 3j. *Tinct. Stom. cum M.* 3j. *misce sumat. gutt. xxx. cum idoneo quovis vehiculo, bis in die. sæpiusve, si languores urgebunt.*

Quantum ægrotanti ab hac methodo utilitatis, opinione majus est. Quando per evacuantia, feri, quod nimium erat, vix dimidium expelleretur; ita quidem factum est, ut natura, per cathartica perque chalybem adjuta, tum in pedem *Materiam* extruderet *Arthriticam*; tum etiam serum per renes abundantem emitteret. Septem, octo dierum spatio usurpandis hisce *Pil.* dicato, pedis finistri doluit malleolus, & digiti majoris articulus major ejusque orbis. Dolori paulo post successit urinae profluvium, tam jure, tamque copiosum, nr, diebus quinque vel sex, pedum, & femorum tumor omnis hydropicus, etiam si immanis, auferetur; & simul cum tumore; parique proportionem, sitis. Ex sententia succedere omnia. Alacrem, vividum, cibi appetentem, animo plenum denuo conspexi; vitam hodie quadriennio postquam ita fuit correptus, vivit; & quidem eam, quæ sola vita est vocanda: ut vel uno hoc exemplo demonstrari possit, quantum *Hydropa*, quantum *Melancholiam* faciat *Arthritis Anomala*, quantum etiam utrunque sanet *Regularis*.

Hactenus de *Melancholia Arthritica*; ad ejusdem originis, & naturæ *Syncopem*, accedo.

CAPUT VIII.

De Syncope Arthritica.

Art. I. **A**lius est affectus, ei, qui præcessit, sive causæ utriusque continentis & proximæ, sive κατὰ Συμπόσειον ortus, habeatur ratio, congener & geminus; Syncope nimirum Arthritica, hunc in locum aptissime referenda.

Ante dictum est, Arthritidem, maxime in corporibus senecta, vel ebriositate læsis, & enervatis, Ventriculum, & Intestina minima quavis de causa petere. Quinetiam exploratum est in eas partes ingressam Arthritida, non semper Anorexiam, Nauseam, Tormina, Diarrhæam, & huiusmodi morbos ἰδιωτικῶς inferre, sed uti nonnunquam Melancholiam, (in superiori capite tractatam) ita etiam interdum Syncope.

II. Compertum, inquam, est, a potione nimis frigida, & tenui, vel δυσπρόσιτο aliquo, ore sumpto, & Ventriculum aggravante, primum, universo corpori male esse; tunc paulatim os pallere, sudore frigido deinde cuticulam madere: pulsus imbecillum, modo nimis tardum, nunc inæqualem, reddi; interdum minui tantum, alias intermittere; solvi denique spiritus animales; sensum, motumque deficere; vitæ omnes corrumpere facultates: interea vero temporis, Arthritidem, (siqua forte in articulis, antequam hæc inciperet tragœdia, comparuit) defubito recedere. Nemultis, ægrum, nisi remedio quodam efficacissimo præsentissimoque, nisi Deo in vicinia mortis opem ferente, servatus fuerit, e vivis exturbari.

Hanc ego Συμπόσιον, quatenus a miasmate Arthritico commissa est, Arthriticam; quatenus vero per omne corpus se diffundens, a causa (in Ventriculo, & τοῖς Ἐντέροις sita) longe posita elucet, κατὰ Συμπόσειον natam appello.

III. Huic ut occurratur, accipiti prorsus, & acuto morbo, nihil æque valere iudico, ac, cardiacorum permagna dosi potentium adhibita, indicationem vitalem zueri; spiritus animales sistere, & instaurare; ut & alienum (si modo id fieri possit) ad τὰ ἔξωθεν arcere. Quo circa Aquæ Hispanicæ quantitatem amplam, in ægri rem, plus semel dedi bibere, proque re nata repeti. Ubi illa defuit, aliam, quæ sequitur, (quando medicamenta in forma liquida citius adjuvant, & propterea solidis anteposenda sunt) præscripsi.

℞. Aq. Abs. ℥. ʒij.

Sp. Menthe,

Tinct. Lavend. C. ana ʒij.

Sacch. albiss. q. s. f. Julapium.

Dosis ʒʒ. j. ad ii. ubi usus veniat, adhibenda; &, ut per usum videbitur, iteranda.

Cum dosi prima, vel secunda, si placet, demittatur Bolus, seu Pulvis sequens.

℞. Theriac. Androm. ʒʒ.

Flor. Salis Armon. ʒʒ.

Cons. Anthus ʒj.

Syr. Cort. Citreor. q. s. f. Bolus, vel

℞. Pul. Serpent. Virg. ʒʒ.

Spec. Diambra ʒj. ad ʒʒ.

Micropip. gr. iij. iijj. v.

Ol. Cin. Chym. gutt. j. f. Pulvis.

Pauperrimis, & indigentibus (uti etiam aliis, ubi medicamenta non ad manus erunt aptiora) Spiritus Vini detur ustulati quantitas ea, quæ proposito respondeat: vel Aquis Cardiacis superaddi possit, Spiritus C. C. Succinatus.

Cum hisce Frictiones simul adhibendæ sunt; & in Vino, vel Spiritu Vini calefacto, immergæ Stupæ, scrobiculo cordis, & toti abdomini applicandæ, crebroque removendæ sunt.

His, vel huiusmodi similibus, utendum eo usque, donec æger refectus, & (modo hoc effectum reddi potuerit,) in solido locatus fuerit: quod utique raro fit, priusquam Arthritidis in articulos ablegata, & iis sit infixæ.

Si a δυσπρόσιτο aliquo temere comeso Syncope proficiatur, & æger facile vomat, aut ad vomendum pronus sit; quamprimum ita factum sit, ad se ut paululum rediret, per Decoctum Tææ, vel Cardui, largiter exhaustum, alienum ejiciatur. Verum, si ad incitas ita redactus sit æger, ut moræ locus relinquatur omnino nullus; quin, ad salutem ægroti quicquid peragi possit uno id, necesse fuerit, eodemque tempore peragatur omne; hoc casu, inquam, Vini quantitas ebibatur ea, & quidem ea celeritate, quæ tum viribus redintegrandis, tum vomitui inovendo satis esse reperitur.

At si revertantur, & importunæ fuerint huiusmodi Συμπόσιον; ut iis initio statim occurratur, præsto sint oportet istiusmodi Cardiacæ, prout factio opus erit, ingerenda. Quamquam enim sanis, integraque valetudine usis, nullum unquam potionis genus hisce Cardiacis (Spiritus nempe, & Aquis generosis) pestilentius aut magis noxium, si in usum communem trahantur, excogitatum fuit; tamen Arthriticis veteribus, præcipue vino deditis, hisque Lipothymis invadit solitis, nihil, quod sciam; utilius, salutariusve. Adeo, videlicet, quibus alii, certe permulti, rebus conficiuntur, & e vivis extruduntur, iisdem ipsis alii servantur, & multos annos, eorum beneficio, vivunt valentque. Hoc autem, uti re ipsa constat, animoque a me sincero, & in humanum genus benevolo dictum, boni velim consulatur; nec in peiorem partem, & sui peniciem a quoquam, tamquam ad malos mores licentia, rapiatur. Qui Cardiacis hac occasione nimio plus indulerit; qui etratum tam turpe, tam stultum erraverit, ipse viderit.

HISTORIA I.

Syncope Arthritica, foras abacta hoste, curata.

Moribus & ingenio præstantissima scæminarum, eadem fere de causa, quam in sequenti Historia repetam, se in vitæ periculum redegit. Diu enim Arthritide, culpa non ex sua, laborans, paroxysmo gravi, imo quidem omnium, quos unquam est perpassa, longe gravissimo, vix ad exitum perducto: aquam illa fontanam, & frigidam potavit, eoque forte largius, quoniam antea non solum impune, verum magno suo commodo fuerat aquæ potrix. At in re-

bus humanis, utramque facit paginam opportunitas: multumque refert, in iis agendis, quæ sint earum singulis accidentia.

Circa idem tempus (ut aliud esse solet ex alio malum, ἐπὶ δ' ἀλβεῖον ἀλγέα κατὰ), cibo quodam inepto, & difficili comeso, mirum quantum ab eo in victu errato, & quam mox adductum est discrimen. Ventriculo primum ægrotavit, nausea & fastidio gravata: doluit deinde vehementer, tamquam spasmis arctissime contrahentibus. Orta tunc erat hysterica (talis esse videbatur) suffocatio. Erat vomitio, sed inanis. Sensuum, & virium erat diminutio. Dum ista fiunt, Arthritidis (quæ in extremis partibus paroxysmum, aliquot jam per menses, exercuerat) illico regressa est, ad ea, quæ intus sunt, vocata.

Plumæ juxta comburantur; ut nimirum spiritus animales, præpostere agentes, odore fædo coerceant, instruantque; Aqua datur Hispanica, semel atque iterum, quanta nempe Ventriculum reficiat, & Arthritidem horum adigendo, inque artus pellendo, ægram restituat. Trium; aut eo amplius, horarum spatio, Syncope remisit. Dolor in extremis partibus recruduit; ægra servata est.

HISTORIA II.

Ejusmodi alia.

Navis olim Præfectus, neque Veneris, nec Bacchi cultor parcus, & infrequens, propter iniquam eorum observantiam, Arthritide multatus est. Graviter, & diu ille doluerat, cum forte fortuna simul in eadem domo essemus, & de Navarcho nostro, tanquam animam agente, ex improvviso clamaretur. Ægrum addolavi; quid hoc clamoris, inquisivi; pulsus inveni languidum, imbecillum, rari: qui solebat esse maximus, & durissimus. Os expalluit. Anhelitus sublimis, & cum intervallo longiori tractus. Corporis superficiem frigus sudorque occupavit. Sensus, motus, vires universæ sunt collapsæ, ipsiusque propemodum œconomia subversa ratio.

De mali causa interroganti declaratum est, ægrum, Pedibus dolentem, febricitantem, sitientemque fontanam paulo ante aquam hausisse frigidam, ad ejus quasi selibram; itaque sibi malum arcessivisse.

Aquæ Ego Cardiacæ, maximeque generosæ, dosin illico prælargam, cum Sp. Vol. Oleos. guttis aliquam multis, in os immisi; &, post tempus aliquod, cum Theriac. Androm. & Pul. Gascon. ana ʒʒ. repeti, imo quidem Haustum tertia vice, spatio quodam interposito repetere, necesse habui. Ne plura, non nisi remediorum summe cardiacorum immensa vi restitutus est æger.

In eo vero restituendo, duo notatu digna erant. Primum, neque ea Cardiacæ febrim; sed e diverso æstus modo benignum, sudorem blandum, & auspiciatum inferre: Cujus id in causa esse videbatur, quod ægro mari versato, frigori assueto, Cardiacæ minime nova essent, & quod illius sanguis, Arthritide diuturna depressus, non cito incenderetur. Deinde, non multo post, quam in artubus calor redierat; quod Dolor redierit articularis, & cum eo incolumitas.

Habetis Syncope Arthriticam; facultatum omnium perturbacionem; animalis vitæ eclipsin; Arthritide revocata, & ad ea, quæ intus sunt, allecta factam. Habetis eam, Arthritide foras abacta, sublevatam.

HISTORIA III.

Arthritide diu ignava & inerti generata, Syncope illius Paroxysmo regulari sublata.

Vir melancholicus, solers, ingeniosus, patre natus Arthritico, ætate progrediens ipse doluit Arthritide; sed ea, quæ segnis, & ignava, paucos habuerit paroxysmos; &, ex iis paucis idoneos & laudabiles certe paucissimos. Huiusmodi anni prope viginti erant cum, ingravescente jam ætate, diu quieverat Arthritidis, & in ista quiete quando fortuito accidit (tanquam πρόσκαιρος, sive causa evidens) in potentibus erratum, æger ultra morem largiore vino menses aliquot usus, non ita diu post Syncope correptus est. Frigus occupavit artus; pallor faciem; spiritus animales perturbati, & depressi sunt; pulsus in carpō humilis, ictusque omni tertio intermittebat. Nihil fuit propius, quam ut periret. Stupebant astantes, unde, & qua ex causa, malum tam grave, tamque repentinum oriretur.

De Arthritide interrogavi, quam illa pridem παρὰ φύσιν esset; & quam perfecte. De insultu ejus tum raro, tum miti certior factus, operam dedi, ut per Arthritidem (quoad ejus fieri posset) in artus exturbatam, malo præsentī occurreretur. Quocirca, præter Haustum Cardiacos, Spiritusque C. C. vim magnam, iterum atque sæpius datam, Electuarii Arthritici quasi ʒj. ter quater in die sumendam, imperavi: cumque horum, & Pul. Gasconici ope, fausto quidem omine, pes inciperet dolere; ut bene res feliciterque verteret, & ineptum promoveretur opus, Alcohol. Martis grana aliquot ex Julapio propinavi.

Nondum ejus scrupulum demisit æger cum paucis horis spatii tantus in sanguine factus est orgasmus, quantus observatione dignissimus. Pulsus illico celerior, elatior: æstus universalis, ingens: venarum hæmorrhoidum apertio: sanguinis eruptio, sitis immodica; spirituum agitatio vehementissima; quæque spes & ratio sanitatis erat, in pede sinistro digiti & articuli maximi tumor, ruborque orgasmum indicavit.

A quantitate Martis, utut valentissimi, tam exigua, tantas excitari turbas, equidem peccatum est. Cassum aliquod, & viribus spoliatum Martem, esse nostrum hoc illius præparatum, nemo prudens affirmabit; quando tam cardiacæ, prius sumpta, tam longe virtutibus exuperet, tamque potenter Podagram expellat.

Ut autem humor evocetur, vel minimum in articulo retineatur, Vesicatorium alio alioque loco impositum est; loco autem affecto Emplastrum, ex Picis Burgund. & Emp. Cephalici paribus mensuris. Pedi vero toti, ex Cerato viridi cothurnus, fasciæ laneæ constructus.

Propediem humerum, usque sumptis ore Cardiacis, invasit Arthritidis; ejus alliciendæ ergo, Empl. e G. Caranna, cum vestitu laneo, illi superpositum est. Horum, quæ intus, quæ extra, adhibitorum usus partim per Podagram, & Quaysan, partim per Diaphoresin, alienum amandatam & exemptum est, spiritusque instaurati; &, quam vidi gravissima, multoque omnium atrocissima, Syncope levata est.

CAPUT IX.

De Calculo Renum Arbritico.

Art. I. **R**enum ille Calculus, qui concretio est Arbritica, cum eorum calculo vulgari, tam per omnia concordat; ut, de eo verba hoc loco facere, supervacuum opinaretur; nisi in ejus Therapia, & προφυλαξει; ne dicam Historia, quædam occurrerent, quorum consideratio specialis habenda.

De Calculo primum annotatu dignum est, cuiquam unquam morborum eum frequentius supervenire, quam Arbritidi: quod ut aliis in regionibus aliorum observatione palam factum, ita in Damnonio nostra esse certo scio. Minime vero cogitandum est, Arbritidi, tametsi gravi verustaque, calculum esse Comitum individuum; nec quidem fere individuum: quando Arbritides aliquas nunquam, aut certe raro, ille comitetur; (raro enim Frigidam, quæ dicitur, Arbritida; raro languentem, quæ tamen Arbritidis, late sumptæ, partes utique permagnæ sunt,) nec quidem ullas semper.

II. Qui a curabulis ad effectuum horum alterum, maxime vero qui ad utrumque sunt proclives; ipsa nonnunquam adolescentia Calculo, ne dicam citius, afficiuntur. Alias vero ita fere se res habet. Cum Cereri, & Baccho æger diu indulset, tam mala vitæ ratione condi, & in sanguine coacervari solet, aliena illi materia; quæ, naturæ molesta, & inimica, partim per articulos, (unde Morbus Artricularis) partim per Renes, una cum sero, quod illi vehiculum esse videtur, amandata est. Ad ureterum autem initium adhærescens, in Arenulas eo loci primum coit, uti postmodum arenulæ in Calculum. Huic autem materiæ, in sanguine cumulandæ, maxime conferre censeatur diætæ, succo lapidescente abundans, eumque sanguini impertiens: confert etiam mala concoctio: vasorum conferant Læteorum ora nimis aperta: ut & Renum a natura imbecillitas.

III. De Calculi humani, generatim accepti, productione, multa quidem, tum ex ejus analysi chymica, tum etiam pondere Specifico proferuntur; quæ ossibus magis, quam lapidibus, eum appropinquare annumerari oportere, non parum arguunt. Hæc autem omnia non tam naturæ Calculorum, quam certis quibusdam eorum accidentibus, præcipue crassamentis, a sanguine acceptis, quæ Calculum magna ex parte constant & efficiunt, debentur. Calculi vero ipsa Γένεσις, ex particularum quarundam lapidearum, cum affine sale, (calcarii nempe lapidis, cum sale suo calcario; vel ocræ, cum sale vitriolico) coitione fieri; iisque sanguinis crassamenta, tanquam vinculis, connecti judicentur. Ista vero quando non sunt hujusce instituti, & a clarissimo Listero φυσικοπράτος & dilucide, sunt tractata; ad eum lubens quidem lectorem remitto. (a)

IV. Calculi autem Arbritici partes, & compositionem, si attente inspexerimus, eandem fere, quæ Calculi renum vulgari, & non Artritici, esse invenimus. Hæc autem res ex duobus Lævenboeckii pronuntiatis, elucebit. Calculum cremavit ille, crematogue adjecit aquam fontanæ, idem fecit cum calcaria, & rosacea Artritico materiam. In his lixivii, beneficio microscopii, apparuit salinarum copia particularum plane similium, rigidarum nempe, concretioni aptarum, dissolutioni resistentium. Jam vero, (ut, quod dixi, inferam) si Calculus, ex corpore non Artritico extractus, adeo cum tofo Artritico conveniat; multo magis, qui est Artriticus, cum utroque, cum Calculo præcipue, convenire judicetur. Hoc autem, utut primo aspectu probabile, non tam argumentis, quam experimentis statuendum, & definiendum.

V. Calculi jam facti, sive Artritici fuerit, sive non, symptomata prorsus eadem inveniuntur: at a vulgari Artritico, ea re potissime distinguendus; quod Artritidis cum sit Επὶ τὴν ῥήμνα naturam ejus participet, materiam amplectatur, & comprehendat. Ideoque, utrum æger in Ποδογρίωντων numero fuerit habendus, & a paroxysmo quando vacaverit, diligenter inquirendum, ut de Calculi natura constet.

A Colica exquisita differt, per ea, quæ Calculum exquisitum ab illa differre faciant: A Colica Artritica, quod nullam spirandi difficultatem, nullos in umbilici regione Σπρόγες; sed nempe melancholiam adeo tristem, & urgentem, aut materiæ crudæ, acidæ, biliosæ vomitum adeo constantem habeat.

VI. Medendi etiam intentiones eadem, ac in Calculo vulgari; at, quod in hoc nostro momenti est præcipui, per auxilia quadam propria, per methodum particularem exequendæ. Nullus enim hic, aut certe perrarus, Acidorum usus, quinetiam Fetus, Linimenta, Cataplasmata, aliaque dorso applicari solita, maxime si paroxysmus simul Artriticus erit, tanquam periculo plena, sunt præmittenda, frigida.

At ejus dolori, si cum artuum dolore concurrat, & intolerabilis fuerit, deliniendo conducunt Paregorica; & quidem maxime, si nulla sanguinis detractio (quæ in Calculo alias utiliter præmitti solet; at in hoc nostro, ad ea, quæ intus sunt, vocare possit Artritida; vel, ut ne exulet, inhibere) præmissa, ægroto propinentur. Illa vero Paregoricorum dosis, ejusque repetitio optima; quæ dolori sublevando satisfaciens, cerebro interea non obfuerit, neque materiam ei vitiosam impegerit.

Si, nullo Artritidis comitante paroxysmo, Calculus erit; alia rerum facies, aliaque medendi via est. Hic enim, in plethoricis, & multo sanguine distentis, ad prohibendam Inflammationem, secetur vena: Enema, ex Decocti com. & Ol. Amygd. d. rec. ana ℥ss: cum Tereb. Ven. Ovi Vitello solut. ℥i. injiciantur. Postero die, Eleuario leniente, Pul. Rhab. & Syr. Violac. forma Boli commisit, vel, Jusculo Avenaceo; cum Foliis Sennæ incoctis, & Manna superaddito, purgante, venter aperiatur, eoque vespere Paregoricum, (quale sunt Pil. Matthæi grana totidem, quod opii granum continebunt unum) locum merebitur. Quinimo, si a Calculo dolor urgebit, ne intestina spasmis contrahantur, ad hosce præveniendos, & illum compescendum, horas aliquot ante purgans, sumatur Paregoricum; ipsumque purgans, si justo lenius fuerit, suo tempore sequatur Enema.

His, ad dilandas urinæ vias, actis, ad Calculum exprimendum usui erit Balsamum Gileadense, Chiliense, vel Peruvianum, ex Syrupo Dialthææ, vel Balsamico datum, & bis, ter, quaterve indie, repetitum.

(a) Vide Dissertationem Ejus Medicinalem, de Calculo Humano, & de Petrificatione.

Syrupus Balsamicus, quem vidi, elegantissimus hoc modo præparatur.

℥℥. Aq. Hordeat. (tertia Decoctio) colatæ, & per subsidentiam clarificatæ, ℥i. Balsam. Tolutani ℥ii. Infunde calidæ, ad ℥i. consumptionem; deinde adde Sacchari Crystallini optimi ℥ii. leniter eoque ad consistentiam Syrupi tenuioris, quem per linteum densum, frigidum trajice, & usui serva.

Si forma Boli arridet, Opob. ℥ss. vel alius Balsami dosis, cum Ovi Vitelli ℥i. temperetur, & intervallis jam dictis assumatur.

Hiscæ vehiculo esse potest Alla nostrorum hominum mustea, (Grou Ale) præsertim alba; quæ cum primis generosa, tum etiam maxime Diuretica; vel Rad. Althææ, Glycy. Eryng. Cond. Hordei, aliorumque his similibus apozema; Saccharo Crystallino; vel Syrupo Balsamico dulcatum. Ad eundem finem utile Foliorum Tææ Infusum, libere potum; vel, ex Decocto præscripto, & Amygd. d. emulsum; vel id, quod sequitur.

℥℥. Amygd. d. corticibus purgatarum, N. x. inter contundendum, affunde Infusi Tææ ℥ii. postea coletur emulsum; eique adde Aq. rosac. vel Cin. bord. & Sacch. Cryst. q. s. Nonnullis Vinum album, vel Decoctum modo scriptum, cum Ol. Amygd. adjecto Sacchari Cryst. momento, propinamus.

Extra, Cuniculi Adipem, dorso superillitum, adversus dolorem mirifice valere, a sene calculoso, tanquam expertum, accepi.

Ad Prophylaxin optime conducunt Aq. calidæ Bristolenses, quibus adjungantur Opobalsamum, & Syrupus e prædictis lubricans. Quibus nulla istiusmodi Aquarum copia, illis usui esset Tææ Citreæ Infusum, omni mane bibere. Novi Calculosum, qui methodo sequenti renes subinde purgans, ad senectutem veterem & tutam est perductus. Ter, quaterve in anno Terebinthina Venet. quasi ℥i. cum Pul. Glycy. forma pil. sumpsit; Cerevisiæ, vel Posseti libras aliquot suberbibens: confestim milliaria quatuor, vel quinque, equo succussatore mensus est: unde sæpe Arenulas excrevit, seque si non immunem, tamen incolumem servavit. Cerevisia omnium optima, quæ cum Aqua pluviali comparata: illam volo, quæ, neque in nivem unquam, neque in glaciem mutata, sincera sit, & pura, nulla testis calce, nullis salibus, aut particulis lapideis inquinata: ea aquarum omnium levissima; ea cum primis Diuretica. Medicamentis autem urinam moventibus præmitti, & nonnunquam interponi oportere ventrem & ductum alimentarem inanientia, lipis notum & tonforibus.

Libet adjicere, in Dysuria, (quæ Calculo interdum accedit) quoties a ductuum urinosorum spasmis oriatur ea, nihil efficacius, conducibiliusve, quam Opiata cum Diureticis juncta, quibus, utut urinæ alias sistendæ illa conferant, simul & remittantur spasmi, & urina cieatur.

At, a dorso dolore, de Renum Calculo, ne quis temere statuatur, unum his subjungam. Olim vetulæ, hydropes interemptæ, Anatome interfui; quæ, cum per annos aliquot eo dolore gravaretur, Calculo effici a familiaribus haberetur, illo tamen, ut ex cadavere aperto constaret, omnino caruit, Reni dextro ingens adnata erat Hydatis, sive vesicula, sero insipido plena, doloris fortasse causa.

Atque hæc de Calculo Renum Artritico.

HISTORIA I.

Calculo & Chiragræ una occurrentibus, facta simul

Quarto ab urbe lapide, prope Iscæ ostium, sexagenarius Artritico, simul & Chiragra & Calculo doluit: illam ostenderunt tumor, rubor articularum; aliaque Artritidis indicia, ordine & concursu Pathognomonico apparere visa: hunc in dorso regione lumbi dolor, ut & intestinorum quasi-colicus; quodque fidelissimum hac in re symptoma, Arenule sub id tempus excretæ.

Morbis adeo diversis ægrotanti, ea dari par erat, quæ contra utrumque prodesse, quæ neutri faverent. Itaque therapiam, Balsami Peruani quantitate, bene magna & frequenti, cum vehiculo idoneo, tentavi, atque adeo perfeci. Balsami hujus guttæ plus minus x. ex Syr. Balsam. coch. i. bis, vel summum ter in die, sunt adhibitæ. Hoc, qua Cardiacum, in extremas corporis partes Artritidem, qua lubricans, & Terebinthinum, e Renibus arenula per urinæ vias expelli fecit: sicque una eademque fidelia, non infelicer duo simul dealbati sunt parietes.

HISTORIA II.

Adversus Calculum Arthriticum Prophylaxis.

Viro præcellenti & eximio, qui diu Arthritide per vices doluit, aliquando etiam calculo, in se a patre derivato; cum adversus utrumque malum Prophylaxin exigeret, consulti, ut exercitatione pertinaci, & crebra, sabulum e Renibus, e sanguine materiam alienam exturbaret, itaque salutis suæ prospiciens, senectæ viam faceret incolumi.

Facta per Lac Scammonii purgatione, aquas hausit vir illustrissimus Bathoniensis, mensos binos, libere & recte equo assidue corpus exercens. His adjunxit Balsami Peruani, stomacho non ingrati, Renibus utilissimi, guttas aliquot, omni nocte, ex Syr. Balsam. coch. i. cum ejusdem aquæ haustu. Renes inde melius habuere, sabulo purgati. Dorso calor, qui ægrotantem multum affligerat, evanuit. Hac, & hujusmodi Prophylaxi, aquis scil. purgantibus & diureticis, statim anni temporibus, iteratis, equitatione, ambulationeque fere continua, contra malorum par crudele, hodie vir insignis se defendit, momenta vitæ propugnat.

Fatendum autem, quod hujusmodi Prophylaxis, non nisi corpore perpurcato, & evacuationibus generalibus exonerato in usum trahenda sit, ne videlicet in Renes sanguinis impuritates effundantur. Quinimo notari fas est, quod ipsæ interdum Aquæ Diuretice, succum lapidescentem habentes, non tam e Renibus arenam eluant, quam iis impertiant, & in iis concretam faciant. Atque hoc casu infusum Tææ, aqua pluviali confectum, Diureticis illis Aquis anteponendum.

HISTORIA III.

Calculus Arthriticus, Vertigo Arthritica, & Arthritis
regularis se mutuo excipientes.

Quoniam vero a nonnullis, de *Calculo Arthritico* dubium existimetur, utrum ille concretio sit *Arthritica*; an non potius ex sanguinis recrementis, emeritis, & inutilibus; per quietem, & vitam nimio plus inertem; in *Renibus* depositis, nata atque facta: unum his subijciam, quod (opinione nostra) tollendo huic dubio omnino satisfecerit.

Vir summa familiaritate mihi conjunctissimus, ex intervallis diu *Arthritide* recta conflictatus, enormem eam ætate suprema habuit. Loco rectæ, primum vertigine *Arthritica*, longa utique, ancipiti, & periculosa (quippe, qua in humum ne irrueret, sæpe quidem summum erat periculum) est correptus. Postea vero quamprimum iste capitis affectus inclinavit, æger *Renibus* dolere cæpit, calculosque varios, non sine ingenti cruciatu, per urinam excrevit: nunquam autem *Calculo*, nisi *Vertigine*, & *Arthritide* regulari liber, ægrotavit.

Post menses aliquot, *Pedibus* denuo laboravit; verum eo tempore, tum *Vertigine*, tum item *Calculo* immunis. Et quidem ita res erat, ut, tametsi horum affectuum alio, atque alio posthac creberime; tamen, eodem tempore non nisi uno semper, aggravaretur. His etiam adjiciendum, quod eundem ordinem minime tenuerunt hi affectus; verum *Calculus* interdum, post *Arthritida* diu vacantem, (cum in sanguine nova materia coacervata, novaque facta esset illius germinatio) ægrum per se invasit; interdum *Arthritidis* paroxysmum e vestigio excepit, tanquam morbus ei geminus, a communi stirpe oriundus: vel potius, in alia corporis regione, ejus pars altera.

Magni vero hic momenti esse arbitror notare, quod ex quo *Arthritidi* se adjunxit interdum *Vertigo*; alias *Calculus*; pro istorum morborum malitia frequentiaque tenuata sit *Arthritis*; & quidem ea proportionem, ut ab illa demi, quicquid istis attribui, confirmetur.

Istorum autem morborum ortus, incrementum, ordo, vicissitudo, & inter se relatio, nunquid aliud significant, quam, quod ii omnes simili gaudeant causa continente; quæ nunc, in *renibus*, *Calculus*; & quidem hosce omnes, pro istius causæ renovatione, viribusque, tum crebros, tum vehementes pariat, & producat.

CAPUT X.

De Asthmate Arthritico.

Art. I. **T**RACTA imi ventris *Arthritide*, ad eam jam progredior *Anomaliam*, quæ est *Thoracis*, quæque respirationis organa præsertim afficit. Ubi primum de *Asthmate Arthritico*; tum de *Tussi Arthritica*, de *Phthisi Arthritica*, deinde sermonem faciam.

Asthmata sunt hujusce tituli perimulta, quæ a causis alibi locorum, nec in *Pectore* extantibus, oriunda, (nauseæ, verbi gratia, colicæ, anginæ, vel hujusmodi morbo alicui *Arthritico*,) *κατὰ σωματικὰν, ἐπιγινώσκται*: & istorum, quibus superveniant, morborum *Capitibus*, sunt vel dicta, vel dicenda. Unum, hoc Capite, *Asthma* dicam *Arthriticum*, nimirum *διωπιδιόν*.

II. Hoc affectu omnium creberrime laborant ii, quibus breve, vel aliis male compositum pectus, aeri reciprocando minime accommodatum, & quorum parietes *Asthmate* & *Arthritide* fuerant, maxime vero si utroque, gravati. Hic enim, multo apparatu & molimine, producendo huic affectui, quasi studetur: cumque, nato & perfecto homini, respiratio usus sit perpetui, & ad vitæ opus sustinendum, continui; mirandum non est, illius impeditiorem, & difficultatem aliquam insignem, sæpe periculosam, sæpe lethalem esse.

III. *Asthmati* huic inferendo (ut, de aere spisso, carbonum fumo, ventis, aliisque tam hujus *Asthmatis*, quam vulgaris & primigenii causis evidentibus, nihil dicam) huic, inquam, inferendo confer miasma *Arthriticum*, pectori inflictum; illius utpote causa continens, & conjuncta: itaque ut, tametsi plures illud causas evidentes & remotas, alio sc. tempore & corpore aliam) unam tamen habeat continentem, & proximam, videlicet *Arthriticam*.

IV. *Pectori* miasma nunc opiata, perperam adhibita, insunt; nunc quicquid aliud *Arthritida* repellat, & pectus appellii faciat; nunc urgente nulla vi externa sive causa evidente, pectus angustum, gracile, gibbosum, breve, aliterve male formatum, ipse per se *Arthritis* intrat, tanquam domicilium maxime conveniens. Interdum evacuatione aliqua solemnî (qualis est fluxio sanguinis, ulcus, vel etiam partus naturalis) suppressa, quæ miasma sensim amandare solita est; in sanguine cumulatam illud, neque, uti par est, in articulos expulsum, pectori committitur, *Arthritica*, utero ex more non gerentis, *Asthmate* hunc in modum aggravatæ, exemplum memoratu dignum his subnectam.

V. De hujus *Asthmatis* *ἑνότητι*, & de ejus natura plane *Arthritica*, ut palam fiat, advertendum est, *Asthma* nunc e vestigio sequi *Arthritida* regularem interciscam; & a *τῷς ἐξωθεν*, ad ea, quæ intus sunt, materiæ vitiosæ fieri *μεταστροφῇ*, aperte monstrare: nunc, e contrario, *Asthma* in *Arthritidem* mutari, antiquam sedem, & avita regna, se denuo ingredi, materiam indicare: nunc, hos affectus se mutuo excipere, vicesque agere alternas: nunc ab *Asthmate*, *Arthritidem* vinci, absorberi; uti nonnunquam, ab *Arthritide*, *Asthma*. Qui quidem istorum malorum ordo, reciprocatio, habitudo, & ratio inter se nihil magis significat, quam quod, ex eadem materia, *Arthritidi* propria, nunc in artubus, nunc in pectore vires exercente, utrumque producat; & *Asthma* illud sit revera *Arthriticum*. Quod quidem enunciatum eo magis probabile, quoniam *Arthritidem* sua gaudere materia, peculiari & propria, quæ in alias aliquando regiones evagetur, omnino constat; *Asthma* vero, non tam a propria ulla materia, quam a vitiosa aliqua communi, (sive alia quavis inimica, & aliena) una cum mala corporis febricitatione, partiumve respirationi dictarum imbecillitate, causa hujus morbi privata, fieri.

VI. Quæ vero hujus prolapix *Asthmata*, duum sunt generum; alterum (uti de exquisito *Asthmate* pronunciatum esse solet) siccum, alterum humidum. In sicco isthoc *Asthmate* anhelum videre li-

cet *Arthriticum*, & tanquam animam agentem, spiritu difficili, respiratione brevi, pectore gravato, tussi vel nulla vel mediocri, sputatione parca laborantem. Qui vini spiritibus dediti fuerunt *Arthritici*, eos sicco hoc *Asthmate* plus semel ægrotare novi.

Asthmate, quod *Arthriticum* est, humido affecti, tussiendo sputum plerunque crassum, & viscidum, idque nonnunquam vitreum exantlant; unde levare solet *Asthma*, donec, nova in *Pulmonem* missa, feri vitiosi copia renovabitur: hoc autem, in teneris corporibus, tenui, laxoque sanguine, & ad colliquendum apto, donatis, & quidem autumnino maxime, locum habere mos est.

VII. Pituita crassa involvitur; una cum eo, *Pulmoni* incutitur; tussique ejicitur miasma *Arthriticum*: sic, ut permultos interdum annos, inversa *Arthritis* hac via fugam capebat; eaque sputatione, (simili fere modo, atque paroxysmo *Arthritidis* regulari) a periculis gravioribus defendatur æger. Et quidem *Arthritidum*, quotquot observantur, *Anomalarum*, nullæ videntur esse benigniores, aut minus timendæ, eo, quod nunc dico, humido *Asthmate*, & diarrhœa *Arthritica*: eo videlicet, propter materiam *Pulmonibus* emissam; hac autem, *Ano*.

VIII. Ex diversis hujus *Asthmatis*, qua sicci, qua humidi symptomatibus, opinari fas est; in priori, membranas, nervos, aut musculos spiritui trahendo inservientes affici, & iis materiam impingi; unde *Respirationis*, cum siccitate labor; in altero, miasma, sanguinis sero implicatum irretitumque; una cum eo *Pulmonibus* committi, & iis inhærendo respirationem impedire: atque pro diversitate symptomatum, diversa morbi hujus *Subjectu* esse, non temere judicamus.

IX. Nonnunquam equidem *Arthritis* (quod ante traditum) ipsis a carceribus, ipso ab initio devia, neque pede, neque manu salutata quidem; *Pulmonem* adit, occupat, laceffit, tanquam *Asthma* germanum; nec ab eo facile distinguitur; donec, ætatis progressu, aliquando foras erumpat, artus exerceat, recteque se gerat. Cujus quidem in artus translationis, hoc effectum esse solet, quod, quo rectius se gerat *Arthritis*; eo *Pulmoni*, & posthac reliquo corpori universo, melius. Qua de causa licet existimare, malum isthuc nihil aliud esse, quam *Arthritida*; primum in pectore deviam, ipsoque principio *Anomalam*; postea suo loco regularem.

X. Hujus *Asthmatis* *ἰσχυρότης* quam legitimi, veri, & genuini, longe alia videtur. *Legitimum enim, curatu difficillimum: Juvenes non sine magno labore, Senes nunquam eo liberari dicuntur.* (a) Contra vero exploratum, hoc *Asthmate* laborantes, facilius allevari, sæpius liberari; & quidem interdum, (quod de vero *Asthmate* rarius affirmari potest) ex toto.

Ut autem in re tam multiplici distinctius dicam, adjiciendum, *Asthmate* isthoc humido gravatos: sputatione, quod dixi, servatos, sæpe diu vixisse: *Arido affectos* maximo sæpe in periculo versari; brevi tempore, non raro strangulari: sed, & ope medica opportune adhibita, factaque humorum metastasi, nonnunquam subito restitui: denique, nulla arte sublevatos, eo se modo habere, & demum e vita cedere; tanquam *Asthmate* legitimo oppressos.

XI. Curatio tollit impedimentum respirandi; vel e corpore illud evocando, vel in artus amandando. Materiam e corpore vitiosam evocat *Venæ sectio*, & *Purgatio*; quarum illa plethoricis, & nimio sanguine distentis; hæc gulæ deditis, satietate læsis utilissima: utraque vero talis sit, oportet, ut ab ea *Arthritidis* *πρὸς τὰ ἐξωθεν* expulsio promoveatur. Hoc autem optime fit sanguinis detractione mediocri; purgatione quæ per *Drasticum* aliquod, & sanguinem exagigans, peracta. Detrahantur igitur, (quando res postulat, & vires ægri pariuntur) uncia quasi novem: *Enema* brevi post injiciatur: die proximo *Purgans* (ex *Aloe*, *Syrupo domestico*, *Pil. Cochleari*, vel ejusmodi aliquo) sumatur, sine paregorico vespere sequente propinando.

Post evacuationes hæc generales, in sicco *Asthmate Arthritico*, magnarum virium & momenti sunt *Sp. C. C.* alique istius generis *Volatiles*, & *flores Salis Armoniaci*.

24. *Pul. e Chel. C. C. Conf. Tussilag. ana Dj. Flor. Salis Armon. Dj. Syr. Balsam. q. s. f. Bolus, quinta, vel sexta quaque hora, cum idoneo vehiculo demittendus.*

In Humido, *Vescicatorium* dorso inter omoplatas applicatum, allevandis *Pulmonibus* summopere confert. Pituitam movent, eodemque tempore *Podagram* expellunt e *Sulfure* præparata; qualia sunt *Tinctura*, *Balsamum*, & *Flores Sulfuris*: uti etiam, his affinia, & plane congenera, *Gummi Antiasthmatica*, *Ammoniacum*, *Bellium*, *Balsama Naturalia*, *Peruanum*, *Chiliense*, *Capivi*, &c. *Placet Tinct. Sulf. gutt. xx. vel Balsami seq. gut. x. ad xv. ex Syr. Balsm. cochlear. dare: & sexta, nona, vel duodecima quaque hora, prout opus fuerit, repetere.*

24. *Tinct. G. Guajac. Bals. Per. ana p. aq. misce.*

In utroque vero, tam humido, quam sicco *Asthmate*, remediis hisce, cum vehiculis idoneis, uti juvabit: usque dum *Pulmoni* conciliabitur quies, & in ducendo spiritu facilitas.

Clysters, & *Purgantia*, quæ in vulgari *Asthmate* non incommode plus vice simplici adhibeantur, in *Arthritico* hocce post primam vicem minime præscribenda: ne videlicet humorum in artus eruptionem, quæ rebus quibuscunque aliis longe præferri debeat, suffraginentur.

Pulmoni phlegma quod impactum est, *Olco Amygd. d. Ol. Lini*, *Syr. Balsamico*, *Cap. Ven.* & aliis ejusmodi *Anacatharticis* moventum, excreandum.

In *Paroxysmo*, siquidem urgebit ille, neque auxiliis supra dictis mitigabitur; maxime valet *Oxymel Scillit.* vel cochlearium, & per vices datum, ut eo spirandi spatium adaugentur; vel ea dosi, qua vomitio cieatur, humorum inclinatio mutetur, & in articulos vertatur. Certe, per unam vomitionem, *Arthritidem* ex *Anomala Regularem* fieri, plus semel novimus. Nonnullis in *Paroxysmo* profuit *Fumus Tabacci*, *Potio Coffee*. Valent suo loco *Frictiones*. Non magni æstimantur *Unguenta*, vel *Linimenta*, *Asthmaticis* vulgo commendata, in re præsentî parum valitura.

Prophylaxis in Humido *Asthmate*, præmissa purgatione, instituitur per *Diuretica*; quæ serum apte & tempori amandent: per *Antiasthmatica*; quæ *Pulmonem*, & spirandi organa tueantur: per *Fonticulos*, dorso inter omoplatas apertos; vel *Epispastica*, maxime diuturna: perque ea, quæ *Arthritidis* primigeniæ *Prophylaxim* agant. *Siccum* autem *Marte* cum *Antiasthmaticis*, *Gummi* puta *Ammoniaci*, &c. juncto; iis videlicet, quæ spiritus animales una cum pectore respiciant, fugandum. In utroque, usus est immensi *Aer aprius*, & pro-

(a) Vide *Riverium*, Cap. de *Asthmate*.

& probe agitatus: uti etiam bona victus ratio: quam ut teneat ægrotans, fugiat necesse est, τὸ ποικίλον τῆς διαίτης, a Medicis non sine causa passim improbatum, & cibo simplici vescatur.

HISTORIA I.

Adolescens, ab Arthritide Asthmaticus, Empirici Narcotico peremptus.

AD trium supra viginti annorum adolescentem, in regione urbis septentrionali, vergente sæculo superiori, anxie & propere accessebat. Ut ætatem hominis adimpleret, a natura ille destinatus esse videbatur. Erat enim forti, quadrato corpore, vultu colorato, uno miasmate *Arthritico*, quod a parte acceperat, infectus, Sanguinem, ab ipso vitæ exordio vitiosum, ipse malis moribus non parum inquinavit. *Spiritus ardentis* avidè potavit: malam victus rationem affectavit: coctionem, quasi de industria, pessum dedit.

Podagra, quæ paroxysmum regularem plus semel ediderat, & dudum artus exercuerat, nescio qua de causa relictis artibus, ad ea, quæ intus sunt, translata, respirationis invasit: hinc *Pectus* aggravatum, spiritus difficilis, respiratio brevis & laboriosa.

Visa est materia, vel e musculis respirationi inservientibus aliquem, vel eorum membranas occupasse; vel in nervorum *Paris vagi* fibras se insinuasse. *Asthma* enim siccum erat; nec quicquam *Sputum*, nec quicquam *Tussim* sibi adscivit.

Dum ita res erat, Empiricus e laniorum vico, ad vitam & salutem (proh Deum atque hominum fidem) instaurandam, est accitus. Ille, historiam neque caput, neque finem ob oculos habens, περὶ ἐμπειρίας familiari & usitata, multa fecitavit; nihil egit: donec elapso pene quadriduo, propter ἀγρυπνίαν (hanc argumenti speciem obtendebat) paregoricum audax, & nequam, sub noctem dedit. Hinc illæ lacrymæ: hinc ille properus ad Medicum nuncius.

Ægrum ego ἀσφυκτον inveni, moribundum, & jam per totam, quæ præcesserat, noctem, animam agentem. Remanentibus palam feci, & (honore habito) discessi. Τοῖς ἡγοῖσι, τὴν ἰσπῶ.

HISTORIA II.

Asthma siccum Arthriticum, Venæ sectione & Cardiaco sublatum.

Ingenio, scriptis, & eruditione vir præclarus, *Rad. Bobun*, hypochondriacus, asthmaticus, cruditatibus acidis, dolore artuum *Articulari*, sæpe vago, interdum fixo, diu afflictatus; dolorem istum nuper acutum, ex improvviso abruptum, & intercisum habuit. At brevis ista niali intermissio, ægrotantem, olim collegam meum, & eo tempore convictorem, visitavi, lecto inveni prostratum, jam per noctem anhelum; & ea respirandi fuit difficultas, reciprocatone crebra quasi animam agentem. Neque *Sputatio*, neque *Tussis* erat ulla. Pulsus in carpo fortis, & elatus.

Ex omni parte reperiens, materiam *Arthriticam* in *Pulmonum* adyta, in eorum membranas, nervos, aut iis movendis inservientes musculos, per Μενιπρωσιον ingredi, & eos occupare censei.

Pertusa meo consilio vena, missus est sanguis; cui, post horas aliquot, innatavit, gelatinæ viscidæ similis, placenta. Deinde, ut e castris inique usurpatis hostem exturbarem, *Spir. Volat. Oleos.* copiam, ex idoneo vehiculo, propinavi; & pro rei necessitate repetii. Auxiliis hisce paucis, & paupertinis, sed opportune adhibitis, sine difficultate respiravit æger: *Pulmone* liberato, & relicto, in pedum & manuum articulos (non novos illi locos) fugatus est hostis: confirmatus æger.

HISTORIA III.

Arthritidis in Paralyfin & Asthma Metamorphosis.

Quidam artis sciens chirurgicæ, semel aut iterum in anno *Arthritide*, per lustra quatuor recurrente, multum ægrotavit; ætate vero proventus, neque tam crebra, neque tam vehementi, per biennium minuta, & sensim mitigata est *Arthritis*; cum in ejus locum mala, multo graviora, simili modo & mensura, succedere: sinistra nempe brachii, pedisque resolutio, cum totius lateris imbecillitate: deinceps *Asthma*, tam molestum, tamque importunum, ut non nisi recta cervicis spiritus traheretur. Siccum autem erat *Asthma*, paroxysmos habens, sed nullo *Typo* regulari signatos. Mari æger diu artem exercuerat; ubi *Spiritus Vini* nimium pythando, tum *Arthritidi*, tum *Paralyfi*, tum etiam *Asthmati* viam fecisse, & fundamenta jecisse non immerito censeatur.

Ita laboranti *Venæ sectio*, *Oxymel. scillit. Purgatio*, *Antiasthmatica Podagragogis* juncta, cum aere aperto, nonnihil profuere. At cum illa morbi natura esset, quæ nervos, eosque valde afficeret, quæ spiritus in iis contentos, (id est, intimum totius corporis humorem) mirifice debilitaret, eum ætas simul ingravesceret, ægroque fere jam inutilis esset medicina; partim morbis, partim ætate consumptum cum, sine ullo in articulis dolore renovato, abstulit ἀσπὸς θάνατος.

Eatenus vero rei nostræ conducit Historia; ut ex ea disci potest, maxime vero ex denso morborum ordine, subitane mutatione *Arthriticam* in nervos transferri materiam; & tum *Paralyseos*, tum *Asthmatis*, causam fieri proximam, & continentem.

HISTORIA IV.

Arthritis, in Asthma, & Hydropa, desinens.

Mulier *Exoniensis*, brevi pectore, neque respirationi satis apto, diu *Arthritica*, nuper omni dolore libera, nec pro more utero gerens; propter hæc causas, annum circiter quadragesimum, *Asthmate* & *Tussi* corripiebatur; illa non parum, isto multum excruciat.

Audita morbi historia, symptomatum ordinem & momentum meditant mihi, luce clarius videbatur; illius materiæ, quæ per uterum, perque articulos soleret amandari; quod in corpore relictum, vel de integro cumulatam esset; in respirandi organa infundi, eorumque

motum impedire. Qua quidem opinione ductus, ut aere puro, & aperto, frueretur ægra, (perpurgato prius corpore) rus illam misi; sed *Antiasthmaticis*, & *Arthritidem* expellentibus munitam. Neglectis autem medicamentis nulla in articulis visa est *Arthritis*; verum e contrario nova, tum in imo, tum medio ventre, coacervata est materia: unde tantus abdominis tumor, spiritusque tam gravis, ut non nisi cum sono & anhelatione spiraret ægra, propemodum strangulata.

Clysteribus ex urina crebris subducta est alvus, tumor abdominis sublatus: atque sic amotis impedimentis, *Sp. C. C. Succin.* aliisque *Podagragogis*, uno eodemque tempore, extrusa est in articulos *Arthritis*, & amplificatum respirandi spatium: atque adeo (quod attendendum) æqualiter.

Hinc aliqua curationis spes; at fallax, & inanis. Natura enim deficiente, neque operam conferente, frustra omnis medicina. In *Hydropa* incidit ægrotans, *Diarrhæa*, & narium *Hæmorrhagia*, symptomatice, & sæpe recidivis, comitatum: quibus demum oppressa, mortem, omnium morborum finem, oppetiit.

HISTORIA V.

Asthma, cum Iliade malorum, Arthritidos defectu regularis, exortum.

Vir Reverendus, quo cum magna perverusque mihi familiaritas, natura firmus, temperamento sanguineo, vultuque colorato præditus, post juventutem non tam intemperantem, quam delicatam, & dapilem, matura ætate corpulentus, & habitior factus est; annoque 1674. & deinceps, *Arthritide* per vices ægrotavit.

Postea solum, & cælum, (quorum illud siccum, hoc perflatum erat) humido, & minus salubri mutans, ætateque procedens, *Arthritide* non, ut ante fixa, verum per artus, ad instar *Rheumatismi*, vaga & erratica, laboravit. Sed neque diu morbus istud ædæ retinuit: nam paucos post menses, quam in corporis ambitu ille sævierat, *Catarrhis* & *Tussi* correptus est æger: unde sputum magna ex parte laboriosum; utpote crassum, viscidum, ad imo *Pectore* citatum. *Tussi* accessit *Asthma*, grave profecto, importunum, & quod ægrotantem multos annos, autumnis maxime & tempore hyemali, divexarit. Quamvis autem *Asthma*, nec interdum unquam, neque noctu penitus cessavit; ea tamen natura erat, ut eadem nycthemeri hora constanter redux, (tanquam ad horologii fidem) & quidem multos in menses continuos, paroxysmum ageret. Dum ita res erat, *Venæ sectio*, *Vomitu*, *Purgatione*, *Decoctis Pectoralibus*, *Spiritibus*, &c. *Antiasthmaticis*, plus semel levatum *Asthma*, minime vero sublatum.

Alias *Hæmorrhoidum* tumore, magno utique, & diutino, torquebatur æger; eoque tempore illud præcipue notandum, quod neque spiritum difficile traheret, neque *Articulis* doleret.

Alias *Vertigine* tenebatur, adeo vehementi, ut quæ ægrum neque ambulare pateretur, neque erectum stare: durante vero illa, cætera bene se habuit.

Mense Junio, 1685. ex vino nimio plus poto, incidit in *Pleuritidem*, *Hæmoptoe* comitatum: auxilio, cum plerisque aliis, sed omnium multo maximo, fuit sanguinis detractio, iterata, copiosa. *Pleuritidi* nondum penitus evictæ, subnata *Arthritis*, in extremis corporis partibus, regularis. Ea vero, nescio qua de causa, siue quiescente, siue repulsa, febricitavit denuo ægrotans, *Angina* affectus. *Angina* paulo post suborta est *Arthritis* (uti post *Pleuritida*) regularis.

Anno plus minus 1687. suadente nescio quo, fortissima sumens *Hydrotica*, (ut erat æger remedium empiricorum amantissimus) sanguinem, a natura calidum, adeo exagitavit, ut *Impetigo* statim erumpens corporis superficiem mire turparet. Tumore lato, & inæquali, facies inflammata est. In *Squamulas* subalbicantes, & furfur, abiit tumor; eoque exeunte, loci, tanquam a *Variolis*, rubor apparuit. Multum, & diu, gravissimo hoc affectu laboravit æger. Alio enim loco restituito sanatoque, alium, sed a novissimos distantem occupavit; & quidem ita, ut maculas crescentes, maturas, arefcente simul semel aspicere daretur. Facies autem maxime, & pene continuo sædata est. Cui addendum, quod æstus corporis universalis, pruritus, & ex eo spirituum inquietudo, ægrum, molli teneque constitutione præditum, supra quam dici potest, excruciat. *Impetigo* sanguinis missione, purgantibus cum calomel. sæpius iteratis, & *Antimoniatis*, est curatus.

Verbo dicam: ex quo *Arthritis* idonea, & regularis, ægrum deseruit; affectu hoc, vel illo, raro autem mitiori, & minus periculoso, annis fere singulis, urgebatur, sæpe tantum non opprimebatur.

Ex *Impetigine*, mutata rerum facies; namque, anno post uno, vel altero, redux *Arthritis* (tanquam ex postliminio) paroxysmos ei τοῖς ἑξῆς, aptos & satis crebros, agitavit. Nihil opportunius, nihil commodius esse potuit: nam *Arthritidis* denuo regularis ope, servatus æger, per extremum vitæ decennium multo magis, quam solebat esse immunis, non tam morbis, quam ætate fractus, e medio excessit.

Hic animadvertendum (quod quidem maximi, in re præsentis, grande pondus argumenti) ægrum, quo tempore siue *Asthma*, siue *Tumor Hæmorrhoidum*, siue *Vertigo*, siue *Pleuritis*, siue *Angina*, siue *Impetigo* locum habuit, *Articulis* nunquam doluisse, nec quidem, in istorum morborum intervallis, ita crebro, aut tam graviter, atque ante *Asthma*: unde verissimile, hos effectus, aliqua saltem ex parte, per materiam *Arthriticam*, (in pulmone *Asthma*, & singulos affectus in singulis eorum locis facientem) excitari. Cujus enunciati fides eo confirmatur, quod in *Arthritidem*, etsi minutam, & parvam, tum *Pleuritis*, tum etiam *Angina* semel; *Asthma* vero sæpius mutaretur. At, quod (testium mille instar) omnem argumenti metum adimat, hoc est; per *Arthritidem*, iterum recte, & debitis ex intervallis, edentem paroxysmo, tum *Asthmate*, tum *Impetigine*, ne dicam alios affectus omnes, ægrum liberari; difficillimique vitæ annis, supra quam spes, aut amicorum expectatio fuit, defendi.

Minime vero credendum, morbis hisce procreandis unam sufficere materiam omnibus *Arthriticam*; quin potius serosa sanguinis eluvie v. gr. in *Asthmate*, eam involvi, irretiri, & simul cum aliis sanguinis retrimentis, per *Pulmones* exterminari. Quod vero de *Asthmate* propositum, de *Impetigine*, cæterisque affectibus jam dictis, aliqua parte affirmari posse, cogitandum est.

Hinc opinari par est, ægrotantem illum, bono corporis habitu a natura donatum, vitæque ratione non adeo prava, aut ineptæ usum,

usum, in tot gravissimos affectus, forsitan non alia potius de causa, incidisse, quam quia *Arthriticum* miasma (quod *ἀρθριτικὸν* ex more usitato, & regulari minime, sic, ut debuit, expulsum fuit) in ea, quæ intus sunt, ferretur; ibique dictos, vel ex toto, vel ex parte, eaque nunc majori, nunc minori, faceret affectus.

Unde probabile, si, longo illo, multorum annorum spatio, (discessum inter reditumque rectæ, in artubus molestæ, & vehementis *Arthritidos*) quo tot tantisque modis æger afflictatus erat; habita *Arthritidos* ratione, fuisset ille tractatus, & in *Arthritide* reducenda, locata fuisset opera; medendi viam tutioram, ægroque multo fuisse commodiorem.

HISTORIA VI.

Asthmatis Vultum induens Arthritis.

Nonnumquam artus, ut ante dictum est, relinquit *Arthritis*, & ingressa *Respirationis Organa*, vel ea continenter urget, vel accessionibus adeo crebris, & molestis; ut, in illa corporis regione, non tam peregrinus, quam morbus indigena, & vernaculus esse videatur. Hujus rei exemplum hic subjiciam, mihi notissimum; virum medendi arte percelebrem, eamque hodie feliciter exercentem, fuit ille parentum altero, diu *Asthmatico*; altero *Phthisico* procreatus, brevem, & male formatum habens *Thoracem*, tanquam ad *Asthma* factus, *Pectoris* affectibus ab ipso ortu proclivis existimari potest.

Post adolescentiam floridam, sed & temperatam, ætate matura, laboravit *Arthritide*, crebro recurrente, satisque apta. Anni aliquot hunc in modum agebantur, cum a *Catarrho* spirandi difficultas *Arthritidi* succrevit, progressu temporis ingravescent. Huc non parum contulit aer, fumo carbonum, salinis (e vicino mari) vaporibus, & officinarum, quæ in propinquo erant, graveolentia repletus. Flante euro, vel euro aquilone, raro ille sine difficultate spiravit; ut vel ea de causa, (vento nimirum eo exorto) sæpe lecto se ejicere, & corpus erigere cogeretur. Eo durante vento, semper *Δυσπνοῖα*; cessante eo, vel in alium mutato; tanquam incantamento, levatus est. Cæna interdum obfuit immodica, & in victu error ferre omnis. Obfuit cutis, alias a frigore, alias ab aere nimis spisso, conspata, & impedita *Δυσπνοῖα*. Quin etiam *Asthma* nonnumquam intulit, ab equitatione, vel ambulatione, vel alia aliqua exercitatione nimia, fatigatio; uti etiam nonnumquam aeris, & planetarum ardor æstivus: unde spiritus animales, sive exhausti, sive debilitati, recipiendo pectori vix sufficerent. Sæpe a cruditatibus incepit *Asthma*: namque inde flatus; inde abdominis distentio; inde thoracis coarctatio, in spiritu trahendo; inde labor, & difficultas.

Sanguis huic ægroto, *Inflammationi* contrahendæ admodum pronus erat: sæpe in *Peripneumonia*, aliasque *Febres*, (nunc *Sudoribus*, nunc *Diarrhæa*, nunc *Urinæ profluvio* signatas) evehctus; semper autem pertenuis, quique minima de causa colliqueret; qui nunc per renes efflueret; *Pulmones* sero qui nunc obrueret, & spiritum elideret. Illud autem serum, post aliquam in *Pulmone* moram, vitreo sæpe colore exantlatum est.

Ingruente *Asthmatis* insultu, reliqua ejus symptomata antecedere solebat ventriculi inflatio, cum intestinorum vermiculatione, & dejectione postmodum insequente: magna *Pectoris* erat constriction; lateris præcipue dextri, subtus mamillam: ubi loci æger in omni *Asthmate*, potissime torquebatur.

In paroxysmo *Asthmatis* (quoniam unum idemque raro diu profuit) medicamenta in usum trahebantur varia. *Mixtura* nempe *Riveriana*, *Tabacci Fumus* *Tubo* haustus, *Empl. Epispasticum* *Dorso inter Omoplatas* admotum. *Ol. Amygd. d. cum Diacod. Potio Tee*, cum adjectis *Bals. Sulp. Therebinthinati* guttis aliquot: at omnium maxime, certissimeque, *Inflationem* mirum in modum cicuravit, compescuit potio *Coffee*.

Ad *Prophylaxin*, & adversus *Asthma* sui tutelam, æger, (auxilium ab exploratis fumens) *Eccoprotico* identidem adhibito, temporari cruditates exterminavit, itaque malum anticipavit. Profuit *Decoctum Corticis*, eo namque sanguini robur conciliatum. Profuit diætæ ratio accurata; cæna parca, vel nulla; loco cerevisiæ *Vinum Burdegale*nsis, aqua dilutum; profuere *Fonticuli*, dorso aperti. Id autem, ut recte concoqueret, & frigus evitaret, ægro præcipue curæ erat.

At, quod rem nostram maxime attingit, eamque non parum illustrat, ex quo tam gravi *Asthmate*, omni mense, ne dicam hebdomade, recidivo laboravit æger (id est, per decennium ultimo lapsum, & quod excurrit) rarius, minus ille doluit articulus: & quod in primis notandum, hujusmodi dolor, quoties occurrit, e vestigio *Asthmatis* insultum est secutus, eique connexus: ut, ab eadem causa communi, nempe *Arthritica*, non immerito fieri credatur uterque hic affectus; & quod *Asthmati*, natura tam *Arthritica*, per *Arthritidis* paroxysmum regularem, (modo vires aliaque ægri res annuerint) utiliter occurratur.

Huic quidem ægro persuasi, ut quo fieri posset artificio, præsertim *Marte*, & *Phenigmis*, a pectore longe arceretur, in extremas partes evocaretur *Arthritis*; ea nimirum opinione ductus, quo plus *Pedibus*, eo illum minus *Pulmone* laboraturum. Neque huic opinioni refragatus est æger; imo maxima ex parte consensit: istam autem medendi viam exclusit ægri constitutio tenera, *Phenigmorum*, aliorumque, quæ dolorem excitarent, usum non admittens. Quæ ad hanc rem adhiberentur omnia, *Pectori* ne obessent, *Asthma* ne inferrent, potius quam ut *Arthritida*, cavendum erat.

Ut autem *Historiæ* nobili finem imponam, habetis *Arthritidem*, dolore articularum, tumore certisque omnibus numeris absolutam, germanam, exquisitam; habetis, inquam, eam castra mutantem; pectus invadentem; idque sic afficientem, ut in *Asthma*, morbum illius regionis proprium, & vernaculum, mutari existimetur.

HISTORIA VII.

Ab Arthritide percussa, Pectoris externi Oppressio, Spiritus impediens.

Vir insignis, illustri domo natus, post adolescentiam opiparam, & non nimis siccam, sub ingressum juventutis *Arthritide* correptus est; eaque multos annos apta, & regulari laboravit. Pede doluit, cum, a frigore percussa, *Arthritis* sternon, & respi-

randi organa derepente invasit. Pectus hinc gravatum: impeditus spiritus: nulla vero expulso, nulla *Tussis* erat; ut in membranas musculosque, pectus ambientes, materiam impelli vitiosam, omnino judicemus.

Vomitu, quando illi proclivis erat, per *Decoctum Cardui* cicato, tametsi non multum ejecit, dilatavit tamen spiritum, & caput dolore affectum allevavit. Visum erat *Diaphoresi* materiam evocare; quem in finem *Epithemate* (ex *Aq. Regine Hungarie*, *Tinct. Lavendule*, *Spirit. Vol. Oleos.*) immersa linthea, *Pectori* applicantur; stragulisque simul pro rei necessitate adjectis, sudor elicitur exoptatissimus, utilissimus. Verum materia nondum penitus educita, sed interdum *Inguen*, nonnumquam *Oculos*, alias *Cervicem*, modo etiam *Genu* afficiente, ut magis regularem *Arthritida* facerem, & extremarum partium articulis infingerem, *Infusi amari* haustum, cum *Tinct. M. gutt. xx.* bis in die sumendum, imperavi: nec quidem frustra: paucorum etenim dierum spatio pes doluit: expulsa est *Arthritis*; ea, quæ intus, sunt liberata.

Alio tempore, cum a frigore pariter repelleretur *Arthritis*, ejusque materia una cum sero abrepta *Gravedinem* faceret; usu *Tincture Sulfuris*, (cujus beneficio materiæ inclinatio commodum mutata, & ad τὰ ἐξωδεν versa erat) æger convaluit.

CAPUT XI.

De Catharrho, Tussi, & Peripneumonia Arthritica.

Art. I. Quamvis hi affectus, quoties absoluti & legitimi reperiantur; propter diversos eorum vultus, & pathognomonica diversa, non immerito *Specie* distingui: proindeque non unius tituli esse judicentur: nihilominus has *Anomalias*, quando ab eadem causa, nempe *Arthritica*, idem *Subjectum*, nempe *Pulmonem*, afficiente producantur; propter hanc earum inter se convenientiam, & necessitudinem, una, non inepte hoc Capite, tractari fas est. Ut autem de illis clare, & perspicue dicam; primum, earum communia, quæ omnibus, vel minimum plerisque sunt; tunc, quibus illarum, quæ propria sint, edisseram.

II. Omnibus hoc commune est, illas tam cito nullos, unquam invadere, nullos æque male habere, & multare, ac quos sive gibbosos, sive graciles, sive *Pectore* nimis brevi, aut acuto, aliove quovis modo angusto, nec satis apto, natura fabricavit, aut etiam constitutione nimis tenera donavit. Si qui etiam *Ictu*, *Casu*, *Vociferatione*, vel *Exercitatione* aliqua vehementi injuriam *Pulmoni* intulerunt; vel a parentibus *Phthisicis*, aut *Asthmaticis* exorti, vel ipsi tales fuerunt. Hos, inquam, omnes *Arthritis* sæpe larvato vultu aggredditur; cumque ejus suspicio ne vel minima incidit, *Pulmonis* adytum intrando, membranas ejus corrodendo; tarde crebro, ac certo, perimit. His enim corporibus, *Pulmo læsus*, & debilitatus, alienum facile recipit; difficulter rejicit, itaque tandem acri, & viroso eo corrumpitur.

III. Hujusmodi corpora vexantur his *Anomaliis*. Utrum vero *Arthritis*, vel quonque ea, priusquam se Regularem ostentavit, & in *Artubus* unquam emicuit, *Pulmonem* afficiat; quoniam indicia non habemus manifesta, & fide digna, explicari nequit. Suspiciari vero licet, naturam, in iis, qui parentibus nati *Arthriticis*, una cum ipsa vitæ lampade miasma accepere; quoties illi, ætate prima & ineunte, *Achoribus*, *Catarrhis*, *Tussi*, aliisque hujusmodi malis supra modum urgeantur, (eos autem crebro sic urgeri, & morbis his alienum aliquod exterminari constat) miasma; a parentibus acceptum, in natorum sanguine retentum, ibique copiis adventitiis quotidie auctum, hisce morbis, aliqua ex parte ablegare. Hoc autem, utrum ita revera sit, an secus; ex natorum, & parentum malis simul comparatis, optime (tametsi, propter rei obscuritatem, non sine aliqua dubitatione) colligendum. Quare in *medicis*, uti dixi, *Suspicionibus* hoc habendum, eoque magis, quoniam, data positaque conjecturæ hujus veritate, medicinæ *Arthritidem* expellendæ reducendæque, ætate hac tenellula, omnium minime locus invenitur.

IV. Ad eas transeo *Anomalias*, quæ disquisitioni nostræ magis exponantur, & pateant. Postquam *Arthriticis* paroxysmos aliquot idoneos, & regulares sustulere, non raro accidit; maxime, si iidem corpora modo descripta habent, a paroxysmo sive interciso, nimis leni, vel raro, materiam in *Pulmonem* transferri νοσσην. In *Paroxysmo* interciso, vel abrupto, sæpe per *Emplastrum*, *Cataplasma*, *Frigus*, vel externum aliquod aliud istiusmodi repellens, ad τὰ ἐξωδεν retro agitur materia, cujus utique repulsioni statim superveniunt pectoris gravitas, & sactura, spirandi angustia, asperæ arteriæ titillatio, tussis, sputum primo tenue, postea crassius; quæ quidem accidentia, qua sunt proportionem, *Pulmones* affici, & in eos humidum impelli *Arthriticum*, aperte indicant. Hæc est *Arthritidos* in *Pulmonem* translatio, omnium maxime evidens & certissima.

Est autem ubi, *Paroxysmo* minime abscisso; verum, propter ejus sive lenitatem, sive raritatem, mala eadem oboriantur; & dubium magis reddant, sintne ipsa *Arthritica*, an non? Hoc autem dubium, *Arthritide* brevi post in *Paroxysmum regularem* erumpente, non raro eluitur: & ea, recte nunc demum agendo, sive nuper minus rectam fuisse confitetur. Ita ex *Arthritide* regulari præcedente, comitata, vel insequente, habes de istarum *Anomaliarum* natura prorsus *Arthritica*, quibus tuto possis acquiescere.

V. Porro, in hoc concordant hæc *Anomalie*, (uti cum iis cæteris fere omnes) quod sapissime seniores, interdum media ætate viros, at rarissime juvenes, quantum observatione constet, adorian- tur. Ut de meis loquar; ex hujusmodi laborantium numero, quem vidi, non exiguo, unum tantummodo adolescentem inveni; alios omnes aut ætate grandi, aut saltem matura, ac constanti.

Hujus rei causa minime obscura est; quia, licet *Arthritide* nativa, & a parentibus ducta, ægrotantes, ipsa quidem adolescentia, nonnumquam pueritia, dolent; hoc in *Arthritide* acquisita non temere cernendum. Ebrietate, gula, malisque ea moribus acquiritur; atque ideo, ante medium vitæ, raro paroxysmos inchoat regulares; perraro *Ἀνωμαλίας*: in sexu vero muliebri, raro ante partus, & catamenia finita.

VI. Sputi ratio est habenda. Primo illud tenue, nec quidem multum esse solet; brevi post tempore copiosius; aliquando cum humorum tanto in *Pulmonem* flumine, quantum pectus aggraveret, *Pulmonem* infarciat, vocem obtundat, spiritus impediat, quodque, si diuturnum

num esse contigerit, ægri corpus attenuet, infirmet, & demum opprimat. Qua vero proportionem Sputum excreatur, eadem fere minuitur, in extremis partibus, *Arthritis*, sic, ut quo plus Sputi ejiciat ægrotans, eo minus *Articulis* afficiatur, Etsi vero istiusmodi Sputatio maxima ex parte salutaris (quoties nimirum non immodica, neque temere suppressa) esse reperiatur, in extrema tamen senectute, nimiam, & perniciosam, interdum novi, sic, ut ea multum æger enervaretur, & demum enecaretur. Hoc autem, ut opinor, rarissime occurrit.

VII. Nihil hos affectus esse *Arthriticos*, evidentius significat, quam unum illud, quod sint omnes *Arthritidi inversa* ratione, quæ paroxysmum vel regularem, vel interruptum excipiant, vel absentem introducant, vel deficientem suppleant, & quidem ita, ut quo minor, rarioreve ille, eo hi majores, ut ex imminuta *Arthritide* externa, pro affectuum horum acrimonia & importunitate, internos hos affectus *Arthritica* origine esse constet; & a miasmate *Arthritico* pulmonem ineunte, Tussim, vel *Peripneumoniam* excitari.

VIII. De *Anomaliis* hisce singularem sumptis jam proxime dicendum; & quidem, primo de Tussi observandum, illam harum omnium esse frequentissimam, quæque paroxysmum *Arthritidis* regularem usitatissime insequatur, raro autem comitetur, nisi ægroto valde *Arthritico* pulmonem admodum imbecillum habente; hujusmodi ego *Arthriticos*, nimirum *Phthisicos*, ægrotantes, uno eodemque tempore tussientes, & dolentes, aliquando inveni. Tussis hæc *Arthritica* nonnunquam in paroxysmum regularem, (materia in artus translata) suapte sponte definit; promptissime vero, si *Cathartico* non nimis leni, sed sanguinem miscente, & turbante, fuerit adjuta.

De Tussi porro aliud notavi, silentio minime prætereundum: nempe, in nonnullis *Arthriticis* paroxysmum eam omnem antecedere; ægrum, dies quatuor, vel quinque exagitare; inter accessionis symptomata prænuncia jure merito censeri; cumque ea Sputi multum ejiciatur; (aliquando permultum ejici exploratum habui) una cum eo miasmatis partem aliquam *Arthritici*, per *Anacatharsin*, quod probabile videtur, expelli.

IX. Hujus generis *Catarrhos*, uti semper *Asthma* comitatur; ita interdum *Hæmoptoe*: Immensa feri copia spiritus viæ occluduntur, unde *Asthma*; & in eodem fero demum exantlando, quia Pulmo (simul cum universa *Pectoris* compagine) concutitur, rapide convellitur, ipsumque serum, acre & mordax, vascula exedit; ab ista agitatione, acrimonia, fit interdum *Hæmoptoe*. Quæ tametsi ægro terribilis, horroremque ei, forsitan alias meticulofo, incuriat; minime tamen pertimescenda, tanquam pessimi prorsus ominis, modo *Pulmones*, a natura *εὐνοιοι*, nulla evidenti causa læsi, & curatio matura, & apta fuerit instituta.

X. Hæ Tusses sæpe, & interdum hi *Catarrhi* ex intervallo aliquo revertuntur, quando nimirum miasma, (ut est semper nascens) in sanguine renovatum, ac cumulatam, *Pulmoni* infigatur. Accessionibus his in primis faver autumnus, qui, cum illud tempus fit, in quo, ad τὸ παροξύνειν & miasma emittendum, moveri solet *Arthritis*, & in quo *Catarrhi*, & Tusses grassentur exquisitæ; quidni hisce nostris favere judicetur. Unum autem hisce omnibus inesse, & quidem magnopere ad eas contribuere censeo, nempe *Pulmonum* a natura imbecillitatem, & *Αἰτίαν*: unde ii, *Arthritico* miasmati, (quandocumque fuerit in sanguine congestum, & expulsionis aptum) pectus adeunti, in se recipiendo, arteque complectendo, perpetuo sunt parati.

XI. Tussientibus his *Febricula* seu nulla, sive lenis esse reperitur; sin eos algere, aut cardiacis nimium indulgere contigerit, (unde *Febris* sive accendatur, sive augeatur) *Peripneumoniam* est quod timeas. Quacumque vero de causa initium capiat hic affectus, signa eum ostendentia, quæ οὐδὲν πολὺ constituent παροξυσμὸν, plane sunt eadem, ac in *Peripneumonia* vulgari, & absoluta, & utrum affectus hic *Arthriticus* sit, an vero minime (nisi forte dolor *Articularis* simul occurrat, extraque dubium rem ponat) ex ejus *Historia* tantummodo petendum est. Quoties autem *Arthriticus* esse apparebit, hujus rei in eo curando rationem aliquam haberi, oportebit.

XII. *Anomaliis* hisce medendi indicatio generalis, eo, quod alienum est, citissime tutissimeque *Pulmonem* liberat: illud autem in diversis his affectibus, modo non uno perficiendum. In iis omnibus *Venæ sectio* prodest, ubi nihil adversatur; in teneris, & debilibus, vix unquam administranda; in morbis, & ætate fractis, ne vix unquam. *Hæmoptoe*, & *Peripneumonia* laborantibus est aptissima; præcipue *Peripneumonia*, qui omnia *Venæ sectione* raro curantur. Ubicumque vero instituta fuerit, caute & provide cavendus est; ut, *Arthritidi* postmodum in artus expellendæ fugandæque, natura ne reddatur impar.

Proximo loco de *Purgatione* cogitandum: ea etiam omnibus hisce malis occurrit, & probabilis videtur, ubi vires ægri consentiunt, maxime vero, ubi corpus cassum, & plenum; aut intestina sunt immunda, & nulla fuit *Venæ sectio*. Illa vero *Purgantia* jure merito præferenda; quæ sanguinem exagitando, & turbando, ad *Arthritida* movendam conferant: de quibus iterum, & sæpius alibi.

Præmissis his, ad ea descendimus, quæ *Arthritidi*, hospitio novo, & inepto, (*Pulmone* scilicet) excitandæ, & foras ejiciendæ faciant. His adjungi, & cum iis simul componi juvat illa, quæ, *Pulmoni* dicata, ei, sive per *Anacatharsin*, sive alio quovis modo inserviant. En horum exempla.

24. Alcohol. M. Balsam. Capivi ana Ὀβ. Conf. Fruct. Cynosbat. ʒi. Syr. Cap. Ven. q. f. f. Bolus.

24. Flor. Sulf. (vel Benzoin.) Chal. prædicti ana Ὀβ. G. Ammon. soluti q. f. f. Pil.

In Tussi, vel *Catarrho Arthritico*, (modo nulla *Febris* suspicio fuerit,) sumatur Bolus, vel ex Syr. Balsamici choel. j. Pil. bis in die, cum Decocti *Pectoralis* haustu; quem quidem Syrupum, velejusmodi alique; alias sæpius in die lambat: alias, forma liquida siquidem arridet, iisdem temporibus propinetur Haustus.

24. Syr. Tussilag. (vel Cap. ven.) ʒβ. Tinct. Sulf. gutt. ii. quibus probe mixtis adde Pul. Olib. Chal. N. ana Ὀβ. Aq. Hyssop. ʒiiss. f. haustus.

Loco Tinct. Sulf. Balsamum ejus Anisatum, vel Terebinthinatum, Balsamum Capivi, Gileadense, Chiliense, vel Peruvianum certis suis dosibus adhibeantur.

Quando malum inveteravit, ad prohibendam sanguinis colliqua-

tionem Decoctum Corticis aliquoties præscripsi, in ægroti emolumentum non mediocre.

Tussienti profunt Throch. Nigri Londinenses, Ecligmata, & ad Sputum educendum, Tussim mitigandam, quæcumque tuto faciant *Arteriaca*.

Cum remediis internis dies tres, vel quatuor impertiveris; unde roboretur sanguis, & ad τὸ Παροξύνειν extimuletur; si nulla in articulis apparebit *Arthritis*, applicetur extra, parti creberrime dolenti, Empl. Cephalicum, per se, aut cum picis Burgund. quantitate æquali, vel Ceratum viride. Sin ista, nimis imbecillia, materiam non movebunt, & ex eorum usu nulla Pulmoni fiet utilitas; validioribus opus erit auxiliis, & majori mole pugnandum. Hoc casu Phanigmi, Vesicantia, Setacea possunt usurpari. Eo autem modo in eorum usu, progredi juvabit; ut a mitioribus semper incipias, neque nisi illa fuerint, ad severiora ascendas: cumque severioribus uti necessum erit, non nisi naturæ permisso, & sic, ut ejus vires pati possunt, intentandum.

XIII. Hac methodo, in his affectibus, Pulmoni, ut opinor, optime prospicitur; maxime, si tutelæ gratia, in dorso Fonticulos aperiat, sique aere sicco, & ventis agitato utatur æger, sique eo omnia dirigat, ut recta perstet *Arthritis*, & ex intervallis debitis recurret.

Hisce vero prætermisiss, aut otiose, & negligentè actis, Tussis ingravescit, corpus non alitur, nullus in eorum, quæ decedunt, locum subeuntibus, succedit Macies: pituita, quæ principio tenuis erat, jam crassior fit, excreatuque difficilior, & interdum cruenta. Exulceratio fit Pulmonum, unde, tanquam exquisita φθίσις, oppressus æger, e medio excedit.

XIV. In *Peripneumonia* vero *Arthritica*, rapidiori gyro versatur res. Inter initia, morbo protinus occurrendum; alias sane non facile vincendo. Sanguinem cito detrahi, Enema post horas aliquot immittere. Purgationem die postero institui, oportebit. Linctus ex Oleo Amygd. d. vel oleo Lim, omni fere hora delingendus. Vitanda sunt Emulsa, & Decocta nimis frigida; sique apparebit in artuum aliquo *Arthritis*, vel, eam educi posse, spes erit; per eam educentia consulendum est ægroto. Hoc enim perpetuo ratum esse arbitror, *Peripneumoniam*, ex *Arthritide* inversa, & in febrem adaucta, natam, ejusdem *Arthritidis* expulsionem, & in artus amandationem, & in viam reductionem (modo hoc effectum reddere licebit) commodissime posse removeri.

XV. Non ignoro Clarissimum Sydenhamum, Medicum ἰσόθεον, de sanandis his affectibus aliter scripsisse, nimirum, metastasi materiæ vitiosæ facta in Pulmonum lobos, intentionem medendi non ad ipsam Podagram esse dirigendam; verum, (hoc symptoma, pari modo tractandum, quo peripneumonia absoluta; venæ sectione scilicet repetita, cum Diæta, & remediis refrigerantibus, ac incrassantibus; Purgandum insuper ægrum, inter venæ sectiones, idque potionibus lenientibus: Sudorem autem obesse, materiam pulmonibus impactam indurando; unde generantur abscessuli, & tandem ægri mors certissime subsequitur.) At ego per Ὑγίειαν, per Ἔσκαλιον, per ipsius Sydenhami manes, oro obsecroque; quænam Morborum Venenosorum (cujusmodi sunt hi omnes) curatio probabilior, quam per ipsius Veneni e corpore, vel in artus, in partes a centro vitæ remotas, & minus nobiles, expulsionem? Annon natio Medicorum omnis, ipseque alias Sydenhamus ἀντιρρῖνδεν, quoties ingravescat, & in orgasmum evehatur, exterminari, exturbari, ejicique jubet? Annon hoc ipsum naturæ opus, eique ministerio, & auxilio, medicorum esse, prædicatum est. Hisce vero, tanquam basi & fundamento, positis, quæ (secundo loco) medicina hanc alieni expulsionem magis promovere possit; ea, videlicet, quæ Venæ sectiones repetitas; quæ Diætam, & Remedia refrigerantia; quæque Cathartica blanda, & lenientia, (quæ quidem omnia, sanguinem deprimitendo, Venenum in eo retinere faciant) spretis interea, neglectisque Diaphoreticis, *Arthritidem* expellentibus, comprehendat: An, e contrario, quæ ex remediis calidioribus, venenum, ad naturæ votum, & propositum, in artus tuto extrudentibus; quæque ex Venæ sectione & Purgatione, ad hoc opus accommodatis; quæque auxiliis, extra admotis, *Arthritidem* evocantibus, sit composita? Si a Febre, medicamentis calidis ne inferatur, erit periculum; hoc ut devitetur, missione sanguinis sufficienti, & calidorum usu non nimio cavendum est, sed neque rei ullius, propter ejus, qui incidere possit, abusum; speranda protinus utilitas; præsertim ubi magna, & humano generi salutaris. Altera vero ex parte Veneno retento, licet depresso; quam exulante, & amoto, tum commodi minus, tum periculi plus, oriri certum est: itaque esse, non suadet opinio temere suscepta, sed cogit experientia, non sublesta fidei, verum iterata, firma, & (uti mihi videtur) rationi consona.

HISTORIA I.

Tussis Arthritica.

Um hæc in manibus sunt, memet interea consulit e propinquo quidam, humili loco natus, annos circa quinquaginta, pectus aggravatum, vocem impeditam, & Tussim habens mediæ ætate molestissimam. Screatu ille multum ejecit, Tussis exantlavit; non nihil elanguit; febricitavit. Erat, quod Tussim, quam magnam, quam diutinam, qua tempestat non minus congruentem, ingenio & natura esse singulari, submonere videretur.

Quæ per anum materiam e sanguine leniter educerent, ex usu medico remedia præscripsi: quibus fumendis, postquam æger dies aliquot, tam utiliter, quam sedulo, incubuerat; novum ecce malum, impropitum, inopinatum est exortum; Genu nimirum dextri Dolor, Cumque didicerim, Pedibus illum antea, more prorsus *Arthritico*, doluisse; per annum autem integrum, & quod excurrit, minime; dolorem hunc *Arthritidis*, sese in Paroxysmum efferentis, indicium esse existimaui. Cum brevem eum, medicorem, neque satis acutum observaverim, partim materiæ per annum, partim per Pulmonem ejici, Tussimque illam revera *Arthriticam* esse, judicavi.

HISTORIA II.

Tussis Paroxysmi Arthritici Symptoma prænunciam.

Senex perhonorificus, morum suavitate, animique integritate clarus, cum de varia, & multiformi *Arthritidis* natura, sermones una

una fecerimus; de sua, qua triginta jam annis per vices ægrotaverat, sciscitanti mihi confirmavit, se febricula, per omnem fere juventutem, quotannis fuisse, deinde vero rheumatismo, affectum; cum hoc eventu minime reticendo, quod, ex quo hic primum apparuit, illa plane desierit, neque semel unquam ægrotantem ex eo tempore invaserit.

Rheumatismo ut mederetur, hortatu Medici, per totam Angliam tum temporis, celeberrimi, *Diaphoretica* sumpsit, iisque affatim assumptis, quæ per artus hic illic sparsa erat materia, jam articulis affixa est, & vulgi quidem opinione æger *Ποδάγεια*. Eo more *Paroxysmus* erat, ut *articulari* (digitorum maxime) *Dolore tumoreque*, noctis unius spatio, excitatis, se ostendere; & omni vere, & autumno, multos annos reverteretur. Quod vero memoria dignissimum, *Paroxysmum* omnem prævit *Tussis* importuna, vehemens, molesta, qua, dies quatuor, vel quinque, ægrotum exagitante, multum ille tussiendo semper eiecit, & una cum pituita (quod quidem verisimile) miasmatis *Arthritici* partem. Cetera vero, quantum ab ægroto accepi, *Arthritis* se recte gessit.

HISTORIA III.

Sputatio Arthritica, in extrema ætate nimia.

TAbernarius quidem in vicino oppidulo, per ætatem mediam & constantem, *Arthritide* doluit recta, & idonea, grandior autem, inversa & *Anomala*. Nunc *Ventriculum* ea, nunc *Pulmonem* est ingressa; illi *Ἀνορέξια*, *Δυσπεψία*, nauseam inducens, huic, *Tussim*. Erat *Tussis* admodum molesta; pituitæ tantum movens, quantum ægrotum ætate provectum debilitaret, alimento privaret, macilentum redderet: qua vero ratione gliscebatur in visceribus *Arthritis*, in extremis partibus ea remisit, & quidem e vestigio; sic, ut de materiæ, ad *τὴν ἐξοὶν* a *τῆς ἐξω*, translatione, & de his affectibus, ab eadem causa communi oriundis, nihil omnino dubitandum. E *Corrice*, *Marte*, & *Sulfure* præparatis, varia præcipiebantur, una cum incrassantibus, & sanguinem roborantibus: eo videlicet, ut in artus expelleretur *Arthritis*, itaque defenderetur *Pulmo*, natura autem visibus deficiente, (*πρῶτον μετὰ πάντων δὲ ψύσις*) frustra erant omnia, Medicamenta, utut probabilia, sexagenario, annis & tristitia fracto, parum profuere. Sputatione nimia, virium imbecillitate, animi mœrore, propter res domesticas depressum, & medicamenta vix sentientem, Mors abstulit, ultima morborum *Medicina*.

HISTORIA IV.

Anacatharsis Arthritica Salutaris.

INeunte sæculo supra millesimum septingentesimo, ad presbyterum *Exoniensem* accessit, qui eo tempore quadragenarius, constitutione tenerima, & iam annos septem *Arthriticus* fuit. *Paroxysmo* dudum gravissimo affectus est, manus, pedes, genu alterum obsidente, eoque adhuc consistente, nox apparuit *Catarrhus*, nares, os, pulmonem, more pene *ferino*, obruens. Hinc *pectoris* farsitura, spiritus difficultas, *Tussis*, sputum primo tenue, postea crassum & copiosum, & imo pectore, magnoque cum molimine eductum. Quemadmodum illud *σπυδρῶν* (*Sputum volo*) increvit, ad eundem plane modum & rariorem, signa pure *Arthritica* (id est, *Dolor* & *Tumor Articularis*) sunt minuta. U: *Arthriticum* miasma aliqua ex parte per *Anacatharsin* expelli, compertum habetur.

Ad *Tussim* mitigandam, & *Sputum* simul movendum, *Syrupum Balsamicum* & de *Meconio*, sæpius in dies lambendos, & *Pil.* hora somni, sed modica quantitate, *Stryacinas* dedi: Quod humorum nimiam inhiberet *Colliquationem*, & ab ea sanguinem tueretur, *Decoctum Corticis* iisdem *Syrupis* dulcatum, imperavi: quæ cum fructu, & emolumento non mediocri adhibeantur.

Biennio post, ab una eademque causa evidenti, nempe frigore, & *Articulis*, & *Tussi* laboravit æger; eoque procul dubio magis, quoniam, cum autumnus esset, ille sanguini depurgando non parum faveret, is erat *dolor Arthriticus*, quo nunquam huic *Arthritico* major, nunquam acerbior; ea vero *Tussis*, quæ, sputatione multa, & pituita larga vi emissa, dolore penitus absconderet, ejusque causam, per *Anacatharsin*, amoliretur. Cujus rei veritas vel hinc eliciatur, quod doloris interruptio *Sputum* repente sequeretur, & pari passu comitaretur. Hujus *Sputi* movendi citandique gratia, *Opobalsamum*, ex *Syrupo Balsamico* sæpius in die, non sine fructu, datum est. Omnia denique sic comparata sunt, ut *Arthritidi*, per *Pulmones* fugam molienti, via patefieret. Ex sententia res successit.

HISTORIA V.

Peripneumonia Arthritica.

MAtrona lectissima, sanctissima, majores habens inter Aborigines *Damnonios*, stirpe tan nobili dignissima, *Pectore* a natura brevi donata, nonnullis ejus affectibus, ea de causa proclivis esse visa est. Quæ, ab ipso vitæ initio, *Pulmonem* illius ingredi, *Tussimque* facere sueta fuit pituita, crassior jam, & ætate progredientem ægram, magis aggravavit. Hinc *Tussis* illi, per ætatem omnem mediam, permolesta; hinc *Dispnoea* fere perpetua.

Vitæ annum circiter quinquagesimum, cessante *Tussi*, locum ejus supplevit *Dolor Artuum* erraticus: Tumuerunt digiti, doluerunt articuli, præsertim *Genus*, & *Carpi*; qui interdum tumore, sed in omni *paroxysmo* dolore sunt affecti. Ruboris, splendoris interea nihil unquam est visum.

Cum materia crebro *Subjectum* mutaverit, nunc quæ extra, nunc quæ intus sunt, obsidens; frequenti observatione palam factum est, ea foras erumpente, & in *Artibus* subsistente, *Pulmones* esse tutos, *Respirationem* integram: contra, intus agente materia, immunes esse artus. *Tussienti* nihil magis profuit, quam *Trochisci nigri Londinenses*, & istiusmodi pharmaca pituitam educunt. Potioni fuit pomaceum, cerevisia longe commodius. Nihil algore pejus, hoc enim spiritus brevi impeditus, ægra pene strangulata.

Cum iter hinc in locum, carbonibus & fumo celebrem, facere decreverat; *Plethoricæ*, *Tussienti Asthmaticæque* suasi, ut, priusquam inciperet, sanguinem detrahendo; ventrem inanendo, *Spu-*

tum movendo, materiam in artus vitiosam expellendo, itineri (quando hyems erat) inauspicato, civitati *Tussientibus* infestæ, se quodammodo paratam redderet. Prætermisiss autem hisce, *Tussis* itinere adaucta est, fumo spiritus impeditus, ut, accedente ad hæc febre, (Medico longe nobilissimo frustra vocato) vita paucis post diebus cederet.

Per *Tussim* veterem & humidam, id, quod alienum erat, naturam exterminasse; sicque articulis pepercisse, non improbabile est: per abruptum *Articularem* morbum, ejusque materiam *Pulmonibus* impactam, fieri *Peripneumoniam*, interfici ægrotantem, manifestum est.

HISTORIA VI.

Catarrhus, Asthma, Tussis Arthritica, per Humorem in Artus Ἀρτρίτιν, & deinde Evacuationem, mitigata, sublata.

ABhinc annos tres vel quatuor, forte mihi obvenit hujusce Tiruli Historia, nisi fallor, observatu memoratuque digna. Erat in suburbiis *Totonesii*, de meliore nota, vir, olim athleticus, valentissimus, corpore quadrato, constitutione firma, senectutem eo tempore ingressurus: qui septem annis algere, & levi quavis ex *πρῶτῳ* tussire solitus, hunc in modum sæpe graviter afflictus est. Frigore quod *Tussim* & algorem creberrime præcurrit, interdum etiam effectum est; ut per artus dolor incertus, & erraticus pervaderet; ut internodia, sive articulorum intervalla, magnopere pungeret, ac si esset rheumaticus, ut aliquando *Articulos* (præsertim *Humerum*, & *Coxendicem*) morderet: cum dolore tumor. Rubor etiam interdum *articularis* erat, ut de mali natura nulla restaret dubitatio.

Olim hic illi valetudinis status erat: nuper autem, interciso, nescio qua de causa, in extremis partibus dolore, tanto in *Pulmonem* impetu & copia, morbi infusa est materia, quanto raro advertatur. Seri vi immensa pectus aggravatum est; tussit æger indefinenter; & quidem enixe. Non nisi difficillime spiravit, neque nisi erecta cervice. Sæpe tussienti deliquit animus, neque spiritus, (cogitandi munus exercentes,) agitati jam & profligati, pristinum ordinem cito recuperarunt. Sputum modo tenue, & salium; modo sanguine, ex tussis importunitate, interspersum. Facies pallidior, corpus attenuatum.

A quo tam mire affectum est *Pectus*, id est, per menses duos; vel tres novissimos, nullus in extremis partibus (qui tamen alias creber esse consueverat) *Dolor*: nullæ querelæ. Quibus omnibus recte ponderatis; uti etiam quod a patre, post homines natos, maxime *Arthritico*, gigneretur æger; ea fui sententia, non alium esse morbum, quam *Arthritida* vetustam, membra olim *ἰσθῶς* nunc *Pulmonem* *ἀναγκάζω*; excruciantem; neque facilius expeditivse posse illam removeri, quam ejus materiam, *Pulmonem* occupantem, in membra, sedem illi propriam, quæquæ possit arte, expellendo reducendoque.

Ita mecum arbitratus, post *Vene sectionem*, utrique malleolo *Phænignum* (ex *Fermenti veteris* part. iv. *Seminum Sinapios*, *Fimi Columbini*, *Raf. Radiculæ*, *Cacum. Rutæ* ana p. i. *Aceti Vini albi* q. f.) calidissimum applicui, frigidum usque renovavi, donec tumor utriusque pedis est exortus. Tumori hic illic facto, vel quam proxime eum, admovi *Epispasticum*. Hæc, ut *Arthritis* evocaretur, ut autem expelleretur, eodem tempore *Ποδάγρυγος* præscripti.

4. *Pul. Gascon.* ʒʒ. *Ther. Androm.* ʒi. *Bals. Per. gutt.* v. *Conf. Alk. q. f. f. Bolus, vespere sumendus cum Julapii Haustu.* Interdum vero, loco *Theriac. Chel.* N. ʒʒ. cum prædictis, forma pilulari, ex *Syr. Balsam. cochleari.* Pro potu ordinario *Decoctum Pectorale*, ex *Rad. Helenii Cond.* ʒʒ. *Eryng. C.* ʒi. *Raf. C. C. Eb. ana* ʒiii. *Balsam. Tolut.* ʒii. *Sem. Coriandi* ʒii. *Aq. Hordeat.* ʒiii. ad ii. *incōctis.* Ad *Tussim* mitigandam *Eclegma datum est*, (ex *Syr. Balsam. de Mecon. ana* ʒiʒ. *Tinct. Aurant.* ʒii.) sæpius usurpandum. De *Tussi* caveret, monui; ut ab ejus acrimonia ne *Pulmo* laderetur; ideoque *Bechicis* sæpe uteretur.

Hisce positis, & jura meo præceptis, medendi viæ ægrotum commisi; ea spe plenus, si *Pulmones* adhuc integri & sani essent, si que ad *τὴν ἐξοὶν* humor transferretur, servari posse restituique ægrotantem, si aliter res fuerit, occubiturum.

Dolori, siti, & languori, a *Phænignorum* usu ortis, propriis remediis; *Paregorico* leni, *Decocto* sitim extinguenti, & *Julapio Cardiaco* medetur.

Phænignorum ope tumor factus est utriusque pedis, ad usque suras, egregius, immensus. *Vesicantibus* feri non parum elicitum est. Quod vero maxime auspicatum, & omnis erat optatissimi; qua serum elicitum est, ea penitus proportionem mitigata *Tussis*; ea restitutum est *Pectus*. Qua de causa *Vesicantium* ulceribus, cito nimium exsiccatis, (ut, quod inesset tumoribus feri penitus educeretur) in utraque sura *Setaceum* meo consilio factum est. Hinc jure feri flumen: quicquid ab *Epispasticis* defectum, hinc suppletum est.

His auxiliis, extra, intus, simul semelque adhibitis, factum est; ut a *Tussi*, ab *Asthmate*, a pectoris gravitate, ceteroque ejus malo omni liberaretur æger: eorum autem loco subortus est *Humori Dolor* plane *Arthriticus*; iisque, si consideremus serum nuper evacuatam, satis acutus.

At quia longa morbi obsidione *Pulmones* enervatos, & debilitatos esse jam liqueret; propterea (tutelæ gratia) quando *Setacea* serum emittere jam finierant; utroque spinæ latere, inter omoplasas, aperiri *Fonticulum*, magno certe ægri cum emolumento, iussi, & *Hydragogum* aliquoties adhiberi.

Hac ille medicina, morbo certe ancipiti, & periculoso liberatus, habitum & colorem brevi tempore bonum obtinuit, omnino convaleuit; neque sublesta fide testabatur, *Rheumatismum* illum veterem, quo per annos aliquotum multos se gravari æger opinatus erat, *Arthritidem* revera esse erraticam; nec non illum *Pectoris* affectum, istius esse *Arthritidos Ἀναγκάζων*. Sic opinari suadet Historia morbi; sic curatio.

CAPUT XII.

De Phthisi Arthritica.

Art. I. **A**ffectuum in pulmone *Arthriticorum* proximus, longeque periculosissimus est *Phthisis*: quæ, ut permulta habet cum absoluta *Phthisi* communia; (ita quidem propria, sive causam ejus continentem, sive medendi methodum intueamur) tam multa, imo

momentique tam magni habet, ut eam præterire nefas æstimetur. Hujus autem morbi hæc conditio esse solet.

II. *Arthriticus*, ex materia vitiosa, vel per causam aliquam externam in *Pulmonem* percussa, vel per ejus imbecillitatem affecta, acceptaque; primum, pectoris gravitate, *Dyspnæa*, & raucedine corripitur: deinde, sputum excreatur; quod, initio tenue, paulatim crassescit. Progressu temporis, caro flaccescit, simili fere proportionem, qua crassum id ejicitur, & paulatim absumitur; vires enervantur. Interea vero dum ista fiunt, nullus in extremis partibus tumor, dolor nullus articularis; aut si ullus acciderit, parvus, & brevis spatii, apparet. Crescit autem faciei pallor, & corporis universi macies; & comitem, (propter vasa, frequenti, & violenta *Tussi* exagitata, & disrupta,) interdum nanciscuntur *Hæmoptoe*. Demum, calor hæcticus exoritur, cum pulsu celeri, cute arida, præsertim vespere; quibus mane succedunt sudores symptomatice. Atque ita æger, tussis pertinaci, sputatione multa, sudore colliquante, *Diarrhæa* impatibili, nec quavis arte diu sistenda, vel (si non sit *Diarrhæa*) tumore pedum aggravatus; & tanquam exquisita *Phthisi*, certe ei simillima, oppressus, cum morte, ærumnarum requie, vitam inferrimam commutat.

III. Et si vero ultimum hujus *Phthiseos* stadium, ab exquisita ultimo; (tanta earum inter se convenientia est) vix potest inter nosci, aut signis diacriticis distingui: duo sunt, in ejus stadiis prioribus, (incremento nempe, & statu) quæ *Phthisi* exquisita raro convenient, aut de ea dici mereantur.

Unum est, quod, aliter quam *Phthisis* exquisita, quæ adolescentum; aut juvenum morbus esse, neque alia, quam firmissima ætate, facile reperitur, hæc nostra *Phthisis*, e contrario, adolescentes raro aggreditur; sæpius autem constantes, & interdum (quod de *Exquisita* nondum videre licuit) viros natu grandiores, mulieres autem maturius, propter naturæ privilegia, (partus sc. & catamenia; quæ tum *Arthritida*, tum *Phthisin* arcent) maturius cessare solita.

Alterum, quod *Calor Hæcticus* (qui in *Phthiseos* exquisita statu, & initio, gravis esse solet, reliquaque interdum symptomata præcurrit omnia) serius in *Phthisi* *Arthritica*; nec quidem usitate ante sputum largiter excreatum, corpusque eo debilitatum, oritur. Cujus quidem *quædam* ratio partim ex jam dictis (hunc affectum non nisi annosiores, id est, sanguine frigidiori præditos, invadere) eliciendum partim ex eo, quod *Arthriticorum*, siquidem juniores fuerint, sanguis, propter frequentes *Arthritidis* paroxysmos, neque temere incendatur, nec quidem incensus adeo exæstuet: Et quidem *Phthisis* *Arthritica* lenta esse solet, neque multa *Febre Hæctica*, nisi ultimo vertente stadio, comitata.

IV. Prædicto fere modo res agitur, quoties in *Pulmonem*, a natura debilem, miasma *Arthriticum*, gravi aliqua urgente causa externa, impellatur; aliave quavis ei infigatur, neque medicina satis efficaci, vel satis opportuna, removeatur.

Interdum autem ad *Pectus*, non adeo recta itur; verum, a *vis* *æthæra*, ad *res cædov*, & retro, variæ sunt itiones, & rediciones; eaque, non nisi annorum aliquot spatio, præactæ; donec denique, post *Tusses* varias, graves, & importunas, succedit *Phthisis*, absolutæ similis, *Arthritica*. At, ubi *Pulmonis* *σπορία* est, & medicina temporis fuit adhibita; materiæ vitiosæ partim in artus exturbatur, scilicet partim ejicitur; *Pulmones*, crebris insultibus debilitati, sanantur: æger & colorem, & robur pristinum acquirit. Quibus autem modis hæc præstari possint, statim exponetur.

V. Ex supra dictis (ut opinor) liquet, nullo modo hujus morbi indolem, & ingenium, posse magis patefieri, quam per ejus *Γενελογίαν*. Quæ enim dixi, illi propria, quando neque semper, neque soli competant: atque adeo fidei non spectatissimæ perpetuæque, verum e diverso dubiæ, sint habenda, ut de morbi hujus ingenio constet, quæ illi cum *Arthritide* necessitudo; quæ conjunctio: quam illa prope *Paroxysmum* excipiat, utrum e vestigio, an e longinquo; utrum, & qua de causa, interitum, an vero deficientem suppleat, & ejus vicem gerat, pro ejus declinatione, increscens: Ne plura, utrum ejus ratio, *Arthritidi* rectæ sit, & quatenus sit, inversa, sedulo quærendum est.

VI. Curatio postulat ut levetur; ut hoste infestissimo, quam citissime, liberetur *Pulmo*: id autem modis alio alioque tempore diversis, & quam in *Arthritica* *Tussi* aliis, elaborandum est.

In principio morbi, uti *Tussis* urget, & tantum in propinquo *σπίσις* est; multum a *Phlebotome* & *Catharsi* rite factis, expectare licet. Hisce potest fieri, ut e corpore exturbetur, vel minimum ut e *Pulmone* eruatur id, quod alienum. At quia non semper hoc effectum est, nec evacuationibus illis commode confiditur; ita illæ fiant, oportet, ut *Paroxysmi* regularis excitandi habeatur ratio; id est, intra modum: ne natura nimium debilitetur, & expellenda *Arthritidi* impar reddatur.

Post sanguinis detractionem, & alvi ductionem; alteram nempe, vel utranque, vel, ubi inutiles censebuntur, iis omisiss, ad alia confugiendum, bechicis, & *ποδαγραγωγοίς* utendum: His, ad materiæ in artus expulsionem; illis, ad expuitionem. Hos in fines *Lithus* (ex *Ol. Amygd. dul. rec.* vel *Ol. e Seminibus Lini*, & *Syrupo Balsamico*, vel de *Præssio*, vel de *Rapo*, aliave quovis *Sputum move*nte) componendus; & hora quaque altera, tertiave, ad cochlearum unum adhibendus. Atque ubi nulla febris indicia repugnant; *Pilula ex Pul. Gascon. Chal. N. Succo Glycyrr. Bals. Peruan. sexta*, vel *octava quaque hora*, adjectæ, isto ex vehiculo fumantur, & in potionem ordinariam *Apozema* detur *Pectorale*: vel, in forma liquida, cochleari *Ecligmatis* instillari possunt, *octava*, quaque hora, *Bals. Peruan.* vel *Tinct. Sulf. gutt. x.* & intervallo omni medio, *Chal. N. gr. vi. vel viii.*

Eo vero usque calidis hisce remediis utor, quoad siverit a febre periculum, & *Arthritidis* expulsio postulaverit. Et quidem eo lubentius hac via progredior, quoniam a calidis hisce, præsertim in senioribus, & *Arthritide* crebro recurrente depressis, non magnum unquam oriri periculum observavi; & si quod unquam extiterit, delubito tolli posse, non vana spes est: at commodum e diverso uberrimum est, adversis hisce longe uberius. Et, ne medicina hæc nostra, tanquam nimis calida, & *Phthisi* inepta, male accipiatur; sancte profiteor, me ea prospere, magnæque ægri cum utilitate, plus semel fuisse usum: cujus ego rei statim exempla proferam.

Si vero febris, seu per se, seu pharmacis excitata; quam ad rem præsentem opus fuerit, major exardeat, *Pulmonique* *φλόγωσιν* inten-

dat: ei, per detracta isthæc calida, per *Enemata*; per sanguinis missionem; per *Corticem Peruanum*, temporis adhibitum, & quandiu incurfat febricula, repetendum: perque alia, quæ *Peripneumonia* tenuare solent, est cavendum. Neque enim *Arthritidem* ex *Pulmone*, nisi tuto, licet amoliri; neque vitæ, nisi per ei conducibilia prospicere. Febre vero tenuata, medicina jam dicta (quoad commode fieri potest) similis, in usum denuo vocanda.

Quando remediis istiusmodi internis, (*Arthritidem* expellentibus, una cum *Bechicis*) dies aliquot teruntur, nimirum duo, vel tres; citiusve, si, in articulo & *σπῆ* *ακρων* aliquo dolor fuerit excitatus; articulo jam affecto, vel qui sæpius efficitur, extra id, quod materiam educat, applicari par est; eo, quo, in Capite præcedenti, aliasque passim, modo declaratum est. His autem eo magis insisto, quoniam ab antiquo commendari video, veterumque usu confirmari. „In *tabe*, ubi vehementior noxa est, ac neque *Febricula*, neque „*Tussis* quiescit, tenuarique corpus apparet, validioribus opus esse „*xiliis*, inquit, (a) *Celsus*, & exulcerandum ferro candenti, sic ne „*sanescere* sinas *Ulcera*, nisi *Tussis* finita fuerit. Quod quidem auxilium, etiam si acre & severum, tamen, ut in *Phthisi* absoluta commodum; ita in hac nostra, propter venenum intus contentum, eliciendumque, commodissimum.

Unum hic monendum, ægrotantibus hisce ponderis & momenti non exigui: *Opiata*, licet vulgo *Phthiseos* utilissima, in hoc casu suspecta esse, neque copiosa tempore præscribenda: ne videlicet miasma *Arthriticum*, jam in *Pulmonem* inditum, eo loci infigant. Dentur itaque sic, ut *Tussim* supra modum importunam inhibeant, & quietem ab ea tutam concilient. Quod autem de *Opiatis* dictum, id etiam de iis, quæ pituitam faciant crassiore, quæ *Pulmonem* obstruant, eique impedimento sint, ex parte aliqua dicendum.

Quoties hac, vel hujusmodi via, in extremas corporis partes amoveretur *Arthritis*, mirum quantum inde levetur *Pulmo*; nihil, ut opinor, ægrotantibus his commodius; quo enim magis *Articulum* illa mordet, eo minus *Pulmonem*. Vidi equidem *Tussim* hac arte primum fieri tolerabilem; sputum minui, utrumque post auferri; vidi restitutum oculorum aciem, & *σπῆ* *ακρων*, & a *Phthisi* incolumitatem. Quæ quidem omnia, quo certiora fiant, opus erit, *Arthritidem* tam expellentia, quam evocantia (id est, tam interna, quam externa) continuare; donec omne id, quod naturæ alienum est, e *Pulmone* fuerit dimotum.

VII. Quoniam vero *Pulmonem*, pituita diu gravatum, enervari debilitarique necessum erit; ad ejus robur instaurandum, cum primis facient *Aque ferratæ* per urinam exeuntes, & *Aer*. Finito igitur *Arthritidos* paroxysmo regulari, aliasve æger restitutus, prophylaxeos ergo, bibat per mensem integrum istiusmodi *Aquas*; Sin earum copia non detur, vel ex ægroti re civili non sit, eas bibere, bibat omni mane *Fol. Tee Infusi* quasi selibram, per menses aliquot. *Cerevisia Herbis pectoralibus*, *Hedere nempe terrestris Lingue Cervine*, *Capilli Veneris*, *Abietis*, *Cupressi cacuminibus*, *Bardane*, *Dauci Sylvest. Seminibus*, *Juniperi Baccis*; *Milleped. siccatis medicata esto*, & *potioni* datur *ordinarie*.

Aeris gratia, commodissime *Toposamum* ex *Isca* itur: quoniam ille, maritimus, *Pulmoni* benignissimus sit; & nautæ raro *Tussi* vexentur; rarissime *Phthisi* moriantur. Si ægri imbecillitas, aut loci ratio aere maritimo uti non patitur, equo vectari, & quidem sæpius, juvabit. Aerem vero profuturum arbitror, tam quia spiritus animales recreat; quam quia *Pulmonem* subintrando, eum roborat confirmatque. Profunt etiam *Fricciones*; modo vehementer, bis terve in die, perficuntur externæ partes. Profunt *Fonticuli* in dorso magni, aperti, juges. Placet *Sorbitio* ex *Choeholota*, adjecto, si lubet, *Ovi Vitello*. Cavendi vero, & quidem maximopere, *Cataracti*; ne miasma, denuo germinans, & in sanguine renovatum, ii ad *Pulmonem* abripiant: quod quidem hisce laborantibus, si frigoris sint impatientes, (uti sunt plerique omnes) non inusitatum; præsertim eo temporis spatio, quo repetere solet paroxysmus.

Hac de causa, præter jam dicta, quæ *Pulmonum* tueantur, *Pectoralia*; quæque in primo *Phthiseos* stadio, cum fructu adhibeantur; istiusmodi reliqua frequenti sint in usu, quæ contra hostem non jam victum, quam repulsum, & viribus redintegratis insultus iterarum, eos defendant. Quare, per anni dimidium hyemale, *Decoctum L. Sassafræ*, cum ejusdem *Cortice*, *Rad. China*, & *Sarsæ*, bis in die sumatur.

VIII. Hæc de *Phthisi*, a miasmate *Arthritico*, per sanguinem, cum *Pulmone* communicato. Siquis autem *Phthisin* *Arthriticam*, a fermento e nervis suppeditato ortam, ejusque indolem, & tractandæ modum intueri velit; clarissimi adeat *Mortoni*, collegæ, dum viveret; amicissimi *Phthisiologiam*, Lib. III. Cap. XI.

Ut autem pateat, antiquitati non latere, materiam *Arthriticam* in *Pulmonem* aliquando invehi, & morbum ei incutere quam gravissimum, fluxionis *Arthritice* mentionem fecit (b) *Galenus*, primum per universum corpus oberrantis; tum a *Pulmonibus* ad se attractæ, donec æger fuerit suffocatus, idque se in multis exploratum habuisse.

HISTORIA I.

Phthisis *Arthritica* *lethalis*.

I Neunte anno superioris sæculi novissimo; fœmina *Cliftensis*, e multis una, fere quinquagenaria, me vocari voluit. *Tussis* illi fuit, eo tempore gravissima; cum sputu, interdum sanguineo, semper autem, quoties ab imo pectore decurreret, crasso, & purulento. Respiratio porro difficilis, vox tremula, & (ab imbecillitate) cum clangore quodam: pedum item tumor, pulsus debilis, & necticus, tabes universalis, virium prostratio fuit: ut in ultimo *Phthiseos* stadio ægra; *Febris* autem mitior, quam in *Phthisi* *primigenia* affectis eo morbi tempore solet, esse videretur.

Diffi-

(a) Lib. III. Cap. XXII.

(b) Τα μεν γὰρ ἄλλα ἱστὸρ φαρμάκων, ὅσα εἰς ἀπαλλαγὴν τῆ νοσήματος οἱ ποδαγραῶντες πίνουσι, τὴν μὲν ἐπὶ τὰς πόδας τὸ ρεύματος φορὰν καλῶς γίνεσθαι, ἐκ ἐξαναίσκουτα δὲ τὴν ἀεὶ τὴν ὑγρὰσιν, ἀλλὰ τινὸς μείζονος νοσήματος ἥμισιν ἐργάζεσθαι. Πλανωμένον γὰρ ἐν τῷ σώματι τὸ ρεύματος ὁ πνεύμων αἰεὶ κινεῖται, ὅθεν τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκην, καὶ ὅθεν τὸ μανὸν τῷ σώματι δέξασθαι τὸ ρεύμα ῥαδίως, δυνάμενος, τὸ πᾶν αὐτὸς ἐφ' ἑαυτὸν ἔλκων, ὅτε πνίγῃ τὸν ἀνδραπον, ὅσπερ ἰσοεικῶς ὅτε πολλῶν ἐγὼ τῇ πείρᾳ ματέμαθον. De Theriaca, Lib. I. Cap. XV.

Difficillimi, & jam obfirmati hujus morbi originem, & causam antecedentem, inquirenti perscrutantique mihi, ipsa narravit, matrem sibi fuisse diu multumque *Podagra* cruciatam, eaque demum extinctam: sibi autem ipsi, ante animum, & quod excurrit, tumere tarsum, & pedis convexum; atque adeo rubere, nitere, dolere: sed, cum mature nimis tumor aut evanesceret, aut repelleretur, quod *Tussis*, (qua, per multos ante annos, fuisset identidem afflicta) de subito ingravescens, *Phthisi* viam aperuerit; ut a materia *Arthritica*, pedem languide nimis afficiente, in *Pulmonem* irruente, longaque eum obsidione subvertente, *Phthisin* hanc oriri; & (auxiliis medicis, sive neglectis, sive incite usurpatis) inveterare, res esset fide omnino digna, paucis post diebus, e vivis excessit ægra, *Phthisi*, sed *Arthritica*, quæ a primigenia *Phthisi*, non facile distingui poterat, oppressa.

HISTORIA II.

Phthisis Arthritica Medicamentis calidioribus sæpe levata.

Mercator *Exoniensis*, gracilis, *Arthriticus* natura factus, ætate constanti leves habuit paroxysmos; extrema vero, & decrepita, jam diu nullos. Bellum pax secuta est, omnium opinione alma, tranquilla, salutaris. Sed (ut eventus comprobavit) dubia, sed fide Punica. Aliquanto post (Septembri MDCCIII.) suborta est *sputatio*, cum aliquo spiritus impedimento, cum *Pectore* gravato; sed, ex crassa mane pituita, assatim citata, exantlatæque, ad tempus aliquot immuni. Languit appetitus; flaccuerunt artus; obtusa fuit oculorum acies, & decolor vultus. *Tussis*, sed *Arthritica* est; & *Phthisis*, ultima senectute, tempore prius inusitato, incipiens.

Ut contra hostem, atrocem & truculentam, ore larvato redeuntem, me paratum habeam, præmissis, ad intestina leniter inanenda, *Eccoproto*, *Insusi amari alterantis coch.* v. *Tinct. M. gutt. xv. bis in die. Tinct. vero Sulf. gutt. xii. ex Syr. de Succo Erysim. coch. i. hora somni, cum Julapii Pectoralis haustu, demittenda meo jure præcipio: Spiritus item Vol. Oleosi guttas subinde aliquot, cum veteris Malacani haustu. Eo nempe hæc omnia, *Phthisicis* raro præscripta; ut medicamentis hisce calidioribus, in artus, siqua fieri possit, hostis expellatur. A præscriptorum usu melius certe se habuit; tumere pedes; levatus est *Pulmo*; *tussis* elisa.*

Mense primo Decembri, nescio qua de causa, detumescere pedes; *Catarrhus* ortus est propemodum *ferinus*, cum sputo tenui copioso. Ut humorum partim eliminaret, *Decoctum Sennæ* (duplicatæ) *Gereonis*; partim, ad *πῆξιν*, ut amandaret, *Bolum e Pul. Rad. Ari C. Zi. &c. cum insusi amari haustu*, horis duabus medicinalibus sumendum dedi. Medicamenta ex voto profuerunt: pedibus iterum paulo post, ab eorum usu, doluit æger.

At vere sequenti, (qua anni tempestate insultus iterare solita est,) cum jam plane siluit *Arthritis*, in illius locum tanquam sublesta, *Tussis* recruduit, importuna, pertinax, cum sputo tenui, rucedine, tracheæ titillatione fere perpetua, spirandique difficultate: Ad quæ *Pomacei*, ægrò gratissimi, usum pene quotidianum nonnihil conferre, verisimile est. *Tussis* ista negligenter habita (toto enim sesquianni spatio, nihil unquam medicamentorum, uti docuit, assumptum est) *Tussis*, inquam, inveteravit: caro assumpta est, pulvis plane hesticus. Mense Julio MDCCI. iterum accessit, ea, quæ sequuntur, adhibui: bis scilicet in die, *Decocti Corticis Chalybeati Zi. cum Syr. Balsamici Zi. Aq. Cin. fort. Zi. Hora vero somni Tinct. Sulf. gutt. x. e seq. Ecligmatis coch. i. cum Jul. Pectoralis haustu.*

24. Syr. de Mecon. Balsam. Aq. Hyssopi anap. aq. misce: de quo insuper Ecligmate, nocturno tempore, sæpius ad delinendam Tussim pitisset. Cerevisia Cacuminibus Hed. terrest. Rad. Chinæ, Sarsæ, Eryng. medicata erat. Inter Omoplatas, utroque Spinæ latere Fonticulus, sex pisorum capax, aperiebatur.

Medicamentis hisce dies xx. usurpatis, micuit oculorum acies, vultus *εὐχρόνως*, remisit *Tussis*, largiter ex intervallis faciens pituitam. Hinc pectus liberum; hinc *σπύραια*. Pro hestico, calor mitis, blandus, benignus, plane naturalis, cum diaphoresi, tam utili, quam jucunda. Verbo dicam, omni ex parte sanior evasit æger, & a *Phthisi* visus est incolumis. At eheu! senibus incerta res salutis: autumnus proxime sequenti, sine causa evidenti ulla, in *Diarrhœam* incidit, gravem, & impatibilem, excrementis liquidis, & biliosis signatam, quæ, alvum indurantibus, suppressa, brevi recurrit; & una cum tumore pedum hydropico, naturæ subversionem ostendens, ægrum, ætate grandem & imbecillum, media hyeme occidit.

HISTORIA III.

Phthisis Arthritica incipiens curata.

Memorabilis certe Historia Dominici C. ex insula *Iskana*, a dolentis septem supra viginti annorum patre *Arthritico* procreati, gracilis, teneri; frigus sine injuria non facile tolerantis, & diu *Phthisici*. Ante triennium *Arthritide* correptus ille, anno novissimo (tanta morbi fuit pertinacia, pedum, manuum aliumque digitum invadentis, & vicissim occupantis) vix binos menses egit immunes. Paroxysmi non ex illo fuerunt genere, quod inflammatione, cæteroque istiusmodi satellitio more suo stiparentur; quin potius lenes, mites; quique in longum idcirco tempus extraherentur. Quoties animus (is autem creber fuit) pedibus imminuentem antevertere paroxysmum, tibialia ne vel lectum ingressurus exuere consuevit; tam noctu, quam interdiu gerens; neque sine successu: hoc enim artificio, *Arthritidem*, paroxysmum molientem, identidem protelavit.

Hujus sæculi initio, mitius se habuit *Arthritis*, & diutius solito conticuit: *Pulmonem* interea obsevit pituita; quæ spirandi intulit difficultatem, anhelationem immodicam, pectoris gravitatem, *Tussim*, sputum, tam mane crassum, quam etiam copiosum. His accessit faciei pallor, universi corporis imbecillitas, languor, & in propinquo *Tubes*.

A materia *Arthritica* pectus aggravante, malorum hanc catervam induci, luce clarius fuit meridiana; neque enim tunc primum istius in *Pulmonem* metastasin, etsi nunquam antea tam magnam, & tam molestantem, est prepressus. Tutos autem *Artus*, & dolore liberatos, quoties *Pulmo* premeretur; & e contrario, *Pulmonem* liberum, *Sydenham Opera Medica*.

quoties aggravarentur *Artus*, semper observavi. Calor autem vespertinus, & sudor ei usitata superveniens, qui, prædictis hisce accidentibus, in *Phthisi* affectis, præcipue hac anni tempestate, solent se adjungere; certe in hoc nostro ægrotante nondum emicuisse.

Quibus omnibus serio pensatis, in eo operam & studium impendi, ut primo pituitam, *Pulmoni* impactam, *Ανακαταρσι* amolirer. Secundo *Arthritidem* deviam, & *Anomalam*, ad *πῆξιν* ut reducerem, itaque tuerer *Pulmonem*. Ut indicationibus hisce satisfacerem, hautum ex *Aq. Hyssopi, Cardui ben. ana Zi. Tinct. Croci Zi. Alcohol. M. Zi. Syr. Bals. Zi. omni mane sumendum, Pilulas, e G. Amoniaci Zi. Mirrhæ pil. Alcohol. M. ana gr. v. Picis lip. q. f. hora quarta pom. Alias vero e Bals. Lucat. Zi. Pul. Dialibæ q. f. hora somni, ex Syr. Bals. coch. i. demittendas, cum Julapii Pectoralis haustu, præscripsi. In potionem ordinariam, *Apozema* e *Rad. Chinæ, Sarsæ, L. Saffaphræ ana Zi. Cort. ejusdem Zi. Warum pasturum exacinat. Zi. in Aq. font. Zi. ad dimidium coctis; colatura Saccharo crystallino dulcata. Ægrum porro sæpius apricari, εὐπνέωνναι vesci, parce cœnare jussi, & Hydromel interdum bibere.**

Vix per unam, & alteram hebdomadam, præscriptis usus fuerat; cum, exantlato fere omni phlegmate, spiritus liberior evasit: *Tussis* minus importuna, imo rarissima. Vires; & cum iis vultus *εὐχρόνως* rediit. Quicquid fuerat symptomatis, breve intra tempus obtusum, & mitigatum est: paulo subactum. Quinimo corporis æstus universalis, sed blandus, salutaris, benignus, quique naturæ vigorem, potius quam *Febrim* indicaret, est subortus. Posthac intra triduum in pedum altero successit dolor, tumor, rubor, *Arthritidos* regularis signa. Hinc pectus sanum, a *Phthisi* graviter urgente liberum, & si *Διάθεσιν* excipias a natura *Phthisicam*, bono cum Deo, usquequaque integrum. Imo quidem postea, per annos septem, bona usus fuit valetudine; nisi quod *Arthritide* laboraverit, recte interdum recurrente & quidem (uti licet opinari) propter eam ita recurrentem, bona.

CAPUT XIII.

De Angina Arthritica.

Art. I. **P**ost febriculam, ad expellendum miasma *Arthriticum*, a natura in sanguine concitatum, quoties ea per *Fauces* illud expellere conetur, & eo loci, una cum vehiculo, id deponens, inflammationem afferat, spirandi deglutindique vias obstruentem, *Angina* fit *Arthritica*; morbus certe *ἴσος* habens peculiare, & a Medicis parum adhuc consideratus; ab *Angina* pura, & exquisita (ne dicam alios affectus, ei consimiles, & congeneres) sive *Therapiam* intueamur, sive *Ætiologiam*, accurate distinguendus.

II. Ut autem initio, de morbi hujus *ἰσότητι* verba faciam; dari hujusmodi *Anginam* omnino liquet. Primum, quod ex eodem æstu febrili, simul cum articularum dolore, tanquam illi gemina, *εὐχρόνως* ea sæpe deprehendatur, & quidem (ut frequenter accidit) interposito quodam intervallo post *Arthritidos* regularem paroxysmum, quo utique intervallo novam in sanguinem materiam cumulari certissimum est; uti, cumulatam expulsionem jam esse idoneam, est probabile.

Denique, quod hæc *Angina*, per se exorta, modo perfecta sit, in abscessum desinens, & copiose pus ejiciens, paroxysmi *Arthritici* vicem explere; quod, ejus causam vacare, quod, ab ejus incursum *Podagram*, ad tempus aliquod, immunem, & saluum præstare; quod, vegetum eum, & lætum reddere; (quæ sunt *Arthritica* decessionis indicia) crebro advertatur.

Postremo, quod *Angina* hæc, per materiam *Νόσσην*, in artus translationem, alias fortuitam, alias arte procuratam, intercisa, sæpe in *Arthritidem* mutetur *Regularem*; sæpe etiam suapte sponte transeant; eadem plane ratione, qua *Vertigo*, qua *Asbma*, qua *Colica*, vel aliud quodvis *Νόσσην* *Ποδαγρον*, & eodem ægri cum emolumento: ut de morbi hujus, proinde ac illorum *ῥῆματι*, nullus superesse possit dubitandi locus.

III. Eos creberrime invadit hæc *Angina*, quibus, ad eam a natura factis, collum breve, crassum, humidum, tono fibrarum laxo & imbecilli præditum; itaque humoribus, tum accipientis, tum retinentis aptum: viros præ sœminis (sic enim ipsa *Arthritis*) sæpius, sed & utroque aggreditur: ex illis præcipue eos, qui media sunt ætate; ex hisce vero eas, quæ catameniis dudum orbatæ; ex utrisque maxime biliosos, sanguine præservido, vel tenui donatos: nec quenquam, uti mihi videtur, unquam; nisi materia prius *Arthritica* (causa videlicet procatartica) copiosa, & evecta in sanguine turgentem, jam jamque articulis doliturum. Interea vero temporis, a causis *Anginæ* exquisitæ prævalidis, & urgentibus, in partes suas, levem & quiescentem illam aliquando trahi, non est diffidendum; ita vero quæ se habet *Angina*, cum parum *Arthritica* sit, & propriam medendi legem minime requirat, non est hujusce tituli.

Causa hujus *Anginæ*, (externa & evidens) frequentissima est *Potatio*; maxime pomacei, aut vini alicujus tenuis, liberior; maxime vero omnium, si accedat algor.

IV. Ut ad *Diagnosin* qualemcumque descendam, præcurrit febris; eaque sæpe, quam in alia quavis *Arthritide* præmitti solet, vehementior: quæ, tametsi prorsus *Symptomatica*, febrium nonnunquam æquare videatur *Essentialem*, ardentem; & est, pro ægroti temperamento, ætate, & pro causæ evidens magnitudine, plus minus ardens. Paulo post exoritur *Faucium Dolor*, & *Tumor φλεγμονώδης*, unde deglutindi spirandique viæ semper arctatæ; interdum autem adeo, ut tridui, vel quadridui spatio, nihil unquam victus possit demitti, neque spiritus nisi difficillime trahatur. Saliva interdum assatim errant; alvus adstricta est. Sanguis a *Vene sectione* Gelatinam (uti in *Pleuritide*, & *Peripneumonia*) præ se fert, in excipulis supernatantem, puram, tenacem, sebaceam; & quidem, quam in *Arthritide* solet exquisita, magis. Utrum vero *Arthritica* sit *Angina*, necne; id, ex *Arthritide*, vel *Angina* prægressa, vel ex ea simul semelque eum *Angina* locum habente, vel, eam evefligio insequenti, id est, ex horum affectuum ratione inter se, omnino intelligendum est.

V. De *Angina* pura & genuina, passim apud Auctores observatum est, *Viscidum* illud, quæ est illius causa conjuncta, modo in latus, modo in pulmonem transvehi; iisque in locis pleuritidem, vel peripneumoniam facere, morbos scilicet non tam materiam, quam loco-

locorum affectorum diversitate distinguendos. Eadem de Arthritica narretur fabula: pari enim ritu, Angine Arthritica materiam, five causa continens, sæpe in pedem, nonnunquam in manum; interdum in genu (ut taceam alias corporis partes quamplurimas) transfunditur; & in illis Podagram, vel Chiragram, vel Gonagram affert; affectus, uti nonnullis visum fuit, longe diversos; at revera ejusdem indolis, & naturæ, locorumque ratione maxime discrepantes.

VI. Curatio vult, ut Fauces quam primum liberentur, & quidem methodo ei, quæ vulgaris est Angine, longissime diversa. Nam, cum indicatio illa generalis, duobus perficitur; quorum alterum humores evocat e corpore; alterum e parte affecta tantummodo revellit, & in artubus deponit; cumque prius illud, (quod Venesectione, Purgatione, Gargarizatione, Vesicatione, & ejusmodi aliis affectum est) utrique Angine, puræ videlicet cum Arthritica commune est; posterius vero (quod Arthritidem in viam reducentibus, & paroxysmum ejus regularem facientibus absolvitur) uni Angine: Nos ea duo conjungentes, medendi legem, quam iterum & sæpius, nec infelicitur fuimus secuti, & aperiemus, & quasi digito demonstrabimus.

Quoties igitur ad Anginosum aliquem accersor, explorata prius tumoris magnitudine, reliquisque ejus, quæ maximi sunt momenti, symptomatibus, in illius causas inquirō; & si æger fuerit ex Arthriticorum numero, quamdiu ab Arthritide vacavit, interrogo. Eam autem si invenio frequenter olim paroxysmos, statisque temporibus, regulares; eosque magnos, & vehementes habuisse; nuper autem præter morem, interrupisse: ex eo suspicor, Arthriticam in sanguine materiam, per hanc vacationem cumulatam adauctamque, in eo turbellas facere; jam nunc exulare; & in sances, ob earum imbecillitatem & cōviciū, immixtam, inflammationem in iis excitare. Major autem erit hujusce rei suspicio, si nausea, & fastidium; si gravitas, & torpor; si dolores vagi (uti solent ante paroxysmum regularem) ad tempus aliquod præcesserant.

II. Hac igitur opinione ductus, primum sanguinem (nisi nuper ille detractus fuit) detraho, & quidem copiosum. Enema paulo post immitti jubeo. Postridie Venesectionem, purgatio, per Rheī puta, Sennæ, & Agarici Infusum, cum Syr. Ros. Solut. q. s. lene videlicet aliquod, instituenda; quando sanguinem exagitantia, propter ejus orgasmum, (qui in hoc affectu jam satis rapidus esse solet) ne obsuerint, periculum est. De alvo sollicitanda, si cathartico fuit inanita, per dies quatuor vel quinque postea nihil laboro; ne alienum ad mē Evrepe, contra naturæ propositum, alliciatur. Cervici Epispasticum post purgationem applicandum, idque prælargum; quod nempe colli dimidium obtegat, hinc autem, horis post viginti quatuor, succedat Emplastr. Melilori, Cantharidum Pulvere aspersum, sæpe renovandum, ut fluimen jube & diuturnum sit. Ab initio morbi usus fere perpetui est Gargarisma incidens, aperiens.

24. Aq. Hordeate ʒij. Diamor. ʒiij. Sp. Sulf. rer. Camp. quantum Lingua fetre potuerit, fiat Gargarisma, vel Melli Rosaceo addatur Sp. salis, five Nitri, ad acorem summum & tolerabilem: Indatur ori paululum, & cum saliva post aliquot tempus ejiciatur. Nihil vero pulvere sequenti præstantius efficaciusve novi.

25. Cryst. Min. Sacch. Crystall. ana p. aq. Misce. Teneatur Ore ʒi. donec Saliva abundaverit: tunc expuatur, & hora post quadrantem vel dimidium, (modo sinat Vigilia) repetatur, Mirum, quantum hinc Saliva.

Profunt herbarum Artemisia, Salvia, Majorana, Rosmarini, Sambuci, Chamemel. Calamintba, Matricarie (quæ acri & volatili spiritu refertæ, discutiant) decoctarum halitus, obvelato capite, & hiantes ore, in arteriam immitti. Die perendino, vel etiam citius, si necesse fuerit, de iteranda Phlebotome deliberandum. Iterari illam, & quidem interdum plus altera vice, postulat deglutendi spirandique, si fuerit, difficultas urgens, importuna, periculosa, sique venam iterum secari oportuerit, Jugularis esio. In summo Gutture dolore admoveatur extra Cataplasma, ex Rad. Althææ, Fol. Malvæ, Ficus incis, Aqua Hordeata coctis, addita hujusce Magmatis ʒiij. Cepar. coct. ʒiij. Sem. Lini ʒij. Mica panis ʒi. Ol. Lil. alb. q. s. Gargarizetur autem os Aqua Hordeata & Lacte Vaccino, paribus mensuris, ad ipsas fauces, capite refupino, intrinmissis. De gravissimo symptomate, (Spiritu nempe intercluso) ut verbum addam, quoties ita ingravescat, ut ægro pene suffocato statim moriendum, nisi aliquis Apollo intervenierit: in hoc casu Laryngotome, tutissimum præsentissimumque remedium, omnino facienda. Tuto certe illam, comodeque posse fieri, Arterie penitus divisæ (cujus Historiam, admodum luculentam, videre licet, Actorum Philosoph. N. 258.) curatio probat.

VIII. Dum hæc aguntur, & quidem eo modo omnia, ut ne materia in partes internas transferatur: (cujusmodi Μεταβοσι in Angina Arthritica, quam in vera & exquisita, tum frequentior, tum incommodior) alia faciunt ad Fauces allevationem Arthritida Regularem inducendo: quapropter Acida, sicut Pomaceum, Vinum Album, aut Rhenanum, vel alia quævis potio, dolorem arcessens Articularem, post purgationem, & quidem interdum libere potanda. Articulo Arthritidi usitatissimo, vel Empl. ex Oxycroc. Cephalico & Pice Burg. ana p. aq. Vel, si efficacioribus utendum, Phænigmus acris & stimulant admoveatur, & prout usus erit, iteretur. Hac confert, quæ olim veteribus familiaris, in aqua, quanta tolerari potest calidissima, Pedum lotio. Tumor excitatus, Panno Vvallico, aliove quovis raro & molli, vel Linteo duplicato vestiatur. Ut ille tumor Artuum in conspectum venit, plerumque subsidit Fauces iste, recurrit dolor, aliaque jam denuo rectæ Arthritidos indicia: atque tum in tuto omnia, & ὡς τρέπεται τὸ Νόσημα: quod Hippocratis, in simili casu, argumentum est.

Si rumpatur vomica, Gargarisma componendum emolliens, & suppurans, (e Decocto puta Hordei, Glycyrrhizæ, Ficus, cum Syr. Cap. Ven.) & demum modice astringens, Jusculis Avenaceis, Hordeaceis, & ejusmodi tenuibus vescatur æger; & ut humorum effervescencia minuat, utque collum versus abscondatur Pons, lecto tempore diurno, quantum potest abstineat; sella erectus sedeat; pedes deorsum versus inclinet; & in lecto alias caput elevatum, habeat. Finita, re paroxysmi, leniente quodam alvus subducenda.

Exempla jam in apertum proferam, quæ lucem, uti spero, non mediocrem prædictis scenerabuntur.

HISTORIA I.

Arthritis, Fauces & Artus simul semelque occupans.

Homo Iscanus, e regione Portæ Australis, decimo ætatis lustro, ex frigore, quod ante præcesserat, Anginæ laboravit. Febris, pulsu celeri, æstu carnis immodico signata fuit: Fauces, cum robore, tumuerunt: voce nihil distincte significavit: spiritum difficillime traxit: cibi transitus præcludebatur. Non dubito fore plerosque, qui ex his indiciis Anginam istam simplicem, & veram esse judicaverint; quam vero recte, confestim apparebit. De dolore interrogavi, Satin salve? Numne alias corporis partes iridem occuparet? Quem cum genu, etiam & malleoli sinistri, eo ipso tempore, tametsi mitem & tolerabilem esse, cum eum Articulos invadere, & more prorsus Arthritico revēti, solitum acceperam; Anginam hanc non tam veram & exquisitam, quam in Arthriticarum numero, & classe ponendam æstimavi; ideoque non iis opus esse auxiliis, (sanguinis scilicet missione copiosa: Clysteribus crebris, Emulsis, & istiusmodi Refrigerantibus) quæ quidem omnia, in affectu absoluto comoda, in hoc nostro partim frustra, partim incommoda essent: sed ab hac methodo deflectendum & id, quod strangulat, aut evocandum, aut in artus transferendum esse. Quem in finem, colli dimidio posteriori Vesicatorium superpono: Crystalli Mineralis ʒss. & Sacchari tantundem (remedium ad salivam hac in re movendam efficacissimum) ut ore teneatur, ut retentum solvatur, ut solutum expuatur, omni horæ quadrante adhibeo: hinc fluidum salivæ, os; ptyalisimus hinc immanis.

Ut alteram curationis partem aggrediar, & materiæ reliquum in articulos transferam, ita præcipio.

24. Pul. e Chel. C. C. ʒss. Conf. Anthus ʒj. Serp. Virgin. pul. gr. v. Conf. Alk. q. s. f. Bolus, hora quaque octava sumendus; cum Julapii haustu Perlato. Potni vero dabatur Decoctum Sarsæ, China, Raf. C. C. Eb. Sem. Coriandr. genu & malleolo dolentibus, ut illuc materia invitaretur, Empl. ex Oxycroc. & picis Burgund. ana p. aq. admovi.

Horum usu, temporis spatio perbrevis, biduo nempe; tantus artuum, & tam acris erat dolor, ut neque Bolo diutius, neque Emplastro opus esset, hoc amplius pari etiam modo & proportionē, Fauces deturgere; spiritus, cibique transitum aperiiri, Anginam curari, certissimum erat. Ægroto gratulabar, quod redierat jam in viam, itaque vale-dixi.

Paroxysmo illo, quo quidem nihil unquam utilius, nihil opportunius evenit, jam finito; cum illius eo tempore recidivi, nullum omnino periculum extaret: ut alvus subduceretur Catharticum, at (ne materia de novo irritaretur) blandum, & leniens propinavi cum Paregorico, hora somni post purgationem assumendo.

Menses inde post aliquot, ad Prophylaxin obeundam incumbens, Aquas omni mane Diureticas, quarta pomeridiana Pil. ex Salis Martis gr. v. Pulv. Chamæpit. gr. xv. cum Syr. Abs. f. q. s. demittere, initio vero, & deinceps septimo quoque die, per Salep Polychrestum, & Manna aquis purgantibus solutum, ventrem movere, in præscriptis habuit.

Historia præfert Arthritidem, primum; febriculam ex algore generare, tum Fauces graviter prementem, nec quidem artubus interea parcentem; deinde Fauces (Medicinæ beneficio) expulsum, & in articulos membrorum missam: Quæ quidem omnia, cum ejusdem morbi irritatio & progressus sint, & Arthritide Anginam mentiente, sententiam nostram magnopere corroborent.

HISTORIA II.

Anginæ Arthriticæ ad Abscessum tendentis in Arthritida Regularem Metamorphosin.

Huc etiam facit agricolæ cujusdam suburbani exemplum, qui, annorum plus minus viginti, Arthritide subinde reverti diu affluatus, initio veris, (nescio qua de causa) Fauces inflammatione gravi corripiebatur, cum æstu corporis universali, & pulsu magno. Dies ille complures nihil devoravit; voce nihil clare significavit; spiritum ægre traxit. Sanguis, ingruente morbo, missus est; cui gelatina, post aliquod tempus, supernatavit densa, crassa. Saliva jugiter effluxit.

Ut Fauces quam citissime relevarem, (hoc enim medendi postulavit indicatio) sanguinem, quoniam abundavit, iterum mitteret; & ad sputum augendum, salis prunelle saccharique crystallini partes æquales ore sæpius teneret, solutas postmodum expueret, ægroto imperavi. Missura porro data est, ex Syrup. Balsam. & Aq. Cin. bord. ad deliniendam humorum acrimoniam, & rursus mitigandam. Clystma emolliens quotidie injectum. Loco cerevisiæ, Decoctum Hordei, Rad. Ering. C. Glycyrrhiz. Cacus. Adiantb. cum Syr. Viol. brevi post tempore, peropportune recidit, quod genu alterum diu multumque dolebat, tumeret: unde Fauces levabantur, facta in hunc articulum materiæ reliquæ translatione: qua quidem re, ut nihil utilius, nihil esse potuit ægroto desiderabilius, quando per eam gutturi maxime caveretur, vitæ & saluti consuleretur.

Historia confirmat Anginæ Arthriticæ doctrinam; simulque monstrat, iis, quæ affluxum ad Fauces cohibeant, quæ gravatas eas exonerent, (Revellentibus, sc. Derivantibus, & Resolventibus) Abscessum aliquando præverti, in fauces, Arthriticum.

HISTORIA III.

Materia Arthritica partim Abscessu Anginoso, partim per Articulares Glandulas expressa.

VIR amplissimus, nec uno nomine colendus, humida constitutione, collo crassiori præditus, catarrho oris fere indefinente, per primam omnem pueritiam delibutus, circa juventutis initia, tum Arthritide, tum etiam Angina; morbo, uti videtur, hæreditario; verum non eodem tempore, solebat affici. Ætate progrediente, cum ex levi in poculis errato, post artuum dolorem vagum, urgeret Angina, spiritus animales impendio deprimeret, suffocationem minaretur; neque vulgarem medicinam, etsi multiplicem, sentiret, ad eam allevandam arcessitus, de Arthritide quæro; nam quando illa nuper idoneum ex more paroxysmum egisset? quænam apud ægrotum illius ciendi ratio probabilior? Cumque ad hoc operis, prævalere ceteris quibuscun-

que Pomaceum inaudiverim; illius subacidi, sed generosi lib. j, alteramque propinavi, eo nempe animo, ut *Arthritida*, quam diutius silentem *απομάχων* Fauces invadere subfensi, in artus propellerem. Eventus suspicionem comprobavit; paucis enim post horis, emicuit altero pede *Arthritis*. Lanea vestiri, blande tractari, molliter haberi secundum illius genium, admonui. Sub hoc tempus, aperto *Facium abscessu*, pus emissum est *Gargarisma* suppurans, & modice detergens, sæpius adhibitum.

24. *Decocti Hordei*, cum *Ficibus incisis*, & *Vini Rubri Gallici* ana ℥ss. *Diamori* ℥ij. f. gargarisma.

Doluit interea, cum ardore tumuit ex animi sententia articulus: post exitum paroxysmi, Aq. *Purgantes*, quibus abluerentur reliquæ morbi, diu potavit æger.

Anginam hanc *Arthriticam* esse constat. Primum, ex diutino *Arthritidos* silentio; tum, ex dolore prævio, antequam materia figeretur, erratico. Tertium, ex subita & facili *Regularis Arthritidos* emersione: quibus simul consideratis arguitur, præter istam *Anginæ* causam evidentem (in potulentis scil. erratur) fuisse etiam *προνυστέλευ*, *Arthriticum* intus in sanguine miasma evectum, e-bulliens, ambitiosum, quod, junctis causæ externæ copiis, naturam eo usque laceraverit, donec illa vires recolligens, hostem in exilium, materiam alienam in Fauces, (ab origine debiliores) & demum, arte adjuta, in artus amandaverit.

Docet historia, in *Arthritide Anomala*, *Anginam* æmulante, spiritumque elidente, posse utiliter, artis ope *ιατρικῆς*, *Arthritida* iustificari *Regularem*.

His subijciam, ægrotum hunc nostrum, posthac *Articulis* sæpissime laborare. *Angina* vero non item: imo ratione prorsus *inversa*; sic, ut quo minus hac, eo magis illa: quæ quidem istorum affectuum, adeo inter se dissimiles mutationes pondus aliquod habent, & demum *Arthritida* se in viam dare, & magis rectam esse ostendunt.

HISTORIA IV.

Arthritis primum Fauces, deinde Articulos invadens.

Mulier lectissima, dignitate domus, suæque celebris, nunquam *ὡς Γαστὴρ ἐκκρεῖ*, quanquam marito satis probabili diu nupta, cum annos quatuor supra quadraginta compleverat, & deficere catamenia jam menses aliquam multos persenserat, obesor, & crassior evasit. Eo corporis statu ac conditione fuit, cum, vere anni MDCCV, ineunt, febricula & tumore faucium repentino corripere: quibus ut occurreret, suasionem amicorum, primum, sanguinem detraxit; dehinc cervicis *Epispasticum* admovit: quorum beneficio quicquid humidum in *Faucibus* depositum fuerat, vel evocatum & elicatum, vel sanguini redditum & repensum est.

Post *Tumoris* abolitionem, perpauca agebantur horæ, cum genu alterum, tum malleolus, tum digiti in pede maximi globus, & vicinus ei articulus ordine dolueret; tam recte, tamque ex more *Arthritidis* exquisitæ, ut, utrum ipsa esset, an secus, nullus extaret dubitandi locus.

Horum autem malorum ordo, quem exposuimus, *Anginæ* hujus naturam non parum explicat: nam, ut *Anginam* e vestigio secuta est *Arthritis* omnibus numeris absoluta, sic, *Arthriticam* esse hanc *Anginam*, liquido & manifeste probant. Et quidem, utrumque hunc affectum eidem febriculæ subnasci, ab ea sustentari, & in Fauces, & in artus, alienam e sanguine materiam, per eandem febriculam expelli, minime ambigendum.

Ex hac historia, & hujus numeri aliis, verisimile videtur, non tam extremæ, & decrepitæ ætatis, quam mediæ, & constantis affectum, esse hanc *Anginam*. Certe ea laborantes, qui ad hunc usque diem mihi innotuere, adolescentes, aut juvenes, excepto tantum uno, fuere omnes.

HISTORIA V.

Anginæ Arthriticæ auspicio supervenit Arthritis Regularis.

Vir nobilis, HEN. COURTENAY, Regia stirpe oriundus, & majoribus suis dignissimus, ætate mediæ, plus semel *Arthritide* doluerat; cum, ex intervallo aliquo ab ejus paroxysmo, (nulla, quod sciam, urgente causa evidenti) *Faucium* dolore, tumore *ὡς ἐκκρεῖ*, spirandi glutiendique vias includente, tentabatur. Gustus summe depravatus; saliva viscida, sitis permolesta, æstus universalis, vigilantia gravis, febris acuta erat. Ad therapiam vena illico pertusa est, & postmodum per *Pulv. VVarvicensis*, alvus subdusta: *Vesicatorio*, cervice tota posteriori serum elicatur: omni horæ dimidio, salivam movens, adhibetur id, quod sequitur.

24. *Crystall. Min.* ℥iii. *Salis Vol. Succini* ℥i. *Sacchari Crystal.* ℥ss. *Misce*, & divide in partes æquales, N. xxiv. teneatur ore particula, quoad dissolvatur; deinde cum saliva expuatur.

Potui datum est *Decoctum* sequens, calidissime pyrtissandum.

24. *Rad. Gram. Can. Eryng. Cond. ana* ℥j. *Hordeo mundat.* ℥ss. *Coccinell.* ℥i. *Coq. in Aq. Font.* ℥iii. ad ii. *Colaturæ* adde *Syr. e Corall. Simp.* ℥iv. *Tinct. Aurant.* ℥i. f. *Decoctum*. Bolus ex *Salis Saturni* gr. iii. *Nitri purificati* gr. v. *Conf. Lujul.* ℥j. *Syr. Melissoph.* q. s. ter in die sumendus, cum *Jul.* haustu, & ad alvum molliendam, omni vespere *Enema* præscriptum est.

Quibus sedulo observatis, salivam mirum quantam, ac si *Mercurio* concitatam, ejecerit. *Faucibus* allevatis, spiravit, glutiit facilius. Restitit febris, quam in declinante *Angina* esse, pertinacior, & huic rei aliquid amplius subesse, neque omnia conspici, comprobavit. Accessit *Podagra*, rem totam aperiens, *Anginam* esse puram putam *Arthriticam*, curationem postulare propriam ostendens. Bolo igitur, & *Decocto* refrigerantibus, ne fraudi sint ægroto, omisiss, ad ea, quæ *Podagram* absque nimio febris incremento promovere possint, dessecto.

24. *Salis Martis* gr. iv. *Pul. Cobl. C. C.* ℥ss. *Conf. Fruct. Cynosbat.* ℥ii. *Syr. Garyoph.* q. s. bolus, bis in die sumendus, cum *Julapii* haustu. Et quoniam ad invocandum augendumque morbi hujus paroxysmum regularem, plurimum valere *Pomaceum*, in experimentis est, libram illius unam alteramque, nycthemeri spatio bibat, exhortor. Pedit affecto *Ceratum* viride admoveo. Doluit e-

Sydenham Opera Medica.

inde pes, & quidem laudabiliter. Expulsa est ad ejus articulos *Arthritis*, & relictis *Faucibus* *παροξυσμῶν*. Aquas aliquanto post, finita paroxysmi re, *Diureticas* hortatu nostro hausit, alias aliasque; primum *Bamptonenses*, anno sequenti *Bathonienses*; utrasque commode.

In *Arthritidis* silentio, supra modum longo & ancipiti, *Angina* si acciderit; utrum *Arthritica* sit, quam merito suspectum habeas, ostendit historia.

HISTORIA VI.

Angina & Abscessus Arthriticus, cum Arthritide insequenti, recta, & idonea.

Annus sunt complures, cum adolescentem visitavi, sanguineum, robustum, & bene coloratum; cui *Faucium* cum dolore *Inflammatio* fuit, spiritus & cibi vias obstruens, (quam Græci *Συνέχων* nominant) cum æstu immodico, pulsu celeri. Numquid *Articulis* unquam doluerat? interrogo. Dolui, inquit, acerbissime, ter quaterve; istud vero quid ad rem? Ego quidem, maxime, reposui, nec in curatione negligendum, sanguinem quamprimum misi, sed, pro ægri ætate & temperamento, parce, & quam in *Angina* fieri solet exquisita, parcius: ea vero copia, quæ ad demittendos cibos, & spiritum recipiendum satisfaceret. Eo vespere *Enema*. Postmodum *Catharticum*.

24. *Rhei incisi* ℥i. *Fol. Sennæ* ℥ii. *Pulpæ Castæ*, & *Tamarind.* ana ℥iii. *Coq. in Aq. font.* ℥vi. ad iii. *Colaturæ* adde *Salis Cathart.* *Elect.* e *Succo Ros.* ana ℥ii f. *Potio*, bene mane ebibenda. Sæpius desurrexit cum levamine. *Gargarisma* resolventem (ex *Ficium pinguium* N. iv. *Rad. Altheæ ras.* ℥ss. in *Aq. Hordeat.* ℥ss. ad i. *incollis*, *Mel.* *Mororum* ℥iii. *Sp. Sulf.* per *Camp.* qu. s. ad acorem temperata) præscripsi, eumque sæpius adhibendum: in potum ordinarium, *Pisnam* propinavi; articulis olim dolentibus, ad *Arthritidem* in eos, siqua fieri posset, invitandam, *Empl. ex Cephalici*, & *Oxyroc.* ana p. æq. admovi. Paucis post diebus, aperto tumore, puris emissa est quasi uncia. Lenito, non composito, sanguinis orgasmo, post breve tempus, articuli dolent, tument, rubent. *Arthritis* recte agit, & *Anginam Arthriticam* fuisse monstrat. Finito paroxysmo, ad *Prophylaxin*, purgatis prius per *Aquas* & *Salem Catharticum* interaneis, *Aquas Diureticas* omni mane hausit; hora decima seq. *Trifolii fibrini Infusum*; quarta pom. *Bolum*, cum *Sale Martis*, demisit; *Hydragogo* septima quaque die interposito, menses binos perstitit; methodumque in multos annos commodissime repetiit.

Eos, qui dolere solent *Arthritide*, *Angina* cum invadit, sitne illa genuina, an *Arthritica*, recte ambigitur; & *Anginam* contra *Arthriticam*, optimis auspiciis, consilio saluberrimo, *Arthritis* invocatur *Regularis*.

HISTORIA VII.

De Arthritide multos annos Erratica; tunc Anginam iterum & sæpius simulante; postremo Regulati Fixa.

Adam denique historiam, tum *Anginæ* hujus nostræ naturam, tum *Arthritidis* morem varium, & incertum, cum primis ostendentem.

Pharmacopæi *Exoniensis*, viginti annos *Arthritici*, uxor fere sexagenaria, *Rheumatismo*, per quinque lustra creberrime recurrente, cruciari visa est: dolore quippe artuum, brachii potissimum sinistri internodia laceffente, rodenti, erratico, vexata: *Rheumatismi* hujus larvati, originem *Pomaceo*, quæ illi potio fuit, acceptam retulit.

Sub finem sæculi superioris, circa vernale æquinoctium, *Anginæ* correpta fuit illa specie, quam *Synanchen* appellant, adeo atroci, ut (ad illam minuendam, humoresque alio detrahendos, etiam in collo *Epispasticum* admotum, alvus enemate soluta, vena semel iterumque pertusa fuerat) toto quadridui spatio, ne hilum quidem victus ore demiserit. Eodem tempore, & pari fœne proportionem, carpo exorsus est tumor, cum dolore, rubore, calore, nitore prorsus *Arthritico*. Dies minimum sexaginta perduravit, in rugas demum contrahente se cuticula, & squamatium ultimo decedente; sic, ut cujus generis, quaque esset familia, tumor omnino palam faceret. Et *Anginam*, & *Chiragram*, ab eadem viscida, & acri gelatina, in sanguine producta, fieri credibile est; quæ hic illic capillaris in-harens, oppilationes, tumores, dolorem, cæteraque morbi utriusque faceret symptomata.

Adversus *Anginam*, cum humores derivantibus, & repellentibus, initio morem gerere recuset, & maturationem affectaret tumor; *Gargarisma* e *Decocto Ficium*, *Hordei*, cum *Melle Mororum* (postea ad detergendum, *Mel* adjectum est *Mercuriale*) in præscriptis dedi: externe vero *Tberiacæ Ven. Empl.* gutturi applicandum. Quicquid intus purulenti fuit, tumore post quadriduum aperto, sensim expressum est.

Contra *Chiragram* imperavi, ut, admoto parti affectæ *Vesicatorio*, vel (quoniam illud abhorreere visa est ægrota) panno molli & denso, per cutim evocaretur quicquid humidi præter naturam articulis inesset. Carpi post paroxysmum mansit imbecillitas, & ad motum impotentia; quæ tamen aliquanto post evanuit: animi vigor & alacritas major, cibi appetitus, uti ab *Arthritidis* paroxysmo solet esse, avidior fuit; sic, ut ex trium pene mensium adversa valetudine, melior ægrota & sanior evaserit.

Ad tollendam utriusque causam, & sanguinem (cujus in cyatho facies sebacea) corrigendum, primum, misso *Pomaceo*, & leni per *Salem Catharticum*, &c. facta *Purgatione Teraxaci Cochleariæque* *Succos* clarificatos, *Lac Asinum*, & *Siomachica* sumeret, imperavi. Medicina vero omni (quod ejus odium fuit) neglecta, insequentem autumno, vagos iterum dolores ægra persensit; qui tamen post progressu temporis evanuerunt, in fixos sensum mutati.

Anginam postea sæpissime recidivam habuit, vere vel autumno quotannis, in annos complures reducem, & vel eia latere conjunctam, vel a tergo famulantem *Arthritida*; nunc carpum, nunc digitum, nunc talum occupantem, κατὰ λόγον aggravantem, cum solita in de-

Hoc vero cum discrimine, & quasi privilegio, quod, ex quo figi occiperat *Arthritis*, eo lenius & pacatius se vaga gesserit, eoque minus vagata fuerit, & quæ diebus hisce fuit huiusmodi *Angina*, fere blandior observata; *Vene sectioni*, *Vesicatoriis*, *clisteribus*, *Gargarismis* facilius cedens, & in *Arthritida Regularem* promptius, & quasi ultro abitura.

Evincit historia, primum, *Arthritidem* multos annos *πλευρητικὴν*, & *Rheumatismi* usquequaque similem, & in *Fixam* posse demum migrare: deinde, in erraticam retrogradi, iterumque desigi. Tertium, *Arthritidem* in eodem corpore, ex eadem febre exoriri posse duplicem; in faucibus *Anomalam*; in artubus, *Regularem*. Quibus hoc adjiciendum, quod ægra, genere nata saluberrimo, cum nullum habuerit a parentibus miasma, itemque diu veteri juncta fuerit *Arthritico*; hoc contentii suspicionem alere censeatur, & *Arthritidis* a marito acceptæ.

Ita quidem *Angina Arthritica*, (morbi, nisi fallor, hæcenus obscuri) secundum illius symptomata, naturam, & morem, quantum in me est, explicui; curationem exaravi; & exemplis utranque illustravi.

C A P U T XIV.

De Dolore Capitis, & Vertigine Arthritica.

Art. I. **A**D Caput jam ascendimus, & ab *Arthritide* factus in eo errationes. Istius autem morborum, uti vulgo describuntur, numerus est adeo multus; *Ætiologia*, tam difficilis; limites, & fines (propter obscuros illius partium, & (a) incognitos usus) explicatione sic egentes, ut nemini mirum videatur, morbos eos communiter receptos, hos a me prolatos non æquiparare. Pauca in apertum proferam *Arthritides*, in capite *Anomalias*; sed, quas exploratas habeo, quas certas, evidentes, & perspectas, *Cephalalgiam* nempe, *Vertiginem*, *Apoplexiam*, & *Paralysin Arthriticam*. De duabus primis in hoc capite, propter earum conjunctionem, sicut evenire solet, frequentem, postea de reliquis verba faciam.

II. Eos sæpe invadit iste Dolor, (nam de illo separatim, & primo loco dicam) qui, cum multos annos *Arthritici* fuerunt, traducto jam vitæ medio, poculis & diætæ nimis amplæ, plus æquo indulgent; exercitationi vero interea, laborique (quæ eorum mala possint corrigere) vix satis: quique ea re *Plethorici* evadunt, & solito crassiores: *Sanguinei* vero quæ ceteris quibuscunque, tum graviter hoc affectu, tum crebro affliguntur.

Ex hisce vero illos sæpissime invadit, qui collo breviori natura sunt; vel qui, in *Capite*, vasa sanguinem vehementia, supra modum magna, habent, vel, qui nimis imbecilla, sanguinique in circuitu propellendo minus valentia: illos scilicet omnes, quibus ea corporis fabrica & compago, quæ humorum in *Caput* inclinationi, diutinaque in eo moræ, nimio plus faveat, openque conferat. Ad hoc conferre non parum videntur, in *Cranio* foramina nimis angusta, quibus (veluti ligaturis) coarctentur *Venæ Jugulares*, & sanguis (sic, ut in *Venæ* sectione) vasa tumefacit; itaque fibras extendendo nervinas, spiritusque in iis contentos perturbando, creet *Dolorem*.

Atqui illos maximopere hic infestat *Dolor*, quando jam ætate grandes, aucta humorum vi & plenitudine simul gravati, simul iis tolerandis impares, illi, malo vehementi pariter, atque intempetivo consistuntur.

III. Sic constituto, & ad morbum hunc excipiendum aptato corpore, cogitare licet *Ανεπιτήδεον* id, quæ est *Arthritidis* causa proxima & conjuncta; post aliquam a paroxysmo quietem, iterum repullulans, se iterum movens, & attollens, itaque orgasmum in sanguine faciens, eo nonnunquam ipso (pari ferme ritu, ac in variolarum initio solemne est) *Dolorem* excitare; *Membranas* scilicet nobiles, tam intra, quam extra calvariam, aut *Tunicas Vasorum* membranaceas extendendo, *Spiritusque* animales, earum *Fibras* incoherentes, irritando vexandoque. Nonnunquam evenire potest, ut, in his *Membranis*, acutissimo sensu præditis, depositum miasma, virulentum & acre, pungat eas, atrodant, atque ea ratione faciat *Dolorem*.

Quocunque vero modo fiat *Dolor*, omnino palam est, eum miasmatis, sese in paroxysmum erigentis, signum esse non raro primum, & prænuntium, ad dies aliquot durare, & tunc in paroxysmum desinere regularem. *Arthritide* vero delinquente, & accessiones sive nullas, sive languidas iterant, *Cephalalgia* sæpe oritur gravis & diuturna, ægrum hebdomadas (ne dicam, menses) aliquot excruciat; & denum nisi miasma ad artus transferatur, vel a capite alias abducatur, *Apoplexiam* introducit.

IV. At de natura ejus *Arthritica* ut plane constet, non solum ex *Arthritidis* silentio defectuque oritur, (quod tamen unum magni hac in re momenti est, multumque valet) verum etiam pro miasmatis *Arthritici* renovatione, incremento, & in paroxysmum eruptione, renovatur, periodos easdem, quas *Arthritis* ipsa, servat, frequentissime in eam regularem, & genuinam migrat; & quidem raro finitur, nisi per regularem paroxysmum, quo quidem oriente statim evanescit) vel per *Apoplexiam*; quibus simul sumptis, morbum hunc miasmatis *Arthritico* in caput irrepente nasci, nihil, ut opinor, indicio potest esse luculentiori.

Dolor ille non semper magnus, sæpe tolerabilis, sed dierum sæpe multorum; interdum autem pene ad delirium usque gravem observavi, patientia majorem omni.

V. Quanquam iste *Dolor* insultum aliquem *Arthriticum*, & quidem vitæ regularem, vel *Apoplexiam* antecedit; interdum accidit, ex regulari paroxysmo, (repellentibus, vel animi pathemate, aliave aliqua causa interciso, & abrupto,) enim excitari, mediaque naturæ opera, & molimine, primum apparere. Quod tamen eodem pertinet, quando utroque casu miasma, minime, sic, ut debuit, expulsum, *Capiti* inflicum est, in illud vires exercet, & *Ολίγη δόματα ναίει*.

VI. Nonnunquam ægrum hæc *Cephalalgia* per se laceffit; identidem *Vertigine* comitata: hæc enim illi est tanquam soror gemina, & comes fere individua. Adhuc aliquando accedunt tinnitus aurium, spirandi gravitas, pulsus magnus, artuum dolores vagi, faciei color saturator, aliqua istiusmodi manifesta sanguinis *Οργασμοειδή* indicia: quæ quidem omnia, ut ab *Arthritide* inertis, neque satis idonea proficiuntur: ita quamprimum illa artus occupaverit, & ad tempus aliquod recte se gesserit, confestim ea, simul cum

Dolore capitis, redeunt; neque aliam videre licet *Arthritida*, quam quæ ex omni parte regularis.

VII. *Vertiginis Arthritica*, sicut omnis, *Subiectum* est ea *Cerebri medullaris* pars, quæ cogitandi officina est: in qua, dum spiritus animales ejus instant tubulos, & in iis sese movent, uti placuerit *Anima Rationali*, (cujus sub præsidio, nutu, & imperio, totum illud *Cogitationis* opus efficitur;) hi eorum motus; sive pleno flumine, sive tenui; sive in tubulis pluribus, sive paucioribus; sive prorsum, sive retrorsum; sive magno cum impetu, sive remisso; sive inflectione, sive evolutione; sive denum alio quocunque modo, & figura ferantur illi, ipsæ videntur hominis, & valentis, esse *Cogitationes*; & pro harum varietate talem in numerum variari, ut, quo singula *Cogitatio* formetur exprimatque, suis singulæ spirituum rite ordinatorum, & huc illuc rite fluitantium, *Motus* respondeat.

Hoc ut clarius ostendatur, quivis seipsum examinando facile perspiciet, quanta sibi in somno tranquillitas, quam alta quies, & a sensu motuque omni voluntario (in somno, veluti in ipsa morte) vacatio. Contra, somnum excutienti palam est, primum omnium in cerebri medullis derepente quoddam micare: eodemque ipso temporis articulo, *Cogitandi* solitum munus, & pensum instaurari. Prima vero *Cogitatio*, vel pro re nata omnino nova est, & jam tum incipiens; vel (quod ad hujus rei explicationem non parum confert) quæ somno interrupta quarum prior modulationi, organis pneumaticis inchoatæ, quodammodo similis videtur; posterior interciscæ, & medio systemate fractæ; sed aliquanto post elaboratæ, & ad finem perductæ. Atque istam in cerebro spirituum *ἐκλαμψιν* illico sequitur (nonnunquam comitatur) motus ab ea propagatus, in corpore muscularis, & (b) *Galeno* jam olim observante, *Qui expergiscuntur, e vestigio pulsus magnos, vehementes, celeres, & cum quadam vibratione habent; qui mox mediocritatem assequuntur*.

Quis autem unquam, in somno spiritus extingui, & ad nihilum redigi putavit? Annon potius credendum est, durante somno in medullaris *Cerebri* tubulis eos stagnare, & (tanquam aerem, in tibiis organi silentis) quiescere; micantque istud, quod expergiscientes primum sentimus, horum esse *Spirituum* in iis (ad instar venti, in tibiis organi) *Motuum*; & quod erat explicandum, *Cogitationes* humanas nihil aliud esse, quam *Πνευματικὰ*, sive *Spirituum animalium* certas quasdam, in tubulis prædictis, *Fluctuationes*, secundum leges, & regulas, ab *Anima Rationali* positas, & datas.

VIII. Hisce præmissis, altero jam loco dicendum est, in *Vertigine* spiritus animales cogitandi munere exequendo impediri; in rivulis a suis aliquot ordinandis, eorumque motibus regendis, interturbari; eumque in modum perverti, qui externa quæque *Objecta*, tanquam in gyro circumacta, repræsentet, itaque, ut ex eo fallatur *Imaginatio*, *Judicium* autem maneat integrum, & inconcussum. Perinde forsitan, ac in modulamine faciendo, si una, vel altera organi tibia, rauca fuerit, & dissonans; ex illius vitio, (tametsi reliquæ omnes claræ fuerint, & illæ, &) statim auribus peritis gravitas quanta maxima sit, harmonia perimitur.

IX. Scio nonnullos, arte nostra principes, hac de re aliter opinari; spiritusque animales, acie quasi militari, & veterum itionum reditionumque tractibus relictis, in gyrosagi, tradentes, per *Rotationem*, & spirituum *Είληπτον*, *Vertiginis* modum & naturam explicare. Cum vero, quo in campo eorum acies instruantur; quo, eorum fiat *Ανέξια* nulla unquam detexit Anatomie: contra vero, *Cerebrum Medullare* totum, ex *Tubulis*, sive *Ductibus*, in *Cerebri* *Cortice* incipientibus, una hoc loco colligatis, & in *Nervos* infra divisus, & dispersitis constare; sicque spirituum gyris, & vorticibus, (aliter quam in *Tubulis*, qui quidem iis admittendis minime sufficiant) ineptum esse, quando Clarissimi *Malpighii* Anatomie detexit oculatissima; longe satius videtur, per *Tubulos*, perque spirituum in iis motus, quales in rerum natura esse, pro certo habeamus; (etst, quis spirituum motus cui conducatur *Cogitationi*, prorsus ignoretur,) quam per ea, quæ nusquam inveniuntur, aut esse judicentur, morbi hujus explicationem aggredi.

Quinimo, dici potest, rerum extra sitarum, totiusque hemispherii visibilis, per ea, quæ sibi sunt dissimilia, veras intus in *Cerebro* posse fieri repræsentationes: (nisi velimus, objecti *Viridis*, v. g. concipiendi ergo, *Viride* quoddam in compendio; sicque *Rubri* ergo, *Nigri*, &c. in *Cerebro*, quo nihil unquam absurdum, statueret) eoque posito, rerum externarum falsas imaginationes, quales sunt in *Vertigine*, per iis rebus dissimilia posse fieri dicamus; adeoque, ad earum in gyro & circuitu moventium imaginationem, etiam falsam spirituum in cerebro motu simili nequaquam opus esse.

X. At qualescunque fuerint eorum motus (neque enim in his *σοχασμοίς* diutius harere lubet) certe perturbari possunt; vel per alienum & inimicum aliquod, in *Cortice Cerebri* a sanguine depositum: hæc in penetrabilia, & sacrosancta adyta, se insinuans, *Spirituum* choro se immiscens; ad eos adhærescens; eosque inter se confundens: vel, per vasa sanguinem vehementia, in propinquo tumefacta, tubulosque spiritus continentes coarctantia. Quæ posterior ratio probabilior est; in *Vertigine* cranii depressionem excipiente; ubi angustiis *Spiritus* urgentur, nec, quo possint choreas exercere, theatro satis spatiofo gaudent. At in *Vertigine* variolas antecedente, vel ab ebrietate, & in hac nostra *Arthritica* locum obtinere potest (uti videtur) utraque.

XI. Præterea *Vertigo* hæc, cum *Dolore Capitis Arthritico*, concordat ex amussi: similia namque cum eo corpora, crassa nempe, plethorica, maximeque senilia, invadit: similem habet originem, ex miasmatis *Arthritico* repullulante, cristas erigente, fugam e sanguine conscisciente: similes habet periodos, & typos, *Arthriticis* paroxysmis respondentes, eosque in nonnullis ægrotantibus numero permultos: similes habet comites, sive signa *Συνεδρεύοντα*, dyspnœam, capitis gravitatem, aurium tinnitum, spirituum depressionem: similem etiam exitum, cum paroxysmo plerumque regulari terminetur; interdum *Apoplexie* cedat *Arthritica*.

Aliquando levis hic affectus, & *Arthritidis*, paroxysmum molientis, signum insuper primum, & prænuntium. Molestus sæpe sic, ut eo laborans, ne in humum cadat, baculo adniti; fere continuo cavere, necessum habeat. Quæ levior est, *Arthritide* regulari, se-

(b) Τῶν δ' ἐξ ὕπνου μεταπεπτακότων, εἰς ἐγρήγορον ἀδραχρήματα μεγάλοι, καὶ σφοδροί, καὶ ταχεῖς, καὶ πυκνοί, καὶ τινὰ κλόνον ἔχοντες, μετ' ἐλπίον δ' εἰς συμμεινίαν ἔρχονται. De Causis Pulsuum, Libro tertio, Cap. x.

(a) Vide Clariss. Stenonis, de Cerebri Anatomie Dissertationem, impressam Lug. Bat. Anno 1671.

rius aut citius erumpente, fere concluditur. At quando nulla venit in tempore *Arthritis*, *Vertigo* interdum aggravescit, & deinde paulo post in *Apoplexiam* migrat. In *Epilepsiam*, utpote morbum confinem & proximum, *Vertiginem* mutari exquisitam, a Medicis passim observatum est; at in eam mutari *Vertiginem Arthriticam*, ex nostra, vel aliena observatione, ne semel quidem novi, ut *miasma Arthriticum Epilepsiae* generandæ minime aptum existimetur.

XII. Curatio partim fit per ea, quæ utrisque his affectibus sunt communia; partim per iis propria. Inter communia, primum *Phlebotomia* consideranda est, quæ, ut humoribus e *Capite* derivandis, tam repentino, quam magno est auxilio, sæpe comoda reperitur, & ubi *Dolor Capitis*, aut *Vertigo* isthac urget, maxime vero ubi oculorum caligine, faciei rubore, arteriarum in temporibus pulsu, & ejusmodi (quæ sanguinis ad *Caput* inclinationem indicant, & *Apoplexiam* minantur) aliis comitatur, apprimè necessaria est: Ea vero ratione copiose (quod in malis similibus alias sæpe dixi) mittendus sanguis, non qua vulgo in his affectibus absolutis, & minime *Arthriticis* soleat; sed qua, *Arthritidi* in artus abigendæ faveatur; nec, quam ad *Caput* allevandum opus fuerit, uberiori.

Pertusa vena, & orgasmo in sanguine novo, *miasma* expellente, facto, nonnunquam illico dolent articuli; sin aliter fuerit, *Purgatio* instituenda est. Si qua ventriculi querela sit, hoc tempore *Vomitus* moveatur, & quidem per *Decoctum Teæ*, vel *Possetum Carduatum* aptissime. Ea vel peracta, vel (tamquam inutili) prætermissa, protinus ducenda alvus; dato, in eum finem, e *Pil. Russi*, vel *Cochiæ min.* vel e *Duobus*, una cum *Res. Jal.* granis aliquot, purgante, quod nimirum intestina non solum inaniat, verum etiam sanguinem exagitet, turbet, & a *miasmate*, foras illud expellendo, liberet. Opus istud duplex (humores alios per alvum evocandi, alios in venis agitandi) interdum mitioribus, in constitutione scilicet tenera purgatuque facilis, perficitur. Interdum *Aquæ*, sive *Alfordenses*, sive *Fontana*, *Sale Cathartico* saturata, rem conficit. Est ubi *Purgatio*, sive propter ejus lenitatem, sive propter humorum colluviem, una vice non sufficiat, atque pro re nata repetenda sit, ita vero ut *Arthritidi* vis *æthereæ* affigendæ accommodetur.

Purgationem, uti par est, factam creberrime sequitur extremitatum dolor; At si usque se *miasma* in sanguine contineat, usque delitescat, turbis in eo intestinis & ciendis, & augendis, quam exilio, pro naturæ jussu, capessendo pronius; hoc casu, ea, quæ ore sumpta fortius *Podagram* expellant, quæque extra admota evellant, usurpentur. Quæ vero, ore data, *Podagram* expellant, non nisi caute (præmissa nempe venæ sectione, alviq; ductione, & *Capite* multum iis sublevato) adhibeantur; ne, quæ sanguinis, & simul cum eo *miasmatis*, in artus extrudendi causa præbeantur, contra in *Caput* utrunque pellant; itaque malum intendant, & mortem arcescant. Et quidem, a *Chalybeatorum* potentissimorum, & *Arthritidem* maxime expellentium usu, manum idcirco melius abstinere possumus; quia *Cephalica*, mox dicenda, suoque tempore propinanda, istorum medicamentorum magna ex parte vices supplere judicentur.

Qua de causa, in *Dolore Capitis* (ut ad propria descendam) *Pul. e Chel. C. C.* vel e *Corall. r.* e *Chel. Simpl.* *Succini albi*; vel istius classis alii mitiores, sive per se, sive cum *Conserva Anthus*, vel *Conf. Flor. Betonicæ*, & *Syr. Stæchados*, vel *Syr. Pæon. Simp. sub forma Boli*, aut ex iis *Pulveribus*, una cum *Pul. dictamni Cretici*, *Castorei*, vel *Sem. Pæon. & Extracto Gentianæ*, *Pilulæ* componi possunt. Quinetiam hinc, sive *Bolis*, sive *Pilulis*, tuto interdum, & utiliter adjicere licebit. *Salis Martis* (vel etiam *Alcohol. M.* post evacuationes copiosas) gr. iii. vel iv. & compositionem, sexta, vel octava quaque hora, repetere. Omni autem ejusmodi dosi superbibere oportebit *Julapii* (ex *Aqua puta Cerasorum nigr. Flor. Tilie*, *Pæon. simp. & Comp. & Spiritu Lavend.*) *Hauslum*: Mediis autem intervallis ex usu erit *Tinctura Succini*, vel (ubi febris, non immodica, fiverit) *Sp. Vol. Oleos.* vel *Sp. C. C. cum Speciebus destillari*, guttas aliquot, ex *Cacuminum Salvia tenuifol.* vel *Rorismar.* vel *Teæ*, infus. *Hauslu* demittere. Hæc enim remedia, præmissis universalibus adhibita spiritus animales blande resciant, & *Arthritidi* in artus expellendæ quodammodo opitulantur. Neque *Coffeæ Sorbitio*, quando *Cephalalgia* ritu singulari medeatur, præcipue si *Cephalica* ei superinjiciatur, ægrotis hinc deneganda.

Simili fere modo in *Vertigine Arthritica*, post evacuationes jam dictas universales *pul. Sem. Rutæ*, *pæon. maris*, *Castorei*, *Rad. Valerian.* *Sylvest. Cyperi*, *Cort. Vvinteran.* *Cort. ext. Aurant.* *Species Dianthus*, *Diamosch. dul.* per se possunt adhiberi, vel eorum aliqua cum *Conf. Flor. Pæon. & Syr. eorum*, vel *Syr. N. Myrist. ex Indiis allato*, electuarii forma. Porro ex *pul. de Gutture*, & *Ente Veneris*, cum *Extr. Calami Aromatici*, vel *Assæ fætidæ solutione*, formentur *pilulæ*; vel, cum iisdem pulveribus adjungi potest, in eadem forma *Sal Martis*, vel *Sal Succini*. Ex his composita sumantur, hora quaque sexta, vel octava, dosi videlicet adeo tum frequenti, tum etiam magna, quæ spiritus animales ordinet, recreetque, non quæ confundat, irritetve. Dosi vero cuilibet æger superbibat *Julapii Cephalici* *hauslum*: uti mediis etiam intervallis *Infusi præscripti* cyathum, cum *Tinct. Succini* guttis aliquot. Profunt graveolentia naribus admota, *Sp. Salis Armon. cum Sale Tartari*, *Castoreum*, *Assa fætida*, &c. profunt etiam *Evdia*: *Balsamum*, quod ab humanissimo fene, D. D. *Vvatherouse*, hac in urbe Medico, dum viveret, præcellentissimo, communicatum fuit, ad tempora & nares inungendas, his aliisque *Capitis* affectibus quamplurimis, utile & jucundum erit.

24. *Ol. Rorismar. Lavend. Majoran. Thymi, Origani, Hyssopi Chym. ana* ʒj. *Cinnam. Aurant. Angelicæ, Rutæ ana* ʒʒ. *Garyoph.* ʒʒ.

Ol. Nucis Moschat. per express. ʒiv. *Ambra gris.* ʒij. *Moschi* ʒj. *Bals.* Per. ʒv.

Ambra gris. & *Mosch.* ponantur super *Lapidem marmoreum*; humectentur *Oleis*; & simul triturentur *Lapide molari*, donec fiat *Massa*, instar *Pomati inspissata*. Huic mixture adde *Bals.* Per. Per *horæ dimidium triturentur*. Deinde adde *Ol. N. M.* per *Expressionem*, & per *horam* fiat *Trituratio*. In *phiala* servetur usui *balsamum dædes cephalicum*.

Quamquam autem ista *Caput* multum allevent, spiritusque labentes suscitent, non iis solis adhibenda fides. Nusquam major incolumitas, nulla perfectior curatio, quam per *Arthritidos* in artus expressionem. Quare, post diem unum, aut alterum, *Cephalicis* ore sumptis impertitum, in utroque hoc affectu (par enim utriusque *Sydenham Operæ Medica*.

que ratio) *Externa*, quæ *Arthritidem* educant, adhibeantur *Articulo* nempe sæpissime dolenti applicetur *Empl. ex G. Carannæ part. ii. Cere flavæ p. j. Ol. Lumbric. q. s.* vel aliud aliquod *Αντιarthriticum*. Hoc autem si nullarum erit virium, & *Capitis* affectus remanebit, maxime, si increscet, tanquam in *Apoplexiam* abitura, ad *Sinapismos*, *Vesicantia*, *Vestitum laneum*, & *Laqueos* hac in re idoneos, (quibus *Arthritis* summopere educatur) quasi ad sacram anchoram, confugiendum est.

Quam parum autem adjuvent in utroque hoc affectu; imo quam suspiciosa, ne dicam periculosa, sint *Emulsa*, *Decocta refrigerantia*, *Narcotica*, *Oxyrrhodina*, *Epithemata*, *Capitis Aqua frigida Lotio*, & ejusmodi alia, quæ ad compescendum sanguinis orgasmum alias cum fructu usurpentur, facile apparebit; quando illa materiam alienam, protinus evocandam expellendamque, medicina prorsus adveniente, & repugante, *Capiti* infigant. Neque satis, ut opinor, tutus sanguinis per *Hæmorrhoides* ductus; quando eo, nimia fit humorum in anum derivatio, quæ vel *Inflammationi*, vel *Fistulæ* viam aperiatur.

Ut autem materia vitiosa, tutelæ ergo, præscindatur, alioque divertatur, operæ pretium erit, *Epispasticum* brachio, vel cervici aliquando imponere; ineunte anno, (quod *Apoplexiæ* tempus esse solet) aliasve, si urgebit *Capitis* affectus, sanguinem detrahare: *Purgans*, omni mense, repetere: alvo nunquam diu astricta esse: artus, at præcipue pedes calidissime vestire. Quin & his hominibus incumbit *Errhinis*, & meditationibus, religiose vero nimia potatione, abstinere.

HISTORIA I.

Ab ignava Arthritide Vertigo, Sanguinis missione & Alvi ductione, victa.

Quidam annos quatuor supra quinquaginta natus, *Vertigine* affectus, dum in his lucubrandis occupor, e vicino oppidulo me appellit. Fuit ille jamdiu *Arthriticus*, paroxysmos habens, sive eorum frequentia, seu severitas inspecta sit, idoneos. Autumno anni MDCCV. *Arthritis*, ignava jam & socors facta, non eo, quo solebat, ardore & vehementia se gessit; paroxysmum, uti moriserat, laudabilem non ullum edidit; verum, in mediocri & imbecilli edendo, languide enixa est. Loco paroxysmi regularis, & acuti, *Vertigo* ægrum invasit, multumque cruciavit. Quoties enim lecto ille jacuit dextro latere, statim *Vertigine* prorsus intolerabili (quippe qua universa sursum deorsum rapidissime ferri viderentur) tanquam oppressus, & pene moribundus, posituram corporis illico mutare necessum habuit. Porro ea fuit hominis fabricatio, quæ plenum, subpinguem, brevique collo donatum eum, morbis cephalicis pronum, & proclivem abunde redderet.

Sic constituto snasi, ut quam citissime venam incideret; *Pilulis Purgantibus* (e *Rudii ʒʒ. Res. Jul. gr. v. Calom. ʒʒ. Balsam. Per. q. s.*) Ventrem inaniret; itemque altera vice, pauculis post diebus, nisi dolor *Articulorum* novus id vetaret. Eo vero redente, parti affectæ *Empl. e Cephalici*, & *Picis Burg.* æquis ponderibus, imponderetur. Detracto sanguini, & parumper in cyatho quiescenti, superincrevit gelatina densa, crassa, cum superficiei flavescente.

Præceptis æger obtemperavit, & quidem magno suo, quod deinde accepi, commodo.

HISTORIA II.

Vertigo Arthritica, Purgatione in Podagram mutata.

Urifaber *Exoniensis*, vir priscis moribus, *Integer vitæ, scelerisque purus*, ætate progressus, & ex ea nimis desidiose acta, crassior jam & habior factus, de nimia plenitudine, & ad motum impotentia, de *Vertigine* gravi & urgente (quæ in negotiis obeundis magno illi jam impedimento fuit) me consuluit. Cum *Arthritidem*, hujusmodi deviam, & *Anomalam*, me plus semel observasse recoluerim. Num articulis unquam ægrotaverat? Interposui. Olim sæpissime, respondit æger: hosce vero annos minime.

De morbi indole & natura certum me habens, ut eum a *Capite* deducerem, & in articulos, sedem & domicilium suum abire facerem (quæ quidem indicatio rectissima esse videbatur) viam, atque in *Vertigine* absoluta, calcari aliam oportere judicavi.

Quare sanguinis detractione (quæ propositum alterum tantum promovere solet, alterum autem interdum inhibere) prætermissa, *Catharsin*, quæ utrisque illis satisfaceret, institui, purgante, pro *Koiliæ εὐλαστία*, satis forti ad eam rem electo. *Calomel. gr. xv. Scammon. pul. ʒʒ. Pii Stom. cum G. ʒʒ. cum Bals. Per. q. s.* pilulari forma, mane demisit: sæpius hinc dejecit; hinc claudicavit; hinc convaluit.

HISTORIA III.

Vertiginem, & in Capite Dolorem faciens Arthritis, idque usitate, Venæ sectione, & Purgatione toties in Articulos acta.

Romatarius hac in urbe, constitutione sanguinea, plethoricus, sexagenario major, anno MDCXCVI. *Vertigine* laboravit. Simul atque eum novi pedibus sæpe doluisse, suspectumque habui capitis hunc affectum esse *Arthriticum*; hac re considerata, primo, sanguinem detraxi; deinde alvum semel iterumque movi: postremo, animales spiritus quæ rescierent, eorum *Αντίος* inhiberent; ea suo ordine sumenda; fonticulos etiam utroque latere spinæ inter omoplatas aperiendos, imperavi. Quæ autem inde fruges? Pes iterum jam tum doluit; defensum est *Caput*; civis servatus.

Anno proxime sequenti, circa vernal æquinoctium, idem pene casus altera jam vice accidit. Intermittente enim, ultra quam solet, *Arthritide*, rediit *Vertigo* cum *Dolore Capitis*: quæ quidem ambo venæ sectione, purgatione, pharmacisque jam dictis, in *Podagram*, (qua nihil capiti salutaris esse potuit) acturum mutabantur.

Æstate anni MDCCII. æger iterum *Vertigine*, simul cum aurium tinnitu, spirandique difficultate multatus est: quæ quidem mala, plenitudine & *Arthritide* nimis inerti nata, post venæ sectionem & catharsin, articulari dolore finire.

Observationibus hinc toties iteratis, planum omnino factum est,

est, *Arthritida* suppreſſam, & a paroxyſmo quieſcentem, *Caput* aliquando viſitare; quin etiam dereliſtum illud, præ cateris in trunculo locis quibuſcunque, tanquam alteram domum frequentare. Porro, cum in alieno iſthoc, utut charo, & amabili loco diverſetur, poſſe in ſedem primariam, in artus, & articulaſcentia revocari. Denique nonnunquam (in iis ſcilicet ægrotis, qui firmiores, & multo robore valentes ſunt) per venæſectionem, & purgationes, quibus ſibi reſtitnatur, & ſuis viribus uti, ſuoque modo agere permiſſa ſit natura, ſine multo *Ποδαγραγωγόν* apparatu, poſſe egeri,

HISTORIA IV.

Capitis Dolor & Vertigo Arthritica, ſæpe revertentes, ſimili methodo curati.

Medicamentarius *Exoniensis*, quo multos annos utor familiariffime, *Arthritide* diu regulari affectus, ſub exitum ſæculi nuper elapſi mitius ſolito, rariuſque cœpit dolere. Malorum ex eo tempore ſtatim crudele, par exortum eſt; *Vertigo* nempe, cum *Dolore Capitis* acuto, vel, ægrotum eo deficiente, cardialgia, cum ruſtu acido, & inflatione ventriculi.

Biennio poſt, cum *Arthritide* nimium ignava eſſet, nec, ut opus fuit, paroxyſmum ageret, *Κεφαλαλγία* rediit, una cum vagis artuum doloribus, & quidem pedum incertis.

Quid autem annos dicam? Decies ego minimum, hunc hominem hac *Vertigine* laborantem vidi: decies eum mœſtiſſime querentem audivi. Quando enim *Arthritide* multum affligeretur, neque ea ſemper regulati; quali eo modo ſe plerumque geſſerit, hiſce paucis accipite. Præceſſit dolor, hic illic erraticus, per artus, per trunci ambitum propemodum omnem: hunc excepit, ita vero, ut illius ſere latus clauderet, torpor, & univerſi corporis gravitas; cum *Ανορεξία*, ſanguinis orgasmo, & tumultu, venarumque diſtentione. His acceſſit alias articularum, alias *Capitis Dolor*, & deinde *Vertigo*. Tam autem magna, tamque moleſta *Vertigo*, ut, qua in præceps ne ageretur, ſæpe haud immerito pertimeret. Ægroti autem forti, robuſtaque, & omnino ſitna conſtitutione præditi, ea fuit felicitas, ut, poſt dies quatuor, vel quinque, *Arthritide* ſæpe per ſe *τὰ Ἀκρὰ* peteret, eodemque tempore *Caput* defereret. Si quando gravius urgere, diutiuſque *Vertigo* perſtare contigerit, quod aliquoties accidiffe novi; venæ ſectione & purgatione, (altera earum, vel utraque) in articulos ſemper exulavit. Cui & hoc adiciendum, nunquam ægri, ſeu *Vertigine*, ſeu *Dolore* afflicti, *Caput* ex toto immune, & incolume prius reddi, quam in *Articulis* dolor oboriretur; eo vero jam oborto, liberari ſemper, & tanquam auxilio præſentiſſimo & plane divino, iſthuc incolume reddi. Qua utique re; ad iſtarum *Anomaliarum* & explicandam *Ætiologiam*, & confirmandam *Therapiam* (ut ego quidem ſentio) nihil magis poteſt conducere.

Cauſam autem ne ſilentio præteream, quare ſanguis in hoc ægroti toties, & tanto impetu in *Caput* irrueret, vel impelleretur; ipſa *Facies* eam monſtravit: *Facies*, inquam, hominis pyropi ruberrima, venis ubique turgidis ſignata, ſanguine pleniffima. Quæ cum ita ſe haberet, vaſa, in *Capite* ſanguinem vehementia, ſupra modum magna, & immenſo ejus flumine, quod utrique iſti *Anomalie* daret originem, diſtenta eſſe indicavit.

HISTORIA V.

Cephalalgia Arthritica, *Vene ſectione* & *Spiritu Volatili*, in *Podagram verſa*.

CUM vitam aliquot ante annis Academicam ſecutus ſit, quidam e proximo vicinus, oppidanus, ebrietati ſatis, ſocordæque ſatis deditus, (quarum altera vini humorum magnam in corpore congerere; altera non eliminare ſolet) opem meam qualemcunque medicam imploravit. Erat illi, propter malam vitæ rationem, corpus craſſum, *Cacochymicum*, pingue, morbo non unius generis accipiendo paratum: ita vero conſtitutum forte fortuna invaſit *Arthritide*, & a malis gravioribus, tanquam poſſeſſione ſuum, defendit. Semel, bis in anno paroxyſmos, eoſque ſatis longos, & acutos celebravit; perque omne illud tempus abſtinere fecit ægrum. Demum, neſcio qua de cauſa, *Arthritide* intermiſit. *Cephalalgia* ſtatim orta fuit acris, & toleratu difficilis. Membras *Capitis* majores contrahi, & in ſpaſmos obſtinate conſtringi, veriſimile eſt. Enim vero tantus ægri fuit cruciatus, quantus omnem modum excedere, quantus ſenſum communem obruere, & pene delirium inferre videretur.

Hæc ut primum novi, & ab *Arthritide* interrupta, devia, & in *Caput* inverſa, turbas has oriri intellexi; ſanguinem extemplo mitteri, & quia conſtanti vir ætate, firmoque corpore erat, non nimis parce detrahi præcepi. Spiritum poſthæc & volatilibus, cum vehiculo conveniente, dedi. Quam quidem medendi viam ideo calcavi, primum, ut alienum & capite revellerem; denique, ad *τὰ ἔξω* amandarem, iſſique figerem. Neque a ſcopo aberravi; hac enim medicina factum eſt, ut dolerent, ut tumerent, utque ruberent iterum articuli; & quidem (ut illa facta eſt) ſtatim, maximaque ægri cum utilitate.

HISTORIA VI.

Miasma Arthriticum in Caput immiſſum, eique Vertiginem & Dolorem inferens, eo repulſum, & in artus mandatum.

Tenera conſtitutione mulier, frigida *Arthritide*, & languenti creberrime affecta, tumorem ejus pallidum, tanquam a ſtatu generatum, in utraque manu, & carpo, magnum oſtentavit. *Arthritide* ſic gravatæ profeſſo male evenir, animi *Pathemate*, propter res quaſdam adverſas, ſupra modum affligi. Eo enim effectum eſt, non ut ſpiritus ſolum perturbarentur, multumque deprimerentur; verum etiam ut rumores hi *Arthritici* proſus ſubſiderent, evaneſcerent. *Vertigo* ſtatim hinc exorta eſt, una cum *Dolore Capitis* & *Colli*, cum ſomno non tantum injucundo, ſed inquieto, tumultuoſo, & frequenter interrupto. Quæ quidem mala, ſi ex omni parte *Hysterica* dicantur, temete nimis & parum conſulte (quod

utique rei exitu probatum) id dicetur. *Epispasticum Nuchæ Cervicis* impoſitum eſt, deinde utrique brachio; quibus ſeri multum evocatur. *Pilule* ſumuntur *Aloeticæ* (ex *Aloes Roſat. ʒj. Pil. e duobus ʒſ. Ol. Abſynth. gr. i. El. prop. q. ſ.*) quibus alvus inanita, ſanguis agitur. *Spiritu C. C. ſuccinato*, bis in die cum *Jalapii Cephalici* hauſtu, & *Pulvere Podagram* expellente (*Chalybis* nempe *Nutriti ʒſ. Pul. e Chel. C. C. ʒi. Mucoris Pul. gr. iv.*) pariter bis die, cum *Vini Canarini* hauſtu, per dies circiter decem aſſumpto, factum eſt, ut denuo rumores, & quidem intra breve ſpatium, eleventur; ut *Arthritide* procul a locis principibus arceretur; ut partibus a centro vitæ remotis infigeretur, & detineretur. Qua vero ratione gradibusque ſunt hæc effecta, *Cerebri* incolumitas effecta, ipſius vitæ res ſervata eſt.

HISTORIA VII.

Caphalæa & Vertigio Arthritica, *Medicina pari*, cum *Phœnigmis*, ſublata.

VIR reverendus, ætate conſtanti, doluit *Arthritide*; nunc vaga, per hæc illa membrorum internodia; nunc articulis affixa, dolore, rubore, & tumore comitata. Primo ſupra decimum exeunte luſtro, *Cephalalgia* & *Vertigine* laboravit, tum gravibus, tum diutinis. Cum me, conſilii ergo, primum arceſſiverit, ex conſtitutione ſanguinea, vultuque florido judicavi, plenitudinis, & quidem ejus unius, has eſſe ſoboles; itaque ſola evacuatione poſſe eas auferri: quam ramen (excuffa omni re, & initio cum ægrotante colloquio, penitus examinata) ſententiam mutare neceſſum habui, & alienam, & *Arthriticam* in *Caput* irrepere materiam, apud animum meum ſtatuerem.

Hoc igitur propoſitum ante oculos ſtatuens, venam primum incidi, & minore quantitate, quam in his affectibus abſolutis conveniret, detracto ſanguine; *Emeticum* præcepi; poſteaue *Purgans*. Quibus malum quando leniri, minime vero tolli perſenſeram, *Pilulas* (ex duobus, & *Ruſſi*) draſticas adhibui, ut in ſanguine major orgasmus ciceretur, & alienum proſcriberetur. Poſtridie purgationis, ut humores excitati, foras avellerentur, ſuiſque denum locis, nempe *Articulis*, infererentur; curæ mihi erat, utrique malleolo, quem *Arthritide* locum uſitatiſſime frequentavit, *Sinapiſmum* (ex *Fermento veteri*, *Raf. Radicale*, *Sem. Sinapios*, *Cacuminibus Ruta*, & aceto *Vini albi*) applicare.

Atque iſta methode in *Cerebrum* inſinuantem, *Arthritida* revelli; proprio loco (nempe *Artubus*) mandavi; ſuos intra terminos, ſua ſpatia coetui; ægrum ſanavi.

HISTORIA VIII.

Vertiginis Arthriticæ, cum *Spirituum depreſſione gravi*, *Curatio*.

CIVIS *Iſcanus*, *Arthritide* regulari, quotannis redeunte, per ſenectutis initium, eſt afflictuſ: ſexagenarius autem, vel eam circiter ætatem, paroxyſmos habuit rum paulatim minores, tum etiam rariores, demum nullos. At brevis iſta fuit ſerenitas, & ab adverſa valetudine vacatio; uti etiam dubia: malum *Arthritide* gravius ſucceſſit, longeque periculoſius; *Vertigo* nempe, cui deinceps comitem ſeſe dedit *Depreſſio* ſpirituum ſuprazodum moleſta, continua.

Cum ita affectum inviſerim, pulſum magnum, & elatum obſervavi; ac ſi inſtaret *Apoplexia*. Quare venam illico pertundi, ſanguinemque ea quantitate detrahi, qua *Capiti* levamento eſſet, juſſi. Porro, quoniam iſti *Capitis* affectus non tam abſoluti, quam *Arthritici* (quod ex malorum ordine vel ipſi ægro, rei medicæ non ignaro, patuit) exiſtimari poſſent; quo *Arthritide* educeretur, *Phœnigmm*, ex ea evelentibus, acerrimum, & calidiſſimum, utrique malleolo, quæ *Arthritidis* in hoc ægroti ſuere ſtativa, impoſui; frigidum, altera quaque hora, renovavi; tumoribus, eo factis, *Epispastica* admovi; unde ſeri acris, ſalſi, vitioſi, *Arthritici* mulrum eſt elicitum. Æger ex eo tempore convaleſcens, annos egit poſtea permultos, eoſque pro ætate ſatis beatos, & tandem morbo, uti accepi, nephritico occubuit.

HISTORIA IX.

Ex Arthritide Vertiginosus, *Viſtu nimis tenui depreſſus*, & *vivis exceſſit*.

VIR mihi conjunctiſſimus diu bona valetudine uſus, ætate adulta dolere cœpit *Arthritide*; quæ, propter multas equitationes, & laude dignam in viſtu temperantiam, raro aliter ſe habuit, quam quæ maxime regularis, quæque maxime ſalutaris. *Paroxyſmum* enim, ſemel bis in anno, cumque malo ſymptomate nullo comitatum, tanquam ad præſcriptum Medici, aut votum ægrotantis egit.

Ita multos annos, ſi non omni doloris ſenſu carens,

(*τὸ δὲ, πλὴν πόνου,*

Ἀπαντ' ἀπὸ μὲν τὸν δὲ αἰὶνος χρόνον;)

beate tamen, & tuto, imo ipſam per *Arthritida* tuto vixit.

Huic, ingruente ſenio, acceſſit *Vertigo*, quæ, paulatim ingraveſcens, eo increvit uſque, ut ſæpe ne in humum æger concideret, periculum eſſet. Quapropter *Veneſectio*, *Emetica*, *Veſcantia*, *Purgantia*, aliaque multa, ſuo quæque loco, ſunt a viris arte noſtra præcellentibus, imperata, &, vel omnia, vel magna ex parte, ab ægro uſurpata. Cum vero iſta propoſito minime reſponderent, *Vertiginem* eam non tam exquisitam & genuinam, quam notham, & *Arthriticam* eſſe ſuſpicatus ſum.

Sexagenario jam major, *Arthritidem*, uti illi videbatur, nimis gravem, diutius non alere; ſed per diætam decrevit tenuare: proindeque, cereviſia potenti & generoſa (quam, per annos alioquin multos, intereum ad hilaritatem, at non incommode, potaverat) abjeſta neſcitæque, non niſi aquoſam, nullarum virium, & vilem adhibuit. Væ autem illis, qui *Arthritida*, diu ſatietati ſuetam, abſtinentia demum nimia tentant evincere. Male habita *Arthritide* intimas in corpore regiones, ejusque viſcera nobiliſſima invadit, unde ægri res in peſſum abiit, & (ut ſæpe accidit) in dubio vita. Minus quidem articulis, ex eo tempore, doluit hic noſter *Arthriticus*; at inauſpicato minus. Sanguis enim intempeſtively, & magna ægri

ægri cum injuria debilitatus, alieno amplius expellendo, sic, ut olim, non erat. Faciem depressam, nec, ut ante coloratam, oculos concavos, vires enervatas notare familiares, & malum aliquod præ foribus ominari.

Cum vero eo res deducta esset, magni aliquid momenti accidit, discusque non indigni. Recurrente enim *Podagra*, & insultum denovo, qualem potuit, faciente, aqua frigida pedes media hyeme immergit æger, itaque temere tumoris *Arthritici* materiam percussit. Pectore, *Capite* subito gravatus primo tussit, & cum impedimento spiritum traxit; mox sensus omnis, ipsa etiam mens defecit; &, tota undique astantium mirante turba, non tam excessit, quam surreptus est e medio.

C A P U T XV.

De Apoplexia Arthritica.

Art. I. **D**E vertigine, & dolore capitis *Arthritico* supra dictum est; speciatim, hos affectus in *Apoplexiam* non raro migrare, eaque terminari: quod quidem nialum, quando hodie gravissimum, eoque gravius, quo minus suspectum, intellectumque sit; operæ pretium mihi videtur, paulo altius ejus rationem repetere; & totam Historiam, ut potero, describere; qua, nisi me fallit animus, apparebit, hanc *Apoplexiam* non minus quam reliquas hujusce nominis *Anomalias* *idos* habere privatum, & propria indigere medendi methodo.

II. Docuit rerum medicarum usus, *Arthriticos*, eos præcipue, qui constitutione sanguinea, collo brevi, & toroso donati, multos ægotarunt annos, seniumque jam ingressi sunt; maxime vero eos, qui *Cereri*, & *Baccho* indulgentes, ludoque campestri, & exercitatione corporis intermissa, sunt plethorici, sensu motuque, nunc aliqua ex parte, nunc omni, subito privatos *Apoplexia* non raro corripit. Quæ si *Arthritidis* paroxysmo regulari, sive interciso, sive dilato, minimique, qua par est, sævitia peracta, enascatur; hanc ego *Apoplexiam* non tam exquisitam, & genuinam, quam notham, & *Arthriticam* appellabo. Ea certe est, de qua, ex communi, &, apud doctos & literatos hæcenus recepta, *Apoplexie* Doctrina, minime fetenda est sententia; minime ordinanda medicina: verum multo aliter, ex eo, quod huic affectui proprium, de utrisque statuendum est.

III. Ut autem proprium illud explicetur, animadvertendum est, in casu jam descripto veri admodum simile esse, Miasma *Arthriticum* in corpore diu affecto, neque paroxysmis utilibus, sic, ut oporteret, expurgato, congeri & coacervari: mox sanguinem, eo saturatum, fermentescere, turgere, & in orgasmum evehi; natura sc. in sui defensionem, & tutelam, alieni summis viribus expulsionem attentante, moliente. Jam vero si acciderit, vel propter *Cerebri* imbecillitatem & *ἀνομίαν*, vel propter aliud quodvis *προκαταρκτικόν*, in *Cerebrum* vehementius sanguinem arietare, & cum majori impetu partes ejus tenerimas ferire; ex eo, primum *Cephalalgia*, & *Vertigo*, altera nempe, sive ambæ suboriuntur; *Caput* aggravatum; facies plenior, & coloratior est; lingua sæpe titubat; motio sit corporis incomposita; gressus inæquales; sique malum ingravescit, & validissimo ægrum insultu urget. Sensu ille, motuque interdum captus, cum oculorum, ac si in ipsa morte, vitæ colore, tanquam *Apoplexia*, percussus est.

Hæc hujusce morbi pars prior; cui si aliud adjiciatur, & ab ejus curatione ducatur argumentum, (nullam melius sperari, nullam citius, nullam tutius perfectiusque fieri, quam per alieni, morbum in *Capite* committentis, ad articulos expulsionem) profecto quidem, ad confirmandam morbi hujus naturam *Ἀρθριτικὴν*, nihil deesse video.

IV. E prædictis liquet, etiamsi nullam hujus morbi, quatenus *Arthritici*, diagnosin, e symptomatum simul concurrentium globo, poterimus ullo, quod sciam, modo elicere: (nam in *Apoplexia* hac *Arthritica*, atque, exquisita motus & sensus similis est defectus, stertor, rhonchus, eademque his utrisque signorum *Συμδρομή*) tamen, si ægri, diu jam *Arthriticis*; si paroxysmi, dudum languidi, & inertis; si *Apoplexia*, languorum & eclipsin illam a tergo secuta, habeatur ratio, horum, inquam, ex symptomatum origine, ipso morbi initio facile erit ingenium, & morem ejus *Arthriticum* investigando consequi.

V. Posito ergo hoc affectu, de ejus *Subiecto*, de causa continente, de remota, de prognosi, aliisque ejus expositioni necessariis, clare dicam, &, quoad potero, enucleate.

Subiectum *Apoplexie* frequentissimum, omnium, qui de illo verba fecerunt, acutissime, partem esse *Cerebri Corticem*, affirmavit doctrina, ingenio, & humanitate vit clarissimus, *Guilielmus Cole*, collega plurimum honorandus. Ea (sic ille solidissime disputat) „ morbi omnis sedes, & *Subiectum* est habendum, quod materiam, „ eum committentem initio accipere, & in quo defigi illa iudice, „ tut: nullo autem in loco materia promptius, quam in *Cerebri Cortice* defixa, facit *Apoplexiam* (a). Huc eam apportant arteriæ nobiles, ingentes, in ramos divisæ tum magnos, tum etiam amplum inter se commercium exercentes. Huc allata, & eo loci sistens, vasorum sanguinem vehentium fines, (furculos sc. arteriarum, & venarum origines) extendit dilatæque. Vasorum istam extensionem necessario, & quidem e vestigio sequitur: in *Corpore Calloso*, reliquoque *medullari Cerebro*, tubulorum compressio, coarctatioque. Hinc spiritus in tubulis istis animales interpellantur: in motu ordinando, eorum mandata; in sensu recipiendo, eorum impressiones; in cogitationibus elaborandis, eorum fluctuationes interturbantur, confunduntur. *Sensitiva*, cumque ea *Rationalis Anima* patitur eclipsin.

Quod vero multum in ea *Apoplexia* sede confirmanda valet; ei data sunt a natura venæ, prædictis arteriis, qua numero, qua magnitudine, qua denique commercio respondentes; quæ, quidquid alieni sit advectum, (facta præcipue sanguinis detractione, vel minimum *Ἀντισπῆσις* debita) reforbent, asportantque. Hoc modo partim, ut opinor, evenit, quod qui gravissima laborarunt *Apoplexia*, sæpe curentur, de integro nunquam in eam incidentes; *Cerebri* nempe *Cortice*, sic, ut pat est, exonerato, & deinde pristinam recuperante *ύπορίαν*: Quod de *Corpore Calloso* minime, si

Sydenham Opera Medica.

(a) Vide Auctoris Tentamen Physico-medicum de Apoplexia.

eum *Apoplexie* locum esse fungamus, expectandum; nam cum ei nulla sint, quæ tam grande onus (*Apoplexie* nempe causam continuentem) auferre possint, animam occupabit non eclipsis solum, sed ipsa nox; *Catulli*

Nox perpetuo dormienda.

Minime vero negandum, miasma *Arthriticum* ipsos aliquando tubulos intrare *Nervinos*; spirituum undulas miscere; nubem animæ, & torporem injicere; & quidem ita semper (alias autem alia ratione) fieri conjicio, quoties hæc *Apoplexia* demigrat in *Paralysin*. ubi nulla videretur alieni, nisi per tubulos prædictos, extrudendi via;

VI. De causa hujus *Apoplexie* conjuncta & proxima, notatu dignum est, illam creberrime vasculorum esse in *Cerebri Cortice* dilationem, quæ *Tubulos* in *Cerebri Meditullio* statim comprimi, spiritusque facit animales in iis obstrui, & turbari. Ista vero *Dilatatio* vel a sanguinis in ea vascula irruentis, & in iis commorati, vitio, vel ab ejus quantitate provenit.

Vitium isthuc, quatenus *Arthriticum* est, a miasmate *Arthritico*, sanguinem commovente multumque exagitante ortum, procul dubio hac in re non parum operatur: Huic autem aliud vitium accedere solet, sanguinis nimirum *Lentor*; qui *Arthriticorum*, maxime vero ætate grandiorum, sanguini inesse: eique detracto, & in cyathis quiescenti, innatare deprehenditur; ita hujusmodi laborantium tum inesse sanguini, tum etiam eorum *Cerebro* inhærere, vasculaque (sic, ut dixi) resarciendo complere, & extendere jure merito censetur.

Miasma isthuc *Arthriticum* per se, maxime vero *τὸ γλίσχρὸν* involutum, si *Cortici* impingatur, & in eo insideat, sanguinem eo loci sistit; itaque dilationem modo dictam infert, & sæpenumero causa hujus *Apoplexie* proxima, uti suspicor, & conjuncta est.

Quoties autem miasma, penetrato *Cortice*, *Tubulos* in *Cerebri Meditullio* subintrat; spiritus animales tunc cominus aggreditur; & proxime tunc facta in eos impressione, *Fluctuationes* eorum ordinarias subvertit permiscetve, donec morbus aut in *Paralysin* exit, aut morte, linea rerum ultima, concluditur.

VII. Itam autem sanguinis, seu vitiosi, seu nimii, in *Capite* moram, & mansionem, (ut de causis remotioribus nonnihil dicam) in primis *Cerebri* creat a cunabulis imbecillitas. Huc confert etiam, quicquid sanguinem impetuosius, & in *Cerebrum* copiosius impelli; quicquid etiam in eo diutius retineri faciat. Copiosius autem impellitur exercitatione corporis, & labore pertinaci.

Anni ferme sunt viginti, cum celeb. *Matthæus Slade*, Medicus *Amstelodamensis*, *Londinum*, *Oxoniam* proficiscens, & in itinere collem (ambulandi gratia) pedibus ascendens, vix superato ejus fastigio, quasi de Cælo tactus, *Apoplexia* prostratus est; neque unquam ad se rediens, animam brevi post efflavit.

Infantuli, paucis ante diebus nati, subitoque, non sine veneni suspitione, mortem obeuntis, corpus olim aperui. Nulla erant veneni in stomacho vestigia, at in *Capite*, arteriæ & venæ *Cerebri* amplexentes, bis tanto majores, sanguinem magna illa nascendi lucta & nisu, in *Caput* infantuli nimio plus intrudi, &, tum *Apoplexie*, tum etiam mortis causam fuisse, verisimile reddiderunt.

Diutius sanguinem in *Capite* retineri faciunt, inter alia vincturæ colli nimis strictæ. Non ita pridem, in vicinia nostra, quidam madidus, & *Baccho* plenus, in lectum commissus, intra breve tempus obiit. Rigidus enim, ore livido, demortuus horis post paucis est inventus. Cum, de causa mortis adeo repentinæ inquireretur, præter ingens liquidorum vim, collari linteo nimis arcto, & in poculis nou exuto (tanquam fune in strangulatis) sanguinis reditu, maxime in corporis situ plano, & *Horizontali*, impediante, mihi probabilius inveniri, aut quidem excogitari potuit. Quæ a nobis *Apoplexie* puræ, & genuinæ *πρῆξις* afferuntur (nimirum, ob accidentia prædicta, sanguinis in *Caput* injectio largior, & exportatio diminutio) possunt etiam *Arthriticis*, ob accidentia similia interdum obvenire, &, in *Apoplexiis* eorum inducendis, locum obtinere.

Huc potro referendum *Opiatorum*, ut & *Errhinorum* abusus, quibus *Arthritici* materiam in cruore alienam, magno suo cum periculo sæpe *Capite* impegunt.

His, quæ ritu peculiari humorem in *Caput* dirigunt, adjungantur ea, quibus (externis, & evidentibus causis) *αὐτοῖς ἐξωθεν*, humor repellitur, & intro agitur: quæ cum hinc *Anomalie*, simul cum cæteris omnibus *Arthriticis*, sunt communes, alibi tum fusius enumerata, non satis explicata sunt.

VIII. De nostra hac *Apoplexia*, si cum *Exquisita* comparatur, observandum, quod uti vere hæc

--- cum Spiritus Orbis

Bacchatur ---

eoque ineunte creberrime occurrit; & calori, se per sanguinem humanum una cum Mundi reliquo, tum temporis fundenti, eumque agitati, debet originem: ita quidem illa, nimirum *Arthritica*, pendet ex uno miasmate *Arthritico*, præsertim augente & ebulliente; quocunque anni tempore hoc contingat. Ver autem, & Autumnus sunt tempora, in quibus id *Arthriticum* maxime *ὀργιζέται*, & in *Caput* sæpissime irrumpit.

IX. De hujus *Apoplexie* *προγνώσις* jam ordine dicendum; tamen plures ignorata morbi natura, & ob eam rem instituta medendi methodo non satis idonea, fato cesserunt; tamen (quod hujusmodi laborantibus solatio sit) omnino constat, permultos ea tentatos: artificioso, sic, ut decet, tractatos, ex ancipiti morbo hoc convalescisse, vitalem diu postea vitam egisse, &, quam ab *Apoplexia* vulgari, & exquisita, longe meliorem. Cujus id in causa esse censeo, quod, debita humorum e *Capite* facta primum *Ἀντισπῆσις*, &, deinde, restituto *Cerebri* tono, saniores ii, tutioremque vitæ rationem ineant, libertate missa inutili, imo perniciofa; quod, e gulæ deditis fiunt temperantes, e tumultibus, sobrii: itaque omnibus sedulo vitatis, quæ aut corpus plenitudine graveant, aut gravatum orbent paroxysmis regularibus, senectutem habeant tolerabilem. Verum, ut omne id emolumentum, tum artis medicæ opus, tum observantiæ fructus est; quicunque fructum istum, minime calcata potiundi ejus via, superaverit, messum ille, nullo semine facto, (quod est unum ex absurdissimis) videtur expectare.

X. Medendi indicatio postulat, ut quam citissime *Cerebrum* allevetur, ut mens, motusque, & sensus influantur. Hoc autem optime faciendum *Evacuatione*, *Revulsione*, & alieni in artus amandatione. Primum omnium inquiratur, utrum calceamentis, aut tibialibus nimis arctis, aliove quovis externo, *Arthritis a τοῖς ἰσχίοις* repellatur,

aut in ea ne erumpat, inhibeatur. Porro, de sanguinis in *Caput* flumine, nimis largo, & torrenti num intrudatur, num in eo diutius, quam ex œconomia legibus soleat debeatque, retineatur, est quærendum; & ex hisce procatasticis quæcunque fuerint inventa, sunt initio removenda.

In huiusmodi *Apoplexia* fere omni necessaria est *Vena sectio*: nihil ea certius, nihil citius opitulatur. Detrahantur igitur, quam primum fieri potest, (quam citissime conficies id, tam maxime proderit) uncia xii. xiv. vel libra una semis pro ægri viribus & constitutione. Paulo post injiciatur *Enema* pungens, & acre; sive ex *Urina Humana*, sive ex *Decocto communi*, cum *Sale vulgari*, vel *Aloe rosata*, aliove id genus alvum irritante. Sub id tempus adhibeatur *Purgans*, e potentissimis, & sanguinem agitantibus; *Pulvis* puta *Warwicensis* a *℞. ad ℥ij.* vel *℞. Jal. a gr. vi. ad x. cum Extr. Rudii ℥j. sive ℞. Elix. Prop. q. s. ut fiant pilulæ*; vel ex *Decocti amari Purgantis ℥iij. & Syr. e Spina ab ℥j. ad i℞. potio*. Si segnius erit demissum *Purgans*, neque trium, aut quatuor horarum spatio ventrem movebit, *Enema* repetatur. Toto isthoc tempore, vel lecto, vel cathedra, corpore, quoad potest, erecto sedeatur ægrotans; ne in *Caput* depressum, & nimis inclinatum, humor imperu, & copia majori suffundatur, malumque augeatur.

Purgatione facta, de *Vena sectione* iteranda, & quo in loco, brachio, an cervice, deliberandum est. *Cucurbitula*, hoc tempore, dorso (inter omoplatas) admotæ, cum multiplici *Scarificatione*, usus sunt eximii.

Vacuefacto corpore, operæ pretium erit articulo nuperrime dolenti *Emplastrum*, vel e *Pice Burgundica & Terebinthina Venet.* vel *Cephalicum cum Euphorbio*, aliudve quodvis potenter attrahens, imponere; totumque membrum, ut e *Capite* materia ducatur & loco magis idoneo figatur, laneis involucris calidissime vestire. In huiusmodi casu, pedes in aquæ fontanæ balneum, quam potuit tolerari, fervidum immittendo, ibique retinendo; ægrum, omni spe vitæ pene destitutum, & animam, ut apparebat, jam tum agerem, *ἐν καὶσπῷ* servatum, aliquando novi.

Cum hæc aguntur, ad *τὰ ἔξω Arthritis* evocari, *Cerebrum* magnopere levare solet: natura, prædictis auxiliis adjuva, in viam redit; & opus, inauspicato ceptum, felicius & accuratius perficit. Sin aliter res sit, neque per ea sanetur æger, ut alieni fiat evacuatio, quæ nominatur *Topica*, collo posteriori dimidio,incipiti, vel capiti raso *Epispasticum* applicetur, & dies quatuor vel quinque geratur. Brachiis etiam internis, aut suris (uti *Chiragra*, vel *Podagra* frequentior est) admoveri possunt istiusmodi *Emplastrum*. Si vero angustis prematur æger, & graviter laboret, *Cervici*, vel *Capiti*, ubi *Sutura Sagittalis* cum *Lambdoidea* coit, vel ubi cum *Sutura Coronali* (prout *Capitis* pars posterior, vel anterior magis afficitur) *Cucurbitula* imponatur. Si nihil horum in usum trahetur, tondere minimum ad cutim oportebit; deinde *Caput* radere, & ad relaxationem cutis perficere; postremo, *Emplastrum e Cuminio*, vel istiusmodi aliud, quod *Διαικνῶν* exaueat, & humores eliciat, applicatum continuo gestetur.

Malo usque permanente, proderit materiam per nares, per os detrahare. Valent hanc in rem *Errhina*, quæ sine sternutatione ferum educant. Sternutationem moventia jure merito vereamur, ne, vi sua & nisu corporis laboriosissimo, humores in *Cerebrum* impellant, ægrumque obruant. Manducare juvat, quæ sunt acerrima; eorumque beneficio salivam largiter educere.

℥. *Raf. Raph. Rustic.*

Sem. Sinapios confus. ana ℞.

Pul. Pyretri ℥j. misce, Melle excepta & Serico inclusa ori dentur, & Sputo identidem ejecto Dentibus conterantur. Huc confert etiam *Electuarium Apophlegmaticum* infra descriptum.

Interea vero temporis, dum fiunt evacuationes, ea, quæ spiritus animales stimulent, & munus suum obire faciant, magni, & quidem frequentissimi usus sunt, quamobrem *Spiritus Volatiles oleosi*, vel *Sp. C. C. juccinati*, cum *Julapii Cephalici Haustu*, crebro & assatum, sic, ut requirat usus, sunt adhibendi. Quinimo *Pulvis de Gutterra*, cum *Castoreo*, & *Oleo Succini*, *Assa fetida* solutione in *Pilulis* temperatus, bis vel ter in die demittatur, cum *Julapii* prædicti haustu. Hæc quidem medicamenta eo potius eligantur, quoniam non solum animales spiritus instaurant, sed & *Arthritidi* etiam expellendæ quodammodo inserviant: verum præmissis evacuationibus, quæ appellantur *generales*, iis potissime utendum, ne, a medicamentis adeo *Cardiacis*, in corpore feriato & pleno, malum intendatur.

Si a prædictis *ἐν τοῖς ἔξω* nulla fiat *Arthritis*, ad auxilia externa, magis efficacia, progredi juvabit: ad *Phenigmos* scil. aut ejusmodi alia, quæ valentissime, quæque materiam evellant omnium certissime.

Quamprimum tumor, aut dolor significabit *Arthritidem* ad *τὰ ἔξω* appellari, studio elaborandum est, ut eo loci retineatur, neque retro agatur: Hoc autem optime fit per *Epispasticum*, & *Empl. Meliloti*, ordine applicata, quibus, per ulcuscula diutine aperta, perniciosus humor educatur. Atque huic proposito non alienum erit, *Emplastro* lanea superponere, laqueos iis involvere, pedemque interdum, modo pes afficitur, deorsum versus inclinare.

Omni hoc tempore commodissimæ sunt *Fricationes*, artuum præcipue, bis vel ter in die, vehementes: quæ quidem e *Cerebro*, sed non e corpore, sanguinem educant, & illius *πομπή* ad corporis extrema vertant.

Arthritide in extrema apparente, veluti præsentem Numine, servatur æger. Nihil auspicius, nihil ei felicius obvenire potest. Morbi, a quo idoneo & recto ægri vita & incolumitas omnino penderet, a quo (e contrario) inverso, & *Ἀνωμαλῶς*, ejus periculum, quantum animo comprehendi potest, maximum est obortum; istius, inquam, morbi hoc modo sublata est *Ἀνωμαλία*, isque jam denuo factus salutaris.

Cum humorum plane mutatur inclinatio; quique nuper in caput irreplere, foras jam in artus abeunt; ad eos expellendos, & promptius expediendos (nec quidem antea, ne sursum eleventur, & in partem iis affectam impellantur) lene quoddam *Παραγρηγὼν* oportet dare: *Pulveris* scil. *Cantiani quasi ℥j. sexta*, vel *octava quaque hora*: cui, si visum est, & tuto fieri potest, adjiciantur semel, aut in constitutione phlegmatica, bis in die, *Chalyb. Nutriti gr. v.* Quod tamen *Arthritidem* expellens, si quovis modo repellatur humor ar-

ricularis, aut caput desubito male habeat, protinus omittendum; & auxiliis externis humorem evocantibus, una cum iis, quæ ore data spiritus animales recreant, utendum est.

Diæta, per omnem hunc decursum, a maxime sit tenuibus: placet *Jusculum Pullinum*, *Avenaceum*, *Panarella*, cum *Uvis Corinthiacis*, aut *passis majoribus*; placet *Chocolata*, ejusmodi & *Sorbitiones*, molles scil. & faciles cibi, quibus ægri vires nutriantur, stomachus autem non gravetur, in cerevisiæ vicem, aut *Pomaceum*, aut *Vinum* aqua dilutum, aut *Salvia*, aut *Tee*, aut *Anthophylli infusum*. Nihil gula & satietate, præcipue vespertina, periculosius. Alvo neque dura, neque lubrica sit æger, illa caput aggravari facit, hæc ad *τὰ ἔξω* malum invitari.

XI. Ad *Prophylaxin* nihil conducibilis, quam in dorso *Fonticulos* aperire; rus petere, aere aperto, & ventis probe agitato frui, vere & autumnio alvum subducere, in robustioribus venam initio Octobris secare; & quod utranque absolvit paginam, maximeque attendendum est, *Arthritidos* recte *παροφύλαξιν* curam diligenter adhibere.

Apoplexiam, in *Cerebri Cortice* locatam, curatio jam descripta plerumque tollit; & ea minime recidiva, ægri multos annos ihmunes agunt: si vero *Cerebri medullium*, sive aliquam ejus partem, tubulos oppilando *Nervinos*, morbus occupat, aut de subito ægrum interimit, aut in *Paralysin* degenerat, Capite proximo tractandum.

XII. Hæc curatio & *Apoplexia*, quæ a *Cerebro* oppresso fit, accommodatur: si materia morbum committens, in *Ventriculo* & *Intestinis* sita est, *Symptomaticæ* illius *Apoplexiæ* (cujus historiam mox subnectam) curatio *Purgatione* tum *ἐν* tum *παρὰ*, & medicamentis spiritus animales excitantibus, & *Arthritidem* expellentibus, est tentanda.

HISTORIA I.

Vertigo Arthritica, cum imminente Apoplexia.

Subacti vir ingenii, & in rebus gerendis subtilissimi, multos annos *Arthriticus*, (quod quidem tempore statis ille periodis, & ut oportebat, doluit hyemem anni MDCCI. nimia transegit indolentia. Ab hoc *Arthritidis* defectu, pro consuetudine paroxysmum minime repetentis, (tanquam omissa re quadam usus egregii, & ad vitam in primis necessarij) statim œconomia ratio turbata est: gravitate, & vertigine caput afflictum, facies supra modum colorata, & tamen hominis minime temulenti, perque ipsos hosce dies sobrii, nihilominus tanquam immoderato tumefacta potu. Lingua titubavit, & voces edidit non satis claras, notabili nempe cum impedimento. Corporis totius motus incertus, inkompositus fuit; neque gestu regulari factus. Quæ quidem accidentia, cum eorum ordine simul considerata, & uti par fuit, expensa, materiam *Arthriticam*, intus servatam, ægroti *Caput* adoriri, & ex ea *Apoplexiam* in propinquo esse, manifeste comprobantur.

Huic autem affectui in isthoc homine generando, præter jam dicta, viam hæc tria patefecerunt. Primo loco, corpus ad hunc affectum concipiendum a natura promptum, utpote collum habens perbreve, cujus opera factum est, ut in *Caput* sanguis impetu cum majori ferretur. Deinde, crassus hujus ægrotantis & generosus sanguis, qui facile ferveret, minimaque de causa incitaretur, & in orgasmum eveheretur: postremo ver, *Apoplexiarum* tempestas.

His adjuva *Συναιτῆς*, malum gravissimum, *Apoplexiæ* vicinum, intulit *Arthritis*: cui ut occurreretur, hanc medendi rationem iniit. Primo, sanguinem misit, & quidem copiose, ad libram usque integram; hoc ferente ægri constitutione, morbo postulante. Tum, adhibito e *Pil. Rudii*, & *Pul. Scammonii Purgante*, *Draffico*, (quod in hac re commodissimum esse ostendit usus,) alvum inanivi, sanguinem exagitavi, *Arthritidem* expuli. Doluit denuo articulis æger, & quidem auspicio doluit. Nam ex ea tam *Arthritidos* ad *τὰ ἔξω* reductione, quam ex humidi, quod nimium erat, e corpore evacuatione, malo gravissimo impendente æger liberatus, & vestitu, aliisque rebus idoneis, quæ a capite procul tenerent *Arthritida*, curatus est.

Biennio post, eadem ille causa, (scilicet *Arthritidis* defectu,) eadem anni tempestate, (nempe vere) simili modo est affectus; capite diu, & impense aggravato, præcipue parte ejus anteriori ea, quæ oculis supereminet. Vena semel iterumque pertusa, *Enemate*, & *Cathartico* fortiori dato, e *Capite* in manus & pedes exturbata est *Arthritis*. Multum hinc æger, at tuto doluit; ejulatus edidit, at inanes; neque, curato per eos *Capite*, misericordiam moveutes. Huic autem *Arthritidis* translationi non parum contulit (nequid hac in re momenti prætermittam) *Empl. Cephalicum*, quod tendini, ad pedis pollicem pertinenti (quem in hoc ægroto locum *Arthritis* maxime frequentaverat) applicatum, eo tantopere morbi vim allexit, ut trium horarum spatio doloris æger impatiens, illud detrahare cogeretur. Tantæ efficacitatis in hoc affectu nunquam sunt externæ applicata!

HISTORIA II.

Arthritidi repercussa superveniens Apoplexia.

Cerebris & *Bacchi* mancipium, vitam agens desidiofam, ex eo crassum, & ventricosum evasit, ipsoque ætatis flore *Podagrosus*. Annos natus fortasse quadraginta, saginatus iste lurco doluit: dolenti vero accidit, quod hic loci memoratu dignissimum, non minus insolens, quam grave infortunium. Hallucis globum, & articulum majorem occupavit *Podagra*, calore, tumore, rubore comitata, cruciatibus eum affecit, sed periculi expertus. Ut ejus acrimoniam mitigaret æger sceminae cuidam medicinam exercenti, (lenitendis ægritudinibus procul dubio doctæ) se commisit. Illa medicamentum e suis, scilicet, comparavit: utrum autem ex *Solano lethali*, *Hyoscyamo*, *Cicuta*, aliisque id genus *Herbis*, quibus uti solent nonnullæ; An ex *Ovorum albuine*, *Sapone*, & *Spuma Cerevisiæ*, quod mihi renunciatum est, in medio relinquam. Constat autem, hora decima matutina remedium isthoc, quicquid erat, loco afflicto superponi: constat, dolorem magnum, acrem, urgentem, horæ unius spatio leniri; duabus horis penitus auferri: Constat, ægrum lecto surgere, cibum capeffere satis modicum: Constat, hora secunda pomeridiana, somno eum gravari, connivere: post paulo obdormire: Constat, hora septima vespertina flertere, & tanquam in somno nimis profundo morbosoque, rhonchiffare: Constat, tum primum ægri conditionem uxorem ejus suspicari; nec deesse, qui de

ea, tanquam ancipiti, & periculo plenissima, fide illam mōneret. Monitionibus illis, utut amicis, & prudentibus, spretis neglectisque, (ne videlicet *Epispastica*, *Scarificationes*, aliaque *Tormenta* medica subiret æger, in utramvis aurem etiam si dormiens, seu potius semimortuus) constat illum, mane proximo, horam circiter quartam, e vita excessisse.

Discant hinc *Arthritici*, quam dubii sint eventus, seu potius quam fatalis, ea, quæ parti extra dolenti superposita, causam morbi repercutiant: discant, eam repressam, & in sanguinem repulsam, posse *Cerebro*, visceri omnium nobilissimo, impingi: discant, impactam ferre posse *Apoplexiam*, posse mortem. Discant, & caveant.

HISTORIA III.

Somnus ab Opiato profundus, &c. ipsa propemodum mors.

Pari temeritate usus est, sed cum minori damno, quidam mihi notissimus, & jam inde ab adolescentia familiaris. Fuit ille *Arthritide* multos annos afflictus, & paroxysmis ejus, tam gravibus, quam diuturnis, mirum in modum emaciatus, cum, mense Martio, Anno MDCCIII. nescio qua ex causa, *Μισμυα* (quod in hoc *Arthritico* abundans, sanguinem infecerat universum) viscera, imo ventre contenta, subintravit. Dolor intestinorum ex eo magnus, quem ut deleniret, *Opiati* quantitatem non immodicam assumpsit. Somnus hinc profundus: horis post sex supra triginta, delirium. Mane proximo *Σπασμοί*, ipsa propemodum mors.

Detraeto prius sanguine, *Sp. C. C. & Tinct. Castorei*, cum idoneo vehiculo dedi; deinde *Bulum*, & *Pilulas*, alternis, sexta quaque hora.

4. *Fæcul. Bryoniæ, Pul. Castorei, Succin. albi, Assæ fœtid. ana gr. v. cum Syr. Artemis. f. Pilulæ.*

4. *Pul. de Guttæ ʒʒ, cum Syr. Pæon. q. s. f. Bolus.*

Pedibus totis *Empl. Cephalicum*, una cum *Picis Burgund.* subtriplo: Tibiæ, & brachio utrique, *Epispasticum*; Cervici prælargum admovi. Erat etiam in præscriptis id, quod sequitur, salivam movens.

4. *Raf. Raph. Sylvest. tenuissima ʒj. Ol. N. M. Chym. gutt. v. Mellis q. s. f. Electuarium apophlegmaticum. Teneatur ore quasi ʒʒ. usque dum manaverit Saliva, utrunque tunc ejiciatur, omni hora repetatur dosis.*

Hac quidem medicina *εὐκαίρῳ* adhibita, cum in summo quidem discrimine vita esset, cum fere actum & conclamatum esset, contra omnium opinionem æger restitutus est. Et quidem, malo & intempestivo *Narcoticorum* usu, morbi vim in *Cerebrum*, & *Nervos* infigente, quanta passim incommoda ducantur, apud eos *Arthriticos*, quibus quies, utut dubia & periculosa, vita charior est, testimonio nimis amplo, & frequenti patet.

HISTORIA IV.

Arthritis, ex Acidorum usu gravior, in Apoplexiam desinens Symptomaticum.

Iscanus Artifex, inde ab incunabulis *Arthritide*, una cum omnibus consanguineis, imbutus, multis annis ea premebatur regulari, artus scil. afficiente, & post debita intervalla recurrente. Cum vero, de affectu valde molesto prorsus evincendo, Medicos suæ ætatis celeberrimos consultor adierat, & quidem (non sine quodam artis nobilissimæ & divinæ contemptu) incassum. Sortis suæ impatiens, & absolutæ curationis spe allectus, *Acidorum* usui, *Servo* nescio quo hortante *Medico*, totus incubuit: quali vero cum evenitu, & quo fructu, narratione dignissimum est. *Pomaceum* ille regionis hujus (id est, omnium, ut videtur, acidissimum) elegit; quo, in vicem potionis ordinariæ, per biennium paulo plus aut minus, usurpato, cibi appetentiam, antea tenuem, & languentem; omni fere illo tempore, acutam & latrantem habuit, uti etiam paroxysmos tum rariores, tum etiam mitiores. De nova methodo cum ægrotante sermones feci, qualemque exitum haberet, avidissime expectavi, speciatim, utrum illa quies, *Arthritidis* esset diminutio, an paroxysmi, in aliud tempus, prorogatio tantum majori demum discrimine (quod ego plus semel observavi) concludenda.

Ab induciis sævior *Arthritis*, hujus seculi initio, tum manus, tum ea, quæ intus sunt, invaluit, *Δυσορεξίαν, Δυσπεσίαν*, ventriculi inflationem, ructus, spiritusque difficultatem introduxit. Mense Junio sequenti, post narium hæmorrhagiam, motu sensuque omni derepente captus, spiritum ex imo pectore laboriose traxit, tanquam jam statim moribundus: pulsus a natura magnus, ab affectu major erat.

Sanguinis, quam ocysissime, libra detracta est; unde linguam æger, & oculos movit. *Vitrioli albi depurati ʒj. cum Decocto Cardui* data est, eaque plus semel iterata, ter quater evomuit. *Enema* posthæc injectum, acre, & stimulare; unde largiter ejecit, Non nimis ea nocte dormivit. Mane sudum, & serenum; uti etiam die postero. Caput immune, ructus autem perduravit ingratus, spiritus difficilis, ut & cibi fastidium. *Arthritidem*, *ἐκ τῶν Ἐντροσδίων*, ore datis, expellere, extra admotis, educere sum conatus. Die, ab insultu, tertio somnolentia continua, oculorum gravitas, & color vitreus, brachiorum motus interdum convulsivi, ægro male ominabantur. *Sp. C. C. Succinatum*, cum *Aq. Cardiacis* dedi, aliaque feci non pauca, ad avertendum, siqua fieri posset, insultum; at inani opera: ægrum eo vespere subripuit.

Θεὸς τε μέγας, ὃ Μοῖρᾶ κραταί.

Tametsi primo aspectu videatur, eum hujus ægroti casum esse, qui, ex *Capite* principaliter, & *Ἰδιοπαθικῶς* affecto, apte possit explicari: (hoc enim, motus convulsivi, somnolentia, *Ἀνασθῆσις, Ἀκίνησις* non parum arguere judicantur; & quidem in primo insultu, nimio sanguine caput aggravari, & ex parte lædi, ob beneficium a venæ sectione non negaverim;) tamen, si *Ἀνρεξίαν*, si flatum, si ructus, si *Arthritidos*, coctionis organa diutius obdidentis, habeatur ratio, verisimile est, eam esse hanc *Arthritida*, quæ primario ventriculū, & intestina anticeret; *Caput* autem, & *Genus Nervinum*, non nisi secundario, & *συμπτοματικῶς*: & quod ista *Capitis* accidentia, revera naturæ, jam pessundatæ, oppressæ, & in ruinam vergentis, essent indicia.

Si vita, sine *Dolore* jucundior videatur; videndum tamen, ne tutior non sit, Bellum honestum, sui defendendi, & publicæ salutis ergo susceptum, paci infidæ, ignobili, periculoque plenæ, longe anteponendum est.

HISTORIA V.

Apoplexia Arthritica feliciter curata.

Mercator *Exoniensis*, humanus, integer, & probus vir ita natura fabricatus, ut, ob colli brevitatem, & temperamentum corporis sanguineum, ad contrahendam aptus natus sit *Apoplexiam*, per viginti plus minus annos, *Arthritide* vexatus est; claudus ea jamdudum factus, neque, nisi sustinente illum aliquo, via progrediens. Cum eo ventum erat, & æger, prope sexagenarius, *Arthritidem* mitescere, neque *Παροξυσμῶς* ex more duos, & laudabiles, iterare senserat, statim huic sereno horrida infecuta est tempestas. Mense enim Junio, Anni MDCCVII. subita *Caligine* correptus, motu sensuque tam interno, quam externo omni privatus, *Apoplexia* perculsus est, cum oculorum, tanquam in ipsa morte, gravitate. Pulsus, sed & ille perturbatus; cum respiratione, sed alta & gravata, unicum vitæ restituit argumentum.

Mali causa satis perfecta, materiam *Arthriticam*, in *Caput* delatam, ex eo evocare nitor: quem in finem, e vestigio sanguinem; eumque copiosum mitto. Primum *Enemate*, dein *Cathartico* quam citissime ventrem emollio, *Epispasticis* cervici, aliisque locis compluribus applicatis, serum elicio. Itaque materiæ alienæ facta partim evacuatione, an protinus *Cerebrum*, ejusque incolas, spiritus animales sistam, & instaurem eodemque tempore, quod alieni reliquum est, ad *τὰ ἔξω* amandem; huic ego respiciens, *Spiritu volatili Oleoso, Julapio Cephalico, Haustu* etiam *Arthritidem* expellente usus sum; & ad *Arthritidem* evocandam, *Emplastris ex Picis Burgund. & Empl. Oxycroc.* pari mensura mistis, & extra plantis pedum impositis.

Cum dolere cœpit articulus (quo nihil lætius, nihil opportunius huic ægroto potuit obtingere) primum *Friktionibus*, tum *Unguento*, (ex *Ung. Nervino, Spiritu Tereb. & Sp. Vol. Oleos.*) articulum urgente, & irritante ungi; posthæc calide vestiri jubeo: unde doluit æger egregie, magnoque suo cum emolumento.

Atque ista quidem medicina (Deo operam fortunante) mentem, & motum ægro restitui. Cum vero gravior, & diutior infederit *Apoplexia*, sicque *Caput* infirmaverit, quod quidem ex illius sermone, vix satis constanti, aliisque morbi vestigiis, notatu facile erat; ut *Spiritibus* vigor, ut *Cerebro*, & *Systemati Nervino* robor redderet: Villæ suburbanæ aerem siccum & apertum, spiritu ducere; & equo corpus sæpe exercere, ægroto suasi. Quibus ille mirifice recreatus, tam oculorum, quam ingenii pristinum adeptus est acumen, & argutias; atque annos jam duodecim *Arthritide* crebro recurrente, verum *Apoplexia* ne semel quidem, egit.

HISTORIA VI.

Arthritica ut occurratur Apoplexiæ.

Matrona nobilis, illustri domo orta, verum *Arthritide* graviter afflicta, nunquam utero gerens circa nonum ætatis suæ lustrum, febrè intermittente corripiebatur; ejusque paroxysmos, pro typi ratione revertentes; tres vel quatuor toleravit. Cum hi finierant, neque ulla medicina, qua materia, & causa eorum proxima eliminari posset, in usum traheretur; statim a febris abitu novum aliquod, a proposito nostro non alienum, in extremis partibus exortum: utriusque nempe malleoli dolor, & deinde tumor plane *Arthriticus*; sed, propter frigidum sanguinis temperamentum, nitore nullo, nec quidem multo rubore insignitus. Perduravit dolor, quatuor vel quinque dies, eoque exeunte, mansit tumor, alteros adhuc complures. Hujus illa modi paroxysmos, nempe *Arthriticos* ex intervallo anni quasi integri, non paucos subierat; cum inopinato *Caput* affectum est, & tanquam invadente *Apoplexia*, perculsum. Ita laboranti, una cum aliis e *Capite* materiam evocantibus, supra quam expectare merito liceret, profuere *Friktiones*, quæ ad pedes materiam invitarunt, & eorum articulis tumores excitarunt. Hinc *Capitis* tutela; hinc ejus malum *Arthritica* esse natura, signum *ἀποδεικτικόν*.

Meum erat dominæ, *Prophylaxin* ordinando, consulere. Hæc duobus comprehensa est. Primum, materiæ vitiosæ, a patre *Arthritico* acceptæ, nullo partu minutæ; verum mensibus obstructæ auctæ, (quæ tum febris intermittens, tum morbi articularis causa esse videretur) quanta maxima fieri possit, tam *Expulsione*, quam, ne crescat, & repullulet, inhibitione: deinde cavendo, ne in caput iterum eadem irrepat.

Ut primæ harum indicationi satisfacerem, purgatio omni mense, loco *τῶν Ἐμμένων* imperata est; diebus autem otiosis, *Aque Spadaneæ, & Stomachicæ*: Ur alteri occurreretur, quotiescunque *Capitis* periculum immineret, & *Arthritis* id invaderet, ad eam educendam *Venæ sectio*, dorsi *Scarificatio*, cum *Cucurbitulis*, colli posterioris, vel totius capitis, *Vesicatio*, malleolo utrique *Phænigmorum* applicatio, & deinde *Epispasticorum* prope locos tumefactos. Hæc, inquam, una cum *Podagragogis* ore datis, ægræ sunt commendata. Hoc autem loco id præcipue norandum, *Arthritidem* interdum ad *Caput*, ad pedes, æque fere inclinare, & in hos ab illo, levi *Friktionum* ope derivari.

CAPUT XVI.

De Paralyfi Arthritica.

Art. I. **V**enio ad *Paralyfin Arthriticam*. Cum miasma *Capiti* appulsum, in ejus *Cortice*, speciatim, vasis illius sanguinem vehentibus, non diu commoretur; verum in glandularum ductus, in *Nervinos* sc. *Tubulos*, impellatur; ex duobus hisce, quæ sequuntur, unum semper eveniat, necesse est.

Nunc in iis, quæ sunt medullæ, *Tubulis* sistendo *Apoplexiam, Vertiginem, Oblivionem, Ἀγρυπνίαν, Somnulentiam*, aliumve aliquem *Cerebri* affectum creat, & quidem aliter, quam in præcedenti capite declaratum est, nimirum (ipso spiritus in officiis suis comi-

cominus aggrediendo, eorumque confertim operas, & jam proxime disturbando) ἰδιόπαθους; itaque ægrotantem sæpe opprimit. Quod quidem eo usque crebrum existimare licet, ut *Apoplexia* laborans *Arthritica*, quoties (*Phlebotome*, *Catharsi*, aliisque auxiliis, ei tollendæ necessariis adhibitis) idem occumbit; *Apoplexia* huiusmodi *Idiopathica*, potius quam ea, quæ in *Cerebri Cortice* locum habet, interimi judicetur.

II. Sæpe vero miasma ad eos *Tubulorum* locos propellitur, ubi *Spirituum* meatus obstruendo & vias implendo, *Paralysin* affert: eamque huius, vel illius membri, sicut *Nervus*, qui ad hoc, vel illud membrum pertinet, est affectus. Unde sequitur, istius membri sive *Motus*, sive *Sensus* tantum, sive uterque læsus & diminutus, interdum etiam abolutus.

III. In causa *Paralyseos* exquisitæ, proxima & continente describenda, Medicis inter se non convenit. Alii enim, duce *Erasistrato* (quod a *Galeno*, ipsius *Erasistrati* verbis utente, traditum est,) a *Lenta*, *tractili*, & *excretu difficili Materia*, *Nervos oppilante*. Alii vero, a vim narcoticam, aut alias virulentam habente ipsosque spiritus confodiente, *Paralysin* fieri contendunt.

Profecto, neutrum horum, opinione nostra, penitus excludendum. Enim vero, ita posse accidere non improbabile est, ut ad committendum hunc affectum, ambo concurrant, & viribus sociatis simul operentur. Nam, ut singulatum hæc attingam, usu quotidiano patet, *Arthriticorum* sanguini γλῆχροντα (a) inesse; eique detracto, & in excipulis quiescenti, post breve tempus, innatare: quod utique (sive antiquorum *Pituita*, sive non) ad *Nervos* obstruendos omnino satisfaciat.

Et, quod altero loco dicendum, virosum aliquod in *Nervos* se recipere; *Spiritus* in iis contentos afflatu, & contagio perimere, & vel per se, vel cum aliquo alio *Spiritus* inimico *Paralysin* inferre, exemplo mox addendo, (*Historia sexta*) manifestum, ut opinor, & testatum fiet.

IV. Ut causas investigem magis remotas, eæ sunt, primum, in sanguine *Diathefis Arthritica*, seu virus istiusmodi indomitum, ἐτερογενές: in fugam, ubicunque possit, abiturum; in *Nervinum Genus* ingressurum. Quæ quidem *Diathefis*, per se multarum virium, & in hoc affectu producendo valentissima, causam interdum adjuvantem habet, nempe *Plenitudinem*, quæ, apud populum satietati deditum, cum ea solet jungi, & in hoc negotio συνωρτίζουσα, certe in hac regione, eorum, qui ex *Arthritide* perperam agente, & minus *Regulari* primum *Apoplexia*, dein *Paralysi* corripuntur; non pauci causam istorum malorum antecedentem in sanguine duplicem agnoscunt, videlicet *Arthriticum* miasma, *Plenitudine* comitatum.

Deinde, *Cerebrum* a natura molle, aut morbo aliquo, aut istu, aliave quavis evidenti causa, debilitatum, & *Nervi* supra modum teneri: quibus facile, per ora plus æquo dehiscencia, virus admittatur, & diu intra *Tubulos* retineatur.

His postremo loco adiciendum, quicquid externæ, sive causæ evidentis, via tam patula materiam adeo paratam adigat. Huius autem generis sunt aer humidus, & palustris, aliæque omnia, quæ in *Paralysi Primigenia* locum inveniant: at in hac *Arthritica*, præcipue memoratu digna sunt vita sedentaria & otiosa, mala victus ratio, frequens *Hypnoticorum* usus, *Spiritus ardentis* immoderate sumpti. *Venus* immodica, frigus, & in corporibus calidis & biliosis, medicamentorum abusus calidorum; omniaque, quæ *Arthritidi*, ne articulis infigantur, obstant; aut iis affixam quæcunque repercutiant.

V. Ex hoc causarum apparatu, facile est conjicere, quem in modum fiat hæc *Paralysi*, & (præcurrente modo *Capitis* gravitate, modo dolore, modo vigilia, modo somnolentia, modo vertigine, modo oblivione, modo tristitia, modo mentis alienatione, modo etiam nullo præcedente *Capitis* affectu, sed intestinorum colico; modo neque hoc quidem) quam expedire virus *Arthriticum* in *Nervos* intrudatur; quæque, eos adimplendo, aliæve *Spiritus animales* afficiendo, cito *Paralysin* hanc inducat.

Ægroti vero conditio, sive morbi ἄδός pro ratione partis affectæ, aliud atque aliud esse reperitur. Si *Linguae Nervus* ἀδελύεται, aut sonum æger inconditum edit, aut verba (voce confusa blaterans) dimidiata: si, quis *Paris vagis* ramus est, ad *Ventriculum* pertinet, (quod quidem *Arthritico*, plenitudine gravato, & ex ea *Procatarxi* primum *Apoplexia*, tum *Paralysi* perculso, contigisse novi) æger omni concoctione, & quidem appetitu captus, cibi fastidio pertinaci laborat; donec, humorum penu vitalium indies decrescere, neque novis accessionibus, uti par est, refeito, summa tamen copia beatus, paulatim marcet, tabe conficitur. *Paralyseos Arthritica* in corporibus *Biliosis*, maxime vero *Celice Biliose* supervenientis, alia solet esse ratio, & quidem prima: Hac qui laborant, famem habent inminutam, pene prostratam; corpus attenuatum, cutim universam (at præsertim oculorum album) ictero colore tinctam, aridam, neque ex naturæ lege perspirantem. Adeo nempe diversa facies huiusce morbi, pro loci ab eo occupati, & causæ conjunctæ diversitate.

VI. *Paralysi Arthritidi* secundariæ, sicut primigenia, multiplex invenitur. *Ratione Subjecti*, nunc unius lateris, nunc unius membri est; & quidem (uti meis obtigit) præcipue linguæ: *Ratione Materie*, sive causæ continentis, interdum eam habet simplicem, & puram *Arthriticam*; aliquando γλῆχρόντη involutam, aliquando bile, vel alio aliquo commissam alieno: alias sola, & per se occurrat, alias motibus convulsivis comitata: alia denique imperfecta est, qua non satis habiles redduntur artus, & in motibus obeundis sæpe vacillant, at non ex toto resolvuntur; alia vero perfecta, qua penduli fiunt, & immobiles; Hæc autem omnia, cum *Paralysi Primigenia*, nostræ huic *Arthritica* sunt communia.

VII. *Periodicam* neque ego novi hanc *Paralysin*, neque temere, propter materiam *Nervis* impactam, & coherentem (id est, continenter eos oppilantem) esse posse judico, qualem tamen aliam observavi, nimirum Ἀγωνίαν, statim temporibus, permultos menses, ad finem pene horologii, recurrentem, (& *Regiæ olim Societati* (b) renunciavi:) contra quam *Galenus*, qui *Paralysin* nullos labere *Typos* affert (c): nisi forsitan (ut illustri *Pergameno* suus servetur honos) de *Paralysi* omnium exquisitissima, & *Primigenia*, sermonem il-

(a) Αὐτὴ δὲ γλῆχρος, ἔ' ὀλκιμος, ἔ' δυσέκκετος. De atra bile, cap. 5.

(b) Vide *Ἀθλα Philosophica Londinensia*, num. 242.

(c) Οὐδὲν τῶν παθῶν ἔ' συνήνται ὡς Ἀτροφία, Παράλυσις, κλ. Libro de *Typis*, cap. 2.

le facere, nostra vero, jam dicta, *Paralysi Hysterica* censetur.

VIII. *Paralysi Arthritica* morbus curatu perditicilis, idque præcipue duas ob causas. Harum altera situs est istius morbi in corpore profundus, nimirum intra *Cerebrum*; ex quo fit, quod, adversus eum quæcunque dentur, ore demittenda, remedia colum tam *Cerebri*, quam *Intestinorum* penetrantia: non parum alterentur, nec in alienum, quod est morbi adeo remoti causa conjuncta, pulsu satis valido arietet, aliæve, uti par est, afficiat. Altera vero difficultatis huius causa est, quod in corporibus senio, vel *Arthritide* confictis, aliæve fractis, & debilitatis, itaque medicinam minime sic, ut par est, sentientibus, locum hic affectus plerumque teneat.

Verum, ut singularia persequar, si morbus hic *Apoplexia* succedat, propter injuriam *Cerebro* inflictam, curatio longe difficilior; & si recurrit *Apoplexia*, tanta plerumque vis humorum, & tam ἄδρῆς in *Cerebrum* impellitur, quanta id obruatur, & ægrotus, antea debilis e medio feratur.

Si e diverso Μῖσµα, sine ulla (sive per *Apoplexiam*, sive alias) in *Cerebrum* gravi facta impressione, in *Nervorum* tubulos irrepar, & se paulatim insinuet: sique interea medicamenta, malo tam immani convenientia, sint adhibita, reliquæ æger ad præscriptum agat idoneum universa; hæc illius conditio minime desperata. Habet Ἰατρικὴ, quod (Deo adjuvante) huiusmodi debilem, quod elumbem, quod emaciatum, quod decolorem, motu, viribus εὐχρηστὰ, εὐσαρκία, donet: & ægrotantem, ultra quam expectatio sit, restituat. Quibus autem modis hæc curatio fiat: jam proxime declarandum.

IX. *Therapia* duplex est; vel quæ, in morbo auferendo, vel in eo, ut ne augeatur, neve renovetur, inbibendo, quæ summis viribus contendit. In prima ejus accessione (quæ quidem indicatio primo loco persequenda) ne alieni vis ἄδρῆς in *Nervos* impellatur, entendum, quem in finem, si *Plenitudo* sit cum pulsu forti, & nihil repugnet, e re futurum arbitror sanguinem e brachio, aut vena jugulari, vel *Cucurbitulis*, & *Scarificatione* dorso detrahare. Horis aliquot post *Vene sectionem* immittatur *Enema*. *Purgatio* usus fere perpetui est, maxime vero ea, quæ sanguinem exagitet, & *Arthritidi* in artus amoliendæ faciat. Porro conducit, quamprimum morbus ægrum invadat, articulo ἐν τοῖς Ἀγκύροις sæpissime dolenti, *Cataplasma Claris. Batei Apoplecticum*, seu de *Raphano Cl. Fulleri*, aliudve quodvis acre, φοινικῶν excitans, applicare, & *Arthritida*, quæ jam nunc e sanguine fugam meditatur, ad τὴν ἔξω educere.

Facta humorum e capite *Antispasi*, & mutata eorum inclinatio, (nec quidem maturius, ne in *Caput* ii, impetu cum majori, a medicamentis inferantur) ad eos extra pellendos, ægroto dentur e *Pulvere Gasconico Purpureo*, aliisque mitioribus Ποδαγραγωγοῖς sic, ut artis est, composita, bis, vel ter in die, cum *Julapii* haustu *Cardiaci Cephalici*. Quamprimum tumor ἐν τοῖς ἔξω fuerit, admoveatur ei *Vesicans*, quod humorem, in eo contentum, foras eliciat, neque retro agi patiatur.

Huc etiam confert *Epispasticum*, cervici, seu collo posteriori dimidio; huc capitis ad cutim *Tonsura*, *Rasura*, & *Emplastrum* ei, de *Cumini Seminibus*, aliudve quodvis attrahens, impositum; quod nempe, post *Evacuationes* generales, si aggravatur, *Caput* allevari. Pro sunt *Gargarismi*, salivam jugiter elicientes, & *Dietæ* ratio tenuis.

Interea temporis, *Spiritus volatiles*, *Tinctura Castorei*, *Succini*, &c. *Julapii Cephalici* haustu, vel cum *Anthus*, sive *Salviæ Infuso*; quæque indicationem vitalem tueantur reliqua, sive extra, sive intus, ea, qua opus fuerit, dosi, modo, & frequentia, juvat adhiberi.

Quoties autem materia *Nervis* est impacta, & infixa, ad eam tenuandam, & vias *Spirituum* aperiendas, (quæ medendi indicatio altera est) iis e *Ligno Sancto*, & *Sassaph.*, eorumque *Corticibus Decoctis* opus, iis, e *Ferro præparatis*, *Frictionibus*, *Balneatione*, *Embroche*, *Vestitu*, *Linimentis*, *Ceratis*, *Emplastris*, & id genus aliis, quæ in *Paralysi Primigenia* cum fructu præscribuntur. In *Paralysi Arthritica*, virolo afflatu facta, *Decoctum Corticis Chalybeatum* ægro multum profuissse novi.

Hic autem sedulo videndum, corpus ægri frigidum an calidum; miasma simplex, seu γλῆχρόντη involutum, an bile mistum, ut in *Paralysi Arthritica*, *Colicam Biliosam* insequente; cujus exemplum mox subiungam satis luculentum. *Calida* enim (si ad diutinum tempus, & copiose propinentur) remedia insomnes reddunt ægros, inquietos, & perpetuo quasi febricitantes, spiritus eorum animales, indefinenter tumultu & agitatione fatigati, perimuntur, nec a medicamentis hisce, utut valentissimis, & maxime *Cardiacis*, vel minimum iis robur accedit, contra, turbamur & debilitatis multum. Huiusmodi laborantes *Aqua* seu *Spadana Germanorum*, seu *Bathoniensi*, seu *Bristolensi* (& procul dubio alia non pauca *Ferro* gaudente, perque renes exeunte) modo viva hauriatur, magnopere reficiuntur; restinguunt enim illa spirituum ardorem, a bile factum, æstrum eorum mulcendo componit, & adjectis, suo tempore, & modo, *Chalybeatis*, huiusmodi affectuum curatio quam jucundissime, quam certissime perficitur.

X. In morbi huius *Prophylaxi* nihil conducibilius, quam, ut *Arthritis* paroxysmos habeat regulares, studiose niti. Hoc enim, ut opinor, ratæ, firmæ, indubitandæque fidei axioma, *Paralyticum* hunc *Arthriticum*, quo plus artubus ægrotaverit, eo minus *Capite* & *Genere Nervino* laboraturum. Quamprimum igitur crescit, & in sanguine se attollit *Arthriticum*; si nihil vetuerit, *Purgans*, & quidem, Δραστικόν adhibeatur, posteaque *Martis Alcohol*. gr. v. bis, vel ter in die sumi præcipiantur. Quibus in subsidium, paucis post diebus, veniat externum aliquod, τοῖς Ἀδρῆς admovendum, *Arthritidem* evellens, & in horum usu perseverandum, donec *Arthritis*, si commode fieri potest, eruatur, & in artubus sistatur. Interea vero temporis, *Alvus* ne dura sit, & humores ne in *Cerebrum* eleventur, est cavendum, & ut janua nunquam non aperta sit, qua natura, (quoties ei visum fuerit) in exilium miasma mittat, & foras extrudat, in brachio, vel dorso potius, ut fonticuli fiant, atque juges sint, curandum.

Hac quidem medicina, qua *Curationem*, qua *Prophylaxim* exhibente *Paralysin Arthriticam* tum perfectam abstuli, tum etiam (quantum ex usu licet conjecturam facere) quo minus reverteretur, effecti: & morbo, olim gravissimo, & ad recurrendum apto afflicti, senectutem, hac tutela (nimirum *Arthritidos* beneficio *regularis*) tum longam, tum incolumen sunt adepti.

De *Paralysi Arthritica* hæc dicta sunt.

HISTORIA I.

Cephalalgia Arthritica, cum Paralyfi incipiente curata.

Mulier Exoniensis, adolofcentia nondum exacta, citius nimium, quam viri folent, Arthritide laboravit. Sex fupra viginti annos habens, permultos ejus paroxysmos ex intervallis erumpentes, dolore primum articulari, deinde tumore, nitore, rubore fignatos, eff perpeffa: quibus vero modis, & gradibus, increvit tumor, iis ufque remiffit dolor, maxime affecti funt pedes, nonnunquam genu, fub accelfione Arthritidis nuperam articulum dolentem Linimento quoddam repellente lenivit. Hinc materia dolorem faciens, fanguini reddita; in Caput translata, quod vel eo palam factum eff, quoniam ægram Cephalalgia, (raro alias, vel nunquam ei moleffa) jam tunc invafit atrociffima. Artus etiam aggravatos, & vix fatis habiles, nonnihil affici, atque adeo infultu Paralytico tentari patuit.

Contra Paralyfin incipientem, & Cephalalgiam ex Arthritide repulfiffa confirmatam, ea præcepi, quæ fequuntur.

2℥. Aloes rofat. 3℥. Scam. pul. gr. v. Ol. Abf. ch. gutt. j. El. Propriet. q. f. f. Pil. mane demittenda. Harum ægra beneficio, ter quaterve, modo laudabili, dejecit. Peraffa purgatione, Bolum hora fomni (ex Theriac. Androm. 5j. Pul. Purpurei, & Gascon. ana 5℥. Conf. Alk. q. f.) & quarta alios quaque hora, Pulveres, in eo contentos, per fe affumpfif, ex Julapii Cardiaci Haufu. Ter etiam in die, Spiritus, Vol. Oleof. guttæ xv. cum poffeti, Floribus Rorifmarini alterati, haufu. Ut autem hæc, quæ materiam in artus expellant, ita comparata funt alia, quæ, artubus fuperpofita, eam extrahant: Emplaftrum nempe, ex Saponis Veneti, Picis Burgund. Empl. Cephal. aquis ponderibus, utrique genu, & malleolo applicandum: tibiæ vero utrique, & cervici Epifpaflicum.

A defectionibus Caput non mediocriter levatum; ab Epifpaflicis multum, Emplaftra attrahentia pruritus fequebatur; uti etiam Dolor plane Arthriticus. Ægræ fuccursum eff, tum magnum in modum, tum celeriter, tum etiam opportune, brevi, forfan, alias fuccubituræ. Addam denique, facta hæc, & tranfacta omnia, tempeffate nullo modo favente: frigidiffima enim erat, & Arthritidi educendæ, (quod a me plus femel obfervatum) ineptiffima.

Cum vero Cephalalgia, longo poft tempore, recruduit, iterato Cathartico, & ambobus brachiis admoto Epifpaflico, curata eff ægra.

HISTORIA II.

Hemiplegia Arthritica fimili modo curata.

Um in his confcribendis fum, obviam mihi venit hujufce morbi hiftoria, in eo confirmando, explicandoque, momenti non exigui. Civis Exoniensis, per omnem vitam fobrius & temperatus, dolore primum brachiorum, crurum, & coxendicis, ad mensis fpatium vago, eff afflictus. Hunc ut tolleret, Theriacam ille Venetam affumpfif; cujus ope proturbatus humor, in pedis digitum miffus eff. Articuli enim maximi dolor; ardor, rubor erat, fimulque globi, infra pofiti, tumor. Raro unquam Arthritis ulla manifefior.

Cum ita res effet, circumforaneus quidam Medicus, nunc oneribus bajulandis, nunc autem medicinæ, uti fors tulit, faciendæ operam dare folitus, ægro perfuafif, ut ad dolorem mitigandum ex fuis emplaftrum, (nobile quoddam antidotum, a Triphone acceptum) dolenti articulo fuperponeret. Quo temere facta, dolor intra breve tempus fedatus eff; tumor omnis fubfidit, & repulfæ, in eo contenta, materia Caput invafit. Somnolentia primum, inexpugnabilis pene dormiendi neceffitas oborta eff; tum paulo poft Vertigo; deinde Apoplexia, quæ vicos obambulantem ægrum humi proffravit. In domum proxime adjacentem veffum, pulfu dubio & vacillanti, finiftri lateris Hemiplegia laborantem, fenfu motuque corporis univerfi prope orbatum reperi. Sanguinis 3xij. quam citiffime detractis, & Enemate in alvum miffa, rejectoque, nonnihil levatus eff. Ad excitandos fpiritus animales, iis amicos, & 6moventes, volatiles, ex Julapio Cephalio largiter, & fæpiufcule dedi. Vertici, & cervici Epifpaflica, plantis pedum Emplaftra ex Pice Burg. & Empl. Cephalico admoveri, Sp. Salis Armoniaci, cum Sale Tart. præparat. fæpe fubmitti naribus inffitui: poftidie Pulvera Varuvicenfis alvum moveri.

His fimilibusque auxiliis paucis poft diebus verba diftincte pronuntiavit, mediocriter ambulavit, Capiti finiftram erexit, debilem vero, & fenfus adhuc obtufi. Ut hæc fecundæ valetudinis initia confirmarentur, utque fpiritus animales recrearentur, & ad munera rite obeunda ftimularentur, ea, quæ fequuntur, adhibui.

2℥. Sem. Rutæ gr. viij. Salis Vol. Succini gr. iv. Conf. Anthus 5ij. Pul. Serp. Virg. gr. viij. Syr. Pæon. fimp. q. f. f. Bolus, ter in die fumendus, cum Julapii haufu.

2℥. Aq. Pulegii, Rutæ ana 3j. Bryonia C. 3iv. Marg. pp. 5i3. Sacch. albiff. q. f. f. Julapium.

2℥. Tinct. Caftorei, Sp. Vol. Oleof. ana p. aq. fumat gutt. xxx. cum idoneo quovis vehiculo, bis in die.

2℥. Cacum. Calviæ tenuifol. 3vj. Sem. Sinapios, Cochleariæ contuf. ana 3ij. Cort. ext. Aurant. Rad. Raph. Sylveft. raf. ana 3j. f. Sacculus, quatuor Congiis Cerevifiæ in Potionem ordinariam, infundendus.

Hac utique medicina, fi vitæ rem fpectemus, ad fanitatem pervenit, fartus & rectus, æger: cum vero finiftri lateris quædam maneret imbecillitas, illius caufa Pathoniam, meo hortatu, petens, Thermas ingreffus eff; unde artuum, qui defecerunt, vires & robur priftinum pene redintegrarum habuit, ex illoque tempore, fubinde dolens articulis, annos ille permultos egit, Apoplexia, & omni capitis infultu liber, non nifi fenio demum confectus.

HISTORIA III.

Paralyfis Arthritica, cum Spafmo Cynico, lethalis.

Quidam ad Credenum humili loco natus, media ætate permultos annos Arthritide laboravit; tentationes certis quibufdam periodis, eafque rectas, & benignas, iterante. Mense Majo, Anno MDCCII. tum Chiragra, tum Podagra, pofteaque Spafmo oris Cynico (nullo ca-

pitis affectu, nedum Apoplexia præcedente) correptus eff. Verba edidit imperfecta, confufa, dimidio Linguae refoluta. Pulfum inveni debilem, vires fractas, neque venæ fectioni, neque purgationi confentientes.

Capiti ad curim tonfo, & deinde rafæ, Epifpaflicum applicui: malleolis, & manibus (locis ab Arthritide frequentari folitis) Phœnigmos. Tumoribus a Phœnigmos applicatione factis, Epifpaflica. Interea temporis Pul. e Chel. CC. 3℥. Chal. N. 5℥. ter in die, cum Vini rubri Hispanici 3iv. Porro, ter in die, debito a Bolis intervallo, Sp. Vol. Oleof. & Tinct. Caftor. ana gutt. xv. ad xx. cum Julapii Cephalici Haufu. Sp. C. C. cum Calce viva, naribus fubinde in languoribus admovetur. Cerevifiæ, Raf. Radiculæ, Cacum. Cochlear. Sem. Bardanæ medicata eff.

Quod derafo Capiti impofitum fuit, bidui fpatio parum evocavit. Cætera profuerunt ægrotanti. Poftquam enim Arthritis ad πὲ Δ'κρὰ fuit translata (quod fex aut feptem diebus factum) Spafmi omnes fublati funt, vox reffituta.

Minime vero perfectæ hæc curatio; etfi enim fputum, (Paralyticis fere omnibus familiare) jugiter effluxit; etfi auxiliorum ufu præfcriptorum, duos prope menfes Arthritis artubus infeedit; unde fames renovata, facies colorata, aliæque fanitatis orta fuere indicia, (quæ Arthritidi denuo reductæ ipfe æger retulit accepta) Linguam tamen ufque refolutam, memoriam infuper labefactatam habuit.

Contra malum tam pertinax, & δύσλοπον, ad tres vices Purgatione, & diebus otiofis Decofto ufus eff Lignis, neque fine fructu aliquo. Verum in Nervos tanta alieni vis irreperat, itaque eos corruerat, ut poft varia medicamentorum genera incaffum adhibita, (utpote, caufam in corporis recessu tam recondito locatam, quæ non dimoverent) ægrum.

Θανάτιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυπεν.

HISTORIA IV.

Colica Arthritica in Paralyfin degenerans Arthriticam.

Hæftenus Arthritidos rectæ, in Paralyfin abeuntis, exempla protulimus, inverse jam & Anomale, eodem modo finientis, ecce tibi hiftoria. Tenui corpore, biliola constitutione vis annorum ferme quinquaginta, quindecim vero annorum podager, ineunte anno MDCCII. pedibus & utroque genu doluit: ceffante vero brevi tempore eo dolore, Colica tentatus eff. Succellit brachiorum primo gravitas, & debilitas; mox Refolutio, ut e digitis nullum movere poffet. Fames abolevit, cibi omnis faftidium fuit, quodcum jam diuturnum effet, ex eo reliquisque morbi fatellitibus, corpus jam plane emaciatum, faciei color flavus, oculorum, quod album effe debuit, ictericum id omne factum eff.

Arthritidem hanc ad πὲ Ε'ντερά inverfam, & a visceribus, una cum bile colicam dudum committente, in Nervorum Tubulos translata effe judicavi.

Ut curationis, quod fieri poffet, abfolutæ iniretur ratio; primum, Decofto Cardui ventriculum moveri; Soluta tum Purgante ventrem inahiri fedulo inffitui. Iis, quæ in impedimento effent, expreffis, Aquam dedi ferratam bibere tepefactam, omni mane, ad libram quafi integram, neque nifi forbillando, & paulatim hauriendam, aliasque, loco potionis ordinariæ, eandem, cum Vini Lufitanici ea quantitate, quæ ad ὁπείσιν opus inveniretur.

Magno fuit huic ægrotanti auxilio, una cum prædicti Aqua ferrata: naufeam enim ademif, famem (id eff, vitæ fpem) reddidit, aliisque poft hæc adhibendis viam aperuit. Chalybem addidi Nutritum, quo in articulos pulfa eff Arthritis, pedis tumor & dolor factus; quæ tamen, omiffa Chalybe cito decreverunt.

Hac autem medicina (ῥ'δρ'οποιὰ nempe diu producta, continuataque, & Chalybe interdum adjecta) visceribus robur, oculis vigor, faciei color reffitutus eff. Spirituum turbis & agitatione, quæ quidem magna & permoleffa fuit, compofita, fudum undique & ferenum eff. Ex elumbi, debili, & emaciato ægro, qua morbo, qua inedia prope jam enecto, res falutis adeo fervata, & vires inflauratæ funt, ut, tamen quædam maneret artuum imbecillitas; negotia tamen obire, itinera equo longa & crebra facere valeret, vitæque alacrem, & vitalem tum ageret, tum etiam acturus effet.

Adeo enim ex medicina profecit, ut jam, annis poft quatuor, multo rarius, multo illum mitius dolere, & paroxysmis tuto carere, (manum vero finiftram, ob tendines contractus, motu fere omnino privatam effe) per literas nuper accepi.

HISTORIA V.

Arthritis primum, & deinde Paralyfis, a materia Colicæ biliola.

Æmine olim memoratæ, primum colica biliola, deinde Podagra laborantis, hiftoriam, quoniam eo tempore plenius de illa differrere nihil attinebat, interruptam, hic loci continuare libet, & ad finem perducere. Remittente (fic, ut dixi) (a) Arthritidis paroxysmo, caput illico tentatum eff, & quidem impenfiffime. Somnus enim inquietus, nec qui, uti parerat, ægrotantem reficeret. Huic adde Capitis gravitatem, & dolorem: quod vero præcipue notandum, quoties expersifficeretur, quod d. ceret ageretve, nihil in promptu habuit, oppreffo nempe Capite, & Mente quafi nube obducta. Periculum erat, ne confestim Apoplexia profterneretur: detractioe fanguinis periculuni ifthuc imminutum, nubes fublata. Brevi poft tempore Paralyfis fecuta eff, qua demum ægra ῥ'δρ'οποιὰ, & Balneatione diutina liberata fuit.

Quandiu hujus ægræ membra fuere refoluta, & aquæ potationi illa incubuit, Arthritide tandiu immunis omni perfiftit: integra vero ad confuetudinem rediens, & veteri diætæ ratione ufa, Arthritide jam nunc urgetur regulari, qua utique confirmatur, prifcos illos, five pedis, five malleoli dolorem & tumorem, fuiffe plane Podagricos.

Aliam novi intestinis pariter dolentem, & quidem ex eadem caufa, poftea vero Paralyticam, cui, cum integrum effet, & intactum adhuc Caput, at bile fanguis æftuaret, ortus eff in manibus dolor, & tumor plane Arthriticus; & indicio fuit, naturam hac inimicum porta conari expellere. Hi vero conatus, quantum adhuc obfervavi, languidi & pene fruflra fuere omnes, & Paralyfi cefferunt:

(a) Vide Differtationem. De Arthritide Symptomatica; Cap. x. Hift. I.

runt: quæ denique *Chalybeatis*, & remediis sanguinem evehenti-
bus, ut & genus *Nervinum* penetrantibus, una cum *Aquarum Ba-*
thoniensium potatione, & in iis *Balneatione* crebra, penitus sana-
ta est.

Hiscæ vero observatis omnino liquet, materiam colicæ biliosam,
causam ejus proximam & continentem nunc in *Articulos* extrudi,
& ab iis in *Nervos* transferri; sicque in nonnullis corporibus ean-
dem esse *Colicæ*, & *Arthritidos*, & *Paralyseos* ordine materiam.

HISTORIA VI.

Ob Arthritidem in Nervos inversam, Αἰσωνία.

VIr bonus, cum primis honestus, diu meus ἐν τῷ φαρμακοποιεῖν
familiaris, jam inde ab adolescentia *Arthritide*, ad tempus
redēnti, laboravit. Vox a pufillo puero, ei densa fuit, obscura,
nec quæ verba clare, vel articulate satis exprimeret, a *Nervorum*,
uti videtur, imbecillitate nativa ducens originem. Ad hæc acces-
sit, ob mortem filii (quem ille quam maxime amavit) dolor vix
consolabilis, ægritudo valde discrucians. Cum eo loci res esset, &
paroxysmus jam declinaret, nondum autem ad exitum perducere-
tur, in apricum animi causa æger vectari voluit. In collem pro-
ximum & vicinum, at eminentem & apertum, bruma tunc tem-
poris sæviente, quando, etiam tum e lecto surgens, elatus fuerit,
ibique plus nimio commoratus, mœstum, & imbecilli lingua *Ar-*
thriticum invasit primum algor, deinde vertigo, tum brevis quæ-
dam mentis alienatio, actionibus absurdis, insolitis, & indecoris
manifesta; deinde lateris, postmodum resoluti, imbecillitas, & ob-
eundi motus impotentia; postremo, & paulatim linguæ *Paralysis*,
Αἰσωνία.

Non novum huic ægroto hujusmodi malum; nam cum moris
erat, exeunte omni paroxysmo, quam citissime potuit, lectum ab-
dicare, & foras illico pedem efferre, vel gestari, raro id impune
fecit: imo, quam citissime fecit, tam maxime pœnas dedit: tam
citissime lingua ejus, tanquam ligamento, impedita, & (quod a
familiaribus sæpe observatum) aliena vox. Non novum, inquam
hujusmodi malum, nova mali fuit gravitas.

Ut morbo isti medicinam facerem, quæ sequuntur auxilia sunt a
me præscripta.

℞. Conf. Abs. Rom. Spec. Diambrae.

Z. Z. in Indiis Cond. ana ℥i.

Conf. Alk. q. f. f. Bolus.

℞. Pulv. Serp. Virg. gr. xii.

Castor.

Spec. Diatr. Piper. ana gr. iv.

Ol. e Sem. Carvi Chym. gutt. ii.

Bals. Per. q. f. f. Pilulæ.

℞. Cort. Winterani,

Rad. Zedoar. pul. ana ℥iii.

Sem. Anisi Carvi ana ℥i.

Cochlear. ℥i. misce, & infunde in Vini albi Lusitanici ℔ii. usus
tempore. Cochlearia duo, vel tria colentur, cum Cerevisia commiscen-
da. Cerevisie haustus hujusmodi medicatus Bolo, & Pilulis quoti-
die superbibatur. Ampulla, ad dimidium vacua, Vino simplici re-
pleatur.

Porro infundantur in aqua fontana bulliente Sem. Cochlear. contu-
sa, Rasura Radicule; Infusum Diambra dulcetur, f. Gargarisma sæ-
pius in die adhibendum. Frictiones artuum sint frequentes. Sumat
etiam Spiritus Vol. Oleos. gutt. xxx. cum vehiculo idoneo, bis vel
ter in die, cervici Epispasticum admoveatur, post dies duodecim,
vel duas hebdomadas repetatur.

Horum usu medicamentorum (non quidem perpetuo, sed longo,
& cum intermissionibus ad tempus diuturnum productum) factum est,
ut verba, uno aliquo quamplurima præeunte, ipse, eadem nullo ne-
gotio clare repeteret. Vegetior item, coloratior, & hilarior evade-
re: cibum capeffere, devorare. *Arthritis* sub id tempus manu oc-
cupavit; curationis spem adduxit, at (eheu!) brevem, & fallacem.
Relicta manu, tam inclementer ægrum habuit, ut e vestigio Ca-
put dolore, stupore, aliisque mali moris accidentibus affligens, eum
pene confecerit. Hoc ob alvum, incuria domesticorum, nimis du-
ram (unde in Caput humores acti) evenit. Ex paroxysmo tam in-
felici, & naturæ rebus tam male convenienti, nullum *Paralyseos*
levamen, nulla vocis restitutio. Contra, medicamento non uno,
neque impotenti frustra adhibito, integrum jam triennium (si ver-
bum unum, aut alterum, μονοσύνθετον, excipiat) mutus fuit,
& quod annotatu dignissimum, per eosdem hosce annos, etiam
satis cibi ingerens, rarius & mitius solito doluit articulis.

Ut historię hujus summam brevi complectar, de hac *Paralyfi*,
in homine *Arthritico*, & jam tum dolenti, frigus insecta, quid aliud
cogitandum, quam quod humores *Arthritici*, adhuc in sanguine re-
lictī, efferti, & in fugam abituri, algore contracto, & angustato
corpore, in *Nervos* impelleretur, & in eos se abidentes mala jam
dicta committerent. Materia vero aliena, quæ e corpore expelli de-
buerat, in *Nervos*, natura forsan nimis apertos, & dehiscences, im-
pulsā, tanta ex eo œconomiz perturbatio, naturæque vires adeo
fractæ, & debilitatæ sint, ut, inverse in posterum *Arthritidi* favens
ea, regularem, ut olim, paroxysmum minime moliat.

HISTORIA VII.

Ex Morfu Canis, Arthritidis recte silentium, Stupiditas, Paralysis,
Arthritide denuo facta Regulari, curata.

RAra quidem, annis abhinc aliquot, & inaudita forsan *Arthri-*
tidos Anomala mihi sese obtulit historia, quæ, ut multa ob-
servatu dignissima, ita doctrinæ huic nostræ lucis non parum alla-
tura continet; ideoque protinus adscribenda est. Homo adhuc in
viviſc *Iscanus*, qui sub exitum sæculi novissimi, decimo ætatis
suæ lustro, pedibus subinde doluit. *Podagra* nimirum ætus ger-
manissima, malleolum mordente, omnibus numeris absolutā. Hunc
in modum ea, per triennium bis terve singulis annis, accesserat;
cum ex *Morsu Canis* (forſan rabiosi) *Podager* ægrotavit. Vulnere,
cruribus inflata, per mensis spatium, ichorem emisere; sanatis au-
tem iis, suppressoque flumine, nova malorum ingruit caterva, atrox

certe, & pestifera. Primum enim late, per universum corpus, spar-
sum est alienum aliquod sanguinis Οἷον, corporis æstum fa-
ciens inmodicum. Deinde *Caput* tentatum est: sedulum enim, &
in agendis rebus antea versatum, ægrum occupavit rerum prope o-
mnium oblivio. Stupiditas adjuncta est, & in sententia de negotiis
ordinariis cum judicio ferenda impotentia. Magna sub hoc tempus
erat membrorum undique omnium debilitas, & digitorum huc il-
luc serpens, tanquam ab acu pungente, dolor. Successit *Tirānos*,
aliasque pedum torpor, & δυσκίνησις. Simili vero ratione, qua corp-
us, ipsa laboravit, ipsa subſidit anima. Levis quavis de causa eju-
lationes æger, & lamenta edidit; non raro lacrymas. Postremo lo-
co manuum, pedum *Paralyfi* correptus, eorum neutrum, nisi labo-
riose, movit. Quod veto maxime notandum, *Arthritis*, quæ (ut
dixi) paroxysmos, bis, ter quotannis iterare solita est, jam inde a
Canis Morſu, per integrum biennium (quo, prædicto more, crucia-
tus est æger) ne semel quidem rediit. Ut hæc malorum ilias a miaf-
mate *Arthritico*, multum conturbato, perque corpus universum, in
ipſos *Nervos* acta (& quidem *Canis Veneno* forſan impellente) pro-
ficisci, non immerito credatur.

Docti unique Medici, & experientes, in hujus ægri curam incu-
buerunt. Quamprimum ea mihi demandata esset, (quando, præter
symptomata jam dicta, ventriculum etiam lædi, Ανορεξία, multo-
que vomitu urgeri deprehenderim) primum alvum subduxi, tum
Decocti Cort. Chalybeati ℥ij. ter in die sumendas imperavi. *Decocti*
hujus vere *Polychrestī* usu, cum levi corporis exercitatione diu con-
tinuato; (nempe, cum intermissionibus quibusdam, ad annos ali-
quot) mirum quantum ex eo commodi exortum: fames enim, oculi
vigor, faciei color, spirituum animalium robur (*Arthritide* denuo
ἐν τοῖς ἔσω revertente, & paroxysmos, sic, ut olim, edente regu-
lari) tum animæ, tum corporis mala finire cuncta. Εὐκίνησις, &
valetudo, post annorum aliquot interruptionem, omni ex parte
integra, & perfecta, felicissime restituta, paulatim, tanquam ex
postliminio, redierunt.

Si *Arthritidos* isthoc, ex *Morsu Canis*, silentium, si symptoma-
ta, per istius silentii triennium oriunda, (gravia profecto, & ter-
ribilia) si, ex *Arthritidis* reductione, symptomatum istorum fugam
animo rite perpendamus, nihil manifestius, quam quod a miafma-
te *Arthritico*, devio, & in *Nervos* irrepente, fierent ista *Spirituum*
animalium, & *Nervorum* mala, & quod, ex eodem miafmate in
artus (ut par est) exulante, *Paralysis* cum malorum ista cohorte
tolleretur.

HISTORIA VIII.

Convulsiones, ex Arthritide inversa universales, Arte
medica sublata.

HIs ob morbi discrepantiam, an affinitatem dicam? *Convulsionem*
addam universalium, ex *Arthritide* intus in *Nervos* acta, hi-
storiam. Vixit, annos ante paucos, in *Iscæ* nostræ suburbiis, fa-
milia, proba quidem & honesta, neque Veneri, neque Baccho de-
dita; quæ tamen *Arthritidi*, sic, ut raro, quæquam unquam ma-
gis, est afflicta. Fratrum unus e medio *Apoplexia* subreptus est *Ar-*
thritica; alter *Arthritide* τὰ Ἐντὸς δια premente obiit: de quibus
suis locis. Fratrum tertius, hic noster, articulis olim doluit, tum
crebro, tum vehementer. At cum hujusmodi cessavere, aut minus
crebræ, minufque vehementes fuere *Arthritidis* accessiones, *Con-*
vulsionibus ille correptus est, observatu dignissimis. Primum enim
illæ partium externarum erant; deinde, mira spirituum in *Capite*
Αἰσωνία postea vero eclipsi comitata. Cum ad ægrum arceſſerer,
Spasmi eum gravissimis implicitum, sensibus orbatum inveni:
cumque diuturnitate malum ingravesceret, (dies enim aliquot ja-
cuit ἀναισθητός) tollendi ejus ergo, medicina, qua possem efficacis-
sima, usus sum.

Præmissis alvum inanientibus, ut *Caput* allevarem, ad cutim ton-
so, & raso, ei *Epispasticum* admovi. Quod quidem amplum, &
diu adhærescens, optimo fuit ægrotanti auxilio; feri enim libras
(quinque, vel sex dierum spatio) minimum bonas evocavit. In-
terea temporis, quæ spiritus sustentarent animales, quæque eorum
motus ordinarent, ore sumenda dedi.

℞. Pul. Castorei ℥j. G. Galbani, Sagapeni, Asse fatid. ana ℥i.
Opopan. solut. q. f. f. pilulæ. Sumantur quatuor, ex Julapii Cephalici
Haustu, quarta quaque hora. Spiritus Castorei, & Vol. Oleos. in eun-
dem finem, ex eodem vehiculo, subinde sunt adhibiti.

Hac ego medicina, supra astantium expectationem, ægrum exci-
tavi, morbo eum ancipiti, & pestifero liberavi, & ut idem ne
recurreret incommodum, *Chalybe*, & *Cortice*, præſidiis hac in re
certissimis, ægrum munivi.

CAPUT XVII.

De Doloribus in Corpore vagis, fixis; de Ophthalmia; de
Erysipellate, & Achorebus Arthriticis.

Art. 1. **V**Idimus, quanta cum sævitia partes corporis nobilissi-
mas, & vitæ maxime necessarias agitet *Arthritis*: quam
illa (tanquam malus civis, qui exulare respiciens, rebus usque no-
vis studeat, domos illustres ad factionem suam trahat) intestina,
pulmonem, cerebrum, viscera ἐν ταῖς Κοιλίαις contenta fere omnia
corrumpat. Nunc, in regionibus a Metropoli, & locis principibus,
longe diffitis & remotis, in provinciæ interioris ambitu, in parti-
bus viscera continentibus, quid eadem faciat, quoque se modo ge-
rat, diligenter exquiramus.

Horum locorum *Anomala*, quæ a me notatæ sunt, in iis *Vaga*,
Fixa Arthritis, *Ophthalmia*, *Erysipelas* & *Achores Arthritici*; de
quibus omnibus hoc capite dicam, uti sequentibus: de *Epiphora*,
& *Dolore Dentium Arthritico*.

II. *Arthriticis* iis, quibus sanguis acri miafmate diu multumque in-
quinatus, cum ad αἷμα id elatum efflorescit; familiares aliquando
sunt *Dolores*, qui nunc vagantur per regiones dorsi, & lumborum,
per scapulas, sternon, cervicem, & caput externum: earum nempe
partium aliqua incipientes, eam ad tempus aliquod afficiunt, donec
alio, quocunque vult natura, transferuntur. Quæ utique loci mutatio
interdum crebra est, & in nonnullis hi *Dolores* (quod ab *Arthritico*
non

non uno tempore accepti) per corpus serpunt externum, pene universum: *Arthritis* sic in *Trunco* vaga, non semper intellecta, *Rheumatismi* nomine vulgo delitescit; quæ tamen, si utriusque huius morbi naturam penitus scrutemur, ab eo longe discrepat.

Nunc in eodem loco commorantur hi *Dolores*, eumque non parum mulcant. Novi hominem, cuius sanguis quando plane computruit, & in *Arthriticam* degeneravit dyscrasiam, huic, inter alias morbi huius *Ανομαλίας*, in regione lumborum, (ac si a renum calculo) *Dolor* immanis, & permolestus accidit; quem tamen a miasmate *Arthritico*, membranas eo loci spinam investientes stimulant, fieri probabile est. Vertebrarum hæc *Membranas*, etiam si plurimum urgeri corrodiqve noverim; raro hoc fit, præterquam in iis, quibus seu ætate, siue morbis pene confectis, regularem *Arthritida* præstare nequit natura. Novi *Arthritidis* calidæ materiam, *Oculi Tunica* adnatam invadentem, *Ophthalmiam* inferre; cum paulo post articulos inviseret, iisque paroxysmum aptum, & laudabilem excitaret, eodemque tempore finem *Inflammationi* poneret, eam omnino *Arthriticam* esse manifestavit.

Novi *Arthritida Palpebram* in vetulo quodam superiore, mentem & eo amplius, excruciantem, quæ cum *Omagram* habuit adjunctam, & *Podagram* e vestigio sequentem, ingenium & morem suum abunde declinavit.

Faciei porro *Erysipelas* notavi, quod detractio sanguinis, factaque inde materiæ in artus *Διάδοχῶν* cum in *Dolorem* mutaretur istuc *Arthriticum*, naturam plane concessum est *Arthriticam*, ipsumque esse materiæ istius generis calidæ & evectæ, eo in loco *ἐξάνθημα*.

Nullius autem *Anomale* in externo corpore natura subtilior, quam quæ est *Arthritidos Achores* inducentis. (a) Jampridem traditum, in nonnullis corporibus fere idem esse, utrum per articulos, an per *Aurium Ulexcula*, id, quod alienum, emitteretur: quod quidem observatione mihi non una confirmatum. Sunt enim *Arthritici*, quibus, in paroxysmorum intervallis, (maxime si paroxysmi tenues sint, & nimium mites, aut forte intercessi) ista per *Aures* evacuatio vicem obtinet *Arthritidis* summe regularis. Sunt etiam, in quibus, neglecta re articulari, perque artuum glandulas veneni expulsiōne penitus omissa, natura unius *Achoris* contenta, per eos id exterminet.

III. Affectibus jam dictis, una cum aliis omnibus, quæ *Trunci* relinquuntur, *Anomalis*, hoc commune est, eas periculo, quam *Anomale* sunt internæ reliquæ, multo magis expertes esse, & ad Regularem *Arthritida* propius accedere. Cujus rei ratio, tam ex locorum a natura ignobilitate, quam ex eo, quod auxiliis etiam externis ii tractari possint, elicienda est.

Quinetiam hoc addendum, a corporis ambitu, ad ejus medullium, a *τοῖς ἰσχίοις* ad *τὴν ἰσχὺν*, *Arthritidem* non creberrime transferri: certe rarius, quam ipsam Regularem. Cujus eventui nullam aliam excogitare valeo rationem, quam quod *Artus*, a corpore longe in aerem projecti, sæpe a frigore magis patiantur; & quæ *Arthritida* reperiunt, causis magis pateant externis; quibus hæc nostræ *Anomale* non sunt adeo obnoxia, & raro intercessit viscera subintrant, verum e contrario in artus multo frequentius erumpunt.

IV. Communis harum *Anomalarum* medicina vult, ut, graves eæ si contingant esse, initio detrahatur sanguis; deinde purgans, (siue *Aloeticum*, siue aliud e *Δρασικωτέροις* aliquod) quo materiæ vitiosæ partim ano possit expediri, partim ad artus amandari, detur.

Præter hæc communia, nisi malum ingravescit, nihil est, quod amplius suadeam medicinæ. Tuta enim est, & incolumis ægroti res, si non ex omni parte placida. Quin & ii homines *Arthritici* molestius sæpe ferunt *Dolores* in articulis, etsi restituendæ sanitatis ergo factos, quam, cui medeantur illi, malum. Mos igitur iis in hoc rerum statu gerendus, &, donec malum per se inclinet, aut tempore vincatur, expectandum est.

At si urgebunt *Dolores* (quæ propria eorum medicina est) æger stragulis in lecto coopertus, aut *Spiritu C.C.* aut *Theriac. Androm.* cum *Pul. Guasc.* vel *Rubro Exoniensi*, vel ejusmodi alio *Cardiaco*, una cum *Poseto Antosato*, siue sudore materiam foras ejiciat, siue in artus amoliat.

Quod de *Doloribus* hisce, tam fixis, quam vagis, pronunciavimus, id etiam *Erysipelate* valebit, ut nempe per *Cardiaca*, *Podagram* expellentia, miasma procul arceatur.

Si, post evacuationes jam dictas, intendatur *Ophthalmia*, siue etiam minime levetur, erit, quo organum, æque pene cum vita earum tueamur, remedio opus: quare *Collyrium* modice discutiens, & corroborans adhibeatur. Inservit huic intentioni id, quod sequitur.

24. *Album Ovi agita*, *Aqua Rosac. dilue*, adde *Camphoræ gr. aliquot*, f. *collyrium*, cuius guttæ in *Oculum* pauca omni mane instillantur, linteaque eo immersa palpebræ bis terve in die superponantur. Potest commode *Lapis Calamaris*, siue *Tutia* præparata *Collyrio* superaddi.

Si *Αχόρες* permolesti sint *Arthritici*, eandem fere recipiunt curationem, ac qui absoluti; neque enim, eorum causa, in articulis dolorem excitari velim: tanta eorum incolumitas, tam magna utilitas. Quod de hac *Anomala* (quantum mihi videtur) una proponendum.

HISTORIA.

Achores, ab Arthritide in alio Corpore generati.

Postremo ineunte sæculo, non procul ab urbe, vir egit generosus; qui, ob juventam non nimis sobriam, ea vix finita laboravit *Arthritide*. Ætate progrediente, similem ea progressum habuit, & quotannis increvit; donec artuum motu ferme omni privatus, æger demum clinicus evasit. Erat ille vir, si quis unquam, totus ex *Arthritide* factus, pari certe ratione, atque dicitur

Ὁλὸς ἀνδρὸς ἐκ Ἀρτρίτις νόσος,

Cum annos prope viginti maritus sine prole esset, favente demum *Arthritide* filiam progenit. Castissima, & venerabilis ejus uxor non tam *Lucinæ*, aut *Dianæ*, quam *Arthritidi* debuit, quod facta esset mater. Patris tam *Arthritici* filia, originis suæ labem & maculam non uno modo agnovit: Erat enim vultu pallido & languenti, constitutione tenerrima. Plures enixa filios, partus ei non parum profue-

(a) - Differtatione de Arthritide Symptomatica. Cap. XI.

runt, & a miasmate nativo, magnam illius partem evacuando, tuantur. *Αχόρες* autem, præcipue cum illa defierat *ἐκ τῶν ποτῶν ἐκείνων*, erant gravissimi. *Aures* externæ, multum tumefactæ, per *Ulexcula* vires emiserunt, mordax & acra, cujus acrimonia regio isthæc omnis inflammata est. *Virus* siccum in squamas abire solitum est, in furfuraceas, subalbidas: quibus, siue sponte decidentibus, siue refricando sublatis, ichor denuo jugiter emanavit. Neque *Purgantia*, neque virtutum optimarum *Alterantia*, (a viris arte nostra celeberrimis præscripta) malum hoc vicere; modum ei forsan imposuere.

Ut semel dicam, miasma hoc indomitum & pestiferum, matronæ illius filios hunc in diem aggravat; quorum plerique omnes (sunt autem multi) *Aurium* exudationes, aut alias illius veneni notas, & indicia, veteri nempe contagio afflati, gerunt; & testimonio sunt probabili, miasma hoc virulentum, in alio corpore per *Arthritida* regularem, in alio per *Achores* a natura ejici.

CAPUT XVIII.

De Epiphora & Dolor Dentium Arthritico.

Art. I. **D**E Catarrhis iis, qui *Arthritica* facti materia pulmones, aliaque respirationis organa invadunt, & tussim frequenter interunt, alibi disputavimus. Qui *Oris* sunt, & *Oculorum*, eadem materia facti, atque eodem e numero reliqui; eos, hoc capite dicendos, jam nunc aggrediemur.

De *Podagra Dentium* libellum olim in lucem misit *Job. Steph. Strobilbergerus*, *Thermiater Cæsareus*; ut vel propterea super hac re sermonem instituere superfederem. At cum iste liber, quicquid promittat ejus inscriptio, non tam de *Dolore Dentium Arthritico*, (cujus neque therapiam propriam, nec quidem diagnosin ullam in medium profert,) quam de affectu isto, quatenus exquisito agat; integrum mihi erit, hanc *Anomalam*, cum aliis suæ Tribus, una tractare.

II. Quod accurate faciam, in primis observandum est, humores illos acres *Arthriticos*, qui, per ambitum corporis erratici, dolores ciere solent antedictos, in *Glandulas Oculis* vicinas, & discernendis lacrymis dicatas, a natura nonnunquam infundi, & jugiter isthinc emanantes *Epiphoram* creare: modo gingivas, & eas, quæ dentes circumvestiunt, membranas immiti, & *ὀδονταλγίαν* facere. Qui utique affectus sæpe diutini sunt, & (humore salso teneras, sensusque acutissimi fibras urgente, spiritusque eas inhabitantes stimulant) nonnunquam etiam molesti. Quoniam autem idem, ab *Arthritide* nunc a *τοῖς ἰσθμῶν* percussa, & paroxysmum interrumpente, oriantur; nunc in *Arthritida* regularem desinant, utrunque vero ita tum oriri, tum desinere constat, idcirco etiam *Arthritici* censentur; ipsamque esse *Arthritida*, sede germana, & vix jam relicta, alieno in regno *ἀνομαλῶν* latentem.

III. Si morbi illi tenues sint, nec ægrotantes supra modum urgeant, curatio his *Arthriticis*, ac quæ exquisitis, eadem sit utilissima: si vero graves periculum, vel molestiam inducant, hujusmodi velim medicinam.

Primo sanguis mittendus, speciatim, optimeque *Vena Jugulari*: tum venter resolvendus, sanguis turbandus, dato, quod ambobus his sufficiat muneribus, mane postero, *Purgante*: deinde *Epispasticum* cervici applicando: *Ulexcula* vero, ne arecant, *Litu* illinantur *Epispastico*, tandiu quidem, quandiu mali gravitas perduraverit. Postea, si *Arthritis* ad affectam usque partem adhærescat, non nisi molimine quodam in artus removenda, ad rem facient auxilia, tam quæ extra applicata, educant eam, evocentque, quam quæ ore sumpta expellant. Atque hæc istorum medicina morborum est communis.

Propria requirit, ut in *Epiphora* vitatis, initio præcipue, restringentibus (ne fero, acri, & venenoso exeunti viam occludant, & fistulam inducant) *Collyriis* mollientibus feri nimia mitigetur acrimonia. Quem in finem *Lac* inservit muliebre, recens, *Oculis* immisum, uti etiam, e *Mucilage Sem. Psyllii*, & *Cydon. Aqua Ros. extracta*, vel e *Trochisc. albo Rhasis* & *Aqua Plantaginis* collyrium.

Sin *Os Catarrhus* opprimat, & ægrotantem humorum copia, vel asperitas offendat, prodest *Gargarismis* eos tum diluere, tum elicere. Ad eliciendum, quam quod maxime, conducit *Raf. Raph. Rusticani*, ore retenta, & manducata, cujus sollicitatione prægnantes se gingivæ possint exonerare.

Si *Dentem* forcipe evelli, postulaverit *Dolor*, eo, quod alveolum purget, (*Melle* puta *Mercuriali*, cum *Sale communi*, *Aqua fontana mixtis*, vel ejusmodi alio) oportebit gargarizare: quo peracto, rursus in alveolum intrudatur *Dens*, ob evulsionem utilior evasurus.

Epiphoræ hujus exemplum in capite undecimo protulimus, *Odontalgia* vero *Arthritica* in manibus est historia, quam illico adscribam.

HISTORIA.

Dentium Dolor Arthriticus.

Quidam mihi familiarissimus, & in rebus agendis conjunctissimus, biliosum & siccum habens Corpus, *Catarrhis* jam inde a cunabulis immune; ubi ad ætatis medium accessit, ex pedibus laboravit. Plurima huic *Arthritico* acciderunt, quæ attente observata, recteque considerata, ad morbi huius inconstantis, dubii, versatilis ingenium, & morem explicandum, valeant egregie: Unum habeo in præsentia dicere, alias alia.

Cum ætas præcipitavit, (quæ non humanam modo sanitatem, sed & ipsos morbos afficit, eorumque interturbat, & abruptit ordinem) eclipses primo leviores, paulatim magnas, & graves passus est *Arthritis*. Pro *Arthritide*, Juncturas artuum more suo occupante, multumque cruciante, nunc *Vertigo*, nunc *Cephalalgia*, nunc *Dolores* per universum corpus externum erratici nunc (quod ad rem nostram atinet) *Dentium Dolor* acutissimus erat: Mirum ægro videbatur, & portenti simile, morbo se vexari tam parum convenienti, vetulum nempe, pumice aridiorem, *Catarrho* dentes infestante.

Intò hac de re colloquio, dubium & sollicitum percunctor, quo se modo gesserat per dies hosce nuperos *Arthritis*; utrum paroxysmos satis crebros, satis vehementes, sic, ut olim, ediderat. Neque crebros, neque vehementes æger reponit, sed in propinquo esse *Arthritidem*, ex *Cephalalgia*, ex *Doloribus* huc illud vagis, se harrolari. Quibus ego; Quid si adventantis illis *Arthritidos* signis, addas etiam *ὀδονταλγίαν*: quando hunc affectum, una cum cæteris modo dictis, eadem causa

causa fieri verisimile sit, *Arthritica* scil. materia, naturæ jam molesta, janua non optima in fugam pulsa.

Ut in pauca rem conferam, paulo post articulos invasit dolor *Arthriticus* omnibus numeris absolutus; eodemque tempore *Dentium* ille Dolor, ut & omnes alii remisere. Hujusmodi *O'dontalgiav* ille postea sæpenumero perpeffus est, ex *Arthritidos* aberrationibus, & deliquiis semper exortam, in *Arthritida regularem* & idoneam, semper exenntem: ut de confirmanda indole morbi hujus *Arthritica*, plura, ut opinor, addere supervacaneum esset.

C A P U T XIX.

Corollaria continet, cum Epilogo.

Art. I. **H**æ sunt *Arthritidis* in Trunco corporis *Anomalie*, non dicam omnes, nec quidem ullas omnibus numeris absolutas, (certe absolutum, & perfectum hujusmodi opus vix unius sæculi, nedum hominis unius esset; sed insigniores aliquas, & quæ in faciendâ medicina mihi passim obvenire, notatu digniores.

Ex iis, quales sint, persuasum mihi habeo, quod apparebit, miasma *Arthriticum*, præter artuum mala, omni ævo animadversa, varios, multiformes, multumque discrepantes inter se affectus, si eorum facies, si phænomena spectemus, efficere; & quidem in hac nostra regione (forsan etiam in aliis non minus) crebro: varios scil. pro istarum partium, & locorum, in quibus sunt, varietate, multiformes, pro diversa eorum structura, & pro eorum usu, discrepantes.

Deinde, constat affectus, sic a devio hoc miasmate generatos, partium affectarum morbos proprios, & vernaculos, ad amissim omnes simulare; vultus eorum usurpare; signa vel pathognomonica præ se ferre; neque a morbis indigenis; per ea, quæ concurrunt diagnostica, posse quovis modo distingui; sed e contrario revera cum iis sæpenumero confundi.

Deinde palam, uti spero, factum est, non hos affectus, alienos & *Arthriticos*, quoties ingravescant, & jam magni fiant, etiam si propriis affectarum partium morbis simillimos, illorum medicinis, (quæ quidem magnis, & gravibus hisce sublevandis, nequaquam aptæ, vel partes sunt;) tractari oportere; verum e diverso privis, suoque singulorum mori, & ingenio accommodatis, *Hædos* autem & *ædos* uniuscujusque horum pro ejus *Subjepto* esse, & cum eo multiplicari; unde tot novæ *Arthritidis* formæ, fereque tot diversæ earum curationes, quot inveniuntur ejus *Anomalie*.

Deinde, diximus *Anomalie* singulam singulæ curationem non alio modo facilius absolvi, nec quidem auspiciatius suscipi, quam partem aggravatam, & novo hoste obsessam allevando; illud autem optime effectum reddi, partim evacuationibus, tam universalibus, quam topicis; sed iis, privata ratione, quæ nimirum malis hisce maxime conducant, adhibitis, optime vero omnium per hostis expulsionem, & ab iis quæ intus sunt inique occupata, πρὸς τὴν ἔξω, ad artus ablegationem. Quibus autem auxiliis, qua medendi methodo, in prædictis *Anomaliis* hoc præstari possit, hujus scripti pagina fere omni ostensum est, & declaratum.

Hæc hujusce *Dissertationis* summa est.

II. Hisce positis, manifeste patet, quam ad hominum salutem magni sit momenti, deviam hanc *Arthritida* sectari investigare, quamque latebras ejus perscrutari, larvas excutere, & in artus suos, & domum utcumque invitam & reluctantem, eam, quaqua tuto possit arte, reducere. Nam, cum *Arthritis Regularis* & *Anomala* plerumque sint in simili ratione, de *Anomala*, tamen per se obscura, seque multum occultante; quantum illa grassetur in vulgus, & quatenus sæviat, ex *Arthritide Regulari* laborantibus, (nempe ex illius crebritate sævitiæque, horum autem *sex non naturalibus*) cuius liceat conicere. Qui recte calculum hac in re posuerit, pro certo invenerit, quod, tamen *Arthritide Regulari*, quam *Anomala*, plures ægrotant; tamen *Anomala*, quam *Regulari*, longe plures occumbant: immo quidem *Regularem* raro, nisi prius degenerantem in *Anomalam*, occidere, ita vero creberrime.

Prætermisiss autem his, & harum *Anomaliarum* investigatione, (quam in suorum commodum & tutelam, medentis semper erit pro re nata exercere) sive neglecta, sive perfunctorie, vel imperite facta, necesse est ægrotos, simulatis his affectibus, *Colica* nimirum, *Phthisi*, *Asthmate*, *Angina*, ne dicam aliis ejusmodi *Arthriticis* (id est, *Arthritide* morbos illos referente) opprimi quamplurimos; quoque longius serpat, & magis gliscat *Arthritis* idonea, ea proportionem plures.

III. Neque nostram hac de re doctrinam, ulla quidem ex par-

te, conveller, nedum eam evertet id, quod de *Arthritidis Symptomatie* speciebus olim dixi, (si quis hæc *Anomalias*, partium affectarum morbos esse vernaculos, & exquisitos, *Apoplexiam* v. g. veram, & genuinam, miasmate fieri posse *Arthritico*; frustra quoque toties, & sine necessitate multiplicatam a me *Arthritida* contenderit,) quandoquidem (ut de rerum nominibus, quæ earum naturas explicant, & tanquam icones, in conspectu ponant, eligendis & præferendis, nihil dicam) horum affectuum, utcumque nominatorum, medicina, quæ a me potissime spectata est, *εσπερας* suo usque, sic opinor, stabit talo, recto nempe & inconcusso, *Arthritidis* in artus expulsionem, quod a me propositum, omnino molienda.

Quibus addi potest veteres (*Paululum* volo, *Alexandrum*, *Aetium*, *Galenum*, *Aretæum*) non solum, ἡ δὲ ἔξω, sed etiam (ut in Præfatione dixi) ἡ δὲ ἔσω *Arthritidem* exhibuisse; horumque me authoritate fuisse usum, & vestigia repressisse.

IV. Hæ, quas nunc protulimus, *Arthritidis Anomalias*, suo quæque genere graves sunt, magnæ, & immodicæ κατ' ἔχλω: Alias autem minoris ordinis, easque non paucas esse suspicor, quæ nunquam eminentes, aut ad statum hunc notabilem evektæ plerumque visum fugiant & pro nullis habeantur. Enimvero usu medico vel parum exercitatis, hoc latere nequit; *Arthritide*, (præcipue frigida, inertis, languida, maxime vero omnium ea suppressa, retusaque,) ægrotantes, interdum *Humeri*, *Pectoris*, *Dorsi*, *Lumborum*, aliarumque in ambitu corporis partium *Dolore vago*, tanquam *Rheumatico*, sæpe etiam capitis affectibus, more prorsus *Hysterico*; alias aliis in corpore malis, quasi *Scorbuticis* urgeri, sæpissime vero *valeudine dubia*, & in tempus diutinum incerta, & neutra, esse. Qui quidem eorum status, ac conditiones, sensu remissiori, & leniori gradu morbosæ, natales suos *Arthritico* miasmati, cæco, in corpus subrepenti; & eo loci clam agenti, se debere, ultro videntur agnoscere: Quinetiam aliquando, multos post annos dubium hunc in modum actos; tandem, apparente paroxysmo *Arthritidis* idoneo, de istorum origine & natura malorum *Arthritica*, omnis sublata dubitatio est.

V. Quid? quod *Arthriticorum* gnatos quoties obtueor, & nunc *Achores*, nunc *Catarachos*, nunc *acres* intestinorum *Humores*, (ut taceam alios affectus certe non paucos,) iis familiares animo complector; profecto quidem memet vix temperare possum, quin eorum ortus incusem, & affectus hosce nihil aliud esse mecum reputem, quam *Arthritidis* hæreditariæ quædam *Ἀποπαράγωγη*, seu scintillulas, a parentibus accepras, in natorum corpora, simul cum ipsa vitæ lampade derivatas, & in iis, secundum eorum modum agentes.

Hæc vero cum sint tantummodo conjecturæ, nec quidem ullis fide dignis probationibus suffultæ, de iis solum *Anomaliis* scripsi, quæ indicis certis, & argumentis, si non *ὑποδείκταις*, tamen valde probabilibus, *Arthritidos* esse comprobentur; iisque fui contentus maximam partem *Anomaliis*, quæ ex *Arthritidis* præapertæ, claræ, & manifestæ deliquiis oriri jure merito censeantur.

E P I L O G U S.

Hæc sunt, quæ dicere habui de *Arthritide Interna*, sive in Trunco corporis *Anomala*, totius *Arthritidographiæ* parte (nostra quidem opinione) principali, & potissima, certe cultu & expositu omnium dignissima: in quibus exponendis eo fui prolixior, quoniam magni salutis hominum interesse judicavi, & a Medicis aut nulla fuit harum rerum mentio, vel si ulla, semper utique brevissima, quasi in transcurso facta: verum de certa *Arthritidos Anomale Diagnosti*; de illius *Reductione*, & ejus præstandæ methodo, nemo unquam mortalium (quantum scio) quidquam est locutus. Uti vero apud *Astronomos* ista *Solis* theoria, quæ ortus, ceteraque gloriosissimi illius *Luminis* phænomena describeret, omnino manca judicaretur; nisi etiam *Eclipses* ejus exhiberet, eo certe plenius, & accuratius exhibendas, quo illæ sint in chronologicis rebus illustrandis, & temporum punctis statuendis utiliores, quoque etiam explicatu difficiliores: Ita quidem *Arthritidis* historia, tamen *Regularem* plane & dilucide tradat *Arthritida*, nequaquam absoluta, atque adeo imperfecta credatur, si nullos habeat *Arthritidis Defectus*, si nullam *Internam*: cujus insuper notitia, quo humano generi commodior; quoque fuerit ignotior, eo distinctius, eo fusiori calamo tractanda.

Quin hæc a me diligenter observata, non sine labore collecta, fideliter renunciata, & jam, animo erga humanum genus benevolo, in lucem missa, boni consulite.

F I N I S.

Δόξα τῇ ἐν ὑψίστοις Θεῷ.

E P I T O M E

Differtationis Primæ de ARTHRITIDE SYMPTOMATICA.

C A P U T P R I M U M.

De Arthritide symptomatica, generatim.

Morborum Migrationes Successionesque ex Hippocratis Precepto sunt inspiciendæ. Art. I.
 Arthritis alia primigenia; alia secundaria, sive symptomatica. II.
 Quæ vel materiam, vel in huius generis arthritida Materie Merw-pismôn, Morbo alicui Primario, & precedenti, refert acceptum. III.
 Hujus Regionis symptomaticæ recensentur, suntque arthritidos, generatim sumptæ, quasi Pars dimidiata. IV.
 Symptomaticarum Ratio Generalis in eo sita est, quod cum Morbi sunt a primigenia distantes, ei tamen gradatim appropinquanti. Modum appropinquandi certissime commonstrant: simul cum usurpato arthritidis primigeniæ Vultu, primariæ Exuvie. Conditio Earum specialis. V.
 Symptomaticarum differentiæ, si Earum Externa, si Paroxysmos spectemus: Partus Facilitas a primariæ Indole, & in arthritidem propensione. VI.
 Alia arthritis symptomatica improprie dicta, quæ rheumatismo superat; Alia magis propria. VII.
 Quæ generatione procreatur vel æquivoca; ut ex chlorosi, & ex hydrope arthritis, vel univoca, quæ eandem cum primario Materiam habet, quæque ob Crisin aliquam imperfectam, exoritur: ut reliquæ omnes. VIII.
 Symptomatica magis propria non nisi Chronicum vetustum sequitur, & grandiores invadit; contra quam minus propria. IX.
 Symptomaticas hæc speciem inter se differre, & diversas pascere Curationes, existimandum est. X.
 Ex Morbi primariæ & arthritidis primigeniæ Therapia elicitur, in Medendis symptomaticis Indicatio. XI.
 In Paroxysmo, ab arthritide; in Vacatione, a morbo primario. XII.
 Prophylaxis ad menses præferenda, ad Annos aliquando repetenda. XIII.
 Ætiologia arthritica, ob neglectam symptomaticæ & primigeniæ arthritidos Discrepantiam, hæcenus imperfecta. XIV.
 Curatione inidonea. XV.
 Methodi ratio. XVI.

C A P U T I I.

De Arthritide Rheumatismo supervenienti, symptomatica falso appellata.

TRANSITIO. Art. I.
 Rheumatismo soli Frigore procreato succedit arthritis: Is autem, Sanguinis lentore gravi & repente Capillaria infarciens, generatur. II.
 Qui fiat ea ελαιοχρότης exquiratur: Non a Chylo acefcente: (Sanguis injecto Lacte non coagulatur.) III.
 Neque solum ab Acido, Serum ejus calefactum per Frigus subitum condensatur: rheumaticorum Urina minus salsa: serum, addito Syrupo Violaceo, virescit: Pellicula Sanguinis, per instillatam Sublimati Solutionem, albescit. Lentorem vel a Calore Frigoreque vehementibus & continuis, vel a Sale Alcalico, vel ab utroque nasci concluditur. IV.
 Rheumatismo male tractato subjicitur hæc symptomatica, & arthritidem Frigidam emulatur. V.
 Illius Facies & Mos. VI.
 A reliquis symptomaticis ut distinguitur. VII.
 Adversus rheumatismum valere posse Vomitionem, sed frequentem & caute præcipiendam. VIII.
 Ad hanc arthritida requirit indicatio, ut tollatur iste Lentor. Quem in finem Antiscorbutica, Spiritus Volatiles, adhibeantur. Quid per Oleum Tereb. Quid per Camphoram agatur, periclitare. IX.
 Pryalismus proponitur, & Emplastra cum mercurio, ut & ad Articulus exonerandos, Suctus. Quid per Maturantia fiat, delibendum. X.

C A P U T I I I.

De Arthritide ex Chlorosi, & ex Mensum Suppressionione.

ARTHRITIS a chlorosi Symptomatica est rarissima. Art. I.
 Eas tantum aggreditur, quæ stirpe sunt arthritica prognata. II.
 Causam habet Continentem, a chloroleos Continenti longe diversam, & ad istum morbum se fortuito adjungit. III.
 Interdum vaga est, sub rheumatismi Nomine delitescens: Alias articulis affixa: utriusque Diagnos. IV.
 Indicatio vult, ut per Muliebria Materie peccans expellatur: qua partu Naturali; V.
 Qua Mensibus. Hisce procurandis inserviunt Martiata eum Emmenagogis juncta, Aquæ Martiate, cum Purgatione nonnunquam intercalanda. VI.
 Arthritidis ex Mensum Suppressionione, Origo & Mos. VII. VIII.
 Medendi Lex, ut per Catharsin, sed Modo peculiari celebrandam, Materiam dimittatur. IX.
 Fomiculus aperiatur. X.
 In isto Pari Symptomaticarum impugnando, quantum interfit. XI.
 Historia arthritidis Vagæ, Fixæ, Nodosæ, Hereditariæ: ex chlorosi, natæ per Emmenagoga fugatæ.

C A P U T I V.

De Arthritide Hydropi superveniente.

HYDROPI arthritis etiam si crebro supervenit, inter Naturæ Δυσοντία tamen est censenda. Art. I.

Ab Hepate, sive viscerum aliquo nobiliori, Labe indomita vitato, quicumque sit hydropicus, raro Is Πόδαρριζ. At si in liquido omne vitium, ex eo sepe oritur arthritidis. II.
 Maxime vero post amara & chalybeata, hydragogis submissa, vel (ubi consistunt Vires) statim post hydragoga. III.
 Spiritus Sero liberati, vel per Se, vel Medicamentis incitati, emergunt denique, Materiam e Sanguine pellunt alienam. IV.
 Atque adeo Seminum, si quod intus latuerit, arthriticum. V.
 Et quidem bono omine. VI.
 Nullam postulat hæc arthritidis Therapiam nisi qua servetur, augeatur, ordinetur. VII.
 In hunc finem singularia recensentur. VIII.
 Ut ea componantur, & in Methodos redigantur. IX.
 Ad hydropa propellendum, Vere & Autumno Aqua subducenda, & quidem Drastrico potius quam Leniente: Ager nec plus, nec aliud bibat, quam Coctioni & Nutritioni quod sufficiat. X.
 E Lecto mane quam primo exurgat, Vesperis mature cubet, bis in die Corpus sub Jove exerceat. XI.
 Hujus Methodi Utilitas. XII.
 Historia Prima, De Arthritide hydropi probe curato feliciter accedenti.
 Secunda, De arthritide asciti, ejusque Remediis, auspicio agnata.
 Tertia exhibet podagram, asciti per Naturæ vires subortam.
 Quarta De hydrope per Diuresin & Abstinentiam victo, cum arthritide per amara & chalybeata famulante.

C A P U T V.

De Arthritide Melancholica.

EX univoci ortus symptomaticis, Principatum habet arthritis ea, quæ diutine succedit melancholiæ. Art. I.
 Hæc melancholia duobus pendet, 1. Spirituum Animalium a Natura Teneritudine, quæ Causis evidentibus sepe augetur, 2. Rebus Eos Afficientibus. II.
 Natura id, quod melancholiam peperit, aliquando in Articulus trudit, itaque symptomaticam hanc arthritida progignit. III.
 Clementer ea fere se gerit. IV.
 Ideoque melancholia, brevi recurrente, excipitur. Ut arthritis ea dignoscatur. V.
 In arthritide Morbo hypochondriaco subnata, juvat id, quod primis Viis includitur alieni, per Alvum amoliri, Coctionemque instaurare. VI.
 Præcipue vero aquis purgantibus, tartaro laxanti & manna adjunctis, blande Alvum subducant. His superaddi possunt aquæ diureticiæ, vel infusum Theæ, cum e ferro præparatis, vel etiam decoctum corticis simplex, aut chalybeatum. Prodest aliquando, loco Cerevisiæ, decoctum chinæ, sarsæ &c. VII.
 Hist. 1. De arthritide melancholiæ Diurnæ succrescenti.
 Hist. 2. De Morione melancholia hypochondriaca & arthritide interempto.
 Hist. 3. De Arthritide symptomatica Purgantibus præoccupata.
 Hist. 4. De morbo symptomatico cum agnata arthritide, aquis astropentibus subactis.
 Hist. 5. De gonagra miti hysterica, chalybe concitata.
 Hist. 6. De arthritide hysterica.
 Hist. 7. De arthritide melancholica cum Ventriculi &c. Affectione, per paroxysmum regularem allevata.

C A P U T V I.

De Arthritide fixa Scorbutica.

Melancholicæ proxima est arthritis scorbutica, sed longo proxima intervallo. Art. I.
 Scorbutus apud Damnonium paulo ante frequentissimus; sed vicini Belgii scorbutis, hoc est, genuino dissimilis. II.
 Ejus Symptomata celebriora recensentur. III.
 Urum scorbuti calidi sit ubique sui generis Materia ambigitur. IV.
 Lepra jam pridem in Damnonio Endemia, cujus gratia Nosocomia passim quam plurima. V.
 Partim illa salis communis, partim etiam tabaci usu cicurata, maxime vero pomacei, in scorbutum hunc Calidum degeneravit. VI.
 Scorbutus hic noster arthritida fixam imitari gestit. VII.
 Scorbuti hujus cum arthritide convenientia. VIII.
 Mites habet Paroxysmos hæc symptomatica, sed diuturnos. Præter cetera, Morbi sui primariæ retinet Symptomata, scorbuti præcipue veteris & confirmati. IX.
 Est semper calida. X.
 In Paroxysmo, materia Articulis impacta blande foras elicienda. In pravo repellentium usu quid illi fiet. XI.
 Extra Paroxysmum, vel pryalismum, vel per catharsin Materie Evacuatio, tum per antiscorbutica arthriticis maritata. Alteratio. Succis herbarum martiati in usum commendantur, ut & Aqq. feratæ diureticiæ, & decoctum Theæ, pomaceum aliquibus prodesse potest, præsertim æstate, & hyeme cerevisia rad. oxylap. &c. medicata. XII.
 Nullus hic crepitus ossium, at tumor pedum minime prætermittendus, ejus descriptio. XIII.
 Et curatio. XIV.
 Historia 1. Ab arthritide scorbutica Ulcus male tractatum, unde Vires Abolitio, deinde Abscessus, demum Mors.
 Hist. 2. Scorbuti Calidioris soboles arthritis.
 Hist. 3. Morbus articularis, scorbuti Alumnus, cum Vomitu Biliofo, Δυσπεψία & Volarum Ariditate.
 Hist. 4. Scorbutis suborta, & Ejus Eruptionibus adjuncta, arthritis. Hist.

Hist. 5. Pedum tumor forbuticus, arthriticus cum, pruritu serino,

CAPUT VII.

De Arthritide Lui Venereæ succedenti.

AB antiquo Venus immoderata, dudum autem, lue ad Eam se adjuvante, arthritidem maxime creberrimeque introducit. Art. I. Horum Morborum Conveniētiæ, & inter se Consensus, unde ad hanc ab illa tam facilis Migratio. II. Nemo a recenti lue Πόδαγξ Miasma, venereum evehi prius & maturari oportebit, quam Articulis impingi potuerit. Ideoque raro nisi Grandiores invadit hæc arthritidis, scil. a lue derivata. III. Sed nec a Veteri patura procreatur, ubi arthritidi moliendæ Natura impar reperitur. IV. Patrisam arthritida parientem adjuvat Mos Empiricorum ille, quo in curanda gonorrhœa præpropere, & neglecta vel remissa facta purgatione, Puris excretio supprimitur. V. Luis in arthritidem Mutatio, ex Ægroti Corpore ad Eam recipiendam idoneo, vel secus, pendet quam plurimum, arthritidis ista nunc in eodem Corpore cum lue generatur; nunc per Concubitum in diverso. Uti a Nutricis lue in Alumnium derivetur Oculorum epiphora, &c. VI. Quodnam hac arthritide Afflictorum Corpus. VII. Morbi huius Diagnos qualiscunque. VIII. Intercis Eius Paroxysmis apoplexia, vel motus convulsivi plerunque fatales (si nulla fuerit Evacuatio) superveniunt. IX. In Paroxysmo, dolor Hypnoticis, sed caute adhibendis, ne illorum abusu, Materia Morbi Nervis impingatur, mitigandus. X. In Paroxysmorum Intervallis, a lue venerea mutuo sumenda Indicatio, antisiphilicis Sanguis tuendus, & mercurio comparata adhibeatur, maxime vero per ea salivatio: quodnam illius instituendæ Tempus in primis opportunum: Placet etiam purgatio cum calomelane. Post usum mercurii, lignorum decocta misceantur. Valent aquæ diuretica, diu recteque pota: Valent etiam, ex antimonio, &c. Alterantia. XI.

Hist. 1. De arthritide impura, aquis diureticis subacta.
Hist. 2. De arthritide, luis Sobole, a Δυσπείτοις irritata, Febrim excitante, Caput aggressa.
Hist. 3. Lui venereæ succrescens, Caput impetens arthritidis.
Hist. 4. Arthritidis lui ἐπιγυγνόμενην, Victu, Digestivis, & Equitatione moderata, tandem Intestina invadens, sanguinis αἷω καὶ κατὰ Μίσσην pariens.
Hist. 5. Arthritidis lui venereæ superveniens, Melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulsionem universalem, & denuum Mortem inducens.

CAPUT VIII.

De Arthritide Asthmatica.

PODagra succrescit asthmati creberrime pituitoso; quo affectu laborantes, nono & decimo ætatis Lustro, raro maturius, dolent articulis, maxime si præcesserit Medicina. Art. I. Quæ, seu Cathartica, præcipue vero Δοασικώτερα, seu ex alterantibus anti-asthmatica, gignendæ arthritidi cum primis confert. II. Arthritidis huius materia minime recens estimanda. Quia nemo repente Πόδαγξ: Quin potius in corpore diu illam latuisse, pituitaque forsitan involvi; & cum ea per sputum κατ' ἐνίκασιον externi, credibile est. Æstate hæc arthritidis lætatur quod quidem ejus χαρακτῆριστικόν. III. Ita hæc arthritidis, hyeme minime obdormiscens, ab asthmate superatur; sub ejus persona delitescit: Æstate vero, cum ad Ambitum Corporis Sanguis liberius effertur, proprie elucet. IV. Ex ista huiusce materie frequenti expuitione, fieri videtur, quod arthritidis hæc omnino blanda, minimeque dolore vehementi, multo minus Tosis, &c. est signata. Indicium ejus optimum in eo locatur, quod asthmatis usitate & ex more submittatur; cætera arthritidi primigeniæ persimilis est. V. Ex ista successione in symptomaticis habenda est, & pectoris, Spiritus, Tussis, Sputi considerationem comprehendit. VI. Neque enim hunc modum asthmaticos, arthritidem negligere juvabit; quin simul atque fieri potest in articulis dolorem excitare, quo levetur pulmo. Hac de causa, Sanguinis missio, vel parca admodum, vel nulla, ne arthritidi protrudendæ natura impar reddatur, admittenda. VII. Per Δρασμωτέρα Catharsis instituenda, quibus Sanguis in orgasmum excitetur. Catharsis etiam pulmonem exonerat, spiritumque liberat. Sed, quoties in simplici asthmate Pituitoso, non toties hoc in asthmate repetenda, ne recta arthritidis impediatur. VIII. Ad depellendum asthma, & concitandam arthritida, mane inf. am. Chalyb. exhibeatur: quarta pom. & nona vespertina balsami alicujus, vel Tinct. Sulf. Dosis majuscula. Diebus aliquot interpositis, extra loco sepiissime dolenti attrahens admovendum; tumori, vel quam proxime illum, Epispasticum. Quando artus per se invadit hæc arthritidis, omnino promovenda est. Natura enim, asthmatis occurrat per arthritida. IX. Si Bechicis opus usque fuerit, iis, sed lenioribus, vespere utendum: Hinc mane seq. Sputum, nec ad meridiem obundet appetitus. Narcotica his asthmaticis parum tuta. Ad invitandum somnum, si defuerit, adhibeatur sessio, frictio, &c. X. Minuitur asthma, quæ proportionem augetur arthritidis. Huius symptomaticæ adjungi solet pedum tumor serosus; ambulatione, frictione sæpe brevi tollendus. XI. Ab hac arthritide restituitur equitatio commendanda; ut & victus idonea ratio, cum ecoproticis, & digestivis, ad asthma & arthritida præcavendum, subinde repetendis. XII. Sicco nonnunquam asthmatis subnectitur arthritidis. Illius descriptio qualiscunque profertur, & in hanc mutatio arguitur. XIII. Ejus curatio breviter delineata. XIV. Hist. De asthmate pituitoso, per arthritidem, exemplo notabili mitigato.
Hist. 2. De arthritide, asthmatis ex Plethora, feliciter adjuncta.

CAPUT IX.

De Arthritide Febri Succedanea.

FEBRI nonnunquam exquisitæ, & perfectæ, succedit arthritidis. Art. I. Quæ quidem successio, sive ob aliquid ἐπερὶσπες in sanguine contentum, sive ob glandulas obstructas oriatur febris, perfacile capiatur. II. Ab eodem miasmate (quod prius dixi) concito & debacchanti, febris; ab ipso lenius moto, sed exulante, arthritidis accersiri solet. His addendum, quod virus arthriticum concitandæ febris valde appositum est. III. Secundo, si febris a glandulis obstructis sit, illa obstructio sanguinis orgasmum parere potest, ut & ille orgasmus, (sic ut Æstus exercitatione quavis adscitus) arthritidis Paroxysmum. IV. Huius symptomaticæ Natales optime illustrat angina arthritica, quæ quidem manifesto arthritidis est anomala, cum febre magna & gravi præcedente. Morbo tamen acuto, rarius forsan quam diutino, ἐπιγύγνεται Arthritidis. V. Ratione paroxysmorum, una est arthritidis ex febre nata, eaque arthritidi primigeniæ persimilis: ratione ortus, multiplex est, & longe a se diversa, quod particulatim exponitur. VI. Quæ febrim comitatur arthritidis omnino provehenda est & promovenda, quæ præcipua, & unica huius medendæ indicatio therapeutica. Verum in huiusce symptomaticæ prophylaxi, febris illius, cuius symptomatica Fætus & Germen est, habenda ratio. Si habitudini Πυρετικῆς subolescat arthritidis, habitudinem istam efficiens materia exterminanda, corrigenda, prævertenda. Si febris Εὐρυσπιδαιτώδης submittatur, durante insultu, per cardiaca & diaphoretica utriusque materia dimittenda est: in vacatione, causa antecedens aquis diureticis auferenda, lacte Asinino, &c. permulcenda: Et sic in aliis huius generis symptomaticis. VII. Hist. 1. Arthritidis synocha secundaria.
Hist. 2. De Arthritide habitudini Πυρετικῆς subjuncta.
Hist. 3. De Arthritide cum febre Εὐρυσπιδαιτώδης vices exercente.
Hist. 4. Quartanam, cortice suppressam, arthritidis sequitur, cum Arrenulis.
Hist. 5. De quartana in arthritidem mutata.

CAPUT X.

De Arthritide ex Colica.

COLICA in Chronicis huius populi pervagatissimis est; ejus, quæ arthritidem præcurrit, Descriptio generalis. Art. I. Est autem ea nonnunquam biliosa; quæ breviter depingitur. II. Ejus in arthritidem metamorphosis: istiusque commoditas, sive caput, sive intestina spectemus. III. In hac arthritide materia foras ejicienda, idque remediis potissimum externis. Cardiaca interna (quæ huius curationis proprietates esse videatur) admodum caute usurpanda, ne in caput arietent. IV. Alia vero colica est (arthritidis productrix) a Pomaceo immitti acidoque: Et est ejus proportione. Quo tempore nostros homines invadat, confirmate illi, & inveteratæ supervenit arthritidis, genuinæ persimilis. V. Natura istam mutationem per se nonnunquam molitur, sæpe vero numero per purgationem drasticam & elateriam, nonnunquam etiam Cardiacis internis excitata. VI. Habet hæc arthritidis Dolorem acutissimum, in colicam ex facili revertitur, iterumque arthritidos Personam induit, iterumque deponit, raro Tosis &c. signata est. VII. Alia podagram progignit colica, quæ ab dyspepsiis oritur: Huius descriptio. VIII. Qui sunt huiusmodi Κακὸς ἐμαχοί, Etatis fluxu aliquando arthritide laborant, quæ colicam tum exceptat, tum ab ea sæpe excipitur. IX. Utrum hæc arthritidis a colica deriveretur, an potius arthritidis sit, dudum in intestinis Anomala, jam vero in Externis partibus recte se habens, etsi in dubiis ponatur in arte faciunda eodem fere recidit: Neque depelletur hæc arthritidis, nisi colicam, cui subijcitur, intueamur. X. In Paroxysmo ferme eadem, ac in arthritide Exquisita, medendi ratio: Prophylaxeos alia atque alia est, pro causæ remotioris diversitate. XI. Huius Tribus symptomaticarum Paroxysmi omnium maxime per Ecoprotica, vel præcaventur, vel minuuntur. XII. Hist. 1. Arthritidis colicæ biliosæ secundaria.
Hist. 2. Arthritidis, colicæ ex Pomaceo ἐπιγυγνόμενην.
Hist. 3. Colicæ ex Dyspepsia diurnæ, Gonagra superveniens.
Hist. 4. Ex Colica Paralyticis, Arthriticis, Inunctione trucidatus.

CAPUT XI.

De Arthritide Morbis quibusdam Cuticularibus subiecta.

QUæ achoribus, hæmorrhoidibus, & ulceribus superest arthritidis, hoc Capite tractatur. Art. I. Morbi ejus primarii alienum aliquid expellunt, adaucta eorum materia Turbas ciet in sanguine, quas sequitur Arthritidis. Arthritico durante Paroxysmo, conquiescunt affectiones primariæ. II. Huius Symptomaticæ Diagnos: est ea primigeniæ Arthritidi conjunctissima: ideoque postremo hoc loco discutitur. III. Morbus quicunque fuerit primarius omnino promovendus: Ulcus, per cathartica, achores, per epispastica, vel leniter attrahentia, hæmorrhoides, per aloetica interne data, per hirundines externe adhibitas. IV. Hist. 1. De Arthritide Aurium achoribus subiecta.
Hist. 2. De Arthritide ulceribus subolescentis, epispasticis allevata.
Hist. 3. De Arthritide (cum febre intermittente) ex hæmorrhoidibus oclusis.

CAPUT XIII.

Crollaria & Specilegia quædam habet, cum Epilogo.

EX prædictis sequitur, quod symptomaticis quæ genuinæ Arthritidi sunt vicinæ, (id est, colicæ, & morbis cuticularibus submissæ) maxime consentiunt illæ, si tantum materiam earum intueamur, quæ sunt minus propriæ, chlorosi nempe, & hydropi επιγυρωσῶσαι, ideoque magis propriis postponi poterant, imo quidem debuerant.

Art. I.

Si quis materiam, v. gr. luis, non arthritida falsam, verum exquisitam parere: itaque symptomaticas hasce, & inter se, & cum Arthritide exquisita congruere argumentetur: nihil isthuc auctorem movebit, quando symptomaticarum a morbis specie differentibus successio; eas etiam, (quoniam morborum primariorum materiam, unde ducenda earum specificatio, manifeste retinent) specie differre monstrat, proprias postulare curationes, ut & propria vocabula, si quis autem eas Arthritidis vocabulo includi voluerit, quanta queso hæc æquivocatio τῷ (Arthritidis) singularem morbum exprimere soliti, jam vero quamplurimos, eosque specie discrepantes morbos exprimentis. Dato vere hasce symptomaticas convenire (quod tamen nec probatum, nec concessum) ad earum curationes tum explicandas, tum exigendas, ex usu erit eas haberi differentes & discordantes.

Art. II.

Scorbuto, aliove quovis e Primariis affectibus supradictis laborantem, Primigenia simul Arthritide posse laborare, non diffitetur Auctor, cui cum hisce tantum morbis negotium, qui Arthritidos induunt personam.

Art. III.

Aliæ sunt Imagines Atthriticæ minus perfectæ, quæ sæpe scorbuti, vel rheumatismi nomine appellatur.

Art. IV.

Glandulæ articulares sunt ex celeberrimis totius corporis excerniculis.

Art. V.

Epilogus.

Observationes Anatomicæ &c. in Actis Philosophicis Londinensibus, ab Auctore divulgatæ.

Numero 151.

Intestinum canis Cecum feliciter exectum.

Numero 162.

Instrumentum Coctionis primarium esse Spiritum Alkali generis Volatilem, & de Glandula in ventriculo Lucii Piscis Tubulata.

Numero 166.

De liquorum in lacteas Ingressu subito, coloreque in iis non semper Albo. Contra Walæum, &c.

Numero 167.

Molis immensæ Glandula cor bobulum, præter naturam, comprehendens.

Numero 240.

Primarius Respirationis usus experimento illustratus. Pro D. Thru-
stano.

Numero 240.

Pectoris Hydrops artificialis.

Numero 242.

Aphonia Periodica.

Numero 247.

Magni Regis Arthuri Cimeliarchum: in Reverendi Viri D. Geo. Hic-
kes S. T. P. Thesau- ro linguarum Vett. Septentrionalium Gram-
matico Critico, brevi edendo, planius & accuratius describendum.

Numero 258.

Bronchotomis promota.

Numero 266.

De Polypo raræ magnitudinis in carne reperto.

Numero 271.

Menstrua viri cujusdam Hemorrhagia, temere suppressa.

Numero 275.

Venæ lacteæ (post Clarissimum Listerum) Coloratæ.



E P I T O M E

Differtationis Secundæ de ARTHRITIDE ANOMALA, sive INTERNA.

C A P U T P R I M U M.

De Arthritide Anomala generatim.

Artus sedes arthritidis regularis. **ARTICULUS I.** Truncus, sive quod reliquum est Corporis, anomala; **II.** Arthritidum anomalorum, quæ Regularem nullum præcurrentem habent Paroxysmum, Diagnoses admodum difficiles, **III.** Earum, quæ Regularem Paroxysmum insequuntur, Diagnoses, variis Symptomatum ordinibus sunt eliciende. De anomala arthritide præcurrente prius constiterit. Eodem Puncto incipiunt hi Ordines, at diversos habent exitus. Quo certior arthritidos Regularis præcurrentis, illiusque Materie quo certior, in ea, quæ intus sunt, Translatio; eo certior anomala Notitia, **IV.** Internæ partes intelliguntur esse trunci omnes, **V.** Arthritidem inter regularem & anomalam quæ sit Differentia, **VI.** Tam symptomatica, quam primigeniæ arthritidos Anomalæ, **VII.** Trunci Partes fere omnes, sed alias aliis frequentius, invadunt, **VIII.** Unde tam Vastum earum Imperium, **IX.** Causæ earum enumerantur, **X.** Ut & differentie, **XI.** Medendi Indicatio generalis, ut arthritide anomala pars affecta citissime, tutissime, levetur. Materie partim e Corpore evocando, partim in artus transferendo. Premissis, quæ par est, Evacuationibus, Curatio reliqua per Materie in artus Translationem afficienda est: Quam ejus expellendæ viam Natura maxime affectat. Medicamenta huic Intentioni inservientia sunt vel interna arthritidem expellentia; maxime conducunt e ferro præparata, præcipue Martis alcohol, sive ferrum nutritum; ejus conficiendi Modus; Formulæ Πόδαγραγωγῶν: Vel Externa, quæ Articulis dolere solitis post internorum usum aliquem applicata, foras arthritidem invitent. Eorum recensio. Ichore vitioso exulante, æger ad tempus aliquod immunis est. Mirior hæc crudelitas, quam per misericordiam methodus, **XII.**

C A P U T II.

De Ventriculi Affectibus Arthriticis.

Nullam in trunco Partem magis infestat arthritidis, quam ventriculum & intestina, **I.** Ut ventriculum ingrediatur ea, duo requiruntur; primum, in sanguine Miasma fugitivum; deinde ventriculus, ei recipiendo accommodatus, **II.** Quibus ille modis sic accommodetur. Ex Causarum diversitate magna, oritur anomaliarum diversitas, **III.** Arthritidis in ventriculo agentis Descriptio, **IV.** Quibus signis innotescat natura ejus arthritica, **V.** Senes ea plurimum urgentur. Autumno sæpe incipit, **VI.** Ejus cum arthritide Regulari Comparatio, **VII.** Anomala hic describitur absoluta, **VIII.** Ut ab Affectu distinguatur hypochondriaco, **IX.** Perinde est, Materia per circuitum, an recta ventriculum iniret, & sive fixæ, sive erraticæ arthritidos sit Materia. Qui denique huic malo procliviores, **X.** Medendi Indicatio postulat ventriculum allevare Purgatione: & in Artus arthritidos amovere: utriusque Purgationis instituendæ ratio. Vomitus, si manet post catharsin, Laudano compescenda; **XI.** Quibus auxiliis amoveatur arthritidis, quaque Arte tum expellatur, tum evocetur. Quæ hoc tempore Dieta. Si ventriculum arthritidis repetat, quid faciendum. Hujus Methodi Utilitas, Prophylaxis, **XII.**

- Hist. 1. In ventriculum & intestina irruens arthritidis, foras expulsa.
Hist. 2. Arthritidis idonea, Balneo Frigido in ventriculum, & ea, quæ intus sunt, repulsa.
Hist. 3. Recta arthritidis, & in ventriculo anomala, se vicissim excipientes, cum anomalæ Curatione.
Hist. 4. Arthritidis semel iterumque in ventriculo anomala, toties expulsa.
Hist. 5. Arthritidis iterum ac sæpius in visceribus anomala, toties in artus ablegata, cum anomalæ Prophylaxi.
Hist. 6. Ex Plenitudine arthritidis, partim recta, partim in ventriculo anomala, Purgantibus & Podagragogis allevata.
Hist. 7. Arthritidem, ex Animi perturbatione, anomalam, in Viam ducunt Πόδαγραγωγά.
Hist. 8. Arthritidis vaga, primo Partibus ex contusione læsis; deinde ventriculo hærens, in Sanguinem resorbetur; in Artus emittitur.
Hist. 9. Multum interesse, qua tempestate laboret æger hac anomala; ad eumque removendam, tam externa, quam interna nonnunquam in Corpore validissimo requiri.
Hist. 10. Cibi Fastidium, & Asthma, ex arthritide ventriculum infestante; ea expulsa; sublata; ea denuo repulsa, recidiva.
Hist. 11. Ex arthritide, cardialgia, ut & alias Ανοπίξια per Catharticum, & humores in artus expellentia, feliciter curata.

C A P U T III.

De Colica Arthritica.

Morbus hic gravis & frequens, una cum intestinis Ventriculum premit, **ART. I.** Ejus Descriptio, **II.** Natura arthritica **III.** Diagnoses, **IV.** Causæ remotiores externæ, quæ repellunt arthritidem, **V.** Internæ, intestinorum Imbecillitas, &c. **VI.** Ab aliis colicæ Speciebus, ut distinguatur. **VII.** Ejus Differentie, **VIII.** Prognosis, **IX.** In curatione, de Phlebotome, de Vomitu deliberandum; deinde Purgatio instituenda. Tum podagram expellentibus, una cum anticolicis, utendum. Eorum Formulæ, & sumendorum Methodus. Contra Spasmos intestinorum pertinaces Fetus, Linimentum, Enema. Quæ Dietæ ratio optima. Vinum utilissimum, **X.** Prophylaxis, **XI.** Morbus, hic Hippocrati non incognitus. **XII.**
Hist. 1. Colica arthritica male tractata, demum lethalis.
Hist. 2. Arthritidis Vaga, colicam mentita, ad Regularem arthritidem reducitur; cum ejus Prophylaxi.
Hist. 3. Colica, ex Quiete, arthritica, in arthritica regularem versa.
Hist. 4. Colica multarum Hebdomadarum Arthritica, eadem metodo curata.
Hist. 5. Colica Arthritica, Purgatione, & Πόδαγραγωγῶν, sublata.

- Hist. 6. Colica, una cum Dolore Capitis, Arthritica plus semel allevata.
Hist. 7. Arthritidis, Intestina sæpe atrocissime invadens, toties exturbata.
Hist. 8. Colica Arthritica, cum Paralyti superveniente.

C A P U T IV.

De Diarrhœa Arthritica.

Miasma Arthriticum nonnunquam intestinis infusum, ea simulat, donec Ano exterminatur, **ART. I.** Diarrhœa ista ut dignoscatur esse Arthritida, **II.** Causam Continentem, & proximam, tantummodo inam habet; initium, & exitus varios. Quæ per se accedit, non raro Salutaris. Quæ Pharmacis excitatur, si modum non excedat, utilis; sin nimis pertinax fuerit, dubia, vel lethalis, **III.** In priori, Natura relinquendum opus, nisi nimium excurrat diarrhœa; tunc enim Astringentibus, ac Cardiacis eget; Reliquæ vero morbosæ post tempus aliquod Lenientibus exprimendæ. Diarrhœa sistenda, si a Purgantibus fiat: Si a Cruditatibus, Purgatione (altera, vel utraque) opus erit deinde Restrainingentibus. In dysenterici periculo, Emulsum. Ad Prophylaxin alcohol Martis, cum aquis ferratis, **IV.**
Hist. 1. Diarrhœa crebra, & Salutaris.
Hist. 2. Diarrhœa, a Cathartico, arthritica, opportunè suppressa.
Hist. 3. Arthritidis vaga, intestina occupans, solo externorum usu evocata, & artubus infixa.
Hist. 4. Cruditatibus orta diarrhœa arthritica, Medicinæ beneficio inhibita.
Hist. 5. Diarrhœa arthritica lethalis.
Hist. 6. Alia ejusmodi.

C A P U T V.

De Dysenteria Arthritica.

Transitio, **I.** Miasma arthriticum aliquando intestina mordet, exeditque Vasa eorum exilia, Sanguinem vehentia: Unde dysenteria, **II.** Morbi hujus signa, **III.** Dependet is a Miasmate prædicto in Sanguine renovato, idque constanti norma, **IV.** Insultus sæpe repetit, Paroxysmis arthriticis, si spectemus intervalla, respondentes. Nunc in Ulcus, nunc in Abscessum degenerat, **V.** Curatio: Sanguine profluente conquiescat Ager: Cardiaca non nisi caute adhibenda: Lingua Laudano superillinitur. Porioni sit Decoctum album. Dysenteria hæc omnino Critica. Ad eam, si nimia fuerit, inhibendam Astringentia. Valet interdum Enema. Vitentur acida. Quæ conveniat Dieta. A dysenterici exquisitæ Curatione, quantum hæc differat. In Prophylaxi valent aquæ ferro alterate.

- Hist. 1. Tenesmus, & dysenteriam inferens arthritidis, omisso Externorum usu lethalis.
Hist. 2. Dysenteria arthritica in Abscessum migrans.

C A P U T VI.

De Abscessu Intestinorum Arthritico.

Ad abscessum inferendum Miasma arthriticum cum primis aptum, **I.** Ejus ferendi ratio, **II.** Causæ ejus binæ, quarum altera dictum Miasma e Sanguine expulsum; altera Intestinorum Imbecillitas. **III.** Hic abscessus sæpe magnus, in alimentari Fistula, creberrimus, sæpe recidivus, **IV.** Si in ano fuerit, eadem fere Curatione, quæ in abscessu ani genuino; si in fistulæ superiori parte, raro ante puris Evacuationem sentitur. Dysenterici aliquando επιρρετα. Quæ, rupta Vomica, conveniat Curatura. Evacuato Pure, Balsamica, Venæ sectio interdum prodest. Aqua ferrata, cum e Ferro præparata, & restringentibus, &c. προφυλαττονται, **V.** Veteres arthritici Vitiis ani arthriticis affliguntur, **VI.** arthritidis in Visceribus, a Luciano bello descripta, **VII.**
Hist. 1. Abscessus Intestinorum arthriticus auspiciato sanatus, recurrendo lethalis.
Hist. 2. Abscessus ani Arthriticus, feliciter curatus.
Hist. 3. De Ani Arthritica, propter Aleoticum, inflammatione, cum instante gangræna.

C A P U T VII.

De Melancholia Arthritica.

Transitio, **I.** Morbi hujus Mors, **II.** Dyspepsia oritur. Ut ab Arthritide melancholica distinguatur, **III.** Curatio Purgantibus, sed blandis & Podagragogis peragenda: Quæ ratio Prophylaxeos, **IV.**
Hist. 1. Melancholia, propter arthritidis Paroxysmos minus idoneos.
Hist. 2. Arthritidis melancholico Saluti.
Hist. 3. Melancholiam, & Hydropa Arthriticum sanat, arte comparata, arthritidis idonea.

C A P U T VIII.

De Syncope Arthritica.

Transitio, **I.** Morbi ratio, **II.** Therapia requirit Cardiacæ, admodum generosa; Frictiones, interdum Vomitionem, eamque Vino movendam, **III.**
Hist. 1. Syncope Arthritica, foras abacto Hoste, curata.
Hist. 2. Alia ejusmodi.
Hist. 3. Arthritide diu ignava & inerti, generata syncope, illius Paroxysmo regulati sublata.

CAPUT IX.

De Calculo Renum Arthritico.

Raro cuiquam unquam Morborum frequentius supervenit calculus, quam Arthritidi: Estque vulgari renum calculo, Arthriticus per-similis, I. Huic malo conferunt mala Concoctio, & Lacteorum Ora nimis debiscentia, II. Est hic calculus, Lapidis Calcarii cum Sale suo Calcario, vel Ochre cum Sale Vitriolico, coitio, III. Ejusdem plane Naturæ est cum tofo arthritico, IV. Ut a colica, tam Ex-quisita, quam arthritica distinguatur, V. Si Paroxysmus simul ar-thriticus est, nullus hic acidorum fotuum, aut cataplasmatum usus: Profunt interdum paregorici. Silente vero arthritide, si quis hoc cal-culo ægroret, quæ Curatio. Syrupi Preparatio balsamici. In Dysuria calculo superveniente, juvant Opiata cum Diureticis juncta. Dorsi dolor judicium calculi æquivocum.

- Hist. 1. Calculo & chiragra una concurrentibus, facta simul Medi-cina.
Hist. 2. Adversus calculum Arthriticum Prophylaxis.
Hist. 3. Calculus Arthriticus, vertigo Arthritica, & arthritidis regu-laris se mutuo excipientes.

CAPUT X.

De Asthmate Arthritico.

UNum hoc Capite tractatum asthma, nimirum Ἰδιοπαθὲς ART. I. Quenam hoc Affectu Corpora maxime graventur, II. Causa Continens, Miasma arthriticum, III. Causæ remotiores, IV. Asthma-tis hujus, & arthritidis ratio inter se, naturam illius arthriticam manifeste probat, V. Est vel siccum, vel humidum: utriusque Mos, VI. Virus arthriticum Pituita involutum, Sputazione ejicitur; & quidem commode, VII. In asthma sicco, quodnam morbi subje-ctum, VIII. Asthma interdum occurrit arthriticum; sive prævio arthritidis Paroxysmo, IX. Quæ in utroque asthma, (tam humi-do, quam arido) Πρόγνωσις, X. Curatio tollit Impedimentum res-pirandi, Venæ sectione, Purgatione, Clysteribus: Quæ sicco propria; quæ humido Therapia; Quid in Paroxysmo faciendum; quid in Pro-phylaxi, XI.

- Hist. 1. Adolescens, ab Arthritide asthmaticus, Empirici Narcotico peremptus.
Hist. 2. Asthma siccum, Arthriticum, Venæ sectione & Cardiaco sublatum.
Hist. 3. Arthritidis in Paralyfin, & asthma Metamorphosis.
Hist. 4. Arthritidis in asthma, & hydropa desinens.
Hist. 5. Asthma cum Iliade Malorum, Arthritidos defectu Regula-ris, exortum.
Hist. 6. Asthmatis Vultum induens Arthritidis.
Hist. 7. Ab Arthritide percussa pectoris externi Oppressio, Spiritus impeditas.

CAPUT XI.

HI Affectus, quoniam ab eadem Causa eundem Locum aggravan-te sunt, una hoc Capite tractantur, I. Quoniam ii creberrime invadunt, quæque Corpora potissime laceant. II. Achores, & catarrhi Puerorum, qui arthriticis orti sunt Parentibus, haud immeri-to suspecti, III. Arthritidis in pulmonem Μετάβασις omnium cer-tissima. De minis certis quomodo judicandum, IV. Seniores sæpe in-vadunt hæ anomaliz, & qua de Causa, V. Sputi consideratio; VI. Si affectus arthritidi Regulari apponatur, VII. Tussiseorum omnium frequentissima aliquando Regularis Paroxysmi symptomata prænun-cium, VIII. Tussim interdum excipit hæmoptoe, IX. Tempus ho-rum Affectuum Autumnus; multum ad eos confert pulmonis Imbecil-litas, X. Ex Algore, vel Cardiacis peripneumonia nonnunquam acce-dit, XI. Medendi Indicatio communis est, ut pulmo quam citissime le-vetur: Ubi nihil adversatur, prodest Venæ sectio; maxime vero in peripneumonia: In plerisque Purgatio, sed peculiari modo facienda: Tum Подαρπαγωγή, cum anacathartics juncta. Horum Formule pro-feruntur. Ad prohibendum Sanguinis colligationem valet decoctum corticis. His succedunt externa, Arthritidem evellentia, quibus seve-ris, non nisi urgente necessitate, utendum est, XII. Ad prophylaxin, aperiantur in Dorso fonticuli. Aere aperto fruatur Æger; quibus, aliisque hac in re, idoneis, aut prætermisissis, aut perperam adhibitis; Æger φθίσις opprimitur, XIII. Peripneumoniæ quæ arthritica Cu-ratio, XIV. Medicina ἰσθὰς (alia, quam Clariss. Sydenhami) de-fenditur, XV.

- Hist. 1. Tussis Arthritica.
Hist. 2. Tussis Paroxysmi Arthritici symptoma prænuncium.
Hist. 3. Sputatio Arthritica, in extrema ætate nimia.
Hist. 4. Anacatharsis Arthritica Salutaris.
Hist. 5. Peripneumonia Arthritica.
Hist. 6. Catarrhus, asthma, tussis Arthritica, per Humor in artus Ἀντίσπασιν, & deinde Evacuationem mitigata, sublata.

CAPUT XII.

De Phthisi Arthritica.

Transitio, I. Morbi hujus ἵδιος, II. Ultimæ ejus Stadium, cum Exquisita phthiseos ultimo concordat. Homines natu prove-tiores (aliter, quam exquisita phthisis) aggreditur: Febris ejus He-tica, plerunque lenta. III. Nunc ex arthritide percussa, hæc phthisis brevi tempore fit, alias non nisi spatio annorum aliquot, IV. Morbi natura patet ex ejus Γενεαλογία, V. Curatio postulat, ut pul-mo allevetur. In principio valere potest phlebotome, & catharsis, Postea bechicis, & Подαρπαγωγή utendum, & quidem eousque, quo-ad fruerit a Febre periculum, & postulerit arthritidis Expulsio. Si febris exardeat, quid fieri oporteat. Hisce dies aliquot adhibitis, extra admoveantur arthritidem educentia. Opiata, & Incrassantia Sydenham Opera Medica.

merito suspecta, VI. Prophylaxeos ergo, maxime valent aquæ ferra-tæ, & Aer, præcipue Maritimus. Profunt Artuum Fricationes, Fon-ticuli, Sorbitio, Chocolatea, Pectoralia, obsunt Catarrhi, VII. Gael-nus mentionem fecit hujusmodi Πεύμαρος (scil. arthritici) in plu-monibus, Ægros sæpe suffocantis, VIII.

- Historia 1. Tussis Arthritica, lethalis.
Historia 2. Phthisis Arthritica, Medicamentis Calidioribus sæpe le-vata.
Hist. 3. Phthisis Arthritica, incipiens, curata.

CAPUT XIII.

De Angina Arthritica.

Febacula ad expellendum Miasma arthriticum, in Sanguine exci-tata, nonnunquam parit anginam, I. Natura ejus arthritica, ut detegatur, II. Quæ illa Corpora, & quas ob προκάσεις invadat usitatissime, III. Diagnofis, IV. cum angina exquisita, ejus conve-nientia, V. Curatio vult, ut Fauces, quamprimum alleventur, & qui-dem Methodo privata; Prodest interdum laringotome, VI. Uri non-nunquam acida; Externa, arthritidem educentia, VIII.

- Historia 1. Arthritidis fauces & artus simul semelque occupans.
Hist. 2. Anginæ Arthritica, ad Abscessum tendentis, in arthritida regularem Metamorphosis.
Hist. 3. Materia arthritica partim abscessu anginoso, partim per articulares glandulas expressa.
Hist. 4. Arthritidis primum fauces, deinde articulos invadens.
Hist. 5. Anginæ arthriticae auspicio supervenit Arthritidis regu-laris.
Hist. 6. Angina & abscessus Arthriticus cum arthritide insequenti, recta idonea.
Hist. 7. De arthritide multos annos Erratica, tunc anginam iterum, & sæpius simulante; postremo regulari, Fixa.

CAPUT XIV.

De Capitis Dolo, & Vertigine Arthritica.

Obscuri sunt in capite Partium usus, I. Quos sæpissime infestet dolor hic arthriticus, II. Ejus Mos; Signum est aliquando Paroxysmi Regularis prænuncium: Ni tale fuerit; etsi in capite Ma-teria remanserit, apoplexiam introducit, III. Ut de ejus υπαρχει constat; dolor hic interdum lenis, interdum ad Delirium usque gravis, IV. Paroxysmus aliquando Perfectum, aliquando intercisum excipit, V. Vertiginis arthriticae Comes fere individua, & tanquam Soror gemina est, VI. Vertiginis Arthriticae subiectum est cogitandi Officina: cogitationis ratio probabilis: Videtur esse quedam Πυδμα-τρηγία, VII. In vertigine Spirituum fluctuationes inturbantur, VIII. Spirituum Είλιγγος a Cl. Willisio propositus, in dubium vo-catur. Rerum Externarum Imagines in Capite veræ, ut & in verti-gine falsæ, per iis Rebus dissimilia fieri possunt, IX. Perturbantur Spiritus, vel ab alieno, a Sanguine accepto, hæc in penetralia se insinuante; vel Externo aliquo Tubulos coarctante, X. Vertigo hæc in plerisque, cum dolore capitis Arthritico concordat: Aut in paroxys-mum regularem: aut in apoplexiam migrare solet. Miasma arthri-ticum epilepsiæ generandæ parum idoneum, XI. Horum Affectuum Curatio communis; tum etiam singulis propria. Balsanum ὁσίδες ce-phalicum Doctoris Waterhouse. Emulsa, Narcotica, Oxyrrhoidina, &c. quæ Materiam capiti infigat, omnino fugienda. Prophylaxis, XII.

- Historia 1. Ab gnava Arthritide vertigo, Sanguinis missione & Al-vi ductione vita.
Hist. 2. Vertigo Arthritica, Purgatione in podagram mutata.
Hist. 3. Vertiginem, & in capite dolorem faciens arthritidis; idque usitate, Venæ sectione & purgatione toties in articulos acta.
Hist. 4. Capitis dolor, & vertigo Arthritica sæpe revertentes, simi-li Methodo curati.
Hist. 5. Cephalalgia Arthritica, Phlebotome & Spiritu Volatili in podagram versa.
Hist. 6. Miasma Arthriticum in caput immisum, vertiginem & do-lorem inferens, eo revulsus, & in artus amandatum.
Hist. 7. Cephalæa, & vertigo Arthritica, Medicina pari, cum Phæ-nigmis, sublata.
Hist. 8. Vertiginis Arthriticae cum Spirituum depreffione gravi, Cu-ratio.
Hist. 9. Ex Arthritide vertiginosus, Victu nimis tenui depreffus, in-teremptus.

CAPUT XV.

De Apoplexia Arthritica.

Transitio, I. Apoplexiæ hujus Mos, & Medicinæ propria, II. Morbi istius explicatio, III. Morbi ex Symptomatum Ordine in-vestigatio; IV. Subjectum Cerebri Cortex, V. Causa continens, Va-sculorum in cerebri cortice dilatio; vel lentor Sanguinis; vel Mias-ma tubulos subintrans, spiritusque cominus aggressum, VI. Causæ remotæ, VII. Ex uno miasmate pendet arthritico, VIII. Prognofis, IX. Curatio propria. X. Prophylaxis, XI. Apoplexiæ, a Causa Ar-thritica, symptomaticæ Curatio, XII.

- Historia 1. Vertigo Arthritica, cum imminente apoplexia.
Hist. 2. Arthritidi percussa superveniens apoplexia.
Hist. 3. Somnus, ab Opiato profundus; ipsa propemodum Mors.
Hist. 4. Arthritidis, ex acidorum usu gravior, in apoplexiam desinens symptomaticam.
Hist. 5. Apoplexia arthritica feliciter curata.
Hist. 6. Apoplexiæ ut occurratur arthritica.

CAPUT XVI.

De Paralyfi Arthritica.

Miasma nunc in medullis tubulis astitit; unde apoplexia idiopathica, I. Saepe ad tubulos nervinos propellitur; unde paralyfis arthritica. II. Fieri potest, vel a Materia viscida, vel a virulenta, III. Cause ejus remotiores, IV. Morbi eidos, pro ratione Paralytis affecta, varium, V. Ejus Differentia, VI. Typos habet aliquando paralyfis hysterica, VII. Prognosis, VIII. Therapia peculiaris, IX. Prophylaxis, X.

- Hist. 1. Cephalalgia Arthritica, cum paralyfi incipiente, curata.
 Hist. 2. Hemiplegia Arthritica simili modo curata.
 Hist. 3. Paralyfis Arthritica, cum spasmis oris cynico, lethalis.
 Hist. 4. Colica Arthritica in paralyfin degenerans Arthriticam.
 Hist. 5. A Materia colicæ Biliosa, primum arthritidis & deinde paralyfis.
 Hist. 6. Ob arthritidem, in nervos inversam, Aëria.
 Hist. 7. Ex Morsu Canis, Arthritidis rectæ Silentium, Stupiditas, paralyfis, Arthritide denuo facta Regulari, curata.
 Hist. 8. Convulsiones, ex Arthritide inversa, universales arte Medica sublata.

CAPUT XVII.

De Doloribus in Corpore vagis, fixis; de Ophthalmia; de Erysipellate, & Achoribus Arthriticis.

Transitio, I. Horum quis Dolorum Mos: Rheumatismi nomine vulgo delitescunt vagi. Fixi nunc quasi Nephritici; nunc Ocu-

los, Faciem, Aures occupat Miasma, & Ophthalmiam quandam, Erysipelas, Achores inducit. Achores Arthritici vices aliquando tenent Arthritidos summe Regularis, II. Affectus hi, periculo magnam partem experies, ad regularem arthritida propius accedunt. A Trunci Ambitu rarius, quam ab Artubus, ad ea, quæ intus sunt, transfertur Arthritidis, III. Harum Anomalarum Medicina communis; propria. Nullus ob Achores excitandus Articularis Dolor: quod de una hac anomala proponendum, IV.

Historia, Achores, ab Arthritide, in alio Corpore generati.

CAPUT XVIII.

De Epiphora, & Dolorē Dentium Arthritico.

DE dolore dentium exquisito scripsit Strobelbergerus, I. Ejus Arthritici Mos & Natura, II. Quæ istorum Affectuum Medicina communis; quæ eorum singula propria, III. Historia. Dentium Dolor Arthriticus.

CAPUT XIX.

Corollaria continet, cum Epilogo.

Dissertatoris summa, I. Hujusmodi Medicina quæ necessitas; arthritidis raro occidit regularis, raro nisi prius degenerans in anomalam: ita vero creberrime, II. Siquis hasce anomalias, Parvum affectuum morbos esse Vernaculos affirmaverit, nostram hac de re Doctrinam minime convellat, III. Aliæ sunt arthriticæ minoris Ordinis anomalix, propter obscuritatem prætermittam, IV. V. Epilogus.

F I N I S.



MECHANICA
MORBORUM,
ET
MEDICAMENTORUM,
AUCTORE
JOANNE-BAPTISTA MAZINO
BRIXIANO,

In Gymnasio Patavino Medicinæ Practicæ Professore.

QUIBUS ADJECTÆ SUNT

ANTONII COELESTINI COCCHII *Epistolæ Physico-Medicæ*, & BARTHOLOMÆI
BOSCHETTI *de Salivatione Mercuriali Dissertatio Physico-Medico-Mechanica.*

*Universum motus est, & aliud præter motum nihil;
motus vero species duæ, & multitudine quidem
utraq; infinita: potentia autem altera in agen-
do, altera in patiendō versatur, ex harum congres-
su, compulsuque mutuo effectus eveniunt numero
infiniti. Plato in Thætetō vel de Scientia.*

*Quæ moventur, aut natura moveri omnia, aut vi,
aut voluntate. Cicero de natura Deorum Lib. 2.*

MARIÆ VIRGINI DEIPARÆ
JOANNES BAPTISTA MAZINUS
D. D. D.



In multumque mihi in votis fuit *MARIA VIRGO DEIPARA* Opusculum aliquod, licet exigua, seu nulla verius arte politum tibi donare, ut si illud minus pretio, tui certe nominis splendore e tenebris vindicarem. At licet ad hoc præsidium comparandum, & ad hanc grati animi significationem præstandam voluntas studiosa compelleret: dignitas tua, & amplitudo, & majestas terris, & Cælo verenda retrahebat, quasque dabat necessitas vires, timor adimebat; serviendum tamen necessitati putavi, tuique nominis aliqua saltem ex parte augendam gloriam, quo nihil utilius, nihil jucundius, nihilque superis omnibus charius agi potest: His de causis Opus hoc meum de *Mechanica Morborum* desumpta e Motu sanguinis, tibi dedico, consecroque, vel potius adfero, quod tuum est; cum revera, quodcunque sit, tibi acceptum referam; ut enim Divina tua ope mihi scribenti semper adfuisti, tu lucem ingenio, tu intelligendi vim menti addidisti, omnibus illis difficultatibus adeptis, quæ ab hoc studio me abducere potuissent. Tuo fretus patrocinio (non enim video, cur etiam tecum loquens, non ea commemorare beneficia passim, quæ a te accepi, cum præsertim memores, gratosque homines esse velis, sintque fortasse hæc quæ scripsi lecturi nonnulli, quorum animos ad Præceptorum meorum memoriam impense studeo revocare) tuo, inquam, fretus patrocinio me ad Patavinam Academiam totius Italiæ nobilissimam contuli, ut a præstantissimis Magistris ad Medicinam faciendam instituerer; Atque adeo tua mihi favit clementia, ut Celeberrimos illius Lycei repererim Magistros *Dominicum Gulielmum*, & *Antonium Vallisnerium*, modo *Cæsaris Archiatrum*, quorum quidem præstantia Mathematicis, Philosophicis, & Medicis, quæ ediderunt, operibus longe lateque perspecta est. In Patriam deinde reversus ad Clarissimum Virum *Cyprianum Benaleam* Sanctissimæ Cassinensis Congregationis Monachum accessi, ab eodemque maximarum rerum scientia ornato Geometriæ principia assiduo labore didici, sed tanto viro diu mihi frui non licuit, illumenim sibi Patavinum Gymnasium tanquam jure suo poposcit, Legum Interpretem futurum: tanto hoc Præceptore, & tam subito destitutus, mœrens quærebam, quomodo incepta Geometriæ studia utiliter prosequi possem, cum tu tandem *AUGUSTISSIMA CÆLORUM REGINA* intra illud, quod tuum est, tuoque a nomine nuncupatur Gratianum Collegium, Discipulo Magistrum, & Geometriæ Alumno dedisti Præceptorem Geometram *Julianum scilicet Bornatum* doctissimum, integerrimumque ex præclarissima Societate Jesu Presbyterum. Is ex Nobili Bornatorum familia natus omni prorsus literarum scientia fuit ornatus: nam & excellens Philosophiæ & Theologiæ Magister, & bonus Poeta, in obscuris vero & reconditis, & multiplicibus, subtilibusque Mathematicis disciplinis ita perfectus extitit, ut fere nunquam ei scientiæ studuisse videretur, quin quod voluerit consequutus sit: Modestia præterea, animi demissio, vitæ probitas in illo fuerunt semper, tum a suis, tum a cunctis nostræ Civitatis ordinibus, tum a me præsertim, qui familiariter cum illo agebam, perspecta, & cognita. Is per aliquot annos me Geometriæ præceptis imbuivit, & diutius etiam imbuisset, nisi repentino, bonisque omnibus acerbissimo fato functus sui desiderium ægerrime ferendum reliquisset; quod si ingenium mihi fuisset tanto Præceptore dignum, & in id studium incumbendi otium quotidianæ Medicæ vitæ rationes dedissent, & tuis melius usus fuisset *VIRGO* muneribus, & magis Præceptorum gloriam amplificavissem. Pudet me quidem, *VIRGO SANCTISSIMA*, tot a te auctum beneficiis, negligenter adeo mihi consuluisse, ut ingrati animi notam nulla ex parte valeam evitare. Cum igitur nullus alius restet tibi gratiæ referendæ modus, quam ea tibi reddere, quæ tua sunt, opusculum hoc excipe, quod pluribus nominibus tibi deberi intelligo, meque omnino felicem esse putabo, si & munus, & donantem non contempnas; hoc unum te etiam, atque etiam rogo, ut imposterum studia, animum, meque totum dirigas, ut tibi semper, & Cælo vivam; in hoc enim uno vera invenitur felicitas; cumque me jam ex magna hujus maris jactatione beatam terram attingentem aspicias, illud oro, obtestorque, *MARIA VIRGO DEIPARA*, ut & tempestatum vim superare, & prædonum impetus frangere per te possim.

BENEVOLIS MEDICINÆ TYRONIBUS.

Cum sapientissimo hoc Sæculo mira legerim a Celeberrimis Viris elaborata, quæ Naturæ opera Geometrice & Mechanice agent, cumque Medicam Praxin agens sapissime observaverim plurima morborum Phænomena a Sanguinis motu eruta, scienter explicari non posse, nisi Mechanicæ leges operam & manum traderent; propterea studui melioribus, ut puto, conjecturis Mechanicas plurium morborum causas a sanguinis motu venari: Præcipuum itaque hujus operis officium est, multorum morborum causas querere tantummodo a motu sanguinis, imposterum daturus operam, ut reliquæ etiam morborum species a Mechanico solidorum motu quoad potero eruantur; Ibi tamen monendum est, me non ubique morborum causas Mechanicis legibus acturum, cum non ubique apte possint convenire; hæc siquidem non coactè vocandæ sunt, sed solum, quas naturalis ratio loci commode postulaverit; Quamobrem laborem hunc, quamvis laconio sermone exaratum tres in partes, claritatis gratia dividendum putavi; in quarum prima, præcipuos Massæ Sanguineæ motus indicandos aggredior; in secunda Pulmonum morbos; in tertia Ægritudines extra regionem Pectoris a vitioso motu sanguinis orituras raptim ostendo: Hac Methodo sperandum credidi, me, si non vera assequi possem, saltem in tam arduis Naturæ phænomenis probabiliora assecuturum: Interim Tyrones benevoli hæc quamvis plana, & Tyronibus accommodata, patienti animo excipite; querenda enim Veritas est.

MECHANICS MORBORUM

PARS PRIMA,

DESUMPTA A MOTU SANGUINIS.

DISSERTATIO PRIMA.



Ulgare, ac tritum adagium est apud Philosophos, quod *ignorato motu ignorari naturam necesse est*: propterea cum mechanicam morborum Theoriam, quantum possibile est, erueret a natura decreverim, consultum fuit primo, hanc a sanguinis motu venari: Etenim cum massa sanguinis quorumcunque humorum origo sit, ac basis, ex qua actiones omnes emergunt, sive sanæ, sive ægræ, procul

dubio ex æqua, aut mala ratione motus massæ sanguinis, quoscunque pariter humores, aut æquo, aut iniquo motu moveri necesse est: junctis itaque motuum viribus, qua ratione natura aut pati, aut feliciter sustineri debeat, juvat inquirere; quare ibi visa est mihi congruere Platonis sententia in Timæo, *Oportet mentis, & scientiæ amatorem principales sapientis nature causas querere, eas quæ necessario ab aliis quidem moventur, alia vero movent*. De universali itaque motu massæ sanguinis per arterias, ac venas acturus, quantum rationalis conjectura docuerat, necessarium putavi sedulo studium agere, ut primo intestinis particularum, seu elementorum sanguinis motus inquireretur; hoc enim cognito quid boni, quidve mali ferendum sit, quoties, aut naturalis motus, aut præternaturalis extiterit, licebit facile invenire; intento juvabit sanguinei fluidi analysis; cum autem injuria tentaverint Philosophi texturam sanguinis vocare ad trutinam, adhuc per vasa circulantis, oportuit celeberrimum Lewenhockium, sanguinem mox a vena extractum curioso microscopio rimari. Sanguis itaque duas in partes separari visus est, quarum una *fluida* est, *concreta* altera. Pars concreta duplici videtur parte componi, quarum una albescens est, aut subflava, quæ ex fibris invicem complicatis retis in modum stringitur, & reticulare sanguinis crassamentum constituit; hoc ipsum observavit celeberrimi viri Boileus, Bohnius, & Malpighius: ex fibris autem reticulariter positae efformantur areæ, seu interstitia, per quæ serum sanguinis, & globuli rubri decurrunt. Altera pars concreti sanguinis rubicunda est, quæ tota ex minutis globulis determinato ordine commixtis componitur; hujusmodi autem rubentes globuli ex aliis globulis coagmentantur invicem superstratis, qui docente Lewenhockio a propria figura plano-ovales appellantur; isti natura sua albicantes sunt, & diaphani; cæterum si plures invicem superponantur, quotum numerus globulorum superpositus senarius sit, tunc purpureum colorem figurant; si vero plures supra senarium numerum accumuluntur globuli plano-ovales, tunc ruboris saturitas, & color subobscurus exditur; ex his planum est invenire, cur in aliquibus cancri, & nonnullis piscibus sanguis albescat; etenim cum in hisce numerus globulorum plano-ovalium superstratus a senario numero multum deficiat, opus est, colorem non purpureum, sed albicantem figurari.

2. Altera pars sanguinis, quæ *fluida* est, serum appellatur, quod, & ipsum duas in partes dividitur: una quidem concrecibilis est, & serum concrecibile a Medicis appellatur, eo quia igni expositum post integram fere evaporationem relinquit gelatinosam substantiam, quæ continuato calore in osseas, & consimiles lamellas densatur. Hujusmodi autem feri concrecibilis portio juxta nonnullos non distinguenda videtur a fibra reticulari crassamenti sanguinei superexpositi; alia vero pars fluida est tenuissimæ aquæ simillima, quotiescunque naturali jure se habeat, aliquando vero turbida est, aliquando flavescens, cum a naturali statu receverit, aliquando autem lacescens, quoties chylo nondum subjugato misceatur. Serum hoc sanguinis, observante Malpighio, si supra vitrum exsiccat, donat in ejus superficie, & vitriolica, & aluminosa, & tartarea, & nitrosa, & salso muriatica, aliorumque generum salia; præterea ex Boilei experimentis judicandum putat doctissimus Gulielmus partem ferocam, seu fluidam esse ad partem consistentem sanguinis in ratione tripla, seu ut 3. ad 1. Ulterius ab instituto deficerem, si negligerem omitterem, globulos rubros elaterio donatos esse, observante enim Lewenhockio, sanguinis globuli transeuntes per quaslibet locorum angustias pressionem patiuntur, ut figuram prorsus mutant, ovales enim fiunt, & cuicunque pressionem se se eleganter accommodant, tandiu postea pristina figuræ restituuntur, quoties separatis angustias ampliori in spatio devolvantur. Cum itaque animal aere, & chylo indigeat, ut vivat, & in aere, & chylo cujuscunque generis corpora salina, sulfurea, terrea, aquea &c. recondantur, jure optimo credendum est, massam sanguinis ex aere, & chylo compositam, ab aere, & cibo cujuscunque generis corpora mutuari; hæc autem suas habent moles, & figuras, & unicuique concessa est peculiaris ratio motus, & situs, juxta naturalem molis, figuræ, & gravitatis specificæ exigentiam. (a)

3. Hæc omnia Philosophis, & Medicis communia sunt, & prout a Boilei experimentis confirmata tuto omnes exceperunt; Verum cum particulæ sanguinis tribus præcipue motibus naturaliter affici mihi semper visæ sint, quibus animalis œconomia continuo, & mirum in modum volvitur, & sustinetur; quorum primus *motus pressiois est, seu impulsus*, secundus *separationis*, tertius vero *assimilationis*: propterea præcipua horum motuum, tum naturalia, cum præternaturalia phænomena inquirere prius necesse est; itaque quod ad *pressionis, seu impulsus motum* pertinet, quem in canalibus sanguiferis alte sustinet massa sanguinis, tria conspirant; *motus nempe*

cordis; arteriarum systoles seu contractio: & vis elastica elasticarum particularum massæ ejusdem. Itaque apertum est omnibus, cor a fibris varii generis undequaque circumseptum quacunque systole urgere sanguinem in arterias; qua alternatim recurrente impulsus sanguinis antecedentem premit homologo impetu, dummodo omnia naturaliter se habeant; quare successiva actione sanguinis impellentis, & reactione ejusdem impulsu componitur quædam ratio motus, quæ universa elementa sanguinis quaquaversus premens arterias conice euntes extrorsum aperit. Licet vero momentum cordis assequi posse non solum arduum sit, verum etiam pene impossibile, ut inferius (n. 15.) patebit; nihilominus certum est fore validissimum: etenim cor non solum sanguinis quantitatem certa cum velocitate debet expellere, verum etiam separare debet resistantiam, quam sanguis præcedens per omnes arterias fluens secuturo opponit; ulterius adest resistantia attritus massularum sanguinis cum internis parietibus, curvaturis, & angulosis inclinationibus vasorum, & resistantia tenacitatis massæ sanguinis, ex quibus omnibus necessario componitur ea ratio reactionis contra vim cordis, quæ nisi a validissima actione, aut validissimo momento cordis vincenda est. Impellitur itaque sanguis a validissimo motu cordis, & impulsus sanguis tot resistantias inveniens elasticas arterias necessario extrorsum urget, quoties vero arteriarum dilatatio eo devenit, ut dilatari naturaliter arteriæ ultro non possint, cogentur lege elasticorum corporum ea ratione contrahi, qua antea fuerant dilatata; post dilatationem itaque contrahuntur arteriæ, a qua contractione novam sustinet pressionem massa sanguinis, urgenturque versus axem canalis arteriosi contenta elementa massæ ejusdem: ibi tamen animadvertendum est, quod sicuti majores arteriæ cordi viciniores, tam ratione majoris impetus, quem a proximo corde excipiunt, cum ratione majoris quantitatis sanguinis, quam cæteris paribus majores arteriarum sectiones amplectuntur, quacunque systole majori momento dilatantur: ita vicissim majori quoque momento proportionaliter contrahuntur; quare in hisce majoribus præcipue arteriarum sectionibus probabile putaverim, massam sanguinis non solum ex glutinosis, ac viscidis, verum etiam ex tenuibus, mobilibusque particulis permixtam a contractionis momento sanguinis massulam versus centrum canalium deferri quidem debuisse, hæc tamen servata lege, ut tenuiores particule facilius, ac citius, glutinosæ vero, ac viscidæ difficilior, ac tardius versus axem deferantur. Verum in minoribus canalium sectionibus, & præcipue in minutis arteriis a corde remotioribus, in quibus actiones, & reactiones facilius accedere possunt ad rationem æqualitatis, & elastica vibratio, seu contractio adeo infirma est, ac tenuis, ut fere nulla videatur, aliter res agi videtur; etenim cum his impetus a corde exceptus multum imminutus sit, & pauca addit quantitas sanguinis, glutinosæ propterea, ac viscidæ particule ob elasticæ contractionis inertiam a vasorum parietibus difficulter recedunt: quin imo his facillime adhærent: fluentibus interea feliciori motu subtilioribus particulis per lineam axis. Quamobrem facile est credere in majoribus præcipue arteriis cordi proximioribus elementa sanguinis a majori vibratione earundem magis magisque pressionem, ac impulsu pati debuisse. Ulterius impulsus, sive impetus promoyentur a momento particularum elasticarum, contentarum in massa sanguinis; etenim cum in hac præter globulos plano-ovales adsint corpora aerea, & alterius fortasse generis, quæ elasticis viribus prædita sint, cumque elastica corpora ad eam figuram se se restituant, a qua prius vi pressionis receperant; certe solidis durisq. particulis permixta tantum dilatari quamproxime debent, quantum a massularum durarum momento pressionem exceperint; deinde cum dura, & solida corpora quocumque loco tangere, ac premere possint elastici corporis superficiem, quaquaversus quoque elastica corpora compressa urgebunt, impellentque solida, quapropter duræ, & elasticæ particule invicem commixtæ prement, & prementur, urgebunt, & urgebuntur, sicque tota massa sanguinis a motu cordis, a contractione arteriarum, & ab elastica vibratione particularum sanguinis quaquaversus pressa mutus impulsibus continuo erit in arteriis agitanda, ut quoque circulationis motu volvatur.

4. Hujusmodi motus pressionis valde necessarius est in arteriis, ut debita fiat corporum contentorum in massa sanguinis resolutio; enim vero cum sanguis sit fluidum viscidum ex coherentibus solidis, fluidisque particulis in data (n. 2.) ratione compositum, certe filamenta sanguinis, cum per minimas canalium sectiones usui naturæ trajici facile debeant, reducenda procul dubio prius erunt sub dimensionibus quodammodo infinite parvis: huic autem operi apprimè conducit iste pressionis motus; etenim massulæ corporum, aut similium, aut dissimilium undequaque impulsæ a se invicem paulatim sejungi conantur; rumpuntur enim continuo motu pressionis nexus earundem inter se, & quæ primo composuit fuerant, minus compositas paulatim fieri necesse est; verum cum massulæ quælibet magis magisque minuantur, quam earundem superficies, & massulæ cæteris paribus sint ut pondera, colligi potest, hujusmodi solida sub minori mole reddita, & sub minori pondere a sero sanguinis circumambiente ob majores massularum relictas superficies facilius sustineri; deinde motus pressionis concrecibilibus feri filamentis utilissimus est: motu enim pressionis atteruntur, & scinduntur filamenta sanguinis, minusque resistantia fiunt, ut, a cæteris particulis hinc inde agitatæ facilius trajiciantur, unde serum fluidius redditum opportunæ mixtionis suspensorum corporum apte conducit.

(a) Vide Lewenhockium, & Gulielmum de natura & constitutione sanguinis.

cit; licet autem fluidiori in sero suspensa invicem misceantur, nihilominus huiusmodi mixtio non prohibet, quin data loci opportunitate a se invicem separari facilius possint, etenim solida, & viscida corpora taliter resoluta sub minori mole, ac pondere, quaquaversus prompta ad motum facile fiunt; quamobrem taliter disposita corpora non solum separationi exequenda facilius accommodantur; verum etiam una cum sero per angustissima, tum vasculorum, cum glandularum foraminula perineare liberior, commodiusque possunt; Porro tali resolutionis opere elementa sanguinis una cum sero ad quandam æquilibrationem rationem acquirendam disposita fiunt. Verum cum tota naturalis æquilibrationis proportio in proportionali numero, pondere, mole, ac motu corporum cum debita pariter feri quantitate, in qua libere innatare debent, experimentis ac rationibus niti videatur; ideo præstat ibi primo animadvertere, quod si sulfureæ, salinæ, aut alterius generis seu consistens portio sanguinis fuerit ad partem ferofam, seu fluidam in ratione 1. ad 3. ut Illustriss. Boyleus, alique celebres Philosophi toties in naturali massa sanguinis experti sunt; tunc facile emerget unum naturalis æquilibrationis attributum, nempe debitum corporum numerus; tali enim numero partium determinatarum sustinetur non solum debita contiguitas corporum immobilium in massa sanguinis, verum etiam specificum, & naturale pondus eorundem, quo corpora quælibet debita feri quantitate velut in statera æquilibrantur: moventur siquidem undequaque massulæ omnes, sed tali lege, ac proportionem contactus, mixtionis, ac ponderis cum aqueis particulis, ut aquea portio ad solidas, seu consistentes particulas sit semper in ratione tripla, aut quasi tripla; ita ut remaneat quantitatis aquæ ad quantitates solidas, aut consistentes hæc determinata ratio majoris inæqualitatis, quæ est inter 3. ad 1. Non solum autem necessaria est huiusmodi ratio inter fluida, & solida, seu consistentia corpora; verum etiam necessaria proportio esse debet inter solida corpora unius generis, & solida corpora alterius, videlicet inter salina, & sulfurea, & alterius cuiuscumque generis inter se; quæ ratio licet determinari nullatenus possit, nihilominus certum est tantorum corporum proportionem inter se admitti debuisse, ut natura motus suos æquabiliter regat; sic enim inter aggregatum horum corporum fieri quodammodo proportionis æquilibrationem, quo in statu naturali serum cum aliis corporibus, & hæc cum sero, & inter semetipsa solida, & consistentia corpora determinatam corporum, & momentorum numero, pondere, & mensura proportionem sustineant. Cæterum si corpora sulfurea, salina, & alterius generis tali numero excedant, ut supra serum expositam proportionem superent, tunc huiusmodi corpora serum undequaque tali amplexu nimis stringent, ut tandem quodammodo obruant: sic massa sanguinis excedenti partium numero densior facta, & cum densitates sint ponderibus proportionales, gravior quoque reddita, a debito momentorum æquilibrationis recedet; tali propterea vitio correptus sanguis tardiori pede fluat, & consequenter facile deponet corpora, obstructions in glandulis, & finitimis vasorum oculis inflammationes paratur. Ulterius cor alte laborat sanguinem graviores expulsum, & musculi inertii motu peristaltico progredientes tractu temporis innúmera mala parturient; ita etiam si huiusmodi corpora non solum numero, verum etiam dissimili mole, ac figura peccaverint, nec per excretorias glandulas, quantum par est, a massa sanguinis separentur, tunc cum ista ad cætera corpora numero, mole, & figura naturaliter se habentia maiorem rationem habeant, necessario ex tot dissimilibus corporum momentis auferetur debita æquilibrationis ratio, quæ iustam sanguinis temperiem, & debitum motum constituit, unde febriles motus procul dubio emergent, chronici, ut plurimum, & intermittentes; Ita gravius fortasse vitium aliquando fuerit, si solida corpora salina præcipue numero minora fuerint, quam par est; tunc enim massa sanguinis levior, mobiliorque facta, magisque prompta ad motum, & supra modum exaltato ulterius sulfure ruet in motus citissimos, nullaque lege mota continuas febres erit allatura.

5. Quamobrem necessaria supramodum est *Proportio motus corporum*; etenim corpora contenta in sero sanguineo tali ratione, ac lege moveri debent, ut cæteris paribus motus corporum in uno spatio vasorum sit proportionalis motui corporum in alio spatio eorundem, & sic successive; quare quilibet motus corporum in uno spatio vasorum similem rationem habere debet ad quemlibet motum corporum in alio spatio, ut omnes motus corporum simul sumpti in uno spatio vasorum sint homologi omnibus motibus corporum simul sumptis in alio spatio eorundem; sicque cum particulæ aquæ corporibus quibuscumque circumpositæ sint, hæc proportionali impetu impulsæ proportionalibus quoque momentis movebuntur, ut tota massa sanguinis cæteris paribus homologo semper pede decurrat æquo naturæ beneficio. Ulterius ut habeatur proportionalis ratio motuum, necesse est corpora specificè leviora, eo quantitate, ac numero gravioribus minora esse, quo leviora cæteris paribus velociora sunt, magisque ad motum disposita; sic enim data tali ratione reciproca quantitatis corporum cum eorundem velocitatibus singulorum corporum momenta, ac vires debita ratione æquabuntur, quibus momentis massa sanguinis æquilibrata æquabiliter motus suos exercebit cum actionibus inter se æquabiliter proportionalibus; Verum si aliqua corpora quantitate, & motu maiorem rationem habeant ad alia, manifestum est, quam facile momentorum rationes inter se dissentire debeant, quamobrem massa sanguinis multiplicibus momentorum legibus inæqualiter agitata febriliter moveri conabitur. Serum quoque non leve vitium affert, quotiescunque aut deficiat, aut excedat; sero enim deficiente, cætera corpora forti nimis contactu, ac amplexu inter se stringuntur, ut motus suos exercere libere quaquaversus inepta sint, adepto ex majori corporum contactu, majori pariter momento densitatis, & gravitatis; si vero excedat, contenta corpora majoribus in spatiis natant, nec eam legem opportuni contactus inter se servare apta sunt, quæ naturali fluido sanguineo necessaria est; laxata propterea textura sanguinis in excedenti feri copia salina corpora sub minimis dimensionibus reddita nimium exolvuntur, & sulfurea in statu inertiae reddita inepte pigrescunt innumeris naturæ periculis; languescunt enim fluida omnia, & solida quælibet enervantur: super omnia lædunt naturalem proportionem motus sanguinis sulfureæ massulæ, quoties harum excessu momentum sulfuris momento feri majus fuerit; tunc enim sulfureæ massulæ sero copulatæ compositum efficient majori

superficie circumscriptum, quam serum ipsis corporibus æquipondans, & consequenter ex hydrostaticis tale compositum levius fiet, quam par est, quare serum & sulfur motibus facile præternaturalibus adeo movebuntur, ut communicata cæteris quoque corporibus agitatione, tota quanta est massa sanguinis violento motu volvetur: fovet ultro impetum vis elastica globulorum plano-ovalium, quæ licet determinari vere non possit, tamen magnam esse certum est; etenim si in hac re liceat philosophari, cum calor præternaturalis in sanguine fiat ut plurimum a causis quibuscumque externis particulas præcipue sulfureas sanguinis agitantes, (a) cumque calor consistat in concitatore particularum motu, sitque calor, ut impressiones particularum corporis alidi in quopiam objecto corpore calorem excipiente; impressiones vero sint in ratione composita ex duplicata celeritatem, & simpla densitatem particularum calidarum, proculdubio etiam calidæ sanguinis particulæ concitatiore motu agitatur ab externa causa probabiliter accedent ad talem rationem compositam ex duplicata velocitatem, & simpla densitatem earundem; quamobrem calidæ præcipue sulfurum massulæ tali ratione urgebunt obiectas, & sibi proximas globulorum plano-ovalium particulas: cum autem istæ elaterio ulterius præditæ sint, vi cujus compressæ conatus suos exercent, ut ad majus spatium & ipsæ extendantur; idcirco clarum est, quantum extendi, & ad quanto majora volumina dilatari debeant plano-ovales particulæ, quoties a sanguinis particulis alte agitis, & præcipue a calidis sulfurum massulis in exposita ratione urgeantur.

6. Ex hisce viris ardentibus & acutæ febres supra modum sine frigore, ut plurimum sobolescent, tandiu duraturæ, quandiu sulfureæ particulæ per loca excretoria separatæ fuerint, aut transpirationis opere alio fuerint evolatæ, usque dum remaneat ea tantummodo sulfuris quantitas, quæ cæteris paribus juxta naturale æquilibrationem primo fuerat proportionalis. Ex his animadvertere facile est, quod si principia, quæ primo vitiose exaltantur, non sint sulfurea, sed salina, aut alterius generis, quorum naturalis dispositio ad motum minor sit, quam velocitas particularum sulfuris; tunc cum salina corpora cæteris paribus sulfureis graviora sint, figuris, quibus circumscribuntur nitrosæ præcipue, aut nitro analogis membranas cuiuscumque generis taliter irritando frigoris & rigoris affectiones primo afferent, sic arteriarum & venarum membranz irritatæ spasmodicis contractionibus crispantur, ut minoris sectionis fiant; stringitur propterea massa sanguinis, ut pulsus eo tempore veluti suffocari videantur, usque dum paulatim exaltato sulfure, & salia ad statum fluoris, aut volatilitatis evecta una cum cæteris particulis immodice moveantur. Ulterius si lymphæ, aut aqua sanguinis quantitate peccaverit, ut ratio feri ad alia solida & consistentia corpora major sit quam 3. ad 1. tunc depresso sulfure & enervatis salibus sanguinis æquilibrationem tollitur sine magno impetu tumultus, inde lenis calor, tenuis frequentia pulsuum sine siti, ut plurimum sequi consuecunt, inde lymphaticæ febres exoriuntur. Ex his colligendum putaverim, quocumque loco, ac situ vasorum, aut glandularum basin, aut sedem paroxysmi febrilis locari posse; enimvero si quolibet loco vasorum, aut glandularum per aliquos canales, ut per chylicos, aut lymphaticos, aut ab aere per pulmones transmittantur corpora in vasa sanguifera, quæ sanguini associata mutant sensibilibus proportionem corporum inter se, aut debitam rationem motus eorundem; tunc necessario vitiose moveri massam sanguinis necesse est, ut tota massa ad majus volumen extensa innumeris asymmetris motibus febriliter agitetur. Ex his quæ dicta sunt, aperte constare potest, hæc omnia facile convenire posse cum iis, quæ de motu agitationis in sanguinea massa celeberrimi Viri, Guilielmi nempe de natura, & constitutione sanguinis, & Michelottus de separatione fluidorum in corpore animali sapientissime docuerunt.

7. Ibi redeundo aliquantisper ad motum pressionis dissimulare non possum, quæ diu suspicatus sum quærens motum sanguinis in arteriis; stetit enim anceps animus, num massa sanguinis a corde impulsæ in arterias lineam quandam spiralem describeret, quærendo ulterius, cujus generis futura esset hæc curva spiralis? ad hanc meditationem nonnulla movebant animum, & primo motus cordis sese torquentis; cum enim cor præcipuo fibrarum spiraliū momento sanguinem urgeat, & motus impulsus sanguinis dirigi facile debeat juxta directiones impressas fluido ab organo impellente, certe ex corde spiraleriter revolutum sanguinem quoque spiraleriter movendum esse per arteriarum longitudinem suspicatus fueram; deinde cum arteriæ ipsæ a tribus fibrarum ordinibus vestiuntur, quarum primus circularis est, rectus alter, qui circulares secatur ad angulos rectos; tertius vero spiralis est, qui referente Diemerbroekio (cap. de arteriis) tum internam, tum externam tunicam obliquis fibris apte munit, qua in re Dominicus quoque Guilielmus (b) geometrico & mechanico artificio ductus spirales fibras amplexus est magnis operibus opportunas: itaque sanguis spirali motu a corde suscepto, videtur, eundem aut similem motum per arteriarum longitudinem sustinere: Enimvero relicto corde occurrunt fibræ spirales arteriarum, quæ spiralem motum a corde susceptum ulterius conservare aptæ sunt; deinde cum sanguis relicto corde variis motibus urgeatur eodem tempore in arteriis, quorum alter sit ab impetu cordis, quo per longitudinem arteriæ continuo impellitur, alter vero sit a motu elastico arteriarum, quo sanguis præcipue in majoribus arteriis a circumferentia versus axem transversim impellitur, & cum hisce motibus accedat eodem tempore peculiaris alter motus, quem fibræ spirales earundem contento sanguini alte donant; idcirco ex hisce motibus eodem tempore sanguini impressis emergere videtur motus mixtus ex hisce compositus, qui cum nec totaliter rectus sit, nec omnimode circularis, sed utriusque simul particeps; certe massa sanguinis a spiraliibus præcipue fibris ultro mota, taliter moveri debet, ut motum mixtum, spiralem nempe, describere debeat, aut quasi spiralem, juxta quem per arterias imposterum videtur ire debuisse; Borellus quoque per vertiginosos motus (c) torqueri particulas, ut recte misceantur indicare visus est; Verum cum in hac re deficiant experimenta, ac necessaria data, quæ meam suspitionem tuto firmarent, reliqui meditationem, contentus hæc tantummodo innuisse, ut futuri geometræ, ac mechanici feliciori ingenio,

(a) Per prop. 85. de motu intestino fluid. Hermannii Phorono.

(b) De natura & constitutione sanguinis.

(c) Alph. Borellus prop. 99. & Scholio Th. 2. de motu Animalium.

huiusmodi spirales curvas fortunata meditatione conentur sedulo invenire.

Motus
fens-
ratio-
nis.
8. Præcipua pressio & impulsus, quæ massæ sanguinis accidunt, beneficia, aut damna huc usque exposita sunt; cum modo, quo sanguis ab arteriis in varias viscera glandulas necessario transeat, peculiare liquorem separaturus: cumque motus corporum continentium contenta corpora tali ratione urgere debeant, homologa, quodammodo motibus corporum continentium, suspicatus sum, sanguineum laticem in glandulis peculiarem a specifica glandularum structura motum probabilitate mutuari, ut separanda corpora apte fecernantur. Licet vero hanc rem celeberrimus Michelottus doctissimo opere de fluidorum separatione plena manu tractaverit; nihilominus studii gratia non verebor exponere conjecturas, quæ de motu separationis fluidorum per glandulas probabiles quoque mihi visæ sunt, præter ea, quæ summa virtute ac studio a tot celeberrimis Viris Leibnitio, Joanne Bernollio, & Bernardo Connoro felicissime exposita sunt; Antequam autem ulterius prosequar, fateor me pluries studuisse, ut naturalem glandularum structuram a celeberrimorum Anatomicorum observationibus clare perciperem; verum cum horum observationes ancipiti pede ubique hæreant, alii enim vasculares, alii vesiculares, arteriarum quidem evanescentium ramulis, venulis, nervis, & excretoriis canalibus, munitas conjectura potius, quam experimento docuere; quamobrem inter conjecturas Malpighii sententiam eligendam putavi, quæ glandulam a folliculo membranoso compositam, varioque modo contextam voluit; huic autem sententiæ videtur quoque assentiri Doctissimus Morgagnus in epistola ad supra laudatum Michelottum conscripta; inquit enim: *Movet enim me ut par est gravissimi Anatomici Malpighii innumera observationes, movet ista luculenta Clarissimi Littrii confirmatio, qui glandulas sine vesiculis non invenire; has igitur in glandulis reperire necesse est.* An autem membranosi isti folliculi elaborati sint a dilatatione arteriæ evanescentis, aut a membrana quadam vesicula inter arterias evanescentes posita & vascula excretoria? ibi anceps non inquiri, cum instituto meo utraq; res faveant; enim vero (liceat in conjecturis conjectari,) si glandulæ istæ separatrices elaboratæ sint ab extensionibus arteriarum ultimarum evanescentium, certe sagax natura ubique provida talibus fibris munire debuerat, quæ evanescentes arterias tanto officio opportunas efficeret, a quarum viribus non pressio tantummodo motus fieret, arteriis ubique communis, verum etiam specifica ratio motuum hisce evanescentibus arteriis donaretur, quæ specifica separationi liquorum apte inserviret; & sane, si natura tot viscera officio diversa, diversa quoque figura, ac structura elaboravit, cur evanescentes quoque arterias non poterit variis fibrarum ordinibus ultro vestire, quæ specificis motibus peculiarium liquorum separationi famularentur? Si vero glandulas membranosis vesiculis elaboratas velis, hæc certe a natura specificis fibrarum ordinibus armandæ probabiliter fuerant, quæ peculiaribus quoque motibus peculiarium corporum separationi operam opportune darent. Hisce præsuppositis refert Michelottus, tam celebres viros Leibnitium nempe, Bernollium, & Connorum in eam ivisse sententiam, ut crederent fluidorum separationes in quibuscunque viscerum glandulis non ea ratione fieri, ut pororum similitudo sit homologa figuris humorum, seu corporum separandorum, ut usque adhuc a plerisque iudicatum est; sed summo consilio arbitrantur, universas corporis nostri glandulas a primo fœtus exordio peculiari liquore saturatas fuisse, quæ postmodum toto vitæ cursu coguntur secernere consimiles succos illis homogeneos, quibus prima jam formatione fuerint saturatæ. Hanc separationis methodum nobilissimo, aptissimoque experimento confirmant; enim vero facta perfectissima mistione aquæ & olei, si velis aquam ab oleo secernere, sufficit chartam emporeticam aqua prius madefacere, cujus una portio postmodum immittatur vasi; tunc enim aqua oleo mixta poros chartæ aqua madefactæ paulatim ascendet, & per reliquam chartæ portionem extra vas peidulum erit exterius elapsura: Verum si oleum ab aqua separare placuerit, chartam emporeticam oleo prius immergere, & per poros chartæ oleo humidum felicissime oleum separabis.

9. Præter hæc, quamvis aureo digna sint voto, peculiarem liquorum separationem in peculiaribus viscerum glandulis alia quoque methodo fieri posse suspicatus sum: Itaque certum est quæcunque animalium viscera, ut lien, hepar, renes &c. suas habere glandulas peculiari, & specifica textura ac figura donatas; alia siquidem est figura & textura glandularum hepatis, alia lienis, alia glandularum renalium figura & modus, & sic de cæteris. Ulterius hæc diversa glandularum modificatio determinatur a diverso ordine ac textura fibrarum muscularium, nervorum, & membranarum; musculares enim fibræ, nervæ, & membranosæ, quæ renales glandulas texunt, diversam habent directionem & vario excurrunt ordine, ac fibræ nervæ, musculares, & membranosæ, quæ hepaticas, & lienares glandulas construunt: Hæc omnia observante Malpighio aptissime confirmantur (pag. mihi 225.) Animadvertit enim in hepate, quod glandulosi acini, quibus lobulus componitur, cum peculiarem circumscriptionem habeant, necessario propria & ipsa figura, quæ ut plurimum hexagona est, vel plurimum laterum: Idem de liene (pag. 300.) ostendit, quod minima hæc glandula fiburam habent ovalem. De renibus vero (pag. 279.) clare asserit *In homine, aliisque consimilibus, levis undequaque ab omnibus licet describitur ren, attamen aliquando in adultis, & sæpe in fœtibus manifesto ejusdem compositio elucescit cum exiguis portionibus altis rimulis sejunctis conglobetur, & in adulto etiam perpetua interius hujus divisionis permanent indicia, diligenti etiam indagine asperam, & ulterius semidivisam observari hujus superficiem, quod tamen ut clarius pateat, animalium nuperrime naturam renes sunt excutiendi; in his enim lobuli quidem multiplicium laterum emergunt rimulis circumsepti, quæ aucta, & provecta animalis ætate, licet fere obliterari videantur, eorum tamen vestigia adhuc supersunt, varioque distinguuntur colore; nam rubedinem, vel etiam immixti liquoris per arterias, vel venas colorem referunt, & etiam contenti lobuli, sive renum exigua portiones, quæ carnis colorem remissorem retinent, ab his circumambiantur: hæc renum subdivisiones non in sola superficie excitantur, sed intime etiam penetrantes carnis aliqualem distinctionem efficiunt; in bobus enim, exaratis superius brutis, & in ipsomet homine collectiones illæ insignes conspicuis foveis in aliquibus brutis circumscriptæ tandem interius peculiarem figuram, & exactam distinctionem habent, videnturque referre plu-*

rium laterum Pyramidem, quæ præ cæteris patet in testudinum renibus, & interius in ipsomet homine, &c. Deinde hæc diversa fibrarum directio, diversus ordo, & varius figuræ & texturæ modus necessario afferre debet glandulis diversimode elaboratis peculiarem quoque glandularum motum singulis glandulis proportionalem; peculiari itaque, & specifico motu moveri debet vi fibrarum specificæ glandulam componentium renalis glandula, peculiari quoque vibratione lienaris, & hepatica.

10. Hisce præhabitis, eligamus ibi glandulas hepatis, simili enim ratiocinio de cæteris quoque viscerum glandulis proportionaliter licebit philosophari. Cum huiusmodi glandulæ sint biliosarum particularum separationi destinatæ, in has biliosas particulas ferax sanguis ab evanescentibus hepaticis arteriis effunditur; ibi tamen cogitur sequi motum specificum glandularum continentium; in hisce enim hexagonis glandularum lacunis biliosæ massulæ (numero certe & momento majores cæteris ibi commixtis) inter se homogeneæ, ejusdemque superficiæ, & indolis urgentur a specifico, & naturali motu glandularum hepaticarum, ut opportuna separationi accommodentur; verum cum methodus separationis ab ordine, ac lege motuum massæ sanguineæ glandulam ingredientis habeatur; ideo nonnulla prænotanda sunt, quæ motuum leges aperient futuræ separationi exequendæ opportuna; Primo itaque sciendum est, quantitatem motus sanguinis exeuntis a corde una systole (natura bene se habente,) semper futuram esse proportionalem quantitati motus ejusdem per foraminulum arteriolæ egredientis, & ingredientis, glandulam eadem systole, ut tali ratione semper fiat glandulæ diastoles, cordis systoli proportionalis: Ut autem hæc obtineri possint, notandum est, quantitates motus aliquorum per quævis foramina erumpentium, quæ viribus impellentibus proportionales sunt, esse in ratione composita ex rationibus duplicata velocitatum, simpla densitatum, & simpla foraminum, e quibus erumpunt; (a) Itaque cum sanguis sit fluidus in statu naturali ejusdem densitatis, ejusdemque gravitatis specificæ, cujus quantitas proportionaliter a momento cordis semper impellitur; ideo simili lege futura erit quantitas motus sanguinis, quæ per unum foramen effluit quacunque systole in ratione composita ex ratione quadrati velocitatis ducti in sanguinis densitatem, seu quantitatem, & ducti in foramen, per quod dato tempore erumpit massa sanguinis; quare si quantitas motus massæ sanguinis erumpentis dato tempore e foramine trunci arteriæ vocetur q; foramen vero e quo erumpit vocetur o, quantitas vero, densitas, seu massa sanguinis vocetur m, velocitas vero vocetur u, erit $q = o + m + uu$? Modo certum est truncum arteriæ plurimos in ramulos esse divisum: si igitur truncus arteriæ supponatur divisus in 20. ramulos, quorum unus in glandulam erumpens sit vigesima pars trunci arteriæ majoris; procul dubio motu cordis naturaliter se habente, futura quoque erit quantitas motus sanguinis exeuntis dato tempore e foraminulo rami arteriolæ in ratione composita ex duplicata velocitatis, simpla massæ, & simpla foraminis, e quo æquali tempore erumpit, quare erit

$$\frac{q}{20} = \frac{o + m + uu}{20};$$
 & cum cæteris paribus quadrata velocitatum sint similia inter se, futura erit quantitas motus massæ sanguinis exeuntis e foramine trunci arteriæ una systole proportionalis quantitati motus massæ sanguinis exeuntis e foraminulo rami arteriolæ eadem systole; quare factio analogismo, fiet hæc ratio $q : q' :: o + m + uu. o' + m' + uu.$ Propterea colligendum, quod

cum sanguis systole cordis expulsi, ingrediens glandulam hanc proportionaliter dilatare debeat, systolem cordis, & glandularum diastolem esse inter se proportionales, quare glandulæ quælibet tanquam parvula corda haberi facile poterunt. Porro cum massa sanguinis ingrediens glandulam hanc in data ratione aperiat, ideo glandula a vi, & momento sanguinis in concava glandulæ superficie determinatam percussione excipiet; cum autem percussiones fluidorum sint ut quantitates motus eorundem, (b) & quantitas motus sanguinis e foraminulo arteriolæ egredientis, & glandulam ingredientis facta sit $\frac{q}{20}$ seu $\frac{o + m + uu}{20}$ erit quo-

que vis percussione facta a sanguine ingrediente glandulam, eandemque dilatante, ut $\frac{q}{20} = \frac{o + m + uu}{20}$ Verum cum dilatatio-

ni glandularum statim succedat reciproca constrictio, eo quia glandulæ quælibet utpote arteriis & venis, nervis, membranosis, & muscularibus fibris contextæ oscillatorio motu & quadam elastica actione, aut quasi elastica tantum constringi debeant, quantum antea fuerant dilatatæ, erit vis, seu momentum constrictionis glandulæ proportionale, vi, aut momento dilatationis; quare glandula in constrictione, seu systole urgebit quoque elementa sanguinis ingressi glandulam secundum rationem compositam ex duplicata velocitatis, simpla massæ, & simpla foraminis, pariter divisus per 20. Secundo opus est fluidum in glandulam delatum non celeri nimis motu agitari, sed leni, placidoque motu moveri: etenim ut in fluidis similia a dissimilibus separari possint, requiritur ea ratio temporis tanto operi opportuna: verum fluente nimio motu sanguine, confusisque omnibus aufertur ea ratio determinati temporis, quæ proculdubio necessaria est, ut debita methodo fecernantur; sic in quibuscunque artis operibus, & in chymicis separationibus debita corporum secretio non a celeri nimis motu fluidorum, sed a lento, placidoque motu, statutoque tempore plerumque perficitur; quare suppositis superioribus cum quadrata decrescant in ratione duplicata suarum radicum, constat quadratum velocitatis massæ sanguinis e foraminulo rami arteriosi egredientis & ingredientis glandulam nempe $\frac{uu}{20}$ futurum esse necessario mini-

mum respectu ad quadratum velocitatis massæ sanguinis e majori arteria egredientis, nempe respectu ad uu ; quare cum

(a) Per prop. 31. Hermanni & per demonstrata a Michelotto de separatione fluidorum.

(b) Per coroll. secund. prop. 42. Hermanni Phoron.

motus sanguinis in glandulis futurus sit minimus, & consequenter lentus, lenis, ac placidus, facile erit similia corpora disponenda esse, ut determinato tempore a dissimilibus separentur. Tertio præstat tanto operi separationis, massam sanguinis ingressam glandulam quacunque systole esse quoque respective minimam, nempe minimo glandulæ continentis spatio proportionalem: enim vero si quantitate præcipue excedat, glandula nimis extenditur & talis, ac tanta fieri potest contra glandulam resistantia, ut glandulæ systoles non ea ratione fieri, ac perfici possit juxta rationem virium, & numeri vibrationum, qualem exigit tantorum corporum separatio. Quamobrem suppositis quoque superioribus, cum massa sanguinis, quæ per rami arteriolæ effluit in glandulam quacunque systole, sit in ratione simpla cum minimo quadrato velocitatis; necesse est hanc quoque massam quantitate minimam futuram esse, videlicet minimo glandulæ continentis spatio proportionalem.

II. Hisce præsuppositis, cum naturalis systoles seu vibratio elastica glandulæ semper eadem ratione fieri debeat quacunque cordis systole juxta eundem gradum quadrati velocitatis; proculdubio rali quoque ratione urgebit, aut immediato, aut mediato contractu contenta elementa massæ sanguinis; cum autem hujusmodi elementa alia similia, alia vero dissimilia; similia elementa (biliosa nempe corpuscula) utpote homologas habentia superficies excipient singula percussiones, si non semper, saltem ut plurimum supra plana homologa; cum autem corpora similia, ejusdemque generis eadem semper lege motus percussa, superque easdem, aut similes planorum superficies semper impulsa moveri necessario debeant motibus, seu directionibus quoque, aut æqualibus, aut similibus, & juxta exceptas percussiones proportionalibus; proculdubio hæc juxta easdem, aut similes directiones itura erunt susceptis impressionibus proportionales: Quamobrem hæc similia corpora numero pauca, lente, ac placide mota, eademque lege homologa motuum, ac vibrationum semper mota, impulsa, ac quassata supra homologas planorum superficies, separatis paulatim aliorum corporum dissimilium vinculis, resistentiis, & occurribus, cogentur moveri omnia, aut fere omnia juxta eandem directionem, ita ut versus unam glandulæ partem ac situm convenire paulatim coacta sint: cætera vero heterogenea corpora cum mole, figura, ac pondere dissimilia sint tali, ac specifica vibratione, & fortasse tali, ac tanto vibrationum numero glandularum hepaticarum urgente improporionatas, ac dissimiles dissimilium corporum superficies inæqualiter quoque percussa, inæqualiter movebuntur per directiones pariter inæquales, ac dissimiles, quare hujusmodi corpora dissimilia necessario urgebuntur per diversas ac dissimiles vias, ac directiones per loca pariter diversa glandulæ continentis; unde dissimiles massulæ tali mechanica methodo motuum dissimilium motæ a similibus biliosis massulis satis sejunctæ ac separatæ, nullatenus impediunt, quin similia & homogenea biliosa corpora a cæteris separata, qua data porta extra glandulas paulatim eliminantur; non dissimili ratione in Chymicis determinatus caloris gradus, sive specifica ignis actio, aut determinatus ignis nutrimentum a fluido heterogeneo unam substantiam separat ab aliis tali gradui ac momento ignis proportionalem, cum postea cæteræ substantiæ ab alia vi, aut alio ignis, & caloris gradu superferunt proportionaliter separandæ: Verum ibi fateor, quod licet specifici motus fibrarum glandularum multum juvent, ut specifici liquores separentur; nihilominus si cum celeberrimo Leibnitio ultro placeat fibras has supponere probabiliter a primordio generationis specificis liquoribus saturatas, certe felicius secutura erit specifici liquoris, similium nempe a dissimilibus separatio: rali itaque mechanica glandularum structura, & tali specifico motuum artificio una cum specifica liquoris saturatione, cæteræ quacunque glandulæ suos sibi consimiles succos a dissimilibus apte separare possunt, ut per excretorios postea ductus alibi deiciantur juxta naturæ recte operantis determinationem: Itaque ex his mirum esset inspicere ordinem ac methodum, qua hexagonæ glandularum hepaticarum areæ proportionali suarum fibrarum motu succos separandos homologue urgent: Cum enim latus seu fibra unius glandulæ hexagonæ sit proportionalis lateri seu fibræ alterius glandulæ hexagonæ, & motus unius lateris sit motui alterius lateris proportionalis, erit latus unius glandulæ ad latus alterius glandulæ, ut motus unius ad motum alterius; quare ex geometricis erunt omnia latera unius glandulæ in statu naturali ad omnia latera alterius glandulæ hexagonæ, ut totus motus unius glandulæ ad totum motum alterius, & permutando erunt omnia latera unius glandulæ ad totum motum hujus, ut omnia latera alterius glandulæ ad totum motum istius; quare omnes motus glandularum simul sumpti erunt omnibus lateribus simul sumptis eorundem proportionales: cum autem ex hisce motibus homologis glandularum fiant impulsus homologi corporum contentorum, propterea etiam impulsus simul sumpti utriusque glandulæ contra contenta corpora erunt inter se pariter proportionales, & consequenter homogenea corpora supra plana homologa excipiendi semper, aut fere semper impulsus similes, aut æquales proportionali quoque methodo, ac ordine a cæteris dissimilibus excipientibus supra plana dissimilia impulsus, seu percussiones quoque dissimiles separati coacta erunt, ut tandem aliquando per sua excretoria vascula extra glandulas ejiciantur; Cystici itaque canales in data ratione separatos succos excipient, & partim in cystum felleam, partim per chledochum ductum proportionaliter deponentur; quod autem de duabus hepaticis glandulis dictum est, proportionaliter de omnibus dicendum erit, quare si glandulæ ab hac lege homologa motuum similibus recedant, facile erit arguere hujusmodi glandulas succis diversæ indolis nimium saturatas esse: quoties enim spatium unius glandulæ repletum fuerit fluidis diversæ indolis, aut quantitate peccantibus, necessario etiam horum momenta ac vires cogentur esse diversæ; cum enim fluida contenta diversa momentorum ratione resistant motibus glandularum continentium, certe cogentur quoque continentes glandulæ, non simili (ut in naturali opere separationis fieri debet,) sed dissimili motu moveri; quamobrem fluida numero & genere heterogenea vitiosa methodo ac inæquali lege ac ordine irregulari separabuntur: Ex his non uno vulnere natura lædatur; enimvero tot succi diversæ indolis, postea in duodenum effusi separationi corporum utilium ab inutilibus, præcipitationi & exaltationi, nec non depurationi chyli, quibus peculiariter biliosæ particulæ destinantur, male inservient; verum ex tam impura bile sordescet chy-

lus, & plurium februm basis massam sanguinis gravitumulto everteret; imo hujusmodi bilis cum pancreatico succo copulata vitiose mota horripilationes & febriles rigores larga manu educet.

12. Neque quis credat, glandularum angustiam impedimento esse, quo minus similia corpora homologis vibrationibus semper impulsu per unam, eandemque directionem eant, unamque partem glandulæ occupent; dissimilia vero per alias directiones tendant, aliasque partes teneant, eo quia quælibet glandula a natura tali methodo elaboranda fuerat, ut glandulare spatium esset proportionale quantitati fluidi excipiendi, vi cuius aptæ essent fluidorum massulæ libere ac quaquaversus motus suos exercere feliciter: Deinde quælibet fluida credi facile debent corpora infinite parva, aut saltem apta nata acquirendi dimensiones infinite parvas; & cum glandulæ membranis elaboratæ sint, quæ facile ad majores superficies extendi possunt, propterea quilibet particularum motus in glandulis naturaliter se habentibus commode exequi poterit, ut homogenea ab heterogeneis corporibus satis apte separari possint: Fateor quidem, massulas separatas non omnes ejusdem esse generis, sed aliquibus quoque dissimilibus particulis aliquantulum associari ac commisceri; aliquando enim similes aliquibus dissimilibus adeo fortiter alligatæ sunt, ut non tam cito ac facile a similibus se jungi omnino possint; verum cum dissimilia hujusmodi corpora numero ac momento similibus minora sint, ideo nullum evenire poterit impedimentum, vi cuius corpora debitis motibus non separentur, & separata foras non ejiciantur, quotiescunque tamen res cæteræ naturaliter se habuerint; tunc enim ruet totum opus glandularum recte separantium, si aut glandularum structura vitium fecerit, aut naturalis earum motus inepte mutetur, aut dissimilia corpora similibus unita numero, ac momento majora fuerint, quam par est; nam ex his lædentur naturales homogeneorum corporum directiones, & vitiosis motibus agitata corpora alte lædent, turbabuntque opportunam corporum separationem: Sic immortalis ille Malpighius in morbo hepate (pagin. mihi 217.) vigente cachexia glandulas in ampliorem superficiem extensas non hexagonas, sed quæ vesiculas æmularentur, refert observasse; ex hujusmodi enim vitio colligendum facile est, heterogenea corpora numero majora homogeneis extitisse, unde metastasi obstructum viscus facile est credere, ex nimis impura bile prima hydropis semina posuisse: Non mirabor itaque amplius tot mala observaturus, quæ ab obstructis visceribus pullulant, etenim obstructa corpora naturalem glandularum figuram, & earum motum necessario invertunt; quotiescunque enim vitio sanguinis extraneæ particulæ taliter uniantur, ut crescant in ratione composita basium & altitudinum, ita ut moles particularum majores fiant luminibus canalium fecernentium, opus tunc est contentas particulas hexagonas glandularum spatia in hepate dilatare, majores idcirco fiant anguli & latera inæqualiter quoque elongata juxta inæquales, ac dissimiles contentorum corporum superficies cogent fibras omnes a naturali ordine ac structura recedere, succedit propterea motus & elastica vibratio a naturali dissimilis, unde inepta fiet corporum directio & separatio; quin imo aliquando fiet nulla: Glandulæ siquidem tantis præternaturalibus corporibus aliquando adeo implentur, ut sæpissime sint coactæ motum tonicum pati; immobiles idcirco contenta corpora nullatenus urgent, tumores ac scirrhus gravi viscerum pondere parituræ; ex his biliosæ particulæ non apte per cysticos canales separatæ; imo a venis ibi finitimis plusquam deceat reassumptæ enormes aliquando icteritias facile afferent; hæc & alia hujus farinæ mala inauspicato contingent a vitio motu separationis.

13. A pressione motu resoluta corpora in arteriis, & debitis motibus depurata, postmodum in glandulis juxta naturæ exigentiam mechanice utilia ab inutilibus separata, eam paritatem ac perfectionem inveniunt, ut motu quodam assimilationis partibus nutriendis facillime adaptentur. Nutritio itaque, cum sit præcipuum naturæ opus, quo animal sustinetur & vivit: cumque a peculiari quodam motu habeatur, quo corpora per massam sanguinis decurrentia, cum sibi acquirant locum singulis partibus accommodatum; propterea necesse est de hoc quoque motu, (quem assimilationis dicimus) verba facere, ut præcipua opera ad motum sanguinis pertinentia evolvantur, quæ ad sanitatem & ad morbum producendum, aut dignoscendum pertinere videantur. Itaque de his acturus notum est, quod *Nutritio Animalium nil aliud esse videtur, quam motus particularum, ad eum locum delatarum, quo reparantur, seu restituuntur particule secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem æquales, aut similes illis, quæ motu transpirationis continuo deperduntur.* Morimur siquidem quotidie omnes, rursus continuo aere & cibo reviviscimus; certum enim est, quod aut læsione partium, aut violento motu, aut transpiratione continua corruunt, & effluunt e corpore animalium particule, quæ solida & fluida componebant; provida ideo natura consuluit animalia quælibet aere, & cibis continuo indigere, ut jacturas suas assidua reparatione redimerent; cum autem in aere & cibis varii generis corpora diversæ figuræ, molis, ponderis claudantur, & massa sanguinis ex aere & cibis continuo reparetur, opus est massam quoque sanguinis cuiusque generis corpora continere; putaverim itaque, nutritionis materiam totam a massa sanguinis esse accipiendam; licet enim nonnulli succum nerveum, nonnulli serum, aut alios fortasse humores ament pro nutritionis materia: nihilominus cum serum & succus nerveus, cæterique humores a massa sanguinis separentur, probabilius crediderim totam nutritionis materiam massæ sanguineæ universaliter esse tribuendam; Universaliter itaque nutrit massa sanguinis, specificæ autem nutrit succus nerveus, cæterique humores specificam nutritionem ferunt, quotiescunque in sero, aut succo nerveo, cæterisque humoribus extiterint particule nutriendis partibus aptæ, opportuneque homologæ: Quamobrem ex his probabile est, non a solo specifico humore totum nutritionis opus moliri, sed a singulis quibuscunque humoribus, quoties singuli habuerint homogeneas particulas specificas & homogeneis partibus accommodandas: hac ratione optime innoscit, cur tot partes natura indole, & substantia diversæ, singulæ tamen juxta suum genus atque temperiem opportuno tempore, aptisque succis nutrantur & crescant; Verum ex imperfecto motu pressione, resolutionis & depurationis corporum inepta fit quoque nutritio animalium; etenim male resoluta, commixta & male separata, & depurata corpora ægre expolita fiunt, rudes idcirco, & crudæ particulæ salium,

Motus Assimilationis.

lium, cum impuro nimisque aspero, aut crudo sulfure missionis æquitatem vitiantes male nutriendis partibus sese accommodant, & male asperis superficiebus aptatæ aut nutritionem minuunt, aut perdunt; Itaque cum tot, ac tanta corpora diversæ gravitatis, molis ac figuræ in massa sanguinis quaquaversus debeant excurrere, ut facile, ac prompte nutritionem exerceant, manifesta est ratio, cur natura concesserit ex Boilei observationibus massæ sanguinis tantam feri copiam, quæ triplo contenta corpora simul sumpta superet; cum enim in sero quæcunque corpora debeant libere innatare, facileque quaquaversus moveri, ac fluere, opus fuerat massam sanguinis tanto sero dotandam esse.

14. Ibi itaque nutritionis rem acturo placeat mihi animadvertere, nutritionis opus non festinanter a natura exequi, sed lento pede, ac determinato tempore particulas nutriendis partibus adaptari; opus est itaque in tam celebri opere fluida placido, leni, lentoque pede moveri; verum si fluidum celeri nimis, aut violento motu volvatur, tunc innatantes particulae non eum ordinem, ac rationem situs, nec quærere possunt, nec obtinere, sed confusa, ac promiscua methodo agitatae varios situs excurrent, quamobrem cum particulae nimis impulsæ non possint opportuno tempore nutriendis partibus commode ac facile adaptari, fas est a fluido nimis agitato nutritionem impediri; sic experimur, in febribus ex fluidis celeri nimis motu revolutis omnes imminuta nutritione macrescere. Ut ergo nutritionis opus naturali methodo exequi possit, duo præcipue necessaria sunt; lentus nempe, lenis, placidusque motus, & apta corporum seu succorum puritas & congruentia; cum autem motus lenis ac placidus in minimis tantummodo canalibus cujuscunque generis haberi facilius possit, in quibus minimo motu tantummodo moventur fluida, proculdubio colligi potest, præcipuum nutritionis opus in minimis canalibus esse exequendum: Pro minimis autem canalibus non solum intelligenda puto vasa minima sanguinem, cæterosque humores deferentia, verum etiam carniū & membranarum fistulas, sinus, ossium foramina & quascunque alias partium vias, per quas fluidi qualiscunque portio possit opportune penetrare; plerisque enim Philosophis & Anatomicis notum est, animalis machinam ex minimis, minutisque canalibus esse elaboratam; quamobrem cum sui generis fluida naturaliter se habentia debeant per tot canaliculos quaquaversus effluere, credi potest, universam animalis machinam suis proportionaliter fluidis statuto tempore nutritione fore reparandam; hujusmodi enim canales aut minimi sinus cum minima quoque vibratione elastica peristaltice moveantur, fluida quoque contenta leniter ac placide urgent; sicque in tam lento ac placido motu notabiliter non turbatur ordo ac situs corporum in sero innatantium, unde facile sufficiens corporum homologorum adaptatio, nutritio nempe compleatur. Quod vero ad secundum pertinet, cum quolibet animal peculiari & specifico humore donetur, quo juxta suam temperiem nutriatur & vivat, necesse erit, hujusmodi succi indolem tali puritate & homogeneis ac sibi proportionalibus fluidis esse donandam, ut ab heterogeneis & dissimilibus opportune priveretur; sic tota viscera humores depurantia natura providit, ut depurata fluida juxta peculiaris temperaturæ exigentiam singulis animalium operibus nutritioni præcise inservirent, ut enim unio optima fiat, debet adesse similitudo & proportio & aliqualis æqualitas corporum figurarum cum similitudine & aliquali æqualitate partis, cui talia specifica corpora aptanda sunt; cum enim in similia & æqualia, aut quasi æqualia corporum unione centrum gravitatis coincidat plerumque cum centro magnitudinis; quotiescunque hæc determinata corporum cum parte, aut loco nutriendi proportio fuerit, unio & adhæsiō facile fient, & consequenter opportuna & firma nutritio; verum si plana corporum dissimilia, dissimilibus planis aut loculis adhæreant, nunc cum centrum gravitatis corporum dissimilium longe absit, nec coherere possit cum centro magnitudinis eorundem; tunc non debita adaptatio seu nutritio fiet, aut facta parum aut ægre erit duratura. Celeberrimus Verheyen nutritionem examinaturus similitudini materiæ unicuique parti adaptandæ assentitur; inquit enim (a) *Generalis materia nutritionis & accretionis est massa sanguinis secundum varias sui partes, non vero tantum aliquis humor simplex & homogeneus; siquidem plurimæ corporis partes, ut sunt os, nervus, membrana, caro &c. inter se consideratæ plurimum differunt quoad substantiam, sed unaquæque pars nutritur & accrescit per materiam sibi aliquatenus conformem.* Inferius vero addit: *non diffuciliter concipitur, in ipsa massa sanguinea contineri multas admodum discrepantes particulas, quarum alie huic, alie isti, alie aliis sunt conformes, & proportionatæ.* Ulterius huic operi perfectæ unionis necessaria est quoque æquabilis aeris externi pressio, qua particulae omnes æquabiliter compressæ suo in loco, suæque naturali superficie circumscriptæ detineantur; deinde necessaria est naturalis sulfuris existentia: ramositatem enim sua plana planis, & plana locis nutriendis veluti a calce ferruminantur; Sic patet in Chymicis, ex tam determinata miscela aquæ, salium, talisque sulfuris cum terreis particulis efformari compositum, calcis aut bituminis in modum, unioni partium aptissimum; quamobrem ex sulfuris balsamici defectu in hecticis nutritio penitus corrumpitur, eo quia in hac massa sanguinis salia supra modum luxuriant muratica & acria, quibus aspera & angularis inest superficies, quæ circa proprium axem rotando angulorum & planorum inæqualitate ac asperitate partes erodunt ac rumpunt, quibus applicantur; impedita ulterius debita corporum adaptatione & earundem opportuna coordinatione: Inde plurima mala ex imperfecta aut vitata nutritione contingent: Ibi denique placet animadvertere, quod si hujusmodi particulae motu assimilationis partibus adaptentur ea ratione quantitatis ac ponderis, ut nutriendis solummodo partibus apte sufficiant, tunc solum nutritur animal; cæterum si præter exigentiam nutritionis ultro succrescant, & dato tempore animalia ad majorem molē secundum trinam dimensionem longitudinis, latitudinis & profunditatis naturaliter extensa sint, oleosis præcipue ac felicioribus succis opportune pinguescent. Et hæc satis de præcipuis naturæ moribus, quibus massa sanguinis motu pressiois seu impulsus agitur, separat pura ab impuris, & nutrit animalia quælibet, a quibus præcipua animalis æconomiae phænomena sive bona, sive mala erui facile possunt & potuerunt,

(a) Cap. de nutritione pag. 219. 220.

Hydraulicas machinas observaturus alte semper miratus sum, quonam opere aut sursum elevata fluida, aut quaquaversus effusa certis legibus ambulent; quibus aqua methodo distributa, & directioni canalium & artificum magisterio obediant; aqua etenim cum naturali aeris superincumbentis pressione ad pedes 32. circiter elevari consuecat; machinæ tamen hydraulicae beneficio naturales ultro superat altitudines, ibique data lege, datoque tempore ac loco vagantur; plura itaque admiranda Hydraulicae artes docuere, majora tamen natura amplexa est de mirandis naturæ operibus ultro sollicita, quotiescunque vi cordis prima moventur fluida, animalibus motum & velut animam donatura: cor itaque primum animæ corporeæ visibile opus illud est, quod hydraulicae machinæ ad instar urget sanguinem ordinato impetu, ut per universas animalis latebras quaquaversus sursum, deorsumque decurrat: ostendit Anatomæ, cor, ventriculosque ipsos conica figura donari; quem figuræ ordinem ex triplici fibrarum genere natura fabrefecit, quarum aliæ rectæ sunt, circulares aliæ, spirales rectæ; cum autem rectæ eo officio destinatae sint, ut cor, ventriculosque ipsos aliquantulum contrahant: circulares vero fortiter stringant: spirales autem valide torqueant; credendum putaverim momentum virtutis motivæ cordis, simpliciter & secundum se consideratum, nullo habito respectu ad nifum contenti sanguinis, facile accedere posse ad rationem compositam ex triplici motu eodem tempore exercito & numero earundem; verum cum hoc jussu assequi arduum sit, propterea celeberrimus Joannes Alphonsus Borellus, quamvis magnus Geometra prop. 66. secundi Tom. de Motu animalium, momentum cordis investigaturus analogico ratiocinio usus est, & cum duobus musculis, temporali nempe & mæsteterio mandibulas stringentibus comparavit; Quamobrem prop. 67. vim motivam fibrarum cordis per se comparatam majus pondus suspendere posse, quam 3000. librarum; probabili satis conjectura docuerit; ex quibus singulæ illa momenta investigari poterunt, quæ utrique ventriculo sigillatim pertinere videbuntur: Ab hoc tamen calculo multum dissentit celeberrimus Jacobus Keillius, verum Doctissimus Michelotto, ut infirmatæ Borelli sententiæ, quantum possibile est, tutor esset, calculum ipsum a Keillio exaratum, a vero alienum esse apte ostendit; inquit itaque (115. de separ. fluid. in corpore animali.) *Venio ad calculum, quo idem præstantissimus Scriptor (Jacobum Keillium intelligit) Jo: Alphonsum Borellum, jam olim vim absolutam cordis definire conatum, confutaturus sancit, eandem istam vim æqualem esse octo onciarum pondus: Ne ista quidem Keilliana supputatio, etiam si firmo niteretur fundamento, vim absolutam cordis determinaret, hoc est, vis per ejuscemodi calculum inventa non foret illa, qua totum cor contrahitur, sed tantum ejus pars, quæ respondet orificio Aortæ, utpote quam vim æqualem statuit laudatus Vir ponderi cylindri sanguinei, cujus basis æquatur orificio Aortæ, & altitudo dupla illius, ex qua cadere deberet grave, ut acquirat velocitatem sanguinis ex corde in Aortam expulsi, si nullam resistentiā superandam haberet. Quamobrem si vim totam cordis computare vellemus, oporteret octo unciarum pondus toties sumere, quoties interior cordis superficies, seu potius ventriculi sinistri superat orificium Aortæ: superet si vis decies, ita ut decem Aortæ orificia occupare spatium æquale superficiei interiori sinistri cordis ventriculi, dico secundum præclarissimi Keillii principium supra memoratum, non octo, sed octoginta unciarum pondus æquare vim cordis totalem seu absolutam.* Quamobrem ex his mihi visum est nil certi de momento seu vi totali cordis determinari posse, quippe præter ea laudato Michelotto exposita (pag. 114.) diversa hominum ætas, temperies sanguinis, qualitas sexus, & ratio texturæ diversa fibrarum cordis, & plurima alia absolutam vim cordis facile mutare possunt; idcirco contentus doctissimorum virorum amica, & docta dissidia admirari, sequar conjecturas, quibus non totale momentum seu totalem vim cordis, sed utriusque ventriculi singulæ momenta, aut vires instituto meo necessarias, si non geometrica, physica saltem conjectura rimari mihi satis est: Cum itaque juxta tres fibrarum rectarum, circularium & spiraliū series, tam dexter ventriculus, quam sinister sigillatim triplici, simul motu moveantur, ut contentum sanguinem foras expellant; cumque ultro ex Clarissimo Verbegen (pag. 120. Anat.) Anatomica autopsia constet, sinistram cordis sinum fibris triplo multis supra dextrum & fortioribus armari; ita ut sinister triplo crassior sit dextro, qui triplo majoribus fibris opportune munitur; eumque fibræ musculares, nervæ & tendinosæ mechanica sint instrumenta motus, quibus cordis sinus continuo motu torquentur; cumque ulterius dextri ventriculi officium sit, per solos pulmones sanguinem ejaculari, sinistri vero supra & infra per totum corpus; facile ex his conjectandum est, ex triplo majori, fortiorque numero fibrarum sinistram cordis sinum investiente, una cum motibus ipsis proportionalibus, vim motivam seu momentum sinistri momento dextri multo majus esse.

16. Licet autem ventriculus dexter momento seu vi motiva debilior sit, quam sinister; nihilominus ratio & autopsia suadere videntur, æqualem quantitatem sanguinis contineri in dextro, & a dextro expelli per arteriam pulmonarem in pulmones, ac continetur in sinistro, ut ab hoc expellatur per arteriam magnam in totum corpus; enim vero cum ventriculus sinister sanguinem recipiat a dextro, certe sinister majorem quantitatem excipere non potest, quam dexter primo exceperat; neque minorem excipere potest sinister, quam dexter amplexus sit: quippe si totus sanguis a dextro non ejacularetur per arteriam pulmonarem in sinistram, residuum in pulmonaribus vasculis remaneret non inani stagnationis ac suffocationis periculo: Quamobrem opus est naturæ bene se habentæ, sinistram ventriculum æqualem aut quasi æqualem excipere a dextro sanguinis quantitatem, qualem dexter exceperat a vena cava, ut plura incommoda effugiantur; inde spatium conicum, aut quasi conicum dextri ventriculi sanguine repletum, aut replendum, spatio conico, aut quasi conico sinistri æquale, aut quasi æquale jure merito credendum est: cum enim certo constet, basin dextri ventriculi majorem esse basi sinistri, & altitudinem seu longitudinem hujus majorem

jorem esse altitudine seu longitudine alterius; procul dubio bases ventriculorum facile erunt in ratione reciproca cum eorundem altitudinibus, & consequenter data tali ratione reciproca quantitas, ex geometricis, etiam spatia ventriculorum conica aut quasi conica futura erunt æqualia, aut quasi æqualem sanguinis quantitatem susceperunt: Hujusmodi autem spatia ventriculorum æqualia, aut quasi æqualia, quamvis celeberrimus Borellus (a) a tribus uncis sanguinis repleti suspicatus sit; nihilominus ab unica tantummodo sanguinis uncia repleti multo probabilius recentiores judicant Anatomici: ibi autem supposita sanguinis uncia, cum aliquando necesse sit inquirere proportionem gravitatis specificæ non sanguinis tantummodo, verum etiam feri sanguinei & aquæ communis, istorumque voluminum proportionem, ut inter se juxta rerum exigentiam comparentur, ex quorum comparatione momenta ac vires horum fluidorum facilius innotescant, quantum possibile est, ut mechanicæ morborum causæ habeantur, propterea hujusmodi fluidorum gravitates placuit experiri: Contigit itaque mihi ex sano, sed plethorico viro annorum 46. circiter gravi vertigine correpto necessitas emittendi sanguinem larga manu, ut a timendo apoplexiæ periculo liberaretur: licet autem specifica sanguinis humani gravitas difficillime erui possit, nihilominus Boylei methodum secutus (pag. mihî 278. partis secundæ Historiæ humani sanguinis) repetitis experimentis quæsito ponderi accedens pluries reperi.

Sanguinem humanum phiala inclusum ponderare grana 2853. 3. cum autem pondus phialæ fuerit granorum 976. quare ablato tali pondere simplex pondus sanguinis granorum 1886.

Serum autem sanguinis sub eodem volumine, utpote eadem phiala ad amissum contentum, ponderabat grana 2770. ablato autem pondere phialæ simplex pondus feri erat granorum 1803.

Aqua denique nostra communis eadem phiala inclusa sub eodem volumine ponderabat grana 2716. a quibus detracto phialæ pondere ponderabat grana 1749.

Cum autem, ex corollario 3. prop. 2. Lib. 1. Phororon. celeberrimi Viri semper laudandi Jacobi Hermani gravitates specificæ corporum consistant in proportionem ponderum absolutorum corporum eorundem sub voluminibus æqualibus; cumque hujusmodi singulorum fluidorum massæ idem phialæ spatium occupantes sub eodem volumine habeantur, erit *gravitas specifica sanguinis ad gravitatem specificam feri sanguinei, ut pondus granorum 1886. ad pondus 1803.*

Et gravitas specifica sanguinis ad gravitatem specificam aquæ nostræ Brixianæ erit granorum 1887. ad 1749.

Pariterque gravitas specifica feri sanguinei ad gravitatem specificam ejusdem aquæ Brixianæ erit granorum 1803. ad 1749.

Ex hisce colligendum quoque est, cum gravitates specificæ corporum sint densitatibus eorundem proportionales, massam sanguinis densiorem esse massa feri sub æquali volumine in ratione pariter 1886. ad 1803. simulque massam sanguinis sub æquali volumine cum aqua nostra communi densiorem esse eadem aqua communi in ratione 1886. ad 1749. pariterque massam feri sanguinei sub eodem volumine cum massa aquæ communis densiorem esse eadem aqua in ratione 1803. ad 1749. fateor quidem, ut Illmus Boyleus quoque animadvertit, horum liquorum pondera ac densitates juxta ætatis, sexus, temperaturæ & loci differentias aliquantulum inter se differre, nihilominus hac data hypothesi, qua aliqua proportio gravitatum in expositis liquoribus determinatur, facile juxta datas rationes accedere possumus ad alterius sanguinis, alterius feri aut alterius aquæ communis gravitates specificas & densitates reperiendas, ut inde momenta ac vires aliorum fluidorum proportionaliter assequi possimus.

17. Hisce præhabitis a ventriculo dextro expulsa sanguinis uncia pulmonarem arteriam ingreditur, quæ pericardium egressa per utroque pulmones diffeminatur; ibi autem mirari est, quantum æstimandum sic pulmo, cujus solius gratia ex duobus cordis sinubus unum, pro cæteris vero totius corporis partibus alterum tantummodo natura formavit; mirandum certe, cum ex ejus peculiari visceris opere celebre illud conjugium celebretur, quo solida cum fluidis, & cum solidis fluidisque, si non aerea, saltem luminosa & ætherea in sanguine copulantur: Ut autem motus sanguinis per pulmones examinetur, suspicari placeat (ut num. 3. dictum est) sicut a sinistro, ita pariter a dextro ventriculo fibrarum ope sanguinem motu pressionis impelli, eundemque pressionis motum sequi per universas pulmonares arterias, qui in venas pulmonares eadem lege traducatur: Exiens itaque sanguis a dextro cordis sinu pulmonarem arteriam ingreditur, & per hac brevi quidem spatio horizontali quasi pede procedit, ut autem ratio transitus sanguinis per arteriam innotescat, juvat rimari talis arteriæ diametrum, quæ ex pluribus observationibus juxta lineam GH reperta est, methodo autem lineæ circini proportionum divisa est linea GH in 14. partes æquales, ut ex his area quoque pulmonaris arteriæ innotescere facile possit; Sit itaque diameter GH (a) circuli quæsitum partium 14. — a; eritque quadratum diametri — aa partium 196. area ergo circuli quæsitæ supponatur — x: cum ratio quadrati ad circulum sit proxime ex Archimede de dimensione circuli ut 14. ad 11. fiatque 14. — b. 11. vero — c. erit analogismus ut b c :: a a x; eritque per 166. Euclidis æquatio b x — a a c; & dividendo per b, fiet æquatio x — $\frac{aac}{b}$, cum autem quadratum a a sit — 196; & c sit — 11; erit productum a a c — 2156; quod divisum per b — 14, erit $\frac{aac}{b}$ — pariter 154. proxime, seu juxta methodum decimalium — 153. 860. pro valore quæsitæ quantitatis x, quæ plane ostendit quantitatem areæ arteriæ pulmonaris e dextro sinu mox egressæ, cujus diameter erat linea GH; itaque uncia sanguinis a ventriculo expulsa, & per spatium repertæ sectionis rarefacta urgebit æqualiter singula latera arteriæ; hæc autem omni partē æquabiliter dilatata restituit sanguini in constrictione eandem quantitatem impetus; unde massa sanguinis per hujusmodi truncum pulmonaris arteriæ æquali aut quasi æquali semper pede decurrenda erit: Cum autem truncus arteriæ in duos peculiares ac præcipuos ramos dividatur, quorum unus in dextrum, alter vero in sinistrum pulmonem excurrat, vis impetus impressa sanguini utrique pulmone erit æquali ratione, aut quasi æquali tribuenda. Ibi autem aliquantisper stemus in anchoris observando motum sanguinis per truncum arteriæ pulmonaris; enim vero sæpe accidit prope ba-

sim arteriæ, per longitudinem trunci excrecentia poliposa carnis, aut eminentia tuberculi, quo casu sectio arteriæ imminuta transeunti sanguini resistantiam feret; Verum quia ibi resistantia polypii objecta sanguini non supponitur magna (mors enim brevi sequeretur,) sed ea tantummodo, quanta requiritur, ut polyposa materies resistantiam ferret sanguini fluenti, si materies ipsa polyposa in fluido ipso sanguineo ferretur; ideo cum resistantiæ corporum contra fluidum sint ut impressiones, seu ut percussiones fluidorum in objectum corpus, percussiones vero unius ejusdemque fluidi sint in duplicata ratione celeritatum ejusdem (b); suspicari jure potest resistantiam, quam affert talis polyposa materies sanguini fluenti unius, ejusdemque texturæ & indolis, accedere quoque posse ad talem rationem duplicatam velocitatis ejusdem sanguinis: Quod si massa sanguinis adeo impura, & heterogenea fuerit, ut portio sanguinis, quæ una systole expellitur, diversa sit ab illa quoad densitatem & velocitatem expulsa altera systole ventriculi cordis; tunc cum percussiones fluidorum diversæ texturæ & indolis contra objecta & resistantia corpora, sint in ratione composita ex rationibus duplicata velocitatem & simpla densitatem eorundem; etiam percussiones massæ sanguineæ, densitate & motu variæ, facile accedent ad talem rationem compositam ex duplicata velocitatem & simpla densitatem; & consequenter etiam resistantiæ objectæ sanguini a tali polyposa materia variæ fient, accedendo diversimode ad varias rationes compositas ex duplicata velocitatem & simpla densitatem. Itaque cum hujusmodi polyposa materies talibus rationibus probabiliter opponatur sanguini, communicata talibus rationibus resistantia, impedimentum feret proximis aut succedentibus quoque sanguinis particulis, & consequenter tota moles sanguinis ibi lentescere coacta erit; quamvis autem lentescens sanguis ultro progrediatur, nihilominus ex adepta tali lentescencia mole sua intumescit, urgetque necessario magis latera canalium ex ea parte, quæ vacat impedimento; minus vero urgentur latera illa, utpote solidiora, quibus impedimenta alte adhærent, a quibus major fit momento sanguinis resistantia. Cum itaque latera arteriarum magis dilatentur ex una parte, quam ex altera, erunt quoque motus restitutionis eorundem pariter inæquales; quare sanguinis non versus lineam axis, sed inclinata & transversa directione motus irruet, ubi major inæqualitas dilatati canalium minorem fecerat fluenti sanguini resistantiam; Hæc arteriæ portio magis extensa, cum a continuis sanguinis vibrationibus arietetur, tandem aliquando objectam membranam lædere poterit timendo aneurysmate. Ulterius sæpe docet praxis aliunde etiam hujusmodi morbum oriri potuisse; cum enim in unica sanguinis uncia a dextro ventriculo expulsa, ratio momenti sanguinis præternaturaliter moti talis aliquando sit, ac tanta, ut natura legem superet, tunc si canales inertein texturam aut fibrarum tenuem robur sortiti sint, coacti erunt cedere valido nisu sanguinis impellentis, & tandem aliquando cedente interiori tunica laxari ac rumpi; tale vitium in febribus evenire aliquando potest; etenim volumen sanguinis a dextro cordis sinu expulsum in statu naturali, & volumen ejusdem expulsum in statu præternaturali haberi possunt, ut solida similia, quæ inter se proportionem habent triplicatam laterum homologorum. Cum autem porositates seu interstitia voluminibus interspersa sint lateribus solidorum homologis proportionalia: latera vero solidorum sint in ratione subtriplicata eorundem, certe etiam pororum amplitudines seu particulatum sibi invicem proximarum distantia; erunt inter se in ratione subtriplicata voluminum sanguinis; Quamobrem cum in statu naturali impressio voluminis unius uncie sanguinis contra objectas canalium membranas sit facile viribus membranarum resistantium proportionalis, proculdubio vi præternaturalis exaltationis dilatatis ultro particularum distantis inter se, volumen talis uncie sanguinis augendos sese in ratione triplicata amplitudinum pororum seu distantiarum, quas habent particulæ sanguinis proximæ inter se, impressionem efficiet contra canalium membranas alia vires ac momenta membranarum resistantiam; quare tandem aliquando tot violentis ac continuis percussionibus flagellatæ membranæ rumpi coactæ erunt. Ulterius hujusmodi læsiones non parum augmentur, si prior unda sanguinis succedenti resistat plusquam decet, quo casu cum succedentis sanguinis impressio non consumatur tota contra priorem sanguinis undam, juxta directionem longitudinis canalium, opus est majori ratione impetum ferri ad latera, quo major est resistantia sanguinis antecedentis; quare dilatatis ultro arteriæ lateribus fiet aneurysmatis incrementum; præter hæc adeo aliquando vigent impedimenta, ut portio sanguinis gravi regressu irruens in valvulam, succedentem a dextro sinu motum sanguinis moleste impediatur gravi vitæ periculo; quin imo uncia sanguinis transversis præternaturalibus directionibus itura, quoties pervenerit, ubi truncus duos in ramos partitur, facile inæqualem sanguinis quantitatem per unum pulmonem afferet, inæqualemque per alterum, summo respirationis incommodo, ob inæqualia pulmonum pondera & manifestam pulsuum inæqualitatem.

18. Præterlapso itaque majori trunco fuit sanguis per utrumque pulmonem juxta duorum ramorum directiones, cum autem unus pulmo alteri æqualis, aut quasi æqualis naturaliter esse debeat, facile quantitas sanguinis expulsa in dextrum pulmonem probabiliter futura erit cæteris paribus æqualis, aut quasi æqualis quantitati sanguinis expulsa in sinistrum, & consequenter semiuncia sanguinis per unum, & semiuncia per alterum ferenda erit; pariter si vis impetus dextri ventriculi eadem sit, quæ semiunciam sanguinis per unum, & semiunciam per alterum pulmonem æquali semper momento impellat, erit spatium decursum a semiuncia sanguinis per ramum arteriæ pulmonaris in uno pulmone æquale cæteris partibus spatio decurso a semiuncia sanguinis per ramum arteriæ pulmonaris in altero pulmone, quapropter ex immortalis Galilæi demonstratis de motu æquabili, duæ semiuncie sanguinis eodem impetu cordis impulsæ decurrent cæteris paribus spatia quoque æqualia inter se; & consequenter, cum quantitates motus aut impetus fluidorum habeant (c) rationem compositam ex duplicato velocitatem, simpla densitatem & simpla foraminum, e quibus erumpunt, certe cum duæ semiuncie sanguinis sint æquales, & velocitates ipsis impressæ ab eodem momento dextri cordis sinus sint pariter inter se in ratione æqualitatis, foramina vero vasorum unius pulmonis supponantur naturaliter æqualia, aut quasi æqualia foraminibus vasorum alte-

(a) Coroll. prop. 68. secundi Tomi de motu Animalium.

(b) Ex corollar. prop. 42. Phoron. Herman.
(c) Per prop. 31. Hermannii Phoron.

alterius pulmonis; etiam quantitates motus seu impetus unius semiunciae sanguinis aequales futurae erunt quantitati motus alterius semiunciae sanguinis; quare etiam ascensus & descensus sanguinis transeuntis per foramina in uno aequalis probabiliter erit, cæteris paribus, ascensui & descensui sanguinis transeuntis per foramina aequalia in altero pulmone; & consequenter peripheria unius pulmonis decurratur per arterias pulmonares, ac peripheria alterius pulmonis per arterias sibi homologas: quapropter ab arteriis, in paritate circumstantiarum, aequalis aut quasi aequalis quantitas sanguinis in venarum pulmonarium orificia effundetur, & ab iis in finistrum ventriculum, aequali aut quasi aequali ratione deferenda erit. Verum si fluidi vitio (ut in pleuritide & peripneumonia ægre curatis cæterisque generibus morborum pectoris sæpe experimur) major quantitas sanguinis per unum pulmonem, minor vero per alterum excurrat, tunc cæteris paribus quantitas motus in uno, major erit quantitate motus in altero; sicque cum rationes compositæ ex duplicata velocitatum, simpla densitatum & simpla foraminum, e quibus erumpunt, multum inter se differant, gravior pulmo & fluidis ponderosior motum diaphragmatis ob costas ex ea parte minus elevatas quodammodo impediens, inspiratio fiet imminuta, & alto lateris pondere laboriosa respiratio. Ulterius sæpe ostendit Anatome unum aliquando pulmonem costas plus justo alligari, alterum vero non ita; quamobrem cum alligatus pulmo non possit ea libertate moveri, ac dilatari, qua alter solutus ac liber; manifestum est, in alligato pulmone impetum impressum sanguini refrangi debuisse, & quantitate sanguinis non æquabili velocitate deferri; sic majus necessario in organo pondus cum inæquali ac difficili respirazione & graviori decubitu, hominem lædet; pariter quotiescunque pleuritis aut peripneumonia contingunt, pars pulmonis inflammata moram facit sanguini transeunti; sic tantum adest impedimentum sanguini advenienti, quantum antecedens in sanguine est in parte inflammata; sic cum non perseveret ea ratio æquilibrii inter motum sanguinis antecedentis, & motum subsequens, oportet sanguinem ratione motus, quantitatis, momenti & temporis a statu naturali & ratione æquabilitatis recedere; unde inæqualitates pulsum, intermittentiæ & palpitationes sæpissime eveniunt.

19. In hoc motu sanguinis per ramos arteriarum pulmonaris, pater observante Diemerbroekio (pag. mihi 412.) hujusmodi ramos, per totam vesicularum substantiam instar artificiosissimi retis una cum vena pulmonari decurrere mutuis inter se anastomosis. Hoc ipsum primo observaverat immortalis Malpighius; epistola enim secunda de pulmonibus asserit: *Tanta est horum vasculorum divaricatio, dum hinc inde a vena & arteria prodeunt, ut non amplius vasis ordo servetur, sed rete conflatum ex duorum vasorum productionibus appareat.* Quamquam autem ratione hoc a natura factum sit, licebit nobis conjectari impostum: Interim observandum est, pulmonarem substantiam jugulum versus angustius esse, versus vero costas spurias extensius & ampliorem; verum cum tam angusta portio, quam extensa suis proportionaliter vasis donetur, colligi potest, vasorum quoque ramificationes cæteris paribus pauciores esse versus partem superiorem, numero vero majores versus inferiorem; & sane cum thoracis portio versus costas spurias majori circumscribatur superficie, portio vero thoracis versus jugulum a minori superficie dimetiatur; fas est quoque, contentum pulmonem versus costas spurias majoris esse superficie, minoris vero jugulum versus: cum autem pulmonum vesiculæ undequaque, tam sursum, quam deorsum effusæ sint, suspicandum est, majorem amplitudinem pulmonaris substantiæ versus partes inferiores oriri, & a quantitate majore vesicularum, & a majori ramificatione ac peripheria vasorum; huic animadversioni favet Archibaldus Pitcairius, (a) assumit enim pectus tanquam sphæroidem, cujus minor diameter sit digitorum 15. major vero digitorum 20.; cum autem sphæroidis a minori diametro ascendendo versus majorem axem semper proportionaliter decreseat, colligendum putavi, capacitatem pectoris, (juxta supposita a celeberrimo Auctore) versus jugulum, in quo desinit major axis, esse angustius, versus vero costas spurias, in quibus desinit minor axis, esse ampliorem; quapropter jure haberi potest, amplitudinem pulmonum versus costas spurias majorem esse illa, quæ versus jugulum elevatur; major itaque vasorum & vesicularum numerus ac peripheria inferiorem pulmonum partem, minor vero superiorem ambit; hinc elevatio thoracis sensibilibior in inferiori, in superiori vero jugulum versus debiliior ac tenuior reperitur; Hinc gravi actione angitur animal, quoties in hepatide pondus hepatis inflammati diaphragma & finitimas costarum appendices trahit inferius; costæ siquidem & diaphragma tenuissimo motu elevata, minusque quam par est, spatium ventant, quod pulmonares vesiculæ inferiores ad majores superficies extendantur, ut necessaria libertate moveantur, opportunum aerem suscepturæ; quapropter dimidiata respiratio & altus angor pectus opprimunt.

20. Fluit itaque sanguis sursum & deorsum ex utraque pulmonum parte, & a majoribus ramis traducitur in minores, minimasque ramificationes, usque dum minimi arteriarum rami facta cum minimis venarum luminibus deosculatione sanguis ab arteriis facillime in venas affluat; Huic autem motui ab arteriis in venas, non tantum auxilio est momentum cordis sanguinem impellentis, verum etiam clarum est, quod dilatato thorace sequatur statim oblatio resistentiæ, quam depressæ costæ & laxatum diaphragma contra superficiem extimam pulmonum exercent; ideoque cum ad fauces præsto sit aer, vel suo pondere, vel elaterio potens ingredi, quotiescunque auferuntur resistentiæ, sequitur, aerem tota vi irruere in pulmones, eosque quantum potest aperire: præterea constat ex Anatome, intra aeres reticulares vasorum, & circum vasa ipsa sanguifera adesse bronchiorum vesiculas, quæ sphæricam quasi superficiem æmulantur aere inspirato: cum enim pulmo debuerit esse viscus aeri excipiendo destinatum, certe opus fuerat, naturam vesiculis quasi sphæricis uti debuisse, ut aerem majori quantitate exciperet; cum enim sphæra sit quibuscunque figuris isoperimetris capacior, etiam vesiculæ quasi sphæricæ proportionaliter multum aeris supra ceteras figuras sibi isoperimétras erunt suscepturæ; sic in phthisi & hydrope pulmonum laxatis nimium ac flaccidis pulmonaribus vesiculis difficultas respirationis & gravis anhelitus fiunt, eo quia flaccescentes nimium vesiculæ, a quasi sphærica figura, ad quasi sphæroidem transeunt; cum autem hæc sphæroidis talis sphære isoperimétrica mi-

nus capax sit, ut inferius constabit, ideo nimium laxatæ vesiculæ quasi sphæricæ pulmonum, & quasi sphæroideam figuram adeptæ minus aeris excipient, quam par est, unde tot incommoda evenient vitio respirationis; Ulterius pulmo debuerat esse viscus leve & facile mobile, quare quasi sphæricis vesiculis dotari debuerat; etenim cum sphærica corpora in punctis se tangant, etiam vesiculæ quasi sphæricæ punctualem quodammodo contactum servaturæ erunt inter se; quare interstitia & areas quamplurimas necessario relinquent, a quibus facile levitas major corporis exoriri potest, quæ certe non haberetur, si corpora illa vesicularia sub alia figura in planis se tangerent, a quibus cum multo pauciores aræ & interstitia relinquantur, certe in tam majori planorum adhæensione, & consequenter in tam minori interstitiorum numero gravitas & pondus visceris supra modum augetur; & sane grave esset experiri molestiam respirationis, quoties nerveum illud ligamentum a Malpighio detectum (b) vesicularum parietibus alligatum convulsivo motu crisparetur; sic enim vesiculæ relicta superficie quasi sphærica non amplius in punctis, sed quodammodo mutata figura in planis cognunt se tangere, factum inde, ut minus aeris excipiant & minora fiant interstitia vesicularum, unde visceris pondus gravius feret fastidium respirationis.

21. Cum itaque pulmo & naturali, & sæpe præternaturali motu moveatur, quo pulmonares vesiculæ figuram quasi sphæricam facile invertunt, sphæroideam quasi superficiem quodammodo acquirentes, non ineptum erit utriusque capacitates, quantum fieri potest, dimetiri, ut quantitas aeris in quasi sphærica, & quantitas ejusdem in quasi sphæroidali vesicula proxime innotescant, ut pulmonarium morborum natura, quantum possibile est, aperiatur; placeat itaque supponere vesiculam quasi sphæricam ABCD (a) cujus diamet- (a) ter AB sit partium minimarum 6. certum est ex geometricis usu decimalium, hujusmodi sphæram ABCD esse proxime partium minimarum cubicarum 1130976. modo supponatur, eandem quasi sphæricam vesiculam, aut convulsione, aut morbofa laxitate, taliter deprimi, aut contrahi, aut laxari, ut diameter AB partium minimarum 6, reducatür in diametrum FG. (b) partium minimarum 4. certum est ea ratione, qua partes oppositæ diametri AB in hujusmodi sphæra ABCD invicem accedunt sub minori diametro partium minimarum 4. reliquas partes oppositas C & D æquali ratione a se invicem recedere, quare diameter EH (b) fiet partium minimarum (b) 8. sic quasi sphærica vesicula ABCD in quasi sphæroidem FEHG converfa erit ex geometricis proxime partium minimarum cubicarum 67. 0208. cum autem contenta corpora sint cæteris paribus in ratione corporum continentium, palam est in vesicula quasi sphærica contentas partes minimas cubicas aeris, esse proxime ad partes minimas cubicas aeris contentas in vesicula quasi sphæroidali sphære quasi isoperimétrica, in ratione numerorum decimalium 113. 0976 ad 67. 0208; quare talis sphæroidis continens, minus continebit particularum aeris, quam hujusmodi sphæra defectu partium minimarum cubicarum 46. 0768. proxime; Quamobrem cum defectus & vitium unius vesiculæ quasi sphæricæ transeuntis in quasi sphæroidem, omnibus vesiculis pulmonum convenire aliquando possit, quis non videt quantum aeris detrahendum sit, quoties universa pulmonum regio, aut convulsione contracta, aut pressione depressa, aut flacciditate laxata, ut in hæcticis, & hæmoptoicis, tam gravi defectu laboraverit? Quamobrem cum opportunis naturæ operibus ea quantitas aeris necessaria fuerit, quæ a quasi sphæricis vesiculis contineri debuerat, manifestum est, a sola quantitate aeris in quasi sphæroidis vesiculis collecta naturam necessario pati, & gravi asthmate facile deficere debuisse. Hisce expositis, liceat tantillum superfedere nonnulla prius exposituro actionibus pulmonarium vesicularum necessaria; etenim quoniam pulmo viscus est, quo aer inspirando excipitur, & expirando expellitur, & cum ab aeris momento, tam sanitas, quam morbus foveri facile possint, opportunum est ibi nonnulla de viribus elastici aeris in pulmones conjectari, ut juxta nostrum institutum morborum pulmonarium semina inquirantur. De elasticitate seu viribus aeris & resistentia, summi viri toto orbe celeberrimi, Isaacus Newtonus, & Guillelmus Leibnizius mira docuerunt; postea vero Jacobus Hermannus immortalis semper laude decorandus, alique doctissimi Viri, inter quos summi nominis vir Joannes Polenus, cui multum debeo, majora de viribus aeris experti sunt; Inde Michelottus toties laudatus tantorum virorum sententias secutus refert (pag. 148. de separatione fluid. in corpore Animalis;) aerem esse fluidum grave atque elasticum, quod comprimere potest in spatia, quæ ponderibus comprimentibus proportionem respondent: ideoque talis natura, ut ejus densitates viribus comprimentibus, seu elasticitatibus quamproxime proportionales existant; Addit autem quamproxime, eo quia summi & incomparabiles viri Jacobus Bernollius, de gravitate aeris; & Joannes pariter Bernollius, de motu muscutorum pag. mihi 23. analytice ostendunt, densitates aeris esse quidem elasticitatibus proportionales in aere tamen parum denso; cæterum in aere multum denso elasticitates in majori ratione crescere, quam densitates. Inspirato itaque aere per tracheæ fistulas elevantur costæ, diaphragma deprimitur, & pectoris cavum necessario ampliat; sic quæcunque vesiculæ pulmonares amplexu aeris quasi sphæricæ turgescunt; portio itaque aeris, quæ inferiorem pulmonum partem occupat, cum necessario pressionem aeris superiores partes occupantis successivo vesicularum dilatatarum continentium contactu quodammodo pati conetur, inferior aeris quantitas superiori proculdubio aliquantulum densior fiet; quamobrem cum densitates sint elasticitatibus aeris quamproxime homologæ, cumque vesicularum inferiorum numerus multo major sit numero superiorum, (ut n. 19. innuimus) certe vis aeris inferiores vesiculas occupantis multo major erit vi illius, qui in superioribus vesiculis jugulum versus continetur; quare facile crederem, initium expirationis juvari non parum a vi aeris inferioris magis densi ac compressi, & consequenter magis elastici superiores vesiculas urgentis; etenim hujusmodi ratio aeris inferioris, cum ulterius, pulmonibus naturaliter se habentibus, pressionem pati non possit a superiori superincumbente ac supranitente, nec ultro densior fieri debeat, opus est, inferiorem magis compressum urgere debuisse superiorem aerem, ea videlicet ratione, qua prius superior inferiorem compresserat; cum autem superior aer, prout minus densus, & ratione pauciorum vesicularum quantitate minor sit, minore propterea feret refi-

(a) Dissertatione de causis, quibus fluit sanguis per pulmones.

(b) Epistola prima de Pulmon. ad Boetium.

resistentiam actioni & viribus majoribus elasticis aeris inferioris, idcirco inferior aer valide urgendo, magisque dilatando contingentes vesiculas, & ab his communicato proximis tangentibus & superioribus vesiculis successivo contactu, superior aer ab inferiori valido nisu per bronchiorum foramina versus asperam arteriam aperta foras expelli debet, ut tandem aliquando inferior quoque aeris portio completa expiratione successive eliminetur; sic tali methodo aeris operantis, inspiratio, & exspiratio reciproca & naturali motu exercentur; Verum si viribus aeris inferioris superiorem valide urgentis opponatur materia quædam lymphatica, aut alterius generis e glandulis tracheæ decidens, quæ bronchiorum foramina obstruat, tunc cum exitus aeris superioris expellendi ab elastica vibratione inferioris ægre fieri possit, resistentiam feret impulsui inferioris; quapropter oppositis viribus corporum contraoperantium grave asthma fiet, aliquando hæmoptysis, aliquando vero retardato motu sanguinis pulmonum inflammatio.

22. In hac re quærens actionem & momentum expirationis, alte miratus sum legens ex supputationibus Bernollianis a Clarissimo Michelotto relatis dilucideque explicatis, actionem & momentum fortissimæ expirationis, qua aer non solum ratione suæ elasticitatis, verum etiam opere musculorum thoracis & diaphragmatis per laryngem expellitur, tam magni momenti esse, ut colligat Celeberrimus Auctor; *Velocitatem aeris fortissimo spiritu per laryngem expulsi absolvere posse eodem illo tempore unius minuti secundi pedes 390. id est 400. pedes, id quod ita intelligi velit, nimirum aerem ex ore impulsam, nisi statim dissiparetur, sed uniformi cum velocitate, quam primo instanti habet, pergere posse singulis minutis secundis, vel singulis arteriarum pulsibus excurrere 400. pedes Parisienses*; quam sententiam ulterius confirmat Epistola, quam magnus vir Joannes Bernollius Clarissimo Auctori conscripserat; verum mirari desii, ut animadverti Bernollium & Michelottum de fortissima, non autem de placida, lenique expiratione sermonem habuisse; Ad superiora itaque redeundo, certum est, actionem inspirationis & expirationis magnum opus esse, ut natura fluidorum leges opportune regat; inspirato enim aere pulmonares vesiculæ superficiem quasi sphericam obtinent, exspirato vero aliquantulum connivent, & laxatis quodammodo fibrarum ordinibus a quasi spherica, ad quasi spheroidalem superficiem leniter declinando deveniunt; hoc autem motu reciproco vesicularum, venæ & arteriarum vesiculis circumscriptæ, in inspiratione comprimuntur, in expiratione laxantur, sanguis itaque contentus inspirando magis stringitur & atteritur, attritus vero succedente expiratione particulis, quibus componitur opportune miscetur; hæc autem attritio, sive resolutio necessaria est, chylus enim mox sanguini associatus, nunquam debita agitatione, mitioneque opportuna perfici poterit, nisi vesicularum pulmonarium oscillatorio motu circumposita vasa elastice urgeantur; Licet vero celeberrimus Alphonsus Borellus (a) impossibile, aut saltem difficillimum censeat, partes sanguinis heterogeneas quantumvis attritas ac resolutas in pulmonibus inter se commisceri, angustissimorum canaliculorum culpa; nihilominus immortalis Malpighius totis viribus in opere posthumo pag. mihi 14. Borelli sententiam studet evertere, attritionem corporum & debitam mitionem in pulmonaribus vasculis positurus; Quotiescumque autem agitatio, attritio & opportuna mixtio corporum in canalibus pulmonum satis apte exequatur opere præcipue elasticitatis aeris, vesiculas & consequenter circumscripta vascula reciproco motu dilatantis; procudubio ex Malpighio suspicari ulterius possem, motum quoque sanguinis per pulmonaria vasa ad spiralem aut quasi spiralem inclinandum esse, (ut num. quoque 7. indicatum est;) Inquit etiam immortalis Auctor eodem opere posthumo loco citato: *His accedet sanguinem in pulmonibus duplici motu agitari a corde videlicet, & ab elatere aeris, aut adderem ego, ab elatere vesicularum, si non placeat, aerem in pulmonaria vascula sanguifera trajicere cum Malpighio; primo motu natura tentat motum rectum, in secundo fiunt, ex laterali compressione motus contrarii a circumferentia ad centrum, unde motus rectus perturbatur, quare ex his necessario sequitur mixtio, & attritio particularum sanguinis*: Cum autem ex duobus hisce motibus eodem tempore exercitis, quorum unus rectus est, transversalis alter, necessario componatur motus quidam ex utroque motu compositus, qui necessario ex mechanicis inclinatus est & obliquus, videlicet quasi spiralis conjectari licebit, motum sanguinis per pulmonaria vasa accedere posse ad motum quasi spiralem, vi cujus quoque felicius resolvuntur, & atteruntur corpora, & attrita debite miscentur, quidquid sit tamen de hoc.

23. Conjectari liceat actionem inspirationis & expirationis non fieri tantummodo a motu musculorum intercostalium, actione diaphragmatis & opere elastico vesicularum pulmonarium; verum etiam adjuvari a motu peristaltico vasorum reticulariter positorum circa pulmonares bronchiorum vesiculas; Enimvero autopsia constat, fibras omnes, & multo magis vasa quælibet ex fibris nerveis, muscularibus & membranosis elaborata peristaltico motu dotari; hujusmodi autem peristaltici motus artificio fibræ omnes post statum naturalis elongationis, intra sese contrahuntur & respiciunt; quæ actio arteriis quoque & venis naturaliter accidit: & sane clarissimus Lyfter (b) omnia prius edocuit, inquit enim: *Pulmonum vasa propter æqualem connexionem cum bronchiis extendi & ampliari & similiter abbreviari & constringi*. Deinde vasorum pulmonarium abbreviatio aliunde fieri potest; vasa enim pulmonaria modo ingrediente aere erecta sunt & extensa, postmodum egrediente aere inflexa & inclinata laxantur & decumbunt; Vasa itaque arteriosa pulmonaria cum venosis retis in modum efformata placeat primo observare juxta naturalem longitudinem, postmodum vero intra sese contracta & abbreviata, ut exigit naturalis actio motus peristaltici. Itaque supponatur arteria ODC, (a) quæ venæ CMO retis in modum unita sit in punctis connexionis O & C; sintque ambo vascula juxta rationem naturalis altitudinis OD & CM; naturalis vero latitudinis DC & MO describantque simul unita quadrangulum rectangulum ODCM. Postmodum opere motus peristaltici reciproca actione vascula hæc contrahantur, & abbreviuntur; ita ut rectangulum ODCM contrahatur in rectangulum EDCF minoris altitudinis, ut evidenter in motu lumbricorum hujusmodi actiones facile observamus; certum est, vesiculas pulmonares contentas in spatio rectanguli ODCM majoris altitudinis eo tem-

pore, quo spatium hoc contrahitur, in spatium rectanguli EDCF minoris altitudinis non parum constringi, & contractis quoque latitudinalibus vasculis multum contrahi ac minui spatia rectangula, quare aer necessario per aperta bronchiorum foramina versus asperam arteriam educendus erit.

24. Supponatur modo alter casus abbreviationis & contractionis, nempe arteriam OCD, & venam DMO (b) retis in modum inter se unitas in punctis connexionis, O & D, mutatisque angulis deflecti & inclinari; ita ut eadem vascula describant rectangulum rhomboideum FCDB priori ODCM isoperimetrum, producaturque recta FB. in E; manifestum est ex geometricis rectangula FCDB & EDCA cum sint sub eadem basi DC, & inter easdem parallellas DC, & EBF esse inter se æqualia; (c) sed rectangulum EDCA minus est rectangulo ODCM, eo quia sub æqualibus OM & DC latitudinibus rectangulum ODCM majoris est altitudinis, rectangulum vero EDCA minoris est altitudinis: ergo etiam rectangulum rhomboideum FCDB licet rectangulo ODCM isoperimetrum, minus erit rectangulo ODCM; quare etiam in hoc casu vasa reticulariter posita, quotiescunque a positione recta spatii rectanguli ODCM devenerint ad positionem inclinatam, aut inflexam sub spatio rectangulo FCDB, inscriptas, contentasque vesiculas pulmonares necessario comprimant, aeremque contentum foras expellent; quamobrem ex his utroque modo facile licebit arguere vasa arteriosa & venosa pulmonum, figuram retis componentia, quotiescunque extiterint in statu naturalis elongationis dilatationi vesicularum contentarum, inspirationi videlicet aperte conferre; in statu vero contractionis aut inclinationis vasorum contractioni vesicularum seu expirationi facile auxilio futura esse: Quoties itaque in vasis pulmonaribus organico vasorum vitio elastica actio, aut imminuta sit, aut ablata; tunc deficiente opportuno impetu contra objectas bronchiorum vesiculas expirationem quoque infirmari necessarium est; quapropter cum ob imminutam expirationem tota aeris quantitas nondum fuerit e bronchiis egressa, succedente postmodum inspiratione; minor aeris quantitas pulmonares vesiculas ingredi potest; unde defectu corporum opportune elasticorum minor motus agitationis, attritionis, & mitionis in particulis sanguinis, & iners motus in organis pulmonaribus naturalem & necessariam respirationem enervant: Colligendum itaque, bronchia motu inspirationis urgere vasa sanguifera, & reciproce vasa compressa sua vi elastica æqualem & proportionalem impetum in bronchiorum vesiculas restituere; ex his ulterius conjectari licebit, in extremitatibus & peripheria pulmonum sedem legitimæ pleuritidis ponendam esse, eo quia, cum in peripheria pulmonum minora, aut minima sint vascula, quorum momentum proportionaliter tenue est ac leve; si vitio inspirati aeris, aut feri defluxi e lymphaticis vasibus pulmonares vesiculæ ad majorem superficiem dilatentur; tunc cum sectiones minimarum arteriarum & venarum ea ratione stringantur, qua vesicularum sectiones magis extensæ fuerint, certe vesicularum dilatatio aliquando tam magna fieri poterit: ut minimæ illæ arteriæ ac venæ omnimode claudantur, idcirco impedito sanguinis citulo in extremitate ac peripheria pulmonum, ibi fiet radix futuræ inflammationis, legitimæ videlicet Pleuritidis origo & basis. Verum cum vasa majora pulmonum sectionibus majoribus donata quoque sint, majorique momento distendant, a vesiculis circumpositis quantumvis supra legem dilatatis, aut a præternaturali momento aeris, aut a copia feri defluxi non adeo stringentur, unde horum vasorum sectiones non graviter impediunt, quin sanguis convenienti libertate possit effluere; cæterum si gravi fato in majoribus quoque canalibus massa sanguinis aut vitio feri, aut organi incipiat lentiori pede incedere, tunc graviori respiratione & angustia gravior quoque morbus emerget, quem Peripneumoniam poterimus nuncupare. Itaque pluries suspicatus sum, veram pleuritidem a peripneumonia ratione loci tantummodo differre, eo quia in legitima pleuritide in minoribus præcipue, minimisque pulmonarium canalium sectionibus sanguinis motus impediatur: in peripneumonia vero in majoribus quoque canalibus lentescat; ita tamen ut utriusque morbi sedes sit ipse pulmo; Ex his clarum est, quam facile transitus fieri possit a vera pleuritide ad peripneumoniam, eo quia quoties sanguis lentescere, aut impediri incipiat in extremis vasculorum finibus sive peripheria pulmonum, opus est, sanguinem ibi lentescentem adveniendi novo sanguini impedimentum esse allaturum, sicque communicato canalibus quoque majoribus ipso sanguinis impedimento parari quoque poterit facilis via ad peripneumoniam elaborandam; quare licebit suspicari, Spuriam Pleuritidem vere non in pulmone, sed extra pulmonem, in musculis videlicet respirationi inservientibus, aut intra musculos & pleuram ponendam esse, ut frequentes cadaverum sectiones palam ostendere visæ sunt.

25. An autem particulæ aeris per bronchia excurrentes sanguinem ingrediantur, nondum adhuc a dimicantibus Anatomicis & Philosophis determinatum est; certum tamen est, aereas particulas sanguini adesse, ut evidenter imposito sanguine in machina Boyleana clare innotescit, ibique elaterium suum exercet; hæc fortasse cum fuerint chylo commixtæ, facile in sanguinem traductæ fuerunt; Malpighius tamen licet ingressui aeris in pulmones assentiri videatur; nihilominus non aerem absolute, sed probabilius putat, quid latitans in aere & aqua etiam summe mobile & activum separari, quod fortasse luminis naturam sapit; ex uvina enim, quæ est portio sanguinis luminosum corpus coruscans, famamque concipiens extrahitur, ut patet in Phosphoro Nobilissimi Boylei, Oper. Posth. pag. 16. Sed hæc mira non sunt, ante enim Malpighium non ab aere & aqua tantum luminis particulas educi creditum est; verum celeberrimus Pater Grimaldus Societatis Jesu semper laudandus prop. 47. n. 1. de Luce & Lumine, in putrido ligno, noctiluca & vermibus mirandam vim ad producendum lumen esse docuit, inquit enim: *Gratis & immerito suspicaretur aliquis, quod modicus ignis, aut lignum putridum & noctiluca, aliudve sive animaculum, non habeat facultatem gignendi in se lumen, illudve ad mulatorum milliurum distantiam ejaculandi tanto impetu, ut citissime ac per lineas semper rectas procedat, tum directe, tum reflexe, tum denique refracte*. Clarissimus quoque Vallisnerius tor meritis ubique celeberrimus, tum in Italia, cum in Indiis aliquas cicindelas mihi indicare dignatus, est (c) quæ multum luminis ejaculantur; quare tanti præceptoris testi-

(a) Pag. 108. secundi Tom. de motu Animalium.

(b) Differtatione De Humoribus pag. 20.

(c) Epistola die secunda Decembris Anno 1722.

testimonio fretus facile credidi, quæ tam celeberrimi viri antea docuerunt. Sed relictis his, licet intento nostro opportunis, redeo ad Malpighium, qui in noctilucæ observationibus Anglicanæ societati traditis, notat concavitate binis ultimis incisuris noctilucæ excitatam, succo quodam repleti, qui fons est luminis: *Malpighius in Oper. Posth. pag. 85.* Quamobrem ex his non mirabor, ab aere etiam & aqua sanguinis animati animalis pulmonum opere, separari quoque luminosa corpuscula & per pulmones in massam sanguinis ejaculari, ibique hanc intestinis motibus agitari; etenim cum luminosa particulæ mobilissimæ ac tenuissimæ sint, vesicularum pulmonarium foraminula subire facile possunt, & in tangentia venarum & arteriarum vascula eadem lege penetrationis introire; verum ingressæ citissimo motu objecta fluidorum corpora valide urgent, totumque sanguinem intestina ac multiplici agitatione succutunt; ex his fortasse luminosis corporibus sanguinem ingressi, parum, aut minimum relictis alte rubescit in pulmonibus sanguis, quam ruboris indolem ultro aereo fortasse minus recte clarissimus Mayovius adscripserat; Scio quidem in chymicis salia volatilia, si cum sulfureis spiritibus opportuna mixtione digerantur; tincturam quoque rubicundam induere, quæ præcipue in sanguine pulmonari ex similibus corporum debita mixtione potest contingere, nihilominus cum hujusmodi phænomena, quæ ad colores spectant, luminosis corporibus præcipue debeantur; propterea in hac re pro particulis luminis ab aere separatis per pulmones, & in sanguinem ingressis Malpighii sententiæ facile assentire; Hinc significandum est, in cœno aere & impuro sanguine minus lucis, minisque particularum luminis adesse, quarum vi particulæ sanguinis & lymphæ minus agitate coguntur imminuta agitatione, attritione & mixtione lentescere, Hinc inflammationes, hydrops pectoris, aut læsio respirationis paulatim accedunt, quidquid sit tamen de ingressu aeris in pulmones, certum est, a vitio, aut pestilenti aere brevi tempore sanguinem vitium trahere, innumeram timendorum morborum familiam allaturum, quin imo non tenuis malorum numerus ab aere quoque nimis elastico, aut nimis compresso sortitur. Enim vero si forte contingat pulmonares vesiculas multatas esse materia quadam e glandulis tracheæ decidua, in bronchiis lentescere; ut in asthmate humido; aut spasmodice contractas esse in minores areas; ut in asthmate sicco: tunc debita quantitas aeris a dilatione naturali thoracis impulsæ in pulmones, cum non tota placide contineri, aut libere vagari possit intra pulmonares vesiculas, fas est, eam quantitatem aeris intropulsam densiorem fieri, nimisque compressam detineri in vesiculis: velut in statu violento; ibi autem cum densitates sint elasticitatibus quamproxime in ratione homologa, cumque vis elastica compressi aeris otiosa diu permanere non possit; validiori nisu, quam par est, urgebit & vim faciet contra vasa circumjacentia, vi cujus canalium sectiones imminutæ fient; unde libertate sanguinis circulantis aut impedita, aut imminuta, factoque motu sanguinis asymmetrico, laboriosa & gravis succedet respiratio, & pericula inflammationis & suffocationis aliquando minabuntur.

26. Verum non istæ tantummodo sunt asthmatum & morborum pulmonarium causæ, faciliores fortasse & faviores occurrunt; siquidem si feri particulæ a lymphaticis, aut e tracheæ glandulis in pulmonares vesiculas decumbant, ibique adeo colligantur, ut spatia illa glandularum impleantur, ab aeris particulis occupanda: proculdubio enorme pondus in pulmonibus emerget. Ut autem hæc magis manifesta fiant, necessarium putavimus pondera aeris & feri quamproxime indagare, cum autem pondus feri facilius haberi possit, si cum pondere aquæ communis comparari curaverimus, propterea ut intento nostro probabilior & proximior succedat eventus, nonnullas analogias præmittendas necessarium credimus inter serum & aquam communem diversi generis & regionis, ut determinatum feri pondus colligere facilius possimus. Itaque notandum est, celeberrimum Jacobum Hermannum *lib. 2. pag. 171. Phoron.* ex supputationibus magni Jacobi Bernollii facile demonstrare, gravitatem aeris ad gravitatem aquæ fuisse in ratione 1. ad 800. Celeberrimus autem Taylor Anglus *pag. mibi 104. Methodo incrementorum directa & inversa* exposuit experimentum a clarissimo Haukesbejo factum, ostendens aeris densitatem mediocrem ad densitatem aquæ esse proximè, ut 1. ad 820. cum densitates corporum sint ponderibus eorundem proportionales; idcirco pondus quoque mediocre aeris ad pondus aquæ communis Anglicæ erit ut 1. ad 820. proximè. Ita Archibaldus Pitcarnius Scotus, *pag. 189. de fluxu menstruo*, expertus est, gravitatem aeris ad gravitatem aquæ Scoticæ esse circiter ut 1. ad 1000. pariter nobilissima Academia Florentina *Experimento 255.* observavit, pondus aeris ad pondus aquæ communis fuisse in ratione 1. ad 1179. proximè. Ulterius acutissimus Pater Franciscus Lana *in suo Prodomo pag. mibi 53.* experimentis accuratissime institutis expertus est, pondus aeris nostri Brixiani datum vas replentis esse ad pondus particularum aquæ Brixianæ idem vas replentis quamproximè ut 1. ad 640. Hic itaque præmissis placeat supponere, quod a Philosophis ac Medicis pro vero habitum est; serum nempe sanguinis præcise & secundum se & naturali in statu consideratum, nil aliud esse, quam ipsamet aqua communis; ut prima quoque Dissertatio numero 2. indicatum est. Omnes siquidem aqua communi vescimur & nutrimur, quare serum sanguinis secundum se erit aquæ communi quamproximè proportionale; quapropter colligi potest, aquam unius loci sub eodem volumine esse quamproximè ad aquam alterius loci sub eodem volumine: ut homologue est serum sanguinis alicujus hominis in primo loco sub eodem volumine ad serum alterius hominis in secundo loco quamproximè & sub eodem volumine; & permutando erit aqua unius loci ad serum sanguinis unius hominis in hoc loco & sub eodem volumine, ut aqua communis alterius loci ad serum sanguinis alterius hominis in hoc altero loco quamproximè; quare juxta nostrum propositum erit pondus aquæ communis Brixianæ sub eodem volumine ad pondus feri nostri sanguinis naturaliter se habentis, ut quamproximè est pondus aquæ communis Anglicæ ad pondus feri Anglici sanguinis humani; sed pondus aquæ nostræ communis est ad serum sanguinis nostri (*per num. 16.*) in ratione granorum 1749. ad 1803. proximè; ergo etiam homologue pondus aquæ Anglicæ granorum 820. erit ad

pondus feri Anglici sub eodem volumine, ut 820. ad 845. — proximè; quare fiet analogismus ut 1749. 1803. 820. 845. — Veritas autem

tem hujus analogismi innotesce quoque usu logarithmorum; facta siquidem summa logarithmorum respondentium secundo & tertio numero proportionali & ab hac subtractio logarithmo primi numeri absoluti emerget logarithmus 2.9271197. quamproximè indicans,

quartum numerum proportionalem quæsitum esse 845. —; Sed pondus aeris per experimentum relatum a celeberrimo Taylor ad pondus aquæ Anglicæ est ut 1 ad 820; ergo etiam pondus aeris ad pondus feri sub eodem volumine cum aqua Anglicana erit proximè ut 1 ad 845 —

Pariter cum pondus aquæ nostræ ad pondus feri nostri sub eodem volumine sit granorum 1749 ad grana 1803 proximè erit pondus aquæ Scoticæ granorum 1090. ad pondus feri sanguinei Scotici sub eodem volumine, ut grana 1000 ad grana 1030. — proximè; sed pondus aeris ad pondus aquæ Scoticæ est per Archibaldum Pitcarnium ut 1 ad 1000; quare erit quoque pondus aeris ad pondus feri sanguinei Scotici, ut 1 ad 1030 — proximè.

Ita rursus cum pondus aquæ nostræ ad pondus feri nostri sub eodem volumine sit granorum 1749. ad grana 1803. pondus quoque aquæ Florentinæ granorum 1179 erit ad pondus feri sanguinis Florentini sub eodem volumine, ut grana 1179 ad grana 1215; —

sed pondus aeris Florentini (per experimentum 255 Academiæ Florentinæ) ad pondus aquæ Florentinæ est proximè ut 1 ad 1179 ergo etiam pondus aeris ad pondus feri sanguinei Florentini erit proximè ut 1 ad 1215 —

Denique cum pondus aquæ nostræ ad pondus feri sub eodem volumine sit proximè granorum 1749. ad grana 1803; pondus quoque granorum aquæ nostræ communis Brixianæ 640, erit ad pondus feri Brixiani sub eodem volumine, ut 640 ad pondus granorum 659

proximè, sed pondus aeris ad pondus aquæ nostræ communis est ex Patre Lana in ratione 1 ad 640 proximè; ergo etiam pondus aeris ad pondus feri nostri sanguinis sub eodem volumine cum aqua nostra communi erit proximè, ut 1 ad 659 —; quare fiet ultimus analogismus sit, ut 1749. 1803 : : 640. 659 —; hæc

autem quarta proportionalis innotesce quoque usu logarithmorum; etenim juxta horum regulas operando emerget logarithmus 2.8192850 proximè indicans quartum numerum proportionalem quæsitum esse 659 —

Hic itaque repertis accedimus rationabiliter conjecturis; enim vero si una vesicula pulmonaris contineat naturaliter particulas aeris, cujus pondus se habeat ut unum; si postea hæc eadem vesicula aqueis particulis repleatur, necessario pondus aquearum particularum erit proximè in ratione 640. ad 1; cum autem serum sanguinis gravior sit aqua communi sub eodem volumine in ratione probabiliter proxima granorum 1803 ad 1849, per regulas proportionum quoque manifestum jam est, gravitatem feri sanguinei in eadem vesiculam defluxi e glandulis tracheæ, & in eadem vesicula contenti fore proximè in ratione 659 —: Quamobrem palam est,

quam facile pulmo vitari possit, & in immensum alte gravari, quotiescunque non una tantum, sed plures vesiculæ pulmonares loco aeris, cui expediendo destinantur, feri particulis repleantur; Hinc constat, quam grave onus ferre debeant pulmones, quoties serosis humoribus saginantur, quamobrem fas est oriri necessario altam respirationem magnumque anhelitum fieri, & animal molestissima anxietate, ac stertore cruciari cum periculo suffocationis, aut saltem facillimè dispositionis ad pulmonum hydropem elaborandum; quæ omnia passim contingere possent, nisi natura continuata expiratione & assiduo excreatus opere a fluenti humorum sarcina paulatim liberaretur.

DISSERTATIO III.

De motu sanguinis per universum Corpus cum Mechanicis morborum causis.

Pulmonum morbis brevi stylo exaratis instituti nostri ordo exigit, reliquorum morborum familiam quærere, horumque causas eadem mechanica, brevique methodo, quantum rationales conjecturæ ferunt, invenire; sanguis itaque tum ascendens, cum descendens impulsui cordis motum debet, & quoties natura languent cor non otium fecerit, conatur impulsus sanguis ima & summa naturæ loca rimari; verum quia sæpissime fluidum hoc expulsa innocentia vitium trahit, propterea & naturalis hujus fluidi motus gravi naturæ incommodo sequitur sanguinis culpam, & ambo funesto morborum numero animal diruunt; quæ omnia ut quæram, superius conjectura nos docuit numer. 15. : ; momentum sinistri ventriculi multo majus esse momento dextri; cum enim a ventriculo sinistro sanguis per universam animalis machinam supra & infra eodem tempore projici debeat, certe ventriculus sinister tantis momentorum gradibus donandus fuerat, utpote majoribus & robustioribus fibris munitus tanto oneri opportunis. Itaque a ventriculo sinistro ejaculatus sanguis arteriam magnam ingreditur, quæ observantibus Anatomicis ad quatuor circiter digitos indivisa totum sanguinem quantitate & impetu amplectitur. In hujusmodi arteriæ magnæ principio animadvertit Clarissimus Bellinus amplitudinem arteriæ,

fiat, quæ cordi affigitur, minorem esse amplitudine maxima sinistri ventriculi, sanguis idcirco a ventriculo expulsus cum non totus intra capacitatem arteriæ cordi affixam per quatuor circiter digitos contineri possit, incipit urgere arteriæ latera, quæ extrorsum quaquaversus dilatata inchoant motum pulsationis arteriarum; in hoc arteriæ magnæ principio hujusmodi sectionem circularem inquirendi necessitas postulat, quantitatem sanguinis dato tempore transeuntis, quantum possibile est, investigare. Itaque licet sectiones arteriarum variæ ac diversæ sint juxta varias hominum moles, ætates ac figuras; nihilominus ex mediocri hominum altitudine pluries observata collegi, arteriam magnam prope basin, & per quatuor ultimas tra digitos, ut plurimum huic diametro AB accedere (a); Methodo autem lineæ circini proportionum divisa est linea diametri AB in 25. partes æquales; quare ex data diametro facile ex Geometricis reperire datum erit sectionem circularem arteriæ ejusdem: sit enim diameter AB circuli quæsitæ partium 25—b, eritque quadratum diametri—bb partium 625; area itaque quæsitæ supponatur—y; Hisce suppositis cum ratio quadrati ad circulum inscriptum sit proxime ex Archimede, ut 14 ad 11, fiatque 14—c; 11 vero—c; erit ergo Analogismus ut c.e.: b.b.y; quare ex Geometricis erit æquatio cy—bbe, & dividendo æquatione per c, erit y—bbe

cum autem quadratum b b sit—625. & c sit—11, erit pro-

ductum b b c—6874, quod divisum per c—14, erit—

491—seu juxta methodum decimalium—490. 625. pro va-

lore quæsitæ quantitatis y; quare sectio circularis AB EF; seu area quæsitæ arteriæ magnæ prope basin, cujus diameter est AB divisa in 25 partes, erit partium decimalium 490, 625.—y; Sic factio quadrato diametri MN (b) Arteriæ magnæ descendens in sexdecim partes divisæ superioribus æquales, erit hoc partium 256; unde reperietur area circularis MONP arteriæ magnæ descendens fore partium 200, 960 proxime: eadem methodo facto quadrato diametri QR (c) arteriæ magnæ ascendens in 12 partes divisæ erit hoc partium 144, quare fiet area circularis QSRV arteriæ magnæ ascendens partium 112, 040 proxime.

28. Ex his sectionibus ascendens & descendens arteriæ magnæ aperte constar, quanta futura sit sanguinis quantitas per singulas sectiones transiens quacunque systole, cum enim a vi impetus sinistri cordis sinus impellatur ut plurimum sanguinis uncia, nempe grana sanguinis 480 (juxta Vecheri mensuras): ut cordatioris judicant Anatomici; cumque ratio sectionis circularis ascendens arteriæ ad sectionem circularem descendens, sit ut 112. 040. ad 200. 960.

juxta decimales, seu ut 12 ad 21—proxime; proculdubio juxta hanc

rationem divisa quantitas sanguinis granorum 480, ibunt naturali

lege & remotis impedimentis, grana sanguinis 174—per sectio-

nem ascendens, & grana sanguinis 305—ibunt per sectionem

descendens arteriæ magnæ. Reperta autem sectione arteriæ magnæ juxta rationem datæ diametri, animadvertendum est, hujusmodi sectionis peripheriam non statim conice stringi, sed per quatuor digitos productam usque ad divisionem arteriæ nullam parere sanguini resistantiam; hoc autem summo consilio a natura factum videtur, ne per primum illud arteriæ magnæ spatium facta sanguini resistantia, retro pulsus sanguis impedimento esset succelluro & motui libero sinistræ auriculæ. Cæterum hoc vitium facile accideret, si aut callo, aut tuberculo, aut polypo vestiretur arteriæ principium, inæquales & inordinatas pulsationes paritutum, gravi vitio ordinatæ circulationis.

29. Modo secuturi motum sanguinis per aortam descendentem

conjectamur, grana sanguinis 305—nempe drachmas quinque pro-

xime, singula pulsatione inferius vibrari, sanguis autem, utpote grave corpus inferius descendendo variis motibus agitur in arteria; quamobrem acturus de morbis supra & infra cor, ibi universaliter præmittendum est, experimentis notum esse, eodem & æquali tempore pulsus vibrari in dextro carpo manu inferius demissa, ac in sinistro manu elevata; eodemque tempore vibrationem pulsus in utroque demisso carpo sentiri, ac in arteriis temporum, & in arteria cæliaca; quare ex chirurgicis observationibus manifestum est, eo & æquali tempore, quo cordis systoles vibrat quantitatem sanguinis, ambas cerebri meninges pulsationes suas edere cordis pulsationibus isochronas; quare ex his Celeberrimus Bellinus in suo tractatu de pulsibus pag. mihi 50. animadvertit, impetum per omnes arterias sanguini imprimi eo puncto temporis, quo cor constringitur: Præterea certum est, ut num. quoque xi. innuimus, ramos majores arteriarum dividi in minores, & minores in minimos, & consequenter sanguinem a majoribus ramis fluere in minores, & a minoribus in minimas ramificationes; cum autem in vasculis toties divisus decrecant semper vasorum circumferentiæ, proportionaliter quoque augebuntur sanguini resistantiæ, & sic majora fiunt decrementa velocitatum sanguinis; idcirco ad ultimas minimarum arteriarum ramificationes delatus cum continuo & successivo decremento velocitatum, tandem aliquando deveniet ad motum quasi minimum: sic flumina quantumvis velocissima in plures, pluresque ramos divisa acquirunt singulis canalium divisionibus proportionalia semper decrementa velocitatum; inde experimur, sanguinem e capillaribus, minimisque canalibus carniū incisarum tali lento pede, quantumvis continuo, effluere, ut guttatim exstillet. Id vero præ aliis adversus celeberrimum Jacobum Jurium Societatis Regiæ Londonensis Secretarium demonstravit accuratissime Michelortus (a): Cæterum hanc rem legi quoque firmatam a doctissimo Bernardino Zandrino in celebri tractatu de China china referente, proportionem motus sanguinis a corde expulsi per magnam arteriam ad motum sanguinis in capillaribus vasculis observatam fuisse a clarissimo Jacobo Keillio in ratione 1000, 000, 000, 000, 030, 000, 000, Sydenham Opera Medica.

(a) De separatione fluidorum pag. 101, 102.

000, 000, 000, 000, 000, 00 ad unitatem: quamvis hujusmodi proportio præcise definiri non possit, ut pluries animadvertit laudatus Michelortus de Separatione fluidorum &c.

30. Itaque arteria descendens plures ramos intercostales primo distribuit, qui per costarum musculos effusi morbos pariunt vitio respirationis; sic sanguis in arteriosis canalibus, aut ultro lentescens, aut aliquando stagnans, nec a venis facile exceptus, quantum par est, dolores laterum facile parat; sic muscoli intercostales a fixato aut lentescente sanguine obruti ægre elevant costas & deprimunt; sic diaphragma particeps vitii motus costarum parum & ipse deprimitur & elevatur respiratione aut ablata, aut imminuta. Infra intercostales musculos phrenica arteria per totum diaphragmatis spatium excurrit arteriosum sanguinem diaphragmati donatura, proculdubio si sanguis aut nimio motu, aut densitate peccaverit, tunc diaphragmatis planum obruitur parta inflammatione; sic si nimia sanguinis copia, aut lentescens sanguis diaphragma inundet, tunc muscularia spaciola implentur, & circumferentia diaphragmatis contracta ad centrum accedere cogitur. Diaphragma autem costis alligatum costas itidem trahit ad centrum diaphragmatis, ibique arcte retinet: sic costis non libere elevatis, nec expansis pulmonibus, & aere minori quantitate in ipsos ingrediente fit inspiratio imminuta, & expiratio nimium languida; præterquam quod diaphragmatis planum plus justo ponderosum, magisque iners ad motum, nec ascendenti chylo viam & manum affert, nec pulmonibus libertatem: aliquando convulsis, contractisque nervis diaphragma excurrentibus stringuntur arteriarum sectiones impedita fluenti sanguinis libertate: musculares itidem fibræ eadem lege convulsæ manent contractæ, & nullo motu peristaltico serpentes sanguinem in otio tenent, ne ulterius in venas feratur; ex his exposita jam incommoda magis succedunt, & concursu nervorum cerebri quoque opera diruntur.

31. Infra diaphragma excurrit arteria cæliaca, cujus dexter ramus tribuit ventriculo gastricam dextram & omento epiploicam, pancreati dat pancreaticam, duodeno duodenam, cysticam felleæ vesicæ, & hepaticam hepatis elargitur arteriam; sinister vero ramus gastricam minorem parit, quæ per mediam ventriculi regionem effusa partitur, & coronatam stomachicam superiori ventriculi orificio donat, cingitque coronæ ad instar, & gastricam sinistram, quæ deorsum ad ventriculi superiora & ad pylorum transferitur; sinister quoque cæliacæ ramus emittit gastro epiploicam, quæ superiore omento suffulta & omento, & sinistro fundi ventriculi lateri ramos tradit; Ulterius quoddam ramos pancreati, & lienis multos elargitur; ex tot autem arteriæ cæliacæ ramis ad tot viscera decurrentibus, manifestum est, horum viscerum labes & vitia facile invicem convenire; etenim si massa sanguinis sylvestri sale graviora vitium fecerit, ea portio, quæ per gastricas arterias & per gastro-epiploicam fluit, regionem ventriculi madefactura stomachi membranas punget acerrime; sic acriter contractæ vomitum, aliquando singultum, aliquando stomachi dolores, languores, anxietates & lypirias febres ventriculo inflammato parturient; quæ imo contractis stomachi fibris contrahuntur quoque arteriæ, & spatia arteriarum fiunt minora; sanguis propterea succedens cum resistantias majores reperiat, incipit lentescere, cogitque venturum sanguinem per alios vicinos, magisque apertos canales majori quantitate inferius effluere; sic cum arteriæ epiploica, & gastro-epiploica ramos quoque omento donent, fluit sanguis per inferiores omenti ramos; plusquam decet, ea videlicet ratione, ut tantum motus & quantitatis tribuatur vasculis omenti, quantum motus & quantitatis a ventriculi arteriis detrahitur; sicque vitio opportuna & proportionalis distributionis massæ sanguineæ, tumefactæ magis omenti arteriæ abdomen quodammodo elevant, ut in hypochondriacis sæpiissime experimur; sensibiles propterea fiunt arteriarum pulsationes in abdomine; eo quia cum ex angustia contractorum vasorum stomachi necesse sit sanguinem majori copia per alios vicinos canales, qui canalibus stomachi correspondent, viam querere; ab augmento quantitatis sanguinis augetur quoque ejusdem velocitas; sic cum a quantitate majori sanguinis dilatentur magis arteriæ, & ab augmento velocitatis celerius distrahantur extrorsum arteriarum latera, opus est ab utraque arterias in hypochondriacis affectibus sensibili magis motu pulsare; quare non semper in hypochondriacis accusanda est nervorum convulsio, non semper flatuum contentorum impetus. Dexter autem cæliacæ ramus cum pancreati, duodeno, & vesicæ felleæ vasa ferat, jungit quoque communione vasorum & pancreatis & duodeni & vesicæ felleæ morbos & vitia; quoties enim sanguis impurus fuerit, pancreatis glandulas deposita fæce facile obstruit, eademque lege arteriarum communicantium impeditis cystis felleæ vesiculis, aut non æque separat a ductum sulfur, aut separatum languescit iners ac vapidum, quod per choledochum ductum in duodenum delatum inepte in officio est chylo depurando; si forte a succis præterfluentibus irritato duodeno convulsa crispentur duodeni latera, arteriæ duodenum vestientes angustiores fiunt, mutantur arteriarum directiones, & obliquitate facta transeunti sanguini moram ferunt; cogitur idcirco succedens sanguis retardato motu alio declinare, & pancreaticam & cysticam arteriam motu & copia inundare; pancreatica idcirco & cystica majorem sanguinis quantitatem excipientes, quam par est, temporibus æqualibus, & majores pancreatis sales, & vesicæ felleæ adusta & acris sulfura largius donant, ambæ suum visceribus incommodum paraturæ: Hujusmodi incommoda sibi parat superius ventriculi orificium, quoties arteria coronaria convulsis nervorum fistulis, quæ per os ventriculi superius repunt, suo in officio otietur, ne sanguinem libero pede ducat.

32. Postmodum magno in officio effusa serpunt per mesenterium mesenterica arteria superior, quæ omnia intestina tenuia, & mesenterica inferior, quæ crassa undequaque circumligant; verum quia motum sanguinis per hæc vasa sæpe sæpius a contento flatuum impetu vitari facile est, non erit fortasse ineptum hac data loci opportunitate circa flatuum vires conjecturas indicare, a quibus & intestina, & vasa intestinalia pari sæpe sæpius contingit. Itaque cum flatuum materia nil aliud esse videatur, quam aggeries particularum aeris, quibus salinæ sulfureæ & aquæ ciborum solutorum particule associatæ sunt, rationabiliter suspicari licet, ex natura aeris flatuum quoque indolem ac vires simili lege nos assequi posse; idcirco numerabo flatus inter fluida difformiter gravia, quorum viribus tria præcipue conspirare visa sunt, densitas nempe particularum, earundem vis elastica, & calor agens: Itaque cum densitates aeris

sint elasticitatibus quamproxime proportionales, flatuum quoque densitates elasticitatibus suis quamproxime proportionales habenda erunt; quapropter cum flatuum particulæ aliquando densiores sint, aliquando rariores; quoties flatuum materies densior fiet, tunc horum vis elastica major erit; minor vero, quoties flatuum materies minorem densitatem exceperit, notum jam est, flatu in intestinis familiari & consueto cursu sursum, deorsumque decurrere, ut libere aut supra, aut infra exire possint; neque intestinalis familia pati solet nisi violenta rectione horum itus, reditusque impediatur; sæpiissime autem accidit, aut a contracto nimis ani sphinctere, aut ab induratis in recto fæcibus, aut a coli valvula nimis tensa una cum pyloro alte contracto flatu non ea libertate ferri posse, ut per superiora, aut per inferiora egrediantur, quo casu intestina pati acerrime opus est. Enimvero si quantitas flatuum claudatur infra coli valvulam intra intestinum relictum, indurata vero fæces, aut spasmodica contractio sphincteris ani, horum egressus impediunt; tunc cum coli valvula introitum donet versus rectum, regressum vero impediatur, opus est flatu contentis variis densitatis gradus esse acquisituros, juxta quos, cum horum vis elastica sit quamproxime proportionalis, necesse est flatuum vires ea ratione contra objectos intestinum parietes elasticè arietare debuisse, quam gradus densitatis postulaverint, cum autem isti gradus densitatis aliquando summi esse possint, summa quoque vis elastica flatuum futura erit damno summo intestinum. Præter densitatem urget vim elasticam circumjacentium viscerum calor, vi cuius flatuum particulæ rarefactæ majus spatium quærere coactæ sunt; enimvero cum calor (a) sit ut impressiones particularum corporis calidi in quopiam objecto corpore calorem excipiente, hujusmodi autem impressiones sint in ratione composita ex duplicata celeritatum particularum calidarum, & simpla densitatum earundem; proculdubio colligi potest, quantum extendi & rarefieri proportionaliter debeant flatulentæ materiæ, quotiescunque præter actionem naturalis elasticitatis, gradibus densitatis homologam, a calore viscerum, aut alterius generis ultro urgentur; videlicet in ratione composita ex ratione elasticitatis flatuum restrictorum & densitatis corporis calidi ambientis, & quadrati velocitatis particularum ejusdem; quare si flatuum restrictorum elasticitas acquisita densitati homologæ supponatur — e; corporis vero calidi ambientis densitas — d; velocitas vero particularum corporis calidi — u; erit caloris actio seu momentum a calore circumjacentium viscerum, aut alterius generis excitatum contra flatu tali ratione restrictos, ut e + d + u n; Juxta quam rationem rarefieri flatulenta corpuscula valde conantur, ingens magnumque spatium occupatura. Quæ hucusque dicta sunt de vi & momento flatuum contentorum, & restrictorum in recto intestino infra coli valvulam, simili ratione de flatibus contentis, & restrictis in reliquis superioribus tenuibus intestinis, aut pressione, aut convulsione spasmodicæ contractis philosophandum erit; sæpiissime etiam in intestinis separantur a glandulis intestinalibus fluida quædam, aut aliunde effluunt hinc inde succi e choleocho ductu, aut pancreatio, qui cum particulis aeris intime commixtis tractu temporis in rugis, aut intestinum cellulis densiores fiunt, viscosi, glutinosi, aut austeri; quapropter latentes aeris particulæ intus inclusæ, & violenter compressæ taliter agunt, ut ab extraneo viscerum calore tandem aliquando dissoluta horum succorum viscosorum compage, collectæ intus aeris particulæ elaterium suum alte exercent; & ad majus & grande spatium rarefactæ & ejaculata succorum elementa, quibus miscentur, violente in intestinum membranas arietent, & salinis particulis, quibus uniuntur acerrime, altis lancinationibus urgeant: sic summi nominis fama Leibnitius rationem explicuit, ut refert Michelottus pag. 44. de separat. fluid. cur aqua frigore in gelu conversa momentum bellicum, in quo continetur, divellat, & impetuosè diffingat, id enim ita fieri existimavit, aquæ fluiditate per frigus ablata particulæ aeris compressi latentes inter aquæ partes uniuntur, grandioresque evadunt, ideoque magis idoneæ fiunt ad agendum in latera tormenti bellici. Intestina itaque tanto nisu impulsæ & salibus acutis vulnerata spasmos, tormina, & dolores patiuntur. Hinc sæpe a flatibus singultus, colicæ affectiones, & inverso intestinum motu enormi cum vomitu volutus aliquando succedunt; fere semper ab alto flatuum elaterio extensæ fiunt intestinum membranae, & abdomine elevato tota quanta est abdominis regio tympani in modum, & resonat & intumescit. Deinde sæpe contingere potest, flatulentas particulas majus spatium adepturos vasorum lacteorum oscula versus cavitatem intestinum jam aperta violentissimo motu ingredi, & per tenuissima hujusmodi vascula elastico nisu excurrentes hæc gravi ruptura divellere, inde effuso sero incurabilis hydrops a flatu absque ullo aut aeris, aut copiosæ lymphæ vitio continget. Ulterius ex his impedito diaphragmatis motu angitur animal difficili respiratione. Verum majora aliquando damna partiuntur flatu, quoties contractis in spasmos, aut nimium extensis intestinum membranis vasa meseraica quæcunque per tenuia & crassa intestina ubique vagantia arte contrahuntur, fiuntque aut impeditæ, aut imminutæ sectionis. Sanguis enim fluxurus motu suo impeditur, ne libere circumeat; stagnat idcirco intra contractos intestinum parietes cum acuti intestinum inflammatione; præter hæc sanguis stagnans, aut lentescens impedimento est sanguini succelluro; sic arteriæ meseraicæ impedito, aut lentescente sanguine turgidæ pulsant enormiter viam sibi paraturæ, & aliquando cum mesenterii inflammatione interni abscessus erumpunt; sic in affectionibus hypochondriacis alte grassantibus cum gravi intestinum borborygmo non levis timor est, quin hujusmodi mala aliquando succedant; deinde ob hujusmodi solidorum ac fluidorum vitia peristalticus intestinum motus, aut lentus fit, aut nullus; nullæ propterea a glandulis intestinum; nullæ, aut paucæ extra intestina promoventur fæces; & oriantibus intestinis succi hepatici, & pancreatici naturæ damno languescunt.

33. Harum arteriarum meseraicarum operæ utiles particulæ ab inutilibus pedetentim separantur a sanguine mechanica glandularum intestinalium structura, in quas arteriæ ipsæ desinunt; separationis autem artificio succurrit præcipue peristalticus intestinum motus; unde postmodum fæculentæ particulæ in unam massam collectæ naturæ commodo foras ejiciuntur. Naturæ artificium observanti liceat conjectari, intestinum figuram cylindricam esse, aut ad cylindri-

cam accedere, & meseraicas arterias; ita & socias venas esse cylindricas intestinales circumscriptas, & circum intestina ipsa describere arcus aut circulorum segmenta. Quoties itaque in motu peristaltico intestinales annuli versus axem minoris sectionis fiunt, arcus seu segmenta circumscriptarum arteriarum sibi invicem accedunt, & curvitas segmentorum necessario major fit & elevatur; e contra in eodem peristaltico motu, quoties extenduntur intestinales annuli recedendo ab axe, proportionaliter recedunt a se invicem etiam arcus, seu segmenta arteriarum, & curvitas eorundem minor fit, & homologa ratione deprimitur. In hoc autem motu arteriarum intestinalium transeuntium a majori curvitate ad minorem, elementa sanguinis in fistulis arteriosis contenta, & per has continuo permeantia, continuo quoque motu succutuntur, & quassantur valide; rumpuntur propterea eorum nexus inter se, solutisque particulis, aut ad solutionem magis, magisque dispositis facilius per glandularum intestinalium foraminula foras erumpere datum est, ut in intestinale cavitatem liberior continuo delabantur. Separatæ fæces a vi & a momento peristaltici motus promoventur ulterius versus rectum intestinum, ut inde a corpore tanquam caput mortuum parlatim eliminetur; cæterum si ab angulorum salibus irritata intestina convulsa torqueantur, non solum intestinum sectio minuitur, verum etiam arteriæ, & venæ intestina vestientes crispantur. Ab hac autem vasorum crispatura affertur sanguini fluenti resistentia, fiuntque elementa sanguinis magis unita ac densa, propterea ad motum necessarium minus apta; motuque ulterius retardato fibrarum intestinalium inflammatio supervenit, peristaltico motu inferiora versus aut enervato, aut deperdito, fæces idcirco & contenta cibaria cum inferiori ferri non possint, aut ægre ferri debeant, coguntur sursum ascendere, & molesto, frequentique vomitu vulvulam parant; etenim cum intestina cylindri in modum elaborata sint, quoties una pars inflammari incipit, pars hæc inflammata, aut omnino constringitur, aut saltem minoris fit sectionis; quare cum cylindri intestinalis superior portio, inflammationis experta, latior adhuc remaneat, inferior vero ob inflammationem strictior & angustior reddita fit; sectio ista intestinalis cylindrica ad quasi conicam sectionem accedet; descendentes itaque materiæ, quæ spatio cylindrico prius continebantur, cum in spatio quasi conico contineri non possint, retropulsæ coguntur ascendere; ubi spatium majus sectionis superioris latius est, ut infelici motu superiora versus expellantur. Ibi autem agendo de motu peristaltico intestinum prætereundum non est, probabile judicari posse, separationes fluidorum e glandulis intestinalibus fore facile in ratione composita ex rationibus densitatum liquorum, & orificiorum, e quibus effluunt, & numero motuum seu (liceat dicere) oscillationum fibrarum elasticarum, a quibus naturaliter peristalticus motus continuo exercetur. Quamobrem, si aut a catharticis medicamentis, aut a succis quorum angularis inest superficies, intestina decurrentibus, fibræ intestinales continuo stimulo irritentur, ut motus peristalticus intestinum ultra debitum naturæ modum celerior fiat ac frequentior; tunc copiosæ necessario quantitates liquorum heterogeneorum a glandulis intestinalibus, æqualibus temporibus separabuntur, in ratione nempe composita ex ratione densitatum liquorum, & orificiorum, e quibus effluunt, & numero motuum seu oscillationum fibrarum elasticarum. Quapropter ex hisce rationibus quoque constare potest, cur serosa ac fluida corpora facilius ac copiosius excernantur, quam solida & viscosa: unde tam facile serosæ purgationes & diarrhææ contingant; etenim cum serosa ac fluida corpora minus densa sint, magisque prompta ad motum, hæc minorem ferent resistentiam motuum elastico fibrarum, & consequenter hæc, cæteris paribus, a tam frequenti fibrarum elasticarum motu agitata per glandularum intestinalium oscula erunt facilius superanda; deinde cum sæpe accidat, massam sanguinis angulosi alias particulis plus justo repleti, hæc salium massula circa proprium axem rotantes, fibrosa non solum sanguinis filamenta scindunt ac lacerant, verum etiam arteriarum & venarum extremitates inauspicato erodunt; factum inde, ut filamenta sanguinis lacerata ac divulsa ex intestinalibus osculis supra modum egrediendi, molestas, gravesque dysenterias aliquando vitæ occasu parturiant; effranes quoque motus succorum, bilis, & succi pancreatici facillime abrafo naturali intestinum muco motum peristalticum acutissime stimulant heterogenea fluida sanguini permixta ab evanescentium canalium osculis gravi dolore evocant, ut inferius ano stimula copiosis purgationibus ejiciantur.

34. Utrique ad latus emulgentes arteriæ horizontali directione primo incedunt, deinde substantiam renum ingressæ, & superiores & inferiores renum partes tranant muriaticos ichores a sanguine glandularum renalium ministerio separaturæ; Vasa siquidem in minimos minimosque ramulos divisa, & per substantiam renum undequaque effusa, tribuunt probabiliter filamenta sanguinis in renales glandulas juxta rationem compositam ex ratione luminum & ratione velocitatum (b); cum autem officia ultima seu lumina sint minima, eo quia vasorum circumferentiæ semper decrescunt in ratione diametrorum, & velocitates pariter minimæ sint in tot divisionibus arteriarum; singula vasa deponent minimas quantitates sanguinis quacunque pulsatione arteriarum in glandulas renales, videlicet filamenta sanguinis guttatim effundunt; cum autem talium glandularum opere sanguineus latex falsos sales præter cæteros abunde separet, quorum figura cubum describit, facile cubici hi sales plane undequaque homologis invicem adaptantur, sicque uniti una cum cæteris crescunt enormiter, & alte in pelvim collecti arenulas, & calculos facile construunt.

35. Inter præcipuas descendunt inferius arteriæ crurales externæ & internæ, utraque amplo foramine donatæ; Interna per femur distributa mutuo nomine poplitea duas in partes æquales divisa, & genu & tibiæ ad pedes usque furculos ibique distribuit; Cum pes totius humanæ machinæ pondus sustineat, necesse fuerat, hunc una cum tibiæ & fibula valide musculorum cingulo armari: tantum opus & onus musculorum egebat grandi vase, quod sanguinem ferret validis muneribus parem. Ibi certe cum harum partium muscoli super cæteros fortiores sint, & per diversas directiones prompti ad motum excurrentes ibi arterias continuo, fortique impetu magis exagitant; & sane talis & continua arteriarum successio necessaria supra modum fuerat; etenim cum sanguis ad has partes delatus magis a corde distet, & velocitas hujus per inclinatos furculos arteria-

(a) Prop. 85. Herman. Phoron.

(b) Per prop. 30. Hermann. Phoron.

rum eo minor esse possit, quo reciproce major est distantia a corde: musculorum validorum actio necessaria fuerat, ut dato majori impetu in inclinatam arteriam, enervatam quodammodo sanguinis velocitatem restitueret; cum enim musculi arterias cruales vestientes motibus suis continuo premant arterias; circulares arteriarum sectiones aut fient minoris sectionis, aut transibunt velut in ellipticas; ex his conjectari potest, ibi posse augeri velocitatem sanguinis ratione quasi reciproca sectionum imminutarum; sic tali methodo fluens sanguis per remotiores quoque corporis partes facilius, citiusque in venas transfertur ad cor denuo reversurus. Experimur itaque quoties otio marcescunt homines negligentia, sive inertia musculorum, infernas partes supra modum sanguine lentefcente intumescere; sic fit œdematosus tumor, & compressæ partes foveam ponunt; fateor quidem non tantum ab imminuta velocitate sanguinis canalium, & musculorum vitio œdema fieri; verum etiam ab impura sanguinis constitutione, cujus vi sulfureæ massulæ in statu inertiae cæteras sanguinis particulas inutili momento urgent. Sanguis itaque beneficio motus cruralium musculorum eam velocitatem acquires, quam tanta a corde distantia abstulerat, urgetur in finitimas venarum fistulas; addito quoque momento gravitatis sanguinis naturaliter descendens.

36. Ut itaque transferatur sanguis ab arteriis in venas, plura conspiciant; primo nempe quantitas impetus impressa sanguini; hæc enim non tantum a momento cordis sanguineo fluidi alte imprimatur; verum etiam a vi descensus per vasa arteriosa, & a motu peristaltico arteriarum descendenti, & musculorum continua vi agentium in subjectas arterias: huiusmodi enim quantitas impetus conservata urget sanguinem, qua data porta, oscula autem venarum, cum proxima sint finibus arteriarum, & aperta remaneant opere fibrarum circularium, credi potest se habere, ut vasa communicantia, sanguinem continuo susceptura; interponitur siquidem finibus arteriarum cum venarum luminibus nexus, & numerus fibrarum, carniū & membranarum non impedimento motus in venas, sed auxilio; enimvero cum fibræ omnes intermediæ suo quoque motu peristaltico donatæ sint, sanguinem ab arteriis jam effusum in motu tenent, & postquam sanguine repleta fuerint exilia illa carniū spatiosa intermedia, facile est credere intermedias has carniū areolas; quotiescunque extiterint fluido jam repletæ, supplere vices planorum horizontalium; quæ horizontalia plana, cum ex demonstratis a magno Galilæo (*de motu*) nihil auferat impetus a sanguine jam descensu ab arteriis; immo multum adjuvant motum corporis transeuntis, seu descendens ab uno vase communicante, seu uno plano in aliud planum, per quod cogitur ascendere; & cum nulla adsint corpora recipientia præter proxima, & aperta venarum lumina, necesse est filamenta sanguinis venarum oscula introire, & ingressa ascendere; sic servato æquilibrio sanguinis descendens cum ascendente sustinetur iustus ordo, & æqua lex sanguinis circulantis, & exeuntis a corde per arterias, & in cor æquabili velut motu per venas ad eandem altitudinem ascendens. Quotiescunque itaque aut vitio fluidi, aut carniū interceptarum impedimento, ut in obesitate sæpiissime accidit, arteriosus sanguis aut ægre, aut inepte venas ingreditur; tunc effusa sanguinis portio carnes aut opprimit, aut inflat; inde erysipelata, aut carniū extremarum œdematosæ intumescunt succrescunt. Profunt secundo ascendenti sanguini per venas valvulæ, quæ frequentes inferioribus, rariores in superioribus venas secant; hæc siquidem cum ascensu sanguini viam donent, descensu impediunt, sustinent onus sanguinis elevati, ne momento suo inferius labatur; præterquam quod huiusmodi valvulæ venis inserviunt, ac si essent vincula, seu specifiçi aggeres, hinc inde dispositi, ne facile a momento sanguinis laxæ venarum tunicæ frangerentur; quod si aliquando accidat, vel copia, vel impetu sanguinis ascendens venarum tunicam, aut laxari nimis, aut rumpi, aut valvulam quamlibet vitium facere, aut flaccescere; tunc laxatis venarum tunicis varicosæ fiunt venæ impedimento sanguinis ascendens, & gravi onere musculorum. Tertio succurrit ascensui sanguinis unio, & contactus arteriarum cum tota longitudine venarum; dum enim arteriæ dilatantur diastolem ferentes, iuxta rationem arteriæ dilatata, venæ portio, quæ arteriam dilatam tangit, in ea ratione contrahitur; quare sectio venæ compressæ non amplius circularis erit, sed describet segmentum circuli; sanguis idcirco, qui per circularem venæ sectionem ducendus fuerat, cum per segmentum circuli iturus sit, necesse est hunc alte urgeri, & impelli majori velocitate sursum, ubi data est latior & facilior via; etenim cum venæ deorsum semper magis magisque stringantur, sursum vero magis magisque dilatentur, & ultro impetus sanguinis adveniens versus superiora detrudat sanguinem, fas est fluidum in segmento circuli restrictum, ac compressum sursum esse velocius ad ascendendum. Quarto huic ascensui sanguinis manum affert venarum unio inter se, efformans majores alveos, seu in venarum ascensu componens majores truncos venarum; sicut enim trunci arteriarum in plures, pluresque ramulos dividuntur descendendo, ita plures viceversa, pluresque rami venarum cum ramulis arteriarum communicantes progressu suo ascendendo uniuntur, & componunt majores alveos, seu truncos venarum, qui eo pauciores sunt ramulis venarum minimarum, quo sunt capaciores in ratione sectionum; sanguis propterea ab huiusmodi minimis venis exceptus, in ramos majores eandem transfertur; verum cum rami majores sint veluti majores alvei, quorum officium est communi amplexu excipere a minoribus varias, diversasque quantitates sanguinis; proculdubio velocitas sanguinis in ramis majoribus, & momentum ejusdem majus erit, ac fuerat in minimis venis; quannobrem collecto sanguine in trunco maximo venæ cavæ, cum porportionali augmento velocitatis dextro ventriculo tribuitur, proportionali ordine, ac homologa velocitate, qua prius expulsus fuerat e sinistro; sic motum sanguinis per venas naturali jure natura regit; cæterum si impurus sanguis ponderosior fiat, aut nervorum injuria spasmodicis motibus venæ crispentur, aut tuberculis, aut polypis stringantur venarum sectiones, statim mutatur ordinata lex motuum, non servatur opportuna velocitas, nec debita quantitas æquali tempore cordi tribuitur; hinc ortæ palpitationes, inæqualitates pulsuum, & aliquando lipothymia animal miserime torquent; præterquam quod cum venosus sanguis aut vitio sui, aut organi resistentiam afferat sanguini subsequenti majorem, quam par est, momentum resistentiæ paulatim arterioso sanguini secuturo communicatur; sanguis propterea arteriosus cum fluere ægre debeat, nec resistentiam venosi sanguinis superare facile possit, ar-

Sydenham Opera Medica.

terias ad majores sectiones nimio sanguine turgidas violenter extendit, & quodammodo retropulso sanguine pulsant violenter hypochondria; & arteria cæliaca, ut in hypochondriacis & hysteriis affectionibus accidit, alte quatit circumposita viscera, molestiam ventriculo, & internas aliquando inflammationes paritura.

37. Quænam autem sit methodus, aut ratio lineæ motus, quam describit ascensus sanguinis per venas, nondum a nonnullis, quod sciam observata est; juxta tamen naturæ leges verisimile putaverim, sanguinem per venas pressionis seu impulsus motu valide quoque sursum urgeri, & filamenta sanguinis ascendendo describere, ut plurimum lineas ab axe venarum divergentes. Cum enim sanguis sit grave fluidum, & ratione propriæ gravitatis conetur descendere, vi autem & impetu cordis fortiter sursum impellatur, cumque major sit vis illa & validior, quæ vi cordis sursum impellit, minor vero & debiliior, quæ solo momento gravitatis sanguinis deorsum sanguinem urget, sanguis sursum movendus erit juxta rationem excessus momenti cordis sursum urgentis, supra momentum sanguinis deorsum prementis. Deinde cum doctissimus Verheyen (a) venarum tunicas æquali numero, eademque fere structura esse, ac sint tunicæ arteriarum, licet primæ secundis tenuiores sint, ostendat; cumque ex Diemerbroekio arteriarum fibræ nonnullæ transversæ sint & obliquæ, etiam venarum tunicæ a fibris quoque transversis & obliquis vestiendæ erunt, ut lib. 7. de Venis contra Lindanum aperte decrevit; quare cum præter hunc fibrarum ordinem, manifestus quoque appareat ordo fibrarum circularium, proculdubio cum vasa continentia mobilia, contentis corporibus motus suos imprimant, & contenta corpora sequi etiam necessario debeant leges motuum impressas a canalibus continentibus; idcirco ex hisce motibus eodem tempore sanguini impressis eveniunt quidam motus pressionis, seu impulsus ex hisce compositus, qui cum non totaliter rectus sit, sequetur, naturam movere filamenta sanguinis lege motus ex hisce composita, per lineas nempe inclinatæ, aut quodammodo ab axe venarum divergentes; & sane cum venosi canales a strictis in latas sectiones ascendendo semper magis magisque conice aperiantur, sanguis ascendens, dum a stricta sectione in ampliorem devenit, necessario filamenta sanguinis spatia illa conica, aut quasi conica occupatura deflectere debebunt ab axe, & describere lineas quodammodo inclinatæ: cum enim pauca sint filamenta sanguinis, quæ per lineam axis, aut huic lineæ parallelam possint excurrere, in huiusmodi spatio quasi conico, certe fere omnia sanguinis filamenta per aperta magis spatia sursum decurrendo per inclinatæ directiones itura sunt; huiusmodi autem ratio motus videtur præ cæteris motibus naturæ convenire; cum enim ascensus corporum per rectas naturæ asperum sit ac grave, per inclinatæ vero faciliior ac levior: certe massa sanguinis per venas sursum ascendenda, per inclinatæ aut quasi inclinatæ lineas motus commodius movenda fuerat. Ex huiusmodi autem inclinato motu particularum sanguinis ascendens, particulæ massam sanguinis componentes necessariam sibi agitationem, ac opportunitatem mixtionem conservant ac sustinent, de motu per arterias supra expositum est.

38. Eodem autem tempore, quo sinister cordis sinus valido ictu impellit singulis pulsationibus grana sanguinis 305 — per suppositam sectionem descendens arteriæ magnæ, eodem quoque tempore, ut æqua servetur ratio & ordo circulationis, projicit grana sanguinis 174 — ut num. 28. notatum est, per suppositam se-

ctionem arteriæ ascendens; talia propterea ac tanta ascendunt grana sanguinis, sursumque distributa cerebrum consueto flumine irrigant. Ascendens itaque arteria duos in ramos subclavios partitur, quidem adhuc thoracis regionem serpunt, intercostalem arteriam emittunt, quæ ex utraque parte costarum radicibus applicata tria, quatuorque costarum superiorum interstitia munit, vicinosque musculos irreptit; sic exiens a subclaviis mammarias costarum plagas & mammas occupat. Cum huiusmodi arteriæ cordi multum sint proxima, impetum sanguinis validiorem ferunt; movetur itaque sanguis per intercostales, & mammarias arterias celeri motu, & cum cæteris paribus quantitas filamentorum sanguinis effundi debeat in ratione composita ex ratione orificio- rum, & ratione velocitatis ejusdem, proculdubio costæ & intercostales muscoli multum sanguinis qualibet pulsatione cordis excipient facilius; verum cum masculi intercostales sint corpora quædam supra cæteros musculos tenuia, cumque velociori sanguine sint irrigata, opus erit effusum ab arteriis sanguinem per musculorum interstitia facile concrecere, nisi venæ hunc præsto sint excepturæ; prompta itaque inflammatio musculorum intercostalium, & facilis læsio thoracis. Ex huiusmodi vitiis musculares fibræ effuso sanguine saginatæ nimis dilatantur; unde adjacentibus costis aut imminuta, aut ablata libertate motus, costæ neque facile invicem accedunt, neque reciproco motu recedunt, quantum necesse est, quare thorax non elevatus, quantum exigit pulmonum libertas, pulmones ipsos vocat in angustias impedito spatio opportuna dilationis; ex hac pulmonum angustia sanguis per pulmonares fistulas ægre decurrit, & particulæ aeris violenter elaterium sustinentes, & altam respirationem & gravem anhelitum ferunt. Uterius parta inflammatione in musculis intercostalibus dolor lateris cruciet, & sæpe ex pulmonum angustia sanguis, quotiescunque aptus fuerit ad lentescendum, aut pleuritidis aut pleripneumoniæ supplicia animal jugulat.

39. E subclaviis ad caput per collum scandunt duæ arteriæ carotides; quæ utrinque latera asperæ arteriæ, ipsamque tracheam aliquibus, ramis excurrunt: Ibi si contentus sanguis niuraticis salibus nimis oneretur, tunc per huiusmodi fibras effusus asperam arteriam vellicat, urgetque quodammodo in spasmos, quorum vi semicircularis tracheæ sectio, aut imminuta, aut in semiellipticam figuram aequaliter conversa libertatem aeris, aut impedit, aut frangit. Refractus autem aer parta rauedine vocem lædit; præterea ex convulsivo motu fibrarum semicircularium tracheæ glandulis adjacentibus exprimitur falsus humor, aut lymphaticus, aut alterius generis, qui ad subjecta bronchia delatus, hæc angulosis salibus circa proprium axem rotaris alte corrodit, & sæpiissime contumacem tussim, & aliquando in pulmonibus ulcus parta phrissi-

(a) Cap. 4. de Arteriis, & venis.

producit: nec ibi est finis malorum; etenim extrema carotis musculos ossis hyodis, linguam & fauces munit, sic aluminosa & vitriolica quædam salia lentefcente sanguine, has partes & replet, & comprimit; lentus idcirco fit partium motus, & ad majorem superficiem extensæ partes ipsæ deglutitioni male obediunt. In vitio sanguinis incommoda magis timenda affert carotis interna, hæc siquidem donat ramos insignes duræ matri, glandulæ pituitariæ, oculis & auri internæ; reliquum vero carotidis duos in ramos dividitur, quorum minor duræ matri, major cerebro elargitur, & facto cum cervicalibus arteriis conjugio rete mirabile, & plexum choroideum componunt; quotiescunque itaque sanguis nimio motu peccaverit, violenta & celeri pulsatione meninges exagitat; istæ autem cerebrum, quod tenero amplexu excipiunt, alte violenterque succutiunt, damno non levi, aut hemicraniam, aut cephalæam, aut cephalalgiam allaturæ. Sed de morbis cerebri opportuno examine agendum erit, cum de motu solidorum disputationem habebimus.

40. Interim ex duræ menyngis duplicatura plures componuntur sinus, qui tamen (observante Verhehen, pag. 156. de membranis cerebri) sunt ejusdem substantiæ & usus cum venis; imo sinus isti sanguinem ab arteriis exceptum tandem aliquando in venas jugulares deponunt; cum enim meninges oscillatorio systolis & diastolis motu gaudeant, sinus isti juxta leges oscillatorii motus movebuntur, transeuntes a sectione majori, ad sectionem minorem, sanguinem prætersluentem, & lympham continuo impulsuri; suspicandum ideo hujusmodi sinus non ejusdem omnino usus esse cum venis, sed potius communem usum cum arteriis sustinere; verum non displicebit nonnullis, credentibus tales sinus esse venarum ju-

gularium appendices, & cum venæ portæ oscillantis usu posse comparari; sed flocci puto hæc inquirere. Certum est, menyngum laxitatem ex copia lymphæ, aut ariditatem, ut in senibus, iisque, qui adultero crine caput nymium onerant, necessarium sanguinis & lymphæ motum per sinus menyngum aut minuere, aut impedire; unde apoplexias, aut paralyses supervenire palam est. Jugulares itaque venæ, quarum una externa est, interna altera, aliquando una, aliquando duplici valvula armantur, quæ subclaviam versus descendenti sanguini viam parant, impediunt vero regressuro; Istæ susceptum a sinibus sanguinem subclaviis venis continuo elargiuntur, & hæc trunco venæ cavæ tandem aliquando restituunt, ut in cor completo circulationis æquilibrio revertatur; Ibi autem mirandum est studium naturæ; dum enim subclaviæ inferius diriguntur, non recta seu perpendiculari via descendunt, sed quodammodo inflexæ plana inclinata describunt; cum enim sanguis præcipiti, & accelerato nimis motu ruere non debeat in cor, sed paulatim, placidoque pede ferri debeat, ne cor nimia copia ac impetu obruat, necessarium fuerat naturæ subclaviarum venas taliter dirigere, ut plana inclinata describeret contentum sanguinem, lentiori ac placidiori motu in cor delaturæ. Hic alia superessent enodanda phænomena vasorum sanguinem deferentium; verum cum huc usque exarata, præcipua sint, a quibus colligi facile possunt mechanicæ leges pro enodandis reliquorum morborum causis; ideo hæc satis mechanicas naturæ leges a sanguinis motu desumptas in præcipuis morborum corporis affectionibus patefacient. Imposterum reliquam morborum familiam a *Mechanicis solidorum moribus* exaratam utiliori fortasse studio, ac labore, si Deus dederit, exponemus.



MECHANICES MORBORUM

PARS SECUNDA,

DESUMPTA A MOTU SOLIDORUM.

BENEVOLIS MEDICINÆ TYRONIBUS.



LN Tyrones Benevoli Secunda pars *Mechanices Morborum desumptæ a Motu Solidorum*. Hic horum actiones ac momenta medicæ praxis opere attentissime observata, tres in partes claritatis gratia dividenda esse censui; in quarum prima, *Distractionis*, & *Contractionis* momenta fibris omnibus tum simplicibus, cum compositis communia esse experimentis, & Mechanicis legibus satis ostensa sunt. Ob id speraverim non tantum naturales oscillationes fibrarum omnium colligere posse, verum etiam universales, & particulares ægrotantium sensuum affectiones me esse adepturum. In secunda, pro morboris sensuum internorum affectionibus probabiliore meditatione sollicitus sum, agens obscurissima immortalis animæ officia, quæ cum soli Deo O. M. nota sint, hoc unum pro mercede Philosophi est, tantarum actionum scientiam desideravisse. Tertia denique morbosas affectiones sensuum externorum mechanice molita est. Neque miremini, me neque de succo nerveo, neque de spiritibus animalibus determinatum sermonem habere, cum lex & ordo præsentis instituti sit, morborum causas ac phænomena a mechanicis tantummodo solidorum motibus eruere voluisse; quibus si vultis actiones ac momenta succi nervei, ac spirituum superaddere, non renuam; si nolitis, arbitror vos naturæ, & morborum phænomena satis apte ab expositis solidorum motibus esse affecuturos. Liberum itaque consilium sit, succo nerveo, aut spiritibus animalibus ultro uti velle, aut nolle. Interim me *Tertiam partem Mechanices Morborum desumptam a Motu Februm*, Deo juvante, daturum esse polliceor, ut sic completa morborum omnium Mechanica Deum, & Naturam Mechanicis legibus agentes tum in sanis, cum in ægris animalium operibus unice veneremur. *Valete.*

Ex latione, motuque, & alterna commixtione fiunt omnia, quæ esse dicimus &c. sensuum hæc omnia sunt visus, auditus, olfactus, gustus, tactusque frigidorum & calidorum; quos sequuntur voluptates, dolores, cupiditates, atque timores, alique affectus innumeri quidem sine nomine, nominati quoque permulti genus, aut sensibile sensui cuilibet est cognatum. Omnigenis visionibus colores, omnigenis auribus itidem voces, cæterisque sensibus alia sensibilia cognata similiter adsunt. Plato in Thæteto, sive de Scientia. Quidquid aut sit, aut fiat, naturalibus fieri, aut factum esse ponderibus & motibus. Cicero 1. de Finibus.

DISSERTATIO PRIMA.

De universalibus sensuum affectionibus.



Sicut a pressione cordis fluidorum motus, ita ab actione cerebri motus solidorum habendos esse putans, tantorum motuum debendam cerebro gloriam jure censui. Cum enim cerebrum prima sit animæ sedes, in qua amplissima officia, divina quasi dignitate fiunt, quæ & ad sensum, & ad motum pertinere videntur; cumque sensus & motus nullatenus haberi possint, quin solida corpora specificis motuum differentiis afficiantur, jure arbitrandum est, solidorum motus ab actionibus cerebri esse eruendos: cerebri dignitatem hisce motibus comparatam universæ Græciæ Plato evulgatus est: Inquit enim in Timeo, *Est Caput membrum, reliquorumque membrorum princeps, cui totum corpus connexum. Dii subesse, ac parere jusserunt; excogitaverunt motuum omnium quoscunque esse queant, compos id fore.* Quamobrem de generalibus ibi sensuum affectionibus acturi a specificis solidorum motibus orituris, nonnulla claritatis gratia præmittenda censuimus, quæ res tam arduas clariori ratiocinio patefaciant.

2. Itaque manifestum est, a cerebro oriri nervos, & hos duplici constare substantia, quarum interior medullaris est, quæ a conditiore cerebri materia ortum habet; exterior membranacea, quæ a menyngibus proficiscitur; hujusmodi nervea corpora undequaque mirum in modum effusa motum animalibus & sensum donant, nervea hæc solida vertebrarum foramina egressa, & per animalis machinam distributa in nodos, ac flexus gangliiformes sese frequenter agglomerant, inter quos præcipui sunt plexus cardiaci, intercostales, mesenterici &c. in quibus plurimi nervorum furculi stricte in unum colliguntur, ut inde rursus hinc inde distributi summis naturæ ministeriis pareant. Ibi prætereundum non est, ea ratione, qua muscoli sunt instrumenta motus, ita membranas nervos investientes fore sensuum organa, cum enim musculorum textura, ac figura varia sit, ac diversa juxta varias actiones ac multiplices motus exequendos, quibus destinantur; alii enim trapezii sunt, alii rhomboidei, alii quadrati &c. Ita non dissimili ratione arbitrandum est, membranas omnes non uno fibrarum ordine, ac una methodo constructas esse, in quibuscunque partibus sensui destinatis, sed varia ratione, directione, ac ordine elaborata fuisse cum diversis angulorum inclinationibus juxta diversas sensuum affectiones exequendos, quibus eas natura divino opere destinaverat.

3. Cum membranz nerveis solidis circumscriptæ sint, cæterisque fibris organicis arcte adhæreant, motus membranarum nerveis solidis cæterisque fibris jure communi communicabuntur; verum cum motus communicentur juxta rationes ac vires corporum imprimendum, propterea motus solidorum nerveorum, aliarumque fibrarum erunt motibus membranarum circumscriptarum proportionales.

4. Nervea solida cranium tamen egressa dotantur naturali *Motu Contractionis, & Distractionis*; quibus motibus conantur determinatum contractionis & distractionis gradum, sive statum sustinere naturali temperiei, constitutioni, ac viribus animalis proportionalem, ac sese ad eundem statum naturalis longitudinis restituere, quotiescunque ab opposita vi sive interna, sive externa, sive mixta, seu motu opposito distractionis (sive tamen divulsionis) distracta, aut ad majorem longitudinem extensa fuerint. Hujusmodi motus contractionis, & distractionis idem acutissimo tractatu de villo contractili celeberrimus Bellinus exposuit & demonstravit; inquit enim; *contractionis naturalis*

Sydenham Opera Medica.

nomine, aut ejus oppositæ distractionis hic intelligimus motum illum in compositis corporibus, quo fit, ut eadem composita ab aliqua facultate externa, sed adderem quoque interna, aut mixta, trahente in majorem extensionem perducta sine divulsione, nature vi, sive sponte, sive a seipsis suæ priori longitudini se restituant, si libertati permittantur: dico autem hac super re, contractionem naturalem tam late patere, ut vix unum compositum noverim, in quo illa non vigeat, & paucissimas nature operationes pariter invenerim, ad cujus partes contractio naturalis non sit vocanda. Cum itaque Bellinus motum contractionis & distractionis compositis corporibus communem velit, hujusmodi motus contractionis & distractionis non solidis tantummodo nerveis tribuendus erit, verum etiam quibuscunque fibris organicis, quæ aut a nerveis filamentis oriuntur, aut quibus nervea inferuntur corpora, aut cujuscunque alterius generis. Ex his colligendum est, quancunque fibrarum organicarum conatum ac vim continuo exercere, ut ad naturalem longitudinem sese restituant, quotiescunque a vi aliqua ad majorem longitudinem distracta fuerit; verum cum hujusmodi contractionis & distractionis motus; de vi elastica participes esse videantur; certe omnes, quancunque fibrarum elastico quodam motu ac nisu donatam esse: a quo peristaltici motus oritur, fateri debuerunt.

5. Ne autem ea desint, quæ motus distractionis, & contractionis ideam ulterius confirmare possint, observationes & experimenta offert Bellinus, pollicitus se rem tam naturæ consonam, ac necessariam fore determinaturum; Eligat itaque celeberrimus Auctor chordam musicam, aut metallicam, aut compactam ex carnibus animalium, eamque per eandem rectam lineam, ac per longitudinem ipsius ad oppositas partes trahit, ut tendatur, sine tamen divulsione chordæ; postquam inquit *ad certam quandam longitudinem priori majorem ipsum extendisti, ac tractione desistas, digitosque removeas, adeoque chordam suæ libertati permittas; chorda ex seipsa pariter coit in seipsam per eandem lineam, per quam traxeras, & fit brevior, ac brevior, quousque redeat in eandem longitudinem, cujus erat ante tractionem, in quam postquam restituta est, ulterius non coit in seipsam, sed ab omni motu cessans in sua priori longitudine quiescit. Illam longitudinem in quam venit chorda per tractionem ad oppositas partes appellant distractionem; & facultas, que distractionem producit, dicitur facultas distrahens; motus quo chorda in priorem suam longitudinem restituitur, est id, quod appellatur motus contractionis, vel contractio; & facultas, a qua provenit contractio, dicitur facultas contractionis.* Hæc Bellinus prop. 1. de villo contractili. Verum in hac re fateor me ultra obstupuisse legens metalla ipsa, quantumvis durissima tali motu distractionis & contractionis donata fuisse; refert enim immortalis famæ vir Jacobus Hermannus n. 24. phoronomiæ, ex observationibus Celeberrimi Cassini constat, metalla frigori exposita nonnihil contrahi, & vice versa quoad volumen extendi in locis calidis, & ejusmodi metallorum extensiones, & contractiones; quibus non dubie durissima quæque alia corpora plus minus obnoxia sunt, absque interno partium motu fieri nequeunt. Isaacus quoque Newtonus summum Angliæ Lumen, (pag. 386. princip. math.) testatur & ipse D. Picartum observasse, quod virga ferrea, qua tempore hyberno, ubi gelabant frigora, erat pedis unius longitudine, ad ignem calefactu evasit pedis unius cum quarta parte lineæ: Deinde D. de la Hire observavit, quod virga ferrea, quæ tempore consimili hyberno sex erat pedum longitudinis, ubi soli æstivo exponebatur, evasit sex pedum longitudinis cum duabus tertiis partibus lineæ. Quid plura? Nonne Academia Florentina pluribus experimentis in crystallis & mineralibus ante hos celeberrimos viros (p. 186.) manifeste experta est, metalla & crystallos calore distrahi

& extendi, frigore vero contrahi? Quamobrem si huiusmodi durissima corpora motu distractionis & contractionis donata sunt, quid de mollibus, tenerisque animalium viventium solidis facillime mobilibus docendum erit? certe nullum fore putaverim, qui tam aperta ac manifesta de motu distractionis seu extensionis, & contractionis phænomena in quibuscunque animalium viventium fibris, ac solidis, aut negare, aut de his audeat dubitare.

6. Cum universa corpora sive solida communi motu distractionis & contractionis parere debeant, contrahendo sermones nostros ad specificum motum distractionis & contractionis fibrarum animalium; querere quis possit rationem, ac causam primo naturalem, deinde præternaturalem distractionis & contractionis fibrarum, de quibus ibi præcipue agendi munus nostrum & officium est: quamvis autem hæc ratio, ac causa difficillime erui vere possit, nihilominus ne desit actionibus naturæ ea ratio ac lex, quæ ad enodanda obscura naturæ phænomena probabiliori jure convenire videatur, putaverim præsentibus celeberrimis Viris Joanne Alphonso Borello & Joanne Bernollio a duabus præcipue causis rem tam obscuram me fore affecuturum: Prima itaque causa est naturalis & peculiaris structura solidorum & fibrarum quarumcunque; qualiscunque tamen structura hæc fuerit, cum verum structuræ modum, ordinem, directionem ac figuram earundem determinare nemo usque adhuc ausus sit: In hac re non me latet, summum virum Alphonsum Borellum (a) musculares fibras, ut catenas, ex observationibus musculorum, habuisse compositas ex fibris perpendicularibus & transversis, quæ inter se texturam reticularem efficere videantur; ex hisce fibris tali ratione contextis efformantur areæ, seu machinulæ, quæ flaccidæ sunt, & lateribus suis connivent, quando musculus otitur; extenduntur vero, cum operatur: huiusmodi machinulæ, seu spatia fibrarum muscularium ex Borello rhomboidalem figuram describere visa sunt; verum cum supra laudatus Joannes Bernollius (de motu musculorum n. 2. & 9. & seq.) spatia, seu machinulas fibrarum muscularium non rhomboidales figuras, sed sphæroides vere describere, analytice ostendat, quæ juxta majorem aut minorem extensionem musculorum sphæroides quoque descriptæ modo a majoribus, modo a minoribus angulorum inclinationibus metirentur, colligendum putavi, musculares fibras donatas fuisse motu distractionis & contractionis præcipuo opere, ac labore talium machinularum sphæroidalium, quam rem celeberrimus Michelottus utilissimis animadversionibus acutissime expendit. Hisce præmissis, si liceat suspensionem meam adducere, opinor, me non adeo a ratione alienum esse, si putem, *Menyngum quoque lacertis* musculis aut musculorum officio comparandos, & *Nervos ipsos* similibus fortasse areis, vesiculis, aut machinulis sphæroidalibus, aut fortasse alterius generis esse munitos; & sane si de nerveis solidis conjectari liceat, laudatus Borellus (b) nervum esse fasciculum seu capillamentum ex pluribus filis fibrosis compositum, atque involucri quodam membranoso colligatum, arbitratus est, quæ nerveæ fibræ fistulas esse cavas, repletas substantia quadam spongiosa, porosa ac madida simili porosæ medullæ sambuci virentis, succo quodam elastico irrigatas probabili ratiocinio ulterius suspicandum putavit; itaque si lacerti menyngum analogice musculis comparantur, si spongiosæ porositates nervorum succum quandam elasticum continent, eodemque irrigantur, cur non liceat opinari, huiusmodi poros, areas & cellulas factæ cum muscularibus machinulis analogismo sphæroidales esse, aut alterius similis figuræ, quæ elaterio quodam donatæ modo extendi, modo contrahi potuissent? Natura siquidem una est, omnibusque in operibus fere semper unitate operari consuevit. Itaque menyngum lacertis, & nerveis solidis probabiliter expensis, facile me transfero ad ea, quæ ad motum contractionis & distractionis *Membrarum* & *Tendinum* pertinere videntur. Membranz itaque cum docente Verheyen verosimiliter componantur ex fibris sibi invicem intertextis, fere sicut tela ex filis, quarum altitudo seu profunditas adeo minima est, ut areas spatia seu machinulas necessariæ altitudinis seu profunditatis non continere, aut comprehendere opportune possit, cumque membranæ præcipuo sensuum officio pareant, cui efficiendo non adeo operosum ac laboriosum est, ut nervis, musculisque contingit, qui summis motuum laboribus destinantur: propterea male existimarem, si motus membrarum contractionis, & distractionis a machinulis, seu vesiculis elasticis factos esse crederem; absit itaque opinio hæc locuturo de membranarum sensui præcipue, non motui destinatis. Naturalem ergo motum contractionis & distractionis membrarum primo factum putaverim a successivo motu oscillatorio menyngum, qui successive membranarum correspondentibus communicatur; secundo a motu fibrillarum nervearum, quæ per membranas hinc inde excurrunt; tertio a continua mutatione angulorum, qui a fibris membranas componentibus efficiuntur; etenim cum membranæ componantur ex fibris sibi invicem intertextis, jure textentes fibræ efficient angulos, aut naturaliter rectos, aut acutos, aut obtusos; cum autem fibræ sensui & motui præditæ, motum & impulsus excipiant ab externis corporibus, aut ab interno motu corporum fibras componentium, futuræ erunt quælibet fibræ in porportionali mutatione angulorum, & figurarum inter se; fibræ itaque rectos angulos naturaliter describentes, cum ratione advenientis motus modo descripturæ sint angulos acutos, modo obtusos, modo curvos, necessario quoque fibræ inæqualibus angulis oppositæ modo distrahentur, modo contrahentur; cumque semper remaneat vis illa seu conatus naturalis fibrarum, quo fibræ nonnaturaliter contractæ, aut distractæ ad naturalem statum conantur sese restituere; opinor membrarum fibras excessiva mutatione angulorum, inter se futuras esse in porportionali mutatione figurarum, & consequenter fibras modo contrahi, modo extendi debere. Qualis modo futura erit probabilis causa, qua *Tendines*, licet densissimi sint, suo tamen naturali motu contractionis & distractionis dotari debuerunt; proculdubio tendinum motibus confert vis nervorum, qui per tendines intime serpunt; vis membrarum tendines circumscriptentium; & aliqualis mutatio angulorum, qui præcipue a fibris rectis & transversis, aut obliquis tendines componentibus, ex secuturis motibus musculorum continuo efficiuntur; Potissimum itaque motibus contractionis &

distractionis obediunt tendines, vi & opere musculorum, qui quæ diversis motibus sollicitentur, tendines quoque, quatenus appendices & caudæ musculorum, successivis distractionis & contractionis motibus erunt sollicitandi. Præter cætera, quæ motum distractionis & contractionis in quibuscunque corporibus promovere consuecunt, universale principium est motus intestinus particularum quælibet solida componentium.

7. Cum animalia quælibet non eodem semper in statu virium & actionum perseverent, sed continua actionum, aut naturalium, aut præternaturalium vicissitudine rotari debeant; & cum diversæ vires & actiones a varia temperie fluidorum, ac varia solidorum structura ac motu dimetiri possint, ideo motus seu momenta distractionis & contractionis fibrarum quarumcunque claritatis gratia duplici modo erunt consideranda; Momentum itaque distractionis, & contractionis aliud est *equipollens*, aliud est *præpollens*: *Vis*, conatus seu momentum distractionis *equipollens*, est naturalis potentia, vis seu conatus solidi distrahendi semetipsum ad naturalem longitudinem quotiescunque ab opposita potentia, aut momento contractionis impeditum fuerit; aut sustinendi statum naturalis distractionis intra fines a natura determinatos. Momentum vero contractionis *equipollens* ejusdem solidi, est opposita potentia, vis seu conatus contrahendi semetipsum ad naturalem longitudinem, quotiescunque a vi aliqua distractum fuerit, aut sustinendi statum naturalis contractionis ejusdem solidi pariter intra fines a natura determinatos. Itaque cum huiusmodi momenta distractionis, & contractionis *equipollentia* in perfectissimo naturæ statu haberi tantummodo possint, ideo talia momenta quotiescunque extiterint, semper futura erunt in statu naturali: quare ibi directiones & motus fibrarum erunt juxta naturæ leges inter se, aut homologue, aut reciproce proportionales. In hoc statu vis & robur naturæ perfectissime consistens est; cum enim vires æquales & oppositæ in idem corpus, aut homologue, aut reciproce agentes & reagentes mutuum effectum tollant, aut tollere aptæ sint, res omnes positæ in actione & reactione æquilibrata, debent necessario recte consistere. Hisce ergo momentis *equipollentibus* solidorum felicissime uti possumus, ut accessus & recessus momentorum a perfectissimo naturæ statu quamproxime innotescant, naturales aut præternaturales actiones animalium felici methodo dimensuri; In hoc quoque perfectissimo naturæ statu supponenda jure sunt elementa, & motus fluidorum in exactissima proportionem inter se constituti; sicut autem momentum *equipollens* est semper in statu naturali; momentum *præpollens* aliquam ob causam, sive externam, sive internam, sive mixtam taliter augeri potest, ut fiat præter naturam; Itaque momentum distractionis *præpollens* illud esse videtur, in quo talis sit hujus momenti *præpollentia*, ut momentum *equipollens* contractionis nullam, aut fere nullam rationem habeat cum momento *præpollente* distractionis; hoc autem semper fiet cum læsione operationum, & aliquando, cum divulsione solidorum. E contra momentum contractionis *præpollens* aliquam ob causam sive externam, sive internam, sive mixtam *equipollens* taliter superat, ut fiat præter naturam; ita ut momentum distractionis *equipollens* nullam, aut fere nullam rationem habeat cum momento *præpollente* contractionis, ibi fibrarum actiones læsas esse, nemo negaverit.

8. Hisce præmissis, ut generales sensuum affectiones consequi possimus, primo incumbendum est, ut in doloris examine laboremur. Unus itaque omnium sensus est, solutionem continui præcipuam doloris causam fuisse, & tantum veterum opinio præjudicata potuit, ut etiam usque adhuc veterum valeat auctoritas. Verum doctissimus Borellus (c) evulgatam huiusmodi sententiam penitus studuit evertere, simulque spreta illa doloris causa, quæ in dissolutione texturæ, & compositionis fibrarum nervearum præcipue firmata esse videtur, tandem aliquando a celeberrimo Auctore deliberatum est (d) immediatam doloris causam a vellicatione in nerveis membranarum esse eruendum: Fateor me dubitanter querere immediatam doloris causam, verum cum unicuique liceat eam ferre sententiam, quæ ad enodanda naturæ phænomena probabilius conferre videatur, ausus sum probabiliori ratiocinio suspicari *immediatam doloris causam*, & molestiam sensuum affectionem orituram esse ab *inequali, inordinato & asymmetrico* motu fibrarum membrarum solida nervea circumscriptentium, & consequenter, etiam fibrarum nervearum, aliarumque, quibus arte, & intime eadem membranæ alligantur, quæ porportionem, ac directionem acquirant notabiliter dissimilem, ac diversam a naturali porportionem, ac directionem motus earundem, mutatis naturalibus inclinationibus angulorum inter se, quos fibræ inter se contextæ necessario component.

Hinc juxta varios gradus motuum fibrarum membrarum solidis nerveis circumscriptarum, & juxta varios gradus motuum fibrarum quarumcunque membranarum intime alligatarum, qui magis, aut minus distent a debita porportionem, ac directionem naturalis earum motus, & juxta varias mutationes angulorum earundem, tanquam ab immediata & primitiva causa consequuntur postea effectus: videlicet aliquando solutio continui, aliquando dissolutio texturæ, & compositionis fibrarum, membrarum circumscriptentium, aliorumque filamentorum, quibus membranæ intime alligantur. Quamobrem qui doloris causam a solutione continui, aut a dissolutione texturæ fibrarum student acquirere, minus recte rem agere videntur; cum non causam doloris, sed effectum penitus offerant; minus quidem errare consuecunt, qui a vellicatione fibrarum nervearum, membrarumque, & aliarum, quibus membranæ intime alligantur, doloris & molestiæ causam eruendam putant. Verum cum nonnulla naturæ phænomena præternaturalia, a corporibus vellicantibus excitata sæpe quoque fiant absque ulla doloris affectione, licet dolor aliquando etiam a vellicatione haberi possit, ideo non semper vellicatio pro immediata, & primitiva causa dolorificæ affectionis erit consulto, & uno naturæ jure existimanda, sed pro mediata tantummodo, ut inferius constabit, cum de affectionibus convulsivis sermo fuerit.

9. Ne autem turbetur debitus morborum ordo, cum inter sævissimos dolores ac sensuum molestias emineant dolores capitis, congruum puto de præcipuis capitis doloribus sermonem habere: de *Cephalæa* nempe, *Cephalalgia*, & *Hemicrania*; cum autem cephalæa inveteratum, & continuum; cephalalgia recentem, & diuturnum, hemicrania vero modo unam, modo alteram capitis plagam torqueat, non difficile erit, ab universali doloris causa super exposita peculiare dolorum

(a) Prop. 94. & sequent. Primi Tom. & prop. 215. secundi Tom. de motu Animal.

(b) Prop. 23. Tom. 2. de motu Animalium.

(c) Prop. 205. secund. Tom. de Motu Animalium.

(d) Prop. 27. secund. Tom. de Motu Animalium.

rum capitis causas aperire: itaque sciendum est, & ex parte omnes nervos; duas nempe meninges, nervorum tunicas, pericranium, periostium, musculos & panniculum carnosum esse præcipua subiecta, in quibus huiusmodi dolores firmari consueverunt; itaque cum in corticali cerebri substantia densissimi arteriarum, & venarum ramuli numerentur; si violento aut velociori, sive ob crassitiem lentiori pede iverit sanguis, conicarum arteriarum, & venarum superficies circulares, magis extensæ fient; cum autem huiusmodi superficies augeantur semper in ratione duplicata suarum diametrorum, venæ & arteriæ ad tantas superficies extensæ, distractis organorum fibris, mutatisque naturalibus directionibus fibrarum, una cum naturalibus angulis earundem inter se, urgebunt violenter non solum corticalem cerebri substantiam, verum etiam duas meninges contra calvariam; verum cum resistentia calvariæ validissima sit, coget venarum, & arteriarum superficies, repercutere semetipsas contra corticalem substantiam in ratione composita ex ratione resistentiæ calvariæ, & ex ratione dilatationis & distractionis venarum, & arteriarum ad majores superficies: si itaque huiusmodi vitia continua fuerint cephalæam; si interpolata cephalalgiam; si vero hanc aut aliam cerebri partem irritaverint, hemicraniam erunt paritura. Verum præter hæc alia fortasse methodo dolores capitis querendi sunt; etenim cum dum meninges contrahuntur, cor dilatur, & cum hæc cerebrum circumscribant, eo tempore, quo volumen sanguinis in statu naturali a corde expellitur una systole, meninges impulsæ elevabuntur, diastole vero cordis subsequente meninges motu veluti reciproco deprimentur. Cum vero motus iste naturalis depressionis quodammodo fieri videatur non tantum a momento naturali gravitatis meningum, verum etiam a motu seu conatu quodam lacertorum, (quos celeberrimus Pachionus in dura præcipue meninge observaverat,) quorum vi membranarum fibræ quodammodo in rugas ac plicas compositæ intra sese recipiunt; motus autem naturalis elevationis fiat motu quodam distractionis, vi cuius fibræ a momento sanguinis impulsæ distractionem pati coguntur; idcirco si accidat, aut nimio impulsu sanguinis, aut nimia feri colluvie extensas præternaturaliter fuisse lacertorum areas, aut glandulas, etiam motus depressionis, seu contractionis meningum, & succedentes motus elevationis seu distractionis earundem futuri erunt adaucto momento gravitatis dissimiles & asymmetri. Cum autem iuxta tam dissimiles & asymmetros motus distractionis & contractionis meningum, fibræ meningum inordinatis directionibus & asymmetris motibus distractæ componere debeant angulos a naturali inclinatione dissimiles; sic mutato naturali parallelismo fibrarum inter se natura pati conabitur, & capitis dolorem modo leviori, modo graviori molestia sustinebit. Serum ulterius aut lentiori pede procedens per innumera vasa lymphatica, aut asperis corporibus munitum moleste afferendo inordinatos, inæquales & asymmetros motus organorum & fibrarum, externas aut internas capitis plagas alte feriet vulnere, aut continuo, aut interpolato, & variæ fient dolorum capitis differentiæ. Hæc, & quæcunque alia extranea, ut vermes, fungi & sylvestres succi, si in regione capitis tyrannidem suam primo exerceant, idiopathicos dolores; si vero extra regionem capitis, ut in stomacho, utero, cæterisque visceribus consensu gravi, cerebrum torqueant, symptomáticos dolores moleste parturient.

10. Modo a doloribus capitis sentio me eam in arenam vocatum esse, ut cum affectionibus convulsivis medicam controversiam acturus sim: cum autem num. 6. *naturalis causa distractionis & contractionis* satis explicata fuerit; huius opportunitati loci convenire videbitur, si prius universalem præternaturalis momenti distractionis & contractionis solidorum rationem ac causam attulerim, antequam de convulsionibus peculiarem sermonem habeam. Eligo itaque plexum nervum mesentericum, unum nempe ex tot nervis plexibus, in quibus facile crederem potissimum firmandam esse sedem ac basim motuum solidorum nerveorum a plexibus exeuntium, tam naturalium, quam præternaturalium, (quidquid autem de plexu mesenterico locutus sum, proportionaliter de quocunque alio plexu, aut de quolibet alio nervo solido intelligendum erit:) sit ergo plexus nervus mesentericus compositus ex unione, & aggregato plurium nerveorum solidorum in statu naturali; apertum est, aut vitio succi nervei, aut feri supra modum fluentis interstitia plexus nervei repleti taliter posse, ut naturalem fluidorum copiam angulos plus justo salibus gravem, ultro superent; sic solidum tali fluido æqualiter repletum dilatabitur ad majus spatium, seu volumen. Cum autem nerveum solidum in statu naturali, & idem solidum in statu præternaturali habeantur, ut duo solida similia, & distantia fibrarum, seu interstitia solidum componentia sint lateribus solidorum homologis proportionalia, solida autem similia crescunt in ratione triplicata laterum homologorum, certe solidum nerveum in statu naturali, & idem solidum in statu præternaturali erunt inter se in ratione triplicata amplitudinum interstitiorum, seu distantiarum, quas fibræ solida componentes servant inter se: Quare si fluida, seu massæ tanquam cunei præcise, & secundum se consideratæ in interstitiis solidi nervei absque motu elastico communicato ab aliis corporibus sibi unitis æqualiter contentæ in iisdem interstitiis pro statu naturali fuerint, ut unum; postmodum vero a massa corporum præternaturaliter effusa, distantia seu interstitia fibrarum solidum componentium dilatata, & extensa fuerint ut 2. erit solidum nerveum in statu naturali ad idem solidum nerveum in statu præternaturalis extensionis ut 1. ad 8. nempe proxime in ratione cubica interstitiorum, seu distantiarum fibrarum inter se; quare solidum nerveum præternaturaliter extensum erit octuplum solidi ejusdem nervei naturaliter extensi a corporibus, seu materia contenta, ut unum. Cum autem solida huiusmodi decurtari jure debeant in ratione proxima secundum longitudinem, quotiescunque dilatantur in aliqua ratione secundum latitudinem, licebit colligere ex præternaturali dilatatione plexus nervei, ramos nerveos a plexu hinc inde exeuntes decurtandos fore in ratione probabiliter proxima 1. ad 8. Ex his ultro res agenda est; cum enim fluida seu massæ æqualiter contentæ tanquam cunei inter interstitia plexus nervei elasticis corporibus, & particulis quoque præternaturaliter effervescentibus unitæ sint, quarum vires, ac inomenta elastica summa esse experimur ad augendos impetus, percussiones, & conatus contra fibras plexus nervei præternaturaliter extensi a materia præcise considerata absque motu elastico, communicato ab aliis corpo-

Sydenham Opera Medica.

ribus sibi unitis; quis non videt, quanta futura sit vis, conatus, & momentum plexus nervei ad nerveos ramos ab ipso exeuntes violenter trahendos versus plexum præternaturaliter dilatatum, in ratione videlicet composita proxime ex cubo, seu triplicata ratione interstitiorum, seu distantiarum fibrarum inter se, & ex motu elastico corporum effervescentium; a quo momento validissimæ resistentiæ erunt enixe superandæ? Quamobrem cum interstitia fibrarum corporibus extraneis æqualiter repleta, seu distantia fibrarum inter se sint lateribus homologis solidi proportionales, erunt simul sumptæ æquales, aut quasi æquales homologæ radici solidi præternaturaliter extensi; quare si talis radix fuerit — b; erit solidum nerveum præternaturaliter extensum proxime in ratione cubica eorundem interstitiorum, seu distantiarum fibrarum inter se ob materiam ibi ultro contentam, nempe erit proxime ut b 3: quod si vis & conatus elasticitatis corporum contentorum effervescentium, aut inflando, aut impellendo magis, magisque fibras plexus nervei vocetur e; momentum autem plexus ejusdem præternaturaliter extensi vocetur m, erit m — b 3 + e. Hæc quæ dicta sunt, ostendere videntur, quanam sit ratio ac causa sive externa, sive interna, sive mixta, quarum vi momentum naturale æquipollens plexus nervei, & ramorum nerveorum transire necessario debeat ad præternaturale momentum præpollens eorundem, cujus momenti opere plexus nerveus, & rami nervorum ab ipso exeuntes apti fiunt non solum superare momentum oppositum contractionis eorundem, verum etiam validissimas resistentias musculorum, tendinum, & ossium, quibus omnibus nervæ ramificationes arte alligantur, aliorumque ponderum oppositorum, quod certe praxin medicam agentibus mirabile est. Agendo modo de *Motibus Convulsivis* cum sanitas & naturalis solidorum motus non solum nitantur in proportionem corporum fluida componentium, verum etiam in determinato ordine, directione naturali solidorum, & determinato motu eorundem, una cum naturali inclinatione angulorum, quos fibræ inter se contextæ naturaliter componunt, & cum æquali, aut reciproca actione & reactione momentorum distractionis earundem inter se: quotiescunque hic naturalis motuum & actionum ordo, & lex præternaturali opere mutabuntur, tunc convulsivæ affectiones contingent. Cum itaque tot morborum causæ, aut a præternaturali dilatatione, aut inflatione solidorum, aut motu oriri consuecant; si aut vitiosis succi nervei, aut a sanguiferis, aut a lymphaticis canalibus evomantur præternaturales succi asperis superficiebus donati in aliquo spatio membranoso, aut nervoso, aut quocunque alio solido sensibili contenti, ibi certe tanquam cunei ingressi spatia solidorum violenter sollicitabunt, extendent & inflabunt fibras solidorum componentes, spatia autem plexus nervei (puta mesenterici jam suppositi) ab extraneis corporibus ultro repleta, impediunt facilem transitum fluidorum naturaliter prætereuntium, inde facta mora corporum ingressorum hypostasis major futura erit, quam par est. Cum autem sylvestres succi solidum supra naturæ leges ingressi dilatent præternaturaliter solidum illud, proxime in ratione composita ex ratione cubica, seu ex ratione triplicata interstitiorum, distantiarumve, quas fibræ habent inter se in statu extensionis naturalis, & ex ratione corporum elasticorum plexum nerveum influentium; proculdubio cum filamenta nervea a plexu exeuntia, & hinc inde effusa tantum proxime trahi debeant versus plexum præternaturaliter extensum, quantum plexus nerveus a præternaturalibus succis ultro extensus fuerat; idcirco filamenta illa nervea a plexu exeuntia violenter trahentur versus partem plexus in data ratione dilatati; cum autem filamenta illa nervea muscularis, tendinibus & ossibus arte sint alligata, musculi quoque, tendines & ossa, quibus tendines alligantur, in data ratione trahenda præternaturaliter erunt, sicque hac ratione præternaturales contractiones organorum & motus convulsivi solidorum exorientur; ex his si extensio & dilatio plexus nervei a corporibus ingressis ea ratione fiant, ut æqualiter & omnibus in partibus æqualis, & unimoda fiat præternaturalis sollicitatio, percussio & inflatio, cum æquali & unimoda dilatatione singulorum interstitiorum, & distantiarum fibrarum plexus nervei præternaturaliter extensi, etiam filamenta nervea a plexu exeuntia æqualibus viribus, æquali, & unimoda conatu, ac momento æqualiter & unimode trahentur versus partem plexus dilatati. Si itaque singulæ fibræ componentes solida nervea a plexu gangliiformi exeuntia, & illæ quibus solidum unitur naturales semper directiones, ac naturales parallelismos sustineant inter se, easdemque fervent naturales angulorum æqualitates ac similitudines; tunc cum fibræ singulæ solida componentes artrahantur versus plexum cum angulis, aut æqualibus aut similibus, temporibus quoque æqualibus fibræ ipsæ transeundo singulis temporibus ordinata, unimoda & æquali lege, ab una æqualitate, aut proportionem, aut directionem motuum fibrarum & angulorum ad aliam priori aut æqualem, aut proportionalem, non afferent ullos dissensus vel ullam asymmetriam in totis motibus fibrarum solida componentium; & consequenter cum singulis temporibus naturalis fibrarum parallelismus sustineatur, attractio quidem convulsiva fiet solidorum versus partem præternaturaliter extensam, sed ordinata, unimoda, æqualis, & isochrona, atque nulla videbitur contingere molesta organorum affectio, aut dolorifica passio solidorum sensibilium: & sane, ut habeatur ratio veritatis; si conatus, vis, momentum & quantitas motus unius fibræ in uno solido (idem intellige proportionaliter de quibuscunque aliis partibus, quibus solidum idem unitur) una differentia temporis fuerit ad quantitatem motus, seu momentum ejusdem, aut ulterius fibræ homogeneæ, & qualis magnitudinis æquali tempore, & in eodem solido, ut est momentum, & quantitas motus primæ fibræ altero tempore ad momentum, seu quantitatem motus ejusdem, vel alterius fibræ homogeneæ secundo tempore, & sic proportionaliter successive erunt (per 12. 5.) singula momenta & quantitates motus unius, aut alterius fibræ homogeneæ iisdem temporibus & in eodem solido, ut sunt omnia momenta & conatus simul sumpti primæ fibræ, ad omnia momenta & conatus simul sumptos secundæ fibræ ejusdem solidi, iisdem temporibus; sed quando conatus & momenta unius, aut alterius fibræ homogeneæ solidum componentis sunt æqualia, aut proportionalia momentis ejusdem, aut alterius fibræ homogeneæ solidum componentes temporibus æqualibus, & sic de cæteris &c. momentum quoque & quantitas motus totius solidi est semper singulis temporibus sibi metipsis æqualis, aut proportionalis, quare cum natura in hoc statu singulis temporibus justam proportionem; æquam directionem motuum fibrarum, & parallelismum

lissimum naturalem earundem cum æqualitate angulorum æquabiliter, & unimode usque adhuc sustineat; certe actionibus & reactionibus proportionaliter se habentibus nullam in se molestiam ac dolorificam affectionem, (& si convulsio fuerit) pati poterit ac sustinere. Et sane, ut verum fatear, sæpe miratus sum medicam praxin agens, convulsivas affectiones absque ullo dolore ægros agitavisse, plurimas enim hystericas, & hypochondriacas affectiones, & convulsivas, pluresque spasmodicos subsultus aut motus, inter quos *Satyriasis*, sine ullo dolore partos observavi: Itaque ex his colligendum videtur, quotiescunque plexus magnus mesentericus nonnullos furculos per mesenterium & intestina; nonnullos vero ad truncum aortæ descendentes; nonnullos ad ovaria feminea emittat; & hic plexus æquabiliter, & unimode in omnibus suis partibus plexum componentibus sollicitatus, percussus & extensus fuerit a fluidis præternaturalibus plexum eundem æquabiliter & unimode instantibus & dilatantibus; tunc momentum plexus nervei æquabiliter, sed præternaturaliter dilatati trahet proxime in data æquabili ratione non solum furculos quoscunque ab illo exeuntes, sed & fibras quasque furculos ipsos componentes versus plexum nerveum præternaturaliter extensum; cum autem momentum tale plexus nervei proxime æquetur singularibus momentis simul sumptis tractionum fibrillarum nervearum ab ipso exeuntium; propterea singularia momenta simul sumpta (a) tractionum, quibus æquabiliter, sed præternaturaliter trahuntur, non solum furculi nervei, sed singulæ fibrillæ furculos nerveos componentes per mesenterium & intestina, per truncum aortæ & ovaria a plexu exeuntes versus plexum nerveum, æqualia erunt momento totali plexus magni mesenterici præternaturaliter extensi; cum porro momentum totale plexus nervei suppositum fuerit supra $b_3 + e$; si momentum singulare furculorum & fibrarum nervearum furculos componentium per mesenterium & intestina effusum supponatur p ; momentum vero furculorum nerveorum & fibrarum furculos componentium per aortam descendente singulariter supponatur r ; momentum autem singulare furculorum nerveorum & fibrarum furculos componentium ad ovaria emissos supponatur f , erunt proxime singularia momenta simul sumpta $p + r + f = b_3 + e$ & consequen-

ter momentum singulare p erit $\frac{b_3 + e}{1 + f}$, & momentum singulare referit $\frac{b_3 + e}{p + r}$; cum

autem ex æquabili, sed præternaturali dilatatione plexus nervei magni mesenterici æquabili quoque ratione trahantur rami nervorum ab illo exeuntium; & singulæ fibræ ramos ipsos componentes versus eundem plexum; in hoc statu cum huiusmodi tractiones sint singulis temporibus ordinatæ, unimodæ & æquabiles inter se & isochronæ, nullam doloris molestiam (& si convulsio fuerit,) erunt allaturæ. Unde praxi medica expertum est, hystericas mulieres, hominesque hypochondriacos aliquando abdomine tumefactos, & feminas utero quodammodo attractas sine ullo dolore extitisse, sed muta tantummodo afflictione una cum aliqua pulsuum inæqualitate, & stomachi languore vexatas fuisse. Habita inde ratio est, cur inflatis, extensis & sollicitatis æquabiliter & unimode in singulis partibus nerveis furculis per ovaria & uterum emissis opere præternaturalium succorum nerveos hos furculos undique, sed æquabiliter dilatantium, aut sollicitantium, fieri aliquando possit ratione nervorum & fibrillarum eorundem ascendente non gravisensatio, (licet convulsiva) in abdomine, intestinis & stomacho cum pulsuum aliquali inæqualitate, sed tantummodo affectio quædam sine dolore, quam universalem corporis languorem appellare mulieres consueverunt.

11. Verum si a præternaturalibus fluidis plexus nervei, aut quilibet sensibilia organa sollicitentur & dilatentur quidem in super exposita ratione composita; sed non æquabiliter & unimode in omnibus suis partibus componentibus sollicitentur & extendantur, ita ut pars una organi magis sollicitetur & extendatur, quam altera, fibris inæqualiter sollicitatis, aut extensis; tunc momenta præternaturalia præpollentia corporum extendentium fibras tali inordinato motu, & dissimili ratione, ac asymmetra proportionem inter se violenter agendo contra momenta naturalia, & æquipollentia fibrarum earundem, necessario fibras omnes nervosas, membranofas & musculares, cæterasque, quibus illæ alligantur, violenter & inæqualiter trahent versus partem inæqualiter & asymmetre dilatam, & sollicitam a fluidis præternaturaliter ingressis, motibus asymmetris fibrarum, & directionibus inæqualibus earundem; consequenter permutabuntur naturales anguli, & naturales parallelismi fibrarum, & organorum inter se, mutatis quoque fibrarum naturalibus directionibus: Quamobrem in hoc præternaturali statu facile crederem, affectiones convulsivas asymmetris & dissimilibus motibus fibrarum agentes, cum dolore ac spasmio esse copulandas. Itaque ex his colligendum putavi, immediatam doloris causam non a præternaturali extensione & sollicitatione habendam esse, ut *sollicitatio & extensio* est; sed quia a sollicitatione tali, ac tali extensione organorum sensibilibus fir inæqualis, dissimilis, inordinata, & asymmetra distractio, attractio & motus fibrarum & filamentorum solida componentium, a quibus mutantur naturales anguli fibrarum inter se; mutatur directio naturalis earundem; turbatur naturalis parallelismus solidorum, & gravi motu invertitur; solida idcirco sensibilia asymmetre, & præternaturali ac dissimili motu modo distracta affectionem convulsivam, sed cum dolore miserrime afferunt; quare jure putaverim, præternaturalem extensionem, inflationem & sollicitationem solidorum sensibilibus mediatam tantummodo doloris causam esse futuram, ut simplex extensio & sollicitatio est; & sane ut hæc omnia experimentis probanda sint, confessus est mihi vir animo & ira potens, qui cum ab hoste sclopeti ictu in regione tamen minus principe femoris vulneratus esset, nullum pro ea temporis differentia dolorem sensisse a tanto ictu percutiente & sollicitante, ita ut per aliquod tempus sanum incolumemque se crederet; verum tractu temporis distractis notabiliter nonnullis fibrarum ordinibus, nonnullis vero contractis, & mutata fibrarum directione naturali parallelismo earundem cum inæqualitate, ac dissimilitudine angulorum, quas fibræ inter se contextæ componunt, dolor, & quædam convulsio species supervenerunt. Itaque dolor non fieri videtur ab irritatione, seu sollicitatione, & violenta extensione tanquam a causa immediata, ut irritatio seu sollicitatio,

& præternaturalis extensio est organorum; sed quia ab irritatione, sollicitatione & præternaturali extensione subsequitur postea effluxus fluidorum in partem læsam, quæ præternaturaliter dilatent eandem; hinc sequuntur momenta distractionis in aliquibus, in aliis vero fibrillis momenta inæqualia contractionis dissimilia & asymmetra, cum inæquali & dissimili & improporionata directione, ac motu earundem; mutato ulterius naturali parallelismo filamentorum componentium membranas, nerveos, musculos, tendines &c. Deinde fateor, me in nobilissima Moniali frequenter observasse convulsivas affectiones; in qua si pollex pedis convulsus tantummodo esset, levissimosque dolores agra sustinebat; e contra fere nullos quotiescunque tota pedis regio æquabiliter & unimode convulsa traheretur. In hac re nonne chirurgicis experimentis manifestum est, vulnerato nervo, aut læsa membrana nervum investiente, cujus aliqua tantummodo pars fibrarum læsa sit, aut abscissa, integra autem manente altera fibras nonnullas inæqualiter, inordinate & asymmetre distractas, nonnullas vero contractas motibus asymmetris, mutata fibrarum naturali directione, ordine ac parallelismo, cum mutatione angulorum a naturali inclinatione dissimilium, spasmos convulsivos ac dolores acerrimos attulisse: qui non nisi rescisso omnimode nervo (cujus rescissionis opere omnes fibræ componentes æquabiliter contrahuntur) tuto ægri solutis doloribus quiescere consueverunt. Antequam autem de hac tabula manum avertamus, remanet animadvertendum, vim, conatum & momentum fibrarum distractionis & contractionis præpollentiam aliquando actionis esse supra momentum æquipollens distractionis earundem, ut fibræ tam violenter distractæ, aut contractæ, fibrarum & organorum læsionem aliquando attulerint, ut divulsionem earundem miserrime ægri passi fuerint; Id semel animadverti in nobili Juvene annorum 20. qui cum satyriasi & febris correptus esset sine dolore, post sex dies facta notabili solidorum divulsione, & secuta magna sanguinis effusione per alvum, enervato priapismo, sed versus regionem hepatis dolore superveniente adacta ulterius febris post triduum obiit. Ibi autem prætere non licet nonnulla, quæ a chirurgicis observationibus desumpta summo opere & theoriæ & curationi convulsionum conferre videntur; observatum enim est sæpissime vulnera capitis ex dextra transferre convulsionem in sinistram partem, & e contra. Cum enim momenta contractionis & distractionis pericranii, meningum & lacertorum dependentium per cerebri peripheriam in statu naturali debeant esse ex utraque parte inter se æquipollentia; nempe in ratione veluti reciproca cum opportuno æquilibrio & reactionum meningum & lacertorum, totiusque pericranii (quod meningum expansio est;) quotiescunque momenta distractionis & contractionis pericranii, meningum, & lacertorum dictorum ex parte dextra, vel ob externam læsionem, vel ob internum aliquod vitium, aut infirmetur, aut omnino deficient; statim infirmatis lacertis ex parte dextra, lacerti antagonistæ ex parte sinistra acquirunt necessario ea momenta præpollentia contractionis, quæ majorem rationem habeant ad momentum oppositum enervatum contractionis ex parte dextra, & sic convulsiones ex sinistra sequi debent.

Quod si momenta distractionis & contractionis omnino deficient ex parte dextra, multo magis lacerti antagonistæ ex sinistra parte necessario acquirunt ea momenta præpollentia contractionis, quæ summam rationem habent ad deficientia momenta contractionis & distractionis in parte dextra; quare cum momenta contractionis ex parte dextra nullo modo reagere apta sint, deficere supponentur, atque erunt 0 ; & cum momentum contractionis in parte sinistra adeo præpollent, ut quodammodo viribus infinitis æquipollere videatur; ibi momentum præpollens erit multo majus, quam suppositum fuerat supra $b_3 + e$; & consequenter ex partes sinistra enormes attractiones & gravissimæ convulsiones erunt orituræ. Quamobrem cum a tam validissimis convulsionibus & attractionibus in parte sinistra meninges crispatæ substantiam cerebri validissime stringant, & ob filamenta per suturas exeuntia; & per pericranium expansa, & validissime attracta impellatur, urgeaturque substantia cerebri contra cranium soliditatem, propterea necesse est, substantiam cerebri, & vasa quoque venosa & arteriosa in parte sinistra graviter lædi, frangi aliquando, aut lacerari; Hæc quidem ex chirurgicis observationibus aperta sunt, quin imo ultio testatur celeberrimus Vallisnerius præceptor meus (b) a celeberrimo Valsalva accepisse, in hemiplexis etiam læsionem cerebri esse in parte opposita illi medietati corporis, cui gravi fato contigit sensus, & motus abolitio. Hic autem dissimulare non placet, quæ facile quis obijcere posset; si enim solida nervea, muscularia &c. extendantur, & inflentur proxime in ratione composita ex cubo, seu triplicata ratione distantiarum fibrarum inter se, & ex ratione elasticitatis corporum elasticorum, aut effervescentium, extensio & inflatio solidorum adeo alte excresceret, ut exterius quoque animadvertetur, quod non sine magno naturæ damno contingere potuisset. Optima quidem animadversio, intelligat unusquisque, non semper omnes fibrillas solidum componentes adeo inflari & extendi, ut singulæ in data ratione dilatentur; sed extensionem & dilationem aliquando uni, aliquando aliquibus tantummodo fibrillis solidum componentibus contingere potuisse, quibus singulariter extensis, non quidem omnibus, licet dolorifica passio & convulsio superveniret, nihilominus extensio & inflatio non adeo immodice fieret, ut exteriora versus magno naturæ damno foras quodammodo erumperet, & appareret; Cæterum si universæ solidi fibrillæ solidum componentes in data ratione dilatarentur, fateri quidem debuissim, extensiones & dilationes adeo supra legem futuras esse, ut ad exteriora quoque effusæ esse viderentur, quod in magnis doloribus & convulsionibus aliquando visum: Opinor tamen membranam carnosam leniter cedendo opportune impedire, ne aliquando ingentes quoque nervorum musculorum, &c. dilatationes exterius videantur; sæpissime certe audivi, nobilissimam monialem convulsivis doloribus affectam, per exteriora capitis & per abdomen spasmodice extensum nescio quam duritiem hinc inde persensisse, quæ durissimos quosdam nodos æmulari videbatur.

12. Convulsivas affectiones cum dolore, & sine dolore generali quodam ratiocinio usque adhuc investigavimus; modo cum plurimæ adfirmata convulsionum differentia perpendendæ, non arduum putaverim ex firmata universali convulsionum doctrina a singularibus convulsionum differentis brevi me expedire. Itaque primo occurrit *Tetanus*; hæc enim est quædam convulsio species, quæ totum corpus una aggreditur; in hac momentum distractionis, seu tractionis nervorum spinæ per

(a) Ex num. 13. phoron. Hermanni.

(b) Pag. 27. del cervello impietrito.

posteriores præcipue dorsi musculos ac tendines decurrentium adeo violentum est & excedens, simulque momentum contractionis nervorum, quod præcipue per anteriores musculos seu antagonistas ac tendines pectoris & abdominis, adeo pari opposito conatu operatur, ut utraque momenta fortiter & enixe in ratione violenta æqualitatis conentur statum suum distractionis ex parte posteriore, & contractionis ex parte anteriore valida sustinere: In hoc statu deest illa naturalis facilitas ac libertas transeundi facile, ac libere a statu distractionis ad statum contractionis, aut e contra; Quamobrem cum membranæ, nervi, musculi ac tendines, quibus nervea & membranosa filamenta alligantur tonico motu distractionis, & contractionis æquali conatu ac momento consistent, rigidum videbitur stare animal, nec in utranque partem inclinare. Quamvis verum Tetanum nunquam viderim, hujusmodi tamen morbi indolem obtigit mihi observare in muliere, quæ per diem apertis oculis adeo rigida omnino constitit, ut nullatenus flecti in utranque partem magnis licet viribus nitentibus potuerit; paulatim tamen remediorum usu cepit tantillum movere palpebras, & tractu temporis a tam violento morbo febre superveniente liberata est. Frequentior causa hunc morbum miserrime allatura, feri particulis velut cuneis per membranarum nervorum, & musculorum & tendinum interstitia, aut fortasse per glandulas mucilaginosas præternaturaliter effusis videtur tribuenda. Cum enim in hujusmodi solidis massæ fluidorum seu serosa corpora undequaque distributa tanquam cunei horum solidorum interstitiis, ac distantis fibrarum undique inferantur, violentè extendent solida membranosa, nervea, muscularia & tendinosa proxime in ratione composita ex ratione cubica interstitiorum, nempe in triplicata ratione distantiarum fibrarum inter se & ex ratione elasticitatis corporum elasticorum: Si itaque quantitates materiæ seu massæ serosæ in data ratione tam posteriores dorsi membranas, nervos, musculos ac tendines, aut glandulas mucilaginosas circa musculos ac tendines a celeberrimo viro Joanne Baptista Morgagno Anatomicorum facile principe indicatas, (a) quam anteriores pectoris & abdominis &c. præternaturaliter fluendo extendant, ita ut vis posteriorum solidorum præternaturaliter extensorum sit æqualis, & æquilibrata viribus solidorum anteriorum, aut antagonistarum præternaturaliter extensorum, horum vires oppositæ inter se æquipollebunt, sicque momentum præternaturale distractionis solidorum ex parte posteriori æquale erit, aut æquipollebit momento præternaturali contractionis eorundem antagonistarum in parte anteriori, unde præternaturaliter stare ac consistere animal coactum erit. Hac methodo in *Emprosthotono* massæ corporum elasticæ, quotiescunque supra legem fluendo per interstitia anteriorum fluidorum, solida dilataverint in ratione composita proxime ex cubica ratione interstitiorum, seu distantiarum inter se, & ex ratione elasticitatis corporum elasticorum, minus vero extensionem fecerint in posterioribus solidis antagonistis; tunc cum momentum præpollens distractionis membranarum, nervorum, musculorum ac tendinum anteriores præcipue partes decurrentium adeo superet momentum contractionis membranarum, nervorum, musculorum antagonistarum & tendinum posteriores partes occupant, tunc animal in anteriora curvari conabitur. E contra in *Opisthotono* cum massæ corporum elasticæ cujuscunque generis præternaturaliter fluendo per glandulas mucilaginosas, & per interstitia posteriorum solidorum juxta expositam rationem compositam dilataverint, minus vero extensionem fecerint in anterioribus solidis antagonistis; tunc cum momentum præpollens distractionis membranarum, nervorum, musculorum ac tendinum præcipue in partibus posterioribus colli, dorsi, &c. habeat rationem majoris inæqualitatis respectu ad momentum contractionis membranarum, nervorum, musculorum, antagonistarum & tendinum in partibus anterioribus pectoris, abdominis &c. animal certe conabitur posteriora versus miserrime inflecti. Ex his colligendum, quam inepte judicent nonnulli succos tantummodo austeros & coagulantes sufficientes pro harum convulsionum causis exponendis, cum quælibet fluida cujuscunque generis hujusmodi morbosa phænomena producantur sint, quotiescunque solida membranosa, nervosa, musculosa ac tendinosa cum mucilaginis horum glandulis in datis rationibus a quibuscunque massis elasticis & non elasticis præternaturaliter extensa fuerint. Plurimæ remanent convulsionum differentię, quæ cum dolore & sine dolore facile occurrunt; ut *Spasmus Cinicus*, *Syrabisimus oculorum*, *Trismus musculorum mandibularium*; *Risus Sardonicus* laborum; quæ cum differant inter se tantummodo ratione loci; eadem lege momentorum præpollentium distractionis & contractionis poterunt facillime & univoce explicari. Ex his, quæ n. 6., & quæ huc usque dicta sunt de motu contractionis & distractionis solidorum, tam naturaliter, quam præternaturaliter agentium, data proportionem, constare potest, momenta contractionis & distractionis solidorum esse posse radices oscillationum tam naturalium, quam præternaturalium, quæ (juxta tamen naturam & rationem fibrarum) in solidis animalium jugiter eveniunt; idcirco ex his oscillationum phænomena tam naturalia, quam præternaturalia satis opportuna proportionem enodari poterunt.

13. Modo acturus de morbis, quos potissimum a præternaturalibus menynge motibus oriri putaverim, me recte sentire arbitror, si prius de cerebri & cerebelli motibus probabilia quædam dixerim; fere omnes una consentiunt, cerebrum ex pluribus glandulis, cerebellum vero ex paucioribus esse compositum. Licet vero utrumque communi menynge involucro vestiatur; attamen non eadem est cerebri & cerebelli ratio ac status. Exterior enim cerebelli superficies multis quidem gyris ac rugis inæqualis est, non tamen (b) in cerebro, ultro citroque observantur, serie quadam ordinata ab uno latere ad aliud deductæ. Non eadem pariter est directio & ordo lacertorum, qui cerebrum & cerebellum circumeunt; non eadem in utroque æqualis est fibrarum dispositio ac modus. Cum itaque a natura tam diversæ rerum, ac directionum series non frustra, sed divina quadam ratione ac consilio factæ sint, verosimilius crediderim, hæc tam diversa mole, rugis, dispositione membranarum, & directione ac figura lacertorum elaborata fuisse, ut diversis motuum differentiis fibræ cerebri & cerebelli parerent. Sicut enim (c) glandulæ diversa fibrarum textura, directione & ordine muniri debuerunt, ut homologis motibus proportionalia fluida separarentur; ita non dissimili methodo a natura probabiliter statutum est, ut

(a) Animadversione VII. Advers. Anat. II.

(b) Ex Verheyen. pag. 169. Anat.

(c) Ut n. 9. & seq. Primæ partis Mechanicæ morborum.

cum naturales a cerebello, & voluntarii a cerebro motus, & dissimiles sensuum affectiones, actionesque exequendæ continuo fuerint, diversis quoque membranarum, & fibrarum cerebri & cerebelli specificis motibus agerentur. Quamobrem cum menynge, (pia præcipue) cerebrum & cerebellum, fibræque medullares, five primas nervorum radices recte ac intime circumligent, jure sentiendum est, ex determinatis ac specificis menynge motibus, fibras quoque cerebri & cerebelli esse æquali ratione ac motu sollicitandas; & vice versa. Cum enim fibræ medullares cerebri & cerebelli a sensuum, aut internorum, aut externorum affectionibus specificis motibus sollicitari ac moveri necessario debeant; istæ pariter inscriptæ membranæ, seu menyngebis, has tali determinata lege motus moturæ erunt, ut communicato quoque tali menynge motu, sanguinis fluenti per sinus menynge, sanguis ipse ea ratione motus afficiendus erit, quæ fibræ cerebri & cerebelli, & membranæ investientes prius affectæ fuerant. Hæc, quæ generaliter dicta sunt, nos manuducere quodammodo videntur ad ea, quæ de morbis capitis, de *Epilepsia* potissimum dicenda sunt. Cum enim in hac naturales motus ægrè & laboriose fieri, voluntarios vero otiosi, musculos convelli, sensus hebecere, & animæ potentias deficere quodammodo videantur; jure credendum, ex vitiosis extraneisque menynge motibus, alteratoque fluidorum motu fibras quoque cerebri & cerebelli moleste & graviter affici. *Epilepsia* itaque alia est per essentiam, alia vero per consensum; prima quidem in cerebro sedem firmat; secundam vero inferiorum viscerum consensu fere omnes Medici voluerunt. Prima a quibuscunque humoribus oritura est, sed quibus talis ac determinatus inest motus ac præternaturalis superficies (Medicis adhuc ignota) quæ incognitam menynge cerebri afferat sollicitationem; hujusmodi enim fluida hinc inde per cerebrum decurrendo, membranarum & lacertorum musculis proportionalium spaciola, aut machinulas fortasse sphaeroidilibus analogas præternaturaliter inflant, & ignota momenti præternaturalis differentia sollicitant. Membranæ autem, fibræque medullares tali humorum copia ac motu sollicitatis momentum attractionis membranarum majus faciendum est; quod fibrillis cerebri, & nervis, solidis intra & extra cerebri regionem serpentibus gravi consensu communicatum convulsivos motus tribuit, epilepsiam allaturos. Hoc autem momentum attractionis filamentorum nerveorum & membranarum sine dolore futurum erit, quotiescunque ordinata ac simili & unimoda lege, ac æquabili motu factum fuerit, servata naturali fibrarum directione inter se, & naturali parallelismo earundem. E contra molesta & dolorifica epilepsia erit futura, cum filamenta menynge & nervorum inordinatis & dissimilibus directionibus & asymmetris motibus attracta fuerint, inverso naturali fibrarum parallelismo. Ex hujusmodi motibus convulsivis undequaque contractæ membranæ tam a glandulis, quam a vasorum lymphaticorum osculis serosæ saburræ spumæ in modum violentè per os exprimuntur; sed ultro ingravescent symptomata, cum accadat laborum, manuum, palpebrarum, totiusque corporis tremor miserrimus; quæ sæpe adeo solida violentè quatit, ut fracta penitus videantur. Ut autem tam gravis tremorum methodus explicari quodammodo possit, animadvertendum est, menynge connecti fibræ medullares cerebri, & superne leniter cranio opera aliquorum filamentorum, quæ per futuras trajecta in peristolium expanduntur. Istæ pariter membranæ ob plicas ac rugas facile distrahuntur a viribus cum externis, tum internis agentibus, & facile ab opposito fibrarum & lacertorum conatu naturaliter contrahuntur; ea quasi ratione, quæ in motibus musculorum agunt & reagent musculi antagonistæ. Itaque momenta contractionis naturalis filamentorum per futuras exteriore exeuntium, & eorum, quæ cranio hinc inde alligantur, cum nullatenus in otio sint, vim suam & conatum naturalem exercere conantur contrahendo exterius membranas versus cranium; sed blando motu & æquabili. Quod si filamenta antagonistica præternaturaliter inflata & sollicitata fuerint, opus impendent suum, ut asymmetre retrahant membranas ipsas ad partes internas oppositas; & tunc temporis cum fibræ menynge in curvam aliquam superficiem naturaliter inflexæ sint, describent actionibus & reactionibus præternaturaliter reciproce oppositis, eundo nempe violentè & redeundo, veluti arcus præternaturaliter quoque reciprocos. Cum autem in tam angustis ac strictissimis cerebri anfractibus itus & reditus præternaturales fibrarum membranarum sint necessario frequentissimi, ob frequentissimas corporum præternaturalium sollicitationes, pariterque sint minimi: fibræ quoque sollicitatæ & attractæ versus spatia interna cerebri, & eodem reciproco, sed opposito, conatu attractæ exterius versus futuras & cranium, describent veluti arcus præternaturaliter reciproce dissimiles, & pariter necessario minimos ac frequentissimos. Cum autem minimi arcus descripti e reciprocis penduli oscillationibus vel in circulo, vel in cycloide tremulos motus agant & afferant; rationabili analogia judicandum putaverim, convulsivos epilepticorum tremores a minimis fibrarum menynge arcubus, descriptis a frequentissima & minima actione & reactione earundem esse orituros. Itaque cum menynge nervos undequaque circumscribant, & isti undequaque per universam musculorum familiam effusi sint, eam rationem motuum tremulorum nervis & musculis communicaturæ erunt membranæ, qualem ipsæ in cerebro susceperunt. Ex hisce ulterius vitiis lentescit certe sanguis in sinibus menynge, ibique acervata fluidorum quorumcumque saburra non raro timendum, quin fractis canalibus fluida undequaque effusa advehant apoplexiam; sed de hac suo loco. Placet nonnullis, epilepsia causas a noviluniis & pleniluniis sæpissime acceptas querere; ob majorem enim aeris pressionem, aut vim inflantem facile statuere voluerunt, succos & humores talis indolis ac figuræ, aut plus justo separari a glandulis menynge, aut certo quodam præternaturali motu moleste moveri. Verum cum epilepticos insultus extra novilunia & plenilunia sæpissime observata sint, rectius consilium cæpi de noviluniis, & pleniluniis tanquam de prima causa, (cum fatear partialiter posse conferre) esse dubitandum. Altera epilepsia species, quæ per consensum tam gravia affert symptomata ab inferiorum viscerum, ut hepatis lienis, ventriculi & mesenterii, potissimum vero ab uteri vitis eruenda est; quotiescunque enim tali vitiosa ratione sollicitantur nervi illi plexus, aut quælibet nervea solida has partes decurrentia, utpote membranæ induta a menyngebis derivata, ea aliquando distractionum, & contractionum vitia transferent in membranas circumscribentes, ut fibrarum

rum similium consensu tandem aliquando meninges ipsæ ea præternaturali ratione sollicitatæ vitiose in cerebro oscillant, qua supra expositum est, tot incommoda epileptica allaturæ; non itaque mirandum est epilepticos, aphonos, stupidos & immemores, sensuque & motu carentes semper fuisse observatos.

14. A tremoribus epilepticis facile transeundum est ad corporis & membrorum tremores. Medica autopsia non raro edocuit, huiusmodi affectiones, vel in musculis, vel in membranarum ac nervis, vel in solidis ac fluidis elastica vi enervatis sedem habuisse; oportunitatem itaque fuerit de singulis juxta opportunitatem brevi sermone agere. Quod ad musculos attinet, jam evulgatum est a Borello machinulas rhomboidales, & Bernollio sphaeroidales oscillatoria quadam vicissitudine, modo contrahi motibus æquitemporaneis, quæ naturalibus musculorum ordinatis actionibus parere debuissent; aliquando accidit a quacunque causa sive externa, sive interna, sive mixta machinulas illas non ordinato & æquabili oscillationis motu, sed inordinato, & asymmetrico sollicitandas fuisse. Nemo dubitaverit, fibras musculares, quæ tot machinulas sphaeroidales inæqualiter, asymmetre, & frequentissime oscillantes undequaque circumscribunt, has quoque fibras inæqualibus, asymmetris & frequentibus oscillationibus sibi continuo communicatis movendas esse; velit itaque nolit animal, tremulis motibus agitandum erit ex inordinata, & inæquali musculorum oscillatione. Quod ad membranas & nervos spectat, repetantur quæ de tremoribus epilepticis satis clare ostensa sunt; enimvero aut sollicitatione, aut inflatione meningum lacerti in curvam superficiem inflexi, cum distrahi, & reciproca vicissitudine contrahi necessario debeant, eundo, & redeundo, describent iu tam strictissimis cerebri anfractibus arcus plus justo minimos ac frequentissimos, qui cum ex penduli phaenomenis tam in circulo, quam in cycloide observatis tremulos motus producant; certe ex tam membranarum minimo motu distractarum, & minimo motu contractarum reciproca sollicitatione tremuli motus exoriantur. Isti autem nerveis solidis communicabuntur, cum membrana a meningibus derivata nervea solida circumscribendo eas affectiones tremulas nerveis solidis afferant, quas ipsæ prius aut sollicitatione, aut inflatione in cerebro præternaturaliter susceperunt. Confert ulterius tremori elasticorum fluidorum vis enervata, vi cuius naturalis solidorum tensio flaccescere consuevit; dum enim corpora elastica debito virium ac momentorum numero continuo oscillant, solida circumscribentia ea tensione gaudent, qua solida ipsa tonico quodam statu naturaliter extensa aut inflata detinentur. Verum si elastica corpora debito numero deficiant, tot solida, cum nec continuo, nec æquabiliter opportunis viribus extensa, & inflata, naturali ac debita ratione possint consistere, hæc prout elasticis fibris prædita frequenti vicissitudine transibunt ab una parte minimæ dilatationis ad partem oppositam minimæ contractionis. Quare cum huiusmodi reciprocatum motuum minorum oppositorum præternaturalium tremulos motus afferat, necesse erit, ut enervato solidorum & fluidorum elastico conatu ac momento, solida quoque nervea, & muscularia in tremores itura sint; & consequenter labia, manus, palpebræ, & reliquæ corporis partes continua oscillationum reciprocatone a tremoribus sollicitentur. Ita quoque si elastica corpora inertibus aut extraneis corporibus unita fuerint, producentur membrorum actiones mixta ex conatu corporum agentium, & impediendum; cum enim causa aliquem effectum adjuvent in ea ratione, qua ipse augentur, alia vero impediunt, aut minuunt, erunt effectus semper directe ut causæ adjuvantes, reciproce vero ut causæ impediennes, aut minuentes. Quamobrem cum momenta ac vires corporum elasticorum in nerveis, ac muscularibus spatiis naturaliter agere conentur, impediunt vero, aut minuunt elasticas actiones corpora præternaturalia, quibus elasticæ communicentur actiones, musculorum & membrorum seu motus eorundem erunt directe, ut vires adjuvantes corporum elasticorum contentorum in nerveis, & muscularibus spatiis; reciproce vero, ut vires corporum præternaturalium impediendum, aut minuendum actiones, ac motus eorundem. Itaque vel causæ modo effectum adjuvent, vel modo simul impediunt; utraq; tamen & adjuvando & impediendo, nifus & conatus suum exercent; qui nifus ac conatus cum sint præternaturales, nunquam eam inter se proportionem adipiscuntur, qualem natura exigit, ut inter se nifus ac conatus isti æquilibrentur; oportet itaque huiusmodi conatus ac momenta præternaturalia inæqualiter agendo, & inæqualiter reagendo taliter sollicitare membra, ut tremulis & asymmetris motibus & oscillationibus agitentur. Si ergo momenta aliquarum membranarum, aliquorumque nervorum ac musculorum, opere præternaturalis causæ, habeant rationem majoris inæqualitatis respective ad opposita momenta musculorum antagonistarum, aliorumque nervorum, membranarum, tendinum & ossium; cum ex momentorum inæqualitate non possint æquilibrata potentia æqua ratione consistere, erunt facile ex frequentissima actione, & reactione corporum momentorum inæqualium tremulis motibus agitandæ; verum deficientibus hisce musculorum tendinum & ossium momentis facile reparandum erit, si pondus aliquod proportionale tremulis manibus suslinendum addideretur; hoc siquidem ponderis externi augmento actiones, & reactiones præternaturales corporum agentium & reagentium ad naturale æquilibrium restituta, felicissime, ablato tremore, conquiescere debuerunt.

15. Et jam ad eam morbi speciem devenit supra cæteros morbos timendam, *Apoplexiam* videlicet, quarum una fortis est, quæ subito animal interficit; altera vero levior, quæ morbum & mortem protrahit. Ut autem de utraque opportunum sermonem habeam, juvat repetere, quæ celeberrimi viri Joannes Fantonus & Antonius Pachionus de motu systolis, & diastolis meningum aptissime docuerunt. Studio itaque naturæ bene se habentis decretum est, motum cordis esse motui talium membranarum proportionalem; cumque isochronus esse debeat naturalis motus cordis & artiarum, isochronus quoque meningum motus futurus erit. Magnis autem visibus moveri meninges supra statutum, potissimum vero uni infertur homologo, nempe impulsui sanguinis per universa cerebri vascula; præcipue vero per fines meningum, ut ab his sanguis per venas in cor proportionali quoque motu circumeat restitutus. Si itaque inauspicato acciderit, aut a glandulis meningum a supra laudatis viris Fantono & Pachiono feliciter observatis, aut ex nimis effuso sero a canalibus lymphaticis, aut ex nimis violento sanguinis impetu, aut ex quacunque alia præternaturali causa, naturalem meningum texturam, rugas aut plicas vel in tota peripheria, vel

in parte ejusdem gravi fato præternaturaliter laxari, extendi aut rumpi, ita ut omnino deficiant, vel in universa meningum peripheria, vel in aliquo spatio ejusdem reciproca momenta distractionis & contractionis fibrarum, & vis diastolis & systolis earundem; tunc cum in hisce solidis præternaturalis status inertia praviter fiat, sanguis & quæcunque alia fluida elastica & non elastica enervato, aut deperdito motu variam apoplexiæ speciem erunt allatura. Non eadem tamen futura erit morbi indoles: etenim si spatia meningum aut laxata, aut inertia, aut fracta eas amplectantur ac vellicant nervorum origines, aut ductus eorundem, qui per musculos dextri aut sinistri brachii, dextri aut sinistri pedis excurrunt, sensum & motum hisce partibus donaturi; tunc vel dextrum brachium, vel sinistram, sive dextrum pedem, sive sinistram infirmari, aut impediri necesse est. Cæterum si graviore fato, aut tota meningum regio, aut ea meningum portio, quæ cardiacos nervos ab origine, & toto progressu investit, aut laxetur, aut iners fiat, quodammodo frangatur, tunc statim impedito sanguinis circuitu, cessante motu cordis, forti apoplexia erit animal moriturum. Hinc sæpe in apoplecticis laxatis potissimum cerebri & cerebelli meningibus, quæ fibris medullaribus undequaque alligantur, fibrarum medullarum series, seu progressiones ordinatæ earundem a proportionali ordine, directione ac situ naturali declinare coactæ erunt; fiet itaque motus fibrarum primo iners ac languidus, simulque fibris acquiruntur directiones, positiones ac situs a naturali statu dissimiles, seu inclinationes præternaturales, inversa ratione naturalis proportionis earundem exorietur gravis phantasmatum confusio, & ex potentia memoriæ enervata oblivio. Sed de memoria, & de reliquis animæ affectionibus præternaturalibus secunda dissertatione agendum erit. Interim cum apoplectico insultu correptos, aphonos quoque sapissime viderim, non erit magni negotii opus rem ac causam aperire; laxata enim meningis portio, quæ recurrentibus nervis respondet, iisque per laryngis musculos decurrunt, non eam rationem motus datura erit voci edendæ proportionalem. Verum non a laxitate meningum & fibrarum cerebri oriri apoplexiam tantummodo judicandum est; verum etiam ab ariditate, aut convulsiva crispatura earundem facillime orituram esse credimus; hominibus enim ultimo senio correptis adeo meninges arescunt, ut moveri inepte debeant, & urgere sanguinem opportuno impulsu non possint enervato momento distractionis: pari methodo augeri inertiam motus credendum, si convulsivæ affectiones prohibeant ea momenta distractionis, quæ a natura statuta sunt, sanguis enim & fluida quælibet, cum non æquabili motu, nec ordinato, neque continuo urgeri possint, facillime tam in senibus, quam in convulsis motus cordis & vita ipsa auferenda est. Nonnulli *Apoplexiam per consensum* facile nominant; verum cum quælibet apoplexia semper opus suum funeste in cerebri regione exerceat & compleat, supervacuum putaverim de apoplexia per consensum ulterius dicere.

16. Apoplexia superveniente aut statim moriendum, aut membrorum stupore, una cum abilito motu sæpe paralytice vivendum est: grave tamen onus est, sensus & motus deperditi, aut enervati causam reddere; licet enim celebres Philosophi ac Medici plurima de sensu & motu alte disputaverint, curandum tamen, antequam de paralyti loquamur, de sensu & motu quædam dicere, paralyti necessaria assecuturis. Cum itaque similitudine quæri debeant, quæ vere a natura rerum obtineri non possunt; crediderim primo, rationalem animam adeo intrinsece, arte & intime uniri, applicari & compenetrari viventibus organis, ac sensoriis, ut minori penetratione lumen politissimo, purgatissimoque vitro ac crystallo applicetur, idemque crystallum penetret, quam anima sensoris, organique compenetratur. Hæc organorum opera duas actiones divinitus exercet; quarum prima & eminentis in cerebri fibrillarum motibus se ipsam eximie ostendit, per imaginationem, discursum & memoriam, de quibus suo loco; secunda vero humilior est, quæ membranis nerveis, musculis, &c. indiget pro sensu & motu exequendis, quam hic brevi probabilique ratiocinio inquirendam curamus. Itaque pro sensus organo membranas undequaque construxit, varias texturam, ordine, directione, ac modificatione diffimiles, variis sensuum differentiis proportionales; pro motu vero duabus indiget natura musculorum speciebus præter nervos, quarum altera naturalibus actionibus famulatur: hæcque continenter moveri debet opera fibrarum taliter modificatarum, & fluidorum continue impellentium; altera vero imperio animæ movenda est, ut voluntariis motibus pareat: utraq; tamen, ut apte summis naturæ operibus faveant, æque, perfecte, ordinateque dispositæ, & elaboratæ, purisque fluidis irrigatæ esse debuerunt. Sicut itaque lumen alteratur & attigitur a quocunque latere, angulo, superficie ac motu corporis illuminati; ita similiter anima solidis intime unita ac compenetrata, juxta quocunque motus solidorum diversas patitur affectiones solidorum affectionibus homologas; anima etenim divino quasi lumine donata cum specificis motuum differentias habitudine & usu sentiat ac cognoscat; & cum universæ organorum affectiones a specificis eorundem organorum affectionibus taliter sentire ac cognoscere debuisset. Sentit itaque anima, quæ sensus ipsi sentiunt, & quæ ratione afficiantur sensus, ea animam ipsam affici necesse est; hinc ex tam intimo animæ cum organis vinculo reciproce judicandum, affectiones ejusdem necessario sensibus ipsis communicari, ut quantum ipsa patitur anima, tantum data proportionem sensoris naturaliter se habentibus affectione communicata, opera compenetratio nis, sensoria pati teneantur. Cæterum si organa sensibilia, aut enervata fuerint, aut vitiose modificata, impedita, aut laesa, sensus quoque aut enervati fient, aut torpidi, aut ægri, aut aboliti. Hinc anima ipsa ex enervatis, aut impeditis, aut abolitis organorum sollicitationibus, aut languide, aut vitiose, aut nulla penitus ratione sentire poterit, sensuumque differentias opportune cognoscere. Licet vero sensationes ubique fiant, & animam juxta leges specifiçi motus organorum undequaque afficiant; nihilominus animæ judicium de motuum natura, ratione, ac sensibilibus qualitate non nisi in cerebro, ut regia animæ sede faciendum est; ibi siquidem communicatis organorum motibus, aut sollicitationibus specificis, ac determinatis *Pie Meningi* (quæ sensus communis organum suspicari jure potest) & consequenter fibris ipsis medullaribus, quæ apia nature

cre immediate vestiuntur, anima habitu, usuque exercita, adeo recolligit eas affectiones ac motus, qui sensoria sua, animamque ipsam antea sollicitaverant, ut juxta determinatas rationes motuum, qui sensibus proportionaliter communicantur, hos acutissime, virtute, usu ac habitu acquisitos cognoscere ac judicare teneatur; sed de animæ actionibus suo loco.

17. Hæc breviter de sensu dicta sufficiant. Res paulo obscurior mihi visa est, de motu animalium disputare; cogitanti tamen mihi sæpenumero, & in hac re meditantur occurrant potissimum duæ sententiæ, quæ naturalis & voluntarii motus phænomenis probabiliter satisfacere videbuntur. Urranque hypothetice asseram; unusquisque autem eam amplecti poterit, quæ probabilior fuerit, & quam ad enodanda naturæ phænomena aptiorem fuisse judicaverit, eam imitatus Astronomorum methodum, qua nonnulli per circulos, nonnulli per ellipsim, nonnulli per alias curvarum rationes phænomenis & motibus planetarum apte satisfaciunt (ut de vorticibus cælestibus ostendit celeberrimus vir Joannes Polenus omni laude meritisimus) eundem finem divisa licet methodo adepturi. Itaque jus veritati querendæ me facturum puto, si audeam ad modum hypothese utranque sententiam probabiliter rationis patefacere. Magnum apud omnes, qui recte & graviter judicant, pondus habet sententia illa celeberrimorum virorum Borelli ac Bernollii, voluntarii motus musculorum fieri imperio animæ, quæ per nervos ob subitanæ effervescentiæ spirituum animalium, seu succi nervei & nerveis tubulis effusi sanguini & lymphæ commixti, cujus effervescentiæ impetu extenduntur machinulæ illæ rhomboidales musculorum cum Borello, aut sphæroidales cum Bernollio, contractionem musculorum exercet: ut autem hujus hypothesis idea facilius ac clarius doceatur, putabo rem fore necessariam, si Bernollii ipsamet verba methodo Borelliana elaborata aperuerim. Inquit itaque n. 4. Doctissimus Bernollius: *Iis itaque generaliter assentimur, & statuimus cum Borello, nervos esse congeriem tubulorum substantia quadam spongiosa repletorum, quæ substantia semper turget, & plena est fluido summe volatili a cerebro suppeditato ejus naturæ, ut si cum sanguine commisceatur, subitanæ effervescentiæ pariat. Et hoc fluidum illud ipsum est, quod vulgo spirituum animalium nomen habet: Si anima imperat aut vult, hoc fieri non potest, quin ex necessitate mirabilis unionis, quam Omnipotens Deus inter animam nostram & corpus constituit, & quæ nos hætenus & usque latebit, quin, inquam, fiat in cerebro localis quedam agitatio spirituum animalium, qui vellicando principium alicujus nervi concutiant per totam longitudinem spiritus intra contentos; non secus, ac fit in baculo, cujus extremitate una vel tantillum commota, altera pariter ob contiguitatem partium commovebitur; Sic itaque ab irritatione principii nervei guttula extrema fluidi ad nervos spectantis ex altero osculo levi vibratione ejicitur, & hoc modo ex omnibus aliis nervulorum per musculum dispersorum osculis simul ad nutum voluntatis totidem guttula evomuntur; quemadmodum autem spongia turgida guttulas pendulas effluere non sinit, sic etiam si oscula ista extrema nervorum semper sint patula, guttula tamen fluidi modo memorati sponte, & sine quadam concussione non excidunt, quia substantia spongiosa nervorum eis loco valvularum inservit. Sequenti vero n. 5. addit: Quando igitur ab imperio voluntatis, vel a consuetudine naturæ (quod fit in motibus involuntariis) eo, quo dixi modo innumere guttule per totam musculi molem, quæ instar spongiæ semper sanguine humectata est: simul ejiciuntur ex orificiis nervulorum, tunc eadem particula tenuissimæ spiculis suis subtilissimis impactæ in particulas sanguineas tenuiores easdem distinguunt, & insito aeri condensato exitum præbent (ut docui in mea dissertatione de effervescentia, & fermentatione) ebullitionem, & subsequenter musculorum inflationem producit; unde contractionem earundem subsequi necesse est. Videatur ulterius Borellus cap. 3. 2. tom. de motu animalium; de causis probabilibus vitalis contractionis musculorum prop. 22. & sequentibus, ex quibus manifesto constabit tantæ hypothesis ratio, ordo, & methodus, enodatis ultro difficultatibus illis, quæ hanc hypothesein evertere potuissent.*

18. Licet tantorum virorum doctrinæ & auctoritates eo pretio sint apud nonnullos, ut fateantur, id semper summæ gloriæ ipsis fuisse, cum Borellianas, aut Bernollianas hypotheses sequi potuissent; attamen philosophandi gratia sperant se veniam fore confecturos, si aliquando alteri sententiæ assentiri videantur. Hisce itaque plurima non arident; primo siquidem, licet probabilem putent succi nervei & spirituum animalium existentiam, tamen non eo officio credunt comparatos, ut sensum & motum primarium tribuant: etenim non putant glandulas corticales cerebri tale, tantumque fluidum separare posse, cum Malpighius capite de liene pag. 305. nervum naturæ suæ succum sero & parce vehere ingenue expertus sit, nec fibras medullares, & nervea solida separatim succum tanto officio sensuum, & motuum undequaque vehere. Inde non facile credunt, voluntatis imperio fieri posse localem in cerebro agitationem spirituum, qui vellicando principia alicujus nervi concutiant per totam longitudinem spiritus intra contentos, ut guttula extrema fluidi ad nervos sputantis ex altero osculo levi vibratione tam cito, tam prompte ejiciatur, & ut cum sanguineo & lymphatico fluido mixta statim fermentescens subitanæ distentionem machinularum, & contractionem musculorum efficiat; si enim frequentissimo & continuo voluntatis imperio in continuis motibus musculorum guttulae semper succi nervei continuo tribuendæ essent, ut cum sanguineo & lymphatico latice effervescent; laboriosum quidem naturæ opus futurum esset, & summum onus glandularum cerebri tantum succum suppeditare nerveis canaliculis, tantis continuisque motibus parem. Arduum ulterius putant, credere tam citum, tam facilem gressum, & regressum spirituum per nerveos canaliculos imperio animæ, & quomodo spirituum particulæ infinite parvæ & elasticæ intra teneras nervorum fistulas, etiam adjuvante vinculo succi nervei, contineri possint. Hæc & plurima alia, quæ, ne rædio essent, relinquere voluerunt, adeo aliquorum Philosophorum ingenia turbaverunt, ut de tanto spiritu & succi nervei usu, & officio quod ad sensum & motum pertinet, dubitaverint, asserentes facilius esse, de adversariis suppositis dubitare, quam eorum suppositis acquiescere. Licet autem spiritibus & succo nerveo officia sensus & motus primario non tribuant; nihilominus de succi nervei existentia dubitare non ausi sunt; existimant enim sanguineis & lymphaticis vasculis undequaque ner-

vea solida circumscribentibus tribuendum esse nervis fluidum quoddam, quod peculiarem naturam, ac indolem nactum (ut in ossium medulla accidit; sine qua brevi ossa arescerent) *nervea solida nutrit, mollia tenet, & aliquod tensionis momentum tribuit*; ut hæc solida taliter disposita animæ organis ipsis compenetratæ & naturæ magnis in operibus prompte ac facile pro sensu & motu ab anima exequendis parent. Quamobrem non succi nervei existentia, sed de officio sensus & motus juxta Borelli & Bernollii sententias dubitare voluerunt.

19. Probabilius itaque consilium putant, eam amplecti sententiam, quam nuper celeberrimus Steno adumbraverat; nimirum per solam mutationem figuræ musculorum contractiones & distractiones seu elongationes in motibus eorundem fieri potuisse. Id tamen animadvertendum voluerunt, non omnino eam sequendam Stenonis ideam, qua docuerat, musculos contrahi & elongari sola mutatione figuræ simplicis musculorum simplicium, qui unicum rhombum constituunt; sed scienter judicaverunt, contractionem & distractionem seu elongationem musculorum habendam quidem esse per mutationem figuræ musculorum, sed compositorum competentium plura spatiosa seu machinulas, quarum non planarum, sed solidarum figurarum muscularium mutatione necessaria, sine spirituum & succi nervei auxilio, modo contractiones, modo elongationes eorundem in motibus exequendis habendæ sunt; sola itaque mutatio figuræ non simplicis, sed solidæ musculorum compositorum id operis sine spiritibus & succo nerveo præstare felicius potest, quod minus apte spiritibus & succo nerveo tribuere plerique voluerunt. Cur enim in voluntariis motibus, (de quibus hic potissimum sermone habemus) hæc de re dubitandum? Cur enim anima intime unita ac compenetrata sensoriis non poterit virtute sua, suoque impetu, usu potissimum ac consuetudine acquisito, (usu enim & ipsa paulatim acquirit, aut fortasse repetit scientiam) cito ac facile juxta opportunitatem actionum, quas ipsa exigit, movere taliter organa, naturali tamen statu se habentia, hos potius nervos, quam illos, a quibus hi vel illi musculorum motus consequi necessario debuerunt? Cur quæso tam eminens anima, quæ in consuetis musculorum motibus machinarum sphæroidalium oscillatorio motu uti consuevit, non poterit in validiorum motuum necessitate usu paulatim experta & edocta tali ratione ipsamet dirigere, disporre & modificare fibras machinularum, ut aliquando non amplius sphæroidalia, sed octaedrica, & in summis, violentissimisque motibus exequendis, intra tamen limites naturæ humanæ isodrica, aut etiam sphærica spatia componat? quæ cum ex sola mutatione figurarum solidarum, (ut ex isoperimetris motum est) majores ac majores acquirant areas ac superficies, jure optimo eam dilatationem, & contractionem citissime asserre musculis ac solidis debuerunt necessariis motibus opportunam, quam fortasse temere elastico & fermentativo fluidorum motui fere omnes Philosophi veterum auctoritate præjudicati tribuere voluerunt? Qui negaret, a tam eminente anima usu ac habitu edocta hæc fieri cito ac facile non potuisse, certe tantum potentiæ animæ organis compenetratæ detrahendum vellet, quantum temere spiritus aut elasticis succis non immediate unitis tribuendum voluit. Si enim anima, ut nonnulli credunt, imperio suo movet spiritus & succos elasticos a seipsa sejunctos, cur multo magis non poterit movere ac modificare organa sua juxta figuras illas, quas habitu & usu perceptorat iis, vel illis actionibus exequendis opportunas, cum immediate organis unita sit ac compenetrata? Si natura ex sola figurarum mutatione in naturalibus & artefactis tot actiones felicius ac citius naturales & præternaturales exequitur; cur multo magis anima organicis compenetrata cito ac facile tam necessaria motibus & actionibus suis exequendis hac methodo persequi non poterit? cum anima tanto natura perfectior habeatur? Itaque si anima intime unita & compenetrata sensoriis organa ipsa immediate dirigere, modificare, componere ac movere virtute sua, usu & habitu acquisita cito ac facile potest, quæ mediate tantum per spiritus, aut succos elasticos agere ac movere tardius debuisset, probabilis creditum a nonnullis est, animam in motibus voluntariis virtute sua & usu agere voluisse & debuisset, ut sola mutatione figurarum & organorum ea beneficia contractionis & elongationis musculorum facile accito ab ipsamet anima sibi compararet, quæ tardius ac difficiliter per spiritus, per succos elasticos fermentescens fortasse minus apte obtinere potuissent. Arguunt tamen valide Borelli sectatores, cum impedito aut ligato nervo sensus obstupefcere, & motum partium, ad quas nervæ illæ ramificationes excurrunt, interire penitus experiantur. Si itaque vis, consuetudo & potentia animæ habitu & usu acquisita ea esset, quæ figurarum solidarum mutatione dirigeret, modificaret, moveret, ac componeret varia configuratione machinulas illas sphæroidales musculorum juxta necessitatem occurrentem motuum exequendorum, certe, etsi nervi impediti, aut ligati essent, posset tamen taliter organa sua movere, modificare ac dirigere, ut motus suos opportune exequi concederetur. Verum si tam celebris dubitatio jure optimo expendatur, non dubitandum, hanc facile fore exolvendam. Licet enim anima sit intime unita ac compenetrata organis, ut apta fiat movere, modificare, dirigere & agere sensoria ipsa juxta suorum motuum exigentiam, intra tamen limites naturæ humanæ; nihilominus semper ipsamet prout organis compenetrata tenetur agere, suasque actiones exercere dependenter ab organis. Si itaque organa naturalia, sana & apta actionibus obediendis constiterint, ipsamet anima recte, opportune & naturali modo operabitur; cæterum si organa vitiosa fuerint, impedita, aut fracta, ut frustra esse videantur, cogetur anima ipsa suorum organorum vitia, impedimenta ac labes pati, & sustinere, exequendo dependenter ab organis vitiosas actiones, aut impeditas, aut nullas. Ex his arbitratur est facilius ac clarius demonstrari obscurissima phænomena; cur nempe sensus aliquando obstupefcant illafo motu? & cur deperdito aliquando motu sensus adhuc superstites habeantur? Sensus enim fiunt specificis motibus membranarum; motus vere voluntarii imperio, actione & usu animæ organis compenetratæ dirigentis naturales machinulas sphæroidales solidarum musculorum juxta rationem figurarum exequendis motibus proportionalium. Difficilius siquidem & obscurius semper fuit, gressus & regressus spirituum per eodem nervos modo ad sensum, modo ad motum, modo ad utrumque eodem tempore per totam animalis machinam supponere voluisse, quin facile consequatur actio & reactio corporum, & inde confusa sensuum & motuum momenta, cum animæ & naturæ vitio & actionum aberratio-

ratione. Hæc satis breviter dicta sufficiant de motibus voluntariis organorum imperio animæ exequendis, cum de naturalibus organorum actionibus ac motibus in sequenti dissertatione dicendum sit. Itaque quidquid sit de his, quæ dicta sunt de tam eminentibus animæ actionibus & de motibus voluntariis organorum, unusquisque eam sibi eligat sententiam, quæ animæ & naturæ actionibus enodandis probabilior futura fuerit, cum utraque opinio opportuna Philosopho, probabilis Medico, licita Catholico videatur.

20. Redeuntes modo unde digressi sumus, innotescunt facilius causæ illæ quæ paralyfin erunt allaturæ. Hujusmodi itaque morbus, qui aliquando deficientiam motus, & sensus, sæpius vero imminutionem utrique asserre consuevit, fieri potest vitio membranarum nervis solidis, cæterisque organis circumscriptarum; vel vitio fluidorum elasticorum, aut præternaturalium intra spatiola muscularia & fortasse etiam nervea contentorum, vel vitio urtorumque; quod si hujusmodi vitiosa affectiones totum fere corpus apprimant, *Paraplegiam*; si vero vel dextram, vel sinistram partem una cum capitis medietate afficiant, *Hemiplegiam* communi vocabulo appellare Medici voluerunt. Quamobrem quod ad vitia membranarum spectat, cum meninges universam nervorum familiam undequaque investiant, si meninges enervatæ fuerint ac languidæ, membranæ quoque consentientes, quæ nervos investiant, necessario flaccescent, & filamenta nervea solidum nerveum componentia non eam inter se unionem adipiscuntur naturali soliditati nerveæ proportionalem. Verum cum ex majore unione filamentorum nerveorum inter se massa nervea densior fiat, hæc majorem rationem habebit ad nervorum volumen; e contra cum ex minori unione filamentorum nerveorum inter se massa nervea rarior futura sit, hæc minorem rationem habebit ad idem nerveum volumen. Cum autem ex densitate massarum fiant corpora consistentia ac valida, ex raritate vero fiant cæteris paribus minus consistentia sive debilia, arbitrandum erit ex majore laxitate membranarum nerveis solidis circumscriptarum nervea solida minus consistentia, minusque valida fieri, ex minori vero laxitate membranarum nervea solida magis consistentia futura esse. Quapropter si ex una parte momenta membranarum, nervorum, musculorum & tendinum habeant rationem minoris inæqualitatis respective ad momenta membranarum, nervorum, musculorum & tendinum antagonistarum ex alia parte; cum vires & actiones ex illa parte nervorum, musculorum, tendinum & ossium, quibus tendines alligantur, aut deficere possint, aut saltem imminui, motus quoque membrorum in hac, aut omnino deficiet, aut si aliquis remaneat, ex tam inæquali, & irregulari actione, & reactione momentorum inæqualium tam ex una, quam ex alia parte, motus quosdam infirmos & enervatos, aliquando quoque tremulos supervenire necessum est. Non solum autem a laxitate membranarum nervea solida inscripta minus consistentia fiunt, ac debilia cum motus imminutione, aut abolitione; verum etiam facillime impleri possunt materia quadam lymphatica, quæ membranas ac nervea solida non tantum ultro opprimat, verum etiam elastica corpora impediatur, ne naturales conatus elasticitatis exerceantur; quippe, cum solida nervea rariora reddita massam habeant, quæ minorem rationem habet ad suum volumen; volumen vero sit spatium, quod corporis massam cum interspersis poris occupat, certe tot pori acquisiti a voluntate solidorum nerveorum implendi facile erunt a fluido lymphatico undequaque fluente; ibi autem firmato sero cum pondera corporum sint quantitativis materiæ, seu massis eorum proportionalia, nervorum pondera, ac momenta enervata augebuntur in ratione composita ex ratione corporum elasticorum enervatorum, (quæ probabiliter etiam in nervis solidis continentur, & ratione quantitatis seri derivari in poros voluminum nerveorum. Quamobrem nervea solida ultra naturæ leges onerosa facta inepta fient ad motum; deinde hujusmodi solida tot seri particulis præternaturaliter repleta, cum minus expedita ad motum fiant, minusque disposita ad elasticas vibrationes; sive motus naturales oscillationum obeundos, non solum motus musculorum, verum etiam sensibilibus affectiones, aut languide, aut nullatenus poterunt exercere; cum enim enervatæ membranæ, & filamenta nervea laxata, non eam solidorum tensionem, vim ac consistentiam afferant, quæ naturali constitutioni, seu naturali momento contractionis organorum sensibilibus convenire videatur; jure corpora quælibet sensibilia, cum nullatenus, aut opportuna ratione motus sensoria afficere possint, sensationes non producent; aut si æqualiter sint productura, sensoria obstupescere videbuntur. Ex his aliæ consequuntur paralyfis causæ; enimvero nervea solida laxata ob laxitatem membranarum investientium non eam densitatem tribuere possunt corporibus elasticis intus, quæ necessaria esse videatur, ut vires sibi naturales exerceantur; enim vero cum densitates corporum elasticorum quamproxime elasticitatibus suis proportionales fiant, a quibus vis & robur solidorum dimetiuntur, & ordinata corporum elasticorum vi & conatu oscillatorio, nervea quoque solida opportunam vim tensionem, & robur sustinere naturaliter apta erunt: hinc colligendum ex membranarum laxitate, nervei quoque solidi aliquando & sensus, aut omnino, aut aliqua ratione deficere debere. Præter hæc fluida elastica juxta nonnullos intra nervorum spatiola, potissimum vero intra spatiola sphæroidalia musculorum contenta, si aut quantitate naturali deficient, aut extraneis corporibus unita opportuna momento careant, non ea in nervis ac musculis vi aut momento tensionis donata erunt, quod & ad membra movenda & ad sustinenda pondera pertinere videbatur. Quare aut nullus fieri poterit membrorum, organorumque motus, aut si aliquis superfit, enervatus ac languidus futurus erit. Hæc sunt præcipuæ paralyfis causæ, quæ aut motum impedire, aut sensum enervare aptæ sunt. Cæterum si expositæ hujusmodi causæ supra modum graviores extiterint, ita ut summa fuerit laxitas membranarum menyngum, & consequenter earum, quæ opportuno consensu nervea solida circumscribunt, aut nimius fuerit defectus corporum elasticorum in nerveis fortasse, & muscularibus spatiolis sphæroidalibus, aut nimia & excedens seri copia, aliorumque fluidorum præternaturalium, quæ hæc vel solida graviter opprimat; tunc non paralytica affectiones organorum, sed apoplectica denuo orientur.

21. Ab his, quæ dicta sunt, facile datum erit proficisci ad affectiones illas, quibus gravi sopore, ac somno animalia gravari consuecunt. Harum affectionum præternaturalium licet variæ sint species, attamen non causis, sed gradu differunt; *Lethargus* enim

gravem, profundumque somnum cum oblivione, & læsione operationum animalium una cum lenta, sed continua febris sibi comparat; *Coma* vero propensionem ad somnum gravem asserit & invincibilem; *Carus* autem longum profundumque soporem ostendere visus est; verum comatis & cari essentia ac natura hoc exigit, ut febris careant, aut fortasse melius ægri febris carere videantur. Itaque licet aliquando laxitas præternaturalis menyngum pro somni præternaturalis causa haberi aliquando possit; nihilominus probabilior opinor, præternaturales laxitates fibrarum medullarum cerebri peculiari modo præternaturalem soporis indolem asserre; cum enim supra ex præternaturali laxitate menyngum, aut tota, aut fere tota nervorum familia, quæ a menyngibus productis undequaque vestitur, aut paraplegiam, aut hemiplegiam asserre debeat, laudabilius cenſeo somni præternaturalis causam ac fontem, quæ cerebro præcipue insidet, medullarum quoque fibrarum laxitati esse rationabilius tribuendam; sæpiissime enim effuso, aut e glandulis menyngum, aut e lymphaticis sero fibræ medullares copiosiori fluido madefactæ a naturali, licet tenui tensione, declinant; Cum vero aut nullo modo, aut languide debitum sibi tensionis conatum sustinere possint, otiantibus aut enervatis sensoriis aliquando gravem, aliquando gravissimum soporem erunt allaturæ. Nerveum succum si credimus, certum est aliquando hunc austeris, aut viscidis, aliquando opiat, venenatisque particulis adeo associari posse, ut corpora præternaturalia vim tensionem naturalem fibrarum magis impediunt, quam adinvent particulæ elasticæ succi nervei; cum autem effectus semper sint directe ut causæ adjuvantes; reciproce vero ut impediētes; enervato elatorio succi nervei a præternaturalis particulis fibræ medullares, aut ægre, aut nullo modo tendi debuerunt; sensoria itaque aut negligenter, aut nullatenus sollicitata & deperdita, aut enervata oscillatione sopore gravi, aut graviore otiantur. In febribus autem gravi inedia, vel lassitudine corporis elasticis corporibus aut evolutis, aut exili momento agentibus non ea vis tensionis in medullaribus fibris acquirenda erit, quæ sensoriis naturaliter & opportune exercendis necessaria videatur. Febris itaque medullaribus enervatis, aut languidis sensoria varia soporis indole ingravescent. In lethargicis affectionibus inflammari meninges facile credendum: Ibi autem inflammatione parte sanguis lentescit in sinibus menyngum, & pondere eandem inflammatarum, & sanguinis lentescens, compressa nimis crebri substantia profundissimum somnum cum oblivione, & læsione operationum animalium erit allatura.

22. Remanet inter comatosas affectiones *Coma Vigil*, qua ægro-
tantes conniventibus oculis dormire videntur, cum fortasse tam gravi somno obruantur. Crediderim, eos furculos nervorum opticorum, qui ad musculos deprimentes & attollentes palpebras opportune ferunt, morbose laxatos quodammodo fuisse, ut attolli difficulter possint, quinimo debeant necessario; sic enim depressis morbose seu paralytice enervatis palpebris ægri dormire videbuntur; verum cum in reliquis fibrarum medullarum ordinibus aliqualis remaneat motus sollicitationis, distractionis & contractionis, & aliqualis elasticitas succi nervei, ea ratione media tenenda fuerat cerebri regio, ut inter somnum & vigiliam consistere debuisset.

23. Superest *Vertigo*, quarum una idiopathica est, symptomatice *Vertigo* altera. Prima causam ac sedem a regione cerebri secunda a stomacho, uteri, aliorumque viscerum consensu cognovit; utraque tamen mala ominatur. Cum vertiginis phænomena a Physicis non satis apte enodari possint, ab Opticis quærenda sunt; ea siquidem est rotationis explicandæ causa, ut nisi Optica præsto sit, difficilis admodum & obscura futura erit tanti operis divinatione. Ex celeberrimis Viris Hayr & Wolfio *Retinam* pro primario visionis organo judicandam opinamur; hæc enim tunica cum choroidi contigua sit, & a filamentis nervei optici perfectissime elaborata, ibi quidem firmanda erit præcipua Vertiginis causa; ut autem hæc manifesta fiant, prænotandum est, radios (a) ab objecti puncto egressos per refractionem in humore crystallino factam in uno iterum puncto, ut visio debita fiat, uniri debere. Hi autem radii cum secum afferant integram & perfectissimam imaginem puncti radiantis (ex eodem corollario) cum eo in loco, quo radii uniuntur, ibi immediate adesse naturaliter debeat Retina: hæc a radiorum punctis opportune tacta, & affecta specifico quodam motu excipiet naturales objectorum imagines. Itaque si accidat aut timore, aut ira, aut quacunque animæ præternaturali affectione, aut corpore quodam extraneo sollicitari taliter nervos opticos, ut præternaturali quodam contactu ac motu nervorum opticorum fibræ Retinæ, quæ superficiem quodammodo circuli rem describunt, in orbem aliqualem torquantur; opus erit radios, fibrillas Retinæ quodammodo circulariter euntes successive sollicitare. Cum autem radii hac ratione successiva tangentes, & sollicitantes fibras Retinæ, quantumvis minimi sint, externorum objectorum imagines secum afferant, ab aliis successivis motibus radiorum & contactibus transsentibus circulariter ab uno contactu fibræ, ad contactum alterius fibræ, circulariter successive sollicitanda erit Retina. Cum vero objectorum imagines sint juxta rationem affectionum Retinæ, necessario objecta externa successive in orbem mota, in orbem moveri videbuntur. Hac ratione membranæ opticorum a menyngibus derivatæ spiralibus fibris probabili menyngum analogismo munitæ, hæc a quacunque præternaturali causa sollicitatæ spiraliter opticorum nervorum fibras innoturæ erunt; cum autem nervorum opticorum filamenta definentia in Retinam, hanc mirabili artificio construant, hæc quoque motu successivo partium quodammodo spiræ in morem movenda erit, quamobrem cum puncta radiorum, quæ imagines objectorum externorum figurant, successivis temporibus tangant, & afficiant motibus suis successivas partes fibrillarum Retinæ, in spiras, aut in orbem motas; hæc necessario repræsentabunt objecta externa, ac si continuis motibus rotarentur. Hæc sunt præcipuæ causæ, quæ vertiginis phænomena enodare videntur, & a quibus plurima visus accidentia Opticorum methodo explicari facile possunt.

DISSERTATIO II.

De Morbosis Sensuum Internarum Affectionibus.

24. **N**udi nascimur privati vitiis, & virtutibus; anima solidis compenetrata paulatim labore & usu acquirit virtutes & vitia.

(a) Ex Coroll. 2. pag. 11. Optic. Wolfii.

vitia. Primo itaque loquendo de moribus voluntariis, qui cerebro omnium fere Medicorum consensu adscribuntur, sicuti naturales cerebello; verisimile est, tantas res acquiri motu fibrarum cerebri, quæ ab objectis cum internis, tum externis sollicitatæ animam excitant: huiusmodi fibrarum motus non obscuri fuerunt Platoni, cum in Timæo docuerit: *Excogitaverunt Dii caput motuum omnium compos id fore*. Itaque si caput motuum omnium compos: ergo in capite radices & principia motuum esse debuerunt; quæ motuum radices cum fibris cerebri primo ascribi debeant, eo quia iis anima pro perfectioribus suis actionibus primo compenetrata est; hoc unum innere voluit Philosophus, fibrillas cerebri prout motuum omnium radices, ac principia primo moveri debuisse, ut inde correspondentibus organis necessarij motus undequaque communicarentur; hi itaque motus fibrarum cerebri animam ipsis compenetratam sollicitantes, & excitantes *Phantasmata* a Medicis appellari consueverunt. Cum vero hi motus fibrarum cerebri juxta diversas sensationes & affectiones animæ, quantumvis minimi fuerint, accipiant magis & minus, jure amplecti poterunt sub idea generalis quantitatis. Hæc itaque phantasmata; seu hi motus fibrarum, cum quanti esse debeant, non tantum majores aut minores esse poterunt, verum etiam juxta varias animæ affectiones ac potentias peculiari numero circumscribuntur. Anima itaque excitatur, & sollicitatur a motu modo majori, modo minori fibrarum & peculiari numero motuum eorundem. Hinc Pythagoras hosce motus modo majores, modo minores animadvertens, & numerum eorundem pro eminentibus animæ operationibus exercendis sapissime confessus est, eum plus hominem esse, qui plus numerorum scientiam habuisset. Cum autem scientia numerorum, & quantitatum quarumcunque nitatur in compositione, divisione, permutatione, & æquatione earundem &c. ideo docere simili sermone voluit Pythagoras, animam in homine eminentius sentire & operari, cum usu & habitu facto melius, facilius ac perfectius compoueret, divideret, permutaret quantitates, numeros motuum, differentias & rationes eorundem pro actionibus animæ rite exequendis. Ab hisce sensibus non videtur dissentire Divus Augustinus, qui ex sacris scripturis locutus est; *Circurvi ego ut scirem, & considerarem, & quærerem sapientiam, & numerum, lib. vi. Musica*. Ut itaque hanc rem difficillimam soli Deo vere notam, & ab anima tantummodo dignoscendam (cum hæc spoliata corpore a fortunata visione Dei Optimi Maximi veram rerum omnium scientiam funditus sibi comparatura sit,) si non re, saltem similitudine agitare facilius, ac clarius possim, puto rem fore necessariam, si prius considerata *sede sensus communis in tuta membrana Pia Mater dicta*; cum hæc nervos, cerebrum & cerebellum, fibrasque arctissime, immediate & undequaque investiat, transeam pro voluntariis animæ operibus probabiliter enodandis ad examinandos motus fibrarum cerebri. Hos itaque motus fibrarum duas in classes dividendos esse censeo, quorum alter est *Motus absolutus*; alter vero *relativus*. *Motus absolutus* est motus ille primo primus, quo fibræ cerebri a causis quibuscunque, tum internis, tum externis primo excitantur ac sollicitantur; Hinc anima primo excitata ac stimolata confuse & abstracte res sentit, & concipit absque ulla tamen affirmatione, aut negatione; & hanc primam actionem animæ *Imaginationem* appello. *Motus autem relativus* fibrarum cerebri est actio illa animæ fibris compenetratæ medullaribus; qua durante motu fibrarum per aliquod tempus anima prius excitata, ac sollicitata a primis motibus fibrarum hosce motus animadvertens, animadversione usu acquisita comparat motus unius fibræ cum altero motu alterius, unam differentiam, aut rationem motus istius cum altera differentia, aut ratione motus illius, & sic successive; hinc anima fibris compenetrata cum motus specificos, differentias, & rationes motuum acutissime sentiat, comparando hos motus inter se, & horum differentias ac rationes, componit has rationes motuum, aut dividit, permutat, aut invertit, aut æquat; quibus actionibus anima usu & habitu facto exercitata ab obscuris ad clara, ab ignotis ad nota paulatim ascendit; & hæc actio *Discursus* & *Ratiocinatio* dicenda erit, vi cujus res primo conceptas anima percipiens & intelligens, de iis affirmat, aut negat, cum totali assensu, aut dissensus libertate. Liberum inde est animæ velle, aut nolle, ut electioe facta præmium, aut pœnam mereri potuisset. Hæc tam miranda actio animæ cum revera explicari nullo modo possit, attamen similitudine quadam & analogia poterit quodammodo adumbrari. Quæram itaque similitudines & analogias ab Analytici; hi enim, ut ab ignotis nota erunt, ignotas res cum notis comparant, rerumque differentias notas cum ignotis, & modo componendo, modo dividendo, modo invertendo & permutando &c. tandem aliquando ignota cum notis æquando ea clare percipiunt & intelligunt, quæ prius ignota penitus videbantur, non dissimili itaque ratione, sed multo perfectiori anima melior & eminentior Analytica a motibus & proportionibus motuum fibrarum cerebri, & a differentiis eorundem sollicitata, utpote iisdem fibrillis compenetrata, hos acutissime sentire cogitur: illosque animadvertens componendo, dividendo, permutando, invertendo, comparando & æquando ea clare sentire, percipere, intelligere tenetur, quæ prius ignoraverat. Hæc omnia indicare quoque videtur Divus Augustinus, qui Tomo primo cap. 33. de quantitate animæ, inquit: *Anima ea, quæ secundum naturam sui corporis sunt, adsciscit atque appetit, rejicit, fugitque contraria, remouet se ab his sensibus certo intervallo temporum, & eorum motus quasi per quasdam ferias reparans, imagines rerum, quas per eos hausit secum oaturvatim, & multipliciter versat*. Cæterum si hi motus fibrarum cerebri, aut continui fuerint & diurni, aut per aliquam notabilem temporis differentiam perduraverint opera objectorum aut interiorum, aut exteriorum continuo, vel per aliquod notabile tempus sollicitantium; tunc anima cum diutius, & frequentius excitata, ac sollicitata fuerit, detineatur usu & habitu facto diu in actu exercito circa hæc objecta tales fibras moventia, anima in tali statu perdurans exercere dicetur potentiam illam, quam *Memoriam* appellamus. Quod si tractu temporis deficientibus motibus & proportionibus motuum fibrarum cerebri, aut novis motibus accedentibus aliquando volente anima, aut opera etiam ejusdem, aut alterius causæ homologue agentis, vel internæ, vel externæ, rursus sollicitentur fibræ cerebri ea differentia specifica motuum & rationum, qua prius a prioribus objectis sollicitatæ fuerant, iidemque specifici motus, & eadem motuum specificæ differentia, ac proportionibus eorundem repetantur, tunc anima ab hisce motibus rursus excitata ac sollicitata, & hosce

animadvertens, repetet & renovabit illa affectiones, quibus antea sollicitabatur, quæ actio animæ *Reminiscentia* appellanda erit. Remanet animadvertendum, has præcipuas animæ actiones imaginationis, discursus & memoriæ suam habere latitudinem; singulæ enim ab initio languidiores sunt, progressu vero activiores, ac validiores fiunt, ita ut à minori ad majorem vim progredi videantur. Num autem tot ac tantæ eminentes actiones ac motus cerebri ab homologis motibus spirituum animalium adjuventur? Affirmantibus non renuam.

25. Ut autem istæ actiones animæ ac potentia, & tam mirandi motus fibrarum cerebri facile ac feliciter exerceri possint, plura conspiciantur. nempe *apta fibrarum cerebri directio & ordo*; qua in re opportunum puto animadvertere ea, quæ pluries in cerebro canum, ovium & aliorum hominum attentissime observasse mihi visa sunt; occurrerunt enim variis in locis cerebri variæ fibrarum series, quarum aliæ uno loco mihi visæ sunt series fibrarum, rectarum, in alio loco series fibrarum obliquarum, in altero vero loco fibrarum curvarum series. Putaverim itaque, pro actionibus animæ æqua ratione exercendis series fibrarum rectarum ea ratione, lege ac ordine fuisse naturaliter dispositas, ut aptissimum inter se servent parallelismum; sic obliquas ea ratione directas naturaliter fore, ut juxta rationem naturalem serierum obliquarum debito gaudeant parallelismo, similique methodo series fibrarum curvarum ea gaudere debuissent directione, ut juxta rationem ac naturam serierum curvarum, singulæ inter se parallelæ dirigantur. Hac ratione singulæ series fibrarum apta directione, regula & ordine locatæ ac dispositæ, ordinatæ fiunt & regulares inter se, & concinne, naturaliterque compositæ. Tali ratione, ordine ac directione dispositæ series singulæ fibrarum edere debentur ordinatos, regulares & homologos motus, & sibi homologas motuum differentias; inde anima ipsis compenetrata ordinate & regulariter sentiens motus, tremores & motuum differentias ac porportiones eorundem, clare, ordinate & æqua ratione concipiet res, intelliget, & recordabitur. *Secundo necessaria est opportuna tenuitas, & conveniens subtilitas fibrarum cerebri*; ea enim esse debet harum fibrarum tenuitas & subtilitas, ut facillime aptæ fiant ad motum fuscipiendam; cum enim promptæ sint ad motum, facillime tremunt, motuque sibi vicinis apte communicant, & hunc proxime fibræ tangentes facile excipiunt, ut animæ imperio & actionibus facillime obediant. *Tertio necessaria est apta & conveniens cohesio, approximatio, & facilis contactus fibrarum inter se*; hisce enim sese opportune tangentibus, motus unius fibræ facile communicatur motui alterius, & sic successive; in qua apta & facili communicatione motuum fibrarum inter se, putaverim, potissimam actionem & rationem memoriæ esse statnendam. Fibræ itaque cerebri neque nimis strictæ esse debent, neque nimis laxæ inter se: si enim nimis ac violenter strictæ fuerint, vel nimis laxæ & distantes, utroque modo cum non tam prompte, nec motum excipiant, nec exceptum cæteris communicare facile possint, vitium cerebri & potentiarum memoriæ potissimum parere poterunt. Hic autem dissimulare non possum errorem illorum, qui putant, homines minori intellectu pollere, quo majori memoria donati sunt; suspicor enim, & memoria præditos æquivalenti quoque imaginatione, & proportionali quoque intellectu præditos fuisse; cum enim potentiam memoriæ exerceri excellenter non possit, nisi fibrillæ cerebri ordinatæ fuerint opportune subtiles ac tenues, cum aptæ ac facili contactu earundem inter se; jure suspicatus sum eos, qui memoria feliciores sunt, proportionali quoque imaginatione & intellectu donatos esse. Fateor quidem memoria feliciores minus laborare & exercere intellectum, non, quia minori intellectu polleant, sed quia cum fortuna memoriæ multum suppleat laboribus & actionibus intellectus, propterea hunc minus exercent & excitant; hunc enim diutius exercere laboris & tædii est. Ex his ergo, quæ dicta sunt, clare constat, cur puncta pedis extremitate statim molesta illa sensatio in cerebro concipitur, & judicetur ab anima, num videlicet punctura illa gravis sit, an levis &c.; etenim cum anima sit sensoriis compenetrata, cumque indivisibilis anima tota sit in tota, & tota in qualibet parte, eo momento temporis, quo anima sentit molestiam in pede, eadem ipsa in cerebro dignioribus organis tam grandi officio destinatis, & ad hoc specificè elaboratis concipere, & judicare debet (dummodo organa cerebri tam summis operibus destinata naturaliter se habuerint) rationem doloris, levitatem, aut gravitatem ejusdem &c. & cæteras sensationum anomalias. Hac lege compenetrations animæ in suis sensoriis solvi possunt obscura, & innumera sensationum & potentiarum animæ phænomena; cur videlicet tam facile, tam prompte sensationes in organis factæ concipiantur, & judicentur in cerebro? & cur tam facile, tam prompte, tam justæ sensoria sollicitent potentias animæ? & vicissim anima tam facile, tam prompte, tam justæ sensoria ipsa excitet ac sollicitet, imperio suo obtemperatura? Hisce itaque breviter adumbratis, arbitror non re, sed potius rudi similitudine exposuisse, qua methodo tam eminens anima rationalis sentiat, concipiat, intelligat & recordetur? cum sciam multo perfectiore methodo ac lege animam immortalem & æternam fore operaturam. Non dissimili tamen ratione, sed multo imperfectiori puto bruta ipsa sentire, & operari, non ut automata, sed ut animalia quidem imperfectiora, quadam tamen potentia donata, animæ analogæ, quæ specificis & determinatis motibus fibrarum cerebri suo modo sentiant, suo modo concipiant, suo modo intelligant, suoque modo recordentur.

26. Non arduum modo fuerit juxta nostrum institutum morborum cerebri phænomena assequi; cum alteratis, aut inversis, aut mutatis fibrarum ordinibus, directionibus, subtilitatibus, parallelismis & motibus earundem præternaturales animæ actiones fieri debeant. Ibi itaque delirium primo occurrit *perfectum unum*, *imperfectum alterum*. Delirium *perfectum* illud esse arbitrandum est, cum omnes fibrarum rectarum series cerebri opera causarum modo interiorum, modo exteriorum agentium, potissimum vero vitio sanguinis, aut lymphæ irritantium inflexæ fiant & obliquæ; sic cum omnes naturales fibrarum obliquarum series, aut rectæ fiant, aut curvæ, similique ratione cum omnes naturales fibrarum curvarum series, aut rectæ quodammodo fiant, aut obliquæ; hoc enim statu præternaturali fibrarum omnium mutatur earum naturalis parallelismus, necessarius earum motus; cum vero a motibus fibrarum cerebri determi-

nentur ratione phantasmatum, mehercle a præternaturalibus hisce moribus præternaturalia evenire phantasmata necesse est; anima autem fibris compenetrata cum concipere, intelligere ac memorari debeat, quæ sentiuntur, a sensibus, videlicet, quæ tum ab æquis, cum a vitiosis fibrarum moribus excitantur, jure anima vitiose undequaque sollicitata errore concipiet, errore intelliget, errore recordabitur, confusisque omnibus æger gravissime delirabit. Huic autem morbo præstat quoque nimia obliquitas, nimia curvitas fibrarum cerebri, una cum directione mutata fibrarum rectarum; cum enim fibræ omnes medullares, quamvis minimo motu moveri videntur, tamen necessario moveri suo modo debeant, quotiescunque nimis obliquæ fiant, nimis curvæ & præternaturaliter directæ, violenter consistere, aut violenter moveri conabuntur opera materiæ alicujus aut externæ, aut internæ præternaturaliter, & violenter sollicitantis; cum vero fibris taliter se habentibus naturale centrum gravitatis singularum mutari facile debeat una cum earum centro motus; propterea harum motiones cum componantur ex ratione fibrarum singularum, & momento massarum heterogenearum sollicitantium, aut momento potentiæ excitantis, nullatenus isochronæ, ordinatæ, & regulares esse poterunt, & naturalibus motibus proportionales, sed præternaturaliter asymmetræ; anima autem confusa, ordinatæ & asymmetræ sollicitata falso concipiet, falso ratiocinabitur, & falso recordabitur. *Delirium imperfectum* illud esse arbitrandum, cum vel solæ fibræ rectæ, vel solæ obliquæ, vel solæ curvæ a naturali ordine, directione & parallelismo declinaverint, pariter cum nonnullæ ex rectis, aut nonnullæ ex obliquis, aut nonnullæ ex curvis vitium fecerint, cæteris naturali in statu permanentibus; fibræ enim cum non omnes vitiose & præternaturaliter moveantur, animam non omnino vitiose & præternaturaliter sollicitabunt; unde imperfecto & partiali, non totali errore concipiet, intelliget & recordabitur; quin imo cum effectus semper sint directæ, ut causæ adjuvantes, reciproce vero ut impediētes, quotiescunque aliquæ fibræ naturaliter moveantur, nonnullæ vero præternaturaliter motus suos exercent, animæ actiones erunt directæ ut fibræ naturaliter motæ, & reciproce, ut motæ præternaturaliter; inde futurum erit delirium imperfectum, seu, ut Medici nuncupant, pseudodelirium; quamobrem aliquando continget ægrum bene concipere, sed male ratiocinari, aliquando recordari alicujus, cæteris oblitis, aliquando per aliquod tempus ratiocinari, sed confusum vera cum falsis permiscendo &c. ut praxim medicam agentibus manifestum est.

27. Hæc omnia vitio fibrarum, sed membranæ cerebri nullatenus offensis aut inflammatis, contingere probabiliter creditum est; verum si per meninges effuso sero, aut violentissimo motu sanguinis per arterias meningum, arteriæ plus deferant sanguinis, quam venæ æqualibus temporibus referant, ut effuso sanguine meninges inflammantur gravi vitio *Sensus communis*; tunc *Phrenitis* oritura erit, quæ a delirio nullo modo differt, nisi meningum vitio, & majoribus viribus & momentis causarum sollicitantium. Cum itaque meninges inflammatae cum fibris cerebri necessaria adhæsione communicentur, fibras has continuo, inæqualiter, inordinate & asymmetræ, violentissimo motu trahere ac stimulare conabuntur; hinc continua, inordinata & violenta fiet fibrarum sollicitatio ac stimulus; etenim cum mutatio motus sit semper proportionalis vi motivæ impressæ (per legem secundam Newtoni), cum causæ tum externæ, cum internæ sollicitantes continuæ fuerint, violentæ ac inordinatæ, futura quoque erit mutatio motus fibrarum continua, violenta, inordinata & asymmetræ; hinc anima tam vitiosis motibus sollicitata inepte comparando motum unius fibræ cum motu alterius, & differentiam & proportionem unius motus cum differentia & proportionem alterius, falso componet ac dividet motus, falso permutabit & aquabit eosdem, & sic violentissimis motibus fibrarum agitata operabitur confusa imaginatione, discursu erroribus pleno, & memoria penitus perturbata. Hic autem morbus alter *Idiopathicus* est, *Sympathicus* alter. *Idiopathicus* sedem habet in vitio meningum. *Sympathicus* vero, qui ab inflammatione diaphragmatis, aliorumque fortasse viscerum inferiorum ortum habet; uterque autem morbus, delirium nempe & phrenitis, febris unitur, quia deficiente cum causæ stimulantibus plerumque deficere & ipsæ confuescant, deficiente inordinato & asymmetrico motu causarum stimulantium in meninges, & fibras medullares cerebri statu suo naturali, suoque naturali parallelismo recuperato, imaginatio, ratiocinatio & memoria paulatim restituentur.

28. Verum sine febris major aliquando supervenit morbus, qui homines ipsos reddit belluis peiores, & morbi contumacia inter omnia animalia miserissimos. Hic morbus *Mania* dicitur, in qua ægri furore quodam insaniunt; hic quoque morbus alter *Idiopathicus* est, *Sympathicus* alter. *Idiopathicus* sedem habere suspicor in internis fibrillis medullaribus cerebri; *sympathicus* vero ab inferiorum viscerum consensu ab utero potissimum oritur. Plerique crediderunt, a violentissimo motu sanguinis hanc effrænem morbi indolem esse orituram; verum cum nonnullis maniacos accurate traxerim, pulsusque non effrænem & violentum, sed juxta naturalem legem, aut leviter agitatam omnibus fere temporibus stupore summo observaverim, jure suspicatus sum, non semper ab impetu fluidorum, sed potissimum a nimis agitato, & concitato motu internarum fibrarum medullarum maniam esse generatam: Enimvero si serum asperis, inæqualibusque superficiebus circumscriptum, aut corpora alterius generis per internas fibrarum medullarum latebras continuas, concitatis ac violentis motibus fluentia agent, ac majori velocitate sollicitent internas fibras medullares; hæc medullares fibræ cum a corporibus præternaturalibus diverforum momentorum, diversarumque superficierum frequenter, ac violenter stimulatæ describant motus frequentissime minimos, continuo violentas, & inæquales oscillationes, naturales earum series ac directiones violentas invertent, & alterato earum naturali parallelismo non tantum asymmetræ, sed concitato & frequentissimo motu movebuntur. Ex hisce asymmetris & concitatis motibus fibrillarum interiora perturbata fiunt, violenta & concitata phantasmata; unde animal facultatibus animæ perturbatis impetu & furore bacchabitur. In hoc furore & impetu vires nervorum & muscutorum supra modum augentur, ut ægri vix a pluribus domari aliquando possint. In hac re probabiliter putaverim, indivisibilem animam tot inter-

nis, frequentibus & concitatis motibus fibrillarum sollicitatam, & agitatam, cum fibris quoque nerveis & muscularibus, cæterisque motuum organis compenetrata sit (quoties necessitas & violenta ratio fuerit,) ipsa quoque frequenter, concitate & violenter universa motuum organa, fibrillis illis cerebri correspondentia movere coacta est; inde vires summae, & summa momenta organorum succrescere necessario debuerunt; sicut enim sano jam homine volente anima movere summo impetu manum, ac pedem, aut voluntaria organa, hæc summo impetu, aut manum movet, aut pedem; ita cum anima frequenter & concitate sollicitata ac stimulatâ fuerit a motibus concitatis fibrillarum, poterit ipsamet indivisibilis anima correspondentibus organis motuum compenetrata, frequenter ac concitate organa motuum taliter sollicitare ac stimulare, ut momento virium adaucto validissimos motus exercent; neque de hac violenta, ac concitata animæ actione dubitandum. Hic enim morbus, vel fiat ab irritatione internarum fibrillarum continua & concitata, unde anima similiter sollicitetur; vel fiat ab ipsomet violento continuo & concitato animæ sollicitantis imperio (ut in amore insano, cæterisque passionibus sæpissime accidit) quo anima violenter, continuo & concitate movente, ac sollicitante fibrillas internas cerebri, tam gravia, tam violenta, tam furibunda viribus supra modum adauctis afferuntur symptomata utraque modo vires supra modum intumescere necesse est; enimvero cum probabiliter fibrillæ cerebri simplices sint, aut saltem nervis simpliciores, nec subdivisæ sint in plurimos, plurimosque ramulos, ut sunt singuli nervi per totum corpus effusi fibrillis cerebri proportionales, & correspondentes, qui undequaque singuli subdividuntur in plurimos, plurimosque, ac pene ramulos innumeros; propterea si ab aliqua materia extranea, vel ab imperio animæ violenter sollicitentur, continuo & concitate aliquæ internæ fibrillæ medullares, hæc cum simpliciores sint, impetum quidem violentum excipient; sed cum vires, impetus & momenta talis motus sint facta ex massa stimulantem ducta in celeritates fibrillarum simplicium, & consequenter cæteris paribus in sua radice minima. Verum cum hæc fibræ cerebri sui proportionaliter donentur nervis, qui sint hisce fibris correspondentes, & hi nervi per universam fere animalis machinam effusi innumeris furculis distribuuntur, necessario singuli & tam innumeri furculi suo saltem celeritatis gradu erunt sollicitandi, qui gradus celeritatis simul sumpti in tam innumeris nervorum ramulis futuri erunt proculdubio pene infiniti; hi ergo tot celeritatis gradus communicati machinulis sphaeroidilibus muscutorum in ratione composita ex tanto numero & motu eorundem, jure merito vires, & momenta nervorum & muscutorum validissimi futuri erunt, quamvis radices motuum fibrillarum cerebri minimæ futuræ fuerint: Si ergo tot, ac tanta virium momenta eveniant ab aliquibus tantummodo & simplicioribus fibris in cerebro sollicitantibus, quibus sui proportionales nervi correspondent; quid dicendum erit, si plurimæ fibrillæ cerebri concitate & violenter sollicitentur ac stimulentur? quibus tot innumeri nervorum furculi proportionales sunt & sibi aptissime undequaque respondent? Utrique vis & momentum pene incredibile maniaci erit futurum. Mirum ulterius est audire maniacos, qui raro se miseros, sed plerumque se magnos esse militum Tribunos, se Reges, se Cæsares, se quoque Deos esse gloriantur. Censeo, tantam rerum gloriam ab eminenti animæ essentia (animæ ipsi nota) esse genitam; anima enim altissimi sui generis conscia, & quasi sui juris reddita ea ratione movet in maniacis, sollicitat fibrillas cerebri, qua in Tribunis militum, in Regionibus, in Imperatoribus moveri similiter potuisset: hæc autem morbi indoles præter cæteras maniacæ species curatû difficillima est. Præter hæc maniaci frigidam aeris intemperiem sine læsione facile sustinent, non tantum quia perturbatis internis motibus naturalibus fibrillarum cerebri, nullatenus molestis sensuum externorum affectionibus, aut desidiose animadvertunt; verum quia cum momenta nervorum ac muscutorum motibus voluntariis inservientium supra modum aucta sint, motum sanguinis quoque sollicitant, ut impetu continuo ad externas usque superficies corporis deferatur, cum itaque sanguis continuo sollicitatus nullo modo piger, in externa carniem & cutis superficie lentescat, jure vigente licet frigore sine læsione maniacus sustinetur.

29. Sicut autem maniacos a motu violento & concitato fibrillarum internarum cerebri probabiliter factos esse credimus; ita melancholicos a lentiori & tardiori motu fibrillarum earundem fieri suspicandum est; hinc timidos & mæstos, cogitabundos, tacitos & solitarios esse vidimus; cum vero delirent sine febris, jure credendum, medullares fibrillas cerebri, quantumvis lentis motu donatas, perturbatas tamen & inordinatas habere fibrarum aut rectarum, aut obliquarum, aut curvarum series; ita ut inter se naturali careant parallelismo: hæc morbi indoles tractu temporis facilius curatur, cum vitio sanguinis, aut feri austeri & lentescantis ut plurimum habeatur, cujus opera etiam fibrillæ medullares quodammodo stare ac consistere coguntur; cum autem fluida vitriolicis, aut aluminolis corporibus supra modum repleta sint, quæ violentum & celerem motum fluidorum aut minuunt, aut impediunt, propterea febrili motu in melancholicis fermentescere non tam facile confuescunt. Porro si pia mater & fibrillæ medullares cerebri solidiores fuerint, & crassiores supra legem naturalis soliditatis & crassitiei, aut vitio morbi, aut ætatis rigidiores factæ fuerint, sine opportuno contactu earundem inter se; sive cum ineptæ fiant ad motum facile suscipiendum, & tarde, aut ægre moveri possint, necesse est, aut fibras inepte & languide sollicitare animam, aut reciproce animam fibrillis crassioribus, aut rigidis compenetratam languide & pigre (etiam si voluerint) has fibrillas excitare ac movere. Quamobrem negligentia, & inertia fibrarum medullarum negligens, & iners anima potentias imaginationis, discursus & memoriæ tarde & negligenter exercens, immemores, & insensatos homines reddit ac stolidos.

30. Breviter expeditur ab iis, quæ ad motus voluntarios cerebri pertinere videntur, instituti nostri lex & ordo est, de motibus naturalibus cerebelli brevi quoque oratione differere: Claritatis tamen gratia liceat mihi prius distinguere organa animalis in *Voluntaria*, *Naturalia*, & *Mixta*; *Voluntaria* ea dici possunt, quæ moventur quidem motu absoluto, sed primario apta nata sunt moveri imperio animæ; hujus generis sunt nervi & muscoli &c. liberis & volun-

Ma-

Mc-lan-cho-lia.

voluntariis motibus inservientes, qui cerebri fibris immediate correspondent, de quibus supra innuimus; *Naturalia* vero, quæ apta nata sunt absque animæ imperio, & anima non advertente moveri impetu sanguinis, aut alterius corporis impellentis; istius generis sunt cor, stomachus, intestina, vasa omnia sanguifera & lymphatica &c. *Mixta* denique ea credimus, quæ licet a motu fluidorum, aut aeris, aut alterius corporis impellentis non advertente anima necessario moveantur; attamen imperio animæ per aliquam saltem temporis differentiam eorum motus suspendi, ac impediri aliquando potest; hujus indolis sunt pulmones, diaphragma, sphincteres ani & vesicæ, quorum motus licet primario naturales sint, attamen cum imperio animæ suspendi aliquando per aliquam temporis differentiam facile possint, de motu quoque voluntario participes judicari possunt, unde mixta organa jure vocabuntur. Hisce præmissis sicuti fere omnes Anatomici & Medici cerebrum primario voluntariis motibus, ita cerebellum naturalibus primario dicatum voluerunt. Hinc celeberrimus Fracassatus in Epistola de cerebro ad immortalem Malpighium conscripta hanc sententiam amplexus, cerebellum a medulla oblongata non differre, experimentis præeuntibus (pag. 134.) acutissime observavit; quamobrem probabiliter judicandum est, opera eorum nervorum spinalis medullæ, qui cerebelli fibrillis unice & immediate correspondet, naturales motus & actiones naturæ exerceri necessario animæ concursu debere; cum enim anima compenetrata sensoriis teneatur concurrere conservationi animalis, cum hujus conservatio opportuno & ordinato fluidorum, & organorum naturalium motui debeatur, durante fluidorum cursu, & organis frustra non existentibus, necessitate concursus operari animam in naturalibus organis, necesse est. Verum quia addant ulterius, & profunt conservationi animalium actiones mixtæ organorum, quæ & de voluntario, & de naturali motu participant, jure merito credendum est hæc organa & a cerebro & a cerebello nervea filamenta esse susceptura, quæ fibrillis cerebri & cerebelli correspondentia & proportionalia, mixtos motus & actiones exercent. Licet itaque primaria actio cerebri sit animæ libera, actio vero cerebelli sit animæ necessaria; nihilominus sapissime vi-tia cerebri & cerebelli communicantibus fibris, & membranis mutuas manus præbent, mutatis nempe a cerebri vitis naturali directione, ordine, subtilitate, apto contactu & cohæsione fibrarum cerebelli inter se; sic cum læsione cerebri organa voluntaria nervorum cerebro respondentium, & musculorum paralytica fuerint, præxi edocemur tractu temporis communicata ulterius paralyti fibrillis cerebri, non solum organa mixta sphincteris vesicæ inertia fieri, & negligenter urinæ motibus inservire; verum etiam organa naturalia pylori, & intestinorum obstupescere, ut enervato aut abolito peristaltico motu a medicamentis licet irritantibus vix, aut deficiente sollicitentur, & moveantur; sic aliquando contigit observare, post contumax delirium non solum ægrum sicco asthma correptum esse, verum etiam post longas mentis aberrationes frequenti cordis palpitatione ægros miserrime afflictos fuisse; non rarum enim est, vitia cerebri, quibus animæ actiones voluntariæ primo lædebantur, facta morbosæ causæ transpositione, naturalibus quoque organis nocuisse, ut enervatis naturalium organorum motibus & actionibus innumeræ morborum familiæ (injuria fere semper accusato sanguine) supervenerint. Neque dubitandum, has morbosas affectiones cerebelli vitis esse adscribendas, cum imaginatione, discursu & memoria penitus repositis, cerebro videlicet melius se habente, præternaturales tamen viscerum affectiones, & organorum naturalium depravati, aut aboliti motus contumaci duratione consistent; non dispari ratione communicationis, cerebelli vitia in cerebrum translata morbosas cerebri affectiones afferre consuecunt. Præter hæc suspicatus probabiliter sum, vasa sanguifera & lymphatica, quæ inter organa naturalia numerari facile possunt, quotiescunque exceperint nervea filamenta cerebelli fibrillis correspondentia, si aut convulsa fuerint, aut paralytica; iners quidem & negligens futurus erit elasticus vasorum motus, ut fluida lentiori motu circumeuntia in glandulis viscerum latefcere pejori naturæ damno conentur. Hæc breves de tam eminentibus animæ potentiis, & de tam obscuris cerebri & cerebelli morbis meditationes, quantumvis potius philosophicæ sint, quam mechanicæ; nihilominus si cum naturæ & morborum cerebri & cerebelli phænomenis accuratissime comparentur, fortasse non levi probabilitate donatæ esse videbuntur. Fateor quidem, me plurima a mechanicis eruere potuisse; verum cum deficient necessaria data, & suppositiones admodum lubricæ sint in tam obscuris animæ phænomenis, consultius putavi, me potius meliora desiderare, quam aut inutilia, aut absurda proponere. Remanet advertendum, morborum capitis curationi non raro conferre aquas nostras Hiermentes, de quibus clarissimus Franciscus Roncallus eruditissimo opere locutus est.

DISSERTATIO III.

De Morbosis Sensuum externorum Affectionibus.

31. **E**A est animæ lex sensoriis compenetratæ, ut anima sine his nec sentire, nec imaginari, nec intelligere, neque recordari ullo modo possit: Sensoria idcirco sentientis animæ operibus destinata variis perfectissimisque fibrarum præcipue membranarum & nervearum ordinibus elaborata sunt; alia siquidem est textura fibrarum auditus, alia visus, alia odoratus, &c. compositio; ordo ac modus alius; Sicut autem varia est organorum textura; ita varia subtilitas, diversa flexibilitas & elasticitas earundem; fibras enim hujus generis elastico quodam nisu donatas esse, satis superque ab experimentis edocui sumus. Cum itaque vires & momenta corporum externorum organa, minimasque eorum fibrillas sollicitant, videntur inflectere & incurvare organa ipsa, minimasque fibrillas componentes, & curvam quandam ex elasticarum genere lineam describere ut plurimum videntur; hæc curva prout ex minimarum fibrillarum flexibilitate elaborata adeo minima est, ut fere insensibilis sit differentia inter arcum minimæ curvæ & tangentem ejusdem. Cum ergo fibræ ab objectorum externorum viribus sollicitatæ a rectis in curvas quasdam lineas transire teneantur, nemo dubitaverit has fibrillas elasticæ incurvatas distrahendas esse: cum autem distractiones elasticæ fibrillarum sensationibus quam proxime proportionales habeantur, juxta mensuras distractionum; sensationes

modo majores, modo minores proportionaliter erunt dimetiendæ: Placeat ergo supponere cum doctissimo Riccato, (a) minimam sensationem futuram esse, cum fibra distracta tantum creverit supra suam naturalem longitudinem, quantum exigit centesima pars suæ longitudinis; inde colligendum, majorem futuram esse sensationem,

cum distractio fuerit una $\frac{10}{100}$ aut $\frac{15}{100}$ suæ longitudinis &c. e

contra nullam, aut fere nullam futuram fuisse, cum fibræ distractio minor fuerit parte centesima suæ longitudinis; hæc quidem attendenda sunt, ut sensatio aut major, aut minor, aut nulla habeatur. Cæterum ultra res petenda est, cum in statu naturali distractiones fibrarum, seu sensationes obtinere voluerimus; enimvero si minimæ curvæ fibræ distractiones ab externis objectorum momenti oblique impulsæ rationem naturalis æqualitatis, aut quasi æqualitatis habuerint inter se, servata quodammodo simili ratione parallelismi eandem æqualibus temporibus, nec non æqualitate, aut similitudine angulorum, quos fibræ inter se contextæ naturali dispositione componunt; nunc minimæ curvæ distractiones fibrarum, & consequenter earundem minimæ reciproce contractiones seu restitutiones erunt naturales; & sensationes naturali ordine, dispositione, lege ac motu futuræ erunt æquo animæ sentientis ministerio. Verum si vitio objectorum modo perpendiculariter, modo oblique fibras impellentium, aut vitio fibrarum, ea ratione inflexæ fibræ distrahantur, ut una fibrilla magis distracta incurvetur, quam altera; hæc vero minus tertia &c. & sic successive in ratione omnimodæ inæqualitatis, temporibus quoque inæqualibus; utique mutato earundem naturali parallelismo, mutatisque naturalibus angulis earundem, distractiones fibrarum fient asymmetræ; unde sensationes inæquales, inordinatæ & præternaturales necessario exoriantur; quinimo si violentissimo momento objectorum perpendiculariter aliquando impellentium, aut vitio fluidorum fibras irritantium violententer distrahantur fibræ, ut curvæ distractiones ipsarum habeant inæqualiter majorem, & præternaturalem rationem minoris inæqualitatis respective ad naturalem fibræ longitudinem, nec facilis ad liberam sublequi possit reciproca contractio seu restitutio earundem; mehercle tam violententer distractæ fibræ sensationes afferent inverfas, confusas, vitiosas, & aliquando dolorificas. Hæc de generalibus sensuum externorum affectionibus intento nostro necessaria satis præmissa esse arbitror.

32. De externis sensibus agendo; Etsi sensus omnes externos utiles ac necessarios plerique hominum judicaverint, præstantior tamen, & utilior visio habita est, non eo tantum mirabili opere, quo natura sola oculi usu Creatoris operibus celo terraque præstantissimis mirum in modum delectari possit. Verum quia ea sunt oculorum beneficia, ut sine his cæteri quoque externi sensus viderentur, oriarique viderentur; studiose itaque curandum est, tam mirabilem potentiam aliorum quoque sensuum commodo, utilitati ac dignitati conservare. Ad tam altum opus præstat primo morborum causas quærere, quibus acquisitis, visio conservari facilius, aut ægra commodius sanari possit. Ut autem hæc suo ordine ac claritate digerì possint, nonnulla præmittenda esse debuerunt. Primo, ex opticis certum est, quodcumque corpus visibile aut luminosum esse, aut illuminatum, & a luminoso proprio lumen, ab illuminato alienum undequaque citissime effundendam; ea autem est immensa velocitas luminis, ut celeberrima Academia Florentina experimento 265. testata sit, lucem per duo milliaria effusam absque ulla temporis differentia fuisse observatam; porro immortalis Nevvtonus def. 2. de coloribus, tam citissime propagari lumen affirmavit ex observationibus temporum eclipsium Jovis Satellitum, ut lumen a Sole in terram septem circiter minutorum spatio deferri animadvertit. Secundo, cum aer, aqua & vitrum sint diversæ gravitatis specificæ, adeoque pariter diversæ densitatis (b) transiens radius ab uno medio in aliud diversæ densitatis refringendus erit: itaque cum radii a corpore luminoso, aut illuminato transeant ab aere in humores oculorum, aqueum, crystallinum, & vitreum, jure merito refrangi debent; tanto autem opere refractionis radii ab eodem objecti aut illuminati, aut illuminati puncto egressi per refractionem in aqueo, crystallino & vitreo factam in uno iterum puncto uniri necessario debent. Tertio, in hoc unionis puncto ut visio perfectissima habeatur, adesse debet Retina; quæ a celeberrimis viris, potissimum vero ab Hayr & Wolfio pro primario visionis organo determinata est; cum vero quilibet radius a puncto radiante objecti modificatus secum afferat integram imaginem puncti radiantis, eo unionis puncto; quo in perfectissima visione adest Retina, in hac objectorum imagines depingi debuerunt. Quarto, licet radii quilibet refracti eo in puncto collecti visionem perfectissimam non parum juvent, radios tamen directos, & pupillæ perpendiculares visioni melius ac fortius prodesse demonstratum est. Si itaque radii perpendiculares una cum refractis eo oculi loco uniantur, ut immediate non adsit Retina, utique unione facta radiorum aut infra, aut extra Retinam, visio aut imperfecta, aut obscura, aut nulla erit futura. Cum ergo Retina sit præstantius visionis organum, arbitror rem fore necessariam, si de hac nonnulla dixerim, quæ perfectissimo visionis operi convenire videantur. Cum hæc sit nervi optici miræ extensio, cujus officium est a radiis perpendiculis, & refractis objectorum in puncto collectis excipere depictas imagines, jure determinatum est, hanc in tam angusto animalis spatio tam immanis ac vasta colligere non potuisse, nisi summam filamentorum Retinæ tenuitatem ac subtilitatem miraremur. Geminianus Montanarius in Epistola quadam ad nobilissimum virum familiariter conscripta hanc rem curiose agitaverat, & calculis & experimentis accuratissime, ut credidit, institutis invenit minimum sensibilem angulum, sub quo partes objecti sunt sano oculo distinguibiles, subtendere proxime in Retina chordam seu subtensam unius minuti; sed subtensa unius minuti continetur in radio sui circuli vicibus 3437. ergo verisimile putavit, spatium Retinæ figuratum ab objecto visibili subtendente chordam unius

minuti fore proxime — sui radii; inde colligit, quod quoties-

3437

cunque

(a) Pag. 131. suppl. al Giornale Tom. 1.

(b) Ex num. 54. Optices Wolfii.

cunque minimus angulus a radiis refractis, & perpendicularibus elaboratus effecerit in Retina basin seu chordam uno minuto minori, objectorum partes nullo modo apte ac distincte videri posse. Simili fortasse methodo ac ratiocinio arbitror celeberrimum virum Philippum de Hayr (a) assecutum fuisse, Retinæ filamentum esse

proxime — unius uncie Parisiensis, quæ quantitas cum proxime

8000

me ex calculis fiat æqualis octavæ parti latitudinis unius fli ferici bombycis, collegit celeberrimus Auctor, latitudinem unius filamentum Retinæ fore proxime æqualem octavæ parti latitudinis fli ferici bombycis. Denique doctissimus Joannes Ricettus in Epistola dioptrica ad nobilissimum virum fama, literis & genere celeberrimum Christinum Martinellum conscripta (b) calculis & experimentis opportune institutis in hac re probabiliora docuisse mihi visus est, crassitiem nempe capilli lucente Sole visi ad distantiam unius pedis Veneti eam habere rationem ad crassitiem imaginis ejusdem capilli in fundo oculi depictæ ut 25. ad 1.; sed diameter pupillæ ad diametrum capilli est in ratione 24. ad unum; ergo facta multiplicatione 25. \times 24. constabit, diametrum pupillæ ad crassitiem imaginis capilli in fundo oculi, seu in Retina depicti fore proxime ut 600. ad unum. Ex his luce meridiana colligendum erit, quantum imagines objectorum in filamentis Retinæ depictæ minimæ futuræ sint, cum in subtilissimo Retinæ filamento tot, ac tanta objectorum depingi facile possint. Mira certe filamentorum Retinæ subtilitas. Non mirabor amplius, cum Optici demonstraverint, ab oculo fere hemisphæricum videri posse, cum tanta hemisphæricæ extensio in tam minimo Retinæ spatio depingi, ac in oculo figurari possit. Hinc tam facile oculorum & Retinæ affectiones occurrunt, ut uno licet Retinæ filamento aut vitiat, aut impedito, aut læso visio quoque aut vitata, aut impedita, aut læsa jure merito habeatur.

33. Nunc si ea, quæ res postulat, dixerimus, non ibi sollicitus fuero de presbyta & de myopis visione dissimili, cum hujusmodi visiones naturales causas naturæ sint. In presbytis enim humor crystallinus cum non satis convexus sit; sitque majoris sphaeræ segmentum; & si nimis exigua fuerit distantia Retinæ ab humore crystallino, (c) in Retina quidem distincte delineari nequeunt objectorum vicinorum imagines, remotorum tantummodo imaginibus clare delineatis, ut vicina objecta confuse, remota distincte videantur. In myope vero, si a natura elaborata fuerit Retina ab humore crystallino nimis remota, objectorum imagines collectæ fiunt, antequam ad Retinam opportune perveniant: cumque ultro humor crystallinus fuerit nimis convexus (d), sitque segmentum sphaeræ minoris, remota objecta confuse, vicina distincte a myope videbuntur. Hisce vitis reparandis consultum fuit in presbyta lente, aut specillo convexo; in myope vero planiori, aut concavo, aut saltem minus convexa lente uti debere. Hisce itaque relictis, primo sollicitus fuero de *Maculis seu Muscis volantibus*, quæ ægrotantibus eo tædio esse solent, ut molesto errore continuo hallucinantur; nonnullæ itaque *permanentes* sunt, cum contumaci loco, eaque semper ratione distant ab axe optico, eundem semper objecti locum ac situm occupaturæ, hæc ut plurimum albo objecto firmatæ rotunda imagine delineari consuecunt. Nonnullæ vero *fluantes*, sunt nigris quibusdam filamentis distinctæ, ea ferme ratione, qua nodos ligneos abietis figurari experimur. Primæ in Retina locum & vitium habent; etenim cum membrana hæc sanguineis vasculis donata sit, si forte accidar, aut motu violentissimo sanguinis, aut vulnere &c. aliquam sanguinis, aut lymphæ impuræ guttulam aliquod Retinæ spatium esse occupaturam, futurum certe erit spatium illud Retinæ excipiendis opportune imaginibus ineptum, ut objecta quælibet maculam quamdam rotundam, juxta rotundam sanguinis, aut lymphæ impuræ effusionem observari videantur; tandiu autem macula ista erit duratura, quandiu effusio sanguinis, aut impuræ lymphæ perduraverit, evanescente postmodum macula, cum effusio sanguinis, aut lymphæ tractu temporis evanuerit; aliquando Retinæ filamentum, aut spatium, aut durius, rigidiusque, ut in senibus redditur, aut materia quadam tenaci ac viscida, aut callo quodam obruitur, aut paralyti afficitur, ut ab unione radiorum hæc minima Retinæ portio neque moveri, neque opportune inflecti possit, idcirco neque pingi, neque delineari ullo modo poterit: hæc Retinæ portio privata motu & imagine, cum talia appareant objecta, qualia in oculo figurata repræsentantur, in objecto exteriori nigra quamdam macula erit fere semper, aut diutissime apparitura, cum materia illa partem minimam Retinæ afficiens, neque evanescere, neque curari facile possit; aliquando tamen hujusmodi muscæ ac maculæ nigræ, etsi in Retina sedem habeant, nutare aliquantulum visæ sunt, non quia in Retina situm mutant, verum quia aliquando Retina ipsa aliqua motu movetur, aut trahitur ad eundem postea locum reversura. Sæpiissime tamen cum muscæ aut maculæ fluctuantes non eam semper ab axe optico distantiam habuerint, pedetentim hinc inde nutare videbuntur; quo casu has in humore vitreo, sed potissimum in aqueo sedem posuisse credendum est; cum enim aqueus humor non ea semper donatus fuerit puritate, ut granula quædam, aut filamenta impuri humoris aliquando exceperit, hæc aut radios impediendo, aut eosdem aliunde refrangendo (cum hi non in puncto Retinæ, cum cæteris radiorum ordinibus uniri opportune possint) muscas seu maculas illas in objecto parere videbuntur. Hæc autem facilius curari poterunt, si remediis humorem aqueum depurari opportune contigerit; non differenda itaque aquei humoris depuratio, cum adaucta paulatim humorum saburra rimeri facile posset, ne impuræ humorum particule sibi invicem adhærendo nebulam quandam texerent, suffusionem seu cataractam impedito luminis ingressu paritura. Nonnulli non ab aquei humoris impuritate, ac densitate cataractam orituram crediderunt, sed opinati sunt, humorem crystallinum ex plurimis lamellis diaphanis elaboratum fuisse, quæ aliquando versus aqueum humorem adeo densiores fiunt, ut supra naturæ legem indurescant, densiores autem factæ, non tantum crystallinum humorem opacum reddunt luminis impedimento; verum cum densita-

tes sint ponderibus proportionales, humorem hunc reddunt ponderosorem; adaucto autem crystallini pondere processibus ciliariis violenter distractis lens crystallina alicqualiter a naturali loco distrahitur, aut deprimitur, & lentis focus non opportune Retinam afficiens visionem aliquando, cataracta temere accusata, aut impedit, aut turbat. Inter præternaturales oculorum affectiones eam ulterius arbitror, qua icterici afficiuntur, cum omnia objecta flava videantur. Immortalis Nevvtonus doctrinam colorum acturus per solam refractionem lumen in colores mutari (e) experimentis, & rationibus in aureo optices opere edocuerat. Cum vero radii, qui varios colores efficiunt ac afferunt, differant variis gradibus refrangibilitatis (f) arbitrandum est, ab aqueo humore biliosis, flavisque particulis permixto transeuntes radios peculiarem, ac specificum refrangibilitatis gradum pati debere, ut hi juxta hunc gradum, flavum objectis colorem vitiose communicent: hujusmodi autem gradum refrangibilitatis radiorum flavorum in prisma vitreo observari posse satis evulgatum est, ut nullatenus dubitandum sit, ex tali determinato gradu refrangibilitatis radiorum a corporibus flavis aqueo humori, aut vitreo, permixtis elaborato flavum objectorum colorem oriri posse. Sed inter morbosa visionis phænomena objectorum duplicatio miranda sæpiissime est. In hac re non me latet, objecta visibilia extra horopterem constituta geminata apparere (g); verum cum objecta etiam in horoptere constituta duplicari aliquando possint, licet ac optice & dioptrici ea, quæ tanta res postulat, haberi facile possint, vehementer tamen ad hanc rem explicandam polyedra lentis experimenta conferre videbuntur: cum enim lens polyedra sit corpus ex superficiebus planis in convexas superficies dispositis (h), si oculus ita constituatur ubi radii paralleli decussantur a singulis planis polyedris, radii paralleli ab eodem objecto prodeuntes in oculum propagari debuerunt; cum vero humor crystallinus, utpote lentacula convexus radios parallelos unire debeat, in totidem diversis Retinæ punctis uniendi erunt radii, quot sunt lentis polyedra plana convexa, consequenter oculus per lentem polyedram toties videre poterit objectum, quot sunt facies, seu plana convexa lentem polyedram componentia. Experimentum hoc affabre ostendere videtur, cur aliquando objecta duplicari videantur; cum enim ob ætatem arescentibus membranis humores continentibus, aut vitio aquei, & vitrei humoris inæqualiter crystallinum humorem prementis, aut ejusdem crystallini culpa aliqua minima lentis crystallinæ portio a naturali convexitate alicqualiter declinet, ut aliquod in data minima parte planum fiat; tunc radii ab hoc præternaturali minimo plano uniendi erunt in puncto aliquo Retinæ; & cum talis unio radiorum differre debeat, & alicqualiter distare ab eo puncto, in quo naturaliter colliguntur, & uniuntur radii illi, qui per axem crystallinæ lentis una cum iis, qui naturali ratione refracti in eodem puncto Retinæ colliguntur, non dubitandum, Retinam duplici loco, ac puncto movendam & afficiendam esse, quare objectorum imagines erunt geminandæ. Verum frequentiora visionis incommoda ab uvea membrana, quæ pupillam constituit, consequi experimur. Tritum enim optice axioma est, crescente lumine pupillam coarctari, ut superfluum lumen expellatur; decrecente dilatari, ut excipiatur necessarium. Cum autem quodlibet punctum visibile radiat in pupillam per conum, cujus vertex in ipso puncto radiante locatur, basis vero pupilla sit (i), cum præter naturæ legem dilatata fuerit pupilla, basis cono luminosi major futura erit, quæ cum plures radios excipiat, quam fieri debeat, a tanto radiorum numero, & consequenter intensione ac densitate Retina violenter afficienda erit, & quodammodo vulneranda; ut autem hæc tam necessaria, tam violenta naturæ, instituto nostro opportuna magis consent: Sit basis pupillæ, aut basis circularis crystallinæ lentis spatium circulare AMBN; radii vero perpendiculares transeuntes per axem sint CGD; radii vero convergentes, & refracti sint AED, BFD, qui concurrant cum perpendicularibus radiis in Retina in puncto D, ducaturque alter circulus EGF parallelus circulo basis crystallinæ AMBN; ex optico theoremate tertio Wolfii, cum lumen propagetur per radios æqualium virium in medio non resistente, intensitas luminis crescit in ratione duplicata distantiarum a puncto concursus reciproce; num autem intensitates luminis sint cæteris paribus ut densitates ejusdem, erit densitas luminis in C, ad densitatem in G in ratione reciproca circulorum EFG, ad AMBN; & consequenter in ratione duplicata reciproce ipsius OF ad CB, sed OF est parallela CB, ergo erit OF ad CB, ut OD ad CD, quare intensitas, seu densitas luminis in C ad densitatem in G erit quoque in ratione duplicata reciproce distantiarum OD ad distantiam CD a puncto D Retinæ; quare cum in OD fiat major densitas radiorum, fiet quoque major intensitas eorum concurrentium in D. Hinc Retina violenter affecta & vulnerata remanebit visione aut læsa, aut impedita. Processus quoque ciliares aut laxati, aut contracti humorem crystallinum, aut planiorem fortasse reddunt, aut magis convexum, ut nonnulli opinati sunt; inde radiorum unio, aut a crystallino distantior in planiore, aut eidem proximior in magis convexa, erit futura. Visio propterea aliquo tempore ob opportunum concursum radiorum in Retina distincta & clara; alio tempore ob aliqualem tantummodo contractum eorundem in Retina exequendum imperfecta & obscura; alio tempore ob nullum in Retina radiorum unitorum concursum ac contractum deperdita visio, aut nulla erit futura. Superessent reliquæ morborum oculi differentia, *Ophthalmia* videlicet, *Hebetudo* & *Illacrimatio*, a quibus facile declinavimus; cum non ab organorum, sed ab humorum vitio fieri consuecant. *Guttam quidem Severam* cum a nervi optici & Retinæ paralyti, aut callo, aut quocunque alio opticorum errore plerique Medicorum factam velint, ab iis, quæ de paralyti supra diximus, causæ erunt opportune posuendæ. Pro appendice addo rem animadversione dignissimam, cæcos nempe ut plurimum longævos esse; num autem longior vita a majori fibrarum cerebri otio compareretur, quod ab otianribus nervis opticis facile assequimur, cum hi cæteris nervis grandiores sint, & supra cæteros continuo operosiores; num quia cæci mi-

nus

(a) Memoires de Mathematique.

(b) Supplementi al Giornale Tom. secondo.

(c) Per prop. 100. & 101. Wolfii Optices.

(d) Per prop. 102. & 103. Wolfii.

(e) Num. 183. Wolfii.

(f) Num. 196.

(g) Per Theorem. 80. Wolfii.

(h) Per def. 23. Dioptrices.

(i) Per Theorem. 78. Wolfii.

nus libere vivere consuecant, reliquis sensoris magis otiantibus? anceps non iudico.

34. Oculorum morbis satis expensis ad morbos auditus progredimur; ineptum autem esset, de his disputationem agere, ni prius innotescat methodus, qua aer agitatus sonum ferat; itaque celeberrimus Jacobus Hermannus (a) suscepta ab immortalis Newtono sonorum doctrina hanc explicare aggressus est; docet enim sonum fieri, cum ex vibratione seu tremulo motu corporis sonori circumjectus aer elasticus undequaque propellitur, propulsus autem densatur nonnihil; particulæ autem aeris inter se densatæ comprimuntur, compressæ vero, cum elasticitates sunt quamproxime densitatibus proportionales, coguntur denuo relaxari, & in partes contrarias, seu unde venerant, regredi: nam addit Hermannus, ita partium corporis tremuli contiguae aeris partes propulse densabuntur, regressu vero, atque adeo amota vi comprimente densatus aer iterum sese in omnes partes, quantum potest, elatere suo expandet; ita ut ita partium corporis tremuli aer condensetur, & in reditu, atque iterum rarefcat; quod partes corporis tremuli in aere ipsis contiguo efficiunt, idem etiam præstabunt aeris partes jam propulse in aere ipsis contiguo, & hic in sibi proximo, atque sic deinceps; sed non eadem ubique harmonia, ita ut, si quaedam aeris partes propulse sint, propellantur & omnes reliquæ, atque progrediantur; sed cum una propellantur, atque densentur, aliæ redeant, atque posteaquam densatæ erant, iterum rarefcent & regrediantur, idque vicibus permutatis; hac ratione sonum fieri, & tali ratione ab aure humana audiri credendum est. Notat deinde Hermannus, quod ejusmodi motus partium aeris propulsarum, atque iterum unde venerant regredientium, seu intervalla progressus atque regressus vocentur pulsus aeris, quæ intervalla ob æqualia temporis intervalla præterpropter æqualia existunt. Porro naturæ & essentiae auditus præstat inquirere soni velocitatem. Hanc rem celeberrimi viri accuratissime dimensi sunt, & primo celeberrima Academia Florentina experimento 245. experta est, sonum spatio quinque minutorum secundorum unius miliaris Veneti spatio peragere. Doctissimus Merfennus pag. 35. suæ Balysticæ expertus est, sonum minutis quinque secundis confecisse pedes Gallicos 6900. inde ex proportionum regulis innotescet, spatio unius minuti secundi pedes Gallicos 1380. conficiendos fuisse. Celeberrimus Wistonius (b) experimentis edoctus exposuit, spatio unius minuti secundi velocitatem soni fuisse pedum Anglicorum 1060. denique immortalis Newtonus (c) considerata crassitie particularum aeris & vaporum diversi generis densitate, constat inquit per experimenta, quod soni tempore minuti unius secundi eundo conficiunt pedes Londinenses plus minus 1142. Parisienses vero 1070., qui in pedes Venetos conversi afficiunt sum-

144

nam pedum 1144. — proxime. Modo ex determinata soni ve-

1440

locitate tempore unius minuti secundi mirum in modum colligit laudatus Wistonius (d) data sonorum ubique locorum velocitate,

210

ea videlicet, qua 1060. pedes Anglici, seu pedes Veneti 1209 —

1350

unius minuti spatio conficiuntur, datoque quocumque intervallo temporis, quo eadem soni velocitas datum spatium peragrat; corporis sonori a nostris auribus distantiam facile innotescere potuisse; si enim inter bombardæ ignem visum, & sonum auditum decem minuta secunda pertransire observata fuerint, constabit bombardæ locum ab auditoribus spatio 10600. pedum Anglicorum, proxime distare debuisse, ut ex regulis proportionum constabit; est enim 1. 1060 : 10. 10600. Ita si inter fulgur visum, & tonitru auditum intercedant quinque minuta secunda patebit, nubes istas, unde fulmina eruperunt a spectatoribus proxime 5300. pedes Anglicos, seu

1250

pedes Venetos proxime 6045. — fuisse distantes. Cognita itaque

350

ex immortalis Newtono sonorum velocitate progreditur celeberrimus Auctor calculorum opere intervalla pulsuum dimetiri; monitos itaque nos reddit. D. Sawerum invenisse factis a se experimentis, quod fistula aperta, cujus longitudo erat pedum Parisiensium plus minus quinque, sonum edit ejusdem toni cum sono chordæ, quæ tempore minuti unius secundi centies recurrit; sunt igitur pulsus plus minus centum in spatio pedum Parisiensium 1070, seu pedum Venetorum 1144

440

— quos sonus tempore unius minuti secundi percurrit; adeoque pul-

1440

sus unus occupat spatium pedum Parisiensium 10 — seu pedum Ve-

638

netorum 11 — proxime, id est duplam circiter longitudinem fistu-

1440

læ, unde verisimile est, quod latitudines pulsuum in omnium apertarum fistularum sonis æquantur duplis longitudinibus fistularum. Mirabile postmodum eruitur ab iis, quæ dicta sunt, & ab experimentis 241. & sequentibus celeberrimæ Academiæ Florentinæ, & juxta demonstrata a celeberrimo Taylor (e) sonos, vel magnos, vel parvos semper æque veloces & æquabiles esse futuros. Hæc quantumvis extra institutum nostrum dicta videantur, attamen eo collimant, ut cognita prius sonorum natura, velocitate & pulsuum proportionem, & consequenter tanti sensus dignitate, præstantia ac necessitate, facilius ac commodius a nobis morbosa auditus incommoda inquirantur & cognoscantur.

35. Ex soni doctrina super exposita generalis quidem soni idea innotescit, specifica vero & peculiaris soni ratio, qua diversi soni fieri diversimode possint, adhuc ulteriora petere videtur: desideratam peculiaris & specifici soni efficiendi ratione experimentis opportune factis celeberrimus Franciscus Lana (f) reperire acriter studuit, prop. enim 6. libri 9. de tremore corporum, ostendit, chordam tensam (idem intellige proportionaliter de quocumque corpore sonoro) & percussam vibrari & resonare; hanc autem non vibrari & resonare, per modum unius, sed ejus plurimas, minimasque particulas, ex quibus chorda componitur peculiare efficere, ut puto, curvas

Sydenham Opera Medica.

(a) Cap. 23. Phoron.

(b) Lectione 29. prop. 62. Coroll. 7. suarum Prælectionum.

(c) Scholio prop. 50. princ. Mathem.

(d) Coroll. 13. prop. 62.

(e) Prop. 12. methodo incrementorum directa, & inversa.

(f) Vom. 2. Magist. Naturæ, & Artis.

elasticas seu distractiones, quæ postmodum transeundo a curvis in rectas efformant minutas, minimasque vibrationes, ex quibus resultat seu componitur talis soni differentia; etenim a pluribus experimentis colligit, quod dum chorda tensa in singulis suis simplicibus undationibus removeretur a suo situ recto, quoties tendit, aut ad dextram, aut ad sinistram, toties quodammodo incurvata elongatur, & consequenter novam tensionem patitur; quoties vero iterum redit ad situm medium in linea recta, toties remittitur nova illa tensio prius acquisita: constat autem ex dictis a celeberrimo Auctore de tensione chordarum per tensionem partes chordæ comprimari, & ipsam cordam subtiliorem fieri, per reductionem rursus dilatari, & priorem crassitiem recuperare. Igitur præter motum simplicem undulatorium, hinc inde per motum unius, seu toti chordæ communem, qua chorda agitur, est, & alius motus constrictionis & dilatationis particularum, seu partium minimarum chordæ componentium, qui operatur in singulis filaminibus, ex quibus chorda coagmentatur. Immo in partibus unius & ejusdem filaminis. Cum enim hujusmodi filamina & illorum particulæ non sint singulæ singulis omnino similes, nec similes arcus describant, sed aliquæ magis, aliæ minus resistent tensioni, compressioni, constrictioni & dilatationi, dissimiles quidem, cum post tensionem se reducunt, vibrationes efficiunt singulas suæ naturæ, ac suis viribus ac conatibus, seu arcibus proxime proportionales, quamobrem ex his peculiaribus minimarum partium similium, & dissimilium chordæ componentium arcibus, seu distractionibus, & contractionibus componuntur minimæ vibrationes, ex quibus efformatur motus ille tremulus, peculiaris & specificus, qui talem ac specificam soni differentiam opportune parit. Simplex itaque & generalis soni idea undulationes totius corporis sonori ea ratione postulare videtur, qua aer simili quoque methodo vibratus, modo ita densetur, modo reditu rarefcat; specifica vero & peculiaris soni ratio hoc ulterius postulat, ut particulæ minimæ corporis sonori similes & dissimiles, quarum aliæ magis, aliæ vero minus ex dissimilibus earum arcibus tensioni, compressioni, constrictioni & dilatationi resistent, componant peculiare vibrationes ex motu partium minimarum similium, & dissimilium compositas; ex quibus fit quidam specificus partium minimarum tremor, qui talem ac specificam soni differentiam sit producturus: inde cum tam variæ fieri possint minimarum partium, seu arcuum distractiones, & contractiones, & consequenter tam variæ vibrationes, seu tremores aeri communicandæ, tot soni differentiarum ab auribus humanis erunt diversimode percipiendæ. Ex his itaque querendum est, a quam causa sonus gravis & acutus habeantur. In hac re non pigeat prius experimentorum meminisci, vibratione chordarum esse in ratione longitudinum earundem. Ita doctissimus Hayr expertus est chordam tensam longitudinis pedum decem, si tempore unius minuti centum vibrationes absolvat, hujus dimidiam eadem ratione tensam eodem minuto secundo 200. vibrationes fuisse absoluturam. Acutus itaque sonus ille esse videtur, qui parvo tempore frequentiores vibrationes absolvit, non solum juxta rationem totius organi, verum etiam juxta rationem minimorum arcuum fibrillarum, quæ dum impelluntur, frequentius vibrantur; exigui propterea & brevissimi minimeque arcus fibrillarum organi auditorii facto opportuno dum iis, quæ dicta sunt, analogismo, dum parvo tempore frequentissimas distractiones & contractiones edunt, a quibus frequentissimæ emergunt vibrationes ac tremores, majorique conatu recedunt a situ suo naturali magis violentam tensionem patientur, acutum sonum edere debuerunt. E contra sonum gravem datura erit auris humana cum majori tempore ac longiori pauciores fiant vibrationes organi & partium minimarum, seu arcuum earundem, ob tardiores distractiones, & contractiones elasticas earum, minoremque tensionem fibrillarum omnium.

36. Hisce præmissis contrahendo sermones nostros ad aurem humanam juxta anatomicum aurium ordinem placet ratiocinari; præter enim externum, & flexuosum aurium apparatus occurrit *Meatus auditorius*; cavitas videlicet cylindrico elliptica; hæc obliquo suo ductu glandulis undequaque donata est, a quibus cerumen continuo separatur; cum vero e glandulis ea ratione separatam fuerit, ut ceruminis corpus naturalem meatus auditorii obliquitatem mutaverit, undulationes aeris ultro reflexæ, & quodammodo a lege naturalium undulationum declinantes, auditum si non invertent, saltem poterunt imminuere. Clauditur autem internus hic meatus auditorius obliqua sectione a *Membrana Tympani* annulo osseo atfixa, cujus peripheria elliptica est, & ex duplici membranacea expansione duræ matris & cutis meatus auditorii coagmentata est; auditorii autem nervorum paris dura portio tympano impertitur; hoc autem tenditur & laxatur a nervis filamentis, & musculis, & ab ossiculorum determinatis motibus, quorum primus *Malleus* est; secundus *incus*; tertius *Os orbiculare*, & *Stapes* quartus, qui immediate membranæ tympani succedunt. Opera itaque musculorum & talium ossiculorum ea ratione ac lege tendi debet membrana, non solum quoad totum sui spatium, verum etiam quoad singula sui filamenta, ut æquabilis & homotona fiat undequaque membranæ tensio; hac autem lege æquabilis tensionis statutum a natura est, oscillatione externi aeris, específicos impetus membranæ tympani communicare, a quibus cum distractæ fuerint, & in minimas curvas inflexæ, postmodum vero succedente motu contractionis específicos tremores, ac vibrationes parituræ erunt, primam naturalis auditus elaborationem opportuno principio donaturæ. Quid autem de auditu timendum esset, si musculi membranarum tympani, & ossicula tendentes, aut nimio sero madefacti, aut paralytici facti fuerint? quid timendum? si humida aeris temperies, si feri calida membranam laxaverint. Nemo ignorat, hisce vitis membranæ, missa naturali tensione æquabili, naturalique fibrarum parallelismo, non eas æquabiles distractiones, & contractiones, & consequenter non eas vibrationes & oscillationes, non eos tremores excipere posse, qui specifici sonorum differentiis exequendis opportuni essent; quid ergo? obtusus mehercle fiet auditus, confusus & hebes: pejus forsasse malum irruet, si convulsis hisce musculis membrana tympani upramodum crispata ac tensa constiterit: a vibrationibus enim, & oscillationibus frequentissimis exasperata membrana feret soni acutiem, rigiditatem, & asperitatem ex quocumque levi aeris momento & pie matris consensu dolorificam sensationem erit allatura. Redeunti ad naturalem auditum animadvertendum est, naturam, initio auditus, adeo de hoc recte exequendo fuisse sollicitam, ut opera musculorum & ossiculorum interiorum adeo disponere, ac naturaliter tendere voluerit

V

mem-

membranam tympani, ut non solum membrana tota, verum etiam singulæ minimæ componentes fibrillæ homotone & unifone tendendæ ac disponendæ similiter essent: tanti porro operis perfectioni iuvat suspicari, fibras membranæ tympani adeo naturaliter singulas esse similiter, homotone & unifone tendendas ac disponendas, ut si aeris externi oscillationes totum membranæ spatium tangere, verberare ac inflectere aliquando non possint; auditui tamen exequendo satis opportune sufficere, si unum tantummodo membranæ tympani filamentum ab aere oscillante verberaretur; ea ferme methodo, qua experimur, chordas in eodem instrumento unifone tensas, tremere tamen ac oscillare omnes unisonas debere, quantumvis una tantummodo ex unisonis chorda tacta fuerit ac verberata.

37. Membranæ tympani sua cavitas correspondet; hæc sphaerica est. In tympani supernis partibus duæ occurrunt fenestræ, quæ in tympani cavitatem sese aperiunt; *Ovalis una, Rotunda altera*. *Ovalis fenestra* illa est, quæ a basi stapedis clauditur, eidem configuratione respondens, situm obtinet tympani membranæ parallelum; per hanc videtur aditus ad labyrinthi vestibulum. *Fenestra rotunda* incertam habet figuram, ut plurimum tamen ad circulem tendit, videturque membranæ tympani verticalis; a parte autem inferiore tympani proficiscitur *Tuba Eustachiana* transiens ad latera interiorum nasi foraminum supra uvulæ basin terminata. Utræque fenestræ *Ovalis* & *Rotunda* transitum donant interiori auris cavitati, quæ cavitas in osse petroso locata est, quæ *Labyrinthus* appellatur; hæc autem labyrinthi cavitas tres in partes dividitur; in *Vestibulum* nempe, in *Canales semicirculares* & *Cochleam*. Vestibulum est cavitas irregulari configuratione constructa, parietes undequaque ostendens concavos. In hac cavitate vestibuli plura aperiuntur orificia, nempe orificium fenestræ ovalis, & quinque orificia canalium semicircularium, orificium cochleæ, & quinque orificia nervis aditum præbentia, atque ideo ab istis occlusa, secunda vero labyrinthi pars, nempe canales semicirculares, hi in semicirculi modum incurvantur, numero autem sunt tres, quorum primus est canalis semicircularis major, secundus minor, tertius minimus; cochleæ autem tertia labyrinthi pars eleganter limacem cochleam repræsentat sub specie conii elaborata. Cujus cavitatis superficies non ex eadem substantia componitur, ac superficies cavitatis canalium semicircularium, quæ nempe durissimum os est; sed ex substantia ita friabili, ut in exsiccatis saltem auribus calcinatum os referat; canalis iste ope ejusdem septi in duos canales ita dividitur, ut canalis alter cum altero nullo pacto communicet: hoc septum, quod septum cochleæ dici poterit, duplici constat substantia, solidiori una, molliori altera. Duo canales, in quos cochleæ cavitatem ab exposito septo partiri indicavimus, *Scale* nominantur, quarum una per fenestram rotundam respicit tympanum, & tympani scala appellatur; altera vero cum vestibulo communicat per orificium quasi ellipticum ad latus fenestræ ovalis situm inter hanc, & orificium proprium canalis majoris (hæc vero vestibuli scala appellatur). Scala tympani superiorem situm obtinuit; scala vero vestibuli inferiorem &c. Ad actuandas autem & ditandas labyrinthi cavitates portio mollis auditorii nervorum paris descendit; in osse enim temporali, & petroso excavatur nervorum auditoriorum canalis, quem non sine ratione in duplicem partitur, nempe in communem & particularem. Quinque ulterius nervi surculi in vestibulo per membranam dilatati peculiari incessu membranaceo progrediuntur. Etenim a membrana vestibuli quædam aliæ membranæ procedunt, quarum singulæ diversum canalium semicircularium orificium ingrediuntur; ubi vero membrana per unum canalis orificium ingressa, membranæ per alterum ejusdem canalis orificium intranti percurrente occurrit, unam continuatam membranam ambæ componunt; tales cum strictioris tæniolæ sive parvæ zonæ figuram habeant, sintque motibus sonoris excipiendis tanquam proprio sensorio destinatæ; hinc a celeberrimo Valsalva *Zonæ sonore* nuncupantur; hæc sunt numero tres nempe totidem accanales, eandemque cum istis obtinent longitudinem &c. Alibi autem docet doctissimus Auctor, zonas has esse mollis auditorii nervi expansiones &c. Observat ulterius, labyrinthum humore aqueo copiose madefactum fuisse, & ab hoc patere aditum in palatum, ut aperto ore tribuendus sit aer, imminuta aurium officia reparaturus. Hæc omnia a doctissimo Valsalva hinc inde colligenda, ac describenda esse opportunum censui, ut accuratius ea innotescerent, quæ auris humanæ organo, ac officio intelligendo necessaria esse viderentur. Hisce præmissis liceat arbitrari, externum aerem a sonotaliter motum undulationes ac tremores specificè contrahere, quæ membranam tympani tali ratione obliqui impulsus urgeat, ut non solum membrana, verum etiam minimæ illius componentes fibrillæ inflecti, ac distrahi adeo teneantur, ut minimas curvas describant; filamenta autem membranæ tympani taliter inflexa ac distracta, cum elastica sint, conantur sese opere elastico momenti contractionis sese reciprocè restituere; quæ distractiones & reciprocæ contractiones, cum specificos fibrillarum motus ac tremores efficient, urgent, impelluntque simili impulsu lege tria illa officula, quæ immediate membranam tympani subsequuntur, hæc autem officula similiter mota & impulsu motu quodam composito ex motu membranæ tympani & ossiculorum, movent ac sollicitant similiter filamenta nervea nervi auditorii per membranam tympani decurrentia; pariterque filamenta membranosa ejusdem paris vagi labyrinthum investientia, & consequenter zonas sonoras naturali lege unifone tensas, ex quarum specifica ratione motus ac sollicitatione auditus sensatio opportune perficitur. Prodest ulterius actioni auditus undulatio, oscillatio & tremor aeris, qui probabiliter per foraminulum membranæ tympani ingrediens cavitatem ejusdem, & ab hac per labyrinthum excurrit; hæc enim aeris portio specificè mota a ratione motus compositi ex motu membranæ tympani & trium ossiculorum, undulationes excipit illis motibus proportionales ac unisonas; aer autem inclusus taliter motus, cum & ipse urgeat, ac sollicitationem adjuvet membranæ nervi auditorii, & zonarum, jure auditus operi auxiliaturus est. Itaque & ab his, quæ in organo auditus observata sunt, & ab experimento chordarum unifone tensarum, quæ, etsi non pulsatæ, tamen isochrone, & unifone respondent illi chordæ unifonæ, quæ sola pulsata fuerat, probabilius credendum est membranam quoque elasticam nervi auditorii una cum zonis sonoris donatam esse fibrillis ordine, textura & tensione similibus, & homologis fibrillis membranæ tympani, non solum juxta rationem totius, verum etiam

juxta rationem minimarum fibrillarum singulorum filamentorum componentium; sic enim supposita simili & æquabili membranæ tympani compositione, textura & tensione cum fibrillis membranæ nervi auditorii, & zonarum curvæ distractiones & contractiones membranæ nervi auditorii & zonarum, cum in statu naturali similes & æquales fuerint curvis distractionibus & contractionibus membranæ tympani, opera etiam adjuvante similis motus aeris in labyrintho inclusi, naturalem auditus actionem ordinatam, consonantem & harmonicam efficient. Quamobrem ut naturalis auditus actio exerceatur, jure credenda est necessaria proportio æqualitatis, aut quasi æqualitatis, & similitudinis inter undulationes & tremores aeris externi, & undulationem & tremorem interni aeris in labyrintho inclusi, & motum seu tremorem membranæ tympani, cum motu seu tremore membranæ nervi auditorii & zonarum; ita ut esse debeat motus seu tremor aeris externi, ad motum seu tremorem aeris interni, ut motus seu tremor membranæ tympani una cum ossiculis ad motum seu tremorem membranæ nervi auditorii & zonarum; verum cum motus membranæ tympani & ossiculorum determinetur a momento, & sollicitatione ac tremore aeris externi; ideo motus membranæ tympani & ossiculorum erit motui aeris externi proportionalis; pariterque cum motus seu tremor membranæ nervi auditorii & zonarum determinetur a motu aut tremore membranæ tympani, & trium ossiculorum una cum aere in labyrintho incluso, propterea licebit arguere permutando, quod motus seu tremor aeris externi sit ad motum seu tremorem membranæ tympani & ossiculorum, ut motus seu tremor aeris interni & inclusi ad motum seu tremorem membranæ nervi auditorii & zonarum; hæc quidem in statu naturali probabiliter sunt judicanda. Verum si minimæ fibrillæ membranæ elasticæ nervi auditorii & zonarum, aut vitio sui, aut meningum, aut fluidorum per cæcos aurium canaliculos fluentium, aut vitio interni, aut externi aeris non fuerint ordine, textura & tensione similiter positæ; ita ut tales curvæ distractiones & reciprocæ contractiones seu tremores fibrillarum earundem non ea ratione ac proportionem fuerint similes & æquales, aut quasi æquales tensionibus, tremoribus, aut curvis distensionibus, & reciprocis contractionibus minimarum fibrillarum membranæ tympani, & trium ossiculorum; cumque fibrillæ componentes non eum servant naturalem parallelismum inter se cum naturali positione angulorum earundem; tunc mehercule cum membrana tympani & tria officula non debita proportionem, motu ac positione membranæ nervi auditorii & zonarum respondeant: nec vibrationes ac tremores similes & isochronæ, aut fortasse nec in opportuna proportionem harmonica fuerint inter se: sonus & auditus confusi, indistincti, & dissonantes erunt futuri. Quamobrem cum membrana nervi auditorii & zonæ sonoræ pia matre undequaque induantur, & hæc cum fibrillis cerebri, a qua vestiuntur, eminentem communionem habeat, feret sensationem in anima ineptam, indistinctam & dissonantem ut anima ipsa sonos inepte & dissonanter percipiat & judicet. Arteriæ carotides, & jugulares venæ, & lymphatica vascula aures undequaque irrigant; cum autem hi meatus sanguine, aut sero irrigati, & membranæ fluidis extraneis madefactæ fuerint, filamenta illa inæquali succorum pondere ac mole repleta, erunt, ut aliquando convulsa fiant, mutatoque earum parallelismo longitudine & crassitie inæqualia, & ab inæqualibus aeris, aut fluidorum heterogeneorum dissimilibus conatibus inæqualiter tensa ac distensa consistent; cum autem fibrarum curvæ distensiones sint proxime in ratione composita ex directâ potentiarum tendentium, directâ longitudinum & reciproca crassitierum earundem; nemo dubitaverit membranarum, aliarumque partium fibras mole, pondere, crassitie ac longitudine, & consequenter distensione & contractione inæquales & asymmetras esse futuras; non ergo sperandum est, harum curvas distractiones & contractiones reciprocas fore inter se isochronas, similes & homologas, sed absque ulla proportionem harmonica dissimiles, inordinatas & asymmetras. En ergo confusus, hebes & dissonans auditus! en ex inæquali aeris motu; impetu asymmetrico, tremore & reflexione sibilus & tinnitus! en gravis & molesta sensatio!

38. Delectationi animalium præstat potissimum odoratus; hic a membrana quadam narium cavernulas investiente in officio est; hæc ex nervis primi paris olfactorii per os cribrosum, & narium cavernulas opportune expansis composita odoratus organum determinare videtur. Verum cum odores sint subiecta odoratus, & odores a corporibus undequaque citissime effluant, natura rei postulare videtur, nos prius de horum corporum effluviis acturos esse. Itaque qui Boylei experimenta e limine salutaverint, non ignorabunt, quælibet corpora composita cujuscunque regni vegetabilis, animalis, & mineralis continua effluvia quaquaversus emitte, quæ juxta vires ac momenta propriæ atmosphæræ odoratus organum modo suaviter, modo moleste sollicitant. Ut autem commodius ac clarius hæc res agitata opportune elucescat, consultum fuit a melioris notæ Philosophis præsupponere, corpora quælibet respectu sui suum totale centrum obtinere, quod tamen centrum partiale esse debuit respectu terræ. Unicuique itaque corpori, ut planetis omnibus evenit, sua circumjacet atmosphæra viribus ac momento corporis proportionalis, quæ ab effluviis quaquaversus a corpore effusis composita sphaericam superficiem describere credita est; hujusmodi effluvia per peculiarem atmosphæram effusa viribus ac momento differunt juxta rationes homologas densitatum eorundem; verum cum densitates effluviarum per varias superficies circulares atmosphæræ sint reciproce, ut spatia, quæ ab ipsis effluviis occupantur in superficiebus circularibus ejusdem, spatia autem ab ipsis occupata sint reciproce ex geometricis in ratione duplicata, seu ut reciproce quadrata distantiarum a centro corporis; utique vires, momenta ac densitates effluviarum per superficies circulares atmosphæræ eorundem erunt reciproce in ratione duplicata, seu reciproce ut quadrata distantiarum a centro corporis. Quamobrem ex his manifestum videbitur, in distantia effluvi linearis ut 2. a centro corporis ad distantiam effluvi linearis ut 3. a centro ejusdem, vires, momenta ac densitates atmosphæræ effluviarum futuras esse reciproce ut 9. ad 4. Itaque vis, momentum & densitas effluviarum distantiarum ut 2. a centro corporis erit ut 9. & vis, momentum & densitas effluviarum distantiarum ut 3. a centro ejusdem futura erit ut 4. nempe ut reciproce quadratum distantiarum 2. ad quadratum distantiarum 3. Si itaque a quibuscunque punctis distantiarum a centro corporis crescentium in

ratione arithmetica, quæ accipiantur ut asymptoton, ducantur lineæ perpendiculares inter se parallelæ, sed ea ratione geometrica decrecentes, quæ vires ac momenta effluviarum decrescunt in ratione duplicata distantiarum a centro reciproce, seu in ratione reciproca quadrati distantiarum ab eodem centro; & ab extremitatibus linearum parallelarum ductarum ducatur linea; hæc linea ducta erit logarithmica, seu curva hyperbolica aut saltem generis hyperbolici futura erit. Juxta has motuum proportionales a centro corporis, unde citissime exeunt, moveri, & agere effluvia contra sensoria videbuntur, num vero, & qua ratione effluvia a corpore eminus delata, ad corpus unde effluerant, tanquam ad suum totale centrum opportune (ut nonnulli Philosophi putant) restitui possint! hoc quidem tam anceps, tam lubricum est, ut nostrum præcurrat ingenium. Multi tamen opinati sunt, effluvia corporis, cum eminus delata fuerint, quorum momenta, vires ac densitates ea ratione notabiliter decreverint, quæ supra proxime determinatum est, necessario occurrere & incidere in atmosphæram aeream, seu ambientem aerem, cujus cum vis, momentum & densitas multo major sit vi, momento ac densitate effluviarum corporis eminus delatorum, mehercle vis, momentum & densitas aeris ambientis eo fortior & validior futura erit ad impellendum, quo atmosphæra corporis debiliior, iners, minusque densa facta fuerit ad resistendum, quotiescunque notabiliter a corpore distaverit. Itaque cum vis, densitas & momentum aeris ambientis majus fuerit momento atmosphære corporis, momentum aeris ambientis magis urgebit effluvia corporis versus plagam, unde decesserant, propter effluviarum resistantiam minorem aeris ambientis atmosphære, cum ergo momentum aeris ambientis habeat rationem majoris inæqualitatis respectu ad momentum atmosphære corporis, & vicissim momentum atmosphære corporis, in notabili distantia ab eodem corpore habeat rationem minoris inæqualitatis respectu ad momentum aeris ambientis, cogetur atmosphæra corporis in notabili distantia ab eodem cedere vi & momento aeris ambientis. Quamobrem cum effluvia corporis impedita ultro progredi non possint, inclinatis directionibus vortico, aut spirali quodam motu revertere fere omnia conabuntur, unde primo decesserant, ut iisdem, similibusque corporis porulis restituta corpus quodlibet præ data lege Universi conservarent; sed non vacat hæc tam incerta, tam obscure meditari. Certe quidem est, juxta vires, densitates ac momenta effluviarum e corpore in datis rationibus proxime exeuntium fibras membraneas & nerveas odoratus variis rationibus esse sollicitandas. Membrana itaque & fibræ nerveæ organi odoratus tali, determinataque textura elaborata, non solum ratione totius, verum etiam ratione minimarum partium membranarum, fibrarumque nerveas componentium sollicitata determinatam quandam lineam curvam describunt, vi cuius peculiaris & specifica non tantum totius membranæ elasticæ, totiusque fibræ nerveæ, verum etiam quatuordecimque minimarum fibrillarum elasticarum talis curva distractio & talis reciproca contractio exerceri debet; suspicari ergo si liceat, hanc quoque curvam distractionem logarithmicam, aut hyperbolicam, aut generis hyperbolici esse futuram. Cum enim (ut supra indicatum est) variæ distantie a centro corporis odorati accepta ut asymptoton crescentes in ratione arithmetica habeant vires, momenta ac densitates effluviarum reciproce decrecentes in ratione geometrica; nempe reciproce, ut quadrata distantiarum a centro corporis, quæ designantur a transversis parallelis ductis a quibuscunque punctis distantiarum a centro corporis odoriferi, & ab extremitatibus omnibus harum linearum intelligatur ducta quædam linea, hæc linea futura erit curva, quæ ad logarithmicam aut ad hyperbolicam lineam pertinere videbitur; sic probabiliter concipi ac fieri potest, membranam nervi olfactorii oblique tactam ac impulsam a viribus, momentis ac densitatibus effluviarum geometricè decrecentibus; juxta rationes reciprocas distantiarum a centro corporis odoriferi arithmetice crescentium incurvari ac inflecti taliter debere, ut membrana sese disponat ad lineam quandam curvam logarithmicam, aut hyperbolicam, aut generis hyperbolico similem describendam; verum cum huiusmodi curvæ adeo minimæ sint, ut a tangentibus fere non differant; si a nobis videri potuissent, satis mihi est hæc probabiliter innuisse, ut tantummodo innotescat, a quantis minimis membranarum ac nerveorum filamentorum motuum differentiis tot eminentes animæ sensationes, (tam minimas motuum, ac figurarum differentias usu ac habitu facto sentientis & percipientis) continuo exerceantur. Membrana itaque nervea oblique impulsam ac densitatibus geometricè decrecentibus, determinatam curvam distractionem patitur; postmodum vero naturali nisu elastico contractioni restituitur. Cum autem tales motus elastici distractionis & contractionis componantur ex rationibus momentorum corporis odori impellentis, longitudine fibrillarum & reciproca crassitierum earundem, hi motus cum tali determinata curva agentes, taliter sollicitando piam matrem, quæ fibræ nerveæ odoratus undequaque vestiuntur, & ab hoc eminenti consensu communicata sollicitatione correspondentibus fibris cerebri ab eadem membrana circumseptis specificam rationem, actionem, sensationem videlicet organi odoratus componere probabiliter videbuntur, a quibus motuum differentiis anima excitata rationes odorum sentire ac judicare teneatur. Quotiescunque autem filamenta membranosa ac nervea organi odoratus, aut paralytica fuerint, aut convulsa, aut gravata succis heterogeneis, tunc cum horum tensiones præternaturales, aut nimium laxæ fuerint in paralyticis, aut nimium contractæ in convulsis; aut inæqualis magnitudinis, & crassitiei; ut in gravedine seu oryza ob succorum depositorum impuritates, mehercle vitio organi effluvia corporis odorati cum non ea lege ac momento motus ac percussio, ut supra exposuimus, proportionali, apte urgere possint ac sollicitare odoratus organum; cumque fibræ organicæ præternaturales non eum naturalem parallelismum servant inter se, nec non naturalem angulorum æqualitatem, odoratus actio aut depravata fiet, aut imminuta, aut nulla; sic aliquando etiam hæc vitia contingere consuecunt, cum aut glandularum obstructione, aut cum os cribriforme fluente nimis muco læsione, aut obstructione correptum fuerit, aut cum a materia quadam polyposa narium cavitates fuerint impeditæ.

39. Sensui odoratus affinis est jucunda sensatio gustus, quæ ea, quæ aut cum cibis, aut portionibus in stomachum ingeruntur, aut amica, aut inimica, naturæ & stomacho ab anima judicantur. Sensationi autem gustus potissimum inservit lingua, cui quoque to-

Sydenham Opera Medica.

ta & palati & œsophaghi peripheria auxilio est; num autem lingua sit musculus, ut putavit Warthonus, ibi non quæro, nec disputo; certum tamen est, sex musculorum paria linguam quaquaversus movere, ut multiplicibus linguæ motibus, innumerisque vocum ordinibus opportune inservirent. Philippus autem Verheyen c. 17. suæ Anatomies nuper edocuit: *Superius lingue planum in plurimas areolas esse divisum a quibusdam sulcis seu fossulis valde inæqualibus, & in diversis subjectis admodum diversis. In distis areolis seu spatiis, quæ sulcis istis circumscribuntur, notare licet potissimum tres colliculorum species, quarum primam constituunt glandulæ, quæ in parte antica lingue, semen sinapis magnitudine vix superant, & posteriora versus sensim augentur: in vivis pellucide sunt, humoreque salivari refertæ, quem pro lingue humectatione in ejus superficiem deponunt; secundo glandulis copiose interspersa sunt corpora quadam dura extremitatibus unguium avicularum non multum absimilia, quæ in lingue planum eminent, & modice incurvata versus partem posteriorem sese inclinant; hæc corpora plerumque desinunt in simplicem cuspidem, nonnulla tamen reperiuntur bifida; tertio in superiori lingue plano etiam notantur corpora pene rotunda majoris ambitus, quam præcedentia, & non ita in cuspidem elevata; cedunt quoque illis tam numero, quam duritie; videntur autem hæc corpora facere ad sensationem gustus. Sed ante Verheyen celeberrimi viri Malpighius & Fracassarius in Epistolis ad immortalalem Alphonsum Borrellum conscriptis prius ostenderant, linguam humanam suis papillis, aut pyramidalibus, aut conicis esse elaboratam, quæ numerosiores in vivente, ac spiritum turgidæ observantur, racemose invicem coalitu sese prodentes, potissimum facto ægmine versus apicem linguæ, minus vero cum ad inferiorem linguæ partem declinaverint. Has autem papillulas, nerveas esse appendices anatomica autopsia satis evincit; hæc nerveæ papillæ cum ciborum masticatione, pressione, & affricu adjuvante saliva e glandulis linguæ & palati undequaque naturaliter expressa diversis motuum rationibus tangantur, ac sollicitentur, affectionem gustus probabiliter excitant; gustus itaque affectio a ratione tactus nullo modo dissentire videtur. Hæc quamvis in genere veritati assentiri videantur, nihilominus apud plerosque constat, specificas gustus affectiones seu determinatos sapores a determinatis salium figuris papillas nerveas taliter sollicitantibus habendos esse; variæ siquidem saporum species a variis salium configurationibus a plerisque Philosophis habitæ sunt; ut autem hanc rem experimento potius, quam ratione acquireret celeberrimus Gassendus e Democriti cineribus atomorum doctrinam excitaverat. Itaque hæc philosophatus est. (a) *Is, non incongrue definiat, qui rotundus esse, congruæque mole atomos, quæ dulcem faciunt saporem, magna figura, quæ acerbum, multangula, nigresque orbiculari, quæ asperum; acuta conica incurva non tenui, non rotunda, quæ acutum; orbiculata, tenui angulata, incurva, quæ acrem; angulata, distorta, crurumque equalium, quæ salsum; rotunda, levi, distorta, pauca, quæ amarum; tenui, rotunda, parva, quæ pinguem. &c.* Verum cum huiusmodi experimenta & figurarum salinarum observationes non id certi referant, quo salina corpora tantummodo sapores referre judicentur; cum hi etiam a sulfure & varia miscela salium, sulfurum, aliorumque corporum haberi plerumque possint, propterea in tam ancipiti re contentus fuero generali ratiocinio suspicari, sapores promiscue a salium, sulfurum, aliorumque corporum superficiebus papillas nerveas sollicitantibus esse orituros. Ex hac generali idea, cur non liceat específicos sapores quærere a determinata salium, sulfurum, aliorumque corporum commixtione? Fateor quidem usque adhuc ignotum esse, qualis futura sit horum corporum specifica mixtio, ut specifici sapores vere habeantur; verisimilitudini tamen accedit, *Dulcem saporem a ratione æqualitatis inter miscelam salis & bene concocti seu depurati sulfuris, aut ab aliquo sulfuris prædominio supra salis, aliorumque corporum momenta posse dimetiri; sic Amarum fortasse fiet, cum nullum sulfur; aut si sulfur adustum & acre cum majori ratione salis, aliorumque corporum, quibus omnibus inest inæqualis & aspera superficies, mixtionem effecerit; Insipidum vero, cum crudo sale & sulfure compositum fuerit corpus; aut si cum majori aquæ portione minima salis & sulfuris quantitas miscelam fecerit; Acerbum verum aut Austerrum a crudo sulfure & sale cujus octaedrica, aut parallelepipedum rhomboidea fuerit superficies, videtur esse elaborandum.* Ex varia itaque mixtione corporum inter se variis, cæterique emergent saporibus, ea videlicet ratione homologa, quæ ex diversis linearum luminis densitatibus, una cum variis refractionum gradibus varios colores oriri experimur; hæc enim corpora invicem commixta, & salivari humore opportune dissoluta papillas nerveas sollicitando in ratione composita ex numero salium, sulfurum, aliorumque corporum, momento eorundem, & ratione salivæ, quæ universa hæc corpora penetrantur, & madefiunt, papillis taliter inflexis, aut incurvaris diversas in lingua saporum rationes afferre consuecunt. Ab hisce papillarum motibus communicata sensui communi seu piæ matri, quæ & linguæ papillas & fibras medullares cerebri consentientibus fibris investit, opportuna & specifica fibrarum medullarum sollicitatione variis sapores animæ offeruntur sentiendi, & judicandi.*

40. Impurò itaque sanguine, si plurima corpora in glandulis linguæ deponantur, quæ excretoria harum oscula obstruat, mehercle saliva impedita arefcunt linguæ filamenta, & nerveæ papillæ arefcunt non ea facilitate moveri, inflecti & incurvari poterunt, quæ in naturalibus saporibus opportune deferendis fieri debuisset; saporibus itaque aut imminutis, aut obliteratis ægri de nausea, cibi fastidio, consentiente etiam stomachi membrana, ut in febribus familiare est, molestissime conqueruntur: sæpius biliosis particulis lympham, & sanguinem plus justo decurrentibus, si in hæc vascula & glandulas salivales hæc biliosæ particule evolvuntur, ab acris, & aspera biliosorum corporum superficie sollicitatis moleste nerveis papillis sapor amarus ingravescit; sæpe ab acris, & caustico sale salivæ irritata & paulatim erosa linguæ filamenta, fistulæ, ulcera & scissuræ superveniunt, & aliquando a venefica vitriolici corporis metastasi cancri linguam horride lacerant. Notum jam est, saliva muriaticis salibus repleta ob papillarum nervearum peculiarem sollicitationem, aut ariditatem earundem strere animalia graviter debere; probat autopsia, plurimas fordes humorum per

V 2

lin.

(a) Fracassatus pag. 194. de lingua.

Vitia
Odo-
ratus.

linguæ glandulas separari; cum pluribus in morbis crustæ diversæ indolis, ex varia humorum præternaturalium hypostasi supervenire videantur. Mira quidem linguæ indoles, quæ non tantum conceptus animi voce & sono exprimit; verum etiam bonas, & malas corporis affectiones affabre indicare apta est; unde Hippocrates in quibuscunque morbis acquirendis, aut judicandis jure merito observandam esse docuerat.

41. Immortalis animæ dignitas hoc exigere supra modum visa est, ut quatuor sensoris in capitis regione prout digniori animæ sede exercendis dotaretur; uno tantum sensu tactus supersite, qui tot animalibus communis undequaque exerceri posset. Immortalis Malpighius, qui hanc rem de externo tactus organo anatomice agitaverat, certiores nos fecerat, pyramidales papillas e nervoso ac reticulari corpori progenitas per universam cutim effusas, & e cuticula erumpentes tactus organum esse futuras. Hisce autem pyramidalibus papillis adstant undequaque per totam cutis superficiem glandulæ miliares, a quibus lymphæ & sudor eumpere consuevit, non tantum communi utilitati naturæ, verum etiam ne papillæ pyramidales vitio tactus arescerent. Monendum autem, affectionem tactus aliquibus in partibus acutiorem esse, aliquibus vero obtusorem fuisse, determinata lege sensus a majori, aut minori numero papillarum pyramidalium & cuticula erumpentium, quarum opera corpora calida & frigida, solida & fluida, dura & mollia &c. dignosci potuissent; ex vario siquidem objectorum momento varia exercetur papillarum curvitas, varia flexio, variusque inclinationis gradus, quæ rationes motuum per membranas papillas investientes communicatæ consensu fibrarum medullaribus cerebri fibrillis, motibus æqualibus, aut proportionalibus sollicitant animam, ipsique compenetratam homogene urgent & excitant, quibus objecta sollicitanda sentire & judicare anima teneatur. Non diu itaque laborantium esse, cum vitia tactus habere voluerimus, offusis enim in miliares cutis glandulas fluidis, aut acris, aut muriatico sale & adusto sulfure repletis, moleste irritantur extimæ cutis & cuticulæ fibrillæ. Hinc ex balsamici sulfuris defectu graves pruritus, cutis asperitates, turpes pustulæ, & guttæ rosaceæ emergunt. Ulterius ex vitriolici, aut aluminosi salis additamento, & juxta majorem salis falsi, acris & acidi ubertatem lepræ, & variæ veneficæ serpiginis ingravescent; ex his a stagnatis humoribus obstructæ glandulæ miliares innumera vitia generari videntur, inter quæ cutis nigredines & porriginæ, ephelides & lentiginæ varii generis &c. Sed pejus omni esset, si paralyti afficiantur nervea illa filamenta, quæ ad extimam cutis superficiem delata papillas pyramidales mire texunt; enim vero nerveæ hæ papillæ communicata sibi affectione paralytica cum sine sensu reddunt, aut saltem stupidum, obtusum, & hebetem, quod majoris semper morbi omen esse plerumque experti sumus.

42. Cum plurima cutis vitia a fluidis non satis opportune, aut nimium transpiratis oriri frequentissime possint, ibi data loci opportunitate breviter de transpiratione nonnulla dicere æquum erit. Per poros itaque cutis transpirare animalia qualibet satis superque potum est; excernuntur enim per poros cutis continuo motu corpora cujuscunque generis, quæ per innumeram glandularum internarum familiam separari opportune non potuerunt. Tanto operi præstat potissimum *Motus internus fluidorum*; secundo *aeris ambientis caliditas & rarefactio*; tertio *uberrima salium dissolventium quantitas, a qua fluida animalium sæpissime dissolvuntur*. Hæc tria si opportuna ac debita ratione fiant, apte ac naturaliter transpirabit animal; cæterum iniqua transpiratio fiet, si hæc aut minus, aut magis operentur. Ad primum ergo quod attinet; *Motus internus fluidorum* a causis internis, sed potissimum externis excitatus calorem afferens transpirationem ultro promoveri consuevit. Cum enim calor sit ut impressiones particularum corporis calidi in quopiam objecto corpore calorem excipiente, quotiescunque sulfureæ particulæ ad statum volatilitatis evectæ fuerint, salinas quoque & fibrosæ sanguinis filamenta violentissime agitant; cum vero agitationes seu impressiones particularum sulfurearum in cætera fluidorum corpora sint proxime in ratione composita ex duplicata velocitate, & simpla densitatum particularum sulfurearum, manifestum est quantum exaltato supra modum sulfure universæ fluidorum particulæ agitari violentissime teneantur; ex violentissimo autem motu particularum omnium atteruntur corpora inter se, & fibrosæ fluidorum filamenta scinduntur, & soliditas eorundem enervatur; sic rupta, attenuata & enervata corpora & citissimo motu agitata mi-

liares glandulas quantitate majori undequaque replent, ut momento motus continuata, & adaucta proportionaliter velocitate fluidorum, uberrima transpiratione per poros seu per excretoria glandularum miliarium vasa, ut in febribus sæpissime evenit inauspicato egredi teneantur. Hæc methodo plus justo transpirat animal; a qua violenta & uberrima transpiratione aliquando boni effectus, sæpissime mali enervata natura superveniunt. Si hæc ab excessu transpirationis quid a defectu timendum erit. Mehercule ex deficiente transpirationis opera ob densitates & vitriolicas, aut aluminosas corporum configurationes, aut ob cutis conspersionem ictericæ flayæ, aliquando nigræ, podagræ & innumera cutis affectiones elaboratæ vitia cutis parturient. Secundo prodest vehementer transpirationi *Calor externus*, quo aer rarefit, rarefactus enim non illud momentum pressionis exercet supra extimam superficiem animalis; unde cutis animalium minus pressa ad majorem superficiem dilatata & extensa sinit quoque miliares glandulas magis dilatari & extendi; cum autem miliares glandulæ in eo statu minoris dilatationis, quo aer minus rarefactus majori momento premit, ad eum statum majoris dilatationis, quo aer magis rarefactus minori momento pressionem efficit, sint ut solida similia; hæc autem crescant in ratione triplicata suarum diametrorum; utique in glandulis dilatatis ab aere magis rarefacto id spatium futurum erit continendis fluidis aptissimum in proxime triplicata ratione suarum diametrorum; quamobrem si diameter glandulæ miliaris in statu minoris dilatationis fuerit ut 1, diameter vero ejusdem in statu majoris dilatationis fuerit ut 2, erit quantitas fluidi contenti in glandula minus dilatata, ad quantitatem fluidi contenti in glandula magis dilatata proxime ut 1 ad 8. Octupla itaque quantitas fluidi continenda proxime erit in glandula miliari, cum aere magis rarefacto hæc futura fuerit in statu majoris dilatationis. Præter hæc cum sectiones excretoriæ pororum glandularum miliarium cutis dilatentur & extendantur, & ipsæ in ratione duplicata suarum diametrorum, erit sectio pori, seu canalus excretorii glandulæ dilatatæ ut unum in aere minus rarefacto, ad sectionem ejusdem pori dilatati ut 2, in aere magis rarefacto ut 1 ad 4. quare quantitas fluidi lymphatici ut 8. contenta in glandula miliari in statu majoris dilatationis transitura erit e sectione ut 4. canalus excretorii, seu pori ejusdem glandulæ. En itaque cæteris paribus ab aere vi caloris rarefacto, cujus opere proportionaliter rarefacta extenditur cutis superficies, major fluidi quantitas in glandulis miliaribus, & major fluidi exitus per magis apertas sectiones pororum seu canaliculorum glandularum earundem; videlicet, en necessitas majoris transpirationis; sic æstivo tempore & in hypocaustis major sudor & transpiratio; hinc ex nimia lymphæ exeuntis, & transpirantis copia debilitas & languor; hæc tamen si cum conferentia, & tolerantia animalium opportune fiant, secundæ res erunt; cæterum gravi naturæ fato futurum erit, si excessu transpirationis animalia deficere videantur; hæc quantumvis gravia sint, graviora tamen aliquando contingent, si excedens externi aeris frigiditas, aut nimia cutis densitas, transpirationis impeditæ vitium fecerint; etenim in adultis potissimum cutis densior facta & aeris frigiditas, variolas, morbillos & periculas facillime prohibent, ne liberiori transpirationis motu egrediantur; hinc stagnatis in cute humoribus fit prava particularum mixtio, quæ veneficos effectus afferens, ea trahit secum damna, quæ mortis periculo ut plurimum exolvuntur. Tertio transpirationis vitia affert *uberrima salium quantitas*; etenim in pluribus morbis, sed potissimum in hecticis fluidorum filamenta cum salinis plus justo particulis associata fuerint, assiccient balsamico sulfure, ab his in motu fluidorum circa proprium axem continuo rotantibus, asperis, inæqualibusque superficiebus, quibus undequaque circumscribuntur, ægerrime lacerantur. Dissoluta autem & rupta filamenta sanguinis naturalis mixtionis vitio nullo aggere, nullo vinculo serum frænant ac muniunt, quin summa libertate, tenuitate ac motu fluens copiosius & velocius in miliares glandulas, ab iis uberrima transpiratione per cutim exeat, sudores ægerrimos & molestissimos allaturum; hinc macies & tabes, languor & deliquia superveniunt. Hæc & plurima alia tum a defectu, cum ab excessu transpirationis cutis vitio evenire possunt incommoda, quæ toti animali communicata, fluida solida summo naturæ dampno evertere poterunt. Hæc breviter de morbofis solidorum motibus sufficiant, Mechanici tamen morborum Operis complemento proderit, si denique Mechanicam morborum desumptam a motu febrium, Deo juvante, ageremus.

MECHANICES MORBORUM

P A R S T E R T I A,

DESUMPTA A MOTU FEBRIUM.

BENEVOLIS MEDICINÆ TYRONIBUS.



Raxis Medica, quam quotidie profiteor, & febrium phænomena attentissime observata expositam febrium Theoriam, Lectores Benevoli, me docuerunt; ut autem facilius innotescant, quæ hic dicturi sumus, Tyrones primo monitos volui. Cum corpora elastica, & non elastica sint numero, pondere, superficie, motu, &c. seu momentis omnino diversa, hæcque in actione & reactione pro minima, & æquabili mixtione obtinenda inter se esse debeant, ut naturale æquilibrium massæ sanguineæ habeatur, & conservetur, placuit pro hypothesei arbitrari, summam momentorum corporum elasticorum æqualem esse summæ momentorum corporum non elasticorum; quia vero sanguinis constitutio non finit eandem, ac præcisam servari diversorum elementorum componentium quantitatem; propterea (quantum in re tam obscura conjectari potest) jure arbitratum est, naturam ea lege hacque methodo partiri summam momentorum corporum elasticorum, & non elasticorum, ut si momentum alicujus corporis elastici sit in aliqua ratione inæqualitatis ad momentum alterius corporis non elastici; ita reciproce tertium quoddam momentum corporis non elastici sit in eadem ratione specifica inæqualitatis ad quartum momentum corporis elastici alterius generis, & sic successive, &c. tali semper servato ordine, quo summæ momentorum corporum elasticorum, & non elasticorum sint æquales inter se, quacunque proportionem momenta ipsa sint distributa in massa sanguinis. Secundo, ut aliter explicetur hypothesis, supponamus ex singulis massis elasticis simul sumptis fieri massam A, ex singulis vero massis non elasticis simul sumptis fieri massam B, quia ex hypothesei summa momentorum corporum elasticorum æqualis esse debet summæ momentorum corporum non elasticorum, erit ut massa A ad massam B, ita reciproce celeritas massæ B ad celeritatem massæ A; ex qua proportionem colligitur æqualitas præsupposita momentorum elasticorum, & non elasticorum inter se. Tyrones itaque vel primo conceptu intelligant momenta corporum, vel secundo; semper momenta corporum elasticorum, & non elasticorum erunt in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis, quorum necessario opere nexus, unio æquabilis, & minima mixtio elementorum omnium in naturali statu haberi debuerunt. Hisce prænotatis, hanc *Febrium Mechanicam* tres in partes dividendam esse censui; prima quidem *universales Febrium anomalias*; secunda *intermittentium Febrium causas, symptomata, legem & ordinem frigoris & caloris*; tertia vero *continuas Febres agit & quaerit*. En itaque completa *Mechanices Morborum desumptæ a Motu fluidorum, solidorum, & Febrium Theoria*; superest, ut consilio potissimum celeberrimi professoris Alexandri Maccope, ne praxis quoque medica mechanico ratiocinio fraudetur; quartam partem *Mechanices Remediorum* superaddere curemus, quam totis viribus, Deo dante, exequi conabimur. *Valete*.

Cum quatuor illa sint, ex quibus compositum est corpus, terra, ignis, aqua, aer, horum naturalis excessus defectusque, & ex proprio loco in alienum translatio, per quam, quod sibi conveniens est, non tenent, intestinam quandam seditionem, & morbos inferunt; quando enim præter naturam unumquodque sit, aut transfertur, calefcunt utique, quæ non frigeant, arida madent, gravescunt levia, & cetera omnia similiter permutantur; solummodo vero idem aliquid sibi met secundum idem, atque similiter, & debita proportionem servata accedens, vel decedens, permittit se idem sibi ipsi sospes, integrumque manere, quod autem aberrat, sive accedendo, sive decedendo mutationes varias, morbos, corruptiones infinitas inducit. Plato in Timæo.

DISSERTATIO PRIMA.

De Febribus in genere.



Andiu vivimus, quandiu movemur, tunc morimur, cum fluida & solida deficiente motu desinunt, tum sani vivimus, cum fluidorum & solidorum motus ordinati sunt, æquales & isochroni; tum maxime ærotamus, cum utrorumque motus inordinati sunt, inæquales & asymmetri. Hæc est idea sanitatis & ægritudinis; hæc vitæ & mortis origo, ac principium est.

Cum n. 3. & seq. Part. 1. *Mechanices Morborum*, motum pressionis, ejusque phænomena satis consideravimus a quo filamenta sanguinis continuo atteruntur, minimasque in particulas quodammodo infinite parvas dividuntur, ut intimior, faciliior ac perfectior fiat earundem particularum mixtio; æquum est, ex perfecta, ordinata & æquabili mixtione earundem naturalem temperiem, ac statum sanguinis; ex imperfecta vero, inordinata & inæquabili earum mixtione præternaturalem intemperiem, febrilemque indolem massæ sanguinis habendam esse: ex variis nimirum mixtionum gradibus, ordinibus ac legibus emergere ex practicis phænomenis mihi visæ sunt universæ febrium anomalie. Omissa itaque communi febrium definitione, quam tot celeberrimi viri undequaque docuerunt, aliter placuit definire, & definitione quidem, quæ mechanicæ legibus commodius satisfacere videatur.

2. *Febris ergo universaliter morbus, est motus asymmetri mixtioni elementorum masse sanguinis cum inæquali aut dissimili excessu, vel defectu proportionalis velocitatis fluidorum & solidorum.* Cum in corporibus quibuscunque tum naturalibus, cu artificialibus ex determinata proportionem mixtionum elementorum componentium diversæ fiant superficies, diversæ figuræ, diversi colores, diversi motus, & diversæ vires naturæ componentium proportionales; divini enim Platonis in Theætero enunciatum est *ex latrone, motuque, & alterna commixtione fiunt omnia, quæ esse dicimus*; ita quidem æquæ temperies & naturalis constitutio sanguinis ab ordine, & determinata lege mixtionem corporum componentium unitate naturæ habenda erit. Verum quamvis manifesta videatur lex determinatæ mixtionis in naturali massa sanguinis, adhuc tamen querenda esset specifica proportio corporum miscibilium, ut naturalis temperies & naturalis constitutio sanguinis habeatur, & conservetur. Enimvero cum elementa massæ sanguinis componentia sint inter se diversa mole, figura, superficie, pondere, motu ac numero, certe horum momenta inæqualia actiones & reactiones semper edent inæquales & asymmetras cum directionibus eorundem inæqualibus,

& inordinatis, quæ non nexum & unionem sanguinei compositi tantis naturæ actionibus necessariam conciliarent, & suinerent, sed laxitatem, & dissolutionem. Hinc pro æqua unitate compositi ex geometricis & mechanicis legibus statuendum, corpora, quæ elastica sunt & actiosa, motuque velociore prædita, numero, mole ac pondere proportionaliter minora esse; corpora vero, quæ inertia sunt & non elastica, motuque tardiore donata, mole, pondere ac numero proportionaliter esse majora. Ita sane facta ratione reciproca, aut quasi reciproca momentorum corporum componentium velociora & elastica cohibentur & frænantur ab inertibus, tardioribus & gravioribus; & vicissim inertia, graviora & tardiora a velocioribus & elasticis communicatione massarum & virium reciproce, aut quasi reciproce adjuvantur. Id sane juvabit unice, ut in æqualitate momentorum actiones & reactiones corporum sint ordinatæ, æquabiles & unimodæ cum regulari lege, ac ordine directionum unitatem ac complexum sanguinei compositi unitate naturæ sustentium & conservantium; consilio autem addidi, aut quasi reciproce, cum fatear, momenta corporum miscibilium non semper perfectissime in ratione reciproca futura esse inter se, ut omnino inter se equipollent; tunc enim geometrica & perfectissima sanguinis temperies & constitutio haberetur; verum cum aliquis excessus, aut defectus momenti alicujus corporis supra momenta aliorum non id vitii parere possit unitati compositi, ut compositum notabiliter erraret; ideo momenta corporum in statu æqualitatis, aut equipollentia consideranda erunt inter se, quamvis ratio reciproca momentorum non tam rigorosa habeatur; ob aliqualem itaque excessum, aut defectum momenti alicujus corporis supra rationem reciprocam reliquorum momentorum dici potest in aliquibus servata unitate compositi sanguinei temperies serosa, in aliquibus temperies ac constitutio &c. sed de hac re satis. Certum est, hanc necessariam rationem reciprocam momentorum particularum sanguinis pro necessaria, ac naturali unitate compositi haberi perfecte nullo modo posse, nisi prius perfectissime elementa inter se misceantur; tantæ enim mixtionis opera sunt intimi contractus, intimi occurfus, intime & æquabiles actiones, & reactiones eorundem, quorum magisterio particulæ componentes ad dimensiones inter se homologas paulatim redactæ momenta elementorum reddunt inter se reciproce, aut quasi reciproce proportionalia. Cæterum si vitio perfectissimæ mixtionis hæc deficiant, contractus & occurfus corporum erunt inter se inordinati, inæquales & asymmetri, actiones & reactiones inordinatæ, inæquales & symmetræ, & momenta elementorum componentium enervata naturali unitate compositi sanguinei, inordinata fient, inæqualia & asymmetra, quæ omnia evenire in febribus verisimile est. Quamvis autem in febribus particularæ sanguinis, plerumque præter legem velociore esse soleant,

attamen cum aliquando accidat etiam præter legem tardiores esse, consultum fuit *excessum, aut defectum proportionalis velocitatis* accuratissime adnotare. Sanguis enim in febribus non semper peccat velocitate, sed etiam tarditate; proinde cum velocitas & tarditas supra aut infra naturæ leges extiterint, semper febrile vitium consequi necesse erit. Denique cum perfectissimæ mixtionis elementorum, & æqualitati momentorum massæ sanguinis profuit necessario *æqualis motus, & oscillatio organorum*, idcirco cum inæqualis fuerit, inordinatus & asymmetræ motus solidorum, jure mixtiones corporum, actiones & reactiones, & momenta eorundem elementorum massæ sanguinis inæqualia erunt, inordinata & asymmetra febres factura. Ex his brevitatis & claritatis gratia prænotandum est, nos *intimam, minutissimam, perfectissimamque mixtionem elementorum massæ sanguinis, quorum beneficio fiunt actiones & reactiones æquales corporum inter se, eorumque momenta existentia in ratione reciproca debito æquilibrio, aut quasi æquilibrio inter se equipollean, apta unitate compositi sanguinei, æquilibrio mixtionis massæ sanguineæ* posterum esse appellaturos.

3. Definitione febrium breviter exposita, decursu enim orationis ultro constabit; ordo exigit febres dividere, divisione tamen simplici in *Intermittentes & Continuas*. De intermittentibus autem in secunda; de continuis in tertia dissertatione agendum erit: interim ut generales febrium affectiones, & anomalias accuratiori examine inquiramus, juvat hic primo expendere *momenta & vires corporum elasticorum, & non elasticorum inter se*; secundo *proportiones eorundem respectu feri, in quo innatant*; tertio *proportiones feri, reliquorumque elementorum respective ad vasa continentia, & nervos vasa circumscriptibentes*. Elementa itaque *actuosa seu elastica* massam sanguinis componentia jure dici possunt *particulæ sulfureæ*, quas elasticas pluribus in locis de principio sulfureo ostendit celeberrimus Gulielmus; *particulæ aeræ*, quas in sanguine observaverat Boyleus; & *globuli plano-ovales* Lewenhockio observante; & quæcumque alia elastica, si quæ sint, minoris tamen momenti. Elementa vero *inertia seu non elastica* massam sanguinis componentia numeramus *salia cujuscumque generis*; *particulæ aqueas, seu serosas*, cum tam aqua, quam serum ejusdem sint indolis; cum vero aqua communis ab experimentis celeberrimæ Academiæ Florentinæ nullatenus elastica experta sit, ob id serosas sanguinis particulæ non elasticas esse firmiter putandum est: *terreæ quoque damnatæ*, si quæ sint in massa sanguinis, inertia & non elastica elementa habendæ erunt. Cum superius indicatum sit, momenta corporum elasticorum in naturali temperie massæ sanguinis futura esse in ratione reciproca, aut quasi reciproca cum momentis corporum non elasticorum; cumque momenta corporum sint ut rectangula composita ex massis horum ductis in suas velocitates, erunt massæ corporum elasticorum ad massas corporum non elasticorum ut reciproce sunt velocitates horum ad velocitates illorum. Hæc quidem proportio unionem & nexum fluidorum sustinet: hæc æquabilem solidorum oscillationem promovet; præter cætera beneficia vires vivæ corporum elasticorum, & solidorum oscillationes id præstant, ut minimi canales ab æqualitate fluidorum circulantium, & ab æquabili oscillatione solidorum aperti consistant: hinc sanguis ab arteriis in venas, & cætera fluida ab uno canali in alium facile transeunt. Ob id in febribus facile solida impedita arescunt & pigrescunt, & fluida lentescunt, cum in his vires elasticæ fluidorum inertes sint, & solida ægræ oscillent. Itaque vel externi, vel interni, vel mixti agentis vitio corpora primo actuosa & elastica non eam rationem habeant reciprocam cum corporibus inertibus; sed elastica corpora habeant rationem majoris inæqualitatis respective ad corpora inertia seu non elastica. Cum corpora elastica in hoc statu suos habeant gradus velocitatis numero eorundem proportionales, erunt quoque velocitates corporum elasticorum in multo majori ratione majoris inæqualitatis respectu corporum non elasticorum: cum vero momenta corporum elasticorum, cæteris paribus multo majora supponantur momentis corporum non elasticorum, hæc multo majorem impetum efficient in corpora inertia, quam ut opportuna ratione ista illis possint resistere; cum ergo nulla fieri possit æqua & opportuna actio & reactio corporum elasticorum & non elasticorum, nulla quidem fiet naturalis & æquabilis mixtio eorundem in sero sanguinis; deperdito autem mixtionis æquilibrio excessu corporum elasticorum febres continuæ erunt orituræ, Quod si corpora elastica minorem rationem habeant respectu corporum inertium, multo minor quoque in data ratione futura erit velocitas corporum elasticorum, quid ergo? ex defectu velocitatis horum gravior eveniet inertia corporum non elasticorum, major sequetur contractus corporum inertium inter se, & gravius horum pondus ac momentum erit futurum. Verum cum ex majori contactu corporum inertium, horum superficies augeantur in ratione duplicata, & horum moles ac pondera in ratione triplicata laterum homologorum; hæc inertia corpora & superficie & mole tam adaucta impediunt viam, transitumque liberum serosis potissimum, elasticisque corporibus, ut ægre, aut imperfecto misceri inter se possint: taliter affecta massa sanguinis lentior jure fiet, densior ac ponderosior; quinimo adauctis hoc gravi onere salium momentis, falsa corpora angulis, quibus circumscribuntur, membranas vasorum, cæterasque membranofas superficies, per quas undequaque excurrunt, sollicitabunt, molestoque stimulo rigores, horripilationes, cæterasque frigoriferæ sensationis phænomena efficient, ut in febribus intermittens patimur experimur, de quibus suo loco dicemus.

4. Non tantum necessaria est proportio reciproca momentorum corporum elasticorum & non elasticorum inter se; verum cum in naturali temperie massæ sanguinis observante Boyleo serum ad partes consistentes esse debeat in ratione triplâ, aut quasi triplâ, videlicet ut 3. ad unum, hæc semper ratio majoris inæqualitatis partis fluidæ ad partes consistentes reliquorum corporum admittenda erit, quæ est inter 3. ad 1. Si itaque solida, & consistentia corpora

excedant excessu —, tunc ratio feri ad consistentia corpora erit 3.

ut ad 1. + —; si vero deficient defectu — erit quoque ratio feri ad

corpora consistentia ut 3 ad —. Cum autem ratio feri ad elementa

quælibet consistentia ac solida esse naturaliter debeat, quam proximè ut 3. ad 1. certe tam in supposito excessu, quam in defectu

mutabitur determinata & naturalis ratio majoris inæqualitatis, quæ est inter 3. ad 1. quod sane grave vitium erit, si diu perduraverit. Vitio enim excessus corporum solidorum seu consistentium in fluido sanguineo majori numero permiscetur solida corpora cum fluido, quam exigunt vires fluidi sustinentis: Cum enim corpora innatantia in fluido sustineantur suspensa opera suarum superficierum; quæ augmento corporum similium cum crescant in ratione duplicata laterum homologorum, horum autem moles crescant in ratione triplicata laterum eorundem, & hæc sint ponderibus proportionales, manifestum est, ex majori contactu solidorum corporum inter se in fluido sanguineo plus augeri moles & pondera, quam superficies, a quibus superficibus tantummodo sustineri commodius possunt; adauctis ergo molibus & ponderibus corporum solidorum supra eorundem superficies non apte ac facile sustineri, moveri ac trajici undequaque possunt in sero sanguineo, ut solida cum liquidis perfectissima ratione misceantur. Si vero plus deficient solida corpora, quam par est, hæc nimis sejuncta inter se excessu fluidi interpositi directiones motuum acquirunt naturalibus directionibus asymmetras: & sane cum massæ sint ponderibus proportionales, erit massa feri cum quan-

titate corporum solidorum — specificè levior massa illa feri cum

quantitate naturali corporum solidorum ut 1. hinc massa feri cum

quantitate corporum solidorum — rarior erit massa illa feri cum

quantitate corporum solidorum ut unum; ideo massa feri continens

corpora solida ut — cum sit rarior altera, transibunt contenta so-

lida per grandiores areas seu porositates feri sanguinei absque occursum debitarum resistentiarum; cum vero rarius, leviusque serum non ea virium proportionem resistat momentis corporum elasticorum, & non elasticorum, quantumvis numero minorum, elastica quidem corpora & non elastica per vias ac directiones itura erunt non sibi naturaliter homologas velocitatibus, nullatenus æquilibrio massæ sanguinis proportionalibus. Pariformiter vitia mixtionis in sanguine facile occurrunt ab excessu feri, aut defectu ejusdem: cum serum naturaliter esse debeat in ratione triplâ, aut quasi triplâ respective ad solida & consistentia corpora; si serum excedat, aut deficiat, æquilibrio mixtionis everti necesse est; sero enim adaucto, cum hoc sit notabiliter gravius aqua communi, ut num. 16. primæ Partis dimensi sumus, non legem pressioem assert vasis continentibus; hæc autem nimis undequaque distracta, ac violenter ad majorem superficiem extensa ab adaucto momento distractionis fibrarum impediunt æquali tempore homologum momentum contractionis earundem; cum autem ex momento distractionis fibrarum canales investientium, & ex homologo momento contractionis earum temporibus æqualibus adjuvetur magnopere necessarium opus æquabilis mixtionis solidorum corporum cum fluidis, sero quidem nimis adaucto, & adauctis pariter feri viribus in reliqua corpora debitum mixtionis opus impediri necesse erit. Si autem deficiat serum infra leges naturalis quantitatis, fluido quidem imminuto, minor fiet velocitas sanguinis, & solida corpora lentiori pede mota, majorique contractu adaucta, ut supra quoque demonstravimus, lentiori pede movebuntur; ex fluido itaque imminuto, & ex corporum solidorum lentescencia iners quidem fiet, & imperfecta mixtio corporum inter se, ut male fluida cum solidis permixta æquibrentur. Videantur quæ numeris 4. 5. 6. & 14. primæ Partis adumbravimus, ne jam dicta hic inepte repetantur.

5. Elementorum sanguinis elasticorum & non elasticorum proportionibus ac momentis satis expensis, modo necessarium est pro febrium phænomenis explicandis, rationes crassamenti sanguinei, sive filamentorum feri concrecibilis (filamenta enim feri concrecibilis, & crassamenti sanguinei sub eodem nomine usurpamus) paucis ultro expendere: Itaque præsupposita filamentum seu crassamenti sanguinei existentia, quam Boyleus & Lewenhockius satis superque experimentis docuerunt, & confirmarunt, juvat instituto nostro usurpare, quæ celeberrimus & immortalis famæ Jacobus Hermannus. (a) paucis edocuit; fluida nempe alia esse *Homogenea*, alia vero *Heterogenea*. *Fluida Homogenea seu uniformiter gravia ea dici possunt, quorum densitas, crassities & motus per universam massam uniformes sunt, & pondera ipsorum absoluta massis eorum proportionalia sunt. Fluida vero Heterogenea, seu difformiter gravia ea dici poterunt, quorum densitas, crassities & motus per universam fluidi massam non uniformes sunt, nec pondera fluidi massis proportionantur.* In statu itaque naturali massa sanguinis, quod ad densitatem attinet, crassitiem, pondus & motum talis esse debet, ut densitas, crassities & pondus corporum componentium; & filamentorum, neque nimis comprimantur inter se, neque filamenta adeo tenuia sint, ut a necessaria pressione, ac pondere deficient; sed talis mediæ densitatis, ac talis mediæ crassitiei, talisque mediæ ponderis esse debent elementa, & filamenta crassamenti sanguinei, ut pressionem efficiant momentis vasorum continentium, & momentis corporum contentorum proportionalem; ita enim servata opportuna unione, servatque debito nexu ac contactu corporum fluidorum inter se, reciproca eorundem mixtio seu mixtionis æquilibrio sustinebitur. Deinde elementa & filamenta massæ sanguinis, cæteris paribus, uniformiter densa, uniformiter crassa ac gravia per universam sanguinis massam esse debuerunt, ne varia eorum pondera in diversis vasorum locis inæqualia vasorum momenta afferant, non levî vitio æquilibrii mixtionum. Ulterius si filamenta retis in modum probabiliter elaborata judicentur, angulos necessario describent modo majores, modo minores, dum a majoribus sectionibus vasorum transeunt in minores, & vicissim dum a minoribus in majores restituuntur. Hæc quidem angulorum mutationes esse debent sectionibus continentium vasorum, & momentis corporum contentorum proportionales. E contra ut inferioribus, nec non in sanguine arterioso ac venoso, sicut & in succe nerveo & lymphatico præternaturalibus evenit, si massa sanguinis quod ad densitatem pertinet, pondus & crassitiem elementorum & filamentorum fuerit heterogenea, inæqualis nempe, & dissimilis texturæ; tunc ratione majoris, aut minoris inæqualitatis, inæquales fient pressiones corporum elasticorum & non elasticorum, diversæ & inæquales pres-

pressiones in vasis continentibus, & inæqualia fient pondera cæteris paribus in diversis vasorum ramificationibus; variæ proinde ac dissimiles fient in areis reticularibus angulorum inclinationes, dissimiles motus ac directiones eorundem; inæquales propterea ac dissimiles corporum elasticorum motus, ac mixtiones cum notabili ac continuo separandorum corporum vitio exorientur.

6. Præstat modoultiora prosequi expendendo rationes seri, aliorumque corporum respectu ad vasa continentia, ad fibras cujuscunque generis, musculares, nerveas & membranofas &c. quæ necessariæ proportionibus cum a Medicis plerumque negligi soleant, non leves in Theoria, & Medica praxi errores afferunt. Ut vero hæc tam necessaria facilius ac clarius ostendantur, nonnulla advertenda sunt, eo quia a solidis præternaturaliter motis, aut se moventibus sustineri potest ratio semper inæqualitatis inter momenta elementorum sanguinis & vasa continentia, aut inservientia, usque dum deperdita ratione reciproca elementorum elasticorum, & non elasticorum inter se, nec non ratione homologa fluidorum cum solidis, elementa sanguinis imperfecte aut ægre misceantur; a quibus consequuntur febres, aut hæ longiori tempore duraturæ sunt, cum pulsum inæqualitate & frequenti cordis palpitatione. Duas itaque ab immortalis famæ viro Newtono naturæ leges instituto meo opportunas amplector, quarum una est: *Corpus omne perdurare in statu suo quiescendi, vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum suum mutare.* Altera vero est: *Mutationem motus semper esse proportionalem vi motivæ impressæ, ac fieri semper secundum rectam lineam, qua vis illa imprimitur.* Impellantur itaque a momento sinistri ventriculi cordis grana sanguinis

15

305. — quacunque systole per aortam descendente (ut n. 28. pri-

33

mæ Partis indicavimus) hæc quidem sanguinis massa expulsa ire debuisset per legem primam uniformiter in directum per lineas tangentes circularem arteriam, nempe (in Figura 1.) per tangentem AD motu quodam seu vi centrifuga, aut centrifugæ analogæ; verum cum sectiones majores arteriæ paulatim minores fiant, sanguini per tangentem eunti in statu naturali resistentiam ferent in ratione perpendicularis BC ad perpendicularem DE &c. Cum autem vis centrifuga sanguinis impulsu continuo per circulares peripherias vasorum circumeat, & contra has continuo agat, nec vis deperdatur; hæc urgebit superficiem canalium versus quascunque tangentes seu versus tangentem AD. Cum vero canales compositi sint ex membranis, musculus & nervis filamentis elastica seu oscillatoria vi donatis, cogentur post passam dilatationem sese ad priorem statum restituere. Itaque cum in statu naturali momenta dilatationis vasorum a vi sanguinis impellentis æqualia esse debeant momenti restitutionis eorundem, futura erit vis dilatationis vasorum & vis centrifuga sanguinis impellentis æqualis restitutioni vasorum, seu vi centripetæ sanguinis restituti versus axem canalium; proinde cum momenta dilatationis vasorum & momenta constrictionis eorundem, viresque fluidorum centrifugæ & centripetæ, quæ a Mechanicis *Centrales* appellantur, esse naturaliter debeant in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis, constabit veritas secundæ legis, mutationem nempe motus fluidorum & vasorum versus centrum, seu versus axem restitutorum debere esse proportionalem vi motivæ antea impressæ a fluido canale dilatante & canali dilatato. Porro cum motus massæ sanguinis fiat vi cordis impellentis, & vi seu momento constrictionis arteriarum, quarum vires non sunt oppositæ, sed tantummodo diversæ a motibus seu viribus massæ sanguinæ, hujusmodi *Vires conspirantes determinatum semper & æqualem directionis angulum comprehendunt* in statu naturali; cum versus axem canalium fluida impellantur. (a) Quamobrem ex motu cordis, vasorum & fluidorum æquabili, seu ex viribus centralibus æqualibus cum æqualibus pariter angulis directionum virium conspirantium, elementa sanguinis per superficies circulares vasorum continuo euntia undequaque similibus, & æqualibus impulsibus versus axem ejecta, in hoc quidem axe æqualitates angulorum occurrent inter se, similibusque occurribus similiter fracta, & in partes infinite parvas quodammodo similiter comminuta proportionali semper velocitate, motu ac tempore movebuntur, momentisque minimiarum particularum reciproce agentibus, hæc particule juxta opportunum mixtionis æquilibrium miscebuntur.

7. Modo ut ab universalibus naturæ legibus ad singularia descendamus, apertum est, vasa quælibet sanguifera ad conicam superficiem accedere membranis, musculis, nervisque undequaque munita, quorum fibræ aliæ rectæ sunt, aliæ quodammodo spirales, & circulares alteræ. Horum organorum opere vasa ex elasticorum corporum genere esse constat, quorum vi in statu naturali a momento distractionis & homologo momento contractionis æqualibus conatibus extenduntur, & æqualibus viribus contrahuntur sanguinem æqualiter expulsa: æqualitatem momentorum oriri putamus a fibris rectis unimode agentibus, a velut spirales & circularibus fibris æquabili ratione decrecentibus: cum enim singulæ fibræ rectæ mole, figura ac directione fuerint inter se æquales & parallelæ, cum effectus omnes sint causis suis adæquatis proportionales, harum momenta distractionis, & contractionis elasticis suis viribus homologa, erunt inter se oscillationibus æqualibus æqualia. Similiter si hujusmodi spirales & circulares fibræ conicæ decrecentes fuerint mole, figura & directione similiter positæ; cum arcus quilibet sint facti ex angulis, aut similibus, aut æqualibus ductis in radios similes, aut æquales, harum fibrarum elasticarum seu oscillantium momenta distractionis, & contractionis in eadem ratione similitudinis, aut æqualitatis erunt futura; si ergo fibræ rectæ non unimoda lege operentur, sed aliquæ tantummodo agant, reliquæ vero aut inertes sint, aut læsæ, ineptæ quidem erunt actionibus naturalibus; cum vero motus vasorum sint directæ ut causæ adjuvantes, reciproce vero ut impediētes, erunt momenta distractionis & contractionis vasorum omnimode inæqualia; cumque anguli directionum particularum sanguinis inæquales fiant ac dissimiles ob vires conspirantes dissimiles, & inæquales, opus proinde mixtionis inæquale erit, inordinatum & asymmetri. Ita si spirales fibræ vasorum non ea lege describant spatia proportionalia circulis ab ipsis spirarum numeris denominatis (ex Archimede de Spirilibus,) sed dissimilia fuerint inter se inepte multum vasa contrahentur, & inepte distra-

Sydenham Opera Medica.

hentur; ita læso mixtionis æquilibrio elementa sanguinis vitiosa miscebuntur. Verum ad pejora rueret æquilibrium mixtionis, si circulares fibræ fuerint mole, figura & directione dissimiliter positæ, aut vitio naturæ, aut asymmetri motu nervorum vasa ambientium, aut musculorum, aliorumque viscerum inæqualiter prementium, cum enim arcus circulatorum sint facti ex angulis ductis in radios eorundem, quoties arcus fuerint dissimiles inter se, futuri quoque erunt aut anguli, aut radii eorundem, aut anguli simul & radii inter se dissimiles & inæquales; cum autem momentum contractionis vasorum fiat ex motu peripheriæ vasis versus axem, cum inæquales anguli fuerint uniti inæqualibus semidiamentris, momentum contractionis eorundem inæqualia & dissimilia futura jure erunt; inæquales inde fient impulsus in massam sanguinis cum inæqualibus directionum angulis, & elementa ejusdem massæ inæqualiter impulsæ inæquali mixtione deficient. Ulterius naturalia momenta distractionis, & homologa momenta contractionis temporibus æqualibus fieri necessario debent; proinde si tempora quibus fiunt momenta distractionis vasorum, fuerint æqualia temporibus, quibus fiunt momenta contractionis eorundem, cum tempus sit æquale spatio diviso per celeritatem, erunt spatia peripheriæ vasorum decursa in motu distractionis æqualia spatiis decursis in motu contractionis; hinc cum spatia decursa peripheriæ vasorum in motibus contractionis & distractionis fuerint æqualia, & spatia sint ex mechanicis proportionalia rectangulis sub celeritatibus, & temporibus, spatia quidem æqualia temporibus quoque æqualibus decurrentibus velocitatibus æqualibus; quamobrem momenta contractionis peripheriæ vasorum æqualia urgebunt sanguinis massam versus axem canalium velocitatibus quoque æqualibus eo ferme gradu velocitatis, quo eadem massa sanguinis a corpore impulsæ vasa dilataverat: ex hisce motibus peripheriæ vasorum distractionis & contractionis æqualibus, quorum opera æquabiliter impellitur massa sanguinis versus axem canalium, elementa sanguinis apte, opportune & æquabiliter misceri conabuntur; hæc in statu naturali evenient. Quod si momenta distractionis peripheriæ vasorum, & homologa momenta contractionis inæqualibus fiant temporibus, cum tempus sit æquale spatio per celeritatem diviso, erant jure merito ex inæqualibus temporibus spatia decursa inæqualia, & celeritates pariter in motibus distractionis peripheriæ vasorum, & in motibus contractionis peripheriæ vasorum, & in motibus contractionis eorundem inæquales inter se: peripheriis itaque vasorum inæqualiter distractis, & inæqualiter contractis, inæquales fient istorum oscillationes, pulsus erunt inæquales, inordinati & asymmetri, pariterque impulsus in elementa sanguinis erunt inæquales, & miscela elementorum sanguinis inordinata erit, inæqualis & asymmetra.

8. Confert quoque naturali & æquabili mixtioni æqualitas texturæ internæ vasorum per universam istorum longitudinem; etenim si interni parietes vasorum fuerint unimode æquabiles, singulæ sectiones circulares habebunt æquales simileque semidiamentros, qui singuli cum convenient in puncto axis canalium, ibi æquabiliter urgebuntur homogenea elementa sanguinis ab æquabili momento contractionis vasorum per totam canalium longitudinem. Jam tandem in punctis axis excurrando æqualibus temporibus æquabiliter impulsæ elementa sanguinis æquabiliter quoque misceri poterunt. E contra eveniet, si nimirum interni parietes vasorum alicubi fuerint aut callo, aut tuberculo, aut polypo aut ex convulsiva nervorum ambientium pressione inæquales; proinde radii vasorum inæquales erunt ac dissimiles circumferentiis eorundem, & sectiones decrecendo in ratione duplicata diametrorum inæqualium, elementa sanguinis contenta in naturali sectione non erunt æqualia elementis ejusdem contentis in eadem sectione præternaturaliter posita; quinimo cum radii vasorum sint ut peripheriæ eorundem, ex inæqualitate radiorum inæquales fient impulsus peripheriarum versus axem cum inæqualibus angulis directionum; elementa ergo sanguinis contenta in sectionibus naturalibus diversa ratione impulsus movebuntur, ac in sectionibus eisdem præternaturalibus cum diversa mixtionum proportionem, saltem per aliquam temporis differentiam. Verum dices, cum in aneurysmate, varicibus, polypo, tuberculo &c. sectiones & motus oscillatorii vasorum sint inæquales in locis præternaturalibus, inordinati videlicet & asymmetri; ergo ibi semper fient imperfectæ, aut ægræ mixtiones elementorum, consequenter semper febres erunt futuræ. Verum placeat animadvertere, ut vero & humores febres fiant: imperfecta aut ægra mixtio elementorum sanguinis oriri potissimum debet ab improportionem præcipua elementorum sanguinis, vitio densitatis, crassitie, poudoris & motus elementorum elasticorum & non elasticorum cum eversa naturali ratione reciproca eorundem inter se: deinde hæc vitia fieri debent per universam massam non in unico tantum, vel singulari loco, sed in omnibus eodemque fere tempore, ut supra adnotavimus, & inferius semper magis magisque constabit. Verum in aneurysmate, in polypo, varicibus &c. quantumvis in singularibus hisce locis præternaturalibus fiant mixtiones imperfectæ & ægræ, tamen cum hæ contingant tantummodo in solis ubicationibus ac locis aneurysmatis, polypi, aut tuberculi, non vero per universum vasorum & massæ sanguinæ spatium; proinde in massa sanguinis transacto loco læso rursus naturales restituentur mixtiones elementorum, & restituta ratione reciproca elementorum sanguini naturalis ejusdem temperies redimetur. Fateor quidem, vitia organica solidorum non parum conferre ut febres vitio elementorum sanguinis generatæ, diuturniores & contumaciores fiant; verum non id præstare possunt sola organorum vitia, ut febres veræ efficiantur (quamvis aliquando possit contingere) sed tantummodo apparentes, quid simile plerumque evenit primo ingressu chyli in sanguinem, quo tempore in sanis quoque corporibus fit celeritas pulsus major, grævedo quædam capitis, calor, quidam levis virium languor &c. cum enim primo ingressu chyli in massam sanguinis elementa heterogenea chyli non statim apte cum elementis sanguinis associari, uniri ac misceri in ratione reciproca elementorum opportune possint, oriuntur plerumque exposita levia symptomata, quæ præternaturalem statum simulare videntur; verum tractu temporis chyli elementis opportune associatis, & commixtis, heterogeneisque corporibus per excretoria vascula separatis prima & naturalis sanguinis velocitas, virium robor, & capitis quies &c. facilius restituntur, verum quia aliquando non tam facile restitui possunt, ideo redeundo ad vitia solidorum,

V 4

cum

cum frequentissime accidat in hypochondriacis, hystericis, convulsivis & paralyticis affectionibus filamenta nervea arteriis, & venis circumscripta variis in locis inæqualiter arteriarum, venarumque directiones incurvare & inflectere; nulli certe praxim medicam agenti dubium est, ex hujusmodi curvaturis, ex tot flexibus contrariis arteriarum & venarum, nervorum, vasorumque lymphaticorum auferri, aut saltem turbare naturale æquilibrium mixtionis; hoc autem ablato, aut turbato, sæpe sæpius arbitratus sum medicam praxim agens, non tantum vitio elementorum sanguinis verum etiam vitio organorum febres lentissimas fieri, hæc diutissime perdurare; quandoquidem cum fluidum per rectas canalium directiones CDEF (Fig. 2.) ire naturaliter debeat, cum fibræ nerveæ convulsæ arterias, venasque & cætera vasa adeo inflecterent, ut a rectis directionibus transire cogentur in directiones inflexas GAHBK (Fig. 3.) constat plura incommoda transeunti sanguini evenire. Primo liquidum in punctis flexus contrarii A & B vasis potissimum stringunt, sectionem necessario efficient cæteris punctis minorem; cum vero massa sanguinis composita ex corporibus elasticis, & non elasticis transiens per sectionem minorem magis comprimitur ac densior jure fiat, & densitates corporum elasticorum viribus comprimentibus seu elasticitatibus eorum quamproxime proportionales sint, elatere corporum elasticorum magis compressorum in sectione præternaturali flexus contrarii A B fortior ac validior fiet elatere corporum elasticorum minus compressorum in sectione naturali LM: Hinc elementa sanguinis transeuntia per sectionem A B valde urgebunt canalem in punctis A & B flexus contrarii; cum vero nervea fistula contracta & convulsa valide resistat dilationi vasorum eorundem, ibi certe ob momentum nerveæ fistulæ comprimentis vas, & momentum corporum elasticorum sanguinis impellentium orietur in sectione A B, violenta actio & reactio solidi cum fluido; verum cum fluidi elementa violenter impulsæ directiones moruum acquirant præternaturales, inordinata quidem & asymmetra futura erit elementorum miscela. Secundo ex flexibus contrariis arteriarum, venarumque cum corpora elastica magis compressa fiant & densiora in punctis flexus contrarii, hinc ob adauctas vires violentæ compressionis, horum momenta majora reddentur, quam par est; quid ergo? ibi quidem moles corporum elasticorum & non elasticorum non reciproca ratione proportionales esse poterunt velocitatibus eorundem, proinde turbabitur in massa sanguinis mixtionis æquilibrium. Tertio, cum in statu naturali motus corporum in uno spatio vasorum esse debeat in ratione homologa cum motu corporum in alio spatio eorundem, & sic successive in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis, cumque in quibuscunque punctis flexus contrarii moles corporum elasticorum, & non elasticorum fiant densiores, & horum momenta fortiora, non hæc fieri poterunt homologa cum cæteris corporibus decurrentibus per alia vasorum loca; turbabitur propterea homologa proportio motuum naturalium non levi damno æquilibrii mixtionis. Quarto, cum in punctis flexus contrarii sectiones vasorum fiant minores; cumque hic major fiat resistentia sanguini transeunti, hujus resistentia adveniendi sanguini impedimento erit; moles itaque massæ sanguinis magis magisque retro intumescens urgebit vasorum latera extrorsum supranaturales vasorum sectiones, mutatis naturalibus fibrarum angulis, mutatoque earundem naturali parallelismo. Cum vero contractiones naturales fibrarum elasticarum sint proportionales dilatationibus earum, cum dilatationes majores eveniant a mole majori massæ sanguineæ, moles autem major momentum proportionalis contractionis impediatur, major quidem futura erit dilatatio vasorum, quam eorundem homologa contractio, si ergo in naturali mixtione elementorum sanguinis non solum esse debeat reciproca actio momentorum elasticorum corporum & non elasticorum inter se: verum etiam esse debeat homologa actio momenti distractionis & momenti contractionis vasorum, oportebit opera nervorum convulsorum vasa stringentium in punctis flexus contrarii mixtionis naturalis æquilibrium enervari, aut perdi. Hæc sunt potissima organorum vitia, quæ naturalem mixtionis legem evertere apta sunt, aut saltem gravi opere intervium, ut elementa sanguinis asymmetro motu mixta difficilius ac tardius restituantur ad eum mixtionis naturalis gradum, quo momenta elementorum sanguinis reciproca inter se mixtione æquibrentur. Ex his ineptum videtur, tam facile accusare sanguinem lentore, visciditate, densitate correptum; cum sæpiissime hæc vitia ab inertia motus vasorum continentium, reliquorumque solidorum motui sanguinis inservientium habeantur; ab hisce quidem vitiis solidorum se moventium motibus asymmetris, inordinatis, inæqualibus, aut inertibus ac lentescens asymmetra fient mixtiones elementorum sanguinis; proinde ex lenta, densiori & crassiori reddita massa sanguinis *Febres ortas Organicas* appellabimus, quæ nisi a restituto solidorum æquilibrium constanti ratione redimuntur, & quas in *Hypochondriacis*, in *Hystericis*, in *Paralyticis*, cæterisque nervorum & solidorum affectionibus ac vitiis frequentissime experimur.

9. Ex his quæ usque adhuc exposita sunt colligendum est, sanitatem id petere, ut momenta elasticorum corporum & non elasticorum sint composita ex ratione reciproca mixtionis eorundem inter se, & momenta distractionis & contractionis arteriarum, venarum, reliquorumque vasorum & solidorum sint inter se in ratione homologa, ut actionibus & reactionibus solidorum cum fluidis inter se proportionalibus æquabiles, isochronæ & ordinatæ fiant mixtiones elementorum massam sanguinis componentium. Fateor quidem, hunc perfectissimum fluidorum, & solidorum statum, hanc perfectissimam elementorum mixtionem non tam facile ac prompte acquiri posse, sed paulatim & pedetentim; chylo enim, ut supra etiam indicavimus, ingresso sanguinem heterogeneis corporibus repleto, quorum momenta primo inæqualia sunt & asymmetra, hæc tamen paulatim multiplici circulationum numero prius agitata ac movenda sunt; per idem quoque tempus æquo & continuo motu separationis glandularum, apta ac opportuna corporum heterogeneorum attritione, & separatione per idonea loca rursus depuranda sunt; ita quidem restituta æqualitate momentorum, hacque rursus æquilibrata æquabili & isochrona mixtione necessarium mixtionis æquilibrium restituitur, & restitutum conservatur.

10. Nervato ac abolito mixtionis elementorum sanguinis æquilibrium vel accusari facile potest præpollentia corporum elastico-rum, vel corporum non elasticorum, *Salium* potissimum vis præpollens: si corpora inertia mole, numero & motu præpollent, *Intermittentes* facile febres orituræ putandum, de quibus in præsentia tractare aggreditur. Verum cum frigoris sensationes oriri primo soleant, quæ postquam desiverint, statutis temporibus redire consue-scant, claritati rei agendæ consultum est; primo *ratione ac causa frigoris*; secundo *cur statutis temporibus redeant febriles accessus probabili ratione investigare*. Ad primum quod attinet, Verulamius de *Historia vitæ, & mortis* experimentis edoctus est, *Nitrum esse tanquam Aroma frigidum; idque indicat sensus ipse; interea quæ novimus unicum esse & solum, quod ea præstet*. Verum cum Academia Florentina non a nitro tantum, sed potissimum a sale armoniaco; a sale muriatico fluida frigescere, in glaciem mutari pluries experta sit; quinimmo ab ipso spiritu vini multum fluida densari in glaciem, si alia superaddantur; jure credendum est a quibuscunque salium particulis, aut corporibus quibuscunque hisce analogis præpollentibus frigoris affectionem habendam esse; & sane cum salia quæcunque, aut his analogia corpora inertia & non elastica variis angulis rectis, aut acutis, aut obtusis, aut superficiebus hisce analogis terminata sint, quoties in massa sanguinis momenta salium fluentium habuerint rationem majoris inæqualitatis respectu ad elastica corpora, & non apte inter se commixta sint, hæc in glandulas continuo deferentur, & ab hisce ea vitiose methodo separantur (ut num. 11. primæ Partis innuimus.) Cum vero infinitus sit glandularum in membranarum, musculis, carnibus tam externis, quam internis numerus, hic excedens salium separatorum numerus, tot ac tanta partium filamenta, angulis, quibus circumscribuntur circa proprios axes continuo rotantibus stimulat, ea ratione motus, qua nitrosa potissimum, aut his analogia corpora sollicitare sensoria, aut frigoris sensationem inducerent, docuerat Verulamius. Membranarum itaque, musculorum ac carnum filamenta undequaque taliter sollicitata ac stimolata frigoris affectionem afferent. Hic tamen anxius non quæro quinam sit *rigor*? quinam *horror*? quænam *refrigeratio*? cum hæc frigoris differentia non re, sed tantum gradu differant; has enim disputantibus Medicis libenter relinquimus.

11. Id tamen si arbitramur, commodum est credere, phænomena frigoris non tantum a determinata corporum non elasticorum, salium præcipue stimulantium, aut sollicitantium actione generari, verum etiam adjuvari potissimum ab imminutis momentis distractionum & contractionum fibrarum omnium; etenim cum falsa corpora seu his analogæ superficies, ac plana seu anguli sollicitantes fibrarum poros undequaque occupent, aut repleant, filamenta membranarum, musculorum & carnum &c. fient densiora; cumque densitates sint ponderibus proportionales (a), eadem filamenta solidorum fient graviora, minus proinde expedita ad distractionis & contractionis motum exequendum; oscillationes idcirco fibrarum fient lentæ, languidæ, aut nullæ. Ea his cum naturales fluidorum velocitates a fibris negligenter aut pigre oscillantibus non opportune promoveri possint, hæc fluida lentiora facta non eum circulationum numerum, non eum mixtionis motum absolvere necessario coloris gradui, æquisque naturæ operibus ac temporibus destinata; ob id cum lentescens fluidorum consuetudo, ac lex videatur, graviora corpora undequaque deponere, jure in glandulis viscerum impuritates, in pulmonum glandulis fæculenta corpora deponentur, ut inde ex fibrarum seu solidorum oscillantium interna, & ex lentescens fluidorum, fæcumque hypostasi obstructiones, interni tumores, anxietates, difficiles anhelitus, suffocationes, pulsus duri ac lentis, contracti sæpiissime cum molesta tussi durante frigoris paroxysmo evenire consuecant. Hinc cum innumera eveniant in tota glandularum familia separationis vitia, consulendum putavi studium operis celeberrimi Petri Antonii Michelotti de *separatione fluidorum in corpore animalium*; hoc enim duce adepta æquæ separationis methodo, vitiosæ glandularum separationes clarius innotescent.

12. Quid plura? Exposuimus num. 6. massam naturalem sanguinis præter mediam crassitiem, densitatem ac pondus filamentorum hanc in arteriis a majori sectione in minores transire, & a continuo momento distractionis & contractionis canalium continentium continuos impetus excipere, quorum opera reticulares areæ filamentorum conantur esse in continua mutatione angulorum, fient propterea reticulares anguli modo majores, cum arteria dilatatur, modo minores, cum arteria constringitur: similiter corpora quæcunque elastica contenta in massa sanguinis, nec non in lymphatico, nerveoque succo stringentur magis inter se & comprimuntur, cum arteriæ a momento contractionis contrahuntur, & a majoribus sectionibus in minores transeunt, e contra vero rarefient & dilatantur hæc, cum a minoribus sectionibus in majores transeunt; & a momento distractionis dilatantur & extenduntur arteriæ. Itaque si momentum constrictionis arteriarum ita fuerit proportionale compressioni corporum elasticorum, ut ita sit contractio arteriarum ad compressionem corporum elasticorum; ut momentum dilatationis arteriarum est ad dilatationem corporum elasticorum, & permutando ita sit momentum constrictionis arteriarum ad momentum dilatationis earundem, ut est contractio seu compressio corporum elasticorum ad dilatationem seu rarefactionem eorundem; tunc cum filamenta massæ sanguineæ sint semper in proportionali aut simili mutatione angulorum, utique filamenta massæ sanguinis eundem gradum, eandemque mensuram densitatis, crassitiæ, ponderis ac motus naturali temperiei sanguinis homologam sustinebunt; hoc in statu motus systolis & diastolis cordis & arteriarum erunt motibus massæ sanguineæ æquabiliter proportionales; pulsus erunt æquabiles, ordinati & isochroni ab elasticis hisce viribus corporum elasticorum, proportionalibus elasticis oscillationibus canalium, minima horum oscula aperta, & actiosa conservantur, & filamenta sanguinis & reliqua corpora inertia prompte ac facile ab arteriis in venas regulari communicatione trajiciuntur. Cæterum si momentum contractionibus arteriarum non fuerit proportionale, ac finile

(a) Ex Vvolfo pag. 363. Mechan.

le contractioni corporum elasticorum, & vicissim momentum dilatationis arteriarum non fuerit simile dilatationi corporum elasticorum, & permutando momentum constrictionis arteriarum non sit proportionale momento dilatationis eorundem: pariterque contractio, seu compressio corporum elasticorum non sit homologa dilatationi seu rarefactioni corporum elasticorum eorundem; tunc cum effectus semper sint suis causis adequatis proportionales, arguendum erit, filamenta & reliqua corpora inertia seu non elastica, componentia temperiem ac constitutionem massæ sanguinis inæqualibus ac dissimilibus densitatibus, crassitie, ponderis & motus gradibus esse affecta, ut quacunque temporis differentia fieri semper debeant inæquales ac dissimiles motus, & mutationes angulorum in areis reticularibus; quo in statu filamenta sanguinis, & reliqua corpora inertia, quod attinet ad densitatem, crassitiem, pondus ac motum efficient motus systolis, & diastolis cordis & arteriarum motibus massæ sanguineæ dissimiles & improporcionales, dissimiles pariter fient pulsuum distractiones & contractiones, quinimmo aliquando fient pulsus duri, contracti ac leniti. Ulterius si obstructis potissimum mesenterii & omentis glandulis sanguini per meseraicas venas ab intestinis ad hepar ascendentem (ut scienter animadvertit immortalis sanæ Professor Morgagnus pag. 3. Advers. Anat. 3.) non opportuna ac debita ratione ac numero misceantur oleosæ & balsamicæ particule, procul dubio hæc impedita bilis separatione aut enervata in hepate, massam sanguinis & lympham densiorem, crassiolemque reddent; a densitatibus itaque & crassitiebus elementorum feri & crassamenti sanguinei minima canalium oscula, necnon glandulæ omenti & mesenterii obstruentur, & impedita ab arteriis in venas circulatione obstructions, & reliquæ præternaturales hypostasies enascuntur. Ex his fibrosum sanguinis crassamentum, quod continuo ex chyli elementis ac filamentis enutritur, elaboratur & crescit, si ex chyli densioris consortio densius fiat, crassius ac ponderosius, areæ reticulares crassamenti sanguinei minora certe spatia circumscribent, juxta rationem adauctam crassitiei ac densitatis filamentorum circumscribentium, & rationem adauctam corporum inertium, quorum omnium momenta habent hic rationem majoris inæqualitatis respective ad momenta corporum elasticorum per aliquam saltem temporis differentiam. Proinde elastica corpora contenta stringentur nimis ac comprimuntur: imminuto cum serum & feri portio concrecibilis circumscribant undequaque elementa sanguinis, hæc & a ferro & a feri parte concrecibili stringentur & comprimuntur magis magisque elastica corpora; itaque cum areæ reticulares in statu naturalis dilatationis, & alia qualibet spatia, per quæ globuli plano-ovales, & alia corpora elastica observantibus Boyle & Lewenhockio excurrunt, ad eadem spatia & areas in statu præternaturalis constrictionis sint, ut figuræ similes inter se; hæc autem decrescant in ratione duplicata suorum diametrorum; utique si spatium areæ in statu naturalis dilatationis fuerit ut 1. decrescens patium areæ ejusdem in statu præternaturalis constrictionis futurum

erit —; Si ergo in spatio naturalis dilatationis areæ reticularis ut 1.

4 contineantur 8. corpora elastica, in spatio ejusdem areæ præternaturaliter constrictione contineri tantum poterunt elastica corpora ut 2. & sic proportionaliter successive in totis areis reticularibus massæ sanguinis. In statu itaque præternaturalis constrictionis arearum omnium elastica corpora contenta stringentur, & comprimuntur in ratione ut 6. Quis non videat, ex tam forti filamentorum massæ sanguineæ, reliquorumque corporum inertium densitate, crassitie ac pondere, ex tam determinata arearum, aut aliorum componentium elementorum unione nimis stricta ac angusta comprimenda ac stringenda esse valide elastica corpora, ut non eum naturalem motum ac velocitatem in tali statu possint acquirere? Imminuto propterea elasticorum corporum spatio, aliarumque particularum tangentium motu ac velocitate, tantum calor detrahendum erit a massa sanguinis, quantum motus & elasticitatis a particulis elasticis, & non elasticis se tangentibus subtractum est; quamobrem cum calor consistat in concitatore motu quarumcunque particularum elasticarum, & non elasticarum, imminuto quidem spatio, motu & elasticitate naturali earundem; calorem quoque sensibilibus imminui necessarium est, hinc data proportionem affectio frigoris superveniet major, vel minor juxta majorem, aut minorem compressionem corporum elasticorum vi majoris, aut minoris crassitie, densitatis & ponderis corporum non elasticorum, quorum inertia magis, vel minus imminuitur elasticitas, motus, actio & reactio quarumcunque particularum elasticarum, & non elasticarum inter se.

13. Sed non diu elastica corpora in statu violento compressionis præternaturalis detineri possunt, sed tantummodo per temporis differentias, modo majores, modo minores juxta majorem, aut minorem crassamenti sanguinei, & feri compressibilis ambientis densitatem, crassitiem, pondus, & motus inertiam in particulis elasticis & non elasticis, propterea frigoris sensationes non continuæ, sed per tempus erunt duraturæ; & sane elasticorum corporum massæ violentè in minora volumina compressæ conantur tandem aliquando sese dilatare quaquaversus ad majora volumina viribus comprimantibus reciproce proportionalia; postquam ergo hæc violentè determinatum seu ultimum compressionis gradum sustinuerint, sese validissime undequaque dilatare conabuntur; corpora itaque elastica, cum particulas non elasticas ipsis commixtas quaquaversus turgent, undequaque impetus & impulsus efficient in tangentia quæcunque corpora non elastica. Cum vero hæc resistent in ratione suarum soliditatum, restituent elasticis corporibus impetus ac impulsus motibus jam impressis proportionales; sic communicata vicissim actione & reactione corporum elasticorum cum corporibus non elasticis, singula corpora movent & moventur, urgent & urgebuntur; verum cum impetus corporum elasticorum sese dilatantium ad majora volumina objecta, & tangentia corpora non elastica sint ratione composita ex numero corporum elasticorum, & summa motuum dilatationum eorum, manifestum est, quam magna futura sit actio & reactio, expansio, rarefactio & dilatio quaquaversus elementorum cujuscunque generis corporis elastici & non elastici massæ sanguinis. Ut autem hæc accuratiori examine expendantur, placeat eligere ex corporibus elasticis solas aeris particulas contentas in massa sanguinis, ut experimenta Boylei docuerunt. Cum vis elastica aeris eleve aquam ad pedes 32. circiter, & ratio ponderis seu gravitatis specificæ aquæ nostræ communis (quam invenimus pag. 54. primæ Par-

tis) ad pondus seu gravitatem specificam sanguinis sit ut 1749. ad

1886. seu proxime ut 1. ad 1. — innotescet, quantum elevanda

fuerit massa sanguinis vi elastica ejusdem quantitatis aeris; etenim cum vires elevent pondera diversa ad altitudines ipsis ponderibus reciproce proportionales (a) vis elastica aeris elevans aquam ad pedes 32. circiter, elevatura erit massam sanguinis, cæteris paribus, ad pe-

des 31. — proxime; si enim fiat analogismus ut pondus, seu gra-

vitas specifica sanguinis 2. — ad pondus, seu gravitatem specificam

aquæ communis, ita fiant reciproce pedes 32 circiter ad quartum terminum proportionalem, utique constabit pro quarta proportionali

pedes 31 — massæ sanguineæ fore respondentes, ut enim 1 — . 1.

: : 32. 31. — proxime. Cum vero eadem sit proportio pedis ad

pedem, ac lineæ ad lineam, & particulæ lineæ ad particulam lineæ, vis elastica aeris proportionalis vi motivæ aeris contenti in sanguine proportionaliter, cæteris paribus, elevare poterit sanguinem ad

particulas lineæ 31 — in canalibus ascendentibus, in quorum as-

censu magna adest resistentia ad motum; quod si canales fuerint descendentes, aut inclinati, aut horizontales, in quibus nulla est ad motum resistentia, quinimmo facilitas & propensio ad motum juxta rationes a mechanicis jam determinatas, quas non vacat hic repetere, apertum est, quantum vis proportionalis elastica aeris massam sanguineam urgere poterit ac movere. Porro si a solo momento particularum aeris in sanguine contenti tantum moveri ac urgeri poterit massa sanguinis; quid sentiendum erit, si viribus elasticis aeris ultro addantur momenta sulfurum, & elastica momenta globulorum plano-ovalium &c. certe quam maxima futura erit massæ sanguineæ rarefactio, extensio & motus in ratione nempe composita ex momento cordis sanguinem impellentis, momento elastico aeris, sulfurum, & globulorum plano-ovalium &c. quæ ratio composita momentorum cum calculis æqua ratione assequi non possit, proinde velocitas, quantitas motus, & momentum massæ sanguinis in statu præternaturali febrium prout summum erit indeterminabile. Ex hisce momentis corporum elasticorum salia, & reliqua solida corpora, fibrosum sanguinis crassamentum, & filamenta feri concrecibilis ultro attreruntur; hæc autem in quantitates infinite parvas attrita, per serum liberiori motu decurrunt, ut sæpissime per sudores, & urinas erumpant. In hoc violento fluidorum impetu momentum distractionis arteriarum, glandularum, aliorumque solidorum adeo præpollens fit, ut momentum contractionis eorundem paucam, ac minimam rationem habeat cum momento præpollente distractionis, non mirandum ergo, cur in tam violentis fluidorum motibus, & tam distractis solidorum filamentis sæpissime eveniant aneurysmata in arteriis, varices in venis, & hydatides in lymphaticis canalibus, vomica aliquando, & sinus præternaturales in glandulis, cæterisque visceribus, pulsus fiant nimis elastici, nimis vibrati, inordinati & asymmetri, separationes fluidorum irregulares, heterogeneæ & vitiosæ, sensoria confusa fiant & languida, totumque corpus præternaturali calore excandescat; tot autem vitia duratura sunt, usque dum transpiratis, aut per excretoria naturæ loca eliminatis, heterogeneis corporibus fibrosum sanguinis crassamentum, & aliqua corpora inertia præternaturales densitates, crassities, pondera, moles, & motus amiserint, & acquisita naturali, sive homogenea subtilitate, æquabili densitate, debito pondere, motuque proportionali, massa sanguinis ad naturalem mixtionem reciprocam elementorum elasticorum, & non elasticorum inter se, naturalemque temperiem restituatur: tali methodo ex mechanicis legibus arbitrandum est, a frigoris affectione ad præternaturalem caloris statum massam sanguinis erumpere in febribus, talique ordine fieri calorem præternaturalem in massa sanguinis, talique lege fluida univèrsa in febribus violentè inter se, & in solida erumpere.

24. Alterum phænomenon, quod expendendum occurrit in febribus intermittentibus est ratio, cur febrilis accessio frigoris & caloris statutis temporibus redeat? Cum in febribus intermittentibus massa sanguinis post accessionem frigoris & caloris ad naturalem statum pene restituta videatur, erunt reciproca mixtio elementorum sanguinis, densitas, crassities, pondus & motus seu momenta eorundem juxta isochronas naturæ leges quasi restituta, verum ut clare exponatur, quomodo determinatis temporibus redeant febriles insultus frigoris & caloris, tria præmittenda esse arbitror. 1. Quamvis massa sanguinis in febrium intermittantium remissione quoad densitatem, crassitiem, pondus, & motum, seu quoad momenta elementorum reciproca ratione mixtorum per aliquam temporis differentiam in canalibus quibuscunque sanguiferis uniformis seu homogenea esse videatur; attamen vitio chyli, succorum hepatis, pancreatis, lienis, necnon glandularum omenti & mesenterii, nonnulla tamen seu filamenta corporum præternaturalium seu heterogeneorum in massa sanguinis existentium in hanc ingrediuntur, & circumveniunt, quæ quantumvis numero, pondere, mensura ac momento multo minora sint corporibus homogeneis adhuc dominantibus, nihilominus continuo chyli, aliorumque humorum heterogeneorum ingressu statutis temporibus febrilem motum restituere apta sunt. Quamobrem secundo loco advertendum est, quod quamvis massa sanguinis per aliquod tempus cum reciproca mixtione elementorum componentium juxta densitatem, crassitiem ac motum &c. videatur esse in naturali proportionem uniformis, & cæteris paribus, æquabilis; attamen sæpe, ac sæpius portio massæ non omnino æquabilis, non omnino uniformis esse potest in spatiis minimis arteriarum & venarum in glandulas desinentium ob asymmetros motus ipsarum glandularum succos heterogeneos, diversorumque momentorum præternaturaliter separantium. Cum autem (n. 10. prim. part.) ostensum sit, in statu naturali systolem & diastolem cordis cum systole, & diastole arteriarum, glandularumque desinentium debere esse proportionales, cumque in tali febrium intermittantium remissione sæpissime non conservetur hæc totalis ratio æqualitatis, aut quasi æqualitatis inter systolem & diastolem cordis

(a) Ex Wolfio Cod. 4. pag. 564. Mechan.

cum systole & diastole arteriarum potissimum minimarum, & glandularum desinentium, succos diversæ & præternaturalis indolis separantium, non poterit diutius massa sanguinis in continentibus vasis in æquo mixtionis æquilibrio sustineri: hinc alte occurrit considerandus motus asymmetre glandularum separantium, & vasorum minimorum in glandulis evanescentium; quis enim praxin medicam agens in febribus intermittentibus impeditas, aut inertes glandulas pancreatis, hepatis, lienis, aut mesenterii & omenti non sensit, aut non cognovit, aut saltem jure optimo non suspicatus est? 2. Certum est, in naturali motu massæ sanguineæ ob isochronas pulsationes, cordis, arteriarum, & glandularum, quarum opera una hora sæpe 3000. pulsationes; ex Cardano 4000. juxta Bartholinum 4400. ex calculis vero celeberrimi Lyster c. 22. de humoribus 4500. enumerantur; *determinatis temporibus necessario haberi determinatum circulationum numerum*; æquabilis ergo futura erit lex & ordo motus elementorum massæ ejusdem, & homologa statutis, determinatisque temporibus eorundem in glandulis separatio.

15. Hisce præmissis cum succi quantumvis heterogenei primo ingressu in massam sanguinis non semper esse possint numero, pondere ac mensura adeo densi, adeo crassi cum ponderibus & motibus, seu momentis notabiliter inæqualibus respective ad ordinatum adhuc motum totius massæ sanguineæ homogeneæ supra cætera corpora heterogenea adhuc prædominantis, nondum alterari poterit notabiliter ordo ac lex, & reciproca naturalis mixtio elementorum sanguinis; verum si paulatim, & crescentibus, determinatisque temporibus creverint ingressus corporum heterogeneorum in massam sanguinis, ut post tantum numerum circulationum, qui determinatis temporibus fieri semper debuit numero, pondere ac mensura, momenta corporum heterogeneorum superare incipiant corporum homogeneorum momenta, eo primo tempore in minimis vasis evanescentibus in glandulas, magis magisque asymmetre motas, utpote minimorum diametrorum respective ad majores diametros canalium, tunc opere corpore diametrorum respective ad majores diametros canalium, tunc opere corporum densiorum & crassiorum heterogeneorum lentescere incipiet sanguis, & cum ultro sequatur & subsequatur determinatis circulationum numeris, crescens numerus corporum heterogeneorum, sectiones vasorum primo minimorum cum decrescant semper in ratione geometrica respective ad majores, primus frustra solida minima vasorum in glandulas asymmetre mota evanescentium a quantitate filamentorum sanguinis circulantium in ratione geometrica aut quasi geometrica replebuntur, & repleta obstruentur, & quodammodo sapisime solidescunt. Ut autem hæc clariora fiant, eligamus frustum conicum canalis minimi in glandulam evanescentis; sit nempe frustum conicum C. D. c d arteriæ desinentis in glandulam, cujus diameter internæ majoris peripheriæ C D sit —

1; diameter vero internæ peripheriæ minoris c d sit — — ; altitudo vero frusti sit — 6. (Vide Fig. 4.) Ut proxime habeamus

quantitatem sanguinis replentem, & contentum in frusto hoc conico, quæ quantitas componat frustum hoc conicum, ex celeberrimi Ozanam Geometrica practica operando constabit contentas partes in

tali frusto conico fore — 3 — Quamobrem si partes istæ contentæ,

& componentes frustum hoc conicum arteriæ supponantur esse scrupuli, hæ contentæ partes in frusto conico arteriæ minimæ evanescentis proxime æquales erunt scrupulis 4. Advertendum proinde elementa sanguinis heterogenea vitio chyli, aliorumque humorum, vel ingredi in massam sanguinis quocunque circulationum numero in ratione Arithmetica continua æquali, vel discrete inæquali. Supponatur primo, elementa heterogenea ingredi in massam sanguinis in ratione arithmetica æquali, videlicet prima hora ingrediantur in massam sanguinis 10. grana corporum heterogeneorum; secunda hora 21. tertia hora 30. & sic successive in tali ratione arithmetica, hoc certe spatio horarum 24. ingrediantur in massam sanguinis grana 3000. seu scrupuli 150. nempe drachmæ 50. seu uncia 6.

Quamobrem si canalium, reliquorumque organorum

robur, & vis elastica glandularum separantium, actiones & reactiones liberæ fuerint, & expeditæ, separandisque corporibus heterogeneis proportionales, utique separatis corporibus heterogeneis ab homogeneis in ratione æqualitatis fluidorum massa adhuc sana conservabitur, & quamvis impura, primæ tamen puritati opportuno tempore restituetur. Cæterum si organorum vis elastica, & canalium robur infirmum fuerit, aut in statu inertis, aut nimis tensum, contractumque fuerit, & glandulæ separatrices obstructæ, aut saltem non habuerint momenta separandis corporibus proportionalia, mercede cum corporum heterogeneorum gravitates non sint voluminibus suis proportionales, horum centra gravitatis non erunt eadem cum eorum centrīs magnitudinum, consequenter mutabitur naturalis reciproca proportio momentorum corporum componentium massam sanguineam. Porro cum impetus corporum heterogeneorum habeant rationem compositam ex ratione velocitatum & voluminum, & horum pondera, velocitates & volumina sint inæqualia, inæqualiter movebuntur corpora heterogenea, & hæc inæqualiter movebunt & percutient ea, quibus undequaque occurrunt: sic ultro inæqualiter urgebunt latera cordis, & vasorum continentium, & ab horum nisu elastico inæquali inæqualiter urgebuntur. Præterea ab hisce vitiis corporum heterogeneorum, vasorum continentium, & glandularum inepte aut ægre separantium corpora heterogenea asymmetre mota, nec a glandulis opportune separata in glandulis, & finitimis vasorum frustis lentiora fient; quamobrem juxta superiores calculos, gratia exempli, expositos (etenim juxta majorem ut minorem numerum, & gradum densitatis, crassitiei, ponderis, & motus præternaturalis elementorum præternaturalium massæ sanguinis, proportionaliter quoque impediuntur, & obstruuntur citius aut tardius, magis aut minus majora ut minora frusta vasorum evanescentium & glandularum;) Cum scrupuli 150. sanguinis ingressi in massam ejusdem spatio horarum 24. divisi per scrupulos 4. jam contentos in frusto conico canalis minimi in glandulam evanescentis, apti sint obstruere, & impedire proxime frustra 37. canalium minimorum similibus, & æqualium canali super exposito; proculdubio si frustra va-

forum fuerint num. 37. proxime, æquali ordine ac tempore impedita & obstructa a scrupulis 150. corporum heterogeneorum, tunc si tantus vasorum minimorum; & glandularum numerus fuerit naturæ gravis ac molestus, ex abolito, aut saltem ex imminuto motu augebuntur contactus inter se, proinde densiora fient, crassiora & graviora elementa heterogenea sanguinis & per num. 12. frigoris affectio supervenire incipiet. Ulterius delatis semper continuo circulationum numero filamentis heterogeneis ad extrema vasorum, & retardata in minimis canalium frustis & glandularum areolis naturali velocitate sanguinis, filamenta feri & crassamenti sanguinei cum gradum densitatis, crassitiei & ponderis magis magisque acquirant, qui gradus resistantiam afferat adveniēti sanguini, & determinata temporis mensura pressionem violentam efficiat contra contenta quæcunque corpora elastica & non elastica, proinde frigoris sensationes sustineri & augeri videbuntur. Hæc autem pressio corporum elasticorum & non elasticorum ultro augetur a vi & impetu sanguinis continuo supervenientis, & in minimis canalibus filamenta heterogenea resistantia percutientis; ex hisce autem impulsibus magis densantur, uniuntur & constringuntur corpora cujuscunque generis, usque dum, cum eum gradum densitatis acquisitum corpora elastica amplius pati ac sustinere non possint (quod determinato semper tempore, ordine ac mensura accidit,) conentur tandem aliquando objectas resistantias naturæ molestas undequaque evertere ac superare; hinc dato tempore per num. 13.) quaquaversus facto impetu, restituitoque (ut loquuntur) elaterio, massam sanguinis urgent & violenter succutiunt; & sane cum corpora elastica & non elastica violenter & diversimode determinatis temporibus compressa diversorum sint momentorum, urgebunt quidem, & tangentia quæcunque corpora urgebunt in ratione composita ex massis & velocitatibus seu momentis dissimilibus & inæqualibus eorundem; corpora idcirco cujuscunque generis sine lege ac ordine, determinatis solum temporibus, mota cum præternaturali actione & reactione inter se, naturalem pro eo tempore mixtionem invertent, & juxta varias ac dissimiles rationes momentorum corporum remissiori, aut intensiori agitatione, calore ac æstu hac data temporis mensura per num. 13. movebuntur, hinc calor summus & febrilis incallescetia ægros miserrime occupant, statutisque temporibus redeunt, ex præternaturalis materiæ restitutione per num. 14. talique ordine, ac successiva methodo denuo retardantur.

16. Itaque si tantus corporum heterogeneorum numerus, si tanta densitas, si tanta crassities, ac pondus eorundem in ratione arithmetica continua æquali crescentium, gravi naturæ molestia cumulentur in sanguine, lymphæ & succo nerveo, ut spatio horarum 24. semper retardentur velocitates sanguinis in tot ac tantis vasorum minimorum frustis, in tot ac tantis glandularum spatiis, ita ut etiam in majoribus frustis data ratione, ac tempore imminutæ reddantur velocitates massæ sanguinis cum determinata pressione corporum elasticorum & non elasticorum, cum inæquali omnibus in locis actione & reactione vasorum, & fluidorum, ex quibus vitiozæ & ineptæ mixtiones superveniunt: tunc cum affectione frigoris per n. 12. subsequente postea calore per n. 13. Quotidianæ febres homotone & regulares orientur; Quod si heterogenea elementa vitio chyli, aliorumque corporum ingrediantur in massam sanguinis in ratione arithmetica continua æquali quidem, sed augeantur hæc dato tempore in tali ratione, ut prima hora ingrediantur, gratia exempli, 40. grana corporum heterogeneorum, secunda hora 80. tertia hora 120. ingressa sint in massam sanguinis, & sic successive gravi naturæ molestia, minimorumque vasorum, ac glandularum impedimento, æqualibusque temporibus cum retardatis proportionaliter fluidorum velocitatibus, iisdem quoque temporibus, talique compressione corporum elasticorum, cum præternaturalibus actionibus & reactionibus organorum, & fluidorum, & præternaturali mixtione eorundem, tunc spatio horarum 12. (grana enim 3102. corporum heterogeneorum ingressa erunt in massam sanguinis) duplex quotidiana febris regularis & homotona cum frigore per num. 12. postmodum vero cum calore per num. 13. exorietur. Ex his clarum est, vitio chyli, aliorumque humorum, si tantus corporum heterogeneorum numerus, si tanta crassities, si tanta densitas, tantumque pondus naturæ grave ac molestum cumulentur in sanguine ratione arithmetica discreta inæquali crescendo, cum velocitatibus sanguinis sine ordine, loco ac tempore retardatis in minimis vasorum frustis, ac spatiis glandularum, & cum inæqualibus loco ac tempore compressionibus corporum elasticorum, fiant actiones & reactiones præternaturales solidorum & fluidorum, cum præternaturali miscela eorundem loco ac tempore inæquali, tunc cum asymmetris irregularibus inordinatisque frigoris accessionibus (per num. 12.) postmodum vero cum calore (per num. 13.) emergent febres quotidianæ simplices, aut duplices &c. alteriusque generis, sed inæquales, inordinate & asymmetre. Advertendum hic ob vitium lymphæ quantitate, densitate, crassitie, pondere ac motu asymmetro peccantis supra æquas naturæ leges cum glandularum & minimorum vasorum omenti & mesenterii potissimum impedimento, lymphaticas ac lentas febres contumaci duratione, noctu potissimum ob graviores atmosphæram ingravescere cum aliquali per dorsum refrigeratione & inertia ad motum; cum enim lymphaticus humor crassior, densior & ponderosior sit redditus, lentiori quoque motu progreditur: imminuto autem motu augentur fluidi altitudines, & lymphatica vascula continentia ad majorem superficiem extendi debuerunt, proinde & adaucto pondere, & adaucta superficie impediuntur spatia, & naturales oscillationes, seu motus distractionis & contractionis fibrarum muscularium, carnium, nervorum & tendinum adjacentium, ut aliquantulum refrigerari & iners fieri admotum animal debeat.

17. Quod si tantus numerus corporum heterogeneorum chyli & bilis potissimum pondere ac motu naturæ molestus transferatur in massam sanguinis in ratione arithmetica continua æquali, pariterque præternaturales actiones & reactiones solidorum potissimum glandularum hepatis, omenti & mesenterii, & fluidorum, nec non præternaturalia momenta eodem, aut simili loco vasorum minimorum producantur semper spatio horarum 48. & sic successive, & a principio unius accessionis ad principium alterius semper intercedat talis, determinatusque numerus horarum 48. utique legitimæ Febres Tertianæ, homotone, & regulares, cum frigore per numerum 12. postmodum vero cum calore per num. 13. violentissime irruerent. Ulterius si ea, quæ supra diximus, ingrediantur in massam san-

Febres quotidianæ.

Febres quotidianæ duplex.

Febres quotidianæ simplices, aut duplices &c. alteriusque generis, sed inæquales, inordinate & asymmetre.

Febres lymphaticæ.

Febres tertianæ.

Feb. e. tertio
legiti.
inz. i.

sanguinis in ratione arithmetica discreta inæquali, hæc numero, pondere ac motu seu momentis inæqualibus, agendo & reagendo, inæquali, varioque loco ac tempore retardando velocitates sanguinis cum frigore per numerum 12. postea nisu ac conatu corporum elasticorum cum calore per numerum 13. *Tertianas Febres aliquando simplices, aliquando duplices, alteriusque generis, sed inæquales, inordinatas, asymmetras* præternaturali mixtionis motu producent. Hic & ibi plerunque primus paroxysmus tertio, secundus quarto respondent; & sic successive alterna, seu permutata ratione paroxysmi progredi consuecunt per numerum 14.

18. Simili methodo, ordine ac lege, remissioribus tamen symptomatibus, si tantus corporum heterogeneorum numerus, si tanta crassities, si tanta densitas, tantumque pondus naturæ grave & molestum, (quod potissimum evenire putandum ex prægressa æstivi tempotis minima particularum sulfurearum, balsamicarumque transpiratione) crescant in ratione arithmetica continua æquali, tali ordine, loco ac tempore, ut spatio horarum 72. velocitates naturales fluidorum æqualibus locis ac temporibus æqualiter retardatæ sint in minimis vasorum frustis spatiique glandularum, & cum æqualibus loco ac tempore compressionibus corporum elasticorum fiant actiones & reactiones solidorum & fluidorum præternaturales, cum præternaturali mixtione eorundem; & sic successive a principio unius paroxysmi ad principium alterius spatio semper horarum 72. progressio fiat, tunc cum frigore (per numerum 12.) deinde

Feb. quartana
simplicis.

cum calore (per numerum 13.) *Febres quartanae simplices & hæmotone* erunt producendæ. Verum si hæc ac tanta ingrediantur in massam sanguinis in ratione arithmetica discreta inæquali, & subsequantur actiones & reactiones præternaturales inæquali ordine, variis in locis, variisque temporibus fiant paroxysmi horis 72. respondentes, cum retardatis velocitatibus fluidorum in frustis minimis canalium & glandularum &c. utique cum frigore (per numerum 12.) accessiones quartanarum orientur; deinde ob vires & conatus elasticos corporum elasticorum cum calore (per numerum 13.) febriles supervenient. Hinc quartanæ febres evenient aut simplices, aut duplices, alteriusque generis, sed inæquales, inordinatæ & asymmetræ, talique ordine ac methodo per numerum 14. erunt reditura.

Feb. ephemeræ.

19. Denique si hæc omnia accidant spatio horarum 12. aut 18. aut 24. &c. ita tamen, ut non amplius fiat paroxysmorum alterna, aut successiva progressio, nec ultro redeat ingressus corporum heterogeneorum in massam sanguinis, cum totali & omnimoda libertate sanguinis, & restitutionum & reactionum naturalium &c. tunc cum frigore (per numerum 13.) *Febres Ephemeræ* modo leviores, modo graviores juxta quantitates ac vires corporum heterogeneorum majori, aut minori momento incalescent, quæ aut sudore, aut opportuna corporum heterogeneorum separatione redimentur.

20. Simili ratione quascunque ex intermittentiis genere febres fieri judicandum probabiliter est; verum cum hujusmodi morborum genera pluribus symptomatibus gravari soleant, hinc raptim de his, quæ frequentius accidunt, nonnulla dicere consultum putavi. Dum itaque corpora elastica massæ sanguineæ antea violenter compressa in glandulis, minimisque canalium frustis, suos conatus elasticitatis compressionibus suis proportionales quaquaversus exercent, agendo & reagendo contra quascunque componentes particulas præternaturali elementorum componentium mixtione, & contra solida quælibet nervea lymphatica, venosa & arteriosa cum æstu & calore, ac motu violentissimo massæ sanguineæ universa diruendo; jure in tam violentis, continuisque particularum percussionibus ac motibus corpora quælibet massæ sanguineæ atteri, & in minimas partes, ac fortasse infinite parvas dividi debebunt: cum enim in calore ac febrili æstu agitationes seu impressiones particularum sulfurearum, aliarumque elasticarum in cætera fluidorum corpora sint proxime in ratione composita velocitatum & simpla densitatum particularum sulfurearum, aliorumque corporum elasticorum, constat, quantum corpora quælibet componentia violentissimis actionibus & reactionibus agitari, & in minima dividi debeant; etenim cum solida similia sanguinem componentia decrescant semper in ratione triplicata laterum homologorum, horum superficies in duplicata tantummodo; cumque solida similia ejusdem generis sint ut pondera, non dubitandum, ex tam diminutis solidis pondere, soliditate & superficie ad miliares & cutaneas glandulas deferri debere quantitate ac velocitate seu momento multo majori, quam par est; proinde hæc plus justo transpirare uberrimis sudoribus conabuntur (de qua re num. 42. secundæ partis satis actum est.) Hisce autem transpiratis, velocitas fluidorum moderatur, & densitates mediæ fluidorum antea præternaturalium restituuntur; redit inde opportuna mixtio, & solidorum cum fluidis æquilibrium: tempore autem tanti motus ac caloris, tantarumque actionum & reactionum præternaturalium massæ sanguinis frequentissimæ succedunt jactationes, inquietudines, difficileque respirationes sed potissimum ægri acerrime sentiunt; Id sane evenit, cum nimirum portio non levis feri per sudores transpirati fluere debuisset per spatia glandularum linguæ, œsophagi & palati hæc undequaque madefaciens; verum tantæ transpirationis incommodo tot fluidis privata spatia linguæ & palati & fibræ glandularum opportuno liquido fraudatæ arefcere conantur, aridæ vero factæ contrahuntur, quo statu angustiora fiunt glandularum foramina, quinimo ablatis, aut imminutis inomentis distractionum & contractionum glandularum, aliarumque fibrarum inservientium aut non adjuvant fibræ motum fluidorum, ut necessariam fluidi portionem excipiant, aut exceptam non promoveant, novam opportuna partium irrigationi accommodam susceperunt. Ulterius a filamentis heterogeneis massæ sanguinis sæpissime obsiuntur glandularum salivalium spatia, impeditoque, aut saltem imminuto feri fluxu determinata fibrarum & glandularum corrugatione sum afferunt.

21. Præter hæc a febrili sanguinis motu dilatata inæqualiter vasa quælibet, potissimum venæ & arteriæ menyngum, has inæqualibus percussionibus violentè extendunt, extensæ inæquali diastole calvariam arietant *Dolorem Capitis* afferentes. Porro cum curvæ menyngum fibræ ex nimio sanguinis motu violenter dilatatæ fiant segmenta majorum arcuum, momentum distractionis menyngum non erit æquale, aut proportionale momento constrictionis earundem, sed præpollens, proinde ex asymmetra fluidorum velocitate per vasa menyngum naturales fibrarum anguli fient inæquales ac

diffimiles. Ob id mutabitur earum naturalis directio & parallelismus cum asymmetra distractione & contractione earum, a quibus omnibus dolorem fieri, num. 8. Mechanicæ solidorum ostensum est; præterea cum a glandulis menyngum in præternaturali motu ac mixtione sanguinis separetur serum, peccans quantitate, superficie salium contentorum ac motu eorum, ab his gravantur, percipiuntur & stimulantur menynges cum graviori capitis dolore; quinimo cum a continuis menyngum stimulis fibræ quoque medullares cerebri a menyngibus circumdatæ inæquales, continuasque sollicitationes ac stimulos molesta communicatione excipiant, hæc medullares fibræ tantis tantisque motibus sollicitatæ sensoria actiosa reddunt frequentissimis, minimisque oscillationibus, ut ægri continuo *Vigiles* esse teneantur.

22. Nec dispar molestia occurrit stomacho, cum frequentissime ab asymmetris menyngum motibus communicata per nervos membranis stomachi motuum asymmetria ægri a frequenti vomitu succutuntur; præterquam quod impura corpora, asperarumque superficialium a glandulis stomachi separata, vel ex duodeno bilis ramenta sursum pulsa in ventriculum repetitis vellicationibus stomachi membranas sollicitando, mox stimulo, & momenta contractionis augendo vomitum afferunt.

23. Quia vero in febrium potissimum intermittentiis declinatione excernuntur urinarum copiarum aliquando cum levamine, si hæc fuerint ægri viribus & naturæ morbi proportionales; aliquando vero periculosa, si supra vires morbi & naturæ constiterint; hinc visum est rei nostræ opportunum, brevi *Urinarum separationes* expendere. Certum est, in febrium augmento ac statu, in quo sanguinis velocitas maior est, aliquando summa elementa heterogenea nimis confusa esse, & glandularum actiones atque elasticitates asymmetris momentorum gradibus oscillare, quo tempore nullatenus æqua ratione separari possunt a glandulis viscerum similia corpora a diffimilibus; æquæ nimirum separationes corporum similibus a diffimilibus cum statutis temporibus & æqualibus, placidisque motibus fluidorum & glandularum fieri naturaliter debeant, ut (pag. 29. primæ Partis indicatum est,) nulla quidem actio separationis opportuna naturæ fieri poterit, nisi declinationis tempore, quo velocitas sanguinis & oscillatio solidorum naturali motuum momento accedunt. Verum quia aliquando accidit etiam declinationis tempore a renalibus glandulis tantam urinarum copiam separari, quæ viribus gravis ac molesta naturæ *Diabetem* afferat, proinde juvat hic de tam gravi symptomate brevi differere. Ab adaucta velocitate sanguinis in febribus, a concitata actione & reactione particularum massæ sanguinis hujus filamenta, & reliqua componentia attrita nimis fiunt, & in partes infinite parvas divisa, serum cum non æqua & opportuna mixtione cum reliquis massæ sanguineæ particulis reciproce misceatur liberiori motu fluit; serum hoc copiosius delatum in renales glandulas impetu summo urget internos parietes glandularum; cum vero impetus sit factus ex massa talis fluidi ducta in velocitatem, qua fluidum temporibus æqualibus defertur, erit impetus tanti fluidi erumpentis per foramina arteriarum evanescentium in glandula in ratione composita ex rationibus duplicata velocitatum, simpla densitatum seu gravitatum specificarum, & simpla foraminum (a), e quibus erumpunt in glandulas desinentes. Quamobrem si cæteris paribus velocitas feri fluentis ab uno orificio vasis desinentis in renalem glandulam in statu naturali fuerit $u = 2$ — 4 nempe in ratione duplicata radice $u = 2$; densitas vero, seu gravitas specifica feri fuerit d ; foramen vero e quo erumpit serum in glandulam sit o ; erit quantitas motus seu impetus feri fluentis e glandula renali proxime ut $u^2 \dagger d \dagger o$. Ita si supponatur in statu febrili radicem velocitatis massæ sanguinis augeri tantum in ratione tripla, ita ut etiam radix velocitatis feri separandi in glandula renali sit $u = 6$; densitas vero d , sed gravitas specifica feri supponatur eadem in eodem sanguine, idemque pariter sit foramen, e quo erumpit æqualibus temporibus o , erit impetus feri fluentis in statu febrili proxime ut $u^2 = 36 \dagger d \dagger o$, tali ergo ratione fluens præternaturaliter serum ab orificiis singularibus vasorum evanescentium in vasa glandularum urgere debet singulos internos parietes glandularum singularibus momentis — 36. En ergo gravis & molesta extensio & dilatatatio renalium glandularum. Cum vero quantitas, seu filamenta feri fluentis (b) æqualibus temporibus per orificia vasorum in glandulas sint in ratione composita proxime ex rationibus orificiorum vasorum, & velocitatum feri fluentis, cumque impetus velocitatis naturalis suppositus fuerit — 4 erunt cæteris paribus quantitates feri æqualibus temporibus delatæ momento velocitatis præternaturalis, ut 36 proxime in ratione noncupla ac fuerant in statu naturali. Glandulæ itaque taliter extensæ excipere proxime debebunt noncuplam quantitatem feri; verum cum hæc sint ex elasticis vasorum fibris & ex elasticis membranarum filamentis elaboratæ, eorumque opera constrictæ, si accadat ea ratione qua fuerant dilatatæ, urgebunt momento adaucto constrictionis per glandularum foramina noncuplam, aut quasi noncuplam quantitatem feri iisdem temporibus: En ergo excedens feri copia, & magna urinarum effusio, quinimo adeo aliquando excedens est, ut sæpissime miratus sum, naturalem feri quantitatem & potiones ingestas longe fuisse superatas.

24. Tam grave, mirandumque phænomenon aeris potissimum debere arbitratus sum, qui per pulmones, per ventriculum, per cibos, potiones continuo exceptus, & inde effusus in massam sanguinis tam gravia phænomena parit ac sustinet: & sane tantam aquarum copiam ab aere potissimum cumulari posse affabre decet experimentum a celeberrimo P. Lana expositum cap. 15. *sui Podromi*. Accipit enim vas vitreum excavatum, & in formam coni elaboratum, talique lege suspendit, ut vertex coni vitrei pendulus, deorsum tendens sustineatur: Hoc vas nive, aut glacie repleatur, & Soli, aut quocunque loco calido exponatur; aer continuo ambiens externam coni vitrei superficiem continuo densabitur, & paulatim in pendulo vertice coni undequaque collectus continuam aquam erit stillaturus, inclusa quidem nive, aut glacie parum, aut nihil imminuta. Hac methodo perennem fontem generari posse, hancque aquam sanandis hecticis utilissimam celeberrimus Auctor testatus est. Ab hujusmodi experimento necesse est colligere, particulas quoque aeris

(a) Per Prop. 31. pag. 214. Hermannii.

(b) Per Prop. 30. Hermannii pag. 214.

in sanguinea massa undequaque exceptas, collectasque aliquando uniri, ac densari taliter posse, ut hæc continuam in aquam collectam stillare coactæ sint; tam mirandum opus fortasse futurum erit in sanguine, cum filamenta fluidorum massam sanguineam componentia enervato mixtionis naturalis vinculo laxa, attrita ac resoluta nimis fuerint, ut opportuna ac necessaria vi intimam mixtionem aeris cum reliquis particulis sustinere ac conservare apte non possint; hæc nimirum aeris moles cum non intime unitæ, nec ad minimam cum singulis, ac reliquis massæ sanguineæ componentibus permixtæ esse possint, hæc necessario unitæ sero supra cætera elementa naturaliter frigidiores & activiores fiunt, simulque supra naturalem numerum agglomeratæ ac collectæ, proinde inter se nimis tangentes serum, cui miscentur, numero, pondere ac motu urgent & augent, & per laxatas, extensasque renales glandulas uberrima urinarum separatione excernuntur; cum vero semper continua aeris quantitas numero, pondere ac motu excipiat in massa sanguinis, hæc quoque continuo una cum sero per renales glandulas fluxura erit. Non rarum ultro est a *longa Diarrhœa* torqueri ægros, ut excretionem longe superent quantitatem ac pondus cibi & potus, quibus vesci solent. Huiusmodi diarrhœæ non semper ab asymmetria humorum, sed potissimum ab aeris particulis non intime, non perfecte commixtis cum reliquis, ac singulis massæ sanguineæ componentibus elementis generari solent; hæc nimirum aeris moles cum inter se uniri, colligi ac tangentes inter se fieri nimis possint ac densari, momento suo elastico intestina undequaque sollicitant ac stimulant, quæ stimolata frequentissimis distractionis & contractionis motibus oscillando, copiosius serum ab intestinalibus glandulis exprimunt, sicque unione facta cum separatis corporibus numero, pondere ac motu longas diarrhœas sustinent ac promovent. Hæc, quæ de aere & de momento ejusdem exposuimus non nova, neque improbabilia iis videbuntur, qui aeris momenta & actiones in fluidis, quibus miscentur, mechanica ratione cognoverint, cum apertum sit sedulo cogitantibus, plurima morborum & actionum phaenomena animali evenire ob incomprehensibile elastici aeris ministerium. Interim hoc unum addo, me Lectoribus tædio esse futurum, si univèrsa febrium intermittentium genera, si singula horum symptomata expendere, cum ab iis, quæ huc usque dicta sunt, omnia, quæ supersunt, exsolvi & explicari facile possint.

DISSERTATIO III.

De Febribus Continuis.

Sæpiissime intermittentes febres ablata, aut enervata densitate, crassitie ac momento filamentorum massæ sanguinis, nec non corporum inertium, cum excessu momentorum corporum elasticorum habentium rationem majoris inæqualitatis respectivæ ad momenta corporum inertium, in *Continuas Febres* & aliquando in *Malignas* mutari facillime poterunt. Sæpe tamen primo insultu febrium irruunt continuæ, & graviore aliquando culpa malignæ febres ægros enecant; Quotiescumque aliquam ob causam, vel externam, vel internam, sive mixtam quantitates & vires elasticæ corporum elasticorum numero ac motu seu momento reliquas particulas inertes, seu non elasticas superaverint, ut non solo nisu elastico inter se, sed concepto impetu agant vi, aut momento cuiuscunque causæ externæ, aut internæ, aut mixtæ contra inertes particulas, & contra momenta distractionis & contractionis vasorum, aliorumque solidorum conspirantium, tunc febres continuæ sine frigore erunt orituræ; cum enim hic filamenta sanguinis & reliqua corpora inertia nullatenus sint, quod atinet ad densitatem, crassitiam & motum reliquis particulis actuosis seu elasticis proportionalia, cumque inertia corpora habeant numero, pondere ac motu rationem minoris inæqualitatis respectivæ ad momenta corporum elasticorum; præternaturales etenim vires elasticæ corporum elasticorum nullo modo cohiberi possunt, frænari ac vinci per aliquam temporis differentiam a densitate, crassitie ac momento corporum inertium; proinde sine frigore, sed solo cum calore irruunt febres continuæ: Et sane cum vires vivæ corporum elasticorum in statu naturali inertibus quoque corporibus momenta sua continua actione & reactione elastici contactus communicent, & horum corporum elasticorum vires vivæ sint in ratione composita ex ratione simpla massarum, & ratione duplicata velocitatum (a) pariterque cum calor sit ut impressiones particularum corporis calidi in corpore calorem excipiente; istæ autem impressiones sint pariter (per prop. 85. Hermannii) in ratione composita ex duplicata velocitatum, & simpla densitatum seu massarum: manifestum est ex harum rationum æqualitate, aut quasi æqualitate, inter calorem, & vires vivas corporum elasticorum, has quoque cum calore esse copulandas, caloremque naturaliter esse producturas. Verum cum vires vivæ elementorum sanguinis in febribus sint præternaturales, nempe cum gravi excessu velocitatum crescentium in ratione duplicata earundem, futura erit aliquando velocitas sanguinis adeo excedens, ut arteriarum orificia plus evomant temporibus æqualibus quantitatem sanguinis, quam orificia venarum temporibus quoque æqualibus excipere apta sint: proinde quantitates liquorum numero, pondere ac motu nimis effusæ in carniem, membranas, reliquorumque solidorum spatia, nec opportuno tempore ac proportionali motu a venis exceptæ momento suo auferent, aut saltem enervabunt momenta distractionis & contractionis fibrarum conspirantium motui sanguinis in finitima orificia venarum: retardato motu sanguinis lentescunt elementa ejusdem, & paulatim statuta inflammatione *Febres Inflammatorias* erunt productura. Porro hæc vitia ultro emergent, si consideraverimus volumina sanguinis in statu naturali, eademque in statu præternaturalis dilatationis: hæc enim duo volumina cum haberi possint ut solida similia, quæ inter se proportionem habent triplicatam laterum homologorum, erunt porositates, seu interstitia voluminibus interspersa lateribus solidorum homologorum proportionalia, quæ latera cum sint in ratione subtriplicata solidorum, erunt pororum amplitudines, seu particularum sibi invicem proximarum distantia inter se in ratione subtriplicata, seu ut radices cubicæ voluminum sanguinis. Si ergo in statu naturalis dilatationis massæ sanguinis pororum

amplitudines fuerint ut unum, in statu vero præternaturalis rarefactionis ejusdem voluminis sanguinis fuerint ut 3: erit volumen sanguinis in statu naturalis dilatationis ad volumen ejusdem in statu præternaturalis dilatationis ut 1. ad 27, seu ut cubus ad cubum; Idem ergo volmen sanguinis, quod in statu naturalis rarefactionis occupaverat spatium cubicum ut unum, in statu præternaturalis dilatationis in febribus erit proxime in arteriis ac venis, cæterisque carniis spatiis 27 spatia cubica occupaturum: cum itaque tot ac tanta volumina cubica præternaturalia sanguinis nimia spatia repleant, nec tam prompte ac facile ab orificio venarum communicantium excipi possint temporibus æqualibus volumina hæc tam copiose, ac violenter ab arteriarum orificiis evomuntur, plurima quidem solida cubica sanguinis inter spatia arteriarum evanescentium, & venarum incipientium remanere debebunt numero, pondere ac motu. nutritioni partium inepta, nec motui per venas secuturo opportuna: plurima ergo solida cubica in tot spatiis otiose lentescuntia firmabunt inflammationis exordia, febres inflammatorias productura.

26. Hæc vitiosa & lentescencia sanguinis volumina per poros carniem, membranas, aliorumque spatiorum effusa, si per substantiam hepatis effluent *Hepatitis*; si per lienem, per mesenterium, per capitis membranas irruant, harum partium erysipelata & *Febres Erysipelatosas* graviter afferent; si vero per stomachi substantiam, *Lypirias* febres gravissimo fato trahent. Inflammatoriis autem febribus, lypiriis potissimum, commune est, nervos, membranas, & cætera solida crispare ac convellere; vitium enim hoc esse debuit ex succo nerveo impuro, falsisque particulis nimis affecto; ex laxata mixtione naturali reciproca elementorum sanguinis falsa corpora moleste agere, & solidorum spatia, quibus aut firmiter, aut lento motu adherent, vasorumque circumferentias, quas undequaque gravi sollicitatione tangunt, moleste sollicitare ac stimulare; crispatis ergo, convulsisque solidorum filamentis momentum contractionis solidorum præpollens fit, supra momentum distractionis eorundem; ex tanta momenti contractionis præpollentia solida coguntur tonico velut motu consistere; ex his fluida quælibet per vasa decurrentia, cum non ab æquabili motu homologo distractionis & contractionis vasorum, aliarumque fibrarum conspirantium non opportune adjuventur, lentescere, & tardo quantumvis continuo febrili motu moveri conabuntur: ibi potissimum in externa videlicet corporis superficie, ubi vasa minima sunt, in quibus fluidorum motus naturaliter minor esse debet; cum vero in canalibus, quorum diametri sunt majores & cordi proximiores, non ea acervari ac cumulari possint filamentorum densitas & crassities, quæ motum sanguinis ea lege tardiores reddant, sensationi frigoris interni producendæ proportionalem, cumque ulterius elastica corpora soluto jam mixtionis naturalis vinculo ob proximi cordis impetum motu continuo semper agant & reagant, hinc in lypiriis exteriora frigere, interiora uri experimur. Cavendum hic, ne a duritie & consistentia pulsuum sanis similibus decepti, ægros putemus minima aut nulla febre laborantes, cum febres non tantum a præternaturali velocitate pulsuum; verum etiam a præternaturali tarditate fieri possint; affectiones enim cardiacæ, singultus, vomitus, jactationes continuæ, suspiria, anxietates, respirationes angustæ, & aliquando lachrymæ involuntariæ, molesta membranarum & nervorum sollicitatione ac consensu majora prædicunt mala, quam convulsi pulsus indicare videantur.

27. Inflammatoriis febribus affines sunt febres illæ, quæ a Medicis *Malignæ* appellari solent, ita ut hæc ab illis non natura, sed gradu differre mihi visæ sint; communiter a *Dissolutione* & *Coagulatione* generatas Medici putaverunt; ex Chemicis enim edocli sunt, spiritum nitri & spiritum vitrioli, quorum singuli cum per se innocui sint, si tamen invicem misceantur, tertiam quandam substantiam, quam aquam stygiam dicunt, eminenter ac graviter dissolutivam componere ultro experti sunt; Ita sulfureæ particulæ cum nitrosis, aut vitriolicis corporibus mixtæ tertium quoddam dissolvens compositum arsenicale elaborant, quamvis se junctim sine culpa operentur. E contra eminenter coagulant aluminosæ & vitriolicæ opere prismatum octoedricorum, aut paralleipedorum romboideorum, si supra numerum, pondus ac motum sanguineo fluido misceantur. Cum itaque in massa sanguinis corpora fluant diversæ superficiei, molis, ponderis & figuræ; hæc cum per se actionibus naturæ proficere apta sint, si tamen accadat, misceri aliquando inter se & uniri particulis, quarum unio ac complexus tertiam quandam substantiam elaboret, quæ superficies ac figura venefici corporis figuram ac superficiem construat, non dubitandum, a gravi horum magisterio massam sanguinis aut dissolvi posse, aut coagulari. Cum enim horum momenta, ac vires sint nimis inæqualiter, ac nimis dissimiliter actuosæ contra naturalia momenta, ac vires corporum reciproca ratione miscibilium, efficient hæc præternaturalia corpora contactus & percussiones semper nimium inæquales, dissimiles & asymmetras, usque dum dissolutione facta, aut coagulatione, juxta naturas ac momenta corporum seu elementorum agentium (effectus enim semper suis causis adæquatis proportionales sunt) massa sanguinis maligna febre, aut dissoluta corruat, aut coagulata. Hæc tamen febres, quantumvis a dissolutione & coagulatione partiri soleant, nihilominus si harum phaenomena & anomaliam attentissime expendantur, pro potissima causa offerunt plerumque *dissolutionem texturæ sanguinis graviores, quam in cæteris febrium generibus*, pro effectu vero *coagulationem*; enim vero præter ea, quæ de causis febrium inflammatarum mox a nobis relata sunt, si aliquam ob causam sive internam, sive externam, sive mixtam scindantur nimis, rumpantur, ac laceantur filamenta massæ sanguineæ, ut omnino corruat unio & nexus ille, quo componitur reciproca mixtio elementorum: quo nexu pariter elaboratur proportionalis status mixtionis feri cum cæteris quibuscunque elementis elasticis & non elasticis; tunc *Febres malignæ ex dissolutione* fieri arbitrandum est. Verum cum taliter dissoluta textura sanguinis corpora elastica & non elastica esse non possint inter se opportune tangentia ac mixta, corpora quidem elastica non satis, non apte movere poterunt ac urgere inertia corpora, seu non elastica; proinde corpora inertia nullo modo reagere opportune poterunt contra corpora elastica, ut exigit naturalis & æquabilis actio & reactio corporum inter se reciproce miscibilium; ob id ex omnimoda inæqualitate corporum inter se incidentium quocumque tempore

(a) Per Theorema 42. Wolfii Mechan. pag. 594.

pore semper inæquales ac dissimiles fient anguli incidentiæ cum angulis reflexionum eorundem; proinde cum corpora elastica nimis præpollentia corporibus non elasticis misceri nullo modo reciproca ratione possint, elastica corpora a non elasticis præpollentia in momentorum separari continuo conabuntur: inertia inde corpora ab elasticis paulatim sejuncta nimis inter se unientur, hoc autem amplexu graviora reddita lentescunt, majoremque elasticis corporibus resistantiam ferent, aut ex nimio inter se contactu corporum, fient minui, aut nulli anguli incidentiæ & reflexionis; quapropter aut inæquales & dissimiles semper evenient corporum impactorum & retro pulsorum velocitates, aut pene nullæ; proinde diversa & dissimilia semper momenta, aut nulla contingere necesse erit: inertia ergo corpora, aut non opportune, aut lente mota, & omnimoda inæqualitate percussa, nec cum elasticis apte mixta, retardare motum, ac lentescere coacta erunt. Id si eveniat in sinibus meningum, aut in præcipuis spatiis membranarum, carniarum, aliarumque intercapedinum gravi naturæ damno erit futurum: En ergo a causa dissolutionis, sequens effectus coagulationis in aliqua parte. Opera igitur dissolutionis texturæ sanguinis pulsus sunt languidi & enerves, ex nervorum sæpissime, vasorumque paralyti, vigiliæ, stillæ sanguinis e naribus, diarrhææ, dysentericæ; cum vero tam gravis sanguinis dissolutio id fecerit, ut hinc inde coagulationem sanguinis produxerit, eo tempore fient quidem pulsus duri & convulsi, phlegmitides, affectiones lethargicæ, linguæ aridæ & siccæ, aliquorum membrorum convulsiones &c. & in utraque morbi differentia periculæ, urinæ confusæ ac turbidæ in conspectum se offerent, Fatemur tamen, aliquando ex paralyti vasorum, ex imminutis nimium viribus corporum elasticorum cum adaucta supra modum inertia, densitate, crassitie ac pondere filamentorum, & corporum non elasticorum malignas febres ex coagulatione, non tanquam ab effectu antecedentis dissolutionis, sed tanquam a primaria causa ob numerum particularum vitriolicarum, aut aluminosarum, præter ea quæ modo diximus, dominantium, esse pariter orituræ; denique advertendum, malignas febres cujuscunque generis, aut debiliores, aut fortiores futuras esse juxta vires ac momenta causarum (aeris potissimum arsenicalibus particulis permixti) diversimode agentium in massa sanguinis.

28. Remanet hectica febris inter continuas deterior, licet minor cæteris esse videatur. Hæc plerumque ab intermittentibus febribus, vel a continuis, vel a male curatis, vel nimium productis: pariterque ab obstructionibus viscerum, inertia, aut pravitate succi nervei cum naturali potissimum pulmonarium solidorum laxitate & renuitare oriri solet; nimius enim sudor in febribus continuis & intermittentibus, nimia urinarum copia, aut diarrhæa, aut dysenteria &c. filamenta crassamenti sanguinei enervant, quibus laxatis & enervatis evolvant & deperduntur elastica corpora sulfurea præcipue, cum activiora & mobilia sint cæteris, ut oleosæ urinarum guttulæ indicant: hisce ergo corporibus balsamicis depauperata massa sanguinis cogitur cum pulsu debili ac celeri inapte, lente & ægre misceri, minutoque febrili motu agitari: porro salia corpora numero, pondere ac momento activiora, nec ab oleosis sulfurum superficiebus juxta reciprocam mixtionis rationem opportune involuta, ac lenita; circa proprios axes continuo rotando angulosis superficiebus filamentis crassamenti sanguinei alte erodunt ac lacerant: Serum ulterius tot salibus ferax ab asperæ arteriæ glandulis, & a lymphaticis continuo fluens in pulmonaria spatia, hæc continue sollicitando ac stimulando molestam tussim producit; quinimo sæpe, ac sæpius a numero, pondere ac momento serositatum saliarum continuo fluentium in pulmones, erosa pulmonum filamenta cum respiratione difficili insanabile ulcus afferunt; Seri quoque salis copia, & attrita jam filamenta sanguinis, utraque opportuna mixtionis inepta, nec aptæ nutritioni accommodata immodicis sudoribus exeunt, usque dum deficientibus balsamico sulfure, ac dulci sero medullæ ipsæ ossium, musculi, carnes, & cutis ipsa vitæ resolutione arcescant.

29. Cum in febribus molestissima sitis ægros fere semper torquere soleat, hæc data loci opportunitate non spernendum consilium est, rationem & qualitatem potus expendere, ne ægri qualitate & quantitate decepti ingravescant; hoc ultro necessarium putavi, cum

nonnulli celeberrimi viri copiosæ & frigidissimæ aquæ potum consulere audacter voluerint, quibus celeberrimus Vallisnerius præceptor meus tanta ratione, doctrina & practica experimentis obstitit, ut nil melius, nil fortius dici possit; Cum tanto itaque præceptore pauca, sed opportuna dicere animus est, ut copiosæ frigidissimæ potus damna, nec non beneficia potus calidi innotescant. Primo itaque fluida frigidissima & copiosa vi ponderis alte premunt stomachi fundum; vi autem frigoris fibræ stomachi contrahuntur ac crispantur, ut num. 6. Mechan. Solidor. satis ostensum est, & ultero stomachi spatium minori superficie circumscribi tenetur: cum vero subitanæ pressiones & contractiones fibrarum, seu momenta contractionum præpollentiam auferant aut saltem imminuant momenta distractionum earundem, nulla quidem, aut iners fiet actio oscillatoria filamentorum stomachi, quæ ultro communicata sanguini per venas & arterias stomachicas motum hujus vel imminuet, aut tollet, & sæpe, ac sæpius ab imminuto, aut ablato motu parta inflammatione lypiria elaboratur. Secundo, a pressione & frigore ingestarum potionum succi dissolventes a glandulis ventriculi separandi, parta glandularum inertia, quodammodo stagnant, immo impediunt, ne novi dissolventes succi opportune separati necessariam ciborum solutionem promoveant, quinimo peristaltico motu ventriculi, aut imminuto, aut laeso non ultro promoventur ingesta, sed diutius retenta acescent, & corrumpuntur dolore stomachi molestissimo. Tertio, in frigidissimis potionibus particulæ aeris contentæ, nec in cibis & potionibus, & hæc in ventriculo contractæ collectæ, durante frigoris momento, ab hoc compressæ fiunt, & contrahuntur in minora volumina; paulatim vero a calore viscerum circumscribentium coguntur expulso frigore quamproxime rarefieri in ratione composita densitatum aeris, densitate corporum calidorum agentium, & ex duplicata ratione agitationis corporum eorundem; cum vero vires elasticæ aeris quaquaversus expandi debeant, manifestum est ex tam adauctis rarefactionum viribus, summo nisu ac momento membranofos ventriculi parietes, jamjam contractos per quancunque directionem arietandos ac percutiendos fuisse, ut dolores ac tormina, & convulsiones aliquando acerrimæ superveniant: ab hisce doloribus ac torminibus ultro augetur fibrarum contractio, impeditoque, aut imminuto per gastricas venas ac arterias sanguinis circulo facillime supervenire lypiriam necesse est. Quarto, contractis stomachi fibrillis, & nimis refrigerata ventriculi superficie, hepatis quoque superficies partim contactu, partim consensu contrahitur & frigescit; ob id glandulæ hepaticæ lentiori motu agentes separationi corporum ægre obediunt, & obstructæ tumores, scirrhus, inflammationes facile generant; proinde praxi medica experti sumus in febrili frigoris accessione, aquam quantumvis non frigidissimam incaute nimis epotam obstructiones in visceribus stomacho adjacentibus, aut consentientibus facillime attulisse; ex similibus enim potionibus contractis ventriculi membranis, & consensu fibrarum, membranarumque conspirantium communicata contractione glandulis viscerum adjacentium, hepatis videlicet, lienis, omenti & mesenterii &c., hæc pari lege contractæ, crispatæque non ea momenta distractionis & contractionis naturalia exercere possunt opportuna æquis motibus, iustisque separationibus fluidorum; quamobrem homogeneæ fluidorum particulæ cum heterogeneis commixtæ, ac confusæ in glandulis viscerum, aut lenre separabuntur, aut consistent, ut gravissimis tumoribus indurescant.

30. Hisce itaque vitiis fluidorum & solidorum reparandis celeberrimus Vallisnerius moderate calidorum aut tepescentium fluidorum usum sapienter consuluit, quorum opera momenta distractionis & contractionis fibrarum omnium in ratione homologa agunt & reagent, promoventur separationes corporum, sanguinis circulus sustinetur, & universale stomachi magisterium roboratur. Fatetur tamen immortalis famæ præceptor, aliquando frigidissimas potiones concedi posse, dummodo ætas, temperies & calidissima temporis & morbi constitutio permittant; sed caute, opportunis temporibus morbi, & debita quantitate, ac pondere tam grave suspectumque negotium agendum esse, utilissimo tractatu edocuit. Imposterum *Mechanices Remediorum* studio ac labore exarata, Deo juvante, viam aperiemus.

Finis Mechanices Morborum.

MECHANICA

MEDICAMENTORUM

BENEVOLIS MEDICINÆ TYRONIBUS.



Andem aliquando, Lectores benevoli, en quarta Pars Mechanices, quam *Mechanicam Medicamentorum* appello. Nollem hic vos arbitrari, me elaboravisse analysim medicamentorum, aut collegisse selectiores remediorum formulas, quas gloriosiores Clinici usu, & praxi approbaverint; etenim in medica facultate æqua analysis corporum desiderari solum potest, non obtineri, quam tamen si in aliquibus lignis, herbis, & mineralibus intelligere velitis, suo loco exponentur, in reliquis usque adhuc frustra ab igne, & ab arte laboratum est: Quo vero ad selectiores formulas remediorum attinet, has ultro habebitis in celeberrimis pharmacopœis, quibus nunc Respublica medica locupletata est. Nostrium ergo Mechanici laboris institutum erit, quantum probabilior ratio postulat, explicare; quo Mechanico opere Medicamenta agant, & reagant contra fibras machinæ animalis, a quorum diversis actionibus, & reactionibus consequi debeant diversæ oscillationes organorum, & variæ separationes humorum ipsis actionibus, & reactionibus Medicamentorum, & fibrarum proportionales beneficio, aut damno machinæ humanæ. Utinam in tam arduo Mechanices Medicamentorum argumento vota vestra, & nostra obtinere possemus, profecto id nobis gratissimum, ac jucundissimum laboris præmium esset futurum: Cæterum si deficeremus, enixe rogamus, & obsecramus, ut hisce brevibus, & levibus præeuntibus doctrinis majora, & utiliora velitis addere, & edocere. Antequam legatis ea, quæ exposita sunt, placeat legere paginas correctionis; in hisce enim habentur nonnulla præmittenda, observanda, & corrigenda. Valete.

DE MECHANICA MEDICAMENTORUM.



UM de *Mechanica Medicamentorum* verba facere diu animus esset, dicendarum rerum gravitate perterritus, quasi ab hac salebrosa provincia declinare decreveram: Verum in hac re cogitanti occurrit me exercitii gratia *Mechanicam Morborum* adumbravisse, quæ cum necessariam etiam remediorum mechanicam postuleret, tandem aliquando studii pariter, ac exercitii gratia coactus esse debueram hanc quoque *Medicamentorum Mechanicam* adumbrare.

Scio quidem medicamenta præeuntibus ratione, & experientia eligenda esse morborum indicationibus proportionalia; electa autem cum fuerint, & applicata ægrotantibus, arduum quidem esse intelligere, quomodo agant, & reagant in organa machinæ animalis: Quamvis autem negotiorum hoc plenum ambagibus esse videam, nihilominus juxta virium tenuitatem conabor de actionibus, & reactionibus, seu viribus medicamentorum disputare, si non vera, saltem probabiliora assecutus. Pro hoc itaque argumento claritas materiæ postulat, ut nonnullæ suppositiones præmittantur, quæ aut veræ, aut verisimiles a Philosophis, ac Medicis ratione, & experientia utentibus haberi solent.

SUPPOSITIO I.

OMnia principia fluidorum animalis potissimum in massa sanguinis, quæ lato modo elementa etiam dici possunt, alia sunt *actuosa*, & *elastica*, alia vero sunt *inertia*, & *non elastica*; inter *actuosa*, & *elastica* numeramus particulas aereas, sulphureas, & globulos plano-ovales; inter vero non *elastica*, & *inertia* numeramus aquam, salia cujuscumque generis, & terras damnatas (si quæ fuerint,) ut in tertia parte *Mechanices Morborum* num. 3. indicavimus.

SUPPOSITIO II.

EX datis Anatomicis certi sumus, fibras animalium esse partes primo simplicissimas instar fili tenuissimi, ex hisce autem simplicissimis fibris efformari alias magis compositas, quarum alia sunt carneæ, alia membranosa, alia tendinosa, alia nerveæ &c., quæ varia figura donatæ sunt; aliæ enim sunt rectæ, aliæ oblique, aliæ curvæ, aliæ spirales &c.

SUPPOSITIO III.

Cum fibræ compositæ ab effectis cognoscantur elaboratæ, aut undequaque permixtæ ex canaliculis varii generis venosis, arteriosis, lymphaticis, & nerveis; vel ex unione, & contactu fibrarum inter se tangentium elaborentur canales varii generis; cumque ulterius constet varia esse fluida sanguinea, lymphatica, & nervea; ideo supponimus hujusmodi fibras esse repletas fluidis variæ indolis, a quibus fibræ irrigantur, nutriuntur, crescant, conservantur, & moventur.

SUPPOSITIO IV.

Cum fibræ compositæ efformentur ex multiplici unione, contactu, & aggregato aliarum textura, mole, figura similium, & dissimilium, quæ tamen omnes una conveniunt in formatione unius compositi fibrosi; ideo tale compositum fibrosum considerabimus cum Philosophis, Medicis, Anatomicis, ac Mechanicis, ut solidum cylindricum, aut quasi cylindricum suis fluidis opportune repletum. Ita assumit celeberrimus Joannes Alphonsus Borellus prop. 71. secundi tomi de *motu animalium*, arterias & venas consideratis excessu, & defectu earundem esse cylindricas. Hisce præmissis dicendarum rerum gratia liceat sequentes propositiones physico-mechanicas addere, ut istarum beneficio dicenda probabiliori ratiocinio statuatur.

PROPOSITIO I.

SI fibra percussa, aut impulsæ a potentia distrahatur, & elongetur; distractio seu elongatio fibræ erit ut potentia percutiens, aut impellens. Etenim distractio, seu elongatio fibræ est physice proportionalis numeris molecularum ductis in motum distractionis, seu elongationis ejusdem: sed fibra percussa, aut impulsæ a potentia est physice æqualis,

& proportionalis numero particularum ducto in summam motuum distractionis, seu elongationis fibræ ipsius, quæ a potentia ipsi imprimitur; ergo si fibra percussa, aut impulsæ a potentia distrahatur, & elongetur; distractio, seu elongatio fibræ erit ut potentia percutiens, aut impellens.

Corollarium.

Cum in statu naturali distractioni, seu elongationi fibræ factæ a potentia percutiente, aut impellente æqualis, & proportionalis esse debeat contractio, seu abbreviatio subsequens ejusdem; ideo contractio, seu abbreviatio fibræ, & restitutio ad suum statum naturalem post distractionem erit quoque ut potentia, quæ antea fibræ distraherat: natura enim cum velit perfectionem suarum actionum, & reactionum; ideo jure suo semper amat æquilibrium suorum motuum distractionis, & contractionis fibrarum earundem.

PROPOSITIO II.

SI fibræ fuerint crassitie æquales, sed longitudine inæquales, istæ autem percussæ a potentiis æqualibus distrahantur, seu elongentur, distractiones fibrarum erunt in ratione longitudinum, seu elongationum ipsarum.

Etenim distractiones, seu elongationes sunt physice proportionales numeris particularum ductis in motus distentionum, seu elongationum earundem: sed fibræ crassitie æquales, sed longitudine inæquales motæ, aut percussæ ab æqualibus potentiis impellentibus sunt physice, ut numeri particularum fibrarum componentium ducti in summam motuum distentionum, seu elongationum inæqualium fibrarum ipsarum; ergo fibræ crassitie æquales, sed inæquales longitudine motæ, aut percussæ ab æqualibus potentiis erunt in ratione longitudinum, seu elongationum ipsarum.

Aliter. Fibræ crassitie æquales, sed inæquales longitudine sunt ut cylindri (per Suppositionem quart.) æqualium basium, inæqualium vero altitudinum, seu elongationum percussæ a potentiis æqualibus: sed cylindri æqualium basium, longitudinum vero inæqualium sunt (per 14. 12. Eucl.) ut altitudines, seu longitudines, & elongationes earundem; ergo fibræ crassitie æquales, sed longitudine inæquales motæ, aut impulsæ a potentiis æqualibus, erunt in ratione longitudinum, seu elongationum ipsarum.

Corollarium.

Cum in statu naturali, per corollarium primæ propositionis, distractio, elongationi, seu longitudini fibrarum esse debeat adamum æqualis, & proportionalis contractio, seu abbreviatio ipsarum; ideo si fibræ distractæ a potentiis æqualibus fuerint crassitie æquales, sed longitudine inæquales, contractiones, seu abbreviationes ipsarum post distractiones erunt in ratione longitudinum, seu elongationum fibrarum earundem.

PROPOSITIO III.

SI fibræ fuerint crassitie inæquales, longitudine vero æquales, istæ autem distrahantur, & elongentur æqualiter a potentiis æqualibus, distractiones, seu elongationes erunt in ratione crassitierum, seu basium fibrarum, seu in duplicata ratione diametrorum crassitierum, seu basium earundem.

Fibræ enim crassitie inæquales, longitudine vero æquales, si elongentur, & distrahantur æqualiter quoad longitudinem a potentiis æqualibus, sunt ut solida cylindrica (per Suppositionem quartam) longitudine æqualia, crassitiebus vero, seu basibus inæqualia: sed cylindri longitudine æquales, crassitiebus vero, seu basibus inæquales se habent ut bases (per corollarium prop. XI. 12. Eucl. Tacquet;) ergo fibræ: quæ motæ, ac percussæ a potentiis æqualibus distrahantur, & elongentur æqualiter quoad longitudinem, erunt inter se ut crassities, seu bases ipsarum: sed bases cylindrorum sunt circuli, & hi per secund. prop. 12. Euclidis, sunt in ratione duplicata diametrorum; ergo bases, seu crassities fibrarum cylindricarum æqualiter distraharum, seu elongatarum a potentiis æqualibus, quæ fuerint longitudine æquales, crassitiebus vero, seu basibus inæquales habebunt distractiones, seu elongationes earum in ratione duplicata diametrorum crassitierum, seu basium earundem.

Corollarium.

Si fibræ crassitie inæquales, æquales vero fuerint longitudine, distractæ autem, & elongatæ fuerint a potentiis æqualibus: contractiones ipsarum post distractiones erunt quoque in statu naturali in ratione crassitierum, seu basium, seu in ratione duplicata diametrorum crassitierum, seu basium earundem.

PROPOSITIO IV.

Fibra distracta & elongata a potentia impellente, aut percutiente ad eandem fibram non distractam, est in ratione composita ex ratione directæ potentie impellentis, aut percutientis, directæ longitudinis fibræ distractæ ad eandem fibram non distractam, & reciproca ratione crassitiei ejusdem fibræ non distractæ ad fibram eandem distractam.

Sit enim fibra cylindrica KCM in statu naturalis longitudinis, cujus crassities, seu basis sit KCO, longitudo KM; hæc autem fibra a potentia A impellente impellatur, aut percutiatur, ita ut distracta elongetur, & efficiat fibram cylindricam VGN, cujus basis, seu crassities sit VGS, longitudo VN, dico quod distractio, seu elongatio fibræ VGN facta a potentia A impellente ad eandem fibram KCM non distractam, est in ratione composita ex ratione directæ potentie A impellentis, seu percutientis, directæ longitudinis VN fibræ distractæ VGN ad longitudinem KM non distractæ, & ex ratione reciproca crassitiei, seu basis KCO fibræ non distractæ KCM, ad crassitiem, seu basim VGS fibræ VGN distractæ.

Etenim cum fibra cylindrica KCM in statu naturalis longitudinis sit ipsamet ex hypothesi, quæ a potentia A impellente, aut percutiente elongatur, & distrahitur in fibram cylindricam VGN, erunt istæ duæ fibræ cylindricæ KCN, VGN ut duo cylindri æquales, sed cylindri æquales (per 15. 12. Eucl.) reciprocant bases, & altitudines; ergo ita erit longitudo MK cylindri KCM non distracti, ad longitudinem VN cylindri distracti VGN a potentia A, ut reciproce est basis, seu crassities VGS ejusdem fibræ cylindricæ VGN distractæ ad basim, seu crassitiem KCO fibræ cylindricæ non distractæ KCM: sed longitudo VN fibræ elongatæ, & distractæ VGN est ut potentia A impellens (per primam prop. hujus)

Cylindri autem KCM, & VGN æquales componuntur reciproce ex his, ex quibus per multiplicationem efficiuntur per expositam xv. prop. 12. Euclidis; ergo fibra cylindrica VGN distracta, & elongata a potentia A impellente, aut percutiente ad eandem fibram cylindricam KCM non distractam, sed in naturali statu constitutam est ratione composita ex ratione directæ potentie A impellentis, aut percutientis, directæ longitudinis VN fibræ distractæ VGN ad longitudinem KM fibræ non distractæ KCM, & reciproca ratione basis, seu crassitiei KCO fibræ non distractæ ad basim, seu crassitiem VGS fibræ distractæ, & elongatæ a potentia A. Q. E. D.

D I S S E R T A T I O I.

De Motu elastico, seu oscillatorio Fibrarum in genere.

Cum fibræ compositæ sint elaboratæ ex multiplici unione, & aggregato fibrillarum, & vaforum cujuscunque generis, in quibus continentur, & fluunt fluida sanguinea, lymphatica, & nervea, cumque hæc donata sint particulis elasticis, & non elasticis, (per primam Supposit.) , ergo necessario hæc fluida elatere prædita communicare debent motum elasticum, aut quasi elasticum fibris ipsis circumscriptis fluida ipsa: Etenim ex mechanicis effectus sunt causis suis adequatis proportionales: sed fluida contenta fluentia per fibras elasticas sunt causæ, quæ agunt, & reagent in fibris, & in fibras circumscriptas, seu continentes; ergo effectus, seu impetus communicati fibris continentibus elasticis, aut quasi elasticis erunt futuri. Cum autem motus elasticus, aut quasi elasticus postulet jure suo motum compressionis, seu contractionis, cui vicissim responderet proportionalis motus dilatationis, seu distractionis, per definitionem 48. Wolfii de motu corporum ex percussione; ergo motus elasticus fibrarum erit motui compressionis, seu contractionis, & vicissim motui dilatationis, seu distractionis earundem proportionalis, seu sub alio nomine æquipollens erit, & similis motui oscillatorio earundem, ut colligitur ex definitione 34. Wolfii de motu pendulorum.

2. Tanto itaque operi elastico, aut quasi elastico, sive oscillatorio, aut quasi oscillatorio fibrarum conspirat ipsamet naturalis structura, & organica constitutio ipsarum; fibræ enim compositæ elaborantur ex fibrillis, quarum aliæ sunt circulares, aliæ rectæ, & inter se parallelæ, quæ circulares secant ad angulos rectos (per secundam Suppositionem;) nonnullæ aliæ obliquæ, quæ priores ad angulos obliquos interfecant, denique aliæ sunt spirales, quæ fortitudinis gratia fibras omnes circumligant. Cum itaque fibræ universæ tam a motibus internis, quam ab externis objectis, nec non a progressivis viventium animalium impelli, ac moveri, & diversimode inflecti necessario debeant; ideo fibræ universæ juxta varias directiones, flexiones, & inflexiones, cum multiplices efficiant angulos, varisque curvitatibus acquirant, futuræ erunt in continua mutatione angulorum, & curvitarum, acquirendo modo majores, modo minores, modo æquales angulorum, & curvitarum mensuras. Verum cum majoribus angulis fibræ opposire, quæ se habent, ut opposita latera angulorum magis distractæ, & elongatæ fiant, ideo cum ad ultimum terminum suæ naturalis distractionis pervenerint, conabuntur in statu naturali constitutæ ad naturalem contractionis statum, seu ad naturales suos angulos sese restituere. Istæ autem distractiones, & proportionales contractiones fibrarum cum successiva vicissitudine angulorum modo majorum, modo minorum fieri debeant, profecto exercere debent successivas actiones, & reactiones similes, & æquales actionibus distractionum, & reactionibus contractionum fibrarum simili lege corporum elasticorum, & oscillatorum methodo pendulorum.

3. Similiter si anguli fuerint minores, tunc fibræ eedem oppositæ, quæ se habent ut latera opposita angulorum, contractæ reddentur, & abbreviatæ; etenim fibræ universæ suis donantur porositatibus, spatiosis, sive areis intermediis, quæ cum stringi, ac claudi pos-

sint; ideo opportunum contractioni locum dabunt, quotiescunque fibræ minoribus angulis oppositæ contrahi teneantur. Cum autem momentum contractionis tale fuerit, ut clausis porulis, ac spatiis fibrarum fibræ contractæ devenerint ad ultimum terminum suæ contractionis, tunc cum amplius contrahi non possint fibræ elasticæ, coactæ erunt in statu naturali constitutæ ad naturalem suæ distractionis statum, seu ad majores angulos rursus se se restituere; quæ contractiones fibrarum & proportionales distractiones ipsarum cum successiva vicissitudine motuum fieri debeant; ideo sequi debent successive reactiones contractionum proportionales actionibus distractionum fibrarum simili lege corporum elasticorum, & oscillatorum methodo pendulorum.

4. Quod autem fibræ contractæ restrictis, & clausis porulis, ac spatiis fibrarum cum pervenerint ad ultimum terminum suæ elasticæ contractionis, coactæ sint ad naturalem suæ elasticæ distractionis statum se se restituere; pariterque fibræ eadem distractæ cum pervenerint ad ultimum terminum suæ elasticæ distractionis, coactæ sint naturalem statum suæ elasticæ constrictionis repetere, constare videtur primo a natura ac lege corporum elasticorum, quæ quanto compressionem patiuntur, tanto acquirunt dilatationis, & distractionis; deinde certum est quod fibra contracta ad ultimum terminum suæ elasticæ contractionis, & eadem fibra cum distracta fuerit ad ultimum terminum suæ elasticæ distractionis, se habent ut duo cylindri æquales: sed cylindri æquales reciprocant bases, & altitudines (per 15. 12. Euclidis); ergo fibra elasticæ contracta quanto erit minor longitudine, seu altitudine, eo mole, & crassitie erit major; & eadem fibra cum elasticæ distracta fuerit, quanto fiet mole, & crassitie minor, tanto fiet major longitudine; quare ita erit major moles fibræ contractæ ad minorem molem ejusdem fibræ distractæ, ut reciproce est major longitudo hujus fibræ distractæ, ad minorem longitudinem ejusdem fibræ contractæ, consequenter patebit ex geometricis fibrarum elasticæ contractam oppositam angulis minoribus, sed mole majori redditam, hanc mole & crassitie adauctam elatere suo comprimere debere fibras sibi proximas, tangentes, & e directo oppositas, & ab iisdem proportionaliter urgeri, & elasticæ comprimi; quamobrem cum hæc fibra contracta perventa fuerit ad ultimum terminum suæ elasticæ contractionis, & majorem molem, ac crassitiem acquisiverit, tunc hæc coacta erit ab ultimo termino suæ elasticæ contractionis transire postmodum ad naturalem statum suæ elasticæ distractionis, non solum beneficio elateris sui, verum etiam opere, & vi externa fibrarum adjacentium, tangentium, & e directo oppositarum adauctas moles, & crassities fibrarum elasticæ comprimantium.

5. Similiter cum fibra hæc elongata, & opposita majoribus angulis elasticæ pervenerit ad ultimum terminum suæ naturalis longitudinis, tunc cum hæc elasticum conatum, & impulsu fecerit in fibras sibi proximas, tangentes, & oppositas basibus cylindrorum, & ab iisdem proportionaliter elasticæ urgeatur, & comprimatur, coacta erit non solum beneficio elateris sui, verum etiam opere, & vi externa fibrarum tangentium, & oppositarum basibus cylindrorum transire ab ultimo termino suæ elasticæ distractionis ad naturalem statum suæ elasticæ contractionis.

6. Favet ulterius motui elastico, & oscillatorio fibrarum animadversio Borelli prop. 70. de vi percussione, in qua demonstratur, quod in fibris universis quanto in inflexionibus, & curvitatibus fibrarum superficies convexæ augentur, & crescant; tanto superficies in parte concava stringuntur, contrahuntur, & clauduntur; quamobrem cum fibræ internæ in parte concava redditæ fuerint adeo strictæ, & angustæ, ut ad ultimum terminum suæ contractionis, & compressionis devenerint, cogentur & opere elateris, & fibrarum constrictarum ad naturalem statum suæ elasticæ distractionis sese restituere; hinc hac successiva vicissitudine motuum constrictionis, & dilatationis superficialium in parte convexa, & concava, eadem sequi debent phænomena, quæ exposuimus opere majorum, aut minorum angulorum.

7. Hæc ultro ostenduntur ab elasticis machinulis rhomboidalibus, cum celeberrimo Borello, aut spheroidalibus, cum immortalis fame Bernollio, quibus compositæ fibræ in flexionibus, & inflexionibus, in curvitatibus, & reliquis motibus animalium machinulæ istæ elasticæ comprimantur, & elastico nisu proportionaliter debeant dilatari, profecto hæc elasticum, & oscillatorium fibrarum motum omnino patefacient.

8. Denique satis superque hunc elasticum, & oscillatorium fibrarum motum ab experimentis ipsis edocuit Bellinus prop. 1. de villo contractili scribens, per totum tempus quo animalia vivunt sive in aquis, sive in aere, sive in solo degant, vi contractionis, & distractionis aguntur ipsorum musculi, ipsorumque partes sentientes. Et sane fateor me summa cum admiratione observavisse in bove, cui recenter abscissum fuerat collum, universas colli fibrillas continuo & successivo motu contractionis, & distractionis oscillavisse, ita ut hujusmodi elasticæ oscillationes secundum distractionem, & successivam contractionem per horam circiter manifestissime perduraverint.

9. Ab his ergo quæ hic dicta sunt, & quæ secunda parte Mechanices Morborum a num. 4. usque ad num. 8. enunciata fuerunt, colligere jure ac merito possumus modum elasticum, seu oscillatorium fibrarum esse radicem, ac causam motus peristaltici intestinalium. Animadvertendum inde est, hunc motum oscillatorium in aliquibus fibris esse majorem, ut in fibris intestinalibus, in aliquibus minorem; in aliquibus vero minimum juxta majores, aut minores, aut minimas angulorum, aut superficialium mensuras, & impetum majorem, aut minorem fluidorum, & corporum impellentium. Quamobrem scitote ex naturæ legibus amantis æquabilitatem, & proportionem motuum tam in fluidis, quam in solidis, in statu naturali singulas fibrarum oscillationes aut majores, aut minores, aut minimas, semper juxta suam naturam, evenire isochronas, & equabiles; hinc si diaphana essemus corpora, profecto admirando, & jucundo spectaculo videremus fibras universas vario oscillationum gradu abbreviari, & elongari magis, aut minus juxta majorem, aut minorem quantitatem fluidorum agentium, & reagentium, & juxta majorem, aut minorem vim, & sollicitationem corporum interiorum, aut exteriorum, aut utrorumque contra fibras; servata semper juxta suos gradus motuum æquabilitate.

10. Ultimo colligere possumus fibras cujuscunque generis, quæ vel

vel vasa componunt, vel se habent ut vasa æquabilibus, & isochronis suis oscillationibus semper promovere & impellere æqualia fluida, temporibus quoque æqualibus per has fibras transeuntia, ita ut in statu naturali nulla fluidi transeuntis portio detineri debeat, præter illam minimam, quæ nutritioni inservit, sed tota transiens æqualiter, & isochrone promoveatur ulterius temporibus æqualibus operibus naturæ famulatura.

DISSERTATIO II.

In quo consistat Sanitas, & Ægrotudo.

11. **C**um natura sit sapientissima geometra omnia disponens numero, pondere, mole, figura, motu, & tempore, necessarium erat ipsam quoque amare voluisse proportionem in quibuscunque physicis operibus machinæ animalium secundum numerum, pondus, molem, figuram, motum, & tempus. Fateor hic me a rigore geometricæ proportionis præcindere, eam tantummodo proportionem intelligens, quæ cum aliqua latitudine servet tamen unitatem compositi; cum ergo in proportionem nitatur unitas, & ordo naturalis compositionis tam in fluidis, quam in solidis, cumque proportio æqualitatis, aut quasi æqualitatis momentorum corporum componentium potissimum sit illa, quæ primario inserviat, & conferat majori, & perfectiori nexui, unitati, & ordini pro acquirendo æquilibrio, aut quasi æquilibrio corporum inter se gratia valetudinis obtinendæ, & conservandæ; ideo in præsentis operis pretium erit, ut Physico licet, considerare quomodo obtineri possit hic necessarius nexus, hæc necessaria unitas, hic necessarius ordo, seu hoc æquilibrio, aut quasi æquilibrio tam in fluidis, quam in solidis inter se, ut in machina animali opportuna sanitas habeatur, & conservetur. Cum itaque natura geometra totis viribus amet, ac velit sustinere, ac conservare animalia in perfecto sanitatis statu constituta, ideo æquilibrio, aut quasi æquilibrio fluidorum primo firmare decrevit. Quamobrem non tædeat primo expendere fluidum sanguineum, cum hoc sit basis, fons, & origo reliquorum fluidorum, a quibus omnibus universæ actiones vel sanæ, vel ægræ cognoscendæ potissimum sunt, nec non solidorum omnium nutritiones, vires, motus, ac momenta.

12. Apertum est itaque ab experimentis fluidum sanguineum compositum esse ex corporibus similibus, & dissimilibus numero, mole, pondere, & figura, & ex corporibus fibrosis retis in modum dispositis; hoc ergo in limine liceat colligere admirandum naturæ artificium in naturali massæ sanguineæ compositione. Cum natura indigeat in hoc fluido sustinere, & conservare quantum possibile est unionem, & nexum particularum componentium, multiplici artificio, ac opere uti voluit, ac debuit; quorum primum externum est, quod desumitur a canibus; secundum colligitur a fibrosa, & reticulari compage ejusdem crassamenti sanguinei; tertium a geometrica mixtione, ac dispositione particularum sanguinis in ratione reciproca, aut quasi reciproca ipsarum; quartum denique ab universali aeris circumambientis pressione.

13. Ad primum quod attinet: canales arteriosi cum conicam figuram describere videantur transeundo successive a sectione majori ad minorem, sunt ipsi, qui sanguineum fluidum excipiunt a corde; sanguis itaque a corde impulsus momento quidem maximo, & ratione muscoli cordis impellentis, & ratione elastica particularum sanguinis impulsu non unionem, & nexum, sed dissolutionem acquireret summo naturæ periculo, nisi arteriæ conica sub figura elaboratæ unioni, & nexui sanguinis primo succurrerent; & sane cum conicæ arteriæ a basi successive decrescant quoad diametros, & peripherias in ratione arithmetica, sectiones autem sive areæ ipsius diametris respondentes successive decrescant in ratione quadrata suorum diametrorum, manifestum erit, quod si diameter basis arteriæ fuerit ut 10, successive autem decrescantes diametri fuerint ut 9, ut 8, ut 7, ut 6, ut 5, ut 4. &c.; sectiones istis diametris successive decrescantibus respondentes futuras esse ex geometricis in ratione quadrata decrescantibus videlicet ut 100, ut 81, ut 64, ut 49, ut 36, ut 25, ut 16, &c.; Ex tot autem sectionum, sive arearum decrementis unusquisque intelliget quantum moles sanguinis coacta transire a sectione majori ut 100. ad sectiones successive minores, & decrescantes, ut indicavimus, quadrata diametrorum ipsis respondentium densari, ac stringi debeat, & in unione, ac nexu detineri, ita ut massa sanguinis successive densior, strictior, & collectior reddenda sit.

14. Neque obstat transitus sanguinis ab arteriis conice decrescantibus in venas, quæ sunt conica spatia successive crescentia in ratione similiter quadrata suorum diametrorum: etenim sanguis ab arteriis delatus in venas in exposita ratione crescentes desertur absque notabili unionis, & naturalis nexus detrimento: omnia enim experimenta in hoc convenire videntur venosum sanguinem multas particulas actuosas, volatiles, & elasticas deperdere in multiplici circulatione, in nutritione partium, & transpiratione, propterea cæteris paribus venosum sanguinem multo minoris momenti esse sanguine arterioso; Hinc natura geometra utens proportionem quantum potest, tantum majoris spatii tribuere debuerat sanguini per venas effluxuro, quantum proxime amiserat virium, & momentorum in circulatione, in nutritione, & transpiratione; jure itaque, ac merito natura consuluit augere in venis tantum spatii, quantum reciproce, aut quasi reciproce deperdidit sanguinis motus elateris, aut sanguis in venis, & beneficio majoris spatii, & valvularum per venas effusarum æquabili cursu, aut quasi æquabili, ac in arteriis, esset circulatorius: Cum ergo æquabilitas motus sanguinis in venis sustineatur, & conservetur, ac in arteriis, colligere jure possumus unionem, & nexum massæ sanguinis in venis pariter esse conservandum, ac in arteriis pro universali unione, & nexu fluidi sanguinei in machina animali.

15. Verum si juxta Borellum considerare voluerimus tam arterias, quam venas, ut canales, qui, consideratis excessu, & defectu inter se proportionalibus, apti sunt constituere ordinem, ac legem motuum cylindricis canalibus proportionalem, juxta quartam Suppositionem; profecto cum in tali suppositione æquabilitas, & proportio motuum, & momentum compositi sanguinei tam in arteriis, quam in venis sustineri debeat, & conservari, nullum certe vitium dissolutionis, sed proportionale quaquaversus beneficium unitatis,

nexus, & ordinis sanguinei compositi tam in arteriis, quam in venis erit oriturum.

16. Deinde tantum cordi fuit naturæ sustinere, ac conservare expositam unionem; & nexum particularum sanguinis inter se, ita ut texturam sanguinis amaverit, munitam fibrosis, & reticularibus filamentis: ocularia enim sanguinis experimenta satis superque ostendunt adesse hujusmodi reticulares fibrillas, præter ea quæ attentissime observaverunt celeberrimi viri Boileus, Levenokchius, & Malpighius; Isti itaque fibrarum ordines effusi per longitudinem, & latitudinem compositi sanguinei, & parallelis positionibus dispositi, reticulares figuras describunt unionem, & nexum sanguineis particulis donaturi: Cum vero fibrosum hoc sanguinis crassamentum varias subeat canalium pressiones, varios impetus corporum elasticorum, & non elasticorum, & multiplices vasorum inflexiones, & curvaturas, per quas fluere debet, ideo fibrosæ reticulares areæ esse necessario debebunt in continua mutatione angulorum. Quamobrem si istæ areæ fuerint quadratæ ex mutatione angulorum oppositorum rombos describent, ut inde in figuras quadratas restituantur; quod si areæ fuerint quadratæ ex mutationibus pariter angulorum oppositorum evenient trapezoidæ in quadrilateras postmodum restituentur.

17. Neque credendum est, has continuas angulorum mutationes in fibris crassamenti sanguinei parere posse divisiones, & dissolutiones corporum componentium, etenim potius unionem, & nexum alte donant; areæ enim reticulares positæ in continua mutatione angulorum ex legibus hysoperimetris successive majores, & minores fiunt; cum vero in transitu majoris areæ ad minorem sequi debeant in particulis elasticis, & non elasticis modo magis, modo minus contentis majores contactus, pressiones, & miscellæ corporum contentorum inter se, ideo non leve beneficium ab hisce mutationibus angulorum erit secutum; & sane natura, cum recte operetur, tali proportionem permiscere debet particulas elasticas, & non elasticas inter se, ita ut evenire debeant momenta corporum massæ sanguinis in ratione æqualitatis, aut quasi æqualitatis: sed hæc æqualitas, aut quasi æqualitas momentorum corporum elasticorum, & non elasticorum inter se similem, & dissimilem neque haberi, neque concipi possunt, nisi elementa componentia ex geometricis tali ordine, ac proportionem misceantur, ita ut hæc proportio sit reciproca, aut quasi reciproca corporum inter se; ergo colligere poterimus, naturam geometram amantem unionem, & nexum elementorum sanguinem componentium in motibus sanguinei compositi tali proportionem reciproca, aut quasi reciproca miscere voluisse ac debuisse elementa elastica, & non elastica massæ sanguinis, ut ab reciproca mixtionis methodo momenta corporum elasticorum, & non elasticorum inter se evenirent æqualia, aut quasi æqualia, æquiponderantia, aut quasi æquiponderantia inter se.

18. Quod exposuimus usque adhuc de mixtione elementorum sanguinis in ratione reciproca, aut quasi reciproca; simile dicendum erit de elementis componentibus lympham fluentem per canales lymphaticos, & de componentibus succum nerveum fluentem per nervos, quæ duo fluida cum secernantur a fluido sanguineo tanquam basi fluidorum omnium machinæ animalis, ideo sub iisdem, aut similibus legibus proportionum debent considerari, ut perfecta sanitas habeatur, & conservetur.

19. Denique tanto operi unionis, & nexus elementorum sanguinis alte succurrit universalis, & æquabilis pressio atmospheræ, quæ universa non solum fluida, sed etiam solida quaquaversus, & æquabiliter circumscribens, & comprimens determinatum pressionis momentum producit, unde determinata unio, & nexus tam in fluidis, quam in solidis opportune consequatur.

20. Descendamus modo ad solida organica; solida enim omnia cum in statu naturali constituta conspirare unice debeant ad unitatem, & nexum omnium componentium machinæ animalis sustinendum, & conservandum, idcirco vel mole, vel numero, vel momenti &c. suas vires exercere debent, quæ sint æquipollentes, aut quasi æquipollentes moli, numero, & momenti &c. aliarum partium, quæ sint prioribus partibus similibus respondentes. Cum itaque hæc fuerint, tunc solida inter se æquabilem, aut quasi æquabilem proportionem momentorum habebunt inter se. Ulterius contractiones, & distractiones solidorum ipsorum fient æquabiles, & isochronæ, propterea hujusmodi solida tali proportionem æquabili, aut quasi æquabili constituta communicando impetus, & pressiones canalibus cujuscunque generis æquabiles, & isochronas communicare, & conservare debebunt æquabilem, & isochronum motum fluidis quibuscunque in machina animali; Vicissim cum fluida cujuscunque generis fuerint in naturali statu, ac proportionem æquabili, aut quasi æquabili constituta, hæc proportionales impetus communicare, & ipsa debebunt solidis ipsis continentibus, idcirco cum juxta talem ordinem, ac proportionem sequantur actiones, & reactiones tam fluidorum in solida, quam solidorum in liquida cujuscunque generis; hinc in statu naturali perfectissimæ sanitati tam proportio reciproca, aut quasi reciproca momentorum particularum sanguinis, & fluidorum inter se, quam homologa ratio fluidorum, & solidorum pariter inter se, itemque solidorum unius generis, & solidorum alterius homologa proportio habendæ erunt pro actionum, & reactionum tam in fluidis, quam in solidis æquilibrio, aut quasi æquilibrio acquirendo, & conservando, ut sanitas habeatur, & conservetur. Similes proportionum leges tam in fluidis, quam in solidis putaverim intellexisse Hippocratem, cum libro de alimento docuerit, *consonantiam, & dissonantiam esse sanitatis & morbi signa*.

21. Quamobrem hisce legibus statuta ratio sanitatis facile hæc alterabitur, aut perdetur, cum vel momenta elementorum sanguinis, aliorumque fluidorum notabiliter declinaverit a proportionem reciproca, aut quasi reciproca ob vitium numeri, aut molis, aut ponderis, aut figuræ elementorum fluida componentium, aut ob vitium densitatis, laxitatis, & asperitatis ipsorum, vel cum homologa proportio inter fluida, & solida notabile vitium fecerit, tunc enim ægrotudines, & morbi necessario sequi debebunt; hoc enim in statu elementa fluidi sanguinei non perfecte inter se permiscuntur, non fiunt intimi contactus, non intimi occurus particularum, neque intimæ, & æquabiles actiones, & reactiones earundem inter se; quamobrem in contactibus, & occuribus corporum inordinatis, inæqualibus, & asymmetris actiones, & reactiones evenient inordinatæ, inæquales, & asymmetræ, everteque unitate, ac deperdito nexu,

nexu, & æquilibrio corporum omnia ad divisionem, & dissolutionem sanguinei compositi inclinare videbuntur; ab hisce autem consequuntur alterationes, & paulatim vitiosæ miscelæ, ac vitiosi status in reliquis fluidis lymphaticis, & nervosis, quæ a vitioso sanguine continuo secernuntur.

22. Pariter si organica solida vel numero, vel mole, vel pondere, vel superficie, vel situ, vel motu &c. peccaverint, tunc solida vel nimis laxa, vel nimis densa, vel vitiose conformata organicas ægitudines erunt productura, quæ ut plurimum ob improprietatem solidorum cum fluidis parere quoque potuerunt plurimos morbos fluidorum graviori animalium detrimento.

23. Ex hisce omnibus primo necesse est colligere, quod cum in vero sanitatis statu momenta fluidorum debeant esse in æquilibrio, aut quasi æquilibrio constituta, pariterque solida esse debeant inter se, & cum fluidis proportionalia; ideo corpus in vero sanitatis statu constitutum sentire debet se se in omnibus suis partibus æquabiliter læve, æquabiliter forte, æquabiliter constans, æquabiliter inobile.

24. Similiter cum in statu ægitudinis momenta fluidorum agent, & reagent sine æquilibrio, neque proportionalia sint motibus solidorum, neque solida inter se aptam proportionem habeant; ergo animal in statu ægitudinis sentire debet, aut pati vel in toto, vel in parte nescio quid vel gravioris, vel præternaturaliter lævioris, vel laxioris, vel durioris, vel calidioris, vel frigidioris &c.

DISSERTATIO III.

De Actione Medicamentorum in genere.

25. **F**luida, & solida esse composita ex particulis, seu elementis inertibus, & non elasticis, & ex particulis actuosis, & elasticis ab experimentalis Philosophia manifestum est. Cum vero singula corpora agent in alia, quibus occurrunt, per contactum, idcirco istæ inertes, & non elasticæ particulæ mole, pondere, ac superficie agent in corpora, quibus contactu uniuntur. Particulæ vero actuosæ, & elasticæ præter molem, pondus, & superficiem, motum etiam, & elatere suas vires, ac momenta exercebunt contra corpora illa, cum quibus contactum, vel mediatum, vel immediatum efficient. Uterius cum corpora quælibet juxta experimenta Boilei de effluviis corporum dividi possint in partes infinite parvas, & divisæ effundi debeant quaquaversus facile, prompte, & expedite per universam fluidorum massam non solum ex se, verum etiam auxilio circulationis sanguinis, ideo juxta hæc evenient nonnulla in præsentia a nobis consideranda pro opportunitate eorum, quæ de actione medicamentorum erimus exposituri.

26. Boileus itaque libro de effluviis expertus est, universa corpora sua effluvia quaquaversus emittere, ut singula circum semetipsa peculiarem atmosphæram describant, singulorum tamen corporum viribus proportionatam. Cum autem vires, seu momenta corporum effluentium eo majores, & validiores numero, ac momento habeantur, quo minus, ex Mechanicis, distant a centro corporis illius, a quo effluvia emanant, & vicissim vires, ac momenta effluviolorum ea minora sint, quo magis effluvia distant a centro corporis illius, e quo effluvia illa procedunt; idcirco demonstratum est a Mechanicis has vires, seu momenta effluviolorum esse in ratione reciproca quadrati distantiarum a centro corporum illorum, a quibus effluvia illa effluerunt. Cum ergo vires ac momenta effluviolorum tali proportionem agent in corpora, quibus aut immediato, aut mediato contactu impetum secum communicant; ideo corpora mota, impulsæ, aut percussæ a momentis corporum effluentium excipient motus, impetus, seu percussiones in ratione reciproca quadrati distantiarum a centro corporum illorum; hinc mensuræ motuum, seu percussionum communicatarum corporibus, seu fibris excipientibus vires, ac momenta effluviolorum jure ac merito defumendæ erunt a ratione reciproca quadratorum distantiarum a centro corporum illorum a quibus effluvia illa promanarunt.

27. Ab his constat corpora medicamentorum, a quibus emanant effluvia in puncto contactus agere, & reagere contra fibras majori vi ac potentia; in puncto enim contactus eorum corporum, a quibus effluvia emanant, nulla adest distantia corporis, a quo effluvia exeunt a fibris tangentibus, sed totalis præsentia contactus, hinc nulla effluvia deperduntur in illo contactus puncto, sed tota agunt, & reagent in fibras tangentes; propterea in puncto contactus corporis corpora, & effluvia agentia, & reagentia majori vi ac potentia agent, & reagent quam in quacunque alia positione, ac distantia. Et sane in quacunque alia positione, ac distantia semper effluviolorum vires imminuuntur, & decrescunt in ratione reciproca quadrati distantiarum a corpore, a quo effluvia ipsa emanant. Ut hæc exemplo innoteant, sit corpus medicamenti A, quod emittat effluvia per distantiam ut unum, in qua distantia ut unum habeatur contactus corporis emittentis effluvia cum fibris, pariter idem medicamentum A emittat effluvia ad alias fibras animalis per distantiam ut duo: manifestum est quod cum effluviolorum vires decrescant in ratione reciproca quadratorum distantiarum a centro corporis A emittentis effluvia, manifestum inquam est vires medicamenti A in puncto contactus cum fibris, seu in supposita distantia ut unum, relate ad vires medicamenti ejusdem A in distantia ut duo, se habere, seu agere in ratione reciproca ut 4; in distantia vero ut 2 a fibris vires effluviolorum medicamenti A agere in ratione reciproca ut unum. Similiter si corpus medicamenti A emittat effluvia per distantiam ut duo ad fibras, & idem corpus emittat effluvia per distantiam ut ter ad alias fibras, apertum erit vires medicamenti A in distantia ut duo se habere ut 9, relate ad vires medicamenti A in distantia ut ter; in distantia vero ut ter a fibris vires agentes effluviolorum ejusdem medicamenti A se habere, & agere in reciproca ratione ut quatuor proxime, cum in physicis præcisæ, & geometricæ proportionem servari non soleant supposita in omnibus æqualitate effluviolorum.

28. Hisce præmissis, ad ulteriora progrediamur. Istæ vires seu momenta corporum, aut effluviolorum emissorum a corporibus, vel habentur ab opere *superficierum corporum*, aut *superficierum effluviolorum* contra fluida, aut solida, cum quibus corpora, aut effluvia uniuntur, & factu contactu alligantur.

Vel habentur opere *figuræ corporum* emittentium effluvia, aut effluviolorum emissorum, quam habent, aut quam acquirunt in miscela cum reliquis corporibus aut fluidis, aut solidis.

Vel habentur opere *motus, & elateris* corporum emittentium effluvia.

Sydenham Opera Medica.

fluvia, aut effluviolorum emissorum, qui motus, & elateres communicantur aut fluidis, aut solidis, cum quibus unionem, contactum, aut alligationem acquirunt, ac sustinent.

Denique habentur ab opere *ex hisce omnibus composito*; de quibus sigillatim hic erimus locuturi, in genere tamen, cum inferius ad singularia, & specifica effecta descenderimus, de singularibus medicamentorum viribus necessaria exposituri.

29. Primo itaque medicamentorum corpora agent vel in fluidis, vel in solidis, vel in utriusque opere *superficierum corporum*, aut *superficierum effluviolorum* contra fluida, aut solida, aut contra utraque, cum quibus corpora, aut effluvia uniuntur, & factu contactu alligantur; Ergo superficies istæ, quæ sunt quantitates extensæ ex geometricis quoad longitudinem, & latitudinem vel erunt *ramosæ*, aut *humatæ*. Sint ergo superficies corporum, aut effluviolorum primo ramosæ, aut humatæ, tunc corpora, aut effluvia ista communicata fluidis, vel solidis, vel utrisque apta erunt ramosis, aut hamatis suis superficiebus circumscribere quaquaversus, & quodammodo amplecti particulas tam fluidas, quam fibrosas sanguinis, lymphæ, & succi nervei, pariterque circumscribere, & amplecti solidas fibras organorum, cum quibus unionem, & contactum habent; quare circumscriptis, & amplexis vel fluidis, vel solidis, vel utrisque, statim acquirunt corpora inscripta una cum circumscriptis majores moles, & superficies, cum autem superficies corporum, si similes fuerint, & augeantur, & crescant in ratione quadrata, ex geometricis, moles vero in ratione cubica suorum diametrorum, aut suorum laterum homologorum; si vero in superficiebus corporum moles fuerint dissimiles, augeantur, & crescant in ratione composita ex rationibus basium, & altitudinum corporum ipsorum, patebit quam facile, quam prompte, quam necessario augeri debeant densitates corporum ipsorum inscriptorum, & circumscribentium; cum autem densitates ex Mechanicis sint ponderibus proportionales, constabit ulterius quantum augeri debeant, & gravitates corporum istorum: Hinc fluida, & solida, vel utraque tali methodo circumscripta a superficiebus ramosis, aut hamatis corporum, aut effluviolorum corporum ipsorum irretire, ac ligare debent magis, aut minus fluida, & solida, cum quibus uniuntur juxta majores, aut minores numeros ramorum, hamorum corporum, aut effluviolorum, & juxta majores, aut minores densitates, & superficies ipsorum &c. aut saltem notabiliter fluidorum, & solidorum motum retardare, talia effecta multo probabiliter fiunt a corporibus opiatiss, aut opio analogis, cum similia corpora, aut istorum corporum effluvia ab effectis judicanda sint superficiei ramosæ, aut hamatæ. Quamobrem medicamenta talis indolis, ac naturæ aut opiata, aut adstringentia, aut hisce analoga dicenda erunt.

30. Ita si superficies corporum, aut effluviolorum corporum ipsarum fuerint *texture, levis, mollis, & laxæ*, quæ tantummodo idoneæ sint levibus, mollibus, & laxis suis superficiebus, aut lenire blando, & molli contactu asperas fluidorum superficies, aut emolliere fluida, & solida nimis stricta, & densa, aut penetrare poros corporum, & nimias angustias istorum dilatare, laxare, & aperire blande, & suaviter, aut impedire majores corporum adhesiones inter se, &c. tunc tales superficies corporum, aut effluviolorum emissorum leves, molles, & laxæ statuent medicamenta, quæ *laxantia* appellantur; talis ergo indolis erunt oleum olivarum, amigdalatum dulcium, leves pinguedines, lac, mel, terebinthina, serum lactis, & aqua ipsa &c. aut his similia, aut his analoga.

31. Verum si superficies corporum, aut effluviolorum emissorum fuerint inæquales, asperæ, & angulares, tunc altissimæ erunt inæquali, aspero, & angulari contactu penetrando poros solidorum, & areas fluidorum, texturas, ac compages diruere, scindere, rumpe, & evertere. Quamobrem hujusmodi corpora, & corporum istorum effluvia *dissolventia* dicenda erunt majoris, aut minoris roboris, ac momenti juxta majores, aut minores inæqualitatum, asperitatum, & angulorum numeros. Itaque primi generis, seu majoris momenti *dissolventia corrosiva* dicentur, ut est aqua fortis, arsenicum, æs, flammula Jovis, gumma hederæ arboreæ, & alia hisce similia, & analoga. Dissolventia secundi generis seu minoris momenti dicentur illa, quæ *Aperientia*, seu *Deobstruentia* appellantur qualia sunt ea, quæ obstructions tollunt, urinas movent, ut funaria, cicorea, abinthium, marrubium, capparis, aristolochia, asparagus &c. ammoniacum, pravera brava, agaricus, rhabbarum, & his similia, aut analoga.

32. Ut plurimum autem medicamenta agere solent, & reagere, suasque vires exercere contra fluida, & solida opere *figurarum* corporum tangentium fibras, aut opere *figurarum* effluviolorum a corporibus emissorum; effluvia enim corporum veræ sunt seminales particulæ ipsorum, elaboratæ ex minimis dimensionibus, ac figuris proportionalibus majoribus figuris corporum, a quibus effluvia ipsa emanarunt, ut satis superque de primigeniis salium figuris demonstraverat celeberrimus Gulielmus, effluvia itaque ipsa donata similibus figuris, quibus majora corpora prædita sunt, apta erunt penetrare fluida & solida, quæ penetranda essent sub similibus figuris a majoribus corporibus effluvia ipsa emittentibus. Neque de specificis talium corporum, & talium effluviolorum figuris licet dubitare; peculiare enim specificasque figuras observaverunt Philosophi in quocunque regno animali, vegetabili, & minerali; ad animale ergo regnum quod spectat, Boileus in analysi sanguinis humani fatetur se vidisse multiplices salium figuras, cubicas nimirum, parallelepipedas, pyramidales, octaedricas, sphaericas, & prismaticas variæ indolis; easdem quoque detexerunt celeberrimi Viri Levenokchius, Malpighius, & Bonius. In vegetabilibus vero adeo manifestæ sunt essentielles componentium salium figuræ, ut de his dubitare absonum sit, sufficiat legere (cum vitiosum sit hic jam enunciata repetere) quæ a celeberrimo Carolo Fracassato dissertatione *de organo lingue* indicata fuerunt, quæ omnia ab experimentis immortalis Academiarum Florentinarum colligere opportunum censuit, ut literariam Rempublicam de vegetabilium salium figuris erudiret. In mineralibus denique specificæ pariter constant, ac naturales eorum configurationes; sic in granatis figuræ octaedricæ, in antimonio prismaticæ, & sphaericæ, in mercurio satis superque detectæ sunt; & nos in libello italice conscripto *de ferri figuris* a ferreis mineris ad nos missis ab immortalis famæ Vallinerio satis ut putio indicavimus particulas ferreas esse probabiliter pyramidales in basi quadrata, aut quadrilatera, a quarum pyramidum lateribus exeunt a basi usque ad verticem plurimæ

mae aliae pyramides minimae, similes pyramidi majori, quae tamen omnes hamatae sunt, uncinatae, & aduncae. Itaque cum effluvia corporum nil aliud sint quam particulae veluti seminales componentes majora corpora, colligendum jure erit etiam effluvia a corporibus emissa eas habere minimas figuras, figuris majorum corporum omnino similes, & proportionales.

33. Figuræ itaque corporum emittentium effluvia, aut figuræ effluviis emissorum, tangentium, impellentium, aut percutientium fibras animalium varios parient effectus juxta varias molium, ponderum, figurarum, & motuum rationes. Inter corpora, quæ agunt pondere, figura, & motu, eminet mercurius, qui sphaerica donatur figura; hæc autem in punctis tangit corpora quælibet, a quo punctuali contactu emergit necessitas continui motus mercurii, punctum enim nunquam potest esse firma basis corporum; mercurius ergo in minimas quoque sphaerulas divisus aptus redditur penetrare poros solidorum, & areas fluidorum quaquaversus, cumque pondere suo reliquis corporibus, cæteris paribus, alte præpolleat, potenter premit solida, quibus unitur, hæc inflectit, & variis impulsibus urget, varias curvaturas parat, consequenter ob sphaericam figuram faciles penetrationes mercurii, & ob pondus ejusdem multiplices fibrarum inclinationes, & fluidorum dissolutiones eveniunt. Simili lege agere, & reagere debent elementa reliquorum mineralium, quiescunque mole, pondere, figura, & motu fibris machinæ animalis applicata fuerint, penetrando fluida, & solida undequaque; enim vero nonnulla mole, pondere, figura angulari, & motu dissolvunt, & frangunt corpora, quæ ab his fuerint penetrata; hinc mineralia nonnulla in numero *Medicamentorum deobstruentium* posita sunt, ut sunt illa, quæ ex ferro, chalybe, aut antimonio parantur &c. Hic statim sentio quærentes, & dubitantes; Quomodo enim ponitur hic ferrum in numero corporum deobstruentium, cum antea ostenderimus ferri figuras esse uncinatas pyramides, munitas ulterius minimis pyramidibus similiter hamatis, & uncinatis? profecto hamatae, & uncinatae figuræ unioni, & firmitati corporum conducunt, non dissolutioni, ut num. 29. indicavimus. Aptissime dubitatis: Verum scitote hæc, & similia corpora diverso in statu esse considerata, vel in statu quietis, & fixitatis, vel in statu motus, & agitationis. In primo statu ferrum, chalybs &c. hamatis suis figuris firmant aptissime fluida, & solida, quæ naturalibus suis angulis fuerunt penetrata. In secundo statu facta unione cum particulis sulphureis penetrant facilius, & in motu, & agitatione constituta corpora rotando circa proprios axes in tali rotatione aperiant, dissolvunt, & scindunt fluida, & solida, quæ penetraverint acumine suorum angulorum.

34. Alia existunt corpora, quæ pondere, mole, & figura non efformata ab angulis acutis, quorum anguli sint minores gradibus 90, sed ab angulis obtusis, quorum anguli semper sint majores gradibus 90, suas vires exercent occupando, & replendo, si non perfecte, saltem quasi perfecte fluidorum, & solidorum spatia, quibus uniuntur, & adherent; talis ordinis sunt *aluminosa corpora*, quæ figuras octaedricas, aut quasi octaedricas sustinent, talia sunt *Vitriolica*, quæ figuram parallelepido-rhomboideam sibi comparant: aut his similia, & analoga. Ab hisce ergo, aut similibus corporibus occupatis spatiis fluidorum, & solidorum opere obtusorum angulorum elementa fluidorum nimis stringuntur inter se immixto, aut ablato ipsorum motu, & fibræ solidorum circumscriptæ obtusis corporibus, spatia illa replentibus in statu veluti tonico detinentur, hinc neque moveri, neque oscillare commode, ac facile poterunt; propterea tarditas motus in fluidis, & tarditas oscillationum in solidis generantur, ex quibus ostenditur qua ratione suum opus constrictionis exercentur medicamenta illa, quæ pariter *Adstringentia* appellantur. Similis ergo figuræ cum alumine, aut vitriolo ab effectis esse possunt balaustria, galla, lysimachia, consolida, bursa pastoris, myrtus, malicorium, mala cotonea, mala punica &c., quæ tamen aliquando magis, aliquando minus stringunt, ac ligant juxta majores, aut minores numeros particularum aluminosis, aut vitriolicis figuris analogarum, aut juxta majores, aut minores numeros angulorum obtusorum spatia fluidorum, & solidorum magis, aut minus replentium. Hic autem monendum est me physicas res agentem indicavisse corpora purgantia stimulantia, & aperientia agere, & reagere, ac si unicum planum haberent efformatum ab angulis acutis, eo quia corpora hæc cum sint divisa, ac subdivisa in partes minimas, taliter figurantur, ac si quoad sensum unico plano donata essent, licet revera solidos angulos obtineant, quorum plani anguli per Prop. 21. 11. Eucl. quatuor rectis sunt minores. Hic quoque considerata sunt corpora *adstringentia* esse composita ex figuris octaedricis, aut quasi octaedricis, aliisque non in rigore geometrico, sed solum analogice, & quoad sensum, cum hæc figuræ ab effectis replent spatia quælibet fluidorum, & solidorum non solum regularia, sed ut plurimum irregularia, idcirco diximus has obtinere angulos ut plurimum irregulariter obtusos.

35. Hic magnopere animadvertendum est figuras corporum effluvia emittentium, aut effluviis emissorum jure suo supra modum conferre ad varias actiones, & reactiones exequendas tam in fluidis, quam in solidis; verum hæc actiones, & reactiones naturales, & proportionales specificis corporum figuris sæpe ac sæpius mutantur, & invertuntur ab unione, & adhæsiōne aliorum corporum, quæ figuræ corporum emittentium, aut effluviis emissorum undequaque circumscribunt; proinde cum in tali casu corpora circumscripta sint illa, quæ primario agant, & reagant contactu, & quæ primario emittunt effluvia; ideo actiones, & reactiones contra fluida, & solida animalis non producantur, & fiunt a figuris corporum inscriptorum, aut ab effluviis ipsorum: sed potissimum fiunt, & producantur a figuris corporum circumscriptentium, aut a figuris effluviis emissorum a corporibus circumscriptentibus, quæ actiones, & reactiones corporum cum plerumque esse soleant diversæ, aut oppositæ illis, quæ fiunt a figuris internis corporum inscriptorum, & effluviis ipsorum; ideo oritur ratio, cur in medica praxi sæpiissime a medicamentis unius generis experiamur sequi effectus diversos, aut oppositos. Ob hanc causam præstantiores Practici abhorrent ab elaborandis medicamentis magis compositis, sed amant, componere medicamenta, quantum possibile est simpliciora (ut leges naturæ postulant) cum ab his effecta medicamentorum simplicium evenire soleant, ac debeant morborum indicationibus magis proportionalia. Pro hoc argumento exponam exemplum, quo

etiam in similibus possemus ratiocinari: Certum est aqueas particulas esse mobilissimas opere suarum minimarum molium sub figuris aut sphaericis, aut sphaeroideis, aut hisce analogis, a quibus aquæ particulae cum figuris curvilineis semper in motu sunt, & esse debent. Verum si tempore hyemis, spirantibus præcipue ventis aquilonaribus, qui prismatibus nitrosis supramodum abundant, ista nitrosa prismata, quorum figura est cylindrico pyramidalis in basi hexagona, circumscribant undequaque curvilineas aquarum figuras, tunc curvilineæ illæ figuræ aqueæ a nitrosis, aut nitro analogis particulis circumscriptæ reddentur solidæ polygonæ, aut quasi polygonæ: sed figuræ solidæ polygonæ relate ad figuras curvilineas aqueas inclusas, & inscriptas ex mechanicis supramodum tardiores sunt ad motum, ita ut aliquando motum omnino deperdant; hinc aquæ particulae curvilineæ quantumvis natura sua mobilissimæ, nihilominus opere aliarum figurarum circumscriptarum solidæ polygonæ, aut quasi polygonæ redduntur coactæ erunt, aut motum imminuere, aut aliquando deperdere, ita ut fortissimam in glaciem densari, firmari, & stagnare debuerint. Ex his, & similibus, quæ dici possunt, colligere possumus, quam facile etiam medicamenta simplicia, quæ opere suarum simplicium figurarum diuretica, aperientia, & deobstruentia esse deberent, fieri sæpe ac sæpius possint, aut coagulantia, styptica, & adstringentia, quotiescunque facta mixtione cum aliis corporibus in machina animali fortuito tales acquirant compositiones, ut solidas polygonas cum angulis obtusis, aut parallelepipedo-rhomboideas, aut octaedricas, aut prismaticas elaborent configurationes alumini, aut vitrioli proportionales.

36. Deinde corpora, aut effluvia emissa a corporibus agere possunt, & reagere in solida, & fluida machinæ animalis opere motus, & elateris; Itaque quæ operantur motu, & elatere sunt ea omnia, quæ a Medicis volatilia, & spirituosæ dicta sunt, ut sunt omnia sulphurea, & omnia salino-sulphurea, quæ si blando, & medio quodam motu, & elatere juxta naturæ leges agant, & reagant viribus fluidorum, & solidorum, & nutritioni earundem proportionalibus, jure ac merito aut alimenta, aut medicamenta *Cordialia* a Medicis poterunt appellari. Verum si hæc corpora, aut emissa effluvia sub minima mole multo polleant elatere, ac motu, & istorum elater ultro augeatur, & crescat, juxta ea, quæ demonstrantur a Mechanicis de corporibus elasticis, tunc elastica hæc, & spirituosæ corpora aut alimenta, aut medicamenta *exaltantia*, & *diaphoretica* dicenda erunt. Quotiescunque itaque vel sulphurea vel salino sulphurea, vel utraque corpora alicui solido, aut fluido applicentur, si hæc numero, motu, & elatere medium statum teneant, qui sit fluidis, & solidis homogeneus, & proportionalis, tunc aptissima mixtio elementorum in fluidis, æqua separatio puri ab impuro, & opportuna nutritio corporis facienda erunt; Similiter æquabiles, & isochronæ solidorum omnium oscillationes cum æquabilibus viribus, & æquilibrio inter fluida, & solida erunt secuturæ; & medicamenta, aut alimenta, quæ tales fluidorum, & solidorum actiones, & reactiones cum expositis proportionibus paraverint, cordialia aut nutritientia, aut roborantia erunt appellanda. Verum si hæc principia sulphurea, aut salino-sulphurea, aut utraque numero, motu, & elatere a medio statu aut deficient, aut excedant, tunc in defectu *Refrigerantia*, aut quasi *Refrigerantia* vel alimenta, vel medicamenta dici poterunt; e contra in excessu, aut alimenta, aut medicamenta *Calefacientia*, aut quasi *Calefacientia* poterunt appellari.

37. Hic addendum est etiam causam caloris vel in statu excessus, vel in statu medio, vel in statu defectus oriri a lege, & ratione affricus, qui sequitur in particulis elasticis inter se, & in particulis elasticis, & non elasticis pariter inter se; & sane a Geometris edocti sumus moles corporum quorumcumque dividi, & subdividi in partes minores, & minores, & in divisione, & subdivisione decretere semper moles in ratione cubica suorum diametrorum, superficies vero eorundem tantummodo imminui in ratione quadrata: Quamobrem cum ex Geometris multo plus decrescant moles corporum, quam eorundem superficies, & cum a majoribus superficiebus eveniant majores contactus, & consequenter majores affricus corporum inter se; ergo ab hisce majoribus contactibus, & affricibus inter se majores quoque calores, & incallescenciæ sequi debuerunt, quanto moles corporum divisæ, & subdivisæ minores faciendæ erunt. Ostendit enim magnus Galilæus pluitibus in locis motum ex se non calorem producere, sed hunc primario oriri a majori, & concitatori affricu corporum, quæ ad calorem tamen excipiendum, communicandumque instituta sunt: sed corpora volatilia, & spirituosæ numero, motu, & elatere præpollentia facta sunt sub minoribus molibus: minores autem moles majores cæteris paribus obtinent superficies, & a majoribus superficiebus majores consequuntur affricus; ergo corpora volatilia, & spirituosæ numero, motu, elatere, & superficiebus præpollentia majores quoque calores, & majores incallescenciæ erunt productura. Verum si corpora volatilia, & spirituosæ fuerint numero, motu, & elatere in statu medio constituta, tunc affricus superficiebus corporum inter se mediam quandam proportionem motus obtinentes æquabilem caloris rationem ostendent; e contra imminutum, & deficientem calorem, si elementa volatilia, & spirituosæ numero, motu, & elatere notabili defectu peccaverint; quamobrem variæ affectiones in fluidis, & solidis erunt secuturæ, ut antecedenti numero indicavimus.

38. Ab his quæ usque adhuc enunciata sunt colligere possumus facilius, promptius, & potentius sanguinem incallescere, quam lympham, non solum quia massa sanguinis multo pluribus abundat particulis elasticis, quam lymphæ, non solum quia velociori motu impellitur sanguis quam lymphæ per canales suos, verum etiam quia obervante Galilæo (de Cometis) ea corpora tantummodo confricatione incallescunt, quæ ab affricu ipso continuo atteruntur, & in minores, minoresque particulas resolvuntur: sic experitur Galilæus, levigatissimas vitreas particulas, aut perfectissime chalybeas nunquam confricatione incallescere, aut saltem lævissime, eo quia neutra in minimas minimasque particulas atteruntur, comminuuntur, & resolvuntur. Cum itaque lymphæ aqueis ut plurimum particulis indivisibilibus, & ex levissima quantitate sulphurum constet, pariterque cum salina corpuscula, quibus lymphæ scatet, a lentiori lymphæ motu non possint facta confricatione in minores, minoresque moles promptè, facile, & expedite atteri, & resolvi, sed tarde, ac lente; ideo experimur ab effectis naturæ, & febrium sanguinem facilius, & vehementius, lympham vero difficilius, tardius, & remissius incallescere.

Hinc

Hinc summum beneficium tribuitur fluido sanguineo a lymphâ ipsi permixta, eo quia a particulis aqueis indivisibilibus, quæ in sanguine triplæ sunt, aut quasi triplæ supra reliqua sanguinem componentia, ut Boilei experimenta ostendunt, imminuitur, frænatur, & moderatur excedens illa attritio, & dissolutio reliquarum particularum massam sanguinis componentium, vi cuius excedentis attritionis, & resolutionis compositum massæ sanguinis, unio, & nexus ejusdem facillime dissolvendum esset totali periculo machinæ animalis: Itaque non leviter peccant illi, qui in morborum curationibus phlebotomiæ nimis indulgent; extracto enim sanguine plus aquæ tollitur, quam auferatur reliquorum elementorum numerus: propterea reliqua elementa opportuno sero destituta magisque inter se arturuntur, & adaucto istorum affricu in minores, minoresque particulas resolvuntur, adaucto in posterum caloris incremento: Verum si in fluido sanguineo extiterint gravia coagulationis argumenta, tunc liberalis phlebotomia non erit accusanda, sed imperanda, & secuto in posterum majori, & majori affricu corporum inter se, coagulatio sanguinis aut imminuatur, aut dissolvatur.

39. Denique frequentissima sunt illa medicamenta, quæ suas vires, ac sua momenta exercent agendo, & reagendo contra fluida, & solida machinæ animalis in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, & elasticitatum corporum emittentium effluvia, aut effluviis emissorum: Etenim universa corpora ex physicis experimentis, quæ agunt, & reagent in fibras organicas, & fluida nostri corporis, vel agent contactu, vel opere effluviis emissorum a corporibus in ratione simul molium, ponderum, figurarum, & motuum, & elasticitatum eorundem; Quare ut aptæ actionum, & reactionum istorum corporum emittentium effluvia, aut effluviis emissorum mensuræ habeantur, oportebit considerare, & expendere si non exacte, saltem proxime, actiones, & reactiones istorum in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, aut elasticitatum istorum, de quibus specificè acturi erimus, cum singularia medicamentorum singulorum opera erimus inferius consideraturi.

40. Consideravimus usque adhuc in genere qua ratione medicamenta agere, & reagere possint contra fluida, & solida machinæ animalis; Modo cum pleræque medicamenta a succis salivæ, cælophagi, ventriculi, & a succis pancreaticis, & biliosis in intestino duodeno, & a continua attritione inter se, & cum reliquis corporibus dividantur, & subdividantur in partes minimas, & minimas, & partes istæ minimæ deferantur minus circulationis beneficio brevi temporis spatio per totam fluidorum massam; idcirco remanet hic quoque considerandum in genere, quomodo partes istæ corporum, aut medicamentorum divisæ, & subdivisæ in partes veluti infinite parvas aptæ esse possint delatæ eminus per totam fluidorum massam tam varios, & tam dissimiles effectus producere in massa humorum.

41. Quod autem primo corpora, aut medicamenta dividi possint in partes minimas, & minimas (ut antea diximus) constare videtur ab infinitis pene dicam experimentis, inter quæ eligam nonnulla. Expertus est celeberrimus Halleus in actis Philosophicis num. 194. unum auri granum in 10000. visibiles partes posse secari, celeberrimus P. Franciscus Lana observatione 8. tractatu primo Magist. naturæ & artis notat se a Boileo accepisse, quod *unicum granum cupri in spiritu salis armoniaci dissolutum potuit tantam aquæ copiam colore viridi inficere, ut illa aqua sic colorata constaret partibus 256806, quarum singulæ sua magnitudine æquarent molem ipsius grani cuprei.* Refert pariter observatione 8. unum granum ligni nephritici posse taliter dividi, & subdividi in partes minimas, & minimas, ita ut tinctura occuparet grana aquæ 57723. In observatione 4. ejusdem libri narrat experimentum de unico grano thuris quantum spatii occupare potuerit in cubili illo, in quo experimentum effecerat, & reperit in illo cubiculo exiguas particulas fumi illius thuris ascendisse ad numerum 7500000000000, idest ad septingentos quinquaginta milliones millionum. Plurima habentur in Boileo de effluviis, plurima in actis Angliæ, ita ut inutile sit de hac redubitare: Ergo ultro constat corpora, aut medicamenta posse facile, & prompte opere tantorum succorum salivæ, cælophagi, ventriculi, intestini, & glandularum machinæ animalis, & opere attritionis cum reliquis corporibus dividi, & subdividi in partes minimas, & minimas, sicque eminus deferri per totam fluidorum massam, cum opera naturæ in animalibus multo sint reliquis operibus præstantiora, & validiora, maxime quia hisce actionibus naturæ in animalibus magnopere succurrit ingens beneficium circulationis sanguinis, quo dividi, & subdividi ultro possint, & eminus deferri.

42. Et sane beneficium circulationis sanguinis omnino apertum est; si enim supponamus cum Bartolino pulsationes cordis singula hora ascendere ad numerum 4400 proxime; & cor impellere singula pulsatione unam sanguinis unciam, pariterque totam sanguinis massam multo probabiliter ascendere ad libras 24. proxime constabit ex regulis proportionum 24. libras sanguinis circulationes suas exequi vicibus 17 proxime unius horæ spatio; dixi autem proxime, eo quia fateor sanguinem fluentem per minimos partium extremarum canales non has leges circulationum subire tam facile, neque tam præcise posse: sed facta animadversione in complexu motuum sanguinis per majores canales juxta majorem sanguinis quantitatem, constabit proxime juxta datas hypoteses assumpta, ut probabiliores sanguinei fluidi circulationes ad tantum numerum singula hora posse ascendere: Si itaque singula hora compleri possunt circulationes sanguinis vicibus 17 proxime, ultro manifestum esse poterit quam facile, quam prompte moles corporum, aut medicamentorum in tam continuis motibus, & motuum attritionibus divisæ, & subdivisæ in partes minores, & minores possint, immo debeant deferri per universam machinam animalis, & per universam massam fluidorum brevibus temporum differentiis; Si itaque corpora, aut medicamenta tantarum circulationum auxilio, & opere attritionum per motus dividi, & subdividi possint in partes minimas, & si brevi temporis spatio possint hæc beneficium circulationis universam massam humorum, & animalis machinam occupare, facile colligere possumus, cur etiam ex hoc capite sequi debeant tam varia phænomena, tam varii effectus, tam varæ actiones, & reactiones in solidis, & fluidis animalium opere medicamentorum, de quibus sigillatim inferius.

43. Hic actiones medicamentorum rectius exposituri nullatenus præterire debemus summam esse relationem partium principum cum quibuscumque partibus machinæ animalis, immo minimas quasque

Sydenham Opera Medica.

fibrillas cum reliquis omnibus majoris, minoris, minimique ordinis, ac usus admirandum consensum obtinere; Sic experimur a levissimo succo aspero, & acri irritante fibrillas uteri totam mulieris machinam violentissime convulsam reddi, immo a levissima muscæ supra faciem, supra cilia, aut frontem ambulantis titillatione universas corporis partes moleste sentire, sic a chirurgicis habemus levissima quantumvis vulnera aliquando universales tremores, & convulsiones attulisse, denique autopsia constat levissimum vulnus in remotiose partis pede statutum statim ægre se habere, majoremque saniem asserre, quotiescunque æger aut cibo, aut potione aliquo excessu peccaverit. Præter hæc quamvis nulla adsit proportio inter actiones animæ se junctæ a corpore, & inter actiones, & passiones sensuum; nihilominus cum anima in viventibus fuerit compenetrata sensorii, statim manifestum erit, quantum consensum necessario futurum sit inter animam, & sensorium, quam necessaria relatio inter animam, & universa organa corporis; ergo si tot ac tantæ habentur relationes inter animam immortalem, & æternam, & mortalia, ac caduca corporis organa in animali vivente, profecto multo magis futurus erit altissimus consensus inter fibras, & fibras, inter organa, & organa, consequenter etiam inter organa, & fluida organis necessaria respondentia machinæ animalis: tam admirandæ, tam necessaria organorum relationes inter se, & inter fluida omnia animalis debentur potissimum nerveis, membranis, & muscularibus fibris una cum succo nerveo, cum ab hisce sensus, & motus primario juxta anatomica, & physica experimenta in animali cognoscendi sint.

DISSERTATIO IV.

De Medicamentis in particulari, & primo de purgantibus opere Solidorum.

44. CUM in secunda Dissertatione expositum fuerit sanitatem basim habere in æquilibrio fluidorum, & solidorum, & in opportuna proportionem utrorumque inter se; pariterque ægritudinem niti in everso æquilibrio, & in eversa proportionem fluidorum, & solidorum, ideo mederi animalia ægrotantia, docente Hippocrate libro de Arte, nil aliud erit quam *tollere de corpore animalium ægrotantium ea omnia, quæ æquilibria fluidorum, & solidorum notabiliter auferunt.* Hinc Medicamenta omnium medicorum consensu appellata sunt *Instrumenta*, quorum beneficio opportuno tempore, loco, ac statu morbi exercitia auferre apta sunt, supervacanea, aut addere ea quæ deficiunt, ut sic restituta, aut conservata æquilibrio fluidorum, & solidorum sanitas vel deperdita restituatur, vel restituta conservetur. Quia vero medicamenta sive hæc medicinæ instrumenta alia primario agunt in solida machinæ animalis, alia in liquida simul & solida; ideo in præsentis sermo erit de Medicamentis purgantibus opere solidorum machinæ animalis.

45. Cum itaque ab effectis experiamur medicamenta purgantia, & alvum moventia sollicitare, ac stimulare primo cæphagum, deinde ventriculum, ultimo intestina, & per consensum fibras quasque ægrotantis, ut plurimum cum majori, aut minori pressione, & doloris affectione; hinc colligendum est omnia alvum moventia munita esse asperis superficiebus circumscriptis a multiplicibus angulorum prominentiis, a quorum aspero, & angulari contractu fibræ impulsæ, sollicitatæ, ac stimulatæ recedunt a naturali sua positione, ac directione acquirendo aliquas inflexiones, aut arcus; Ob hanc causam aliquantulum evertuntur naturales fibrarum inter se contextarum anguli, & aliquantulum mutantur naturales earundem fibrarum paralleli. Verum cum asperæ, & angulares corporum superficies statuunt bases suas in soliditate, mole, & pondere corporum agentium, ideo moles medicamentorum applicatæ fibris agere, & reagere debent ponderibus, & angularibus figuris. Ulterius cum medicamenta determinatis gravitatibus donata varios pariter excipere motus apta sint suis gravitatibus proportionales, pariterque cum a dissolventibus succis cælophagi, ventriculi, intestini duodeni, reliquorumque intestinorum medicamenta atteri, & dissolvi debeant in partes veluti infinite parvas, quæ aut motu, aut elatere sollicitare, ac stimulare fibras aptissime possunt; ideo medicamenta attrita, & dissoluta cum fuerint, suas vires ac momenta exercent contra fibras tangentes, & percussas in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, & elasticitatum medicamentorum eorundem, quæ ratio composita virium, & momentorum non levis, sed magni, aliquando summi momenti erit futura. Hinc facta sollicitatione, ac impulsu quaquaversus ob multiplicia momenta particularum, aut effluviis earundem contra fibras consequi debent in fibris ipsis frequentes, & multiplices contractiones fibrarum potentiis sollicitantibus, aut impellentibus proportionales, per 1. Prop. hujus. Cum ergo multiplices fibræ distractæ deveniant ad ultimum quasi gradum suæ distractionis, continentur ipsæmet sese restituere ad naturalem suam contractionem, ut prima Dissertatione ostendimus. Ideo cum distractiones fibrarum & homologæ contractiones earum nil aliud sint quam oscillationes earundem, ut eadem Dissertatione aperuimus, & hæc fieri debeant juxta vires, ac momenta particularum, aut effluviis earum sollicitantium, ac stimulantium fibras; propterea a facta sollicitatione, ac impetu secuturæ erunt determinatæ oscillationes fibrarum sollicitationibus, ac impulsibus communicatis proportionales.

46. Cum ergo fibræ multipliciter sollicitatæ, ac impulsæ multipliciter pariter edere debeant oscillationes, istæ autem sint radices ac primæ causæ motus peristaltici fibrarum ventriculi, intestinorum, aliarumque partium; ideo motus peristalticus fibrarum ventriculi, intestinorum, aliarumque partium frequentior, celerior, ac fortior erit secuturus ad materierum excrctiones celeriter, & copiose promovendas. Ut autem vires ac momenta distractionum, & contractionum glandularum magis manifesta reddantur, non tædeat considerare fibras membranæ villosæ intestinorum, seu papillaris esse circumscriptas a fibris membranæ nerveæ, & fibras nerveæ membranæ esse similiter circumscriptas a fibris membranæ muscularis: Modo manifestum est, quod cum distractiones fibrarum membranæ villosæ ad ultimum terminum suæ distractionis, & inflexionis deveniant, tunc coguntur ad suam naturalem contractionem se se restituere, consequenter etiam reliquæ fibræ membranæ nerveæ, & reliquæ fibræ membranæ muscularis inter se communicantes ad

suas naturales contractiones reddentur restitutæ. In tantis autem motibus contractionum fibrarum membranarum nervæ, & membranarum muscularis longitudine, & crassitie dissimilium, & inæqualium cum fibris membranarum villosæ, constabit quot, & quanta momenta impulsuum communicanda ulterius sint glandulis per nerveam, muscularem, & per alias membranas distributis, nimirum in ratione composita ex ratione directæ potentie antea impellentis directæ longitudinum singularum fibrarum inæqualium, & reciproca ratione crassitierum earundem, per 4. Prop. hujus. Facta autem tam valida, tam potenti compressione, & contractione glandularum omnium quaquaversus ab opere tantarum membranarum intestinalium, profecto cum areæ, & capacitates illarum glandularum decreſcant ex geometricis in ratione quadrata suorum diametrorum, materie contentæ in glandulis membranarum intestinalium tanta vi expellentur ab imminutis areis contractis, compressis, & decreſcentibus in tali ratione quadrata diametrorum glandularum, quanta est vis contractionis communicata fibris arearum glandularum a ratione composita virium fibrarum membranarum nervæ, muscularis, & villosæ contractarum; Quamobrem cum copiosissimæ sint glandulæ intestinales quaquaversus copiosas pariter expellere debebunt materias per excretorios porulos in cavitatem intestinorum, & sic successive.

47. Expulsioni materiæ partæ a proxima, & immediata sollicitatione, ac stimulo villosæ, seu papillaris membranæ, succurrit ulterius altera remotior, & mediata actio contra fibras nervæ, & muscularis tunicæ intestinalium: purgantia enim corpora a calore viscerum, a succis dissolventibus ventriculi, pancreatis, & hepatis atteruntur, & dissolvuntur in partes minimas, quæ porositates intestinalium penetrando effluviis ad modum, tandem accedunt ad contactum nervæ, & muscularis membranæ, aliarumque membranarum intestinalium: Hic ergo suos contactus, impulsus, ac vires exercendo sollicitant, & irritant fibras membranæ potissimum nervæ, & muscularis: Vel ergo effluvia hæc opportune sollicitant, & irritant fibras, vel leviter. Si leviter, nullæ, aut quasi nullæ secuturæ erunt e glandulis secretiones materierum, nullæque, aut quasi nullæ purgationes; Si vero opportune sollicitant, ac stimulant, tunc sequi debebunt a potentiis effluviis tangentium impetus, & impulsus, a quibus impulsibus fibræ primario distractæ fiunt, mox successive, ut diximus, redduntur contractæ. Cum autem effluvia successive exeunt a corporibus purgantibus agant in fibras nervæ, & musculares &c. in ratione reciproca quadratorum distantiarum a centro corporis, a quo effluvia illa emanant; ideo si hæc pervenerint ad contactum fibrarum nervearum, postea ad contactum fibrarum muscularium, & contra has fibras in tali ratione reciproca impetum, & nifum fecerint, necessario fibræ membranæ nervæ majorem distentionem, fibræ vero membranæ muscularis minorem distentionem, seu curvam quandam inflexionem minorem pati, ac sustinere debebunt, sed per 4. Prop. hujus, quælibet distractio fibræ facta a potentia impellente est proxime in ratione composita ex ratione directæ potentie impellentis, directæ longitudinum singularum fibrarum, & reciproca ratione crassitierum, seu basium earundem; ergo constabit quam varia futura sint momenta distractionum singularum istarum fibrarum nervearum, & muscularium: Cum autem post curvas distractiones fibrarum superveniant, & succedant similes, & æquales contractiones, & restitutiones earundem, & sic successive similiter, & æqualiter agere, & reagere debeant distractiones, & contractiones fibrarum; ergo patebit quot, & quanta successiva momenta percussionum ferre, ac sustinere debeant glandulæ adjacentes per totam nervæ membranæ, aliarumque membranarum superficiem distributæ a fibris membranæ nervæ; & muscularis aliarumque membranarum impellentibus, & percutientibus. Hinc consequuntur simili ratione impulsuum, & contractionum glandularum intestinalium successive excretiones materierum contentarum in glandulis ipsis, ut antea satis exposuimus: Cum ergo excretiones materierum e glandulis intestinalibus, fiant ab immediato opere medicamentorum agentium, & reagentium, in villos membranæ villosæ, seu papillaris, & a remotiori, seu mediata actione ipsorum corporum purgantium agentium, & reagentium per effluvia, seu per minimas particulas ipsorum contra fibras membranæ nervæ, & muscularis, &c., patebit excretiones, & separationes materierum e glandulis intestinalibus consequi a ratione composita virium, & momentorum corporum stimulantium, aut sollicitantium opportunè villos opere immediato, & opere mediato per effluvia corporum eorundem contra fibras omnes intestinorum.

48. Hic placeat animadvertere nos pro excretionibus opportune exequendis e glandulis intestinalibus semper suppositis sollicitationem, seu stimulum contra villos membranæ villosæ, vel contra fibras membranæ nervæ, & muscularis esse opportune validam; ita ut sequatur distractio fibrarum membranarum, & deinde consequatur contractio æqualis, & proportionalis earundem, ita ut ab actione, & reactione istorum organorum eveniat oscillatio fibrarum, & glandularum cum sollicito motu peristaltico intestinalium. Cæterum si vires, ac momenta purgantium medicamentorum validissima, ac fortissima fuerint, ut sustineant semper statum tonicum, statum convulsivæ contractionis in fibris membranæ papillaris, ita ut non sequantur inde homologæ, & æquales distractiones, & contractiones reliquarum membranarum; Vel si effluvia medicamentorum tam fortia, tam valida sint, ut violenter agant in fibras omnium membranarum, ut fibræ coactæ sint sustinere statum tonicum distractionis, aut contractionis, tunc statuto vel tonico statu distractionis, vel convulsivæ contractionis in fibris intestinalibus parum, aut nihil oscillantibus inertia fiet motus peristaltici, aut ablatio ejusdem, cum parvitate, ac nullitate excretionum e glandulis intestinalium; Experimur idcirco validissima, & fortissima medicamenta purgantia supra vires talium fibrarum intestinalium parere dolores intestinorum, & abdominis, non autem separationes, aut excretiones materierum majori periculo ægotantium. Summo itaque studio fugienda sunt medicamenta hæc purgantia, ut elaterium, gutta gummi, scammonia, & magisteria, &c. variz indolis, ac altæ dosis, pariterque nonnulla antimonialia, & mercurialia, potissimum si hæc exercere velimus in languidis, & inertibus fluidorum, & solidorum constitutionibus, in teneris, & senilibus ætatibus, aut in morbo fractis: Aliquando tamen permittenda sunt, immo consulenda quotiescunque fuerit densa admodum, & viscosa in ventriculo, & intestinis humorum tenacitas, & temperies ægotan-

tium fuerit valida, ac fortis, si ætas vireſcens, aut consistens, si solida fibrosa intestinorum fuerint veluti paralytica reddita, & cum morbus sollicitam purgationem postulaverit; tunc enim similia purgantia esse poterunt fluidis densioribus, & solidis proportionalia. Quamobrem praxis, & prudentia Medici semper vocanda est in iudicium pro necessaria, opportuna, ac prudenti electione medicamentorum.

D I S S E R T A T I O V.

*De purgantibus opere Fluidorum, & Solidorum,
& cur aliqua Medicamenta electiva
operari videantur.*

49. **S**atis, ut puto, ostendimus purgantia medicamenta immediatis, & mediatis viribus agere, & reagere contra solida intestinorum, aut materierum excretiones sequi debeant e glandulis intestinalibus: Modo ordo postulat, ut ultro consideremus tales separationes non solum haberi ab opere solidorum, verum etiam simul & semel ab opere medicamentorum agentium, & reagentium contra solida, & liquida animalium: Minimæ itaque purgantium medicamentorum particulæ, sive effluvia per orificia vasorum lacteorum chylum, lympham, sanguinem, aliosque succos ulterius ingrediuntur, aut ingredi conantur: Ingressa autem cum fuerint facto intimo contactu cum particulis fluidorum rotando circa proprios axes asperis suis superficiebus dividunt particulas fluida componentes, partes filamentosas scindunt, & compagem crassarum particularum, & unionem nimis arctam cum tenuibus, ac fluidis aut minuunt, aut laxant, aut tollunt, laxata compage, aut imminuta, aut ablata particularum humoralium inter se majori, & celeriori motu circulationis suas inveniunt una cum particulis purgantium medicamentorum, & ad glandulas intestinales facilius, & promptius simul deferuntur: facta enim suppositione totam massam sanguinis esse proximè æqualem libris 24. & cor singula systole expellere unicum sanguinis unciam, pariterque pulsationes cordis juxta Bartolinum singula hora ascendere proximè ad numerum 4400. facile ostendimus n. 42. totam sanguinis massam purgantibus particulis permixtam per cor 17. vicibus singula hora proximè esse circulandam, consequenter totidem vicibus singula hora per intestina esse proximè deferendam. Si itaque tam facile, tam prompte tota, aut quasi tota massa sanguinis ad intestina deferatur, constabit cur a medicamentis purgantibus agentibus, & reagentibus contra fibras intestinales tot ac tantæ separationes materierum evenire debeant; evacuatis enim primæ vice glandulis intestinalibus facile a repetitis circulationibus denuo replentur, & denuo sollicitantur, irritanturque glandulæ ipsæ a permixtis particulis medicamentorum, sicque novam parant, & paratam sollicitant excernendæ materie quantitatē.

50. Tanto autem parandæ, & excernendæ materie instituto juvat ulterius frequentia oscillationum, quæ a purgantium particulis vasibus continentibus communicatur: Vasa enim continentia continuo sollicitata a particulis medicamentorum, quæ fluidis permiscuntur, celeriori motu oscillationum oscillant; transeunt itaque frequenter a sectionibus majoribus ad minores, & rursus solcite ad majores sectiones restituuntur, communicando frequentiores impetus fluidis contentis: cum autem fluida celeriori velocitate mota excerni debeant, ac separari, ex mechanicis, ab orificiis vasorum, aut glandularum in ratione composita quantitatum, & velocitatum fluidorum, (aut juxta nonnullos quadrati velocitatis ipsorum), & orificiorum vasorum, ideo in frequentiori motu oscillatorio vasorum cum æqualibus temporibus majores promoveantur humorum quantitates, majoresque pariter velocitates ipsorum, certe copiosiores humorum quantitates ab iisdem, similibusque glandularum orificiis erunt excernendæ.

51. Quod si argumentum hoc sedulo expendere velimus, patebit aliam præstantissimam causam supra modum conferre ad feliciter humorum separationem: ut autem hanc causam clariori methodo exponamus, necesse est præmittere nonnullas desumptas ab experimentalis Philosophia: Corpora videlicet aquea, sive, ut Chemicis vocibus utar, menstrua aquosa apta esse non solum ad salium dissolutionem, verum etiam ad dissolvendas substantias resinosas, ut gummi Arabicum, Tragacanthum, Bdellium, Ammoniacum, & similia; corpora vero sulphurea ad penetrandas, dissolvendasque sulphureas pariter materias esse disposita; sic oleum terebinthinæ penetrat sulphur commune, aperit, & solvit: ita corpora salino-sulphurea opportuna esse ad omnia quoque salino-sulphurea composita dividenda, & dissolvenda, omnia denique corpora salina tantummodo valere ad salinas potissimum massas penetrandas, ac divellendas, ut universa Philosophorum, & Chemicorum experimenta ultro confirmant; deinde apertum est singula viscera machinæ animalis eo esse instituta, ut peculiare succos secernant e glandulis viscerum mole, figura, & motu dissimilibus, sed proportionalibus pro diversis generis succorum separatione a massa sanguinis, ut prima parte Mechanices Morborum n. 8. & sequentibus satis exposuimus, & ut universa naturæ phænomena satis superque ostendunt.

52. Hisce præmissis, ingrediatur gratia exempli rhabarbarum ventriculi capacitatem, hoc quidem dissolutum a salinis ventriculi cuneis, & a reliquis componentibus succum biliosum, & pancreaticum, & in minimas particulas redactum chylum, lympham, & sanguinem penetrat: certe quaquaversus in solida, & fluida agens separationes quidem in genere potens est exercere; verum eo tempore quo opere circulationis hepaticas glandulas penetrat, hic potissimum statuere experimur specificam, & præstantiora sua momenta, ac validiores suas vires: constat enim ab effectis opere rhabarbari biliosas potissimum particulas solcite, & copiose eliminari supra reliquos succos animalis: cum autem ex chimica analysi bilis multo abundet sale, & sulphure, ergo cum salino sulphurea composita facilius, & promptius dissolutionem patiantur a corporibus pariter salino-sulphureis, colligere jure possumus elementa rhabarbarum componentia potissimum esse salino-sulphurea, & ab homogeneis succis biliosis faciliem, ac majorem pati posse dissolutionem. Cum itaque rhabarbari particulæ hepaticam substantiam fuerint ingressæ, hic potissimum facta mixtione istorum corporum homologorum inter se vires, ac momenta istorum majora reddenda erunt, & ultro augenda. Duplici quidem opere, & primo succus biliosus in hepate facile

Facile esse potest ad modum menstrui dissolventis rhabbarum, bilis enim solvens, & rhabbarum solvendum sunt, ut diximus,ambo homologa, & homogenea corpora inter se, videlicet salino-sulphurea; Hinc rhabbarum a particulis biliosis magis magisque in hepaticis glandulis fractum, ac dissolutum, & copiosiores successe particulas emittens, aptum erit tali specifico visu, ac impetu sollicitare fibras glandularum hepaticarum, itaut a talibus specificis oscillationibus fibrarum sequi debeant majores, & copiosiores secretiones corporum biliosorum, quæ sint talibus fibrarum motibus, seu oscillationibus proportionalia. Secunda methodus specificæ actionis, & reactionis inter rhabbarum, & succum biliosum talis quoque esse poterit: sulphureæ enim bilis particulæ suo pollente elatere; ergo facta mixtione, & unione particularum elasticarum bilis cum elasticis particulis rhabbari & facta ulterius nexu salium unius cum salibus alterius vires augeri debebunt proxime in ratione composita ex ratione numeri particularum elasticarum, & salinarum compositi biliosi, & particularum elasticarum, & salinarum rhabbari, & ratione motuum utrorumque; quare facta mixtione, & unione particularum bilis cum particulis rhabbari, vires ac momenta hujus specifici compositi in tali ratione composita augenda erunt. Quamobrem ab hisce specificis viribus, ac momentis facta frequentiori, ac potentiori stimulo contra glandulas hepaticas frequentiores pariter, & potentiores oscillationes specificæ glandularum hepaticarum erunt secuturæ ad ulteriorem bilis ab hepate separationem, ut num. 10. primæ Partis Mechanices Morborum indicavimus: hisce probabiliter legibus innixa fuit veterum Medicorum opinio, quæ medicamenta electivè purgantia decreverat; ab hac enim duplici methodo agendi, & reagendi medicamenta electivè purgantia vires suas ostendere videbantur.

53. Neque dicas a rhabbari particulis excitari posse actionem separationis in aliis quoque visceribus, ut in pancreate, mesenterio, renibus, ac in hepate promota fuerat; eo quia quamvis aliqua excretio aliarum materierum in aliis visceribus excitari possit ab opere particularum rhabbari; nihilominus secretio aliarum particularum in cæteris visceribus multo minor, ac levior futura erit secretionem biliosarum particularum facienda in hepate a specifico opere rhabbari; numeri enim particularum biliosarum specifico sale, ac specifico sulphure prædictarum homogenearum salis, & sulphuri rhabbari multo majores sunt in hepate, quam in reliquis visceribus, consequenter corpora biliosa agentia, & reagentia contra homologas rhabbari particulas in ratione composita majoris numeri salis, & sulphuris biliosi, & ratione elateris sulphuris ejusdem majoribus quoque viribus, ac momentis in hepate erunt operatura: vicissim cum a phænomenis medicis habeantur rhabbarum facilius, & potentius agere, & reagere figura, motu, & elatere pro majori secretionem bilis ab hepate, quam reliquorum humorum a reliquis quoque visceribus; ergo colligere jure ac merito possumus specificas actiones, & reactiones rhabbari contra biliosas particulas, & specificas actiones, & reactiones particularum biliosarum contra rhabbarum se habere ut menstrua inter se vicissim proportionalia, ad mutuum inter se dissolutionem exequendam. Ex mechanicis enim edocti sumus effectus semper esse causis suis adæquate proportionales; hinc opere rhabbari per omnia licet viscera circulantis majores quidem quantitates biliosæ materiæ, quam reliquorum humorum (quarum aliquid concedimus separari posse) erunt majori numero in hepate secerndæ, ob majorem rhabbari cum fibrosis particulis proportionem, & homogeneitatem.

54. Similiter ratiocinari poterimus, si considerare voluerimus actiones, & reactiones eorum purgantium, quæ a Medicis *Phlegmagoga* dicuntur, in quorum classe sunt mechoacanna, jalappa, agaricum, turbit, hermodactylus, ireos, esula, colocynthis, &c. Hæc primario serum solvunt, & promovere duplici pariter methodo, quarum prima respicit phlegmagoga, hæc medicamenta relate ad serum secernendum; secunda respicit serum ipsum relate ad exposita medicamenta. Primo itaque medicamenta phlegmagoga apta sunt asperis suorum salium superficiebus circa proprios axes rotantibus fibrosam sanguinis, & seri concrecibilis texturam penetrare, laxare, aut scindere, qua magis aperta ac dissoluta fluidior seri portio copiosior fluenda erit, & facilius per intestinales glandulas secernenda: deinde probabile est phlegmagoga elementa cum ad intestinales cellulas delata fuerint opere circulationis, hic juxta suorum angulorum, ac motuum differentias specificis motibus sollicitare fibras glandularum intestinalium, qua facta sollicitatione, specificæ, ac determinatæ in fibris eveniunt oscillationes seri molibus, figuris, ac motibus proportionales; etenim, per primam propositionem hujus, motus fibrarum semper sequi debent in statu naturali juxta impressiones corporum impellentium: cum autem a specificis oscillationibus fibrarum glandularum secernenda sint a sanguine illa potissimum elementa, quæ specificis oscillationibus fibrarum mole, figura, & motu proportionalia sint (ut prima Parte Mechanices Morborum numero 8. ostendimus); ergo patebit a phlegmagogis specifica actione, & reactione sollicitantibus fibras glandularum intestinalium secuturas esse copiosiores seri a sanguine separationes determinatis illis glandularum intestinalium oscillationibus proportionales; quare materiæ serosæ copiosius separatæ in cavitatibus intestinalium evomendæ erunt. Ulterius judicari probabiliter potest elementa corporis phlegmagogi facilius, & promptius adhærere, & uniri sero, & corporibus seri, quam reliquis componentibus massam sanguinis, ea videlicet ratione, qua experimur mercurium facilius, & promptius uniri auro, quam reliquis mineralibus, & solas auri particulas potentissime penetrare, ac scindere. Ita edocemur plantas, & plantarum radices enutrirî singulas, & crescere ex determinatis succorum a terra extractorum corporibus ipsis adherentibus, utpote ipsismet plantis proportionalibus, & homogeneis, rejecto ut plurimum aliorum corporum consortio. Quamobrem elementa corporis phlegmagogi facilius alligata, & unita sero, & seri particulis, factoque augmento molium, & virium inter se efficiunt faciliorem penetrationem glandularum, ut qua data porta exeant majori numero serositates cum paucis aliorum corporum consortio; hinc a phlegmagogo corpore plus fluidi seri, plus seri concrecibilis promoveantur, & feruntur extorsum, quam reliqua elementa massæ sanguinis componentia promoveantur. Juxta tales fortasse naturæ leges veteres Medici phlegmagoga hæc medicamenta electivè purgare serum, & aquas arbitrati sunt.

Sydenham Opera Medica.

55. Modo expendere debemus serum ipsum relate ad exposita medicamenta. Serum enim ex Chemicis haberi potest ut aqueum menstruum non solum ad penetranda, & dissolvenda ea corpora salini generis, qua seri particulis proportionem respondent; verum etiam ad penetrandas, & dissolvendas illas resinofas texturas, quæ mole, figura, & porositatibus aptæ sunt excipere subtiles lymphæ sphaerulas, & volatiliores lymphatici salis particulas dissolutioni specificarum resinarum institutas: hinc ab hoc aqueo menstruo specificis salibus composito penetratur, & rumpitur non solum mechoacanna, jalappa, agaricum &c. verum etiam penetrantur, & divelluntur resinofæ quædam substantiæ, ut terebinthina, gummi arabicum, ammoniacum, sagapenum, sacrocolla, & his similia, quibus penetratis, ac dissolutis a salino hoc aqueo fluido elementa sanguinis, aliorumque corporum quoad molem imminuuntur in ratione cubica, quo vero ad superficies in ratione quadrata; quamobrem quoad molem multo leviora, & mobilia redduntur, quo vero ad superficies hæc remanent majores, quæ sustinendo majores contactus cum particulis aqueis, necessario majorem adhæSIONem, & unionem efficiendo cum aqueis particulis, ab hisce aqueis sphaerulis, aut quasi sphaerulis facilitatem motus excipiunt, ut glandulæ, aut renales, aut utraq; a majori motu corporum transeuntium laxatæ, dilatatæ, & apertæ serosis potissimum fluidis viam parent.

56. Hæc data opportunitate discendi de medicamentis, quæ electivè operari videntur, nolo dissimulare exponere probabilem rationem, propter quam experimur nonnulla vegetabilia, ut hellenium mures enecare, nucem vomicam canes occidere, reliquis animalibus illæsis, nonnulla vero ab animalibus desumpta, ut cantharides vesicam humanam specificè lacerare, & urinas promovere, reliquis visceribus sine noxa remanentibus; denique nonnulla mineralia, ut mercurium, fauces irritare, & erodere, & salivationem ut plurimum promovere. Hæc phænomena clare ostendunt variam esse texturam, & compositionem principiorum sanguineas massas componentium juxta varias animalium species; quamobrem particulæ componentes hellenium permixtæ cum sanguine murium facile elaborant moles, quæ in hisce animalibus sunt pondere, superficie, figura, & motu quodammodo veneficæ; & solummodo fluidis per mures circulantibus inimicæ: Nux vomica permixta cum sanguine canum, & felium componere facile possunt particulas, quæ se habent mole, pondere, superficie, figura, motu, & elatere veneni ad modum pro solis canibus, & felibus enecandis; similiter cantharides sine noxa mixtionem inire possunt cum sanguine humano; cum vero istæ aut in renibus, aut in vesica unionem fecerint cum tali determinato numero salis armoniacalis urinam componentis, tunc tales moles componi possunt, quæ pondere, superficie ac figura, stygiæ veluti indolem acquirant, aptam renales glandulas, aut vesicam potentissime lacerare, urinarum mucus dissolvere, & urinas validissime promovere. Sphaerulæ pariter mercurii cum ex natura figurarum sphaericarum semper in motu esse debeant, ideo sine noxa cum fluidis possunt permisceri, & circulare: cum autem mercurius experiat ab effectis a saliva præsertim hominis jejuni aliquantulum detineri, ac firmari, propterea mercurius cum ad loca salivaria, aut ad loca salivæ analogæ pervenerit, hic mora, & quiete acquisita, & hac data occasione quietis a salivæ salibus undequaque circumscriptus, relicta figura sphaerica polygonam figuram acquirit, propter quam in hisce locis majorem moram faciens, & firmitatem acquirens, majores vires, ac momenta exerceat pondere, & aspera superficie, quam a corporibus circumscriptis sibi comparaverat, parta faucium, oris, aliarumque partium erosione, & copiosa salivæ separationem: Similia quoque phænomena in chemicis manifesta esse videntur, sulphureæ enim particulæ unitæ particulis nitrosis, aut vitriolicis tali numero ac mole inter se arsenicale compositum elaborant, quod veneni ad modum operatur contra fluida, & solida, quamvis, componentes particulæ se junctim sumptæ omnino sint innoxuæ; similiter ex miscela spiritus nitri cum spiritu vitrioli tertia quædam substantia emergit, quam aquam stygiæ appellamus validissime erodeptem, quantumvis componentia se junctim accepta beneficia non lethalia esse experiantur. Ex his colligere possumus specificæ phænomena purgationum in animalibus, ut plurimum contingere, quotiescumque determinata fluida cum determinatis, ac specificis corporibus, ut fluidis alterius generis copulenter determinatis in locis machinæ animalis: hisce enim in locis specifica fieri possunt ex determinata mixtione, & unione corporum composita quædam, quæ ob nova pondera, novas superficies, figuras, ac motus peculiare actiones, & reactiones exercent, a quibus determinatæ separationes humorum sive bonæ, sive malæ consequi debeant, aut beneficio, aut detrimento animalium; quamobrem quæ diximus de rhabbaro, ut plurimum expellente biliosas materias, quæ de jalappa, mechoacanna, hermodactylis &c. seu de phlegmagogis expellentibus ut plurimum a glandulis intestinalibus serositates, simili lege, ratione, ac methodo de quibuscumque aliis medicamentis dicendum erit specificas actiones, & reactiones contra peculiaria fluida, & solida corporis exercentia, specificas materierum separationes promotura.

57. Quærendum denique est, cur post purgationes alvus styptica soleat remanere; facile autem quæsito satisfacere poterimus, si considerabimus ab opere medicamentorum sollicitantium, & stimulantium fibras, & glandulas intestinalium, has coactas esse frequentissime, & celerrime oscillare, consequenter motum peristalticum intestinalium factum fuisse celerrimum, ac frequentissimum: quare cum a celeriori, & frequentiori motu sequantur necessario majores effusiones fluidorum non solum præternaturalium, verum etiam naturalium, & elasticorum succi nervei, ideo hisce majori numero effusis, ac deperditis fibræ omnes, & glandulæ intestinales laxatæ, enervatæ, & in statu inertis reddendæ erunt; quamobrem post purgationes glandulæ, & fibræ lentescendo in suis oscillationibus tarde, ac lente separationes, & excretiones materierum imposterum erunt paraturæ, ita ut post purgationes alvus styptica reddenda sit. Accedit quod in purgatione major seri copia excernitur, quam necessitas postulat, hinc multo minor copia remanet post purgationes, fibræ, & glandulæ intestinalium magis exiccata, & arida redduntur, hinc minus aptæ sunt ad opportunos, ac validos motus oscillatorios, seu peristalticos exercendos pro materierum separationem, proinde alvus styptica erit secutura.

DISSERTATIO VI.

De Medicamentis Vomitu excitantibus.

58 **C**orporis purgationes potissimum fiunt, aut per medicamenta alvum moventia, aut per medicamenta vomitum excitantia. Cum vero de purgantibus per alvum in antecedentibus dissertationibus actum fuerit, ideo ordo rei agenda postulat, ut in præfenti de medicamentis vomitum excitantibus acturi simus. Hic autem de vomitoriis acturi, solummodo considerabimus illas causas vomitus, quæ a medicamentorum stimulo cognoscendæ sunt: negligimus itaque vomitum illum, qui a vertigine, a vulneribus, a motu insueto corporis, ut in heda, in navi &c. quæ causæ vomitus facile referri possunt ad illas causas, quas a medicamentorum irritatione partas esse inferius ostendemus. Cum ergo actiones medicamentorum per vomitum nullo modo explicari iusto possint, nisi præmittamus ea, quæ ab Anatomicis necessaria esse judicantur, ideo juxta celeberrimum Heisterum considerabimus: *Ventriculum sub figura utriculi luforii, quia quadruplici numero membranarum munitus est. Prima itaque istarum membranacea est, cujus fibræ transverse procedunt. Secunda musculosa, in qua fibrarum ordo varius est, & quasi inextricabilis; quedam enim quasi circulares a parte superiori ad inferiorem descendunt, aliæ in superiori ventriculi parte inter utrumque orificium, aliæ a sinistro latere ad dexterum oblique excurrunt, quedam orificia ambiunt. Tertia nervea rugas efficiens multis vasis sanguiferis, & parvis liquidum gastricum secernentibus instructa. Quarta villosa, tenuis, porosa præcedenti nerveæ arte adhaerens; Per hanc tunicam etiam quandoque oscula excretoria hiare glandularum ventriculi prope antrum pylori celeberrimus Morgagnius adnotavit. Adversa. Anatom. 3. pag. 6. Præterea adsunt arteriæ gastricæ ad venam portæ tendentes: ubi notanda sunt vasa brevia ad ramum splenicum abeuntia, & vena coronaria ventriculi ambiens. Nervi deinde circa sinistram orificium intrantes a pari vago admodum insignes sunt, hinc adeo sensibile redditur sinistram ventriculi orificium, denique vasa lymphatica ad receptaculum chyli abeunt. Ventriculus duo obtinet orificia, sinistram unum cum gula continuum, multisque rugis instructum, quod longe altius est dextero, dextero vero, qui pylorus appellatur cum intestinis alligatur, quo in loco adest singularis valvula ventriculi orificium claudens, tandem ad est fundus ventriculi, qui anteriora spectat.*

59. Prudentissimus itaque Clinicus vel naturæ, vel morbi necessitate imperet ægotantibus assumere vomitoria, brevi tempore particulæ vomitorii vel pondere, vel aspera superficie, vel motu, vel vi ex hisce omnibus composita, unitæ etiam succis facile salinis, qui a nervea membrana ventriculi continuo separantur pro penetratione, & dissolutione ciborum, elaborant potentissimas vires in ratione composita ponderum, superficierum, & motuum corporum permixtorum inter se; quamobrem tali ratione agentia, & reagentia vomitoria primo stimulant membranam villosam, quæ cum membrana nerveæ arte adhaereat; statim nervea membrana consensu facto stimulat. Cum vero stimulus vomitorii fiat a continuo contactu eiusdem supra membranam villosam; ideo & nervea membrana continuos stimulos excipiens, & sustinens multo majores exercet contractiones, quam distractiones: hic animadvertendum est nerveam membranam emittere fibrillas nerveas quaquaversus per spatia proximæ membranæ musculosæ pro necessario motu ejusdem; quamobrem cum muscularis membrana duplici fibrarum ordine donata sit, quarum alter circularis est a parte superiori ad inferiorem descendens, altera vero oblique sive spiritaliter varias directiones motus describens; ideo ambo isti fibrarum ordines primatio statuent convulsivas ventriculi anomalias.

60. Et primo cum membrana nervea continuos stimulos sustinens a villosa comunicatos coacta sit multo majores pati contractionis gradus quam moveri motibus distractionis; ideo & membrana subsequens muscularis omnimodam relationem habens cum nervea crispationem, & contractionem ferre debet; hinc statim circularium fibrarum ordo membranæ muscularis statum contractionis acquires parat sectionem minorem ventriculo; cum autem iste transitus ventriculi a sectione majori ad minorem fieri non possit sine necessaria fundi elevatione versus sinistram ventriculi orificium; ergo contenta omnia in ventriculo versus gulam primò elevari coacta erunt. Etenim cum fibræ circulares versus pylorum multo sint minoris diametri, quam sint fibræ circulares fundi ventriculi, idcirco cum circulares sectiones ex geometricis decrescant semper in ratione quadrata sutorum diametrorum, profecto cum sectio pylori, seu dexteri orificii sub minori, aut minima diametro contenta stricta fuerit, ac clausa, adhuc sectio fundi ventriculi sub multo majori diametro remanebit satis aperta, ac dilatata, quare dextero ventriculi orificium arctissime contractum, & clausum impedit, ne contenta in ventriculo ob fundum elevatum, & proportionaliter contractum per intestina transmittantur, quin immo materiæ contentæ versus fundum, & sinistram ventriculi orificium expulsa, & hisce in locis suas irritationes ultro exercentes tandem aliquando fundum ventriculi fortiter, & convulsive contrahant, & adacta fundi angustia cogunt materias contentas violenter impelli sursum parto vomitu. Ulterius tanto operi constrictionis pylori, & fundi ventriculi conspirat proportionalis contractio fibrarum pariter obliquarum, seu spiritalium, a quarum viribus fortissime constrictionem circularium sustineri, & conservari necesse erit. Cum itaque totus ventriculi fundus ab assidua irritatione contractus, & crispatus convulsive sursum elevetur, & pylorus, seu dextero orificium fortissime contractum, & omnino clausum reddatur; ergo impedito motu materiæ per intestina, opus erit contentas materias, & fortiter compressas a capacitatem ventriculi jam decresciente in ratione quadrata diametrorum fibrarum circularium per dextero ventriculi orificium sursum violenter esse expellendas.

61. Verum sentio in hac re arguentes, si a stimulo vomitorii irritantur continuo fibræ ventriculi, cujus irritationis opere stringitur, & contrahitur pylorus; ergo ab eadem causa irritante stringendum quoque erit orificium sinistram ipsi gulæ continuum: quapropter materiæ contentæ neque sursum per vomitum, neque deorsum per intestina erunt expellendæ. Optima quidem dubitatio; & sane si ea proportionem fibræ sinistri orificii plurimis nervis stipatæ redderentur contractæ, ac reddantur strictæ & clausæ fibræ dexteri orificii, seu pylori, proculdubio materiæ contentæ lethali vitæ periculo neque sursum per vomitum, neque deorsum per intestina moveri potuis-

sent: sed violenter in ventriculo detentæ gravissima ventriculi tormina, convulsiones, aliquando inflammationes cum lypiria febris producerent. Verum debemus animadvertere sinistram ventriculi orificium cum gula continuum multo altius esse dextero, sive pyloro, quare contentæ materiæ pondere suo occupant primo fundum ventriculi, deinde facilius, & promptius pylorum, non solum quia hic est sinistram humilior, verum etiam quia motus peristalticus fibrarum ventriculi a gula ad pylorum successive dirigitur; cum itaque a pondere materiæ potissimum pylorus, & pars fundi versus pylorum teneantur, ideo facta in hisce locis majori densitate, pondere, & asperiori graviorque contactu corporum ingestorum, multo magis contentæ materiæ stimulant pylorum & partem fundi pylorum versus, quam reliquas partes a pyloro remotiores; hinc in dextero orificio, & partibus huic proximis major contractio, majorque convulsio erunt secuturæ; effectus enim sunt causis suis adæquatis proportionales; quare effectus contractionis, & convulsionis in partibus pylori majores, & validiores ac continui esse debent, in quibus causæ irritantes, ac stimulant fuerint pondere, densitate, & asperiori contactu majores, validiores, & continuæ; quamobrem in partibus pylori validiori excitato motu convulsionis molestæ istæ materias sursum, seu gulam versus erunt impellendæ, versus quam sola major porta aperta remanet, seu minor resistentia concessa est parto vomitu, ut etiam antecedenti numero indicavimus.

62. Talis elevationis necessitas gulam versus materiæ molestæ ventriculo ultro consequitur a motu pressionis sursum totius abdominis opere nervorum paris vagi, qui cum membrana nervea communionem habent; isti enim effusi per abdomen totum convulsiva contractione acquisita sursum elewant viscera abdominis, intestina, musculos &c. quæ omnia simul impetu facto in ventriculum contentas materias sursum per gulam validissime ulterius urgent ad majorem vomitus generationem.

63. Præter hæc Mechanicæ leges supra modum favent tam necessariæ elevationi materiæ gulam versus, & per gulam ipsam. Cum enim pultacea materiæ sit quid compositum ex corporibus solidis, & fluidis, elasticis, & non elasticis, & compressio massæ chylaceæ in minus volumen per pressionem factam ab elevatione, & constrictione fundi ventriculi, & dexteri orificii: pariterque cum elasticitates corporum elasticorum sint viribus comprimentibus quam proxime proportionales; ergo cum in elevato fundo ventriculi, & in spatio præcipue dexteri orificii fiat, cæteris paribus, major pressio, & coarctatio chylaceæ materiæ, necessario elementa elastica sulphurum aeris, & statum componentia hanc pultaceam substantiam majorem, cæteris paribus, elatorem acquirere debent pylorum versus, & in parte fundi ventriculi pyloro proxima. Quamobrem cum elastica particulæ pervenerint ad ultimum terminum suæ compressionis in hisce partibus pylori, & pyloro proximis, cogentur talem violentum dilatationis nisum sibi comparare, passis compressionibus proportionalem: cum vero nullum majus spatium occupandum remaneat, nisi versus sinistram orificium, seu gulam versus, versus quam majus spatium apertum est, minorque occurrit resistentia; ergo major dilatatio, & potentior rarefactio ejusdem massæ chylaceæ vi caloris interni, & externi acquisita faciendæ jure erit gulam versus; principio autem gulæ occupato ultro augetur necessitas expediti motus materiæ ascendendæ, aut ascendens per œsophagum. Etenim œsophagus est canalis membranofus multo angustior ventriculo: quare ex mechanicis cum velocitates corporum fluentium sint in ratione recta proca sectionum canalium; ergo facta pressione fluidi chylacei a compressionem communicata ventriculo, motus materiæ chylaceæ in latiore spatio ventriculi ad motum ejusdem materiæ chylaceæ jam occupantis minorem gulæ capacitatem, ac sectionem, erit reciproce, aut quasi reciproce, ut major motus per minorem capacitatem gulæ, ad minorem motum per latius spatium ventriculi; propterea manifestum erit quanto majori motu, & quanta majori velocitate chylacea materiæ, quantumvis leviter mota in ventriculo; coacta sit majori velocitate moveri per œsophagum, quotiescunque ob passam pressionem in ventriculo, & versus sinistram orificium impulsa, gulæ principium ingressa fuerit: motus itaque chylaceæ materiæ per œsophagum, seu vomitus expeditus, & promptus necessario erit futurus.

64. Modo arduum phænomenon explicandum remanet, quod medicam praxim agens aliquando vidi mirabundus. Aderat monialis, quæ pisces talis speciei nullatenus in ventriculo detinere poterat, coacta erat post aliquod tempus cum vomitu solos pisces sine reliquis ut plurimum cibariis emittere: cognovi Medicum qui carnem suillam quantumvis plurimis cibis permixtam, attamen hanc tantummodo evomebat: quamvis argumentum hoc salebrosus esse videatur, nihilominus probabilia cogitanti occurrit mihi considerare naturam præstantissimam sui ipsius conservatricem separare a glandulis nerveæ membranæ ventriculi succos variæ indolis compositos ex particulis aqueis, sulphureis, & salinis diversæ molis, ponderis, & figuræ, quæ salium particulæ se habeant ut cunei multiplicium spuperficie-rum & angulorum, ut juxta multiplices ciborum dissolvendorum differentias singularia, & specifica veluti menstrua penetrantia, & dissolventia cibos haberentur: sicut enim in Chymicis, ut n. 51. innuimus, singula corpora penetrantur, & dissolvuntur a similibus, & homogeneis, sicuti aqua fortis argentum, regia vero aurum, & acetum plumbum penetrant, ac solvunt; ita cum præcipua actio ventriculi sit penetratio, & dissolutio ciborum opere potissimum succorum, qui a glandulis nerveæ membranæ ventriculi continuo secernuntur, facile erit judicare naturam artis magistræ tam admirandum opus penetrationis, & dissolutionis ciborum obtinere posse beneficio, & opere specificæ differentie corporum agentium, & reagentium contra cibos in ventriculo contentos, ita ut similia, & homogenea a similibus, & homogeneis præcipue penetrantur, & scindantur; a dissimilibus vero, & heterogeneis aut imperfectam, aut ægram, aut nullam penetrationem, & dissolutionem acquirant: hinc juxta leges naturæ amantis proportionem corporum, figurarum, porositarum, & motuum eorundem inter se manifestum erit multiplicia corpora dissolventia, quæ promiscue separantur a glandulis ventriculi, quoad potentiam apta esse cibos penetrare, ac solvere, sed imperfecte, & languide; quo vero ad actum, seu ad usum specificum, & determinatum penetrationis, & dissolutionis eorum, certum erit similia & homogenea solum a similibus pariter, & homogeneis quoad figuras, poros, & motus facilius, citius, & perfectius penetrari posse, ac dissolvi, ut physica experimenta a legibus naturæ petita omnino declarant.

65. Dein-

65. Deinde considerandum est, quod ut specifica cibi differentia apte, & perfecte penetretur, & scindatur a specifica actione, & reactione particularum, sive cuneorum dissolventium, debet cibus iste aptus esse, ac dispositus ad intime se permiscendum cum reliquis ciborum particulis: a perfecta enim & intima miscella istius cum reliquis cogitur excipere quaquaversus percussiones particularum dissolventium, seu cuneorum, quorum auxilio penetratur & frangitur hæc specifica cibi differentia, potissimum ab illis corporibus, aut cuneis salinis dissolventibus ipsi cibo dissolvendo similibus, & proportionalibus. Hisce præmissis, si aliqua cibi species extiterit in ventriculo, quæ non sit apta ad perfectam, ac necessariam mixtionem sibi comparandam cum reliquis ciborum particulis, & ulterius in ventriculo aut minora sint, aut languida, aut nulla existant corpora dissolventia, homogenea, & proportionalia specificæ illi speciei cibi dissolvendi; tunc illa cibi species non perfecte permixta cum reliquis, neque opportune poterit penetrari, frangi, ac dissolvi. Quamobrem hæc cibi species imperfecte, aut nullo modo mixta cum reliquis, neque dissoluta, & facta, cæteris gravior, ac ponderosior remanere debet, consequenter ventriculo molestior; gravior autem & ponderosior reddita cum fuerit, non poterit facile ac prompte moveri versus pylorum, versus quem tota materia chylosa naturali motu jam dissoluta, fluidior, & levior reddita paulatim movetur, & dirigitur, sed tali motui versus pylorum resistentiam feret gravitate ac pondere. Cum vero talis cibi species pondere, superficie, & præternaturali tarditate affecta, eveniat quoque supra modum molesta nerveis, & muscularibus fibris ventriculi, ideo facto eo potissimum in loco, cui materies illa adhæret, ulterius stimulo, & excitata quadam affectione convulsiva ea lege contractionis promovebitur vomitus solius materiæ molestæ, & gravis, quam antea exposuimus evenire opere medicamentorum irritantium. Tali ulterius vomitus solius materiæ molestæ ac gravis conspirat ipsamet actio, & passio animæ (quantum ex se est, & organa ipsi apte pareant); hæc enim intime compenetrata sensoris suis cogitur moleste sentire, & graviter pati molestas, & graves suorum sensuum, & organorum affectiones: quare anima primario suas actiones exercens in cerebro & cerebello hic moleste, & graviter sollicitata cogitur violenter sollicitare, & proportionaliter impellere potissimum eas specificas cerebri, & cerebelli, quæ relationem, & consensum habent cum illis fibris ventriculi moleste, & graviter affectis a corpore illo molesto, & heterogeneo; quamobrem ultro promoventur, & augentur motus illi contractionis fibrarum nervearum, & muscularium ventriculi, qui sint ad specificam illam materiam naturæ gravem, ac molestam, volente anima, per vomitum expellendam proportionales. Quod si una cum corpore illo extraneo aliquid etiam materiæ pultaceæ per vomitum emittatur; profecto vel erit hoc quantitate paucum, vel extraneo corpori arte adhærens, vel quid ægre dissolutum, & reliquis particulis gravius aptum evertere ut antea æquilibrium mixtionis materiæ pultaceæ, ideoque exposita methodo erit hoc quoque per vomitum expellendum. Hæc simili ratione eveniunt, qua experimur a sæbi particula dolio immissa everso æquilibrio mixtionis universas vini particulas excitari in violentissimos motus usque dum tota sæbi extranei expulsio secuta fuerit.

66. Quamvis vomitoria sæpe ac sæpius necessaria, & utilia esse videantur; nihilominus aliquando aut caute, aut nunquam erunt exercenda, si itaque ægrotantes non fuerint ad vomendum prompti, neque vomitionibus assueti, tunc vomitus vel caute tentandus erit, vel omittendus; verum si fuerit hæmoptisis, aut scapularum, aut thoracis naturalis angustia, tunc a vomitoriis abstinere oportet. In pariter si ætas tenera, si constitutio ventriculi languida, si inedia præcedens fuerint, & vires fuerint enervatæ, & fractæ, tunc penitus debemus a vomitoriis recedere, denique in Pletoricis caute vomitus promovendus erit, nisi prius opportuna sanguinis missio fuerit instituta, facile enim ab impetu evomendi vasa sanguine turgida miserrime rumpentur.

DISSERTATIO VII.

De Medicamentis Diureticis.

67. Nemo est qui non intelligat medicamenta diuretica illa esse, quæ serum a sanguineo fluido continuo promovent secernendum specifico motu fibrarum renalium, quod inde in ureteres exceptum per vesicam, & per uretram expellitur, quod fluidum expulsum *Urinofum* a Medicis appellatur. Cum itaque renes sint primaria organa talis separationis fluidi serosi, placebit considerare ex datis Anatomicis substantiam renum aliam esse exteriorem, seu corticalem, interiorem alteram. Exterior juxta Malpighium glandulosa creditur, juxta Ruischium vasculosa habita est. Interior vero tubulosa, nempe ex plurimorum tubulorum aggerie composita est: hæc definit aliquando in 10. aliquando in 12. papillas, quæ plurimis foraminulis perviæ hiant in pelvim: hæc autem pelvis est cavitas membranosa, quæ inde extra renes collecta, & unita ureteres construit, qui tandem obliquo ductu in vesica terminantur; ab arteriis itaque emulgentibus delatus sanguis ad externam vel glandulosam, vel vasculosam substantiam opere determinatarum oscillationum organis renalibus proportionalium continua fit separatio fluidi serosi a massa sanguinis, quod a tubulis internæ membranæ exceptum & in papillis ultro depuratum in pelvi excipitur, & paulatim per ureteres in vesicam transmittitur. In statu naturalis compositionis renum facile est judicare glandulosa, vel vasculosa illa organa renum esse similia & æqualia inter se, ut apto ordine, & æquabili proportionem æquales quantitates humorum determinatis temporibus secernerentur. Cum enim serum hoc a sanguine separandum leniter, tarde, & isochronis legibus moveatur in glandulosa, aut vasculosa renum substantia, pariterque capacitates glandularum similes, & æquales in naturali renum constitutione haberi debeant; ideo similes, & æquales quoque contentæ quantitates humorum exercendæ jure erunt ex mechanicis in ratione luminum, seu sectionum corporum glandularum, vel vascularium: hinc fluida serosa æquabiliter suscepta ab interna tubulorum aggerie, æquabili quoque ordine, motu, & tempore transmittenda erunt in papillas, & ab his in pelvim, a pelvi in ureteres, & ab ureteribus in vesicam, ut determinata quantitate, statutoque tempore per uretram expellantur.

68. Hæc in statu naturali: sæpiissime autem experimur primo a Sydenham Opera Medica.

medicamentis aqueis, aut quorum basis est aquea, ut sunt aqua communis, serum lactis, & aquæ minerales &c. promoveri urinarum quantitates. Secundo a laxantibus, & emollientibus medicamentis easdem sequi urinarum copias, ut sunt oleum amigdalorum dulcium, terebinthina, & succi herbarum emollientium ut malvarum, betarum, parietariæ, violarum, fragariæ, alteæ, &c. tertio a salinis medicamentis variæ indolis, quorum vis est aperire, ac solvere texturas fibrosas humorum, aut sollicitare, aut stimulare organa renalia, ut sunt nigella, allium, pastinaca sylvestris, raphanus, ita fabarum, tartari, ammoniaci &c. pariter plurimi sunt succi essentialies herbarum, ut petrosellini, feniculi, asparagi, dauci, dictami, rapæ, persicariæ, acetosæ, anagallidis, irionis, praveræ bravæ, &c. quarum decoctiones, nec non istarum pulveres urinas copiose educunt, quibus addere poterimus millipedes, mel, & plurima alia hisce similia, quorum vis salina primario est, sed aliquo principio sulphureo permixta.

69. Medicamenta ergo diuretica quæ aquea sunt, aut basim habent aqueam, agere potissimum videntur quantitate, mole, pondere, figura: primo enim agunt quantitate, mole, ac pondere, quando etenim quantitates aquarum ingrediuntur vasa animalium, tunc massæ humorum eleantur ad majorem altitudinem quaquaversus supra, infra, & ad latera, & successive per longitudinem canalis repletis canalibus; quamobrem juxta Borellum Prop. 71. secundi Tomi *de motu animalium*, considerando vasa ut cilindros, haberi possunt vasa in statu naturalis positionis, & eadem vasa in statu majoris extensionis ob aquas contentas, ut cilindri similes: sed per Proposit. 12. 12. Eucl. cilindri similes sunt in ratione triplicata, seu cubica diametrorum, quæ sunt in basibus; ergo diameter basis cylindri in statu naturalis positionis fuerit ut 2. & post aquas assumptas extensio diametri basis facta fuerit ut 3. tunc primus cylindrus in statu naturalis positionis & extensionis ad secundum cylindrum in statu majoris dilatationis factæ ab aquis contentis erit in ratione 8. ad 27. Cum tanto itaque augmento vasorum ingreditur massa sanguinis externam renum substantiam, renales autem cellulæ vel glandulosæ, vel vasculosæ dilatandæ, & ipsæ erunt in ratione majoris quantitatis aquarum effusarum in cellulas ipsas; cum autem istæ ad ultimum terminum dilationis devenerint naturali suo nisu elastice contrahuntur, & contenta fluida per internam tubulorum aggeriem in papillas, & ab his in ureteres valide impellunt: hinc juxta frequentes aquarum successivas transmissiones ad renes urinarum copias per vesicam, & successive per uretram ejiciendæ erunt, tanto operi etiam conspirat sphaerica, aut quasi sphaerica aquarum particularum figura, quæ cum aptissima sit facillime moveri quaquaversus, & tangentibus corporibus motum tribuere, ideo aquæ particularæ movendæ erunt, & exterius promovendæ.

70. Hic nolo præterire gravissime peccare illos, qui audacter aquas minerales enormi copia bibere amant, & se has enormiter bibisse gloriantur; primo enim a pondere aquarum dilatatur nimis ventriculus, & laxatur, ut nervea membrana ejusdem enervata, & iners reddita lenissime oscillare coacta sit, & succos, seu cuneos dissolventes tarde, ac parce secernat; propterea & ob solidorum ventriculi inertiam, & ob succorum dissolventium inopiam, & debilitatem iners imposterum, & languida ciborum dissolutio consequitur: deinde excedens aquarum copia ad renes violenter effusa mole, pondere, ac numero nimis aperit cellulas illas, quibus nimis apertis, nimis quoque laxetur naturalis textura eorum, & inæpta imposterum redditur ad specificos fibrarum motus facile, prompte, & valide exequendos, ut in statu naturali exigit æquabilis, & isochrona distractio, & contractio renum eorundem; quamobrem nimis laxatis sinibus, & naturalibus fibrarum angulis paulatim, colliguntur in renibus corpora extranea mole, superficie, & numero dissimilia, & heterogenea, quæ asperis superficiebus stimulando, ardores urinarum, dysurias, & strangurias, ut bis & ter vidi, aliquando etiam renum laves, calculos, aut ulcera parturiunt. Nolint ergo gaudere aquarum potatores se ad 180. aut ad 200. & amplius uncias ascendisse, cum tantæ aquarum copias facillime non levia ferre possint pericula a nullis imposterum vincenda remediis; profecto 80. aut 90. ad summum 100. uncias Italici sufficere videntur, ut aquæ sine periculo, sed utilitate bibantur: quod autem aquæ minerales, & his similes tam facile, tam prompte transire, & expelli soleant per urinas, nolite admirari, cum ostensum sit sanguinis circulationem singula hora vicibus 17. proxime esse efficiendam; quibus motibus si addamus quantitatem aquarum, pondus, & salinas particulas, quibus minerales aquæ donatæ sunt, & a quibus viæ renum magis magisque aperiuntur, ultro constabit, quod facta ex hisce omnibus ratione composita virium, & momentorum, constabit, inquam, quam necessario aquæ minerales, & hisce similes prompte a sanguinea massa separandæ sint, & citissime excernendæ.

71. Sicut autem excedens laxitas organorum renalium plena est periculis, ita apta & conveniens laxitas eorundem ad urinas promovendas opportune conspirat; huic operi favent succi, & potiones laxantes ut violarum, parietariæ, malvarum, alteæ, &c. talis ordinis sunt terebinthinata, oleum amigdal. dulcium, oleum lini, & emulsionem laxantes, similia balneis non relictis; fibræ enim organorum renalium aliquando rigidiores sunt, ut in senibus, in hysteris, in convulsivis, & hypocondriacis affectionibus facile evenit, firmiores aliquando redduntur magisque consistentes aut præternaturali fibrarum suarum constitutione, aut opere fluidorum viscidorum, & tenaciorum organis adhærentium; fibræ enim renales sæpe, ac sæpius vestiuntur, & multantur materia quadam densa, viscida, ac filamentosa, quæ adhærendo, & circumscribendo fibras, has reddunt mole, & soliditate majores, cum autem moles, & soliditates corporum, cæteris paribus, sint ut pondera, profecto fibræ istæ mole, & soliditate adauctæ, graviores pariter reddendæ erunt, graviores autem redditæ resistunt motui sanguinis advenientis, impulsui succi nervei communicato renibus renalium nervorum auxilio, quare tunc specifici motus renalium fibrarum minores, magisque lenti, ac tardi facienda erunt pro lenta pariter ac tarda, consequenter minori fluidi serosi separatione; tali autem in statu opportune succurrunt mox exposita laxantia, & oleosa medicamenta, quæ leni, ac molli humectatione, ac penetratione emolliant rigidas illas fibras, & paulatim laxant mucosam illam superficiem fibris circumscriptam, qua emollita paulatim decidunt, & collabescunt viscida illa involucra fibris obvoluta, sic fibræ aut flexiles redduntur, aut spoliaturæ, ac

denudata mucos leviores, & mobiliiores fiunt, & ad naturales suas oscillationes exequendas expedita redduntur, quibus facile, ac prompte oscillantibus major, & uberius feri copia fecernitur, & promovetur ad majorem urinarum ubertatem; cum itaque hæc necessariae urinarum separationi sufficiant, hisce contentus esse debet Medicus, neque validiora medicamenta tentare debebit; cæterum si adhuc renes non obediunt, ad majora progredi licet; aperient idcirco contumaces solidorum areas, & mucos, aut extraneas materias fibris, & glandulis renalibus adherentes, dissolvent balnea tepida, & exposita illa diuretica; quæ salinis spiculis donata sunt, quatenus angulis suis penetrant, & aperiunt porositates renales, & viscidas quascunque saburra divellunt, ac rumpunt; diuretica itaque altioris ordinis exercenda erunt desumpta ab animalibus, vegetabilibus, & mineralibus. Inter remedia ab animalibus petita præstant illa quæ parantur a cancri, a millepedibus, a formicis, a stercore palumbi, & cantharidibus &c. Inter vegetabilia eminet saxifragia, semina irionis, radix praveræbravæ, & salia quælibet a vegetabilibus collecta cum laude poterunt exerceri &c. Inter mineralia adest mercurius, nonnulla ab antimonio desumpta, & ea quæ parantur ex tartaro, nitro, calce, & sale armoniaco urgente necessitate postulantur. In hac pariter classe numerari quoque poterunt spiritus salis dulcis, sal urinæ, & nonnullæ aquæ minerales fortes, ac validis salibus potentes; ut Sancti Mauriti ex valle Solis &c. hujusmodi enim remedia non solum motu, & elatere vim faciunt in solida renum, & magis oscillantia reddunt; verum etiam salinis suis superficiebus fibrosum sanguinis, & feri concreciscibilis crassamentum scindunt, ac frangunt, magisque renum poros appetiunt, hinc uberius feri contenti copia effluens valide, & potenter renum actiones, & reactiones exercet, ut serum per urinas copiosius educatur: & sane cum ab hisce omnibus agentibus, & reagentibus motu, & elatere augeatur feri velocitas, & a salina, & angulari eorum superficie scindantur filamenta nimis fixa feri concreciscibilis, & magis extensi, fiunt meatus solidorum renalium necessario fluida serosa secernenda erunt in ratione composita ex numero corporum agentium, ex velocitate, & elatere ipsorum, & ex ratione orificiorum canalium, seu glandularum, quæ ratio composita virium cum potens sit ad ferocitates promovendas opere renum, & vesicæ; idcirco copiosissime effusiones urinarum erunt secuturæ.

72. Quamvis autem urgente necessitate valida diuretica necessaria esse videantur, nihilominus prudentissime, & semper vocato aliorum consilio adhibenda sunt, scrupulose enim animadvertere debemus a validioribus diureticis sequi quidem posse uberrimas urinarum copias, sed peiori periculo, non beneficio; sepe enim ac sepius tantæ humorum viscidiorum saburra deferri possunt ad renes, ut facta primum copiosissima secretionem tenuioris feri, crassior inde, & concreciscibilior feri portio una cum reliquis particulis viscidis, ac filamentosis alterius generis adauctis enormiter molibus impediatur renum acinos, & adeo obstruat tubulos, & papillas urinarias, ut in renibus gravissimæ firmiter urinarum suppressiones totali vitæ periculo. Quod si hæc non eveniant saltem sanguinis effusiones, & sanguineæ urinæ cum grumis, aliquando etiam hemorroidum, aut narium hemoragiæ facile poterunt effluere; quamobrem in omnibus medicamentis potissimum diureticis habenda semper erit æqua, & attenta ratio, quantitatis, temporis, & ætatis, ita ut in omnibus sit prudens usus, ne amica remedia in hostilia venena permutentur.

73. Hic sedulo notandum est, nos gravissime incidere in renum morbos, quotiescunque fluida sanguinea, & lymphatica præpollenti austeritate peccaverint; cum enim hæc vitia fuerint, tunc indoles fluidorum aut aluminosa erit, aut vitriolica. In indole aluminosa peccat numerus salium sub figuris octaedricis, aut quasi octaedricis; in indole vitriolica culpantur salinæ illæ particulae, quarum figura est parallelepipedum romboidea, aut ad has figuras inclinant. Hæc autem corpora cum naturali austeritate polleant, organa primum, quibus applicantur, potentissime ligant, quotiescunque præpollentia hæc corpora extiterint, & veluti materia tartarea circumscribunt; facile est ergo judicare horum salium figuras occupare, & implere sinus, & spatia fibrarum, quibus repletis, redduntur fibræ nimia firmitate, ac soliditate constantes, ita ut inflecti, incurvari, & oscillare difficulter possint. In tali autem difficultate oscillationum fibrarum firmatur corporum fluidorum unio, & nexus inter se; Verum hæc ultro augentur, & crescunt vitio fluidorum ipsorum; fluida enim, & ipsa repleta salibus talis naturæ, ac indolis graviora fiunt, ac lentiora; in tali autem lentescencia, ac tarditate facta majori nexu augentur moles, & pondera partis arenulis, calculis, & lapidibus tam in substantia renum, quam in cavitate vesicæ feri urinosis impedimento. Cum hæc vitia fuerint tam in fluidis, quam in solidis, tunc a radice morbi aquæ potiones, oleosa pharmaca, & blanda emollientia curationem instituunt, aqua enim diluendo, & laxando, & oleosa molli sua superficie emolliendo, & infirmando conflantem salium texturam, horumque angulos investiendo stimulos salinos aut frangunt, aut saltem imminuunt, sic arcus salium uniones dissolvuntur, & in minores minoresque particulas dividuntur, & laxata tali methodo fluidorum, & solidorum compage fibrarum renalium oscillationes, & secretiones feri faciliores, & promptiores consequuntur majori urinarum fluentium facilitate; tanto beneficio conspirant opportuna æquitatio, conveniens motus, balnea tepida aquarum, & balneum olei communis, & vina mollia, tenuia, & facilis transitus. Cæterum si morbus vel in renibus, vel in vesica calculis, arenulis, aut lapidibus statutus fuerit impossibilis, ut plurimum solet esse curationis, quamvis curari soleat ille, quia a lapide vesicæ partus est facta sectione vesicæ ad lapidis contenti extractionem; verum tractu temporis similia pericula redire consuecunt.

74. Denique pro hoc argumento non omittendum est non solum a vi morbi, ut in febribus ardentibus, in marasmo, & in emaciatione, verum etiam a violentioribus diureticis sequi aliquando urinas, quæ a Medicis oleosæ dicuntur. Istæ autem raro ostendunt in sua superficie oleosas quasdam guttulas ad instar olei super aquam effusi, ut nonnulli perperam arbitrati sunt, sed ostendunt paulo post excretionem quandam veluti superficiem telis aranearum similem, quæ si diligenter tangatur, edocti erunt Medici a sensu tactus hanc urinæ superficiem esse mollem, & oleosam, oleosæ substantiæ ad instar. Omnibus enim manifestum est urinam esse quid compositum ex oleosis, & filamentosis chyli, & sanguinis particulis sero sanguinis, & lymphæ dissolutis, & inter se commixtis, in quibus ta-

men excedens salium copia præpolleret; quamobrem si facta fuerit sanguinis dissolutio, aut si violenta diureticorum potentia deferat ad renes majora elementa chyli; & sanguinis nutritia, balsamica, & oleosa, quam naturalis feri quantitas postulat, & pori renales magis dilatati fuerint, necessario a renibus separari debebunt corpora nutrita sanguinis, & chyli plurimis salinis retentis, consequenter oleosæ superficies apparentes, & conspicuæ fient in urinis gravissimo ægotantium periculo, & cum fatali ipsorum emaciatione.

DISSERTATIO VIII.

De Medicamentis Diaphoreticis.

75. CUM summa, & continua sint beneficia, quæ ab opere transpirationis per universam cutis superficiem eveniunt machinæ animalis; ideo *Diaphoretica Medicamenta*, quæ aut transpirationem promonent, aut augent, judicanda erunt tanquam præstantiora naturæ subsidia: Transpirationis ergo operi tria conspirant organa: *Cuticula*, quæ firmiter adhæret cuti interveniente corpore reticulari Malpighii infinitis foraminulis aperta pro exitu sudoris, & materiæ transpirabilis. Secundo *Corpus reticulare*, quod pariter est tenuissima membranula cuticulæ proxime adhærens innumeris quoque foraminibus reticuli ad instar perforata, per quæ foraminula exeunt papillæ cutaneæ, & ductus excretorii cutis, qui habentur, ut universalia cutis emunctoria. Tertio præstantius organum transpirationis habenda est *Cutis*, quæ est valida membrana totum corpus invellens, cujus structura componitur ex fibris tendineis mirum in modum implexis, ex copiosissimis venis, arteriis, & nervis, a quibus papillæ pyramidales per rete Malpighii extensæ prominent; infinitæ ulterius adfunt glandulæ miliares pro secretionem materiæ transpirandæ, & per sudores promovendæ, ita ut cutis universale naturæ emunctorium jure, ac merito æstimandum sit.

76. Modo diaphoretica medicamenta duplici in classe partiri possunt, alia enim interne per os assumuntur, alia vero externe exercantur. Illa quæ interne per os assumuntur, nonnulla solam habent basim aqueam, nonnulla sulphuream, ut plurimum vero salino-sulphuream. Itaque diaphoretica habentia basim aqueam statuuntur ab aquis calidis, aquæ enim calidæ epotæ sudorem promonent, tales sunt decocta etiam millii, & lentis &c. Diaphoretica quæ basim habent sulphuream, colliguntur a spiritibus, seu aquis ædentibus &c. denique quæ obtinent basim salino sulphuream ostenduntur in regno animalium a cornu cervi, a viperis, a bufonibus, a lapide histricis, aut infuso, aut decocto in aquis cordialibus &c. in regno vegetabili ab angelica, scordeo, centaurea, carduo sancto, saponaria, contrajerva, & ab herbis illis, ac vegetabilibus, quorum sapor amarus est; in regno minerali ab antimonio, a mercurio, a jovialibus, a bezoarticis, & sulphuratis &c. Externa autem diaphoretica colliguntur ab aere calido, a motu corporis, a balneis, & fictio-nibus, a cucurbitulis &c.

77. Itaque, de his omnibus necessaria loquamur, primo occurrunt diaphoretica aqueam basim habentia, ut aqua calida, decoctum millii, & lentis &c. Aquam calidam reddi opere particularum ignearum fatentur omnes; nisi enim igneæ particulae aqueis permixtæ violentissime agitent aqueas, profecto aqueæ particulae nunquam possent incallescere. In tali autem incallescencia aqua ista elementa adeo attenuantur, ut vaporum naturam acquirant summa levitate, ac raritate acquisitis; cum autem igneis particulis associata fuerint aquea elementa celerrime moveri debent in ratione composita ex numero particularum ignearum, & vapotosarum, & motu utrarumque. Ulterius cum aqua igneis particulis in tali ratione alligata e ventriculo penetraverit lactea vasa, & lympham, & sanguinem postmodum occupaverint, hæc rursus alligata particulis æreis, & sulphureis lymphæ, & sanguinis, alteram componit rationem priori multo validiorem, compositam nimirum ex numero particularum ignearum, sulphurearum, ærearum, & aquearum ex motu singularum, & elatere ignearum, ærearum, & sulphurearum, quæ ratio composita cum multo validioris momenti esse debeat, fateti poterimus quam necessario communicata universis fluidis maxima velocitate transpirationes, & sudores consequantur: Et sane a tanto momento corporum motu, & elatere prædictorum fluida universa velociori motu ducta, & calore ulterius acquisito attenuari, & rareferi coacta sunt; attenuata autem, & rarefacta minimas acquirunt moles, & spatia majora occupant in vasis ipsis, majoribus quoque velocitatibus acquisitis; hæc itaque attrita, & rarefacta tandem aliquando deferuntur ad externam cutis superficiem, seu ad glandulas cutaneas, & sic sub transpirationis, vel sudoris indole exterius transmittuntur.

78. Majori quidem momento motus sanguinem, lympham, & succum nerveum agitant spiritus ardentis cujuscunque generis, quorum basis sulphurea; sulphur enim ad statum volatilitatis evectum summo poller motu, & elatere. Animadvertendum autem est sulphureas particulas in velocissima motus, & elateris actione præpollentes supramodum agitatae, & attritas quoad gravitatem, & molem decre-scere; consequenter semper magis magisque leviores fieri, & cæteris paribus velociore, in tali statu potentissimum conatum exercere debent contra objecta corpora non solum in ratione concepti motus elateris, verum etiam ratione superficiæ sulphureæ; etenim superficies corporum multo minus decrescunt ex geometricis, quam ipsorum moles, & pondera: sed resistentiæ, quæ objectis corporibus opponuntur, fiunt in ratione superficialium corporum objectorum; ergo cum sulphureæ particulae plus habeant superficiæ, quam molis, & ponderis, necessario cæteris paribus urgere, & impellere debent opere suarum majorum superficialium majores quoque quantitates corporum: Quamobrem sulphureæ particulae agentes, & reagentes summo motu, elatere, & majori magnitudine suarum superficialium contra objecta corpora validiorem vim exercebunt contra objectas, & numerosiores humorum particulas; sicque cæteris paribus particulae humorum numero majores a sulphureis superficiebus impulsæ, vel per sudorem, vel per transpirationem effugient, cum juxta ordinem, ac legem circulationis ad cutaneas glandulas delatæ fuerint: Et quidem hæc minoribus temporum differentiis faciendæ erunt, eo quia ex mechanicis velocitates corporum sunt in ratione inversa, seu reciproca temporum; ergo quanto ardentissima sulphura velociora fiunt, eo suas vires, suosque conatus exercere debent minoribus semper temporum differentiis.

79. Ab his progrediendum erit ad illa diaphoretica medicamenta, quæ basim habent salino-sulphuream compositam, videlicet ex sale, & sulphure, qualia superius enunciamus. Sicut autem quoad motum, & elasticitatem elementa illa potissimum sulphurea antea exposita apta sunt celerissime, & brevi tempore moveri, & cæteris paribus beneficio suarum majorum superficierum numerosiora objecta corpora impellere: ita elementa salino-sulphurea potentiora sunt sulphureis quoad corporum penetrationem, minus vero quoad motum. Minori quidem momento motus, & elateris valent particulæ salino-sulphureæ, quam possint sulphureæ; quo vero ad penetranda, & divellenda in minimas particulas objecta corpora multo salino-sulphureæ sulphureis potentiores sunt. Ut tanti phænomenon rationem exponamus, placeat animadvertere particulas potissimum sulphureas summo, ut diximus, pollere motu, & elatere, hinc brevissimo tempore multum spatii decurritur a sulphure; cum vero sulphur fuerit sali associatum, tunc cum corpora salina graviora sit sulphureis, supposita molium æqualitate; ergo corpora salino-sulphurea, utpote graviora sulphureis, futura quidem erunt sulphureis multo tardiora, magisque inertia motu, & elatere, cum sulphurum elater, & motus a pondere salium non parum frænentur. Verum hæc quanto tardiora motu, & elatere inertia sunt, eo ad penetrandum, & divellendum eveniunt aptissima. Etenim ex natura sulphuris specificè levioris sale habemus impulsu, seu motum sursum per rectas lineas, aut quasi rectas; ex lege autem salis specificè gravioris sulphure habemus impulsu, nism, & motum deorsum per rectas pariter lineas, aut quasi rectas; ergo in particula salino-sulphurea cum adsit tendentia deorsum opere sulphuris specificè levioris sale, & simul tendentia deorsum opere salis specificè gravioris sulphure, profecto cum naturæ potentia destruantur, sed utraque quantum jure suo possunt, agant, & reagant, componetur momentum ex utroque momento compositum: sed tale momentum motus compositum ex motu corporis levioris sursum, & simul corporis gravioris deorsum ex mechanicis legibus describit motum medium inter rectum sursum, & rectum deorsum; hic autem motus medijs necessario describit lineam motus ex recta, & circulariter inclinata, quæ spiralis est, aut quasi spiralis, ergo particula salino-sulphurea jure suo cum moveri debeat, ac possit spirali motu, aut quasi spirali in fluidis machinæ animalis, spiralem, aut quasi spiralem lineam motus erit descriptura; Talis autem motus per lineam spiralem, aut quasi spiralem affabre indicatur exemplo lineæ motus, quam fumus ascendens describit: Cum enim fumus sit compositus ex particulis aereis, & igneis respectivè levibus & ex particulis terreis, aqueis, & salinis respectivè gravibus, cumque particulæ graves alicui impedimento sint particulis levioribus, necessario cum moveri debeant, mediam certe viam lineæ motus tenere debent inter motum rectum sursum, & motum rectum, aut quasi rectum deorsum: sed hæc media via lineæ motus facile componit motum rectum, aut quasi rectum, & simul circulariter inclinatum, qui ex Mechanicis spiralis est, aut quasi spiralis; ergo necessario fumus compositus ex particulis levibus, & gravibus spirali motu, aut quasi spirali sursum movendus erit, aliquando etiam spirali deorsum erit impellendus. Ab hoc experimento fumi, præter ea, quæ prima parte *Mechanices Morborum* n. 7. dicta sunt, arbitratus sum fluida universa machinæ animalis, utpote composita ex elementis, seu particulis gravitate, mole, motu, & elatere similibus, & dissimilibus spirali motu, aut quasi spirali multo probabiliter esse movenda.

80. Hujusmodi autem ratio motus, mirum! quantum conspiret ad faciliorem corporum, & fluidorum penetrationem; Utenim facillima habeatur penetratio, debet corpus penetrans anteire per rectam lineam, aut quasi rectam, & simul quasi rotando rumpere impedimenta corporis, & superficiem lineæ rectæ circumscripta: sed per motum spiralem corporum, qui ex geometricis compositus est ex recto, & circulari, corpus penetrans ante progreditur per rectam lineam, & simul rotando rumpit impedimenta lineæ rectæ circumscripta; ergo faciliior penetratio solidorum, & fluidorum a motu spirali, aut quasi spirali terebræ ad modum suas vires exercentis habenda erit. Ulterius cum fluida componantur ex particulis diversæ gravitatis, molis, motus, & elateris, ideo in perfectissima fluidorum compositione debent pariter perfectissime inter se permisceri. Ofsendit enim celeberrimus Borellus prop. 99. & Scholio secundi Tomi *de motu animalium*, aptissimam, perfectissimamque mixtionem nullo modo a natura obtineri posse, nisi per motus vertiginosos, seu spirales; ergo jure, ac merito judicare possumus corpora salino-sulphurea spirali motibus, aut quasi spirali rotata, ac necessario auxilio esse naturæ ad corporum, & fluidorum mixtionem, & ad eorundem penetrationem, & divisionem perfectissime exequendas.

81. Cum itaque tali lege motus terebræ ad modum utilissimæ moveantur particulæ salino-sulphureæ, profecto istæ ad diaphoresim supra cæteras validissime pertinebunt. Cum enim fluida quælibet potissimum sanguinea beneficio circulationis ad externam cutis superficiem delata fuerint, hinc statim occurrit resistentia superanda cutis densæ, & crassæ, hic tenacitas materiæ sebo similis a glandulis sebaceis parata, hic resistentia aliqualis cuticulæ, & potens externi aeris pressio; quamobrem cum motus particularum salino-sulphurearum terebræ ad modum euntium aptissimus sit ad penetranda & ad vincenda impedimenta, & dissolvendas texturas humorum crassas, lentas, ac viscidas; & in minores moles beneficio terebrationis reducendas; idcirco constare poterit quanta utilitas secutura sit a motu spirali fluidorum, & particularum salino-sulphurearum ipsorum ad superandas resistentias solidorum objectorum, ad attenuandas materias, dissolvendas, & in minimas moles reducendas, ut facilius, & promptius beneficio sudoris, & transpirationis per cutis superficiem, facillime educantur. Ob hanc causam multo probabiliter judicandum est, medicamenta diuretica sudores, & transpirationes promovere aliquando posse, quotiescunque in venriculo, aut in intestinis dissoluta unionem fecerint, cum æqualibus partibus sulphurum, & salium, quorum auxilio spiralem lineam motus, aut quasi spiralem, vel valide acquisiverint, aut adauxerint. Cum enim similia diuretica actiones suas exercent per spirales lineas motus valide, & potenter magis magisque penetrant, & dissolvent in minores, minoresque moles objectas materias, quoties istæ paulatim ex sulphurum consortio statum volatilitatis, aut quasi volatilitatis acquisiverint; propterea magis attenuatæ cum fuerint, cæteris leviores redditæ, opere circulationis ad cutim delatæ facile transpirare coactæ erunt.

82. Remanent auxilia transpirationis, & sudoris considerata ab externis auxiliis, ut ab aere calido, a motu corporis, a balneis, a frictionibus, a cucurbitulis, a suffumigiis &c. Hæc enim omnia adaugent motum, & elaterem particularum fluida componentium; ab hoc enim motu, & elatere adauctis attenuantur particulæ ipsæ, & ad transpirationem exequendam disponuntur. Hic animadvertendum est a frictionibus, & cucurbitulis agitatam cutis superficiem incallescere, & calefactam rarefieri. Ex Mechanicis enim erudimur in spatiis calefactis dilatari sectiones, & areas cutis; ubi autem sectiones glandularum, & arearum, & areæ cutis dilatata fuerint, hic cæteris paribus majores effluunt humorum quantitates in ratione sectionum, & arearum dilatatarum; quamobrem cum opere frictionum, & cucurbitularum major humorum quantitas fuerit ad cutim vocata, & hæc ex legis motu, & externæ frictionis magis fuerint attenuata, & rarefacta, opus erit hanc vel per sudorem, vel per transpirationem uberiori pariter quantitate esse eliminandam.

83. Cum in transpiratione subtilior, tenuior ut plurimum humorum portio evolet, & deperdatur, crassior vero, & gravior sudori, & transpirationi resistat; ideo cavendum est, ne diaphoreticis abutamur, quotiescunque aut inflammatio fuerit, aut timeri possit, aut chronici, ac longi morbi extiterint: Etenim magis aperta diaphoresi, & deperditis balsamicis, & spirituosiss, volatilibusque substantiis, remanentibus particulis crassioribus, tartareis, viscidioribus, & gravioribus, facile inflammationes aut augebuntur, aut de novo emergent, viscerum obstructions fient, morborum, & febrium gravitates augebuntur. Hinc principio morborum, & febrium sudores ut plurimum suspecti sunt, & ob detentorum humorum crassitatem morborum longitudo ominantur, salutes enim sudores nisi concocta materia evenire justo solent, quæ ab initio morborum obtineri nusquam possunt; Ulterius in uberrima transpiratione, & excedenti sudore leviores, balsamicæ, & homogeneæ copiarum particularum elasticarum & non elasticarum deperduntur, quæ actionibus animalibus, & naturalibus exequendis inservire debuissent; propterea post graves sudores, & transpirationes ægrotantes admodum enervati, ac languidi reddituri deficere quasi videbuntur; pariter a diaphoreticis abstinentum facile erit, aut caute diaphoretica exercenda erunt, cum natura sudoribus, & transpirationibus non fuerit assuetæ; etenim si violento nisu diaphoreticorum urgeatur, ut plurimum caput periclitabitur, translata ad meninges, & ad vasa torcularis herophili majori sanguinis pondere, ac numero gravissimo capitis detrimento.

D I S S E R T A T I O IX.

De Medicamentis Adstringentibus.

84. **M**edicamenta adstringentia aut imminuere, ac retardare, aut omnino auferre motum a fluidis, & oscillationem a solidis ab experimentis medicis ultro certi sumus; nonnulla enim magis aut minus adstringunt, ut sunt acida, austera, & acerbæ, alteriusque indolis ramosæ, & filamentosæ mediocri quantitate accepta; nonnulla penitus ligant, ac firmant fluida, ac solida, cum acida, austera, & acerbæ, alteriusque indolis ramosæ, ac filamentosæ excedenti quantitate peccaverint. Verum in hoc limine Dissertationis statim occurrit gravissima difficultas pro explicanda actione corporum adstringentium; habemus enim ab experimentis parvam molem coaguli magnam lactis quantitatem densare, & coagulare; habemus spiritum nitri sanguinem, & potissimum lympham supra modum figere, certi fumus decoctum corticis granatorum, bistortæ; & tormentillæ serum sanguinis potissimum ligare, & irretire, pariterque opus fluida animalium alte firmare; quomodo aut hæc effecta fixitatis, & coagulationis sequi poterunt in magna humorum copia a paucis, & tenuibus corporum istorum particulis per exposita fluida effusis, & permixtis? quamvis hæc phænomena explicari ardua esse videantur; nihilominus experientia Boilei de effluviis corporum nos edocet hæc necessario esse secutura. A Boileo enim eruditi sumus, minimas moles corporum esse divisibiles in partes quasi infinite parvas (ut antea indicavimus), quæ effundi possunt citissime per magnas fluidorum quantitates, & sic facta mixtione tot, ac tantas fluidorum copias posse firmare, ac figere: & sane nonne ex Boileo in historia *sanguinis humani* manifestum est unam guttam spiritus humani sanguinis occupare posse colore, & motu 2000. guttas aquæ, per quas gutta illa spiritus humani sanguinis effusa sit? ergo non erit mirandum, nonnulla corpora effusa per universa fluida machinæ animalis posse quoque facta mixtione facile, & breviter ipsamet fluida irretire.

85. Verum audio nonnullos rursus quærentes, & dubitantes: Certi quidem sumus (inquiunt) de Boilei experimentis, de subtilitate effluviarum, de corporum divisibilitate in partes minimas, & de istorum tam prompta effusione per fluida quaquaversus, potissimum auxilio circulationis, ut num. 48. & alibi satis ostendimus: verum adhuc obscurum est, quomodo corpora divisa, & subdivisa in partes infinite parvas possint occupando celeriter tot, ac tanta spatia humorum, per quæ effusa sunt, humorum ipsorum particulas taliter densare, ac figere, ut norabilem densitatem, unionem, firmitatem, & consistentiam acquirant: etenim dum corpora dividuntur, & subdividuntur in partes infinite parvas, ut tot ac tanta spatia humorum occupent, certæ istæ particulæ minimæ erunt tenuissimæ, ac mobilissimæ: sed partes tenuissimæ, ac mobilissimæ potius aptæ sunt agitare, rarefacere, & dissolvere humores, quibus permiscuntur, quam eos densare, ligare, & irretire; ergo videtur obscurum intelligere, quomodo corpora divisa, & subdivisa in partes infinite parvas apta sint magnas humorum copias, quibus permiscuntur, densare, unire, & irretire.

86. Optime quidem ab istis quæritur, & dubitatur, verum sciant primo ab experimentis nonnulla corpora quantumvis mole minima, & mobilissima effusa quaquaversus celeriter auxilio rennatis, & velocitatis suæ, & beneficio circulationis sanguinis per magna spatia humorum, quibus permiscuntur, & contactum habent, posse humorum ipsorum particulas irretire, aut saltem retardare: Enim vero ab experimentis ipsis edocti sumus sp. vini, & sp. urinæ humanæ (Boileo observante) inter se mixtos densari, & concrefcere, summam firmitatem, ac consistentiam acquirere inter se alba sub imagine: & tamen spiritus isti nonne tenuissimi, & velo-

velocissimi sunt? In quo magis rectificatissimi sunt, eo promptius, & firmitus coagulationem assumunt. Idem Boileus, & P. Lana tom. 2. lib. 4. Exper. 15. *Magisterii natura & artis*, experti sunt oleum terebinthinæ chimice destillatum, quamvis maxime fluidum, omnino coagulari, & firmari absque ulla alterius corporis admixtione, & tamen oleum hoc chimice destillatum supramodum attenuatur suis in partibus, maximeque fluidum redditur: Hetmullerus, & Joannes Freind anibo celeberrimi viri experti & ipsi sunt sp. nitri, & sp. nitri bezoardicum sanguinem, & potissimum lympham cito, & fortiter firmare, & coagulare: & tamen spiritus isti tenuissimi sunt, & mobilissimi; ergo ab his & a plurimis brevitatis gratia omisiss colligere jure possumus corpora plurima quantumvis tenuissima, & mobilissima, effusa quaquaversus motu suo, & auxilio circulationis per massam humorum aptissima esse humores figere; coagulare, aut saltem retardare, quibus permiscetur, & uniuntur: Quænam ergo erunt causæ assignandæ talis firmitatis, & consistentiæ, ut tot experimenta ostendunt?

87. Causæ itaque assignandæ, & ab hisce experimento multo probabiliter colligendæ desumuntur partim ab iis, quæ de actione medicamentorum in genere indicavimus, & partim in præsentis dicendis, causæ ergo talis firmitatis, & consistentiæ desumuntur a determinatis corporum miscibilium superficiebus. Secundo a specificis salium figuris. Tertio ab emissionem, privationem, seu exhalationem partium, quæ vel motu suo, vel ratione suæ figuræ impediunt aliarum partium cohesionem, & colligationem. Modo expendamus primam causam: Cum itaque corpora miscibilia fuerint aut singula, aut alterutra cum superficiebus ramosis, hamatis, seu filamentosis, tunc inter se mixta, & tangentia facta inter se flexu, & inflexu cum superficiebus suis ramosis, aut hamatis arctam inter se adhesionem elaborare facile possunt, ac debent firmitate, & consistentia corporum mixtorum constituta: quantumvis autem corpora miscibilia fuerint divisa, & subdivisa in partes infinite parvas tenuissimas, & mobilissimas; nihilominus cum ex geometricis moles, & pondera corporum decrevantur in ratione cubica, superficies vero ipsorum solum in ratione quadrata, ergo majores remanebunt superficies corporum, quam pondera, & moles ipsorum: sed corpora quælibet sunt inter se tangentia primario opere suarum superficierum; ergo si superficies corporum fuerint ponderibus; & molibus suis majores, & ulterius superficies, aut singulæ, aut alterutæ fuerint filamentosæ, ramosæ, aut hamatæ, profecto facto nexu inter se aut majori, aut minori: & in data ratione imminutis ponderibus corporum, etiam aut majores, aut minores firmitatis, consistentiæ, & coagulationis gradus producentur necessario: tali aut simili methodo verisimile est, opiata, & similia medicamenta suas vires exercere in fluidis machinæ animalis opere superficierum ramosarum, crassorumque sulphurum, quibus abundant; tali methodo arbitratus sum omnia lactea, gelatinosa eboris, & cor. cervi, ita gummata, & resinosa quælibet, ita etiam fortia hordeacea, & avenacea extracta, terras pingues, ut sigillatas, succos plantaginis, papaveris, portulacæ, lactucæ, consolidæ, amigdalorum, tormentillæ, bistortæ, semina istorum &c. consistentiam, & firmitatem aut majorem, aut minorem producere, non solum inter se, verum etiam cum fluidis fibrosis, feri, sanguinis, & aliquando succi nervei, & cum solidis etiam, quibus amplexu, aut contactu facto uniuntur, & adhærent.

88. Secunda causa firmitatis, & consistentiæ tam in fluidis, quam in solidis desumitur a specificis salium figuris fluidorum, & solidorum porositates adamussim, aut quasi adamussim replentibus: etenim si salium figuræ aptæ sint occupare spatia intermedia fluidorum sanguinis feri, & succi nervei, si aptæ fiant complere spatia musculorum, carniarum, aliorumque solidorum machinæ animalis profecto, adaucto salium pondere in spatiis fluidorum, & solidorum, mobiles fluidorum particulas, cum ad motum promovendum, conservandum, & reliquis communicandum exigant opportuna spatia, quibus moveri possint; si hæc spatia fuerint a particulis salium occupata, necesse erit mobiles fluidorum particulas, & oscillantes solidorum fibras in quiete constitutas reddi, & paulatim lentescere, aut aliquando penitus immorari: hinc lentescunt, aut firmatis fluidis, & imminuta, aut ablata solidorum oscillatione, fluidorum, & solidorum inertia, aut graviore fato firmitas, & coagulationem emergunt, talis ordinis secundum tamen magis, & minus agunt in fluidis, & solidis alumen, vitriolum, acacia, balaustum, labrusca, malum punicum, & granatum, ita mespilla, plurima acida, austera, & acerba &c.

89. Huic loco conveniunt etiam corpora illa, quæ permixta cum fluido seroso, aut sanguineo, aut nerveo particulas sanguinis arcto contactu facto circumscribunt. Ita si circa particulas aqueas feri, aut sanguinis circumscribantur salina prismata, aut alterius generis, quæ ex talibus circumscriptionibus figuras solidas polygonas elaborant, ut in formatione nebulæ, seu potius pruinae problemate 6. observaverat Galilæus; tunc cum figuræ solidæ polygonæ circumscriptæ aqueis particulis, aut alterius generis multo tardiores fiant, & lentiores reddantur aqueis particulis inscriptis; ut dialogo primo idem immortalis famæ Auctor demonstraverat, certe retardabitur motus naturalis fluidorum, & solidorum, quibus corpora ista polygonæ stellarum more composita applicabuntur: ex tali autem motuum imminutione effecta resistentiarum, vel in fluidis, vel in solidis, vel in utrisque erunt secutura facta majori, aut minori fluidorum, & solidorum firmitate, & consistentia; talis aut similis ordinis esse possunt nonnulla vina acerba, & austera, succi immaturi, aquæ acidulæ, maritales, nonnullæ aquæ vitriolicæ, aut aluminosæ, quæ permixtæ cum fluidis, & unitæ solidis nostri corporis effecta firmitatem producant.

90. Tertia denique causa consistentiæ, & coagulationis fluidorum, & causa firmitatis, aut saltem inertiae solidorum oritur ab emissionem seu exhalationem earum partium, quæ vel motu suo, vel ratione suarum figurarum impediunt aliarum partium cohesionem, & alligationem; Ita albumen, & ovi vitellum igni opposita, aut costioni subacta evaporatis plurimis particulis aqueis albuminis, & vitelli fibrosæ partes alte concrevunt, & adhærent inter se, ovo indurato; similiter serum sanguinis, & sanguis ipse exiractus, si igni, & calori exponantur, evaporatis, ac deperditis particulis tenuioribus, feri sulphuris, & salium, & remanentibus crassioribus, & fixis, & filamentosis alte concrevunt, & coagulationem acquirunt, ut in oleo terebinthinæ destillato, & similibus indicavimus; Ita si ab opere ignis, aut caloris interni, aut externi balsamicæ, ac oleosæ solidorum particulae attenuata supra modum evaporent per

transpirationem, aut deperdantur, aliunde tunc arescent solida, & arida, & veluti exsiccata consistent absque ulla, aut saltem minima eorum oscillatione; medicamenta autem quæ tali methodo privativa adstringunt fluida, & solida, sunt illa, quæ a Medicis *Exsiccantia* dicuntur. Hujusmodi indolis dici poterunt omnia aromatica, omnia composita ex castoreo, omnia vina nimis sulphurea, aquæ pariter sulphureæ, balnea, & luta sulphurea, & ea omnia quæ potenter calefaciunt, dummodo immoderate abutantur. Ab hisce enim omnibus, & similibus attenuantur aquosæ, oleosæ, & balsamicæ humorum particulae, quibus attenuatis, & a compage, nexu, & contactu aliarum dissolutis evaporant, & exhalant, remanentibus partibus fibrosis, & filamentosis humorum, & partibus fibrosis, & filamentosis solidorum sine debita, naturali, ac necessaria humectatione, & madefactione partium fluidorum; propterea densari, & concrevire solida, & tandem veluti arescere necesse erit, imminuto, aut deperdito motu fluidorum, imminuta, aut deperdita oscillatione organorum. Ob hanc causam in febribus ardentibus, in magnis sudoribus, in immoderatis hæmorrhagiis, diarrhœis, & dysenteris deperditis particulis tenuibus, & balsamicis fluidorum, & solidorum ægrotantes, aut in inflammationes incident, aut in emaciationes, quæ ad phthisim terminari consuevunt. Gravissime itaque errant Medici illi, qui validioribus purgantibus aliisque remediis calefacientibus, & exsiccantibus abutuntur, & frequentissimis phlebotomiis indulgent; ab utrisque enim fluida, & solida spoliuntur necessaria feri, oleosi, & balsamici sulphuris quantitate, hinc lentescere humores, & minus oscillare fibras necesse erit, adaucta tarditate, & aliquando parta humorum, & organorum consistentia. Non mirandum ergo si valida purgantia, & calefacientia, post repetitas incaute phlebotomias videamus ægros incidere in pleuritides, in febres inflammatorias, in malignas ex coagulatione, aliquando etiam in paralyses, & polypos: etenim ab incauta medendi methodo fluida, & solida redduntur in statu talis inertiae, & siccitatis, ut utraque coacta sint lentescere, & aliquando consistere summo vitæ periculo; totis itaque viribus curandum erit, ut medicamenta tam externa, quam interna, tam caute exhibeantur, ut humores superflui expellantur, conserventur vero necessarii; tali enim proportionem actionum, & reactionum debita, & naturalis firmitas fluidorum, & solidorum summo naturæ beneficio sustinebitur. Ab his ergo quæ exposita sunt, possemus colligere rationem, propter quam medicamenta divisa in partes veluti infinite parvas, & effusa quaquaversus facile, & breviter per magnas humorum copias apta esse possint facile pariter, & breviter irretire, & firmare, aut saltem notabiliter retardare particulas fluidorum, & fibrosas texturas solidorum, quibus permiscetur, uniuntur, & opportune adhærent pro explicandis actionibus *Adstringentium* medicamentorum.

DISSERTATIO X.

De Medicamentis Opiatis.

91. *Opiata Medicamenta* veteribus ipsis non ignota extiterunt. Hippocrates lib. 6. Epimiorum narrat Hegesippo soporiferum fuisse imperatum. Galenus, & Arabes plurima de opiatis locuti sunt, & opiata medicamenta data occasione exercuerunt. A plerisque judicatum est præeuntibus experimentis opiata fluida, & solida aliquando magis, aliquando minus irretire juxta majorem, aut minorem opiorum præstantiam, & quantitatem; hinc hujusmodi medicamenta semper caute ab omnibus fuerunt imperata. Nonnulli alii arbitrati sunt opium humores dissolvere, sudores excitare, & inflammabile esse judicaverunt; Ne autem in alienis diu versare videar, dicam brevibus, opiata opere naturalis suæ constitutionis apta esse primario pensare, irretire, & firmare humores, consequenter etiam solidorum oscillationes, aut imminuere, aut impedire; secundario vero posse opiata humores dissolvere, sudores promovere, sollicitate solida, calorem, & siccitatem inducere, cum vere opiata sint corpora, quæ specifico abundant sulphure inflammabili.

92. Primo itaque expendamus in opiatis causas firmitatis, & fixitatis, a quibus opiorum medicamentorum effecta possint probabiliter declarari. Indicavimus numero 29. ramosas, filamentosas, aut hamatas superficies crassorum sulphurum posse valide, & prompte adhærere corporibus fluidorum, & solidorum, & remediis, filamentosis, & hamatis suis superficiebus facto nexu ligare, & irretire corpora, quibus uniuntur, & cum quibus opportunum contactum habent. Modo manifestum est, ab observationibus Nicolai Lemerii in *curso chimico*, opium esse sulphureum compositum resinofum, quod lacrymæ ad instar paulatim extillat ab incisio corpore papaverum; cum ergo a solventibus cuneis ventriculi, ab actione, & reactione duorum succorum pancreatici, & biliosi fuerit sulphurea, & resinosa moles opii divisa in parte infinite parvas, & hæc brevi tempore effusæ sint quaquaversus auxilio etiam sanguineæ circulationis; tunc cum istæ minimæ particulae nullatenus mutant naturam, indolem, ac superficiem ipsimet opio debitam, ideo resinosis, filamentosis, aut hamatis suis superficiebus particulas fluidorum feri, sanguinis, & succi nervei potissimum in cerebro, & cerebello, & fibrosa ipsorum filamenta nexu facto quasi irretient, ac ligabunt ipsasmet solidorum fibrillas enervata, aut quasi abolita ipsorum oscillatione; ob hanc causam imminuto opportuno motu fluidorum, & solidorum somnus, & quies evenient, assymetriæ motuum solidorum distractorum conquiescent, & quiete, ac naturali unionem restitutus convulsivæ, ac dolorificæ affectiones sedabuntur. Ulterius imminuto motu, minuitur quoque collisio, & affricus corporum mixtorum inter se frænato calore partium. Cæterum si fortiori opii opere solidorum, & fluidorum motus & affricus præternaturaliter retardentur; tunc præternaturales somni fient, præternaturales emergent quoties, & præternaturalia frigora evenient, quæ sæpe ac sæpius plena particulis esse solent, cum ab his stagnationes inflammatoriæ, paralyses, apoplexiæ, & alia hujus generis incommoda consequi facile possint timendo vitæ periculo.

93. Similia pericula fixitatum ultro augentur, si ramosæ, ac filamentosæ opiorum superficies particulis salinis, quibus non solum jure suo donantur, verum etiam salinis fluidorum adhæreant, & has nexu facto circumligent: etenim unionem instituta crassorum

rum sulphurum cum salinis particulis elaborantur, moles, & pondera corporum, quæ proxime augentur & crescunt in ratione cubica suorum diametrorum, si moles tamen istæ similes fuerint inter se; verum si fuerint dissimiles, augentur, & crescunt proxime in ratione composita ex rationibus basium, & altitudinum earundem; cum vero ab hisce molibus, & ponderibus adauctis minima canalicula præcipue cerebri, & cerebelli, carni, & glandularum oscula impedita reddantur, fluida, & solida graviora fiant, & graviter augeantur densitates utrorumque, constabit quot, & quantæ resistentiæ debeant fluidis, & solidis supervenire, a quibus aut magis, aut minus adauctis cognoscendæ erunt majores, aut minores consistentiæ, & firmitates in machina animali.

94. Hisce probabiliter consideratis, transeundum est ad ea, quæ secundo ostendunt, cur intelligere possimus humorum dissolutiones, sudores, calores, siccitates, & vigilias opere opiatorum. Celeberrimus Volphangus, Wedelius lib. 1. cap. 12. pag. 45. de opio a praxi; & observatione testatus est, *Opium non operari, nisi serum sit in sanguine proportionatum*. In debito itaque sero opiata somnum, & quietem, convulsionibus, & doloribus pacem ferunt; cum vero temperies hominum fuerit fervida, ac sulphurea, aut ratione temperamenti biliosi, aut ratione febrium, aut serum fuerit minus, quam necessitas postulat, & salinis biliosisque particulis nimis ferax, tunc resinosæ, ramosæ opii, sulphurumque crassum ejusdem particulæ in tali temperie corporum cum opio permixtorum statum quodammodo volatilitatis acquirunt; quidquid enim recipitur per modum recipientis recipitur: Et sane ab experimentis chemicis edocti sumus sulphurea composita facilius, & promptius dissoluta reddi a sulphureis quoque corporibus ipsis permixtis. Ita sulphur si bulliat in aqua, aut in tenuissimo vino, aliove liquore, nunquam liquecet nisi in oleo ipso ebullierit; similiter sulphur ipsum in oleo terebinthinæ dissolutionem facillime patitur, quam in reliquis liquoribus penitus respuit; cum ergo sulphurea determinatis sulphureis addita divisionem & dissolutionem alte patiantur, neque fixitatem, neque coagulationem acquirant, ideo aliquando potest contingere composita opiata reddi posse facile, ac prompte divisa, & dissoluta a specificis aliorum sulphurum particulis, quæ vel a temperie, vel ab aliis causis humorum locum, ac sedem habent in machina animali sero imminuto; propterea statu volatilitatis acquisito, opiata illa non nexum, non firmitatem producent, sed divisionem, dissolutionem, motumque communicant fluidis, & solidis, hinc calores, sudores, & vigilias evenire necesse erit.

95. Probabile ulterius est, quod cum sulphurea elementa elatere prædita sint, hæc sulphurea mixta sulphureis, fortique nexu facto inter se necessario parere debent maximam pressionem internis particulis sulphureis elasticis; cum vero ex Mechanicis elasticitates corporum elasticorum sint compressionibus eorundem quamproxime proportionales, idcirco elastica illa elementa sulphurea inter se perfectissime mixta, cum ad ultimum terminum compressionis deveniant, nec ulteriorem compressionem pati possunt, cogentur violentissime expandere semetipsa, & ad naturalem suæ dilatationis statum se se restituere; hinc nisi facto, fractisque paulatim resistentiis quaquaversus sequitur dissolutio, divisio, & motus corporum internorum, & externorum, a quibus calores, sudores, & vigilias consequi necesse erit; hac methodo crediderim explicari multo probabiliter posse phænomena rarefactionum, motuum, sudorum, vigiliarum, quæ aliquando contingere experimur ab usu opiatorum. Ex his ergo colligere poterimus, quod si in fervida humorum temperie in febribus ardentibus, aut in continuis voluerimus ab opiatis levissima etiam dosi acceptis necessariam, ac quæsitam quietem, ac somnum parere; utile consilium erit madefacere prius corpora illa copiosis porionibus aquarum, aut emulsionum, deinde opiata exhibere; experiemur enim a levissimis etiam opiatis opportunum somnum sine noxa esse secuturum. Opiata enim magnæ dosis semper sunt plena periculis, quamobrem semper fugienda erunt.

96. Verum quidem est, quod post motus sudores, & vigilias partas ab hujusmodi opere opiatorum dividendum, & dissolvendum fluidorum texturas, cum augmento oscillationum solidorum, tandem aliquando supervenire solent novæ laxitates, novæ quietes, ac novi somni, sed cum maxima virium inertia; etenim facta divisione, & dissolutione texture fluidorum, cum augmento oscillationum in solidis, sudores, & transpirationes augentur, quibus adauctis; plurima elastica, sulphurea, & actiosa corpora alio transpirant, & evolant, plurima aqua, & lymphatica elementa vaporant, & exhalant; remanet ergo in fluidis, & solidis copia inertium particularum, quæ cum actionibus, & reactionibus valide, ac continuo exequendis ineptæ sint, tarditatem, lentescentiam, ac inertiam donant fluidis, & solidis ipsis quiete, ac somno restitutis; ea videlicet ratione, qua nos a laboribus, ab exercitio, ab itineribus laxati, ac fracti facile in quietem, ac somnum incidimus. Similiter animadvertit Volphangus Wedelius, infantes, ac pueros post diarrhœas, vel post serosas purgationes a jalappa institutas facillime in placidissimum somnum promoveri *de opiatis pag.* 38. Verum fatebuntur Clinici quam gravi, ac longo virium dispendio. Hæc ergo quæ de actione tam primaria, quam secundaria opiatorum exposita sunt, & accepta a phænomenis naturæ probabilia nobis visa sunt, quare hanc sententiam utpote probabiliorē accipiendam putamus; aliam quidem opinionem libenter amplectemur, cum probabiliora, aut legerimus, aut audiverimus.

97. Interim nolo præterire post partam ab opiatis quietem, ac somnum, ut plurimum graviore redire morborum convulsivorum, & hysteriæ &c. insultus, etenim tempore quietis fluida, & solida sunt in statu inertie reddita, hinc fluidorum, & solidorum motus languidi, & imminuti fiunt; secretiones glandularum potissimum capitis, & renum paucae, & mancae, supramodum transpiratio imminuta est: hoc itaque tempore violentiæ quietis major, & major accumulatur aggeries impurarum, & acrium materierum in massa humorum; cum vero post plurimas, & plurimas circulationes sanguinis, & miscellas cum reliquis humoribus opiata medicamenta paulatim delata e corpore fuerint, aut per urinas, aut per feces, aut per transpirationem, ita ut paulatim enervata fuerint quantitate, & viribus, tunc fluida, & solida incipient denuo suos motus, ac oscillationes præternaturales restituere; quam ob causam congestas præternaturales materias majoribus motibus agitare, &

asperis suis superficiebus majori impetu sollicitare, & irritare sensibilia organa necesse erit, dolorum, & convulsionum incremento; hæc in hypochondriacis, ac in hysteriis manifesta sunt.

DISSERTATIO XI.

De Medicamentis Cordialibus.

98. **V**eteres Medicæ Praxi Scriptores de *Cordialium* elaboratione, & usu semper sollicitos animos habuerunt, rati a cordialibus medicamentis sustineri potentias, & vires cordis, a quibus animalis machina conservaretur, & viveret. Et sane conservandæ, ac sustinendæ naturæ leges id postulant, ut totis viribus quærantur, & adhibeantur ea medicamenta, a quibus aut a natiuitate, aut fortuita lassitudine, aut a morbis fracta, aut enervata naturæ organa sustineantur; cui officio potissimum cordis machinam inservire arbitrati sunt Clinici, cum cor primum vivens, & ultimum moriens altissime habeatur. Verum talis generis medicamenta, quæ *Cordialia* appellantur, si recte eorum compositio, actio, & usus expendantur, ultro ostendunt, non solum cordis, seu potentie vitalis beneficio futura esse, verum etiam operibus cerebri, & cerebelli promiscue famulari, cum ab his potentie animales opere cerebri, & naturales opere cerebelli cum robore, ac motu perfectissime consequantur.

99. Cum ergo dicendarum rerum magnitudo, & dignitas postulent, ut de cordialibus sine confusione agere velimus, ideo necesse est primo exponere mutuam adesse relationem inter potentias vitales, animales, & naturales, ut iusto intelligamus, medicamenta cordialia, non ad cor tantum, sed ad cerebrum, & cerebellum jure, ac merito pertinere. Quamvis celeberrimus Joannes Alphonsus Borellus prop. 67. secundi Tomi de *motu animalium*, vim motivam fibrarum cordis in statu naturali probabiliter arbitretur æquipollere posse viribus librarum 3000. nihilominus varia hominum temperies, varia ratio temporum, ætatum, motuum, & ciborum aperte ostendere poterunt momenta cordis varias subire leges, neque posse adamussim determinari. Cæterum quidem est hæc varia momenta cordis in statu naturali debere esse proportionalia momentis membranarum cerebri, & cerebelli; Ab Anatomicis enim edocti sumus systoles, & diastoles cordis homologue respondere systoli, & diastoli meningum, & vice versa, cum enim membranae cerebri, & cerebelli, cerebrum, & cerebellum, & spinalem medullam circumscribant, profecto hæc a motu cordis impulsam sanguinem excipientes, erunt systoli, & diastoli cordis proportionales; hinc etiam motus succi nervei secreti ab organis cerebri, cerebelli, & spinalis medullæ futurus erit impulsus sanguini æquabilis, & proportionalis; quare actiones, & reactiones animales sensui, & motui voluntario institutæ a cerebro dependentes, & actiones, & reactiones, seu oscillationes naturales a cerebello, & a spinali medulla emanantes opere motus, & elateris succi nervei non solum aptam, & continuam relationem habere debebunt inter se; verum etiam cum actionibus, & reactionibus cordis, motibus cerebri, & cerebelli proportionalibus; quamobrem potentie vitales, animales, & naturales profecto veluti in æquilibrio actionum, & reactionum erunt inter se constitutæ in animalibus, cordialia itaque non uni, sed omnibus potentiis data proportionem respondent, atque succurrunt; hæc quidem majoris dignitatis gratia cordialia appellata sunt, cum veteres cor dignitate, structura, & officio cæteris visceribus præstantius esse judicaverint.

100. In cordialium itaque classe considerari primo possunt ea, quæ volatiles, spirituosas, & elasticas particulas tribuunt sanguini, lymphæ, & succo nerveo, quarum auxilio motus cordis, cerebro, & cerebello apte tribuitur, augetur, & conservatur. Secundo illa, quæ opportune nutriunt, & communicant fluidis oleosas, & balsamicas moles, quarum beneficio sequatur conveniens partibus nutriendis unio, adhesio, seu, uno verbo, nutritio. Tertio, quæ simul & semel motum, & elaterem, & nutritionem donant machinæ animali.

101. Primi ordinis judicari possunt illa, quæ aromatica sunt, ut cinnamomum, cariophilus, nux moscata, radices Angelicæ, Imperatoriæ, zedonariæ, calami aromatici; talis spheræ sunt etiam omnia spirituosas, & volatilia, ut sp. melissæ, rosinarini, lavendulæ, sp. succini, cornu cervi, & alia hujus farinæ elementa spirituosas, & elastica, quæ ab animalibus, vegetabilibus, & mineralibus colligi possunt: hic autem animadvertendum est hæc medicamenta spiritu volatili, & elatere repleta, sanguinem, lympham, & succum nerveum quantitate, motu, & elatere nimis violenter agitare, & impellere; curaverunt idcirco Clinici medicamenta ex hisce composita pluribus opportune corrigere, ac moderari permiscendo potissimum frigida, & alchalia, aliquando sub adstringentia variæ indolis, ut frænato impeu corporum volatili, & oleosorum naturales medii motus, & elateres in sanguine, lymphæ, & succo nerveo restituerentur, & conservarentur; hinc elaborata fuerunt confectiones cordiales alchermes, & hyacinthina, aliquando in aliis quibus permixta fuerunt opiata, & resinosas, ut observamus in dia-scordeo Fracastorei, in mithridato theriaca, & orvietano &c. Verum utinam hæc tam composita cordialia fuissent simpliciora medium motum fluidis, & solidis excitantia, & conservantia, fortasse feliciori operæ naturæ actionibus inservirent, natura siquidem cum summa sit geometra, simplex est, plura respuit, cum pauca sufficiant.

102. In secunda classe habenda sunt illa, quæ lactea sunt, ut lac asinum, humanum, vaccinum, &c. succi pariter extracti ab amygdalis dulcibus, aut a cachao, aut a gelatinosis, aut ab Hordeaceis, ab avenaceis, & a succis pullorum, caponum, ranarum, testudinum, nec ova ipsa hæc in tabula numerantur: *Nutrientia* enim omnia vim, & robur naturæ altissime tribuunt, augent enim fluida, & solida naturali mole sustinent, a quibus vires, & facultates vitales, animales, & naturales felicissime exercentur, & exercitæ conservantur.

103. Tertiæ ordinis sunt illa fluida, quæ colliguntur a succolata, a jure viperino, a succis pineorum, pistachiorum, ab avibus, a pardicibus &c. a vinis pariter creticis, antiquis, & balsamicis, & hisce similibus; hæc enim omnia unusquisque intelliget, quam facile, quam prompte, quam necessario motum, elaterem, & simul nutritionem ferant machinæ animalis.

104. Modo cum in hoc triplici ordine cordialium status medius quoad

quoad motum, elaterem, densitatem, & nutritionem fluidorum, & solidorum naturæ proportionalis esse experiatur, & hæc via media possit natura acquirere æquilibrium particularum humores componentium, & æquilibrium oscillationum in solidis, ideo in morbis, in quibus aut peccat excessus, aut defectus velocitatis, elateris, densitatis, & nutritionis tam in fluidis, quam in solidis, curandum enixe erit a Medico (quod tamen fateor difficillimum esse) ut cordialium beneficio hic status medius, quantum possibile est, acquiratur, & acquisitus conservetur cum unitate, & æquilibrio elementorum inter se tam fluida, quam solida componentium.

105. Hisce autem indicationibus ut obtemperemus, sedulo attendendum est, ut ea primum eligantur cordialia, quæ aut excessum opportune imminuunt, cui operi cordialia temperata succurrunt: aut defectum motus elateris, & nutritionis æqua proportionem adaugeant, cui officio validiora cordialia, & nutrientia præsto erunt. Hic animadvertendum cordialia quælibet, & si temperata fuerint, apta esse violenter agitare humores, quotiescunque fervida extiterit ægotantium temperies, fuerint longe febres, deliria, & æstivæ summæ caloris constitutiones, tunc enim medicamenta cordialia nimis agitantur, nimis attenuantur, magis volatilia, & elastica redduntur; hæc enim exhibita potissimum augmento, vel statu morbi, & associata particulis sulphureis, & elasticis massæ humorum adaugent impetum istorum in ratione composita ex numero particularum elasticarum, motu, & elatere earundem; Hinc gravissimas comparant in fluidis, & solidis motuum improprietates, morborum, & febrium incremento: curandum itaque erit cordialia quælibet exhibere ægotantibus, aut antea accessiones, aut in accessionum declinatione, eo enim tempore cordialia minus agitata, ac dissoluta a vi, ac impetu particularum sulphurearum minus volatilia, minusque elastica fiunt, minori humorum agitatione; sic facilius, & commodius morbohis particulis paulatim resistunt, & naturæ succurrunt. Cæterum citra has temporum differentias cordialia dissolventes vires, facile poterunt exercere contra fluida, & solida gravi vitæ periculo, quo casu non cordialia, sed venena dicenda essent. Ulterius in quibuscunque cordialibus primæ, secundæ, & tertiæ classis id unice curandum est, ut mediocris, sed conveniens quantitas fervetur in quibuscunque ægotantibus temperiæ potissimum fervidis, & continuis febribus correptis, & facilius accedere possimus ad statum illum medium, aut ipsum paulatim acquirere, a natura geometra postulatam. Denique remanet, ut inter cordialia eligam damnam dum non usum, sed abusum succulatæ Indæ, quæ quanto præstantior, & utilior est cordi, cerebro, & cerebello præcipue in senibus, emaciatis, & febri carentibus, cum moderata quantitate, qualitate, ac debito tempore assumatur; ita paulatim perniciose esse poterit, quotiescunque citra senectutem hac abutamur qualitate, quantitate, ac tempore. Quod de hac, ita de cordiali quælibet dicendum erit.

106. Videbitur nonnullis me ab argumento cordialium medicamentorum declinare, si in præsentibus brevibus agere velim de aliquibus remediorum speciebus, quæ specifico velut opere agere videntur in machina animalis: verum ab his quæ probabiliter dicturus sum, plane intelligent, quod sicuti cordialia specifica sunt medicamenta cordi, cerebro, & cerebello, ita nonnulla alia merentur haberi, ut *specificæ remedia*, quæ cordialium more specificis aliquorum viscerum differentiis opportune succurrunt. Inter tot, ac tanta eligam tantummodo duo consideranda, quod autem de his, ita proportionaliter de reliquis specificis medicamentis dicendum erit. Eligo itaque radicem *hypercacuanæ* specificam in dysenteria, & *Chinam* in intermittentibus potissimum febribus specificæ admirandam: Ut ergo debito ordine progrediar, istorum medicamentorum actiones, & reactiones expendam ab effectis, quæ observantur tam in fluidis, quam in solidis machinæ animalis. Primo itaque vocetur ad examen *Hypercacuanæ*; hæc quidem sollicitat ventriculum, & intestina vomitu promoto; ergo hæc aget in solida ventriculi, & intestinorum. Modo considerandum est in fluxu dysenterico acres, asperasque superficies humorum illas esse, quæ continuo, & immoderate secernuntur a glandulis intestinorum cum erosione extremi tatum vasorum; cum vero in tali acrimie materiarum separatione continuo irritentur fibræ intestinales augmento motus peristaltici versus intestinum rectum; hinc si hæc incommoda diu perduraverint, aliquid in intestinis vitium erit secuturum, videlicet a continua irritatione, & erosione fibrarum tandem aliquando laxatur, aut etiam rumpitur naturalis textura fibrarum intestinalium, quare fibræ læsæ, & enervatæ coguntur postmodum majorem pati distractionem, quam contractionem; propterea in præternaturali irritatione intestinorum motus peristalticus non æqualiter, & isochrone exercetur (ut ostendunt expositæ propositiones) sed asymmetre, & inordinate imminuto momento contractionis, & adaucto momento distractionis fibrarum.

107. Hisce præmissis, exhibeatur dysenterico radix *hypercacuanæ* ad drachmam unam, aut ad drachmam unam cum dimidia, profecto verisimile est a vi, & opere talis quantitatis, ac modi agentis contra fibras ventriculi, & intestinorum talem specificum vomitum excitari, & oriri talem specificam contractionem in vomitum excitato in fibris ventriculi, & intestinorum, quæ facile sufficiens sit ad restituendum imminutum statum contractionis, & ad comparandum in fibris intestinalibus nimium laxatam motum contractionis, qui sit omnino oppositus præternaturali laxitati, aut adauctæ distractioni fibrarum ipsarum: quare paulatim restituto eo contractionis gradu, & acquisita paulatim fibrarum collectione, & unione inter se, paulatim quoque acquiritur robur, seu quidam tonus fibrarum naturali, aut quasi naturali proportionalis; Quamobrem paulatim comparato motu peristaltico intestinorum naturali, isochrono, & æquali remittitur dysenteria, & paulatim sanitas restituitur: In tali dysentericæ remissione sequamur hunc specificum vomitum naturæ amicam, ac salubrem. Cum in vomitu ab *hypercacuanæ* producto fiat specifica contractio fibrarum intestinalium versus ventriculum, & ventriculi versus gulam, certe in tali contractione fibræ contractæ intra se se respiciunt, concava intestinorum superficie restricta; consequenter oscula vasorum intestinalium jam aperta, vel ob erosionem, vel ob laxitatem, stricta, ac clausa reddenda erunt sanguineo fluxu, aut impedito, aut imminuto. Deinde a tali specifica fibrarum intestinalium contractione alterum superenit in dysentericis beneficium, videlicet ab opere vomitus con-

tractis fibris sectiones intestinorum imminuantur in ratione quadrata diametrorum, seu peripheriarum intestinalium, ideo glandulæ intestinales & ipsæ magis collectæ, & unitæ redduntur inter se, quo in statu robur, & vim acquirunt, ut juxta leges naturæ oscillationes suas exerceant; hinc naturali motu acquisito aptissimè paulatim redduntur glandulæ transmittere in venas desinentes materias contentas, & venæ desinentes & glandulas coactæ sunt materias excipere, & per consuetam circulationis viam alio transmittere, & liberare intestina a præternaturali excretionis sanitate paulatim restituta.

108. Hic sentio arguentes, plurima sunt medicamenta quæ vomitum pariunt, attamen dysenterias non sanant; cur ego vomitus ab *hypercacuanæ* productus dysenterias solum sanare aptus est? Ratio ex dictis constare videtur; etenim verisimile est talia vomitoria non apta esse talem specificam vomitus differentiam, & talem gradum specificæ contractionis excitare in intestinis, & ventriculo, quæ sit omnino opposita specificæ illi præternaturali laxitati, & distractioni fibrarum intestinalium, ut antea satis exposuimus: sed multo majorem, ac violentiorem, aut multo dissimilem; cum autem verisimile sit solum actionem *hypercacuanæ* aptam esse talem specificum vomitum, ac talem specificam contractionem fibrarum parere, quæ sit a diametro opposita præternaturali laxitati, & distractioni earundem in dysenteria; ideo radix *hypercacuanæ* tali vomitu excitato dysenterias sanare specificè potens erit, quas reliqua vomitoria curare non poterunt.

109. Ulterius verisimile est, alterum beneficium oriri ab opere *hypercacuanæ*; sicut enim moles, ac quantitas ad drachmam unam, aut ad drachmam unam cum dimidia exhibita dysenterico vomitum parat, & determinatum contractionis gradum oppositum præternaturali laxitati, & distractioni fibrarum intestinalium producit; ita verisimile pariter erit aliquam molem, & quantitatem *hypercacuanæ* divisam, & subdivisam in partes minimas ingressam oscula vasorum lacteorum, & ab his delatam in massam sanguinis posse non dissolvere, ac frangere texturas, & nexum humorum, quibus applicantur particulæ illæ *hypercacuanæ* (ut gravissime operantur aliorum vomitoriorum corpuscula,) sed tantummodo aptam esse debita mixtione, amplexu, & figuris huic officio proportionalibus unionem, & nexum parere humoribus, & hos, horumque fibrosas texturas opportune densare, constringere, ac sustinere ablata, aut imminuta dysenteria, quæ beneficia a reliquis vomitoriis nullo modo haberi possunt, immo contrariæ actiones timendæ erunt dysentericæ augmento. Utinam in plurimis morbis, ut in maniacis, hypochondriacis, hysteriacis affectionibus, & febribus ipsis ars medica ita valeret, ut specifico remediorum opere communicare posset in organis, ac fluidis taliter laxis, aut taliter enervatis, aut præternaturaliter inflexis, directis, ac motis illos específicos motus, flexiones, directiones, ac status oppositos, aut quasi oppositos tali præternaturali laxitati, inertia, aut præternaturali inflexioni, curvatura, directioni, ac motui solidorum, ac fluidorum, profecto restituto paulatim tam in solidis, quam in fluidis cerebri, cerebelli, uteri aliorumque viscerum motuum æquilibrium, separarem maniacas, hypochondriacas, hysteriacas affectiones, nec non febres facilius esse curandas.

110. Simili methodo specifica actio chinæ chinæ poterit multo probabiliter explicari. Cum china-chinæ in febribus intermittentibus potissimum valeat, & radices febrium intermittendum in pravitate succorum ventriculi, bilis, pancreatis in duodeno, & intestinorum cognoscendæ primario sint; ideo colligendum erit chinæ chinæ particulas taliter agere, & reagere contra præternaturales motus succorum primarum viarum mixtione, unione, amplexu, figuris, & motibus suis, ita ut impendant, & auferant, aut saltem imminuant præternaturales, & asymmetras pravorum humorum miscelas, & motiones; ita ut ulterius chinæ-chinæ particulæ communicent illis succis mixtiones, & motus præternaturalibus mixtionibus, ac motibus oppositos, sed legibus naturæ proportionales, aut quasi proportionales. Deinde elementa chinæ-chinæ, & effluvia ejusdem communicata chylo, lymphæ, & sanguini similiter aptissima redduntur mixtione debita, unione, amplexu, figuris, ac opportunis motibus oppositis impedire, aut auferre, aut saltem imminuere præternaturales impurarum particularum a primis viis acceptarum miscelas, ac motus, sicque communicare massæ humorum novas mixtiones: novos motus mediis mixtionibus, aut mediis motibus homologos præternaturalibus mixtionibus, ac motibus, aut omnino dissimiles, aut oppositos; propterea hac lege communicato etiam solidis æquali medio, ac naturali motu oscillatorio, acquiritur paulatim fluidorum, & solidorum æquilibrium pace, unione, ac quiete naturali humorum restituta, febribus expulsi, usque dum tamen actio chinæ-chinæ, seu momentum ejusdem in primis viis, & massa humorum perduraverit. Hæc quæ usque adhuc exposita sunt ex legibus mechanicis manifesta esse videntur; ex mechanicis enim edocti sumus, quod si fuerint potentia agentes, & reagentes molibus, ponderibus, figuris, numero, & motibus, seu momentis, ac viribus inter se æqualiter oppositis, has in hoc statu mutuas inter se actiones, & reactiones, seu mutuos inter se effectus tollere, & in æqualitate actionum, & reactionum oppositarum, necessario unionem, quietem, ac medium statum corporum consequi necesse erit. Si itaque momenta, & vires chinæ-chinæ agant, & reagant in primis viis, & in massa humorum contra momenta, ac vires pravorum succorum ventriculi, bilis, pancreatis, intestinorum, & massæ humorum in ratione opposita æqualitatis; tunc facta æquilibrium inter actiones, & reactiones oppositas chinæ-chinæ cum reliquis viribus, ac momentis pravorum humorum mutui effectus oppositi auferentur, & in æqualitate actionum, & reactionum oppositarum potentiarum quies, & pax, ac status medius tam in primis viis, quam in humoribus erunt orituræ, victa febris; In hoc statu semper febres intermittentes vincentur, aut vinci poterunt.

111. Multo autem magis superabuntur præternaturalia febrium elementa, quotiescunque vires, ac momenta chinæ-chinæ opposita viribus, ac momentis præternaturalibus pravorum humorum in febribus supramodum præpollent; etenim omnino everfis, atque omnino mutatis motibus humorum præternaturalium inæqualibus, inordinatis, & asymmetris a viribus, ac momentis, motibus, ac directionibus præpollentibus chinæ-chinæ, & in æquilibrium fortiter, ac valide restitutis, tunc rursus victa febris sanitas restitueretur; in hoc

secun-

secundo statu actionis præpollentis china-china febres intermittentes semper victæ remanebunt, nonnullæ etiam continuæ vinci poterunt, aut saltem moderari: cum autem hæc beneficia tam in primo, quam in secundo casu habeantur ab opere, ac viribus china-china, cumque hæc beneficia obtineri non possint sine restitutione æquilibrî mixtionis particularum massas humorum componentium, colligendum jure erit vires, ac momenta china-china agentis, & reagentis contra fluida tam externa in primis viis, quam interna in canalibus mirum in modum inservire, ut obtineatur status medius, seu æquilibrium mixtionis humorum; deinde cum tale æquilibrium mixtionis humorum supramodum consulat concoctioni ipsorum; ideo aptissime a celeberrimo Francisco Torti in suo utilissimo Tractatu de China-China indicatur chinam-china altissimo operi concoctionis humorum opem ferre.

112. Verum si vires, ac momenta particularum china-china minora fuerint præpollentibus viribus, ac momentis pravorum humorum, vel in febribus intermittentibus, vel in continuis, tunc a china-china neque febres intermittentes, neque ullæ continuæ vincendæ erunt, sed remanebunt tam in motibus fluidorum, quam in motibus solidorum status medii, aut æquilibrî asymmetriæ. Ab his ergo quæ usque adhuc exposita sunt, verisimile est potissimum actionem china-china pro febrium victoria cognoscendum esse a specificis viribus, ac momentis particularum china-china æquabiliter oppositis asymmetris, & inordinatis motibus particularum humorum aut externarum, aut internarum, aut utrarumque, quæ ratio motus particularum china-china specificæ opposita præternaturalibus motibus humorum apta est communicare, ac statuere medium motum, & directionem isochronam, ordinatam, & æquabilem in particulis humorum, & in solidis asymmetre, & inordinate motis in febrium agitationibus, ut factò paulatim mixtionis æquilibrium in fluidis, fluida moveantur, & oscillent solida juxta leges naturalis æquilibrî, victis febribus, & sanitate restituta.

DISSERTATIO XII.

De Concoctione Humorum.

113. Inter præstantissima, & utilissima Medicæ Praxis opera primum locum obtinet *Humorum Concoctio*: Hæc tam necessaria naturæ actio illa est, qua naturalis fluidorum, & solidorum temperies apte sustinetur, pura ab impuris secernuntur, & impura corpora per excretorias vias eliminantur, determinatis temporum differentiis, tam admirabili secretionum beneficio humores optimo in æquilibrio constituti id ferunt, ut sanitas perfectissime conserveatur, & amissa felicissime restituatur. Hoc autem æquilibrium humorum in concoctione ipsorum aperte docuit Hippocrates, cum de veteri medicina enunciaverit, *Concoctionem fieri a permixtione, & temperatura mutua humorum*. A qua mutua temperie, & permixtione humorum æquilibrium ipsorum statui necessarium erit: tanto operi obtinendo tota Medicorum sollicitudo fuit; moniti a naturæ legibus frustra in operibus artis esse elaboraturos, cum methodum concoctionis ordinem, ac tempora, aut neglexerint, aut non obtinuerint. Scientia quidem concoctionis humorum longam praxim postulat, pro qua obtinenda nolit Medicus neque nimius esse in Philoſophicis & Chemicis, neque nimius in Mechanicis, & Botanicis, neque nimius in minimis Anatomicis, sed in his contentus necessariis amet potissimum esse in practicis morborum observationibus, ut eruditissime, & utilissime ostendit Celeberrimus Bartholomæus Lavagnolus, Professor Patavinus, de usu Chimie. Utinam mihi esset ingenium tam necessario argumento dignum, sperarem me brevibus universa medicæ artis præcepta feliciter esse assecuturum: quanvis autem huic muneri me imparem esse fatear; nihilominus exercitii gratia ea tradam consideranda, quæ magis necessaria esse judicaverim.

114. Ut itaque opportuno ordine progredi possim, notandum sedulo est concoctionem humorum præferre ipsorum præparationem. Præparatio autem humorum nil aliud vere est, quam apta dispositio eorum inter se mixtorum quoad molem, gravitatem, figuram, & motum; quoad tenuitatem, laxitatem, & densitatem, ut dato tempore opportuna, & utilis subsequatur separatio corporum a se invicem. Hæc autem humorum præparatio alia a natura fit, alia ab arte; præparatio humorum, quæ a natura perficitur, habetur ab æquabili oscillatione fibrarum, & glandularum, ab ordinato humorum motu, ac circulo, a debita miscela succorum pancreatici, & bilioli, alteriusque indolis, & a convenienti somno; Quæ ab arte exequitur, comparatur ab exercitio, a quiete opportuna, a cibo, a potu temperie, & ætati hominum proportionalibus, acquiritur a salubri aere; experimur enim in puro aere, in quo elater est mediæ densitati proportionalis, ab actione succorum ventriculi cibos facilius præparari, dissolvi in ventriculo, promptius fieri chyliſicationem, & hanc facilius disponi ad sanguificationem obtinendam. Hinc ab Hippocrate de aere, aquis, & locis habemus magnopere observandas esse aeris, & temporum mutationes, ut opera naturæ vel perfecta, vel imperfecta esse intelligantur. Denique præparatio humorum cognoscitur a recto usu medicamentorum, videlicet decoctionum alterantium, quæ medicamenta vel habentur a bolis, vel a pulveribus, vel a fluidis; Itaque juxta varias humorum præparandorum indoles exhibentur fyrupi, & decoctiones ex variis herbarum differentiis compositæ, aut pulveres variæ speciei incrassantes in tennitate fluidorum, incidentes, ac dissolventes in densitate, ac crassitie, & ut medico utar vocabulo dulcificantes in aspera, & acri humorum superficie, aliquando calefacientes in frigida ipsorum temperie, aliquando refrigerantes in fervido humorum statu, aliquando compescentes humorum impetum, ac elaterem, quotiescunque solida, & fluida enormiter agitata motu, & elatere præpollent. Necessitatem, & ideam medicamentorum præparantium significare voluit Hippocrates sectione 7. aph. 70. edocuit enim. *Corpora cum quis purgare voluerit, oportet fluida facere*; videlicet oportet prius apta ratione medicamentorum disponere corpora ad purgationem, ut hæc facile, tuto, & utiliter purgata reddantur.

115. Difficultas quidem non levis oritur pro cognoscendo, ac statuendo tempore, quo præparatio humorum jam instituta est, ut præparatis humoribus æqua ratione proximam concoctionem expe-

ctare, ac statutam intelligere possimus. Crediderim autem tempora completarum præparationum judicanda esse a mutationibus, quas paulatim acquirunt excreta a statu morboſo ad salubrem, quamobrem excreta, quæ morboſe crassiora fuerant, quo tempore incipiunt fieri tenuiora: quæ lentiora, quo tempore fluidiora eveniant; quæ prius aspera extiterant, quo tempore sensui incipiant leniora, & benigniora reddi, tunc illa erunt facile tempora præparationis humorum, aut completæ, aut proximæ perfectæ præparationi obtinendæ; pariterque si videamus, somnum, appetitum, & vires paulatim ad statum naturalem inclinare, tunc conjectari quoque poterimus humores desideratam subire præparationem; Cum vero expositæ excretorum mutationes a statu morboſo ad salubrem non æqualibus, & similibus fieri possint temporibus, sed dissimilibus, & inæqualibus juxta majorem, aut minorem præternaturalis materiæ copiam, densitatem, & motum, juxta varias temperierum, temporum, & ætatum constitutiones; ideo semper a Medicis laborandum erit, ut has specificas temporum differentias, si non veras, saltem vero proximas assequi possint; Quamobrem maxima egemus praxi, attenta observatione effectuum, signorum, & excretorum cum Hippocraticæ disciplinæ studio, ut apto medicamentorum usu, ac tempore præparationibus naturæ succurramus, & completas præparationes aptissime cognoscamus. Pro hisce autem obtinendis consulendus erit Celeberrimus Prosper Alpinus, qui, duce Hippocrate, hanc materiam perfectissime complet.

116. Interim cum hisce gradibus præparationum progredimur ad concoctionem materierum, seu ad illum statum, quo materiæ vel morbificæ, vel heterogeneæ, mole, pondere, figura, & motu ab homogeneis dissimiles dispositæ redduntur, ut opportuna ratione per loca excretoria, & naturæ congrua separentur, quarum beneficio morbi judicationem consequi experimur. Quamvis autem, docente Prospero Alpino, concoctionis signa a pluribus haberi possint, nihilominus præstantiora, & certiora ex Hippocrate ab excrementis alvi, & urinæ colligenda erunt. Quotiescunque itaque alvi excrementa, quæ prius præternaturalia fuerant aut quantitate, colore, odore, aut mole, figura, & tempore excretionis incipiant mutari taliter, ut acquirant quantitatem ingestis proportionalem, colorem subflavum, neque gravissime, & molestissime oleant, & moles istorum sint apte molles, opportuna figura coherentes, & consistentes, & consueto tempore sine dolore, & irritatione exeant, tunc poterimus judicare aut adesse, aut proxime futuram esse humorum concoctionem. Eligam inter Hippocratis experimenta tantummodo illa, quæ libro 4. Epidemiorum significaverat in agrotis illis, qui habitabant juxta ædes Medosadæ: In hisce statuto tempore apparuerunt fæces quantitate ingestis proportionales, molles, coherentes, quas, ut monet Martianus, viscosas Hippocrates appellat, & subflavas, simili quidem ratione flavedinis, quam observamus, cum albus narium mucus vigente statu cruditaris mutatur in subflavum tempore concoctionis, postmodum addit Hippocrates morbi judicationem lib. 1. de morbis esse secuturam.

117. Deinde concoctionis argumentum ab urina desumendum erit, cum enim urina antea in statu morboſo fuerit tenuis, aut confusa, cum eneoremate disparato, & divulso, postea incipiat elaborare albam subsidentiam, levem, & æqualem, & acquisiverint colorem subrufum cum nubecula subrubra, pyramidalem quasi figuram ostendens, tunc, docente Hippocrate, concoctio humorum habebitur, aut expectabitur: hæc satis superque indicantur lib. 1. Epidemiorum ab historiis herophontis, Cleantidis, & Melidæ; hæc ostenduntur lib. 3. Epidemiorum in Cherione, Pericle, & Nicodemo; cum autem hæc felicia concoctionis signa extiterint, & perduraverint, tunc fere semper absque ullo medicamentorum auxilio morborum judicationes secuturæ erunt, parta expulsionem impurarum materierum per ea loca, quæ fuerint providæ naturæ facilliora, & commodiora, videlicet vel per sudorem, vel per urinas, vel per feces, vel per hæmorrhoides, vel per narium hæmorrhagias, vel per sputum, vel per insensibilem transpirationem, quo tempore Medicus debet otari, ut docuit Hippocrates aphor. 20. sectio 1. *quæ judicantur, & judicata sunt integre &c.* Verum si adhuc inertia naturæ, & morbificæ materiæ ratio, ac quantitas per spontaneas expulsionem judicationem morbi non fecerint, aut elaboraverint imperfectam, tunc Medicus debet esse sollicitus de opportuno medicamentorum usu, ut inertis, aut oppressæ naturæ prudenter, ac provide opituletur, sollicitando ea loca, quibus natura inclinaverit juxta aphorismum 21. Hippocratis sectionis 1. *quæ educere oportet per loca conferentia, eo ducere convenit*. Propterea aliquando dejectoria per alvum, aliquando diaphoretica, aliquando specifica deobstruentia, vel diuretica, aut alia impellentia exercere oportebit. Animadvertendum ultro est in concoctione humorum observanda esse determinata tempora, quibus concoctiones haberi solent, videlicet considerandi sunt dies critici, neglecta die sexta, quam Hippocrates in Epidemiis, ut infidelem accusavit; hisce itaque diebus criticis ut plurimum concoctiones humorum separare poterimus.

118. Cæterum si nulla signa concoctionis humorum superveniant, tunc Hippocrates lib. 1. de morbis popularibus ob cruditates, & confusiones humorum minatur longitudinem morborum, aut recidivas, & aliquando mortem; Quamobrem a Medico tunc temporis res prudenter agendæ erunt apta ratione victus, oportuno exercitio, debito somno, salubri aere, & aptissimo medicamentorum usu non irritando naturam, sed sustinendo.

119. Statuta præparatione, & concoctione humorum monendum est, nonnulla medicamenta alte postulari a morbo, & causa morbi, verum penitus impediri a languida temperie agrotantium, vel ab inertia organorum, vel ab ætate; Itaque, gratia exempli, chalybeata quaruntur quidem unice ab obstructionibus viscerum; verum si agrotantes fuerint temperiei languidæ, inertis ventriculi, & ætas fuerit tenera, aut a præcedenti longitudine morbi nimis fracta, tunc ab hisce recedere oportebit; fortis enim chalybeatorum actio, ac stimulus non obstructiones auferet, sed parta crispatura quodammodo convulsiva in fibrillis viscerum obstructiones augebit, imminuta, aut impedita solidorum oscillatione, imminuto, aut impedito motu, & elatere fluidorum; cur ergo in pueris, in senibus, aut morbo fractis chalybeata, aut boli medicamentorum gummosi, duri, ac tenaces offeruntur? profecto hæc, & similia inutilia erunt, cum ab inertia ventriculi, dissolvi, ac frangi non possint; immo hostilia experiuntur, cum ventriculo pondus, & natu-

ra laborem augere videantur, propterea qualia excipiuntur per os, talia per secessum solent eliminari.

120. Deinde remanet ut doleam, medicinam usque ad hæc tempora in remediorum inventionem non multum profecisse, præter enim nonnullas remediorum species a chemicis, a mineralibus ut mercurio, ferro, & antimonio, china chinæ desumptas, quibus veteres caruisse certi sumus, profecto cogimur confiteri nos pro medicamentis parum, aut nihil acquisivisse. Verum chinæ-chinæ medicamentum adeo egregium est, ac sumum, ut plurimis certe æquipolleat; hoc enim prudenter, opportune debita quantitate, ac tempore exhibitum, & repetitum febres fugat, morborum fere omnium socias, & quod magis pro argumento præsentis Dissertationis æstimandum est, præparaciones, & coactiones humorum paulatim, & feliciter parat, ut Celeberrimus Franciscus Torti ratione, & praxi tractatu *de China Chine* nervose statuere conatus est, ut antea indicavimus.

121. Tandem video me in hac Mechanica Medicamentorum expendenda, & in hac concoctione humorum opportune comparanda, non parum defecisse, cum leges emittendi sanguinem omnino neglexerim; fateor enim a sanguinis emissionem recte, aut prave instituta præparaciones, & coactiones humorum aut feliciter haberi, aut miserrime destrui. Verum intelligant Lectores benevoli, me ab hoc argumento data opera declinavisse, cum sciam, phlebotomiam leges suas accipere a majori, aut minori plenitudine vasorum, a majori aut minori densitate, ac pondere humorum, a tem-

perie, ab ætate, a viribus, a regionibus, aliquando a consuetudine, & fere semper a morbis inflammatoriis, quæ omnia cum jure suo nullis Medicis obscuro, postulent, solam medicorum prudentiam quoad quantitatem, modum, & tempus extrahendi sanguinem; ideo pro hoc argumento animadvertendum esse arbitror, sanguinis emissionem vere, & necessario postulari cum massa sanguinis peccaverit quantitate, densitate, & crassitie & motu partis a principiis intrinsecis componentibus ipsam massam sanguinis. Cæterum si densitas, & crassities humorum partæ fuerint a principiis extrinsecis, ut transpiratione impedita, aut imminuta, a succis ventriculi viscidis, & austeris, a viscido, & austero chylo, a pancreaticis, & biliosis succis tenacibus, & impuris, a labore, ab aere &c. tunc raro, & semper caute sanguinis missio vere postulabitur. Etenim vitia hæc a causis externis producta facile, & sine periculo auferri possunt ab opportunis purgantibus, ab alterantibus, & depurantibus massam humorum, a diætâ, ab exercitio, a frictionibus, a mutatione aeris &c. Etenim a phlebotomia hæc incommoda supramodum augentur, & crescunt, spoliato sanguine elementis serosis, elasticis, spirituosus, & balsamicis, hinc oscillationes solidorum, & glandularum in statu inertie redditæ nullatenus inservient secretioni, & depurationi humorum peccantium majori morborum incremento; Quamobrem phlebotomiæ leges in concoctione humorum, & curatione morborum nonnisi Medicorum prudentiæ, virtuti, ac praxi remittendas esse putamus cum verbis, ac præceptis determinari nullo modo possint,

Finis Mechanices Medicamentorum.



Fig. I Partis Mechanices Morborum




Fig. II Partis




Fig. III Partis






Fig. Mechanices Medicamentorum



ANTONII CÆLESTINI COCCHII EPISTOLÆ PHYSICOMEDICÆ

Ad Clarissimos Viros

LANCISIUM, ET MORGAGNUM.

BREVIS CASTRENSIUM FEBRIUM Historia, quæ Ferentini, Anagninæ, finitimisque locis Anno MDCCIX. grassata sunt.

CAPUT PRIMUM.

Clarissimo Amplissimoque Viro Jo. Mariae Lancisio Innocentii VI. olim, nunc Clementis XI. Archiatro & a secretiori cubiculo Antonius Cocchius S. P.



In magnis morbis ad te Lancisi Clarissime recurrimus tanquam ad Romanum Hippocratem & mundi parvi reparatorem. Crudelis apud nos viget epidemia castrensiū febrium ab acri & pene realgarina aeris diathesi oriunda, ipsum quo vivimus, quod die nocteque trahimus, in publicam perniciem & calamitatem conversum est elementum. Scias itaque oportet, diligens naturæ scrutator, ut per

consilia tua nobis opportune succurras, Ferentinum inter & Frusinonem palustres & musco virentes aquas jacere: sunt vero sulphureæ præsertim atque enormiter foetide, quæ hoc potissimum anno circa æstivum solstitium erumpere cœperunt, & mox supra modum auctæ agros & segetes pene omnes inundarunt: minerales sane particule, quæ hisce aquis per abditos terræ sinus evectæ atque indiscussæ retinentur, perpendiculari ac fervido solis radio in atmospheram elatæ tanto quidem deterius ad morbos parantur & cladem, quanto pervicacius in desudum aquarum foveis linum & cannabis macerantur. Addo *stagna loquacia* seu potius inquinamenta ranarum, bulfonum atque amphibiorum consimilium, quæ nunc humi degunt, tunc aliis cum vermibus viles aquas inhabitant. Ex quibus omnibus, Syrio ardente pestiferi vapores prodeunt & veluti alas acquirunt, qui ubi per aera discurrunt, non possunt non machinam nostram hydraulico-pneumaticam perturbare, alte feriunt hominem respirantem: *pleurunque enim*, ut Æsculapii successor inquit, *hominis natura Universi potestatem non superat*. Et quemadmodum gubernatores optimi vim tempestatis, sic medici tunc morbi impetum superare non possunt. *Divinum illud in morbis ex cælo*, aere scilicet vitiat, Causa senex deducit, authoremque & dominum in cunctis, quæ corpori accidunt, aerem appellat. Vix oppida in montium verticibus sita a labe secuta sunt; eorum nanque plebecula susceptas in Ferentinensi planitie febres convehit ad montana. Verum Frusino, Ferentinum, & summorum Pontificum olim Sedes Anagnina temerati aeris damna maxime sentiunt.

Virg. II. Æn.

Lib. de dieb. i. ju. dic.

Lib. de flat.

Harum febrium epidemiarum symptomata.

II. Febres sunt verè malignæ, & epidemicæ, quippe in omnibus similes, rigore, qui membra quatit, exacerbantur: nempe simplicis, aut duplicis tertianæ typum initio ut plurimum servant, perniciosam indolem suis mox phenominis detecturæ. Torva occurrit egrorum facies, & quasi vipereo veneno *isterescens*, scintillant oculi intuitu contumaces, & proprium laticem, quem lacrymas dicimus, invite fundunt: infelix porrectis artibus, & tota spina decubitus. Pulsus, qui est reciproca cordis echo, parvus, creber, & inequalis, *Ulcerosa* lassitudo, & sitis, & sonus aurium intra se ipsas, & capitis dolor ante delirium acerbitate contendunt: aures, quæ *filie carminis* ab Ecclesiæ vocatæ sunt, tinnitum, sibilum, bombum, vel pluviam decidentem mentiuntur: internus enim carotidum ramus foramen ossis petrosi juxta meatum auditorium ingreditur, mox oblique ephippium versus sub nerno optico ascendit, & in rete mirabile, & plexum choroidem disperditur; si propter febrilem æstum solito audentius pulset, membranas, & ossicula dimovet, & in tremorem aliquem agit, quo hic, vel ille sonus exprimitur, pro impulsu scilicet, pressionumque varietate. Lingua ad oris præfecturam nata, cui magna fides debetur in morbis, ob nullam, aut infinceram salivæ separationem arida, scabra, squalida evadit, saporemque perversum renuntiat: dehiscere, & caligare solet, ubi papillæ nervæ a scoriiis salino-acribus divulsæ, corrosæ, & eschara, qualis a caustico inuritur, obductæ sunt. Anorexis quoque se morbi comitem præbet. Pessimum, & fere rabiosum verminum genus nunc tormina, & alvi profluvium, nunc peristalticum motum invertens cardialgiam, & vomitum, & sibi egressum molitur, imo dolorem pseudopleuriticum, syncopen, vertiginem creat: mordicatis enim ventriculo, & intestinis, per nervos octavi paris utrobique desinentes intercostales musculi, cor, cerebrum, & nervi optici in afflictionem trahuntur. Incurfat anhelitus, faucibus hæret vox, & est pro voce suspirium. Nec desunt anxietatis plenæ vigiliæ, vigilantium somnia deliria, subsultus tendinum præcipue in carpis, venatrix manuum palpitatio, jactatus convulsivi, & tumultuariæ assurgendi colluctationes. Tandem fatiscientibus viribus sopor comatosus obrepit, nam dura mater membranaceus ille musculus, vitæ automatum facile princeps, & apud Ecclesiasten *vitta aurea*, irritata, plus æquo contracta, & inflammatorie affecta supra duos renixus movetur cerebri, & cordis; in falcato tendine, & lacertosis hemisphæriis vectis momentum prævalet, hinc violenta, nec regularis succi nervei expressio: strangulato deum in alveis suis residuo sanguine ita cerebrum comprimit, ut liquidum animalis secretio, aut iter impediatur, & delirium in lethargum degeneret. Corruptum lixivium repræsentant urinæ, parotides interdum extuberant, & urinæ protinus defæcantur. Purpureæ maculæ, quæ postea vibicis instar livescunt, effulgent in cute; nam *malignus ichor* per miliares glandulas secretus nec tantæ molis est, ut in pustulas tumeat, nec tantæ subtilitatis, ut perspirare possit; vel quod *ipse sanguis inter in ductus glandularum excretiores extrusus, corruptusque sit*.

Sandoz de medic. 1. aph. 1. Lister in coun. cu.

III. En tristis apud nos grassantium febrium aspectus; hinc vero earum facinora expendam. Septimo, nono, undecimo solent occidere, raro decimum quartum attingunt, ut Ferentini præsertim observamus, cum illuc sæpe ad Optimates curandum accersar: & siquæ medicinæ obtemperant, nunquam absolute judicantur: (ipsa enim cæli impuritas criticos naturæ motus distrahit perpetuo, ac turbat) sed enervato sanguinis robore, volatili, oleoso, & balsamico sulphure absumpto in quartanam, cachexiam, immortalesque viscerum obstructions abcedunt. *Majora enim omnia vitia* (loquitur Aretæus Cappadox) *soli Dii medicantur; nam aut in vivere primario morbus delitescens totum in malum habitum convertit, aut omne corpus ingruente pestilentia in malum succum viscera permittit, quando sibi utraque vicissim ad perniciem suffragantur*. Vidimus plures rusticos montium incolas, qui ob annonæ caritatem ad secandam maturam jam segetem in Ferentini agro morati fuerant: Hi vero, cum non aerem solum venenatum, sed æstiva siti adigente aqua etiam sane ipsa siti nocentiores, veneni fontem bibissent; colore turpes se intus uri, simulque caput in partes quasi dissilire conquesti sunt; tanta erat gravitas, pondus, & dolor: circa quartum morbi diem ad penates suos revecti rei angustioris domesticæ homines brevi a tam funesto malo, & alii parotide præcedente jugulati sunt; quo spectat illud in Coacis *quæ dolenter ad aurem assurgunt, pestifera*; alii lethargo stertentes, alii dysenterico ulcere occubuerunt; alii contra iisdem fere symptomatibus confecti, cum opportunum per reditum tempestivæ medelæ locum dederint, pristina valetudini ope nostra sunt restituti: & novimus, quantum contulerit montanus aer ob tenuem, ac purgatissimum nitrum, vegetumque elaterem.

Ergo ubi me in montes, & in arcem ex urbe veniovi,
Nec mala me ambitio perdit, nec plumbeus auster,
Autumnusque gravis, Libitinæ questus acerbie.

Horat. Sermon. I. 7. Cat. 5.

IV. Non est hic, ut te, vir amplissime, detineam inutili causarum, symptomatumque explicatione, cum te non fugiat, sales summe volatiles, & alcalino acres ipsos aere ceu menstruo dilutos, atque inspiratione haustos, per pneumonicas vesiculas cribrari; saliva quoque ad ventriculum ablegatos una cum chylo sanguinem petere; quo cum pervenerint primo duntaxat Cartesii elemento circumdati & febrilem motum excitant, & tragicas agunt metamorphoses; fuso enim sanguine, & velut a sui foedere sejuncta parte lymphatica, quæ est cruoris vehiculum, reticulata conestit, ut caseosa pars lactis injecto liquotes coaguli a fero dividitur & condensatur. Insunt sanguinis fibrillæ elasticæ, quæ ad perennem contractionem nituntur; inest latex, qui massam divulsam & fluidam reddit. *Tunc autem pessima est* (bilem intelligit Plato) *quando puro sanguini mista villorum ligaminumque fila suo ex ordine dimovet, quæ ideo in sanguinem diducta & sparsa sunt, ut mediocrem tenuitatis & crassitudinis habitum consequantur, neque propter caliditatem, cum ipse sit lubricus, raro ex corpore defluat, neque si crassior sit, ad motum fiat ineptior, atque egre per venas fluat & refluat*. Scissis ab acuto fermento iis quasi habenulis, fugitivum serum elabitur seu decantatur, & scissæ fibrillæ mutuo amplexu & globuli rubicundi a Leevuenhœckio per dioptricum vitrum detecti mutua oppositione se se coercent & remorantur. Hinc ea sanguinis constitutio, quam stricto laxam sectæ methodicæ dux Asclepiades & mutato nomine lento liquidam Bellinus appellavit.

on Timoxo.

V. Therapeuticen nostram exponimus, ut quidquid est minus sapienter a me provisum, sapientia corrigatur. Initio, si cogit vomitus aut vomendi proclivitas, unicas binas albi temeri, in quo metallorum crocus ad usque drachmam horas XII. infusus extiterit (in quo scilicet per emoreticam papyrum trajecto sulphura natent emetica subtiliora) præscribo admonens, ut, quoties vomuerit æger, diluentem pituitam bibat; nam ea, propter quæ vomit, perinde ac in cholera diluentur. Fertilis in montes aeris labes salivæ impressa & ad ventriculum detrusa prius quam lacteas venas tota subeat & ob valvularum repagula irrevocabilis per viam omnium brevissimam eliminanda est, quam innuit natura, & natura orator Hippocrates *purgare oportet æstate superius, hyeme vero inferius*. Sin minus, diarrhœa supervenit valde contumax & non raro in dysenteriam faciens, quæ sudorem impedit seu generalem & pene regiam sanguinis despumationem. Unde nil mirum, si hæc eadem in lateris dolore impedit anacatharsim, & ideo ab Hippocrate damnata est) in metastasi tamen pleuritica aut peripneumonica dextra præcipue & cacoehyma post sanguinis missionem *Scomphi* interitu non obstante alvum audacter ciemus v. uncis olei lini recens expressi cum drachma spermatis cetis non rancidi in jure fervido permisti: & qui Pythagorica tenacius colunt mysteria, die non impari id agunt sexto, octavo, decimo, & duodecimo, ut pectus a lymphæ quasi piceis crassamentis extricetur, ut sine ulla irritatione præcipitentur nova glutina, quæ facile possent in parte affecta ipso cum sanguine cumulari, ut tandem laxatis solidis non solum sputa, sed etiam sudores promoven- tur; viscerum enim tensio velut quibusdam uncis instar retis piscatorii, quod nominatur griphos, cutem circumplectitur, & coarctat) ventrem autem compactum vomitus solvit, & egerentem magis, quam oportet, sistit, illum quidem humectans, hunc vero sic- cans; præsentem diarrhœam vomitus sistit; ergo vetat futuram: paregoricum sub noctem exhibeo, ut induratum ab emetico tumu- latum

Corandi methodus exponitur.

Hipp. de loc. in hom.

IV. Aph. IV.

de dixib.

latum sedet. Si progressi jam morbi curationem aggredi contingat, tum a purgando expedit vacare; nam ubi febrile fermentum cum massa humoralis confusum est, vi cathartica separari non potest, & quæ potius eidem resistunt, & sana sunt, dissipantur. Militat pro re nostra chirurgicum argumentum: *Obediant* (Hippocrates) *luxationes, non tarde reponuntur, si quis antea quam inflammentur, reponat*: Nam ubi ossis caput ex acetabulo excidit; ita nervos, & revehencia vasa comprimit, ac distorquet, ut contenti humores restagnent, & ob moram acefcaunt, & vellicantem naturam acquirant; hinc dolor, febris, & inflammatio: brachium retrorsum luxatum inferius memorat. *Si igitur statim adfueris, externo cubiti gibbo cogere oportet, & sponte incidit. Si vero febris prævenierit, non amplius reponere oportet: dolor enim in cogendo augetur. Ut autem in summa dicam, neque alium articulum febrienti reponere oportet.* Sic medicus, qui ægritudinum internarum chirurgus est, ingravescente febre fodicare non debet, quæ centrum vocitat, intestina. Græcus Magister initio acutorum, & non nisi materia turgente dejectoriis utebatur: Hoc namque refermentantium genus interdum crudam, & lateris assuetam materiam subdita quasi face provocat, & febres vel exacerbant, vel duplicat. Nos certe sequi volumus dictatorem: post secundum morbi diem vix præmissio enemate ad vesicantia, ad bezoartica, & diaphoretica, ad Peruvianum corticem convolvamus.

VI. Et vesicantia quidem inter generosa Arabum præsidia recensemus: ubi enim cantharidum, ac euphorbii sales in rete cutaneum, excretoriis discissis tubuli sese insinuant, solida vehementer, & longe lateque crispantur, quæ motu dein reflexo ad aream stimuli circumpellunt, & ideo in ampullosam vesicam epidemis attollitur; liquida vero intra canales pelliceo-conicos veluti *cobobata*, & novis motibus exaltata tam parvo spatio capi cum nequeant, reflunt ad interiora, & ex unda in undam *cobobatis* liquidis exaltatisque id, quod concretum est, & quiescens solvitur, quod vero iners, ac torpidum excitatur. Acriores cantharidum partes sanguinem, & inde renes pervadere arguit dysuria, quæ a spasmodica totius fistulæ urinariæ contractione dependet; venenum veneno domamus. Aperto emissario deleteria corpuscula sero commissa, quæ ordinariis cribris consentanea non sunt, commodius, & citius emunguntur. In peste Noviomagensi Diemerbroek incolumes eos narrat, quibus cauteria, aut aliqua ulcera insculpta erant. *Neque fontanelle* (subdit Waldschmidt, *aude sua defraudande, quæ grassantibus morbis malignis ab omnibus gestari debent.*

VII. Ad alexipharmaca, & diaphoretica quod pertinet, sæpe a nobis usurpantur contrayervæ radix (quæ certius potest, quod posse videtur aut lapis bezoar, teste Riverio, aut etiam lapis de Coa) viperæ jecur sale rectificante ditissimum, cornu cervi philosophice calcinatum, stibium diaphoreticum, nitrum stibiatum, bezoardicum minerale, ac joviale, electrum album, & camphora, ut exotica, fermentativas, ipsique cruori penitus impermiscibiles molculas præcordiis potissimum, ac cerebro hærentes cicurent, solvant, & ad extrema vaforum urgeant, expellantque: oleum scorp. Matthioli, a quo pingues, & balsamico volatiles guttas emendicamus, & alia hujusmodi gregi Helmontico infensa: diascordium Fracastorii, quod est brevis theriacæ, seu nobile remedium compendium, gelu epicrasticum de cornu cervi juxta Barei normam peractum, quod in oris vestibulo colliquefcens tabe sua sitim temperat, & maligni fermenti aciem retundit, aqua prophylactica Deleboe Sylvii utpote acido volatilis: emulsa demum ex amygdalis dulcibus, & melonum, cardui benedicti, papaveris albi seminibus cum aqua sonchi, ut butyrosam lympham dissipatam resarciant. Decoctum hordei *tristi succo, tardoque sapore felicitis mali* acuendum, vel crudus fons in assiduam, largamque potionem sufficitur: *princeps ingenii & doctrinæ Plato* figuram aquæ icosaedram tribuit in Timæo; *habens viginti* (sunt ejus verba) *æquilateres bases nascitur*, idest facies viginti, ut exponit fidiſſimus Platonis interpres Marſilius Ficinus: porro, cum aque corpuscula ob angulos summe flexibiles contigua ſint, minimæ salium coagulantium pyramides inter ipsos deprehensæ, redimere se nequeunt, & tanquam vortice rapiuntur: *malo cum Platone errare, quam cum ceteris reſe sentire.* Corporis peripheria iterum, atque iterum cucurbitulis stimulat, in remissione tamen, & ante cibum: ubi scyia linamento ardens imprimitur, nisu aeris, & pondere, quod circumpositæ partes totum sustinent, cutis intra scyiam affurgit, & in superficie majorem extenditur; fit enim ex plana curva: discluduntur, & ampliantur pori, & quicquid est perspirabile, eliditur: conniventia vasa, vel arcuatim per extensionem compressa vix abstractis cucurbitulis suæ se figuræ restitunt, adeoque a contactu materiæ, cui prius hærebant, recedunt, & quasi spatium relinquunt affluentī sanguini, unde facilius asportatur. Novos etiam motus inspirant frictions, inunctis manibus vel Ætiana mistura, vel oleo amygdalarum dulcium, & aqua Hungarica, seu spiritu Reginæ Hungaricæ: cutis enim revera est, ut Glissonus Anglus asseruit, *universale quoddam spiraculum, sive emunctorium corporis, per quod omnes ejus exhalationes commode effluant*: & suam cuique corpori adesse atmosphæram, Boyliana experimenta confirmant. Ut autem felicius, & optatius emergat sudor, præsertim cum anxie vigilat, & delirat æger, ad ipsa diaphoretica etiam opiatum adjungimus duce Wedelio, tincturam scilicet Thomæ Sydenham, quæ ceu pharmacum Helenæ *nepenthes* Homero dictum sollicitudinum obliviam inducit: quippe hypnotica non modo somni tranquillitatem conciliant, sed & falsum, & acidum, & acerbis blandis ramusculis, figente sulphure involvunt; atque hebetant; duræ matris etiam in subditis organis tensionem relaxant, qua flaccescente, sudoris viæ liberius patent. Imitamur naturæ ritum; natura, quæ non est, nisi *ars ætæ Divinitatis, seu ars Dei in materia*, mortalibus somnum instituit ad perspirationem explendam; expleta perspiratione somni quoque necessitas expleta est. *Duplo magis dormiens perspirat vigilante*, ut probatur e statera Sanctorii: est enim vigilantiæ proprium, omnes corporis musculos contractos, meatusque adeo glandularum duplo angustiores reddere. Sic diaphoretica cum hypnotico propinamus. 24. *stib. diaph. scr. i. bezoart. jovial. scr. ss. hepat. viperin. præp. gr. v. ol. scorp. Matth. gutt. iiii. confect. hyacinthin. alb. inod. diascord. Fracast. ana drach. ss. coque in bolos v. quos deglutiat hora somni, & superpotet aq. card. benedict. unc. vi. & tot citr. unc. i. laudan. liquid. Syden-*

ham gutt. xii. Hoc autem (sudore nimirum) excreto, & sanguis in naturalem statum restituitur, & febris remittit, & lassitudo sedatur. Si cunctari patitur morbus post expulsum sudore portionem fermenti, reliquum curæ est, ut Peruviani corticis usum auspiciemur; *Neque ulla alia spes in magnis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præstet.*

VIII. Dolatum lignum, quo trajicimus mare, *aerio seu quondam in Vulture pinus immani steterit trunco, seu frondibus Alpes vestierit*, quatuor, aut septem digitos a morte nos arcet. Peruvianus vero cortex naturæ lapsæ subsidium, sacra veluti anchora, naufragam, atque fluctuantem vitæ naviculam tuetur, & fundat: hic est contra periodicas, perniciosasque febres Alcides, qui alcali suo amaro, austeroque obvios in ventriculo, & intestinis heterogeneos succos a labe vindicat, & repentes feras interimit: vi peristaltici motus in vascula Aselliana tracucitur, & quæ in chyli, & lymphæ reductivis adenibus glutinosa ad tempus quiescunt, futuræ febris semina incidit, absorbet, eliminat: ecce quomodo novas invasiones *febrilium catholicon* anteverit; immo sanguinis contextum, ut ejusdem canales in *habituali hæmoptoe* adstringit, & blanda astrictione corroborat, liquidis æque, ac laxis solidistonum largitur, & sulphureo acres, feditiosasque particulas, quas captivas, & inermes fecit, per reiteratas sanguinis circulationes in cutem, in renes, in intestina secum præcipitat: evidens tamen, quam promovet, evacuatio nec insueta nec multa: igitur insensibilem, quæ præstantissima est, redintegrat perspirationem. *Curationum vero animæ sunt temporum opportunitates*: longe a paroxysmo, inclinata scilicet febre, corticem exhibemus, & statis horis repetimus; nam sanguis puncto reservecientiæ per elasticas suas fibrillas majori orgasmo distractas expanditur, turgescit, & in ostiolo ductus thoracici subclaviæ sinistra inserto valvulam premit, & quæ ingredi, & quæ ascendere coguntur, repellit: thoracicus ductus febrili succo distensus, aortæ, quæ super ipsum pulsant, obnititur, & ab ea validius repercussus in motum convulsivum vibratur, & præcordia, plexum nerveum mesentericum, stomachum, peritonæum lege consensus laceſcit; hinc horror, aut rigor universalis, lumbago, vomitus, angores, & alia symptomata, quæ in accessione cumulantur: tunc cortex Americæ, tunc cibus ipse, aut ipse etiam potus non aliud quidem, nisi turbas adjungeret. *Ubi id (frigus) expectatur, omni potione prohibendus æger est: hæc enim paulo ante data multum malo adjicit*: sic largior calidæ potus qui juxta Zecchium præservat a calculo, dum tamen calculus, affinis sepulcro materia in renum pelvi existit, vetare debet; tunc enim aqua transire non posset, & pelvi magis distenta nephriticum dolorem acueret.

IX. Hernicus quidam viridis ætatis, salino terrei temperamenti, crapulæ simul, & Veneri indulgens, nec aeris pravitate, nec rot acerborum funerum exemplis deteritus Ferentinum concessit, ubi plures duxit dies, noctesque: nondum erat reversus, cum coepit ægrotare: incidit enim in popularem febrem cum rigore, verminoso vomitu, cephalalgia, & vigili oculorum conniventia. Secundo morbi die, qui apyretos videbatur, ne vires morbo accederent procrastinatione remedii, anthelmonticum dejectorium jussimus, quo biliosæ tincturæ, insecta non pauca sursum deorsum expulsa sunt: deinde jura subtilia vitulina, vervecina, gallinacea, in quibus limatura cornu cervi nodata, radices graminis, scorzonæ, & contrayervæ, folia sonchi, oxalidis, & chamedryos leniter incocta essent, non parvis pateris propinabantur. Die tertio febris rigore præludens adeo exacerbata est, ut æger deliro comate, syncope, & luctuosis suspiriis (quæ sanguinem per venam pulmonicam tardius progredi, & profundo, ac pleniori aeris cylindrio indigere significant) æstaret: ego Philonis filiz memor cænam inhibui: *optimum vero medicamentum est opportune cibus datus*: cervici, & infernis artubus vesicantia destinaui, & emulsa pro sitis levamento. Quarto palliata intermissio: linguam asperam, obscuram, & pulsam, qui licet non admodum debilis, celerimus tamen erat ex febris recrudescencia, tunc pene fornicanter, atque inharmonicum reperi: lotium primo tenue, lateritio colore saturatum apparuit; nam tunc cessavit ea sanguinis velocitas, quæ non finit in adenosa renum superficie nisi merum laticem separari. Quinto sub auroram tres uncias aquæ prophylacticæ Sylvii, & de vexo jam die bolos, & haustum, qui sequuntur, obtulimus. 24. *nitr. stibiat. bez. Jov. ana scrup. ss. Cortic. Peruvian. ver. in subtil. pul. redact. atque oleo scorp. Matth. irrorat. drach. i. diascord. Fracast. confect. hyacinthin. alb. inod. ana q. s. coque in bolos numero impares; item aq. card. bened. un. iv. & flor. actes unc. iiii. tinctur. paregor. Syden. gutt. xii. emerſit quidem sudor, sed frustra emerſit: novo enim paroxysmo ea, quæ aderant, efferata sunt, & quæ non aderant, supervenerunt, nempe sanguinis e naribus stillæ, surditas, & citra faucium tumorem difficultas deglutienti: cogitabam interea gelu de cornu cervi chinatum, quod bis, terve in die cochleatim assumeret. 24. *scob. corn. cerv. drach. v. aq. font. q. s. eoque lento igne, vase clauso ad libram unam: decoctum filtra; & prius, quam in gelu concreſcat, adde aq. prophylact. Sylv. unc. iiii. diascord. Fracast. stib. diaph. ana drach. i. Cortic. Peruvian. ver. in subtil. pulv. redact. atque oleo scorp. Matth. irrorat. unc. i. Sed ne jus quidem deglutire poterat miserandus æger cecidimus spe tam justa Corticem Arboris Vitæ repetendi: cucurbitulæ iterum, atque iterum affixæ sunt, concisa demum scalpello in homoplatis cute, ut sanguis a capite derivaretur, & quicquid intra cranium hærebat, per systalticas a tot vulnusculis excitatas canalium oscillationes revocaretur ad cursum: tritei fucum dolosa febris prope statum depofuit: undecimo convulsus interiit.**

X. Sudor itaque per universam cutem ejectionis prodesse nequivit: miramur acerrimum febrile fermentum nec despumatum esse, nec fractum: sed inter suas ipsius scorias invaluisse. Porro cum sanguis textura jam lacer per duram meningem reflueret, & spicula corrosiva e sanguinis consortio se passim proriperent, atque in tendinea musculares fibras veluti immissi cunei meningeos sinus convellerent, eorundem angustatis diametris pars sanguinis crassior & fere polyposa resedit, & auctus meningis elater quasi arcus tensus resiliens oscillatorio potius solidorum collisu quam parca & minus celeri animalis liquidi irradiatione nervos omnes in mo-

Lib. de fractur.

Mechanica vesicantia.

Opera medica copraſt. rom. 2. disp. 12. de febr. malig. Bezoartica, & diaphoretica selectio. ra.

Georg. I. 2.

Marcus ad Q. Prat.

Traſt. de part. trib. con. tin. c. 4.

Lib. 4. Odiss.

IV. Aph. 16.

Hipp. de dicta.

Cels. lib. 1. cap. 5.

Peruvianus cortex.

Phraſis, qua contentus est Morſton.

Hippocrates Cratæus.

Cels. lib. 3. cap. 16.

Hernicus ægroti historia.

Cels. lib. 3. cap. 4.

Descripti ægroti coronarium.

motu tonico detinebat; hinc vigilæ: debilior tamen erat quævis fibrarum undulatio in sensoriis & vix percepta; hinc stupor & alienatio mentis, ut multa simul æger apprehenderet, sed incomposita & cæco impetu in nervos motores linguæ appulsu fatua balbutiret, en coma vigil seu *monstrum biceps phrenitidis & lethargi*. Jugulares venæ, quibus sinus duræ meningis laterales continuati sunt, una eademque contractione laborabant; hinc sanguis quem exhaurire minime poterant, per arteriarum fines e naribus extortus est. Advenit surditas, membrana tympani aut zonis acusticus sideratis. Adempta sine faucium & colli meteorismo deglutendi libertas, vel quia musculares œsophagi fibræ convulsæ ac inflexibiles erant, vel quia (ut ex Riolani observatione coniecimus) fibrilia recrementa per carotidum furculos in thymum præsertim evecta glandulam illam parotidis instar distendere, anginaque occulta œsophagi pariter ac tracheæ tubum coarctare valuerunt: liquidi enim mora & stagnatio major quam alibi fit in glandulis, ubi vasculis, ceu Morton refert, non procedunt rectis lineis ut in musculis, verum spirant. Tandem metastasis intra cranium subsistens epileptico modo interfecit. Cucurbitulam autem occipitali te inciso admovevi jussissem, si tum venæ occipitalis, quam nuper solertissimus Valsalva descripsit, existentiam, originem, & suos truncos, & quo intra cranium tendunt, non ignorassem; nam per ea venarum occipitalium vulnuscula sanguis, quem in laterales meningis sinus convecturæ sunt, avertitur, & reliqui sanguinis per eosdem sinus fluentis copia quidem minuitur & motus augetur: remedium porro non contemnendum cum ferreus urget *semnus*, sed Aretæus olim de curatione apoplexiæ agens sic monuit: *Cura morbus autem diu trahitur & caput in causæ est, cucurbitula occipitis affigenda & sanguis largitus hauriendus: plus enim quam venæ sectio proficit & vires nequaquam labefactat.*

XI. Unum superest, quod silentio celari non debet. Vermes epidemicæ hujus constitutionis animata potius concausa, quam organicum symptoma esse videntur: lumbricorum ovula bombycum ovulis ferme analogia cum mille aliis morbois corpusculis aëri, cibo, potui commissa ingeruntur: sed quia tunc acidum volatile gastricum, & bilis alcali oleosum lixivio-acre vel refracta sunt vel plane deficiunt, suo solent putamine vermes excludi & animalcula intra animal repunt, vascuntur, adolescunt & propagantur: nec tutus spatium est elephas. Horum regio sunt intestina, chylumque nostrum, qua absumunt, qua corrumpunt & vitiant: hæc tanquam in concavo ergastulo glomerata febrili hominis æstu succorum acredine & minutis quæ devorant paludum insectis in rabiosam feritatem adiguntur; omnis autem fera morsus habet quoddam virus. Initio, cum febris præsertim intermittit, vel saltem remittit, certe in truces stomachi atque intestinorum indigenas dirigenda sunt tela, quæ ipsos interimant simul & educant. An tunc mercurium dulcem, vel æthiopa minérale, diagrydium sulphuratum, & optimum rhubarbarum subtiliter trita oleoque scorponum Matthioli irrotata & cum syrupo persico aurique folio in pilulas coacta, & postea jus tenue recenti oleo lini adipatum exhibere fas sit, authoritati tuæ decernendum relinquimus. Porro sublimatum dulce vel æthiops mineralis, ut cinnabaris nativa, quam epilepsiæ magnetem Crato Archiater Cæsareus vocat, in ventriculo dissolutionem non patitur: nec febrilis ignis mercurium in sphaerulas adeo penetrantes vindicat, ut cerebrum nervos etfi cathartico ligatus aggredi possit: quin Ballonio, Fernelio, Poterio, atque Etmullero febris antidotum in mercurio latitare suboluit: corpuscula metallica, quæ a nexu suo & chymica temperie non defleunt, eodem gravitatis momento, quo vermes suffocant, & per saltico motu accelerato simul cum vermibus dejiciuntur: quare mercurius dulcis solet esse remedium epidemicæ dysenterix, quæ integros quandoque debellat exercitus, hæc scilicet a virulento vermium morfu originem capit, est ille vermium domitor: & plus quam radix Brasiliensis, quæ *Ipecacuanha* nominatur, ulcus intestinorum inflicto abstergit consolidatque. Rhubarbarum prætereâ & oleum Matthioli in vermium necem conspirantia viantia & balsamica rugis & mucro refertam, quæ villosa vulgo dicitur, intestinorum tunicam roborant, & dysenteriam arcant.

XII. Non amplius te moror Vir amplissime veritus ne tibi firmæ radio: cultus tamen erga te meus & devotio illud exigit, precor, ab oraculis tuis, ut mihi adversus febres malignas verminosas ab aere oriundas methodum aliquam peculiarem aperias tu, qui Principis valetudinem moderaris. Scio utique ex Græco Patre, quod impossibile est, statam, ac certam doctrinam in ipsa (in Arte Medica) fieri: tua tamen, quam mittes, consultrix epistola erit mihi instar pyxidis nauticæ in hac tempestate morborum. Nunc occasum plejadum, nunc pluvias, glaciem, boream, & quidquid anno hyemante circumstrepit, anhelamus: Nam æstivos morbos hyems succedens solvit, & hyemales æstas succedens transmutat. Asperriam hyemis naturam noxia paludum effluvia, quæ surgunt ætate, commendant: Habet has vices (Plinius junior) conditio mortalium, ut adversa ex secundis, ex adversis secunda nascantur. Paludem Maro descripsit, dum cecinit:

Hic specus horrendum, & savi spiracula Ditis
Monstrantur, ruptoque ingens Acheronte vorago
Pestiferas aperit fauces.

Hydra Lernæa a Leone Baptista Alberto Architecto Florentino scribitur, nil aliud fuisse, quam aquam stagnantem, quam Hercules perripuit aggeribus partim alio derivavit, partim soli exposuit desiccandam. Patrocinio tuo fovere me perge, & vale, atque iterum vale Pontifici Clementissimo.

XIII. Kal. Septemt. 1709. apud inclytos Carceres Cælestini Papæ V.

ERUDITISSIMO VIRO ANTONIO COCCHIO
de Medicina apud Hernicos optime merito Jo: Maria
Lancisus S. P.

Petis a me, Studiosissime Cocchi, ut tibi rescribam, ecquid de palustribus istis hærentibus aquis, deque inde ortis, frequentius hoc anno per æstatem grassantibus malignis, ut ajunt, febribus sentiam. Quid rursus agendum, ne libitina adeo impamiter tuos in agros defæviat, mihi videatur.

Sydenham Opera Medica.

II. Antiquissimam forte putavit aliquis querelam, quam apud me habes, & in qua vehementer doles, Ornatissime Vir, partem nempe Provinciæ, quam incolis, Ferentinum inter, & Anagninam palustribus aquis plus solito identidem inquinari. Etenim Strabo diligentissimus ille Romani agri descriptor, postquam lib. v. Geographiæ Latium a salubritate commendavit, loca excipit, quæ palustria sunt, atque morbosa, qualis, inquit, est ager inter Antium & Lavinium usque ad Pometiam, & Setini agri quedam, & circa Terracinam, & Circejum: quo sane locorum circuitu isthæc etiam finitima tellus comprehendi posse videtur.

III. Sed non omnia, quæ dolemus, eodem jure queri possumus: vel enim regio ista ob jugem aquarum scaturiginem, nulla hominum industria vincendam telluris humilitatem olim etiam canosa fuit, & culpa in eos conferenda est, qui primi coluerunt; vel propter temporum injurias (ut arbitror) non corrivatis sedulo aquis, in hujusmodi statum pervenit, & excusanda minus est posterorum, præsentiumque negligentia, quæ eosdem latices torpere sinit, qui apertis tum veteribus, tum novis scrobibus, & canalibus in amnes, ac mare tempestive derivari potuissent.

IV. Quid quod multi inducta paulatim exaggeratione, desertis palustribus locis prudentissime succurrerunt? Alterum excitandis lacunis, ac stagnis semper subservisse compertum est, scilicet alicubi vel non inventa circumstantis declivitas soli, per quam nascentis, aut influens aqua libere possit excurrere; vel importune occurrens major altitudo proximi fluminis, aut palagi, unde pigrum fluentum repellitur, quod illorum admisceri undis ad integrum paludis exhaustum oportet.

V. Caterum mirari desines, mi Cocchi, cur isthic hoc anno affluentior aqua tam dulcis, quam mineralis suis ex scatebris effluerit, & vicinos campos inundaverit: etenim dum algidissima (*) hyems aqueos vapores e terra excitari prohibuit, recens, exterumque nitrum abunde nimis insufum est. Ver autem pluvium subterraneas venas latices magis implevit; exinde sub æstatis initium utraque de causa potuit uberius lympham manare. Vidit phænomenon hoc ante mensem ipsa etiam Roma, timuitque, cum in valle juxta mœnia montis Cælii exigua cæteroqui scaturigo tantam aquæ copiam ocysime reddidit, ut brevi locum illum impleverit, & insectorum, amphibiorumque multitudinem admiserit, certo certius circumfusæ etiam atmosphæræ plurimum nocitura, nisi summa Clementis XI. providentia udam, sinuosamque vallem citissime aggesta terra oppleri jussisset.

VI. Inertes vero latices ideo tanto putore humiliora circa Anagninam, & Ferentinum loca infecerunt, quia iidem ex enormi diversorum qua vegetabilium, sensilium, & insensilium, qua etiam mineralium corporum missione inquinati, agitante solis æstu, corruptivum fervorem cum innumerabilium vermium exortu subire coacti fuerunt: quam sane fermentationem suis, quos desert, igneis salibus ipse quoque per æstatem sæpe flans auster adauxit, qui cum semper ex imis ad sublimia enitatur, ex palustribus, verminosisque aquis lethifera effluvia & abripit, & attollit, facile etiam ad montana Oppida evecturus, nisi eadem effluvia in altum sublata multum dispertirentur, ac partim ipso in volatu caederent, partim evanescerent. Unde fit, ut Patria tua, quæ situ eminet, innoxio cælo fruatur.

VII. Qua vero ratione hujusmodi labis semina, sive animata, sive inanimata castrenses, ac pestilentes febres gignant, & tu inuis, & nos latius in opere de noxiis paludum effluviis brevi edendo demonstrabimus. Nunc autem satis fuesit M. Varronis (a) sententiam, hujusmodi infortuniis pulchre accommodatam referre: *Advertendum, inquit, etiam, si qua erunt loca palustria, & propter easdem causas, & quod arescunt, animalia quedam minuta, quæ non possunt oculi consequi, & per aera intus in corpus per os, ac naves perveniunt, atque efficiunt difficiles morbos*, quos deinceps Columella (b) cæcos appellavit: quoniam subdit, *eorum causas, nequidem medici (nempe suæ ætatis) perspicere queunt*: non enim per ea tempora vermium ex semine, ovulisque propagatio tam clare patuit, sicuti nostro ævo, quo vulgi etiam sermonibus trita est.

VIII. Nec deest probabilis conjectura, exoticum liquidum nostris fluidis incongruum a vermibus, dum stomachum, atque intestina corrodunt, suas per tenues proboscides veluti per totidem syphunculos in albas, rubrasque venas, immo in nervos etiam magno cum ægotantium discrimine infundi. Accedit denique, quod per eadem ulcuscula multis aliis ab aere derivatis particulis suapte natura nobis insensis, latius (præter pneumonicum) iter aperitur in sanguinem.

IX. Triste sane experimentum consimilis epidemiæ Roma cepit. Superioribus annis, cum ad duo circiter millia hominum in Leonina Civitate propter stagnantes, corruptasque in fossis Hadrianicæ Arcis aquas verminosæ, & pestilenti febre trimestri spatium perierunt. Sed quemadmodum tunc temporis nobis accidit, ut funestis læta successerint: nimirum ingruentibus prope autumnale æquinoctium pluvias, ventisque in contrarium versis, ita vobis, deservescitibus posthac æstibus, arbitrator eventorum, & in antecessum gratulor. Cæterum cum furit ex paludibus morbus, initio præsertim æstatis, vix ullis remediis aut arceri penitus potest, aut reprimi; ne si Æsculapius quidem ipse, & Machaon propulsores, & curatores adessent. Unde ingenua, magnoque viro digna confessione scriptum nobis reliquit Hippocrates (c) in æstiva quadam constitutione, nihil memorabile suis ægotantibus profuisse, scilicet non ventrisurbationem, non venæ sectionem, neque quæcumque alia, quæ ipse tentavit, quem omnia cum ratione tentasse putandum est: habent enim effluvia ista certum incrementi tempus, quod plerumque tota æstate finitur, cujus decursu affatim irrumpentia in hominum corpora, quæ magis propensa sunt (sunt autem valetudinaria, aut quæ minus congrua vitæ ratione utuntur) duplici potissimum via (præter minus conspicuas) respirationis nempe, ac cibi penetrant, pariterque in fluidas, atque in solidas humani corporis partes debacchantur; sed cum plure incipit, æstusque temperatur, tunc certe palustribus humor, imbribus dilutus, ut docuit Columella (d) citius mitescit, & flantibus ventis a septentrione non solum lethifera subsident in paludibus exhalationes, sed quæ jam in aerem sublata fuerant, alio converti solent, ac dissipari.

Agg. Latini
para an-
tiquitus
etiam ob
palustres
aquis in
fama la-
borabat.

Vel
suapte
natura
palustres
est regio
vel inco-
larum
negligen-
tia, quæ
potissi-
mum ac-
censanda
est.
Inertium
aquarum
causæ,
vel re-
gionis
humili-
tas, vel
palagi, &
flumi-
num al-
tutudo.

Quibus
de causis
abundan-
tior hoc
anno tam
dulcis
quam
minera-
lis aqua
fuerit.
(*) Con-
sule hi-
storiam
epidemiæ
ortam ex
constitu-
tione al-
gidissima
hyemis
anni
1710. a
nobis
descri-
ptam, &
in calcæ
operis de
Rom.
Cælii
qualita-
tib. ad-
nexam.
Ex va-
riorum,
ac mina-
torum
corpo-
rum
missionem
infectis
aquis so-
lis æstu
pestiferi
vapores
attollun-
tur.
(a) Lib.
1. de re
rustica
cap. 12.
p. 107.
M. Var-
ronis
sententia
de palu-
dum ver-
minibus
qui mor-
bos gi-
gnunt.
(b) Lib.
1. de re
rust. c. 9.
pag. 23.
Colum-
ella
idem si-
gnificat.
Quo pa-
to ver-
mes hu-
manum
corpus
infectos.

Epidem-
ia Ro-
mana in
Urbe
Leonina.

Æstatis
initio
morbus
curare
difficile.
(c) 6. Ep.
sect. 7.

(d) Lec-
c. 1. 1.

Quarta-
tione
curatio
infi-
randa.

(a) i.
Ep. scd.
De
ver. Me-
die. n.
17. Medi-
cus gu-
bernatori
navis
ab Hip-
compara-
tur.

Purgan-
tia in
hisc fe-
bribus
nisi ab
initio,
raro pro-
funt.

Specifi-
cum
harum
februm
pulvis
China
cum oleo
Matth.

Quibus
in ca-
bus absti-
nendum
sit ca-
thartica.

Reme-
dia præ-
scribuntur.

Vesican-
tia pro-
ficia,
&
quando
Quibus-
dam, &
quando
venæ
sectio u-
tilissima
fuerit.

(b) 6
Ep. scd.
6.

Alia re-
media
adap-
tur.

Reme-
dia ne-
candis
venibus
ex china
& acidis
cardiacis
paranda.

X. Ad curationem porro grassantis morbi, quod spectat, illam
ru quidem sua duxisti via, partim infusum venenum detrahendo,
partim corrigendo, partim etiam volatilizando, ac dissolvendo.
Sed quoniam mala sæpe sæpius artis vim elidunt; propterea illud
Hippocratis. (a) ob oculos perpetuo a nobis habendum est, si non
profis, saltem ne noceas. Ac rite quidem divinus Senex (b) Medi-
cum gubernatori navis comparavit: quemadmodum enim ille ma-
gnis in tempestatibus ita gubernaculum, & vela moderatur, ut
ventorum impetus, secundos quidem excipiat, adversos vero decli-
net, vel ne illidatur scopulis, vel mergatur undis: Sic ptolesio
solers Medicus nunquam nimia cupidine celerioris curationis, mul-
tiplicandis cum temeritate, vel confusione remediis, adduci debet:
sed ita diligenter naturæ motus observare, ut salubribus faveat,
noxiiis obsistat, ægrumque translatione saltem in chronicum mor-
bum (quod est hac in re, ut admodum frequens, ita summope-
re utile) ad salutis portum utique perducatur. Exinde fit, ut hu-
jusmodi in febribus, raro purgantia, nisi ab initio, & quidem cum
absente diarrhœa, quotidie remiserint, aut alternis diebus rigore,
aut saltem frigore exacerbentur, juvare solent: tunc enim, quo-
niam non levis febrilis fermenti portio hypochondriorum glandulis,
quæ in primas vias hiant, hæere solet, non ægre illinc blandis
subito emeticis, aut dejectoriis evellitur, ut inde locus fiat usui
chinæ-chinæ guttulis olei Matthioli irroratæ, tanquam specifico
hujus pestilentia alexipharmaco, quod experimento quoque utilif-
simum compertum est apud illos, qui continuis quanquam febrili-
bus, gelido tamen artuum frigore laborant. Sed hæc purgatio non
nisi prima, aut secunda die laudatur; postea vero, quoniam sæ-
pe (excitata diarrhœa, vel dysenteria) ad alvum confuit mali-
gnus humor, ab omnibus purgantibus pene cum superstitione ab-
stinendum est, solisque diaphoreticis, & alexipharmacis utendum.

XI. At vero si febris servaverit ideam continentis, stipeturque
delirio, lethargo & convulsionibus, nullumque urgeat extremorum
frigus, quoniam significat acre, malignumque fermentum majori
ex parte intra sanguifera vasa furere, atque in præcordia, cere-
brum, & nervos impingere, purgantibus exasperari solet, etiam si
nausea, ac vomitu æger vexetur, exigique tantummodo blanda,
crebraque enemata, stillantias aquas, vel simplicia, quæ longa
vocant jura acido volatilia, ex decoctione rad. scorzonæ, pim-
pinellæ, gramin. contrayer, acetosæ, ac foliis contusis fenchii: po-
pulari pariter emulsiões ex semine melon. cardui sancti, & amy-
gdalis, additis temperatis diaphoreticis, & cardiacis, modo ex si-
bio diaph. succino, & camph. modo ex cornu cervi, ac lapide be-
zoar. vel guttulis spiritus sal volat. sal armon., modo ex confe-
ctione hyacinth. de Alcher, ac potissimum diascordio Fracastorii:
quinimo cum primum coacti alicubi sanguinis indicia apparuerint,
aut etiam tinctura rite præparata, vel spiritus mannæ, quem vi-
tæ appellant, ægris exhiberi potest. Sed vesicantia præcipue non
solum artubus, verum etiam cervici tempestive, atque utroque in
casu, modo absit dysenteria, admovenda erunt.

XII. Hoc forte tibi mirum videbitur, quod quanquam in ma-
ligna ista febre viperæ dentis instar censeatur phlebotomi lanceola;
nihilominus tamen ægotantes plethorici, qui eadem febre cum do-
lore capitis, pulsusque magno, & æquali corripuntur, secta venæ
frontis, vel jugulari, tunc maxime cum majore mentis motione,
soporeque, immo parotide premerentur, quandoque levati fuerint:
sectiones enim istæ (modo extremorum frigus absit, & vires con-
stent) accensentur illis, quas laudat Hippocrates (b) & proximi
ventris appellat; evacuant nanque, & revocant in præcordia, ac
subinde in vitalem circulum multas cruoris partes, quæ piceam;
& quasi non dixerim, polypeam consistentiam nactæ; sinibus du-
ræ meningis, atque universæ propemodum cerebri superficiei, pe-
rinde quasi supreni, mortalesque decubitus pertinaciter adhæserant,
atque illinc deturbati naturæ opera non solent, nisi magno, ac
plerumque irritò parotidum conatu.

XIII. In eundem pariter scopum collimant non solum viscera
recens mactatorum animalium cranii futuris adhibita, utpote quæ
proprio sale oleoso-volatili illas sanguinis particulas diluunt, leniunt,
ac submovent, quæ summo capiti erant defixa; verum etiam ac-
curbitulæ siccæ, atque adhuc semel scarificatæ, si opus fuerit, ac
præ cæteris frictions per totum morbi cursum, innectis manibus
oleo amygd. & Matth. cum camphora identidem repetitæ torpescen-
tibus liquidis naturales motus inspirant.

XIV. Sed vereor, ne tu arguas, mea ex memoria discessisse re-
medium maximopere necessarium pellendis, necandisque vernibus,
quod forte primas in hoc morbo tenere debuerat. Porro illius non
sum oblitus, sed valde dubito, ne, dum pharmacum, (præterquam
ex amaris vegetabilibus, china præsertim atque ex acidiusculis car-
diacis) quarimus, venenum inveniamus, quod ægros citius quam
vermes perdat: mercurialia enim in tanta naturalis œconomia con-
fusione nervorumque potissimum oppressione quid quaso alium,
nisi mortifera in cerebrum inducta epigenesi novas turbas facere
possunt? Igitur in alexipharmacis, ipso in tempore, denique in
naturæ præsertim solertia, quæ docta est sine magistro, spem o-
mnem collocare oportet, ut filii Patris simus, qui nos admonuit,
ut saltem non noceamus. Nanque medicina est quoddam experi-
mentaliter prudentia genus, quæ vix doceri ab ullo potest, tota fe-
re sedulo peritoque ab Artifice in arena ipsa invenienda ac tra-
ctanda est. Macte igitur animo, mi Cocchi: sed dum aliorum va-
letudini incumbis, fac ut tuæ quam diligentissime servias. Romæ
prid. Kal. Sept. MDCCIX.

NON NULLA DE TERRÆ MOTU.

CAPUT II.

Illustrissimo Domino Jo. Maria Lancisio Sanctissimi Patris
Clementis XI. Archiatro & intimo Cubiculario
Antonius Cocchi S. P.

Plane deerat quid ad te scriberem, nec habebam a te quid ex-
pectarem Vir Amplissime. Sed tremor copiosus & triste at-
tulit argumentum. Festo die Seraphici Patris nempe IV. Nonas
Octobris secunda noctis hora vehementius consueto mota est terra,
& parum absuit quin nova Cassia solo iterum æquaretur; cælo in-

terdiu sereno signum a Plinio commentatum tenuis linea nubis in
longum porrectæ præcesserat. Motus ille non fuit subsultus, idest
deorsum sursum concussio, nec lateralis hinc inde vibratio, sed
unam tantum partem sine vibratione propellens ruinam superstru-
ctis ædificiis minatus est, & pertinacior sane fecisset pessimum o-
mnium motus & demolitor, utpote per quem non restituitur cen-
trum gravitatis ædificiorum ut immineat suæ basi; horrenda tamen
reliquit vestigia, altæ rimas, immanesque parietum hiatus, & a-
lia ruinarum initia: prægnantis arenæ fœtus, seu potius vegeta-
bilia monstra nullo caule, nullisque radiculis firmata, nempe tu-
bera inter gulæ delicias habita, non rostrante sue, sola montium
concussione detecta sunt. Si epistola est quædam longinquæ homi-
nis representatio, pallentem me, squalidumque trepidare jam vi-
des. Sextum Hippocratis librum de morbis popularibus legebam,
cum cæco velut mugitu oborto; crepitante domo parietem in me
nutare animadverti, & saxa veterem libertatem, pene dixerim,
affectare, ut me adhuc vivum absconderent, tumularent, obtererent.
Addidit fuga periculum periculo jam malo, scalas enim non pe-
dibus, at strato per lapsum trunco decurrimus. Viri, & puellæ
extra domos, & se ipsas promiscue vagabantur, & passim matres,
quo se, & infantes e cunis ereptos reciperent, ambigebant. Bea-
tæ Ritæ Vestales, & alia aliorum Ordinum vittata capita, sicut
rescivimus, a male tutis claustris recedere cogitabant. Fugientes
secuti sunt ægri ægritudinis suæ obliti, cum malum impenderet
atrocius, cui nec Principis providentia, nec Medicorum solertia,
nec ipsa natura, quæ nobiscum cohabitavit, potest opitulari. Vo-
ces ad Deum sanctum, fortem, atque immortalem emissæ, lacry-
mis, & suspiriis intercissæ undique resonabant. Non externæ gen-
tes, non Asia in nos sævit, nunc magna pars nostri metus est
domus ipsa, quam colimus. Sic afficit timor, ut neque diurna
negotia, neque nocturna silentia cum securitate permittat: Gra-
vior propterea somni vis ad lectum nos, tanquam ad paribulum
trahit. Crebras terræ commotiones in hac Reipublicæ Sede (titu-
lum duntaxat reliquit Roma,) & brevibus pagis ex consensu
continentis cum ignivomo Italiæ monte Vesuvio accidere Patri-
tii Cassiani opinantur, quasi inde minerales particule sulphureæ,
ac nitrosæ igneo vortice per subterraneos cuniculos deriventur.
Travaginus Nobilis Venetus, ut ex Nicolao Cyrillo strenuo Cartesii
sectator, & Medico solertissimo Neapoli accepimus, asserit, &
veri non citra similitudinem, nimirum quando terra deorsum sur-
sum concutitur, ibi terræmotus fieri per essentiam, ibique ma-
gnam effluviarum copiam reperiri. Ego testari possum, quod in
Cassiano solo mitior est, & frequentior talis concussio. Porro aer
intra specus, & cavernas inclusus volatili efferoque veluti agmine
occupatus, ac rarefactus, dum ejus spirulæ te se angustiis expedi-
re nituntur, majorem hic, quam alibi renixum offendit, seriem
videlicet, & solidissimam, imperviamque compagem montium,
quorum alpina juga rangere cælum videntur. Unde nec mirum,
si elastico, prævalidoque impetu solum eluctatus ædes quatit,
prostrat, disjiciat; nam juxta egregiam Plinii analogiam, nil aliud
fere est in terra tremor, quam in nube fulmen, & tonitru. Et
quidem fulminis primordia esse nitrum, sulphur, & ramenta ter-
restria, ostendit Cartesius: cava nubes, qua exhalatio sulphurea,
& nitrosa includitur, instar bellici tormenti, exhalatio vero ut
pyris pulvis se gerit, quæ dum nubis claustra disrumpit, aerem
circumjectum valide commovens, fragorem edit non illico interi-
tuum, nempe tonitru, & coruscationem, seu fulgur explicat, eo
quod materia primi elementi, quæ celeri, & largo confluxu nubem
inferiorem pervadit, ex angusto sinu, & tortuosis anfractibus vi
refluere in liberiores aereæ cogitur: explosum fulmen sive recta,
sive oblique in terras ruit, impetu secum ferente lapidem pene
metallicum ex accensa mistura concretum; tælum nempe, quod non
Cyclopum incude, sed naturæ magistro tornatum est. Pari omni-
no mechanice accidit & terræ tremor, & subterranea fermentatio,
vi cujus terra concutitur: ignis tam in atmosphæra, quam intra
terram eliditur ex violento partium motu, quem libera excitat
primi elementi materia. Sic ubi fœnum pluvis humefactum, &
sole non bene siccatum reponitur, sponte solet accendi, non sul-
phure, oleo, nitro, quo abundant plurima herbarum cadavera:
aqua ansam præbet accensioni; nam ejus moleculæ tanquam parvi
cunei fœni poros ita constringunt, ut expulsi globulis sola, & ef-
fractis remaneat materia primi elementi, quæ eo usque pernicio-
simum motum exercet, ut demum tumultus oculis pateat, sub for-
ma ignis. Insinuare non possum occulta ignis semina in fœno,
quæ ob præsentiam aquæ interius simul confugiunt, & cumulan-
tur, licet ad antiperistasis, seu circumobfessionem contrarii recur-
rat antiquitas: pulvis enim pyrius, qui ex carbonibus, nitro, ac
sulphure confectus est, quamvis madescat, accendi nequit. Non
sufficit itaque si cuneus in asseris rimam indatur, ad asseris di-
scissionem; requiritur malleus cuneum ipsum percutiens, impellens-
que, ut scilicet asseris partes ex motu dividantur. Sed ut ad tem-
meam redeam, aer in terræ sinu coacervatus, pressusque, ac ten-
sus quadam stagnatione concrevit; si vero ignis salibus impetitur,
tunc adeo tumet, & æstuat, ut veteris loci veluti carceris impatiens
quæ magis resistunt, vehementius dimovens, & non raro etiam ef-
fringens, viam vi molitur. Dicere superfedeo, quæ redolent me-
teoristam, ne dissertationem de terræ motu, quam fervidus, &
dubiæ lanuginis adolescens exaravi, importune retexam: pagellis
istis augurari poterat Censor, quæ libro suo olim cecinit Venuſinus.

Contrectatus ubi manibus sordescere Vulgi
Cæperis, aut tineaſ pasces taciurnus inertes,
Aut fugies Uricam, aut unctus mitteris Ilerdam.

Illud autem omittendum non est, quod nos alienæ valetudinis cu-
stodes ac vindices quotidie periclitamur: tonat enim assidue terra,
& quod habet præcipuum perdidit, flare. Huc venimus ut tibi
Proteſtor optime pareremus, & paruisse tibi nonne est quoddam
efficax orandi genus, ut nos in occupationis exilium missos plenum
discrimine quamprimum liberes? Ignosce quod curas doloremque
animi tibi sæpe narramus; nam ipsa narratione dividimus. O-
mnem spem in gremio potestatis tuæ ponimus, & tua summam
apud Principem potestatem non aliud desiderat nisi velle. Me dilige
ut te diligo. Vale. Idib. Octobr. 1716. Cassiæ.

Jo. Ma-

Turex
tunc
temporis
corcy-
ram obsi-
dione in-
fecta
bant.Dissem-
p. Me-
teor.Ep. 1.
Nb. 1.S. Gre-
gorius
cum ad
Petri
Sedem
evehit
fuit ita
de se ipso
plorans.
scripsit l.
1. ep. 6.

Jo: Maria Lancisus Antonio Cocchio suo S.

Clem.
XI. Ne-
pos me-
ritissimus
hodie S.
R. E. Car-
dinalis.

NE me putes, Cocchi suavissime, ideo tuis literis ab Idibus Octobris ad me scriptis nondum dedisse responsum, quod vel te ex memoria depoluerim, vel propter curarum vim, quibus plerunque gravor atque interpellor, causas responsioni neccere morasque injicere velim: non enim unquam quoad vixero aut amicorum, tui praesertim similitum obliviscar, aut ullis occupationibus impediari, quominus successiva saltem tempora ad rescribendum subripiam. Porro diuturna primum ad Castrum Gandulphium apud inclytum Abbatem Alexandrum Albanum rusticatio mea effecit, ut tuas nisi post secundam hebdomadam acceperim. Deinde quoniam in reditu ad Urbem inveni pluteum obrutum atque onustum sexcentis ferme qua epistolis, qua dissertationibus, quae ab eo die, quo hinc discesseram, fuerant aggestae, non parum certe laborandum mihi fuit, ut ocyus ab ejusmodi negotiis me dissolverem. Nunc itaque ut potui, expeditus, totum me tibi trado.

Molestissime fero, te isthic nutante solo dies, noctesque cum timore, vitæque discrimine penitus vigiles transegisse. Quis enim hujusmodi casus, in quibus sæpe propter ædium ruinam vivi homines sepeliuntur, suisque membris contusis, ac laceris diu supervivunt, aut dissimulare possit, aut non dolere?

Sed quanquam hoc inter dira, maximaque infortunia referendum est; ubi tamen autumno abeunte firmatam isthic tellurem jam videris, quod contigisse speraverim, gratulandum tibi potius, quam indolendum arbitror, non tantum quod sospes divino favente Numine evaseris, sed potissimum quia & oculis, & animo, quæ olim de terræmotu eleganter scripsisti, lustrare secundis curis, & quidem sapientioribus, ut scite Euripides; causasque omnes, ac discrimina diligentius exquirere, rimarique poteris, quas nemo absens, nisi fallacibus conjecturis assequi valet. Ut enim cum Plinio minime dubitandum reor, quin ipso in terræmotu idem eveniat, ac inter nubium tonitrua fulmen erumpit *incluso spiritu luctante, & ad libertatem exire nitente*: ita sedulo animadvertendum investigandumque adhuc superesse cenfeo, quomodo in terræ cuniculis pyrius veluti pulvis cumuletur, & quare data occasione incendatur, perque certa solum loca, eaque interdum montana illico erumpat, atque profiliat. Loquor autem hic de vero motu terræ, non de solo tremore, qui ex consensu illius telluris, quæ urgetur, truditur, ac dehiscit, fieri consuevit. Accedit vero non leve gratulationis argumentum, quod omnia, quæ nobis adversa contingunt, a christianis præceptis ad nostram vel animi, vel corporis utilitatem referenda esse doceamur, scilicet ut magis perfuncti periculis tales, hoc est probi, justique perseveremus, quales in ipsis discriminibus sumus, nosque futuros pollicemur. Cæterum curabo, atque enitar, ne de spe, quem jure in mea erga te existimatione, ac benevolentia habes, unquam depellaris. Vale. Romæ Idib. Novembris 1718.

DE IMMANI HYSTERICO AFFECTU.

CAPUT III.

Illustrissimo Domino Jo: Mariae Lancisio Clementis XI. Archiatro, & intimo Cubiculario Antonius Cocchius S.

Hipp.
lib. 2. de
morb.
Mulieb.
Bellin. de
morb.
Fest.Hipp. I.
de offic.
nar. de
caus. di-
tina.
morb. I.
2. c. 2.Differ.
ad Spoo.De Gy-
næcio.
l. 2. c. 8.

SACRA Vestalis in Cœnobio B. Ritæ annor. xx. quadrati habitus, & biliosi, ut ajunt, temperamenti Idibus Maji post insuetum quendam laborem correpta est repentina faucium angustia, crebro altoque suspirio, & cordis & arteriarum palpitazione, cui quælibet pulsus differentia conjungitur: obmutescens ac pene exanimis humi procubuit. Attingit orthopnœæ gradum difficultas spirandi: persistunt adhuc præcordiorum angor, suspirium, abolitio vocis, sicca tussis, capitis dolor & interdum vertigo: *& cor vibratur*, & vibratione cordis costæ videntur extrudi, cum reapse cor in epileptico motu sit, *& feriat pectus, eo quod supra suam basim assurgens cuspidem ad costas peringit*. Agra circa septum transversum, quod est microcosmi horizon, se fascia muniri velle, ut satius spiritum ducere possit, frustra nititur exclamare: modo pallor, modo rubet, corde scilicet *astringente venas ac laxante*, quod intelligo etiam de arteriis, & addo Cappadocis verba: *Sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color*. Inter deglutendum torpescit œsophagi circumpulsio, & non raro cibus medio in itinere interceptus cogitur eo redire unde discesserat. Assumpto cibo tenduntur & murmurant hypochondria & coacervantur suspiria; auctos tum nec regulares pulsus silemus. Prima hora somni somnum excutit & experrecta surgit pectore anhelato, palpitante corde, & quasi injecto laqueo suffocari se putat, ut iis solet accidere, qui pectoris hydropse laborant: artus frigidi sunt: sanguis per extremas arterias præpedita circulatione: pigra est alvi dejectio, urina parca & tenuis: catamenia jam pridem subsisterant, & liquid effluat, fluor est albus: convulsis enim lacertis Malpighio nostro descriptis, qui vasorum oscula in concavum uteri fundum hiantia sphinctericum quasi rete amplectuntur & stringunt, non cruor, sed pars ejusdem serosa delabatur. Secta est vena cubiti, secta est & saphena. Quæ autem tensis crispatisque solidis blandiuntur, quæ succos hysterico-acres retundunt & diluunt, quæ tandem lunare tributum exigunt, non prætermisi. Sed nullum hæcenus vel parvum levamen. Vereor ne ob spasmodica diuturna, quæ intra thoracem præsertim vigent, laxentur tandem *sanguiferi tendines seu arteriosa suspensoria* quæ cordis prolapsui reniti debent. Tuam igitur, Lancisii Clarissime, opem imploramus: simulator enim hic morbus sæpe sapius prodit in publicum vultu non suo. Reticere nolo quod Ludovicus Mercatus duorum Hispaniarum Regum Philippi Secundi & Tertii Archiater sapientissimus innuit, *quibus si adhuc addideris sexus differentiationem optime moliri, quam esse Medicum*.

Singulare inrerim gaudium, quod ex valetudine Clementissimi Principis a te iterum restituta percepimus, metum temperavit, quem crebrior atque immanior tonantis terræ concussio, & quem præcipue duplex hefterna una, mane iero altera, intulit nobis, quique justissime extorres domo nos fecit. Omnes lymphatorum ritu excurrerant, cum ædes undique titubarent, recta obstreperent & humus discedere sub pedibus videretur. Plorantes mulieres ad preces, ad vota conversæ sunt. In plateis & agris tentoria passim offendimus, sed quæ composuit tumultus & timor, illi similia quod Lucanus describit.

Sydenham Opera Medica.

Rectorem dominumque ratis secura tenebat;
Haud procul inde domus non ullo robore fulta,
Sed sterili junco cannaque intexta palustri
Et latus inversa nudum munita phaselo.

Phars. I.

Porro, ut Jeremias loquitur, *cogitavit Dominus dissipare murum* &c. *et tendit funiculum suum & non avertit manum suam a perditione*. Tum Cassia, tum Nursia ejusdem calamitatis consortes, quæ hoc nato recens sæculo ceciderunt, jam nunc in novis ædificiis alte dehiscunt: imo aliquot Oppida Nursinæ ditioni subiecta, nempe Abbatia Sancti Euticii, famosa Lithotomorum Patria vulgo *le Preci*, Tukuranum, Saccovesium, Villa Crucis, Castrum Vetus & alia, si non prostrata sunt, fere in ruinam propendent. Vale iv. Kal. Jul. ann. a Virginis Partu 1719. Cassiæ in tentorio.

LANCISIUS COCCHIO SUO S.

MIROR profecto, amicissime Cocchi, te internutantis terræ metus artubus, ut arbitror, trementis stylum tam firmiter stringere potuisse, ut morbosam istius Sanctimonialis historiam quam diligentissime ad nos scriberes. Ego enim in urbe eodem, quo vos die, ante XII. horam ex terræmotu tanto quidem terrore percussus fui, ut nisi Sanctissimus Princeps ex gravi morbo nondum satis convalescens animum meum valide retinisset, ab Aula statim ad tentoria confugissem. Itaque cum repentina formido & tibi, & mihi communis fuerit, neutri certe dolendum erit, præsertim ubi cogitaverimus, nihil nobis, aut aliis solidi mali contigisse. Agamus itaque singulares Deo Opt. Max. gratias, & lati posihac in Domino vivamus.

Ut vero ad casum a te propositum descendam, non dubito quin duobus abhinc mensibus Sacra Vestalis propriis jam destituta catemeniis, per eum, quem narras, corporis laborem, uteri, ac proximorum ovariorum recrementa ad præcordia, atque ad cerebrum magnam partem repentino cum impetu traduxerit, locumque fecerit Hippocraticis effato in lib. de Virg. morbis. *Sanguis non habens effluxum præ multitudinem refilit ad cor, & ad septum transversum*, addimus nos, ad cerebrum: *cum igitur hæc repleta fuerint, cor satum fit, deinde ex satuitate torpescit*; & quæ sequuntur. Omnia symptomata, quibus angitur isthæc Virgo, suboriuntur partim ex acri sanguine per ipsa præcordia circumvecto, ac musculares vasorum membranas, diaphragma, cor, & pulmones pungente, & sodicante, partim ex stygiis pene ichoribus, qui cum liquido animali sunt per nervos splanchnicos, illosque præsertim, qui ex gangliis a me nuper detectis ad interiora pectoris divaricantur. Nota hic obiter, ganglia esse olivares plexus in truncis nervorum, ut nodi in arundine, seu quædam esse veluti cerebella extra cranium locata, ipso tamen cerebro robustiora, pia, crassaque meninge involuta ad musculos, qui libero motui magis resistunt, superandos constructa: en ratio, cur nervi, qui ad motus organa feruntur, partim cum, partim sine gangliis occurrant. Stygi pene ichores liquido animali permixti non possunt non villos nerveos, retiaque villosa irritare, & in convulsionem adducere: quamobrem immanis hysterica affectio nascitur, & perennat; neque porro spes est, fore, ut remittat, & cedat, nisi tollatur causa, & ad causæ principium, nempe ad uteri vias tum convulsas laxandas, tum obstructas aperiendas perveniat. Quoniam vero effecta plerunque ante ipsam causam in morbis saltem moderanda sunt; idcirco, cum certissimum sit, viscera omnia tam thoracis, quam abdominis convulsionibus tentari, summamque credinem fluidis omnibus esse communicatam, omnium primum a laxantibus, ac retundentibus curatio inchoanda erit, ut tuto postmodum ad deobstruentia, atque ad emmenagoga recurratur.

Differ.
apud
Morg.
agnum in
Adversar.
ius Ana-
tomica.

Quod autem attinet ad emollientia, nihil est opportunius oleo amygdalarum dulcium recens ex decorticatis amygdalis sine igne expresso, quod ad uncias duas, addita uncia una olei pariter recens ex melonum seminibus extracti, exhibetur in jure antelucanis horis per xv. vel xx. dies: propinaturque ante cenam drachma una optimi spermatis ceti; atque interim singulis vespertinis horis injiciendam putarem per alvum decoctionem omenti vervecini in jure paratam ad uncias tantummodo viii. vel x. ut nimirum contractum tam colon, quam uterus molliatur. Abstineat interea temporis agra a vino, & abstemia saltem in annum persistet, caveatque ab omnibus acidis, acribus, frixis, caseo, leguminibus, omnique sapido alimento; sumat jura subtilia ex hœdinis, vitulinis, aut vervecinis adenibus deprompta, saltem ad libras duas, hoc est post duas horas ab hausto oleo amygdalino: oleum liquidum, ac jura contractas partes emolliunt simul, & exotics sales cicurat. Post hæc locus erit infusioni drachmarum vi. cortic. myrobalanorum paratæ in libra una feri capilli, vel juris subtilis: mire enim valet infusum hoc ad extrahendas tincturas salium acrium austerrum, seu convulsiones inducentium.

Ab hac deinceps leni purgatione tutissimo aliquot anthysterica præsidia adhiberi poterunt, inter quæ præstare semper mihi visa est, præter chinam chin. & bezoarticum joviale, sequens mistura.

2℥. Aq. tot. Citr.

Meliss.

Nuc. virid.

Ceras. nigr.

Et Theriacal. ana unc. i.

In his ignita camphora sæpius extinguatur; additur vero vigoris gratia parum aquæ hystericæ Quercetani, & nonnihil laudani liquidi: exhibenda est cochleatim bis aut ter in die, sed præcipue cum profocativus paroxysmus recurrit.

Cæterum ad mensium reditum promovendum assidue conducunt jura ex radicibus temperatis parumque amaricantibus cum nodulo chalybis, nec non hemicupium aquæ dulcis, in qua radices althææ, folia malvæ, violar., & parum artemisiæ floresque sambuci, incocta fuerint. Quod si vero aut convulsiones minime cedant, aut catamenia adhuc subsistant, vesicantia femoribus admovenda & pediluvia, frictions & cucurbitulæ sæpius infernis partibus adhibenda erunt. Tu interim, mi Antoni, memineris moniti Hippocratici in mulierum nempe curationibus *Numen semper esse implorandum*, & cum eadem fuerint virgines aut viduæ procurandum, ut se Sanctorum meritis voveant: ita enim per summam confidentiam earum cor cum arteriosis tendinibus undique laxatur; quo fit, ut interdum etiam citra miraculum, Deo adjuvante, ocyssime convalescant. Vale.

Romæ 3. Nonas Jul. 1719.

DE SEPULTO INTRA PECTUS ANEURYSMATE.

CAPUT IV.

Illustrissimo ac Sapientissimo Viro Jo. Mariae Lancisio Clementis XI. Archiatro intimo Cubiculario Antonius Cocchius S.

Cassianus juvenis ad quintum ætatis lustrum pertingens salino sulphureæ constitutionis minuta & sicca scabie infestabatur, quæ cum morderet acerrime & ungui operoso importune imperaret, urticam hanc pertæsus æger adipato malagmate intra corporis pomæria repellere non dubitavit: mense Augusti anno 1717, in febrem incidit lentam sterili com Tussi, dyspnœa & macie; porro ea quæ comedebat, invito ventriculo ingerebantur, & non longe a pascu crescere febrilis motus sine ullo artuum frigore deprehensus est: pulsus celeres, duos, & contra quam fieri solent, magnos exploravimus, & veluti miniatis in ipso vultus pallore genis manuum pedumque volæ æstuabant: exul erat instigator somnus, ipsum namque obrepentem tussis ut hostis ad excubias posita undulatorio tremore nerveas cerebri fibras concutiens depellebat: in urina licet naturalis color exhiberetur, rotunda tamen seu oleosa corpuscula natata, & divulsam hypostasim subsidere non semel aspexi. Nescio quæ dejectoria & postea non Haly Abbatis pulverem, sed species aromaticorofatas natu major collega præceperat; quinto Idus Septembris ad trutinam revocata sunt curativæ indicationes. Prima, convulsivum & strepens symptoma, quod tussis est, ac faucium ariditatem compescendi; & ideo eclegmata e recenti oleo amygdalarum dulcium syrupo violaceo & paregorica Sydenhamii tinctura lambebat æger, & amico gelu de cornu cervi identidem se recreabat (venæ autem in cubiti flexura incisio convulsis intra thoracem canalibus diametrum celerius reddere potuisset, imo & pulmonici infartus administram tussim levare teste Junghenio.) Altera, tuendi & sanguinis ligamina & pulmonum quoque compagem, ne in tenero & ampulloso parenchymate eadem ulcuscula suborirentur, quæ sal acre pforicum modico fero dilutum in extrema superficie tubulorum cutaneorum fines excedens insculpsit, & ideo bolos istos deglutiit.

24. Sperm. Cet. non rancid.

Antihæct. Poter. a scrup. ss.

Cortic. Peruv. ver. & in subtil. pulv. redact. scrup. 2.

Bals. sulph. anisat. gutt. 3.

Syr. hed. terrest. q. s.

Coge in bolos tres & inaura.

Tertia demum, rectificandi renutriendique; & ideo jus Septali viperina carne animatum adhibuit, ut nempe salino acres particulæ sale volatili pingui & balsamico ad peripheriam reducerentur vel transpirarent, ut effœta liquida exaltarentur, ac in solidis elastica virtus resurgeret; pulmenta ex farre præsertim & rapis Curii quondam cupediis usutpat, in potum vero aquam cum redolentium malorum frustulis & scandalo citrino decoctam substituit. Hac sane methodo strigosus homo & jam lentis colorem referens convaluisse propemodum videbatur.

II. Sinat, vir amplissime, conniventia tua me breve scholium de morbosa epigenesi ejusque symptomatibus adjicere. Hæctica fermentatio succensa est ob interceptionem in sanguine rabidi salis, quod novas sibi vias aperiebat; sanguinis ipsius contextus lento ulcere dissolvi & alcalino acre fermentum in pulmones devolvi cœpit: distentis ac turgidis pulmonum vesiculis & adenosâ trachæ tunica suctionis ritu compressa irritatis naturæ serum exprimi consueverat; hinc tussis: cylindrus aeris cartilagineam seu dialecticam tubam ingressus cum minus spatii & non parum renixus in pulmonibus offenderet, sanguinem per venam pulmonicam refluxum satis premere non poterat, nec promovere, ut ad sinistram cordis alveum perveniret: hinc difficilis respiratio, seu dyspnœa, imo & asthma: anorexis aderat tum ob atonas ventriculi rugas, tum quia gastricus succus non acido-volatil, sed acer, & iners & vitiato sanguine manabat: sitis, nam asperæ cum saliva particulæ tale quiddam nerveis œsophagi, ac faucium villis inurere aptæ fecerantur: æstus non longe a pascu febrilis motus, subrepsit, & crebrior pulsus, malarum rubor hilaris, extremorumque æstusio forsan acciderant, quia novus chylus adhuc rudis in subclavia sinistra vena turbæ salium fundentium occurrens per densiores suas moleculas aliquandiu renitebatur; fufus tandem, nec sanguini assimilatus in aeris, & urinæ fistularum affatim ruebat; subdit Bellinus similitudinem: *Quemadmodum autem candentia ferramenta densa frigidis aquis easdem in fervorem concitant, vel aqua eadem frigida inaspera prunis ardentibus fervorem pariter concipit: sic chylus ab assumpto cibo genitus statim ac in fervidum sanguinem derivabitur, quaquaversum agitur per minimas suas particulas &c.* hinc motus organæ, quæ muculos dicimus, butyroso nectare defraudata sunt, & aruerunt. Scabies, impetigo, & aliæ hujusmodi crustaceæ affectiones sunt (ait Hippocrates) turpitudine magis, quam morbi, imo nos a morbis majoribus vindicant; si vero empirice repellantur, mutato situ, mutant & nomen, & morbi nomen acquirunt: id quod male cautus Atheniensis propria calamitate confirmat, *transgressus autem ad Melum, ubi sunt calidæ balneæ, a pruritu quidem, & cutis crassitudine liberatus est, verum hydropicus factus occubuit.* Ad historiam, quam reliquimus, revertamur.

III. Dum febrilis ignis, qui simul ignave & atrociter extinguit vitam solet, extinctus esse putaretur, sinistram latum micare non desinit (cum Cicerone dicam) quasi quodam igneo motu, & pulsus adeo est violentus, ut costas, & sternum, admotamque manum arietet: ad externas usque carotides pulsus jactationes conspicuæ sunt: cubare in faciem, mox deinde supinus potest æger, cum tamen cibum assumpsit, aut petit acclivia, & pulsus intenditur, & respiratio. Facile est, conjectare aneurysma prope aortæ arcum, aut extra recurrentium nervorum munimen. Sciscitanti mihi de aneurysmatis principio, & occasione rerulit, jam se ante scabiem hoc affectu laborare, vino non parum indulisse, & in ludrica lustrationum arena sæpe sæpius decertasse: & sane tam vini potus, quam gymnastica exercitatio interni canalis diloricationem inducere valuerunt. Suavem vitis humorem & solidum alimentum, & timoris pharmacum vulgus appellat, sed Plato noster ad id po-

tissimum conferre judicat, ut fecundo calice naturæ, & habitus animorum in convivii detegantur: quippe cum (Marsilius Ficinus in dialogum secundum de legibus, vel de legum latone) sacras Palladis arces, quæ ante omnia colende sunt, impudentissime pulset. Sed liberiori usu meri sanguis in tartareo-sulphuream diathesim vertitur, qui dum per canales pelliceo-conicos it, reditque, si unus, aut alter languidæ texturæ fuerit, illum partim orgasmò, partim vi erosiva labefactat, fere ut muros discutiunt steriles mala juven. robora ficus: & Dolæus inter potatorum flagella hydropem quoque, feri videlicet ex rubulorum scissura colluviem nunquam siccandam numeravit. Si vero luctam examinemus, constituentia nos stamina mille modis agitat, fleat, contorquet; audire fas est Hippocratem: *Fiunt etiam convulsiones ex laboribus, ex casibus, ex plaga, & si quis onus majus tollat, & ex cuisibus, & lucta, & omni-bus id genus: tanta enim, Dii immortales (sit modo loquendi venia) ad supplantandum adversarium exigitur in musculus tensio, & crispatura, & quanta inde vasis distractio, & liquidis strangulatio contingit: bella sunt ista nullos habitura triumphos.* Post repulsam scabiem erodentes sales creverunt in sanguine, & sanguifer truncus præaffectus ulteriorem ab iis labem contraxit.

IV. Aneurysmatis implicatio coegit, experientissime Lancisi, ad te recurrere. Tu enim aureum de Corde, & Aneurysmatibus tractatum præfatione in Metalothecam Vaticanam (idest a Michele Mercato Gregorii XIII. & Clementis VIII. familiari, & Medico descriptam) innuisti, & jam secundis curis aggredieris. Nova, & solida ex diuturna cadaverum sectione comparata doctrina prodibit in lucem, quæ temporis tui, tuæque experientiæ filia, summum jus erit in Medicina: laudabit & hanc olim ventura posteritas, & medicæ rei gloriam, quam per tot egregios labores quæstisti, non fortunæ, non aulicæ dexteritati, sed tuis meritis sine odio, & gratia fatebitur adscribendam.

V. Kal. Augusti 1719. Cassiæ.

Eruditissimo, Clarissimoque Viro

ANTONIO COCCHIO

Lancisius S. P.

Quamquam per hos dies nimio urgente æstu, qui nullo etesiarum flatu temperatur, omnis fere ad philosophandum mihi facultas erepta est, atque a scribendo plane deterreor; nihilominus accepta abs te, Eruditissime Cocchi, accuratissima narratione symptomatum, quibus Cassianus juvenis post depulsam asthmaticam, hæcticaque affectionem ex cohibita olim scabie subortam nunc divexatur, veluti admotis calcaribus excitor, atque ad respondendum commoveor. Ut autem paucis multa complectar, non dubito, quin acris humor, qui in cute primum, deinde in thorace miliarem, quasi dixerim, labem induxerat, ac tuis quidem auxiliis utcumque cicuratus, a glandulari solum trachearum membrana sensim sine sensu discussus, ac dissipatus fuerat, adhuc non levi ex parte internam tendineam, adiposamque tunicam ipsius aortæ, atque adeo ejusdem cordis eadem miliari pruriginē efficiat. Neque vero existimes conjectura duntaxat me ad hoc asserendum perducere; nam plures habui hoc mali genere laborantes, qui subsistente paulatim intra cordis substantiam sanguine, auctaque inde hujus visceris mole, in ejusdem prolapsum inciderunt, tandemque qua distractis, qua compressis, erosus ac disruptis sanguiferis, lymphaticisque in pectore vasis decesserunt, in quorum nox cadaveribus comperi non solum cor ad bovilli magnitudinem auctum, ac super diaphragma decumbens, sed arteriam quoque magnam forcice per longum apertam cum minuta, eaque manifesta interioris tunice scabie (quod non sine admiratione Viris, qui mecum aderant, & quibus id mali genus prædixeram) ostendi. De cætero tecum sentio, Vir Clarissime, præcipuam superstitis hujus ægrotationis causam a lustratione repetendam, in qua præterquam quod fere omnes thoracis, atque abdominis musculi maxime intenduntur, eaque ratione anhelitum valide, diuque cohibent, sanguinisque circuitum per cordis vasa violenter intercipiunt; fortasse accidit, ut juvenis iste non magis in arena, quam in cœnopolio egregius athleta repente improvidusque, quod sæpe contingit, ab adversario in terram dejectus fuerit, lævumque dorsi latus vehementer contuderit, ac propterea arteria magna, imo & cor ipsum alicubi distractum, laxatumque sit. Quo sane factum esset, ut fibræ, ac vascula ex fibris pariter, villisque contexta relicta fuerint adeo imbecillia, ut præterlabenti postea sanguini, ejusque potissimum crassescens ichoribus moram facillime injecerint, locumque dederint celebri Hippocratis effato: *Si quæ pars ante morbum laboraverit, in ea firmatur morbus.*

Verum enim vero, quo luculentius ejusmodi ægrotationis causam ex palestra retexisse videmur, eo certe minori cum boni exitus fiducia novam curationem poterimus instituere. Etenim in morbis, in quibus structuræ vitium latet, nullum, vel si ab Æsculapio arcessatur, pharmacum solet opulari. Sed ne citra medelam relinquamus ægrotum, operæ pretium arbitror, novas indicationes ex ipsius mali visceribus elicere: scilicet primo sales, ut tu optime conjicis, tartareo sulphureos in universa liquidorum mala redundantes abluendi, temperandique. II. irritatam, convulsamque fibrosam cordis & aortæ texturam molliendi, lævigandique. III. impectos, interceptosque in præcordiorum cuniculis viscidos humores solvendi, abstergerendi, dissipandique. IV. denum laxas alicubi, ac pene diloricas easdem partes firmandi, interdictis iis omnibus, quæ tum fluidam, tum solidam causam augere, deterioreque facere possunt. Tamen si vero longe facilius est in casu nostro scopos curationis meditari, quam explere; adhuc tamen ea tentanda sunt, quæ ratione, atque experientia duce in consimilibus affectionibus ad producendam saltem vitam comperta sunt profuisse. Quod itaque spectat ad diluendos sales per universum corpus exuberantes, opportunissimus esset decursu ferventis adeo æstatis tum internus, tum externus usus aquæ Nucerianæ: valet enim mirum in modum ad liquidorum acredinem diluendam, simul etiam ad nativum extorum tonum a sulphureis, salinisque particulis labefactum firmandum, roborandumque. Ad eundem quoque finem conspirat serum, & lac asinum vitreis organis in B. M. destillatum cum succis recentibus plantagininis, urticæ, hedere terrestris, & pomorum redolentium, additis cancris flu-

viati-

viatilibus confusus. Ad molliendas deinde convulsas cordis, aortæque fibras nihil est aptius oleo amygdalarum dulcium, & seminum melonum sine igne recens expresso, quod cochleatim ante prandium, ac cenam, cumque etiam jure matutino exhiberi potest. Ad id pariter sumunopere confert sperma ceti non rancidum propinatum cum conserva violarum.

Ut vero solvantur impactæ salinæ phlegmatis massulæ, quibus miliaria veluti tubercula in arteriarum tunicis eleuantur, equidem præsentissimum remedium comperi in temperatis anni constitutionibus sublimatum dulce leni admissum dejectorio, cujusmodi esset.

24. Sublimat. dulc. gr. vi.

Resin. Julap. gr. vii.

Ocul. Cancror. præp. g. xii.

Electuar. lenitiv. sesquidrach.

M. & mistura oleo amygdalarum

in mortario vitreo malassetur. Quod utique medicamentum semel, aut bis in mense repetendum videretur: hoc enim pharmacum non modo fluidorum vitia corrigit, sed eorundem crassitiem hic illic vasculorum fines obsidentem, obstruentemque sic incidit, attenuatque, ut ad refluendum reddat idoneam; ne quid dicamus de vi, quæ hydrargyro inest, vulnusculem abstergiva, ac fere epulotica, quippe neminem latente.

Denique quassatam in minimis, ac forte diloricatamalicubi per luctationum nisus, casusque præcordiorum texturam pro virili parte restituunt balsamica, & vulneraria; hujusmodi præ cæteris sunt (novissimo tamen curationis loco ponenda) extractum florum hyperici, & sambuci cum tantillo balsami Copaivæ.

Sed omni longe melior in hoc morbi genere medicina paratur ex congrua, semperque parca victus ratione: cum enim vasa per diatam servantur depleta, invicem non premuntur, neque oppilationes contrahunt. Vinum ex toto circuncidendum est; nam merum non tantum vasorum fibras corrugat, & coarctat, sed copiam quoque salinarum, sulphurearum particularum intra corpus infundit, quibus fieri non potest, quin malum ex utraque causa ortum augeatur: vino autem sufficerem infusionem nunc foliorum melissæ, nunc decoctionem pomorum redolentium. Caveat propterea a violentis corporis, animique motibus, a quibus sui morbi duxit initia. Etenim athletæ generosam quandam in contentione ipsa vim exercent, & tanguntur gloria, cum publice decertant. Vale.

Romæ VIII. Idus Augusti MDCCXIX.

Corpus humanum definiri posset Epistola (nempe ab Apostolo mutatis verbis) scripta non atramento, sed Spiritu Dei vivi: ad Corinth. 2. cap. 3.

Nemo novit horologii impedimenta, nisi qui rotas, fusos distinguere, & quomodo ab elatere, seu primo mobili motus concitentur, optime sciat. Adeo oportet, eum, qui medicinam facere vult, subiectum suum, seu corporis humani texturam rite rimari. Steph. Blacardus Anat. reformat. c. i.

DE VENÆ CAVÆ DILATATIONE. CAPUT V.

Clarissimo, Doctissimoque Viro Jo. Baptista Morgagnio in Patavino Lyceo primario Anatomies Professore & Presidi Antonius Cocchi S. P.

Quam universus terrarum orbis tuo jam nomine plenus sit, & famam ipsam superent virtutes tuæ, me quædam tetigit ambitio, ut ad te scriberem Vir Clarissime: tu enim in perscrutandis arcanis humani corporis, quod est immortalis animi hospitium, omnes curas implevisti. Adversaria anatomica tua communi edita plausu, quantum tibi sit ingenium, quanta doctrinæ profunditas, satis ostendunt: hæc mihi probaverat utique nostrum dum viveret amicissimus Lancisius, cujus nomen alte posterorum animis insidens & fama rerum immortalitati traditum arentibus oculis commemorare non possum. Illud etiam accedit, quod si tu in eum epistolare commercium iniveris, non solum dolorem, qui vivit adhuc, retundes, & recrudescens itidem vulnus suavissimis verbis tuis lenies, sed etiam quidquid commodi ex familiari illius consuetudine in me ipsum derivabam, abunde satis præstabis: is eris, a quo artis oracula petere non verebor, & mihi Lancisius in te reviviscet; nam, ut de se ipso inquit Cicero, *reperire ex magna turba neminem possumus, quo cum aut joculari libere aut suspirare familiariter possumus*: quare ad te recurrimus, te solum expectimus, te imploramus, ut persona licet absens, consilio tamen præsens me consoletis & recrees. Venæ cavæ dilatatio, quam nuper mihi contigit observare, meam ad te scribendi ambitionem lateffivit.

II. Venæ cavæ dilatationem exposita utiliqua ex anatome deprompta, quæ nempe ad machinam hanc nostram statico-pneumatico-hydraulicam spectant, te humaniter indulgente præmittimus. Unam venæ tunicam & arteriæ duas tendineas veteres nostri crediderunt. Arteria dicitur vena pulsabilis, ab Avicenna vocatur vena audax; quinque tunicis constat: prima exterior retis instar intexitur innumeris sanguineis vasculis nerveis fibris implicitis; unde vasculosa nuncupatur: secunda Ruyfchio inventa dicitur cellulosa, cum sit cellularum congeries adiposamque membranam imitetur; pinguem succum ex arteriolis secretum hæc cellulæ aservant, quo arteriarum tunicæ perlinuntur, ut motui fiant aptiores: tertia, teste Willisio, minimis glandulis albicantibus compingitur, quæ laticem separant ad arteriarum fibras emolliendas, ne motu exarescant: quarta muscularis est, siquidem fibras carneas induit, quarum tensione vel remissione constringuntur vel laxantur arteriæ: quinta & ultima interior tunica musculari subjecta nervosa vocatur, utpote quæ nerveis fibris contextitur. Vena iisdem tunicis constat atque arteria, sed longe tenuioribus ac infirmioribus: præterquam quod inter carneum ordinem, qui extimam venæ tunicam constituit, & ordinem annularem vasculosa tunica cellulosaque interponuntur. Qualiscunque sit arteriæ & venæ fabrica, contractiles sane potentia videntur esse fibræ annulares seu annuli carnosus pace Clarissimi Bellini, qui dicit exemplo glomeris contineri quidquid est spirarum in arteriis, quidquid in venis, quidquid in oesophago & intestinis; tu vero Morgagnum doctissime, omissis tunicarum numero, id contra celeberrimum Regis Prussiæ Archiatrum affirmas, denique in arteriis nullas alias carneas fibras nisi annulares observo. Conus arteriæ a corde oriens ex lato in acutum definit; venæ conus ex acuto incipit, & in basim semper ma-

jorem expanditur usque ad cor, in cujus dextro ventriculo maximus diameter, & finis venarum est. Venæ, ut detexit Realdus Columbus, valvulis instructæ sunt, secus arteriæ; diversa canalium structura in se continet providentis Dei mysteria, qui divisit mare fructum in divisiones; nam liquidum ex lato in angustum currens duos subit motus, directum a corde, & reflexum ab angustis tubi lateribus, ita ut angustia loci motus celeritate compensetur & pulsu; ex angusto cono in latam basim progrediens directi motus multum amittit, motuque caret reflexo, & ob mechanicam inversi conii, & quia longe distat ab embolo pulsante, tarde ac tacite movetur; ideo cicatricula, obducti vulneris vestigium, citissime in vena firmatur; quæ tamen impetus inæqualitas sive reflexus placiditas necessaria est, ut nutritiones, cribrationes aliaque animati corporis munera peragantur: sed ne sanguis ad majora vasa promotus retrocederet, aut subsequenrem suo pondere moraretur, Æternus Artifex venas, interjectis valvulis, quæ sanguinis ascendens cylindrum sustinerent, præmunivit: id, quo non opus erat arteriis: in ipsa cava, cum scilicet dextrum cordis ventriculum ingreditur, tres valvulæ tendinosæ columnis adhærentes, quas tricuspides vocant, erectæ sunt ut sanguinis impetum frangerent, & reversuras undas aggeris instar reprimerent. Venæ arteriis duplo numerosiores sunt, quia lymphas & alios succos e visceribus reducere in cor debent, atque eandem ob causam sunt ampliores. Num arteriæ singulæ singulis cum venis in mutuum occursum uniantur, tanquam unum ubique continuum, etsi venæ non saliant, adhuc sub judice lis est: assertiva opinio, forsitan ut accuratior suboluit Celso: *Juncta enim est (ait consularis Vir) vena arteriis, his nervi*; & Bellinus, *continua enim inter se sunt vena, & arteria: & si non sunt continua, ipsarum sanè oscula semper patent*. Insignis vena est porta, quæ sanguinem a circulatione per plura viscera abdominis refluum absorbet, & in jecur officinam bilis arteriæ ritu conducit, ut a ramulis suis, qui ad cavæ ramulos hiant, amarum illud, & balsamicum duodenii fermentum per glandulas hepaticas separetur: crassiusculis tunicis donata est, seu media indole arterias inter & venas. Venæ pariter insignis est azyga, idest sine pari, quæ dextro duntaxat in latere (loquor de homine) solet inveniri, forsitan ob spatii libertatem, cum ibi neque arteriam magnam, neque Pecqueti ductum natura locaverit: hæc est velut diverticulum cavæ, de hac princeps Anatomicorum Eustachius opusculum nobis reliquit, & de hac dudum ad te scripsit Lancisius nonnulla phænomena, & præsertim pleuritica exponens. Venarum maxima ea est, quam Praxagoras nobilis Medicus cavam appellavit, ut Rustus Ephesius refert: dividitur in truncum descendente, qui a capite, aliisque partibus superioribus, & ascendente, qui ab inferioribus initium capit; amboque in dextrum cordis sinum terminantur. Videmus igitur, quod non lapidei, non ænei sunt canales nostri, sed tunicis, qui distrahuntur, crispantur, exedi, ac rumpi solent contextuntur. Felix, qui liquidum crasum, ac solidi robur constanti morum temperie tuetur, & in rebus non naturalibus auream, ut Flaccus cecinit, *quisquis medicritatem diligit*, nempe Hippocratici præcepti tenax, labor, cibis, somnus, venus, omnia mediocria. Id autem, quod dicitur aneurysma, seu pulsans tumor in arteria, est hydatidis in vase lymphatico, & varix, seu dilatio in vena, cum aut valvulæ rumpuntur, aut tunica diloricantur: quacunque enim vi scindatur durior arteriæ tunica, sanguis percussione momento in mollem impingens eam magis, magisque dilatat, & velut in sacco coarctatus tumorem extollit, in quo manifesta, imo sæpe permolesta pulsatio perferitur: si vero tumor rumperetur, æger per immensam hæmorrhagiam properaret ad mortem. Non secus de altero fistularum genere seu de cava, cum dilatata est, licet asserere, quamvis systolesque ac diastoles reciprocatione non perstrepat tumor.

III. Dilatio cavæ morbus est, qui vulgo facile imponit, occurrunt enim symptomata hydropis, hydropem pectoris primo, mox ascitem, & denique anasarcam æmulatur: est tamen cavæ dilatatio, quæ si palpitent jugulares venæ, jam in dextræ cordis auriculæ aneurysma transivit, ut monebat Lancisius priusquam decederet, nimum æqua morte interceptus: nomen ab aqueo humore tamquam a materia, sive a symptomate mutuatur, sed citra febrem. Solent contra hydropici febre lenta detineri, ut testatur divus Hippocrates: *Si hydrops in pulmone fiat, febris & iussis tenet, & acervatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur omnes, & patitur talia qualia is suppuratus fit*; ut testatur quoque Arabum maximus Avicenna, qui de hydropicis in genere inquit, *& accidunt eis plurimum febres tepide*: diathesis enim mucido viscida, & fere aquosus languor est cachexia, seu juxta Hippocratis definitionem *pituicæ albæ occupatio*, nempe mollis, pallidus, & eminenter phlegmaticus corporis habitus, nec ex uno vitio, nec ex uno vitioso viscere prodians, at omnium in deterius conversio, hoc est strictum in liquidis & laxum in solidis; quoniam itaque, explicat Bellinus, *hæret ad arteriolas quicquid est siccus, compactius seu robustius in sanguine, abundat copia aqueorum humorum, qui ab eodem siccis subsistente exprimuntur & per corpus distribuuntur; nihil igitur alimenti ducitur ad partes, quod sit naturali simile & alendo aptum, sed quicquid ad partes ducitur, erit aquosum quid plane diffuens, & tantum non diffuere partes faciens; male igitur aletur, seu cachexia continget cum suis conjunctis omnibus: hinc fiet, ut partes ad maximam imbecillitatem redigantur & fluere quaquaversum permittant humores aqueos, qui in cavitatibus majoribus vel inter cutem colligentur, & fiet hydrops*. Cum lympham inter & sanguinem eversus est cohesiois ordo, uterque humor tali motu agitur, qualis est febris lenta: jugiter enim sed mitius provocat cor ad movendum se, pellendumque inordinate liquida; serum interea lixivioso corrosivum redundans vasa distendit, scinditque, novas sibi vias aperit, & hydropem machinatur. Potest autem canalium truncos extendere ac dilatare plethorica moles seu mera sanguinis plenitudo & orgasmus, ut innuit Stahl: *Cum enim hæc (abundantia sanguinis) non solum liberrimum sanguinis progressum spatii proportionati intuitu varie alterare possit, sed etiam ipsi energie motus certissime plus negotii facessat cum pondera ipso, tum mole etiam ad capacitatem spatii comparata: concludat differtissimus Celsus, ergo si plenior aliquis & speciosior & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet, quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro quasi ruina quadam revolvuntur*: scio multis olim fluminibus

impositos pontes, & a magnis Imperatoribus aquarum calcata esse superbiam: sed hi omnes statim in opere, aut brevi ab opere corrue-
runt; purpureum flumen, seu potius mare rubrum, quod intra nos
circumvehitur, ubi arteriæ aut venæ parietes dilatavit, sicut alvei ita
& fræni cuiusvis evadit impatiens sanguinis missio, sanguinis momen-
tum, imperum, stimulum demit, & a strangulatu canales redimit;
nempe auxilium, quod parca victus ratione mendicatur præsentaneum
missione sanguinis obtrinetur; detracto enim sanguine, vasorum tuni-
cæ concidunt, sublato, pondere cessante pressione musculares fibræ ex-
peditius contrahuntur: aer in missi sanguinis locum succedit, & vi e-
lastica sanguinis motum accelerat, & quicquid intra canales residet at-
que hæret, torrente suo secum trahit; sic in pleuritide materia, quæ
pleuram & pulmonem occupat, inflammatoriæ febris seu acutæ fusio-
nis quoddam veluti præcipitatum & brevis totiusque per venæ medicum
vulnus, quam per asperam arteriam, solo tussis molimine, educitur,
idcirco missi sanguinis superficies tanquam in gelu concreta, & profun-
dum utpote villis solutum & liberum nigricans, & solito fluidius de-
prehenditur. Venæ cavæ dilatatio Arætei verbis adumbratur: *nam*

De Caus.
& sign.
Acut. 12.

Tit. igno-
rus hy-
drops.

Perf. 12.

Cap. 12.

Ep. 1. 12.

*tota una est, atque continua; a nonnullis autem Medicis ea pars dunta-
taxat, quæ secundum dorsum discurret, ægrotare creditur; quoniam ejus,
quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt: intra pectus enim rei nulli adherens,
sed in pectore sublevata protenditur, donec transversum septum egressa
cordi inseritur: igitur si quod ingens malum hanc venam corripit, pectore
ambiente delitescit: nec alienum videtur esse, quod ait Van Hel-
mont: Itaque imperium, & actio regiminis renum se extendit nedum in
renes, ureteres, & vasa urinaria, verum insuper in cavitatem ventris
inter peritonæum, & musculos abdominis, itemque in venæ cavæ divaric-
ationes se inferiores usque & in pedes ac tibias. Sed referata per cultrum
cadavera in ipso mortis silentio sepultam ægritudinem docuerunt. Ca-
veant qui crassos dies, lucemque palustrem degunt, qui abdomini suo
nati esse videntur & voluptatibus, quique athletico & castrensi victu se-
cundam valetudinem evertere contendunt: caveant, inquam, ne via
cumulentur in sanguine, ne conteratur hydia super fontem, & con-
fringatur rota super cisternam &c. utor allegoricis Ecclesiastæ verbis;
nam hydia sagacissimo interprete Joanni Smith accipitur pro cava,
id est venarum trunco maximo, fons pro dextero, & cisterna pro sinistro
cordis alveo: rota vero aperte indicat sanguinis circulationem, cujus
principale instrumentum est arteria magna cum suis fistulis. Huc reci-
dit quod improbat Seneca: Cum fatigaverunt se vino & libidinibus,
cum illos mox inter vina defecit, cum voluptates angusto corpori ultra
quam capiebat ingestæ suppurare cœperunt, tunc exclamant miseri Virgi-
lium illum versum;*

*Namque ut supremam falsa inter gaudia noctem
Egerimus...*

Hist. 1.

Æncid. 6

Huc etiam recidit quod narrat Tacitus: *Vitellius ventre & gula sibi ipsi
hostis, Otho luxu, sevitia, audacia Reipublicæ exitiosior ducebatur: si
enim crapulæ antidotus, insensibilis transpiratio, quæ scilicet onustus
corpus ad æquilibrium redigit, integra non sit, tumet sanguis, & in-
splenter affurgit diametro major seu capacitate canalium: immo si ac-
cidum, acre, ponticum dominetur in liquidis vel propter hæmorrhoi-
dum ac inusti emissarii siccationem, vel tandem propter vehementem a-
nimi pathema, (quod est veluti cogitationis epilepsia, rostroque imma-
nis vultus adunco immortale secur tundens) humoralis massa incipit sibi
esse impedimento, quin libere feratur per præcordia, partim scilicet
irritando fibras, partim replendo vasa: quare ubi minor renixus occur-
rit, fiunt distensiones, scissuræ, varicositates tum in rubris, quæ san-
guinem, tum in albis venis, quæ lympham reducunt; id quod cavæ
potius inferiori & auriculæ ventriculoque dextris quam sinistris solet
accidere: cum enim sanguis enervatus suoque volatili exutus refluat &
redundet somni tempore, incidit primo in parietes dexterarum capa-
citatum, quæ utpote minoribus fibris contextæ minus validæ sunt,
quam sinistra, & magnæ arteriæ cordis.*

IV. Fatendum omnino est, organicos morbos extirpari non posse,
præsertim cum cessent ii decubitus, qui ab internis ægritudinibus vin-
dicabant. Errat itaque si quis existimet in tali casu medendum esse:
ipsa remedia onus, stimulus, & morbi evaderent additamentum; nam
cum sanguis trajici nequeat debita proportionem a dextero ad sinistram
ventriculum, ipsa remedia sanguinis aggesta calcando premendoque in
atrium cordis, quod est cava & auricula dextra, impetum faciunt: &
quia ubi adempta est libertas circuitus per præcordia, necessario sectio-
nes sanguinis ascendentes per venas inferiorum artuum & imi ventris
eandem in ascensu cursuque difficultatem subeunt; ideo serum, quod
est tota sanguinis massa subtilius, facile per poros effugit & replet spa-
tia carniū, & consequenter cavitates abdominis & dextram præci-
pie pectoris cum apparente, sed falsa symptomatum moderatione, ut
advertit Hippocrates, *postea erumpit ad alvum, & statim quidem san-
guis esse sibi videtur ac a morbo liberatus.*

De
morb. tit.
hydrops
pulm.

Anat. 1. 2.
c. 9.

pag. 123.

V. Publica sanguinis via, quæ e cunctis visceribus & musculis ad cor
reducitur, est vena cava: tument inferni artus, hydrope pulmonem
obsidente; nam sanguis ab arteria ad venam pulmonicam libere transire
nequit, & cava ejusque propaggines præsertim inferiores exonerare ad
cor in orbem restituere non possunt totam illam liquidam mensuram,
quæ ab aortæ ramis intra carnes projicitur, & ideo serum, & lym-
pham ad motum minus aptam, quæ pedes ac tibias inflantur, depo-
nunt. In hoc vas (loquitur Diemerbroek de cava) *sicut omnia flumi-
na in mare aquam, ita omnes corporis venæ sanguinem effundunt: un-
de nil mirum si ligata cava infra cor in cane alioquin sano sex horarum
spatio suboritur pseudohydrops qua siccitica tumor; ut indefessus scru-
tator cordis Lovver memoriæ prodidit, perforato itaque dextro latere tho-
racis infra septimam & octavam costam paulo infra regionem cordis, &
immissio digito venæ cavæ situs palpandus est, deinde pectoris latus illud
ad venam quamproptere compellendum est, quo filum ei facilius obduca-
tur; atque in isto pectoris situ arte stringendum est vinculum, dein pecto-
re relaxato vulnus consuendum est: peracto autem experimento canis mox
oblanguet valde & intra paucas horas expirabit. In dissecito autem abdo-
mine magna feri quantitas innatare conspicietur, non aliter quam si asci-
te diu laborasset: quod ab impedito sanguinis ab arteriis in venas circu-
itu secerni prius expertus fueram. Præstare possunt convulsio & orgasmus
quod efficit capistrum in cava; serum enim sanguinis, ut aqua ex hu-
midis contortis linteolis, per cava vasis foramina gestit excedere: Spas-
ma, inquit Bellinus, est solutio unitatis in partibus nervosis vel illis mus-
culorum sine vulnere: si vena, vel arteria convulsione seu spasmodica*

distensione occupata sit, jam habemus quomodo varix vel aneurysma
producitur: nec deest Cui Senis autoritas, *quod si convulsio in vena*
facta sit, hæc quidem per exordia dolorem excitat & pulsat, progressu
vero temporis sanguinem ad carnem transmittit, qui in carni putrescat
in pus vertitur.

Lib. 1. de
morb.

VI. Subsistente demum sanguine in supernis etiam sectionibus ma-
nus tentatur ædificare, ac ægri quandoque ruptis intra cerebrum lym-
phaticis, & non raro sanguiferis tubulis apoplectice moriuntur, tam-
etsi repentina suffocatione interire debuisse putabantur. Medicinæ
parens Hippocrates eorum, *qui a morbo victi sunt, curationem non ag-
gredi admonuit; sibi imputet quisquis uti noluit medentum imperio,*
nec se dignum vita judicavit, si multa neglexit, quæ conspirant ad
vitam: medicam quærit opem hæc invenit; discat impostum artem,
quam contempsit, quam irrisit, necessitatis & temporis filiam esse,
ægro tamen miserrimo, & semel pereunti nigrum theta præfigere sine
ullo auxilio, & spei fucō nec medicinæ decus est, nec sapit humanitatem.

Lib. de
Arte.

VII. In tanto itaque salutis discrimine tria sunt indicata, sangui-
nis molem detrahare aut saltem ejus acumen hebetare & lenire; lym-
phæ recrementa per alvum & vesicam educere, ut sua liquidis volatili-
tas reddatur, & inde sensum redeant ichrones ad naturales abscessus;
denique affectum canalem defendere ac roborare. Res quidem faciles
dictu, executu difficiles, & plane inutilis, cum ad ultima ventum
est, ni author vitæ Deus remediis vigorem addat. Ut autem præfatas
indicationes ipse adimplerem, quinque uncias olei ex lini seminibus
per recentem sine igne torturam expressi cum jure vitulino tenui atque
insulso epicurice propinavi; nam celebre hoc oleum sulphure genero-
so, sale recondito, & balsamica uligine sua lævigat, cicurat, resol-
vit, & quæ resoluta sunt, per alvum secum ipse præcipitat. Scilici-
ticum oxymel & gummi ammoniacum strenue urinam cientia, centi-
pedas præparatas alcalico-nitrosa vi turgidas in pulverem tritas tinctu-
ram & sal volatile tartari & hujusmodi alia seligi, quin & jura colum-
bæ turratilis vipera carne fars, & chin. succis radicibus, herbis, flori-
bus, seminibusque traumaticis obstructæ instituiamus. Si adjunctus Cel-
ticus bubo retrocessisset, sublimatum dulce apprime conduceret; nam
alcali seu rete illo merallico venereæ luis spicula franguntur. Exerceto
circa morbos duo (est altera Græci Dictatoris parænesis) *ut juves aut*
non noceas. Ars ex tribus constat morbo, ægroto, & Medico artis mini-
stro: ægroto cum Medico adversari morbo oportet, saltem diætæ obtem-
perando, quam Medicus & pro Medico imperat Plato: Diligentia vi-
ctus corrigendi & gubernandi sunt morbi prout cuique datur otium; ne-
que difficile infestumque malum pharmacis instigandum. Ludovicus Cor-
nellius nobilissimus Venetus austerum, egregium, & vita digno Prin-
cipi imitandum diætæ reliquit exemplum. Ad rem quadrat apte quod
inquit Seneca: Vir magnus ac prudens animum deducit a corpore, &
multum cum meliore & divina parte versatur, cum hæc querula ac fragi-
li quantum necesse est. Sed aurea prorsus sunt verba, quæ Sexti Cæsaris
Præceptor subdit: Quid porro? nil agere te credis si temperans æger sis?
ostendens morborum posse superari vel certe sustineri. Est mihi crede vir-
tuti etiam in lectulo locus.

Epist. 2.

in Timæ

Epist. 7

VIII. Hæc licet pauca atque immatura de venæ cavæ dilatatione
mittere ad te volui, Morgagne præstantissime, ut tuum acquiram pa-
trocinium. Humanitatis tuæ specimen præbe, & me dilige, & vale
ad artis nostræ incrementum.

XIII. Kal. Jul. MDCCXX. Cassiæ.

ERUDITISSIMO VIRO ANTONIO COCCHIO
Medico experientissimo Jo. Baptista Morgagnus S. P. D.

UTinam is essem, Vir doctissime, quem tu pro singulari tua hu-
manitate facile putas, ut triste tibi ac bonis omnibus consultissi-
mi Lanciis desiderium meis possem responsis lenire. Haud equidem
inficias iverim, me in quærendis per anatomen ut bonæ ita etiam ad-
versæ valetudinis causis non levem ab ineunte ætate operam posuisse.
Verum tamen hic noster mediocris usus neque est cum longa experien-
tissimi Viri exercitatione comparandus, & si vel maxime esset, non
ea tamen nobis incredibilis vis ingenii, non ea summa eruditio, non
denique tot alia suppetunt, quæ ille ad habitas a se observationes in
abditis retrusis rebus vestigandis adjugebat. Quæ sane omnia si-
qua alia, certe a te proposita disquisitione postulat atque adeo flagitat.
Cavæ namque venæ penitissime latent, & cum dilatantur, eæ facile
affectiones vel antecessere vel (quod tu egregie observasti) subsequun-
tur, ut minime omnibus proclive judicem, ipsam illarum dilatatio-
nem aut in ægotantibus per propria ac peculiaris signa internoscere,
aut in denatis inter tot alia, quæ Anatomici oculos manusque moran-
tur vitia animadvertere.

Quamobrem factum esse existimo, ut quamvis morbus iste rarus
non sit, perraræ tamen ejusdem observationes legantur: quæ cum
præterea non ea diligentia, qua opus esset, conscriptæ sint, vix no-
bis usui esse possunt. Quò magis in tantis tenebris tuos, Vir eruditissi-
me, præclaros conatus admiro atque commendo, authorque sum,
ut observando meditandoque rem tam diu obscuram magis magisque
illustrare pergas. Fructum sane capies istius operæ non continendum:
cum enim homines plerique in gulam cæterisque voluptates multo sint
brutis animantibus propensiores, magnisque præterea curis animique
affectibus obnoxii; quas videlicet ob causas sanguifera vasa tum mul-
to, & erodente sanguine opplent, tum eodem sæpius remorante di-
stendunt; neque tamen circum extremos venarum cavarum trunco-
tam validum circumvolutum habeant muscolum, quam bruta nonnul-
la, in quibus rubicundi insignisque sphincteris instar esse observavi:
nihil hercle facilius fieri videtur posse, quam ut trunci illi, ad quos
quidem (ut recte animadversum abs te est) effectus crudisque adhuc,
& crassioribus succis onustus sanguis appellit, in maguos haud raro va-
rices dilatentur; quos si Medici persanare nequeant, at eos ut digno-
scere saltem & diutius a ruptura per vulneraria medicamenta aptamque
in primis victus rationem tueri possint, maximopere optandum est.
Vides igitur, experientissime Cocchi, quantæ suscepum a te laborem
utilitatis fore cenream, quantoque propterea opere a te petam, id quod
egregie incœpisti, præclare absolvas. Mihi sane quod me potissimum
selegeris quicum tua ista optima studia communicares, gratissimum
fuit. Idque ut intelligas, omni erga te officio omni tempore curabo.
Vale & me quod facis ama.

Datum Patavii postridie Kalend. Julias MDCCXX.

BARTHOLOMÆI BOSCHETTI DISSERTATIO DE

SALIVATIONE MERCURIALI

Physico - Medico - Mechanica.

AD LECTOREM.



Uolentia mea, qualis sit, innotuit, primos Medicinæ Parentes, tot tantosque viros ad culmen artis evectos, indefesso contemplationis genio, & philosophandi instituto, illam Medicinæ partem, quæ ad hominis morbos profligandos, vitamque tuendam maxime conducit, phlebotomiam nimirum, & purgationem, ut universaliora magis, sedula diligentia, improboque labore adamussim illustrasse, & enixe addictos in universali corporum purganti, sicco pede salivationem transexisse, nihilque in hoc pulvere defudasse, licet fortassis salivatio in purgantium censu reposita magis universalis eluceat, jam quatuor circiter labuntur anni, quibus accuratis morborum observationibus in hac Sparta exornanda occupatus castra sequor celtica lue denatorum, quorum gratia luci publicæ exponere succinctum Salivationis specimen ante oculos mihi constitui. At circa hujus operis editionem diu dubitabundus hæsi, itidemque prono ad cursum impetui frænum injeci, quia *qui bene latuit, juxta adagium, bene vixit*. Nunc tandem laxam dedi habenam, quamvis id felicitatis fastigium me attigisse minime opiner, ut opusculum meum ad palatum tuum delineasse crediderim, cum hoc nostro felici sæculo nobiliora extent ingenia, & uberiora nunc vivant, ut tot disciplinarum inventa in rerum abstruso latentium reperta, antiquorum mentibus incognita, huc usque in naturæ magnificentia latuisse, ut in posterorum industriam, & gloriam cederent, quorum cœtus concordēs, quid curiosi, quid novi natura parit, aliorum oculis adhuc non animadversum, vario addiscendi studio incitati vitam per pericula non sufferendo labori commiserunt. Quid igitur divitiis alieno partis labore, & aliena industria repertis non fruimur? si nimia primi ævi ubertate defatigata natura nostris universum tradidisset Parentibus, antiqua nova rerum accessione illustrata, nuperisque experimentorum inventis suffulta non cernerentur. Quod ad meum dicendi, & philosophandi genium spectat, nemo mihi vitio vertat, si non adamussim hic omnia conscripserim, cum semitam fere nullis calcata vestigiis, nulloque afflante lumine pergere cogar, ubi novam mihi sterno viam: si igitur ab æquo deflectens semitam non agnoscam, cui trito insistere possim, conatus meos, quantum fas erit, in viam reducere defatigabor. Non ergo cum Seneca *sequor priores, facio, sed permitto mihi, & invenire aliquid, & mutare, & relinquere*. Quemadmodum enim extensis ventorum flatibus velis sublata temonis directione navis incerta via syrtes impingens, undisque obruta dehiscens casu salutis asylum offendit: ita mihi fortuito continget, si primis initiatus Medicinæ meandris, & ut homo in arte novus opellam hanc meam ad utilitatem ullam revocavero. Præclarum hoc opus ausus sum tentare, non ut exercitatis faciem præferrem; sed ut magis expertos Medicæ artis Heroas ad perficiendum hoc opus exemplo meo stimulem, & si alios excitavero ad salivæ morbos venandos, qui labores meos fugerunt, bene jacta erit alea, & frugem carpisse, metamque attigisse mihi videbitur. Cæterum feliciora ingenia intima quæque, & abscondita scrutantia vident, ubi nobis non ultraprogressi liceat. *Non enim, inquit Cicero, parum cognoscere, sed in parum cognito, stulte & diu perseverasse, stultum est*. Tu interim, Amice Lector, hæc habe, quæ si placuerint, lege, ut noster omnis non sit irritus labor; in quo si erravi, humanum scias esse labi. Vale, & me amare perge.

DE SALIVATIONE.

CAPUT I.

ARTICULUS I.

De Saliva naturali.



Quemcunque opinor libenti animo laturum, si ego ad salivationis historiam graphice pertractandam posthabitis tot eruditorum conatibus, & studio accurate pro virili perpendam, quibus hæc viribus innitatur, quibusve mediis illustretur, ut illa contrahatur industria, atque brevitate, ut non multum posse inutiliter impendere tempus, si ulteriori inquirendi labore sollicito nova forte mihi contigerit comprehendere experimenta, quicquid in hac mea dissertatione poterit in dubio latere, ad eruendum arcessita. Ea enim est rerum natura, hominumque peritorum fertilis industria, & inquirendi libido, ut argumenti ad historiam spectantis notitia in dies plus illustretur. Itaque ut augeatur ipsa, & eluceat historia, (si forte unquam omnibus absoluta numeris futura sit) necessarium, aut perquam utile indicavi naturalis salivæ artificium, ejusque morborum causas, qua fieri poterit diligentia mea, non inani, ut spero conatu, ad trutinam prius revocare.

Inconsultius facere ratus sum, si proprietates, & salivæ usus constituerem, antequam ejusdem qualitates, & affectiones subexamen vocarem, quod ultimo allatum, ut concipiam modo, satis duco enumerandas eas esse maxime generales affectiones coactionum, quæ ex diversis materiæ particulis in cujusvis salivæ naturalia corpora abeunt. Atque ea propter operæ pretium fore existimo affectionum causas inquirere, antequam saliva ad ejusdem naturam solentius indagandam me alliciat.

Salivæ corpus itaque fluidum esse videtur eo in primis, quod consistat ex particulis, quæ dum se invicem in exiguis componentium corpusculorum superficiem lubricis, atque levibus tangunt, inter se invicem reptatum promovent; hinc inde agitata juxta suas superficies adeo volvuntur, ut sui motus momento se diffundentes, aquæ ad instar libere quaquaversum ferantur. Et sane non negandum orbicularem molecularum figuram ad corporum fluiditatem plurimum conferre; Interim vero cæteræ dantur qualitates salivæ, quæ diversas particulas arguere videntur, varie admodum, & aliquando irregulariter figuratas, dummodo ingredientiæ partes in corpusculis satis exilia dividantur, atque ad eam levitatem, & volu-

bilitatem redigantur, ut ob molem suam fluidorum corporum particulis liber inter se ipsas motus non interceptatur; proindeque sint non tantum volubiles, sed actu motæ, ut corpus fluidum reddatur, non quidem solo aggregato talium corpusculorum, quæ sphærica sunt, aut alia regulari forma prædita, verum sola duntaxat, vehementi & varia particularum illud componentium agitatione. Quæ quoniam tactis corporibus adhærescunt, vel saltem partibus quibusdam turgent, quæ molecularum congruitate, ad particularem, quos tangunt, corporum poros relata, firma adhesionem per superficiem corporis labentes humilitatem impingunt, fluidus, & humectans liquor dici merentur. Si vero notionem humiditatis hæcenus explicatam sequamur, supererit adhuc unum quid, quod circa naturam fluiditatis nos instruit; id vero est discrimen, quod fluido corpori, & humectanti liquori intercedit, quæ cum in multis conveniunt, confundi perperam solent: cum omnis humectans liquor sit fluidus, non tamen quodve corpus fluidum humectet. Aer enim, æther, & ipsa flamma corpora fluida vocantur, atque nitrum fusionem passum verus liquor est, hæc tamen corpora ea, quæ tangunt non madefaciunt; ex hoc deduco salivam aqueis corpusculis hæc illac motis abundare, quibus exterior corporum superficies guttulis ipsius liquidis irrorari tota conspicitur. Si externis contactu partes exiguarum salivæ corporum in novum motum cieantur, quo volubilia illa corpora reciprocam ipsorum adhesionem impediunt, in rariorem seriem disponantur, & in aliud adhesionis genus, & partium complicationem ob quandam viscositatem mutantur, ut in suarum superficierum lateribus se invicem tangant, facile in tenues illas membranas, quas bullas appellamus, contexuntur; adeo ut per cerebras evolutiones, quas aer inter eas invicem parres ciet, sibi mutuo ita applicentur, ut super suas invicem superficies labantur, tandemque ob superficierum congruitatem in ætiori partium contactu mox evanescant. Quæ ratione numerosæ declinanter superficies salivæ in multitudine parvulorum in convexo sphaericorum, adeo contrahuntur in convexo plana aquæ superficie, ut superficiales earundem particulas nullis cavitatibus repletæ, aut sulcis refrangant, ob quam radiorum lucis refractionem diaphanæ apparent, in quas vicissim aere subtiliori, & radiis solis conjecis, pellucidum satis corpus deprehenditur. Verum quamvis minimæ hujusce liquoris particule sibi invicem commisceantur: tamen aliorum corporum particulas facile admittunt, & cum duobus, vel pluribus junctæ non refugiant misceri absque fluidæ molis incremento, inter ipsas parvula inania intercedunt, adeoque sub magna mole parva materies ita coalescit, ut corpus leve constituat. Præter aqueas partes leniter juxta se invicem labentes adsunt molecule in saliva viscidiusculæ, quæ in illius substantia natantes coitum, & unionem quasi molliuntur: unde ob irregularem agilitatem illius par-

tium vagationem hac illac incessanter dilabentium, & obcrassiusculas ejusdem moleculas aliarum celerem, & intestinum motum ægre ferentes, si non compacti, lenti corporis saltem naturam æmulantur; & cum salium ramenta sint in aqueis moleculis ad minima soluta, & intime commixta, insipidi corporis succus saliva deprehenditur.

Saliva igitur cum sit corpus humido aquea-tenuis pellucidum, lento-fluidum, insipidum distinguitur a paucreatis succo, qui humor tenuis aquæ fontanæ ad instar offenditur; cujus qualitates gustu perceptibiles juxta experimenta, & observationes Listeri, D. de Graaf, & Verheyenii falso-acidæ plerumque attinguntur. Hinc differt pariter saliva a lymphâ, utpote humor saliva tenuior, cum sit plane aquosus. Unde a salivæ commercio maxime excluditur crassum illud viscidumque liquamen, quod a tonsillis vel tussiendo, vel screando exprimitur, quodque extra orbitam sanguinis secretum in cavitatibus glandularum, palati, faucium, & narium abundantius accumulatur, ubi ab aeris perenni affluxu subtilioribus particulis, magisque mobilibus dicti humoris abreptis, crassior, magisque tenax portio relinquitur. Hic viscidus humor in narium cavernulis interius obductis membrana crassa vasculis sanguiferis densissime referta, pluribusque obstita glandulis jugiter transudat; delatus ille per ramos arteriarum carotidum membranâ insertos ad glandulas omnes, a quibus cum recensita membrana suos processus extendat ad os cribrosum, & cuneiforme, atque illorum cavitates undique cingat, potest per cavitatem spandoidis in fauces descendere, & a glandulis in nares copiosius emitti; cum membrana, quæ nares obducit, crassior sit, magisque glandulosa, adeoque abundantiori humoris separationi magis apta. Hujus muci pars magis aquea confertim extillat a punctis lacrymalibus, quorum ductus aperto orificio ad os turbinosum nasi exonerantur.

ARTICULUS II.

De causa materiali salivæ.

Cum igitur existimem salivam esse chyli liquorem, ingenue fateor, quod dubito; at cum magis sollicitè opiner, ut majorem rationem reddam, cur modo non acquiescam in asserentibus a sero oriri salivam, nec in aliis docentibus a lymphâ; faciet illud fortassis ad hanc meam opinionem excusandam, si in virorum diversimode sentientium congressu liber detur philosophandi locus. Ut itaque libere loquar, quæ sentio, videtur mihi salivam generari potius a chylo, quam a sero, vel lymphâ succo chyloso restaurata. Quod fortasse elucet ex animalium duorum, vel trium dierum media, quo temporis spatio nullus salivæ affluxus in glandulas confluit, in sanguinem non irrepente chyloso latice, non deficientibus interea in massa sanguinis; imo seroso aqueis plurimum auctis particulis. Quod si sanguis fame extinctorum spontanea analysi oculis subjiciatur, ostendet quidem partem gelatinoso nutritiam, & fibrâ sanguinis in auras evolasse, & consumptam; sed aqueo-serosa pars in ratione quantitatis crassamento sanguinis quasi æqualis erit: quare multiplicata causa salivam fovente, in ductus glandularum confluat necesse esset salivæ humor, qui tamen in fame confectis, arescentibus glandularum folliculis omnino evanescit. Quippe serum sanguinis, & globuli sunt veteres, atque ægre dissipabiles humores, qui a principio vitæ sanguinem conficientes usque ad ultimum senium vix mutationem suscipiunt, humorum itaque materia non sunt attritæ ferri particule, & immutabilia fluida, sed sanguis chylo saturatus, qui simplici contactu sanguini commixtus universas glandularum, & viscerum lacunas alluens, sensim in vasa excretoria impellitur, & peculiaribus suis officinis accommodatur. Sanctioriana statica huic assertioni applicata, dum mensuram evacuationum exhibet, illam miris modis illustrat; inquit enim diligentissimus Sanctorius: *Non qualibet hora corpus eodem modo perspirat, quia ab assumpto cibo quinque horis circiter libram ex magna parte exhalare solet, a quinta ad duodecimam tres libras circiter: a duodecima ad decimam sextam vix libram.* Unde maximum chyli dispendium fit, cum totus chylus in sanguine recipitur, minima a duodecima ad decimam sextam, quia parum chyli remanet dissipandum; at hyberno tempore quoniam hebetatur transpiratio, adeoque insensibilis dissipatio chyli per poros cutis, augetur salivæ affluxus ad glandulas: igitur chylus est immediata causa salivæ. Nec dicatur cum Diemerbroekio, chylum virtute quadam peculiari cor ingressum subito, ac vehementer rarefieri, ut in eo instanti verratur in sanguinem, cum chylus eo diu cum sanguine circumferatur, ita ut tandem sub eadem chyli forma extra sanguinis orbitam extrudatur. Chylus in sanguine recenter cibato diligenter a Listero observatus, & ad multos dies custoditus sero licet ab ipso pluries commixtus non potuit adhærere, nec ut serum concrefcere, sed tanquam oleum ex aqua emerit; *Sanguis, inquit, ex vena cujusdam viri missus ad libram, ex toto albus instar lactis inventus est, ad hebdomadas integram mansit, nec fractus ut lac, nec in superficie florem, aut membranam habuit, aut acedinem contraxit, tandem in ampulla vitrea diu servatus putredine resolutus est.* Sic in ansere faginato animadvertit Steno succum nutritium in orbe sanguinis diu permanere chylum. *In ansere autem ad plures dies largo pastu faginato super ejus sanguinem missum rubentem, & in fundo vitri concretum candidus chylus fluitabat absque ullo aquoso feri indicio.* Hæc auctor; unde chylus dum in orbe sanguinis toties, & ad tot horas circumfertur, sua integritate conservatur, donec tandem in salivam confectus transmitti possit. Deinde cogites velim cum Listero, quanta sit sanguinis in iero cum flavo colore affinitas, idest serum, a quo alluentes humores bile infecti conficiuntur, tamen saliva nullo virore lutescens a naturali colore non deflectit; porro quæ ab aqueo-serosa sanguinis parte ad glandulas continuo ruentia, & rapide discurrentia facilius in uberes excretiones faciscunt, cum flavescente sero flavescent.

Verum enim vero ejusdem salivæ principia examinatus, nescio an fas mihi sit suspicionibus meis indulgere, ut cum aliqua certitudine gradus, & status salium determinentur; quod ut dubiis fiat satis, cum multo majorem deposcat experimentorum laborem, quam nunc mihi vacat, invitat me ad analyticam Chymicorum diligentiam per ignem salivæ principia eruendum, rimandam.

Hæc enim immixta retortæ vitreæ non ægre ostendet leni igne commota aquei vaporis prædominium, qui in auras per retortam

ascendens, vel per alembicum expulsum, ab ignis calore diffusus, in fine vasis non coit, & insipido aqueum liquorum pressius unitus exhibet: Aucto exinde igniculorum gradu sequitur liquor tenuis, & magis spirituosus, qui est sal volatile in fluore spiritus vesicæ, & oleo volatili intime associatum, quod inertem, & viscidam massam in fundo vasis relinquit; ex cujus calce, ac lixivio sal fixum educitur, terrestrioribus remanentibus particulis, caput mortuum nuncupatis; ut inde si qualia in mixto miscibilia existunt, educeret ignis, saliva partibus aqueis magis saturata sulphureo-salinis, terrestrique particulis tantum coalesceret, in qua aqueæ moleculæ super alias prædominio potiuntur, & minima salium ramenta, oleosa, & terrestria corpuscula æqualibus mutuo nisibus, licet quantitate, ac mole non æqualia, invicem irretiuntur.

Varii generis salium particulas continere salivam, acidas nimirum, salino-oleosas, insipidas deprehendit, qui maturitate consilii, constanti probata experientia a veritatis scopo minime aberrat, dum investigandam solertius ipsius naturam sibi proponit cum clarissimo Nuchio ab observationibus naturam petente in cap. sialographiæ, post earundem levem inter se commotionem cum alkalinis, cum acidis, tum spirituosus liquoribus salivalem laticem associari percipit.

Paulo vero examinata, atque perpena maxima illius dissolvendi vi duriorum quoque corporum compagem coalescat oportet activioribus salium principiis, salinis nimirum, sulphureis, urinosi, volatilibus, aquoso latice dilutis, quæ si Chymicis Paracelso, Ludovico de Comitibus, Helmontio, Basilio Valentino sit præstanda fides, comparantur liquoribus, alba est, qui corpora in minima, seu prima entia resolvit, & ex eo liquore de universali menstruo participante, acidum, cui par in natura rerum difficile invenitur, solvens elicitur, quod licet insipidum videatur, mire penetrans ita contactu suo ferum corrodit, massam triticeam fermentat, tincturam Heliotropii rubeo colore tingit: ut obvium sit concipere, salium quoque acidorum prædominium. Farina triticea cum aqua communi subacta in massam redigitur ponderosam, instar lutii viscidam: saporis ingrati: Sin saliva inter subigendum adhibeatur, massa protinus effervescent mole intumescit. Salis enim, ac sulphurum portiones in farinæ massa subsidentes ita viscosa humiditate obruuntur, ut se invicem non exagitent. Dum vero acidæ salivæ particule in salia, ac sulphura impingunt, eadem in motum concitant: hinc aliæ ab aliorum motu exagitatae longa subactione totam massam penitantes, partes terreo viscidas attenuant, & subtiliant, adeoque tumultuantes farinaceæ moleculæ incallescunt, & fermentationis motum suscipiunt.

At si compressis corporibus, & inertibus stimulum addit, summe mobilibus frenum imponit, eaque coerces, ut in hydrargyro longe patet. Quotiescunque igitur salivæ spicula salina acina acidorum rigida, & acuta vi suæ gravitatis, & figuræ subeunt mercurii infinita interstitia, exorta a solidis exilibus, & partibus sphericis in puncto contactus se invicem attingentibus, earundem positionem, & in contactu directionis nisum dimovent, atque cunei vim in sphæroideas partes exercendo illas exacuant; fit ut pessundata globorum figura, & positione contactuum, diversæ resultent oblongæ, & ramosæ, ex quorum ad mutuos sui, arctosque amplexus dispositorum unione motus ipsius hydrargyri obtunditur, & in corpus veluti fixum refultat. Quod si permirum forte tibi videri possit, salivam cunei vim exercere in mercurii particulas, cogites velim ab earundem ramositate, & figura, moleculas sibi mutuo irreti posse, ut difficillime sese extricare queant: quo a ratione minime alienus videbor, si hoc rite perpendens suspicabor, ob salinas salivæ moleculas opportuna sui interpositione mercurii partes in crassiora longe corpuscula redactas secundum latiores suarum superficierum portiones sese contingere, quæ tangentiæ corpuscula varie huc, illuc, hac, illac volutata ad totalem divisionem, aut divulsionem minus saltem, dum apta redduntur, post varios occursum, & recursum, superficies ob latitudinem, & figurarum congruitatem ad cohesionem mutuam uniuntur, quæ ubi semel hunc in modum cohæserint, majoris contactus secundum superficierum proportionem rationem habebunt; quorum coalescentium corpusculorum partes, cum a gravitate aeris premantur, urgeanturque, nec a vi ætheris intus ut prius agitentur, mutuo sibi adeo adhærent, ut licet specificæ gravitatis proportionabiliter minores sint, ex grandioribus quidem ob molis suæ crassitudinem corpusculis constant, quibus major superficierum scabrities eas adeo adunat, ut totali divisioni resistent, donec intensior ignis, aut vehementior agitatio hanc mutuam partium cohesionem dissolvat.

Quoniam saliva cum solutione mercurii sublimati, & Jovismixta ceruleum colorem ad album tendentem acquirit, ut idem prorsus efficit aqua fortis, inducitur clarissimus Balgivi, ut credat salivam continere in se sal nitro salinum universali analogum, quo potenter sublimati chrysallos penetrando eosdem fundit, ac exolvit: sed hic non definit actio salium salivæ liquoris inhærentium; nam non minus dissolvendo sulphura instar alkalium, quam in modum aquæ salia aliquando illum dices cum Taury, Helmontio, & chymicis menstruum universale, cum quibus si aliorum auctorum effata circa materialia principia salivæ in unum credere fas sit, ex omni genere salium conflatum, quod intra reclusos corporum meatus, omniumque alimentorum poros coercitum, valeat omnes resistentias, & partium cohesionem tollere quæ aquoso tantum menstruo reluctarentur.

Statuto salino principio per stultorum æque, ac sapientum magistræ experientiam, tandem sapere disco & serio iterum cum Dolzo, Sylvio, Delbene, & aliis in saliva multum aquæ, parum spiritus volatilis, & minimum salis lixiviosi cum olei, spiritusque acidi tantillo mixti, temperatque considero, a quibus non discrepantibus Balgivio, & Guglielmini nitro-tartareas moleculas in recessu constitutas ulterius addo, ex quo licet plures salium particule in salivæ fluido innatantes mixtura una coeant, salina tamen corpuscula ita intra semet complures exiguas aquæ particulas intercepti, ut portio salium ad aquam sit minima. Hinc a varia utrinque corpusculorum allisione inter sese mutuo molant, atteruntque, ut in tam exiguas comminutæ particulas, in tam tenuia latera, angulosque adeo levi acumine donatos ab aqueis linguam humectantibus dissolutæ, ita agitari possunt, ut licet pluribus salibus refertæ ob summam exilitatem in ipsos organi poros insinuando sese angulorum

acuminibus, membranosas partes juxta variam salinorum miscibilium figuram, & molem varie, leniterque titillent. Hæc enim mixtura a salibus diverſi generis in aqueoſerolis moleculis intime diſſolutis conflata nullum ſaporem habet, ut intra nexus corpusculorum ſapidorum excepta diverſas ſaporum percipiendas ſenſationes guſtus organo exhibeat, quo medio ſapidorum demulcedine, ſuaviſque ſaporis ſubſtantia obſignatus, & aſperioribus ſalibus collisus, molliſ texturam, ingratiſque ſaporis impreſſionem comprehendit.

ARTICULUS III.

De cauſa efficiente ſalivæ.

IN tenebris latitabant lymphæ ductus ob ſubtilitatem aciem oculorum eludentes, quouſque benignioris auræ afflatu contigit ſummo Anatomicorum Bartholino, adeo tam lynceo, ac manu adeo agili orbi erudito illos patefacere; at primo intuitu ignorata eorundem mechanica ſtructura ob tenuem ſubſtantiam aranearum telas æmulantem, ſancitum fuit, vehi lympham a corde, tanquam a centro per lymphaticos canales ad partium circumferentiam, cui errori quamplurimi innixi ſalivam emanare roriſero quodam ſucco per lymphatica vaſa ad glandulas trajecto, commentum ſunt; ſed Biſſii dogmate de hoc motu lymphæ a Ruyschio expoſito, ipſi valvulas pertinaciffime neganti ad oculos demonſtrante, quæ ubique geminæ, & ſemilunares ſitu ſuo impediunt, ne lymphæ per eorum meatus ad glandulas excurrat, canuit hoc apud homines commentum. Anathomorum diligentia per cultum adeo Anathomes culmen pertingit, ut inſudandum non ſit penſitandi viarum ambages ſalivalium ductuum, cum hæc vaſa cuicumque in Anathome initiato ſeſe maniſeſte declarent. Fluit ſalivæ a diverſis glandulis, tanquam totidem rivulis in oris cavum, quæ indiſcriminatim, & varie implantantur. Primi generis ſunt glandulæ buccarum, & labiorum, quorum ductus excretorii intervenientibus fibrillis a membrana buccas fuccingente emanantibus artius conglomerantur, quibus in ſuperficie tunice compressis humor ſalivalis in os exprimitur. Addit his Steno ſublinguales, ad utraque ligamenti latera linguæ ſitas, quorum excretorii canales ab exiguis radicibus enaſcentes haud in truncum coaleſcunt; ſed tractu parallelo a lingua verſus gingivas tendentes ad digiti tranſverſi fere a dentibus diſtantium oſtiis exiliſſimis in oris tunicam exonerantur, accuratior nihilominus Gaſp. Barthol. inſpectio oſtendit, vaſa hæc non a ſublingualibus, ſed ab aliis glandulis, illiſque adſitis germinare; a ſublingualibus vero ductus binos enaſci, qui in ductum communem coaleſcentes prope ductus Warioniani oſtium in os hiant. Hinc occurrunt palatinæ, quarum glanduloſa productio mediantribus exiliſſimis, & innumeris excretoriis ductibus palati tunicam perforat, & quaſi cribroſam reddit in poſtica parte palati occurrentibus. Accedunt tonſillæ in faucium extremitate ſitæ, quarum ſinus ex canaliculis minoribus coeuntes in os hiant, quibus annumerantur uvula, columella, & gurgulio. Quæ vero extra os, ſunt parotides conglomeratæ circa auricularum radicem implantatæ, quarum excretoria ex pluribus glandulis, & ramuſculis in unum coeuntia oblique deſcendunt, & oſculo ſatis amplo prope labrum inferius terminantur. Adjungitur glandula maxillaris interna ſita interius ſub maxilla inferiori, cujus ductus muſculos oſſis hyodis ingreditur, & deſinit prope dentes inciſores inferiores inter gingivas. His ſubneſtitur ductus ſalivalis a Nuchyo divulgatus, qui ex glandulis in orbita oculi ex pluribus furculis in unum truncum coaleſcentibus emergit, & non procul a Stenonis ductus oſtio recte deſcendendo ſuper os maxillare in os dehifcit. Inſinitæ aliæ extant glandulæ in toto palato per compreſſionem conſpicuæ, quas hic recensere operæ pretium non eſt.

Qua lege ſalivalis humor per recensita vaſculorum excretoria in os eructetur, res eſt ſumma opinionum controverſia exagitata, ſed nondum fortæſſe juxta naturæ leges explicata. Ut res hæc ſecretionis dignitate ampliſſima, explicatuque difficillima a minus incerta hypoteſi ſibi ex neceſſario ordine ſuccedenti deducatur, animus eſt ſpectare oculis externam, internamque glandularum habitudinem, mihiſque conſtitui occaſionem ultro obvenientem arripere, ut illa ſaltem indicarem, quæ a peritis rerum Anatomicis intelliguntur, quæque earum exiſtimatores explicantes, in glandularum ſtructura penitus fidem meam extorquent. Ruyschius in prodromo ſuo theſauri Anatomici ſexti opinatus eſt, cui conſentit Heiſterus cum Verheyenio, glandulam eſſe congeriem vaſculorum, arteriarum, venarum, & nervorum inter ſe certo ordine circumvolutorum, cum ductu excretorio conflatam, e quorum extremitatibus, lateribuſque alia minima vaſa ortum ducunt, quæ ita inter ſe implicantur, intexunturque, ut explicatis pluribus ramuſculis in glanduloſum corpus efformentur. Hæc vaſa tandem inſinitis revolutionibus invicem coaleſcunt, quæ ſecretoria nuncupavit, quæque omnia una cum nervo peculiari membrana induuntur, ut ſecundum poſitionem dictorum vaſorum membrana ipſa accommodetur, ne vaſa dimoveantur a debito ſitu ab humoris ſecretionem neceſſario. Diſta vaſa ſecretoria in unum truncum coaleſcentia excretorium vaſ efformant. Diligentiffimus enim Anatomicus docet illud eſſe mere vaſculoſum, quod glanduloſum ab Anatomicis nuncupatur, tali experimento innixus, videlicet particulam corticalem cerebri accepit, quam poſtea capillo ſuſpexit in aqua modice calida, digitis illam cerebri corticalem particulam ſurſum deorſumve dimovens, donec laxatis inter ſe vaſculis conſpicerentur filamentorum ad inſtar. Quapropter juxta Ruyschium glanduloſum corpus nil aliud eſt, niſi vaſculorum congeries, quorum ramorum ſeries glandulæ fabricam indigitantium fuit clariffimo Stenonio ante Ruyschium indicata. Malpigijs vero in ſua epiſtola ad ſocietatem Anglicanam de glandularum ſtructura diſſerens ſtatuit glandulas conglobatas veſiculares eſſe, annuens dictas glandulas civitatem membranofam manifeſte habere. Unde tam in humano corpore, quam in diverſis brutorum corporibus periculum faciens, glanduloſum corpus ſimplici membrana compingi teſtatur, intra cujus cavitatem retis ad inſtar vaſa ſanguinea vagantur, quæ cum non prava nervorum ramificatione glandularum ſtructuram efformante contorquentur, revolvunturque, a quibus vaſculorum convolutionibus glandulæ cavitatem efformantibus aliorum canaliculorum ramuſculi hiant, ex quibus denuo canaliculis apte in unicum ſpatium confluentibus deducit Malpigijs, glandulam nil aliud eſſe, quam veſiculam quandam membranaceam, intra cujus cavitatem vaſa

ſanguifera reticulari modo una cum nervis locantur. Veſicula hæc glandularis fibris carneis conſtituta eſt, quæ poſtea horizontaliter ipſam penetrant, tandemque cum ſanguiferis vaſis, nervorumve filamentis amicumt, ut furculi varie contexti in debita criſpatione, & neceſſario tono detineantur. Cavitatem in dictis glandulis veſicularibus præmiſſa prius harum partium maceratione ſe vidiffe teſtatur ipſe Malpigijs, & præcipue in glandulis præternaturaliter conſtitutis, quam plures vidit glutinoſo humore, & interdum tartarea materia reſertam; ex hoc ſtatuit provenire diverſum glandularum colorem, ex diverſo humore in ipſis glanduloſis cavitatibus ſtagnante, quod confirmat ſe ſecus vidiffe in ſanis corporibus, ac in cadaveribus præcipue hydropæ correptis; inde diverſitatem coloris in glandulis minime arguere diverſam glandularum ſubſtantiam, ſed ex humoris diverſa natura in ipſis glandulis morantis potius oriri ratus eſt. Bellinus autem naturæ forſan exigente neceſſitate putavit, formari glandulam poſſe, ſi a ſummo ramo arteriarum, vel etiam a quacunque parte ramorum aut trunci deducatur canaliculus non conicus, nec emittens ramos, ſed cylindricus vel adſolutus in ſpiram, vel plicatus in plicas, tum etiam neque intortus, nec plicatus, ſed extenſus, per quam, ſive plicatus ſit, & intortus, ſive explicatus, & directus, ſit ejuſdem amplitudinis, & ſine ramis, at demum abeat in canalem ampliorem cum vena continuum. Insuper inſuat per ejus longitudinem ſanguis de more, & ex univerſa interna ſuperficie canalis originem ducant canaliculi alii hiantes in cavitatem ejuſdem canalis, quales ab interna ſuperficie inteſtinorum originem ducunt venæ lacteæ hiantes in cavitatem eorundem: & quemadmodum hæc per totam longitudinem inteſtinorum feruntur ad exteriora, & intra inteſtinum per meſenterium ducantur, quo uſque confluant omnes in unicum alveum lumbarem: Ita canaliculi illi hiantes in cavitatem arteriæ intortæ extra membranas ejus feruntur per pelviculam aliquam aquæ, & ipſa, & canalem, ex quo derivantur, apte liget, & ſiſtat, & in communem aliquam cavitatem deducat. Hoc glandularum artificioſum per Bellinum totum conſiſtit in quodam textu arteriarum, qui circa ſingulas quaſque glandulas admirabili revolutione ſibi miſſiles occurrenti invenitur, prodigioſo quodam modo implicatum, & veluti reticularum opus conſtituens, quod innumeris filamentis in modum retis conſitum poſt inſinitos ſibrarum interſectionum occuſus in glandulas faſciſſit.

Ego tandem opinarer cum Ruyschio, & Bellino, glandulas eſſe vaſculorum complicationem, certo ordine diſpoſitorum, quarum reticulares contextus ſint plexus canaliculorum ſanguinem vehentium, ſed ita coordinatorum, ut ſanguis poſt ſuperatis plexibus retiformis, antequam inſinitis ramulis corpus glandulæ penetret, dividatur in tenuiſſimos canaliculos, a quibus protuberant oſcula ſecernentia in ipſius glandulæ cavo hiantia, qui poſtea inſeſtuntur, & demum curvatura ſuperata ſeſe contorquentes in venarum ramuſculos facti majores abeunt. Fateor enim circa glandularum ſtructuram, earumque excretorium ductum non adeo datum eſſe labores impendi, & ita obſcure petat cultro Anatomico via in diſſecandis glandulis, ut minime negotio adiges, ſi cultris utaris; unde ſciendi infortunio inter partes noſtri corporis glandulæ tantum cultri Anatomici dexteritatem eludere videntur. Interim vero minime perterriti illarum præparationem mihi licuit maceratione cum diligentiffimo rei Anatomicæ Amico, quaſi ad finem uſque rem perducere: at nec ipſa certioribus factis alicujus tincturæ immiſſione per vaſa arterioſa obvium nobis fuit aliquid de earum ſtructurâ percipere. Repoſito autem pancreate in aqua per plures dies, illud maceraviſſimus, poſtea deducta ipſius peculiari ſuccingentiſſimæ membrana, iterum in novam aquam repoſuiſſimus, quod tandem intra aquam agitaviſſimus, & poſtea bacillo ligneo ſupra tabulam ipſum percuffiſſimus, donec intra aquam denuo agitatum perpulchre oculis exhibuerit tot filamenta varia contorta, quot obtutum effugere potuerit. Simili ritu periculum fecimus de pancreate aſcelli, nimirum de glandula illa magna, quæ in meſenterii canini centro tantum reperitur. Hæc glandula elegantiori ſpectaculo ſuo innumera filamenta patefecit, non ſecus ac teſtium fibrillarum contorſiones, quapropter ſuſpicatus glandulas compingi ex vaſculorum congerie, a qua dicta filamenta ortum ducunt, inſtituta denuo glandularum Anathome ulterius indagando animus fuit, arteriæ progreſſum in corpore glanduloſo expiſcari, & per quantum datum fuit obſervare, arteria in plurimos ramulos ſcindebatur per totum glanduloſum corpus ſimul cum nervo, qui majori largitate ſe expandebat in inſinitos ramulos, donec oculorum aciem proſuſ eluderet. Vena pari inſeſſu vagabatur ſicut & arteria, e cujus latreibus inſiniti furculi exoriebantur, qui vario modo, & ordine invicem contorquebantur, donec amplius minime licuit obſervare, an dicta filamenta ſint vaſa diſtincta ab arteriis, & venis, an arteria ipſa degeneraverit in tot illa filamenta, quæ jucunda admiratione ſpectabantur. Attamen ſuſpicor, facillime arteriam in filamenta degeneraſſe, ut penitus ab arteria ipſa in inſinitos ramulos diviſa illa filamenta tubuloſa extenderetur, vel a lateribus vaſis arterioſis proſciſcerentur, a quibus filamentis tot efformantur arteriolæ tam exiguæ diametri, & ita tenues, ut inſpicientes oculos eſſugiant. Igitur a vaſis arterioſis filamenta illa, ſive arteriolæ enaſcuntur, a quibus variis circumvolutionibus corpus glanduloſum compingitur, nimirum arteria primo ſcinditur in plurimos ramuſculos cum nervo comite, & vena, inde ab arterioſis ramulis filamenta illa minima protuberant, quæ poſt varias revolutiones in alia vaſa minima degenerantia ſecretoria vaſa efformant, e quorum inde coailitu commune ſecretorium fulcitur. At minus eſt, quomodo filamenta locentur, quem ordinem ſervent in eorum circumvolutionibus, quo itinere nervus per dicta filamenta explicet; decuſſantur enim invicem in ſuis flexionibus, & nervus ſemper arteriam comitatur in ingreſſum glanduloſi corporis, & in primis arterioſis diviſionibus ingreditur, ultra quam partium exilitatem minime licet oculo intueri.

De huius filamentis vaſculoſi contemplatione, ut certior fierem, in arterias meſeraicas per aliquot dies maceratas croceam tincturam injeci, & ſtatim illa, quæ filamenta nuncupavi, flavo calore tingi conſpicebantur, quod fieri non potuiſſe videtur, ſi filamenta illa ob arteriæ meſeraicæ ramulos tinctura inflatos non flavefcendo tingerent: ex qua eleganti meditatione ſateri cogor filamenta illa ab arteriis enaſcentia totum quaſi glanduloſum corpus efformare. Hæc omnia fideliter obſervata Ruyschianis experimentis maxime conveniunt. Quantum ad ea, quæ ſpectant ad obſervata Malpigijs, timeo clariffimum virum in lapſum humanitatis incidiffe, ſcilicet intra

intra vesiculam membranaceam vasa retis ad instar locari quidem, annuentem; at id quod vesiculosum nuncupavit Malpighius, membranam, vasa, & filamenta intelligere; cavitatem vero & interstitia ab ipso Malpighio observata, suspicor ipsa glandularum inania præternaturaliter, seu morbose fuisse constituta; ex quo cum Pitcarnio deduco, inter arteriam evanescentem, & nascentem venam, nullum intercedere spatium, quod possit aut pro partium poris, aut pro glandula haberi, nec interjacet glandula media inter venam, arteriamque, orificiis, aut poris, figura diversis instructa: sed glandula illa secretionibus dicata, est pars eorum canalium qui nervum, venam, arteriamque efformat; idcirco ab arteriarum ostiis oscula venarum protuberant cum arteriis continuata, quarum venarum furculi arteriarum flexu versus cor replicata videntur.

Investigatis instrumentis, in quibus elaboratur animalium secretio, excogitandum est naturæ artificium, quo illa utitur, ut secretibiles humores a sanguinis consortio extricentur. Steno salivæ a sanguine secretionem explicaturus, fingit venarum contractionem glandulis inhærentium a nervis hac ratione datis, ut in constrictis venis sanguinis motu moram trahente serosior ejus pars in glandulas transcolaretur. At hanc mechanice disciplinam non curans, aut contemnens doctissimus vir curiosam investigationis ideam, nullam tamen ni fallor demonstrationi innixam pensavit, cujus ingeniosissima opinio illis placuisse videtur, quibus explicandi ratio juxta mechanicæ leges non arrisit. Si attendatur cum Borello venam arteriarum comitem esse duplo majorem secundum diametri dimensionem, concipietur fieri oportere, ut a nervis non possint ita coarctari oscula venarum, ut evadant arteriarum diametro minora: unde influat necesse est, dato impetus momento sanguis per ora venarum tanto obice restrictionis contrahente, ut retro urgeatur. Immo si arteria cum comite vena sit continuatus canal, ut demonstrant cum Pitcarnio ingeniosissimi Anatomici, fieri posset, ut nervorum filamenta per venarum tunicam distributa continuatis fibrillis per arteriam non dispergantur (si septum aliquod inter finientem arteriam, & incipientem venam non intercedat, quod fecit fibras arteriarum in longitudinem extensas, quibus brevioribus factis, in contractione detinentibus venam, simul arteria constringitur, quo vel nulla sit secretio, vel minime hac ratione major.

Alii, ut facilius incant negotium, fermentum in glandulis intus hærens salivales humores elaborans somniant. Nomine fermenti hinc intelligitur motus intestinus particularum mixti, quæ propria vi motiva in motum concitæ, vel alterius corporis advenientis impetu rotata sese mire exagitant, ex quarum mutua turbatione subtiles, & minus inertes sese quaquaversum explicant, quæque tamen a crassioribus implicatæ usque adeo detinentur, donec crassiores partes a subtiliorum nisu plurimum subactæ, singulæque ad gradum exaltationis evectæ dissolutionem, alterationem compleant. Hanc actionem fermentativam clarissimi viri mordicus defendunt in glandulis operantem, & ut facilius in tutam semitam incederent, cuicunque glandulæ peculiarem liquorem ingentum assignant, qui in animali primo nascente in diversas glandulas fertur, insitque vi ratione suæ congruentiæ jugiter in iisdem glandulis permanens sanguinis partes per has glandularum angustias delatas confestim immutat in suæ indolis fluidum, quam opinionem convellere oportet, atque aliam in re rationem, si theoreticam secretionis per se mobilem, & philatris necessariam ab objectis conjecturis, sedæque hypotheseos inconstantia vindicare exoptamus. Actio fermentativa in homine detur potest quidem motu illo intestino, remota particularum coheræntia, mutatisque gradibus nissuum diversum coherendi modum producere in mixtis, partimque heterogenearum unionem dissolvere, ita ut corporum minima componentia non nisi in simplici contactu se tangant; attamen hoc pacto fluidorum subactæ particula, ut deserant contactum aliarum molecularum, quæ discernendæ non sunt, ut in unum coeant, (cum in fluidorum natura non ita facilis cogitanda sit attractio, ac electrica vis nova causa diversa a succo fermentativo requiritur, quæ esse non potest, nisi determinatus impetus sanguinis, & gravitas specifica fluidorum cum solidorum viribus, & connisu proportionata, a quorum mutua vigoratione ab invicem rotatæ particula separari possunt. Non exigui sunt momenti, quæ Borellus de motu animalium contra hanc fermentativam secretionem adducit. Quoniam sanguinis moles non coalescit ex indivisibilibus, sed moleculis quantis figura diversis, oportet, ut ex intestino mixti motu vertiginosis motionibus agitata, atque contrariis rotationibus concussæ ebulliant, rarefiant moleculæ ipsius mixti, utque loco cedant advenientibus particulis, & motu contrario rotatæ accurrant ad replenda loca ab exeuntibus relicta, qui vertiginosi motus ebullitionis, commotionis & expansionis in fluidis fieri nequeunt, nisi alia particula super alias excurrant, quod certe natura, licet subtiliter agat, in minimis, & subtilissimis arteriolarum filamentis in circinis glandulosos convolutis, fieri non posse videtur. Quare absolum est sub rapido, & celeri motu, quo sanguinis massa per fistulas glandulosas propellitur, ejusdem moleculas ab insito glandularum fermento lubricas ebullire, atque rarefcere.

Concesso hoc fermento urget Mechanicorum decus Bellini. Si unaquaque solutio fieret per peculiare fermentum suum, hoc ipsum fermentum vel repararetur ab aliquo liquido animali, vel non: si ab aliquo liquido, cum a se ipso reparari non potest, indigeat oportet alio fermento, & hoc ipsum altero usque in infinitum: si vero non reparatur ab aliquo fluido, erit igitur insitum momento generationis in aura feminali contentum, quod cum per totum vitæ spatium absumi non potest, erit per illud tempus ingenerabile, incorruptibile; sed alteretur fermentum glandulis peculiare, uti in læsis secretionibus sæpe videre est, cum a se ipso in naturale fermentum restitui non possit, ab alio reparandum erit, & hoc ipsum ab alio reficiendum: Ecce infinitas fermentorum. Si vero per totum vitæ spatium alterari non potest, antequam moriatur animal, nunquam vitabitur perluentium humorum secretio, quorum immutabilitatem observatio practica redarguit.

Verum qui hanc de fermentis hypothesin amplexi sunt, ultra quod in circulationem sanguinis blaterant, cum ab insito glandularum liquore sanguis præterfluens aliam induat naturam, coguntur re ipsa profiteri, corpora fluida in contactum nitentia, sibi coheræntia in alium abire compositum non posse, nisi mutetur partium se invicem involventium coherendi modus, ut a primo contactu

removeantur, vel in prima positione oblique vel perpendiculariter posita per directiones suorum motuum non sistantur, ex quibus demum fit, ut (nisi in contactum determinati gradus, & determinata positione particularum in lineis suarum directionum plurimum mutata) dicendum sit, coheræntiam primam eorum corporum in aliam coheræntiam a prioris coheræntis vi diversam abisse. Nam eorum directiones sunt ab invicem variatæ, nec ipsa corpora persistunt ad contactum in ipsum primo nitentia, non solum per lineas motus, eodem modo, ac primo ad invicem positas urgentia. Quoties igitur liquidum immutandum erit in aliud liquidum, fermentum, ut coheræntis vis mutetur, debet directionum motus, & nissus in contactum imminuere, vel augere, nec poterunt partes coherentes momentum suæ coheræntis mutare, nisi præsto sit corpus fermenti, quod intime sese partibus in contactum nitentibus, & inter se coheræntibus immiscendo, easdem a linea suæ directionis, a gradibus nissui in contactum urgentibus, atque a contactu primo dimoveat, ut in majorem, aut validiorem quocunque modo diversam coheræntiam illas urgeat; quod cum requiratur admixtio fermenti in particulas fluidi, per illa vascula se rapientis, nisi determinetur a diversis solidorum, & pressionum momentis a circumpositis fibrillis in motum constitutis, fermentatæ moleculæ eodem directionis motu in glandulas sisti, itaut in ipsas particulas allidens mutuo cum impetu facultas non sit major illarum momento non poterunt licet in fermenti naturam mutata in glandulis sequestrari.

Quod si sufficiant solidorum impulsus, & diversæ circumpositarum fibrillarum pressionem, ut coheræntes particularum occurrentium mutentur, qui sit, ut tanquam necessarium constituatur ad animalium separationes fermentum? sufficere autem ad coheræntiam partium removendam suadet facultas illa, qua mutuo invicem coherærent miscibilia, quæ licet contrahens cordis impulsui, solidorum oscillis, fibrarum circumprimementium conhiu, cum tamen sit minor illorum momento, non poterit in eadem positione, & contactu fluidi corpuscula detinere.

Ut evidenti ratio mechanica pateat, qua coheræntis mutationi, & contactus remotioni facultatem illam contrahentem viribus impellentibus, & atterentibus resistentem ab iisdem superari ostenditur, inquirenda est causa illius resistentiæ, quæ a corde superatur, cujus vis motiva musculi cordis juxta celeberrimi viri Borelli calculum, cum superat suo momento resistentiam totius sanguinis arteriarum, & fasciarum earundem dilatationem impediendum, non solum major est vi ponderis 18000. librarum, sed ejus absoluta vis musculum constringens, in quo a fibris cordis quasi ad mutuum contactum deventibus compressa fluida ad minima dividuntur, atterunturque ad totalem vim, qua sanguis in arteriis expulsiōni resistit, eandem proportionem habet, quam unitas ad sexaginta; cujus demonstrationis calculus, licet non evidenti demonstratione ostendatur: tamen si mensurentur resistentiarum aggregata, quæ sanguis patitur, dum fluit per angustissima capillamenta gracilescunt canalium, in quibus nulla fere pars contenti liquidi est, quæ non perveniat ad usque contactum superficiem canalis, quæque per brevissimum canalis vectem dimoveantur cum majori resistentia, quæ crescit, tum quia liquidum fluens per angustiores canales plures contactus invenit, cum, ut constat ex Geometricis, superficies minoris canalis major sit, quam superficies majoris proportionem molium, tum quia sanguis fertur per mille flexiones varias canalium, qui illic texuntur in rete, hinc in spiram circumvoluti incurvantur, mirisque modis implicantur, in quorum singulis flexionibus novam semper patitur resistentiam, exerat cor oportet tot vires in singulis contractionibus suis, quot sufficiunt ad superandum insignem resistentiarum cumulum, quæ cum iisdem arteriis contrahentibus sanguini a vi cordis superentur, dum sanguis per exilitatem, & ramificationem vasculorum supra omnes resistentias a cordis contractione truditur, facilius me allicio, quamquam tardii, ac laboris impatiens, magis diligentia, atque aliorum industria, quam mea instructus, ad internam cordis fabricam perpendendam, quod perinde est, ac naturam, & vires causarum, quæ ventriculorum contractionem producant, ad examen revocare: in quorum contractionibus cum actio cordis tota consistat, sufficiat ventriculorum nissus considerare, qui, dum contrahuntur, sanguinem eorum contractione prementes, partem eorum motus ipsi communicant, ob quam impressionis, & motus communicationem sanguis movetur, urgeturque in circulum. Impressionis igitur motus integris cordis viribus debetur, quæ ventriculorum viribus separatim sumptis debent esse æquales; ut ventriculi sinistri vires, ni fallor, ut inquit M. Furin in Bibliotheca Anglica Gallico idiomate conscripta, vim ponderis novem librarum æquant, illæ dexteri sex, igitur integræ cordis vires minores non erunt vi ponderis 15. m. librarum; igitur sanguis, licet non propellatur, & urgeatur a vi juxta Borellianum calculum determinata, movebitur tamen a vi 15. libras æquante, qua pressionibus cordis subjicitur, & a vivido fibrarum suarum elatere ad partes propellitur.

At quoniam cordis vis, quæ determinata est, nequit impetum illum sanguini imprimere, quo ipse sanguis superare omnino possit implicatorum vasculorum resistentias, per quas canalium circumvolutiones perpetuo fluit, refluitque, nisi præsto essent alia facultates motrices, quæ novum supra fluidas particulas momentum exercent. Proinde in cordis subsidium omnes fibræ ut parvi vestes systaltico motu, & pressionibus liquida in gyrum pellunt, & ulterius urgent; ab hoc igitur tum solidorum tum fluidorum impulsu, & connisu poterit coheræntis vis immutari, aut nissus particularum in coheræntiam nitentium plane tolli, etsi non admittatur imaginarium, atque commentitium chymicorum fermentum.

Verum quam dubio, & infirmo fundamento innitatur quisquis fermentis hisce suffultus secretionis opificium enucleare satagit, concipitur a sanguine in motum agi ulla fermentatione non posse. Quod autem sanguis a fermentatione non moveatur, ex eo evincitur, quod spiritus ardentis in destillatione non exhibet, acres quidem, & urinosos, sed oleosos, atque ardentis omnino nullos. A solo itaque aeris elatere, & spirituum animalium irradiatione cor excitatur in circularem motum cum pulsuum arteriarum sanguinem exprimit: at non intestino motu ebullitionis, & effervescentiæ illum exagitat, si nomine ebullitionis non intelligimus motum illum, quo sanguis ab axe ad latera, a parietibus allisus ad axem vasorum repellitur.

pellitur, ut fusque deque in vertiginem agatur, quæ sane ejus incallescencia, atque ebullitio, si intra vasculorum ductus ob fermentationem excitaretur, ab incisa vena protinus emicaret. Quod si sulphur inesse aliquod sanguini innuas, ut unum ejus fermentationis principium, cujus particula sulphureæ indefinenter in corde accensæ totius vitæ nostræ curriculo effervescentias remonent, utque in tenuissimum spiritum dissolutæ cum aliis liquoribus exaltentur, aliqua febrili inflammatione, ubi sanguis ex toto accenditur, enormiter exaltatæ, immo ab ista conflagratione in undequaque gliscientem flammam adactæ, si per biduum pabulum nutritium huic flammæ deficeret, cum quod semel fermentavit, fermentationis motum non ineat amplius, deberent sponte quiescere, quod cum non contringat, dubietatem fermentorum prorsus demonstrat, & eorundem utilitatem pulchre convellit.

Explosa ut minus rationi consona fermentorum hypothese in medium producta, nec illa vetus scholarum sententia, qua glandulæ per facultatem attracticem secretiores a sanguine promovent, vel per electricam vim humores separant, admitti potest per saniozem philosophandi rationem; nam sanguis a partibus non attrahitur, sed vi cordis contractili, & vasorum resiliencie compressus ad partes propellitur.

Pitcarnius vero, cui nec chymicorum fermentum, nec mechanicorum cribrum arrisit, sed mechanica magis, & Geometriæ nuper recepta conformior explicandi ratio, secernendum liquorem a sanguinis consortio, hac arte contra cribratores directæ determinatam in glandulis exposcentes figuram expedire conatur, quæ sere tota in hoc sita videtur, quod si fluidum vi impetus gravitatem ipsius fluidi superans in cavitatem tubi adigatur elastici, & facile cedentis, orificium ipsius tubi in circulum abeat: cum impetus fluidi æquali vi per lineas longitudinis tubi, & ad latera ipsius perpendiculares expellat parietes ad æqualia undique a dato axis puncto intervalla, quæ æquale impetus momentum sustinendo paria evadunt. Si fluidum magna vi, hoc est fluidi gravitatem multum superante in cavitatem tubi adigatur, manifesta ratione evincitur, & multiplici experientia confirmatur, motui tubi in longitudinem conjungi semper impetum in tubi latera perpendicularem, qui ipsa ab axe motus undique nititur extrorsum propellere, idque vi æquali; quia nulla fingi potest ratio, quare major esset versus unam partem, minor versus alias nisi quæ a partium fluidi gravitate peteretur, quam nullius momenti assumpsimus præ magnitudine alterius vis fluidum impellentis; & si latera sint flexilia, elastica, & facile cedentia, tum fieri non potest, quin effectus suos consequatur impetus, expellatque latera ad æqualia undique a dato axis puncto intervalla, eaque tantæ longitudinis, ut diductorum laterum tensio, & elasticitas subsistendo impetus momentum, jam pares evaserint; quo casu quam primum induisset figuram tubus, & postmodum in aliam mutabitur, cujus sectiones omnes ad axem perpendiculares necessario erunt circuli majoris vel minoris diametri, pro majori, vel minori fluidi impetu, laterumque majori, vel minore flexilitate in diversis tubi locis. Tales vero flexiles tubi sunt vasa corporis animalis universa, per quæ cordis machina fluida omnia propellit ea vi, quæ propulsorum gravitatem longe superat. Hæc Pitcarnius. Cum igitur sphaera sola sit inter figuras solidas quæ datum orificium pertransit quolibet situ ad illud delata, & solus circulus sit inter figuras planas, qui admittit cujusque figuræ corpus, dummodo diameter corporis non sit major diametro circuli, deducit, fluida, quæ separanda sunt, nullam deposcere figuram sibi propriam, & constantem, cum glandulæ circulares ex se cuicunque figuræ secernendæ accommodentur, dummodo vires cordis impellentes ad occursum suum orificii ad cohesionem partium fluentium tollat. Expendamus modo ingeniosissimum quidem tanti viri rationum cinium. Quoniam impetus fluidi in aliqua cavitare contenti, ad hoc ut ab ipsa axe æquali vi undique nitatur extrorsum propellere tubi latera, exigit, ut motus fluidi, quo impellitur per longitudinem tubi, æquet impetum ad tubi latera perpendicularem, qui impetus ab axe ad parietes tubi perpendicularis æqualis esse non poterit motui tubi in longitudinem, quotiescunque motui fluidi in longitudinem opponuntur, & hiant ductus aperti (quos Pitcarnius in demonstratione non supposuit) qui fluido concepta vi in cavitatem tubi adacto egressum cedant, fit, ut dempta plenitudine, & totali inflatione ipsius tubi, impetus fluidi ad latera nitentis eludant; ex quo colligitur in glandulis nullum fieri a sanguine impetum, ut diducantur latera earundem in circulum æquali motu rectæ vel obliquæ directionis momento. Cum fluidum in cavitatem glandularum propulsum transeat per diametrum orificii non majorem diametro canalis excretorii, non erit majoris molis, quam quod poterit per ductus illos eliminari. Verum licet corpus glandulæ, ejusque orificium ex tunicis distractilibus, & facile cedentibus fibris coalescat, ut possit, si cæteris datis, in circulum abire: Nihil tamen minus si ductus excretorii oscula non conniveant, aut obliterentur, glandula non migrabit in sphaeram, cum pressio liquidorum ad latera minor sit quam eorundem nisus recta incedens, nec sanguinis impetus infringatur ab hiantibus ductuum excretoriorum oris in glandularum corpore sitis, ut illius imminuta rectæ directionis velocitate ad parietes augeatur impetus, non fiet, ut æquali nisu diductilia latera undequaque premantur a secernendo liquido, quod sese prius ejaculare conatur linea recta ad perpendiculum per tuborum oscula aperta, antequam ab axe angulos rectos momentum in glandulæ parietes æquales exerceat. Igitur ab impetu sanguinis ipsius gravitatem superante nulla in glandulis figura sphaerica evincitur. Ut autem in dubium non revocetur ostensio propositionis, sufficit aciem intendere oscula glandularum hiare, nec hiare solum postquam fluidum fecit impetum, sed hiare ipso momento temporis quo fluidum impellit. Hinc licet nisus villorum osculi glandulosi nullo contrapondio impeditur sit continuus ad contractionem, & nisi extendatur a fluidis currentibus, aut in eo contentis, ob pressionem cujusque liquidi ad contactum suarum fibrarum carnearum excurrentium perpetuo ad contractionem tendat: tamen fluidorum motus omnino directus a perpetua solidorum oscillatione, dum urgendo extendit fibras cavitatis glandulosæ, & in illas æquale momentum impulsionis exerit, quia æquales resistentias non invenit, in fibras minus contrahentes, quæ sunt illæ orificii glandulosi, primo in easdem propagatur ejusdem impetus, qui cum in illas propagari non possit, nisi dilatetur diameter osculi, fit ut simul, & semel ab eodem urgente fluido extendatur cavitatis glandulæ, & excretorii ductus osculum, antequam diductilia latera eodem nisu urgeantur, quæ cum premi non possint ab eodem impetu, primo aperietur excretorii ductus orificium; & licet non aperiat ipso momento temporis quo fluidum impellit, aperietur saltem, antequam colligatur ille impetus in parietes, qui illos in circulum abire cogat. Partes minus resistentes esse fibras orificii excretorii in cavitare glandulosa, ex eo patet, quod non solum a minimis fluidi guttulis, cunei vices gerentibus, & sese insinuantibus inter spatia orificii nullo fibrarum nexu firmata, ab illarum pressione ita urgentur, ut sustinere illam percussione non possint: sed etiam quia opposita, & se invicem agentia latera orificii nullis fasciis fibrillis, ut cætera cavitatis glandulosæ fibræ, irretiuntur, quæ pluribus fibrarum ordinibus, & fasciculis compinguntur.

Urget tamen Pitcarnius, si corpus recipiendum sit orificio minus, & intra illud possit accommodari, adeo ut omnes sectiones per plana orificio parallela sint minores orificio dato, tum non hoc solum corpus, sed infinita alia cujusque figuræ orificium illud poterunt subire; & quamvis maximam corporis sectionem similem ponamus, & æqualem figuræ orificii dati, quia tamen diversissima corpora eandem secta nanciscuntur figuram, per idem orificium diversissima poterunt transire corpora, sive per idem vas secernens diversissime derivari secretiones. At nonne sagacissimus Auctor exclusis quibuscunque determinatis figuris sphaeram admittit; & tamen secretiones plures, & longe diversas per idem orificium celebrari non finit. Sic inquit: Per idem orificium circulare transit non tantum sphaera, cujus sectiones similes sunt æquales circulo orificii, sed conus & cylindrus super æquali basi, & per idem orificium transibit, & pyramis, & prisma, & conus, quorum sectiones maxime per plana orificio parallela sunt triangula æqualia, & similia triangulo datum orificium comprehendenti. Ex quo deduco cum annularis cylindrus solus sit inter figuras, quæ admittit cujusque figuræ corpus quomodocunque situm, modo corporis maxima diameter non sit major diametro annularis cylindri, multo plurimas, & longe maximas necessario fieri fatendum erit, quam si glandula determinatæ figuræ admitteretur, quod est contra artificium subtilissimi Pitcarnii. Unde licet conus, & cylindrus in æquali basi per sphaeram possit transire, non transibit tamen fortasse, si simplici contactu in cæteras particulas non nitatur, & in minimam divisus ut ad secretionis opus requisita velocitate polleat.

Quoniam minima solida diversimode inter se complicata, & motu intestino agglomerata fluidum constituunt, hæc ipsa juxta molem, gravitatem, figuram & cohesionis momentum vibrationem suscipiunt. Si v. gr. supponamus in eodem fluido particulas corporeas non omnino dissociatas, sed concatenatas inter se, sive propter varias figuras sese mutuis amplexibus tenentes, sive quia anguli unius corpusculi inter cavitates alterius insinuat non possunt libere vagari, ita ut concipi debeant veluti vectes, qui ab una parte impelluntur a premente, ex altera retardantur a resistentia, quæ contrario nisu resistit impulsui ipsius prementis; tunc quidem particula illæ in spatio fluido actione contraria adhesionis retardatæ, prementis viribus impulsæ impetus a premente impressos successive retardant; & hoc pendet ex lentore, quo colliguntur prædicta corpora atque resistentibus viribus, quæ imminuendo vim ipsius prementis particulas a contactu non dimovent, & prædictas machinulas a secretionem divertunt. Quia vero corpus ipsum suscipiens pro diversa situatione ejus diversimode impulsui illato resistit, fit ut actio percussiva varietur pro diversitate resistentiæ a situ variatione procreatæ; & hæc est secunda causa, a qua impetus energia ipsius percutientis, & resistentia corporis diversificatur.

Si postea impetus graduum impressorum inæqualibus corporibus ab eodem corpore percutiente, & ejusdem viribus mensurentur, erunt quidem eorum velocitates quodammodo proportionales magnitudinibus corporum impulsorum: sed corpora illa inæqualia, quæ impelluntur ab æqualibus viribus motivis inæquali velocitate movebuntur, & velocitates illæ duorum corporum inæqualium eandem proportionem habebunt, quam unum corpus habet ad aliud in ratione gravitatis, & molis. Hinc evidens est, cum corpus fluidum varie contextum diversisque particulis combinatum transferatur a virtute communicata, & propagata a projiciente, dum modo per medium fluidi ab impulsu fertur, modo revolvitur horizontali vertigine circa suum centrum, modo particula centrifugæ excurrunt contra directionem motus ejusdem fluidi non posse æqualiter impelli, ut æquales sustineat impetus, sed longe diversas minimorum solidorum solutiones subire, ut in plurimis particulis, sit minima divisum, alias simplici tangeus contactu revolvatur; & hæc est prior ratio, quæ ope determinati motus secretionis leges observat; sed ajunt; canalus omnis suo liquido plenus cum contrahatur a facultate posita ad contactum laterum omnium nitente intra contentum liquidum, exerceat sua momenta in canales animalium villis circularibus in superficie eorundem canalium dispositis, contextos, qui villi circulares æque distantes canalium orificiis contrahuntur per illam ipsam aream circuli, ad cujus circumferentiam ponuntur, erunt non solum momentorum æqualium, sed series globorum liquida componentium, dum per canalia fluunt, cum æquo nisu villos canalium contractiles impellant, & in ejusmodi circuli diametros æqualiter nitantur, canaliculi illi in conicos, aut cylindricos abibunt, quorum conus, aut cylindri in circinos circumvoluti erunt glandulæ circularis diametri. At licet momenta facultatum contrahentium canales omnes in genere sint æqualia, seu villi contractiles æque crassi, & dispositi per veram circumferentiam circulorum in fluidum æque nitantur, & liquida solum æque premant, incredibile est, quantum hæc communiter admissa in prodigiosis glandularum productionibus a veritate dissent. Artificium naturæ, quo illa utitur ad glandulas producendas subtiliori fortasse mechanica sulcitur.

In summis arteriis protractio cylindrica glandularum inflexa in spiram, & intexta in reticulares opus est filamentorum glomer, quæ flexionibus variis in quas hi iidem rami veniunt, per corpora glandularum implicantur in textu inexplicabiles, eorundemque spiræ ob inexplicabilem illam diversitatem positionum innumerabilibus ramorum ramis ad usque ultimas, qui universam arteriarum ramificationem texentem, glandulas constituunt invicem decussantur, implicaturque in mille anfractus ita rotatæ arteriæ, ut filum

lum earundem, quod successive glandulæ advolvitur, non veniat in eundem locum cum filo jam advoluto, sed ipsum secet in decussim. In hac apta superimpositione filamentorum, & spiris arteriarum ad se invicem inde decussim positis, atque diversimode se secantibus mirabili artificio villi contractiles advoluti superficiei in mutuam contractum nitentes contrahuntur premendo in puncto contactus superficiem canaliculi inferioris conici, au cylindrici; Ex horum mutua canalium positione, & nifus directione fit, ut cum momentum, & pressio superincumbentis vasculi non sit minus momento inferioris resistentis, superficies vasculorum conica, aut cylindrica quasi in planam decussata abire cogatur, adeoque fit ut eorundem villi contracti per plana, ut notum est ex Geometricis; tangentia planum immixtarii glandularum non constituent verum circulare orificium, tam affabre contextum, ut tota glandula in arteriolarum ramis evadat in figuram exacte sphericam.

Recensita aliorum sententia, & sphericarum figurarum in glandulis necessitate, eaque in dubium revocata, nullus tamen æquabilis, & constantes inter pororum diversitates, vasorumque orientium in animalis contextu ajo esse figuras. Orificia glandularum non solum majoris, vel minoris diametri ratione inter se differre, sed figuris diversis ita efformari, & compingi, ut a diversa fluidorum pressione, a diverso solidorum renifu possint ita distrahi, ita comprimari, restringi, dilatari, convelli, ut si non omnes figuras æmulentur, saltem cuicumque figuræ accedant: quapropter fas sit dicere in separatione fluidorum aliquam proportionem filtri cum fluidis requiri, & vires cordis propellentes cum aliqua ad orificia glandularum pressione, quæ superent ad occursum osculorum cohesionem partium fluentium, quod expeditur determinata sanguinis velocitate, quibus omnibus mechanicorum diffidia dirimuntur, ita ut nec cum Borello, & Poristis, nec cum Pitcarnio in integrum litigium habeatur.

Quoniam sanguinem componunt minimæ solidorum moleculæ diversimodæ inter se contextæ, certisque miscilibus præditæ, ideoque nexu, ac gravitate distinctæ, ab eadem vi cordis impressa minima illa fluidi componentia diversum velocitatis gradum, ut superius ostendimus, suscipiant oportet, quo fit ut a concepto impetu ex fibris contractilibus cordis, vasorumque compressione sanguinis moleculæ, mutatis positionum directionibus, vel arcto corporum contactu relicto per arteriarum conica, vel cylindrica canalicula fluant, & per ipsa ad glandulas salivales delatæ, dummodo diameter maxima particularum fluidi separabilis non sit major diametro orificii, in obvia glandularum oscula separabuntur. Exigunt tamen, ut sint in minima divisæ juxta Borellum, Pitcarnium, & nuper virum maxime doctum Michiellotum, quæ non tenaci nexu, sed simplici contactu uniantur, ita ut una quælibet earum possit agitari, fluere, circumvolvi, aliter motis lateralibus, alio enim modo salvati non posset facilitas illa, qua fluidi partes leviter coherentes, & non determinato impetu allisæ soperare possunt orificiorum resistentias, & inter diductos poros sese intrudere; quarum solutiores partes ab axe arteriarum per latera vasorum discurrentes, & non separandas partes simplici contactu tangentes, si arterioli occurrerint glandularum latera nitendo oblique contrahentia, ipsarumque molecularum impetus non erit minor orificiorum viribus, nec major, ut tempus, licet indefinite parvum habeat (ad liquorem enim in aliqua glandula separandum sejunctionis tempus, licet indefinite parvum, requiritur) in orificia vasorum impinget, & in hiantia oscula intrudentur.

Quodcumque fluidum in arteriis præexistens a sanguine separandum ab ipso fluido abscedere non poterit in ductus glandularum secretorios, si sanguinis fluentis velocitas ad ipsas glandulas talis, ac tanti momenti non erit, ut possit glutinamentis associatis moleculas dividere, & partium implicatarum nexum laxare, atque imminuere. Mutuis nifibus igitur sanguinis rotatis particulis, & vertiginosis motionibus agitatæ a variis pressionis, & lationis momentis fiet, ut sanguinis solutæ moleculæ modo a pressione fluidorum ad latera vasorum impingentes, modo a lateribus repulsæ per axem revolvantur: hinc a tergo superveniente impetu propulsæ, eundem semper directionis nifum, & impetus gradus habere non poterunt. Ubi autem canaliculum arteriosum conicum, aut cylindricum Bellini plicatum in plicas, vel in longitudinem extensum, fluidum separandum impinget, atque sufficienter vasorum orificia impellendo extendet, apertis osculis applicabitur.

Quod autem quæcumque sanguinis velocitas velocissime currentis, aut pigre arterias transfluentis non sit sufficiens ad separationem, non modo se dilatantibus, verum se contrahentibus vasculis, eaducor ratione, quod corpora diversæ gravitatis vi æquali pressionis impulsæ sapissime velocitates, atque directiones inter se diversas suscipiunt, & conservant. Sic observo, dum globulos plumbeos, vel grana frumenti diversæ gravitatis, ac molis manu projicio, licet gravibus motus imprimatur æqualis quantum ad projicientis vires, in eis tamen velocitatem, & impetum primum non conservari, sed alia recta incedunt, alia oblique vagantur, alia velocius moveri, alia tardius cursu rapi prospiciuntur, servata tamen eorum velocitate reciproce proportionali magnitudinibus, & gravitati corporum impulsorum. Hinc sicut impetus projicientis diffunditur in allata corpora, & communicatur projectis; ita eadem in diversis gravitate, ac mole sanguinis moleculis ratione imminuitur, vel augetur. Sanguis igitur cum non uniformis sit, sed constet ex particulis diversimode figuratis, (corpus enim fluidum, simulque continuo fluens, licet in omni puncto diversibile, componitur ex partillis terminatis, & quantis) & quanquam infinite parvis, & divisis, tamen mole, figura, & partium cohesione diversis, ut dubitandum non sit, plures fluidorum proprietates, ac naturas pendere a diverso coherendi modo, a structura, configuratione, ac motu molecularum sanguinem componentium; ita ut particulæ a quam componentes hac ratione similes inter se sint, atque diversæ ab eis, quæ oleum componunt; harum infinita miscibilia partium parvitate maxima pollentia diverso gradu velocitatis instruita, & diverso nifu, & causis in projectis corporibus impellentibus æquali impetu inæqualiter operantibus glandulas alluunt, quorum velocitatis momenta debent commensurari corpusculis sanguinis gravitate diversis, & inæqualiter ictui cordis & solidorum oscillis resistentibus.

Sanguinis igitur moleculæ per axem arteriarum fluentes illas partes

resistentes non offendunt, quibus allabentes vasorum latera occurrunt. Arteriarum tunica quarta interior tenuissima fibrillis in longum protensis villos annulares tunicæ præcedentis ad rectos angulos secantibus, contextitur. Hujus fibrillæ non possunt ita concatenari, ut internam superficiem scabram, & parietes vasorum inæqualiter lævigatos non constituent; adeoque sanguis particulis collateralibus retentus non poterit excurrere, extricari, quin miris in modis per plana horizontalia, vel inclinata variis ictibus flectatur, indeque circumvolurus minimarum asperitatum confractionibus ita impeditur, ut ictus illatus particulis sanguinis in latera nitentibus a corde, & impellentium corporum impressa velocitas ratione contactus excurrentis projecti impetum retardantis debilitetur; quod evincitur non solum in liquidis fluentibus extra animalium canalia, sed etiam in liquidis per ipsa animalium vascula fluentibus, quæ dum fluunt per canales in linea, quæ maxime distat a canalium superficie, majori velocitate rapiuntur, quam si fluerent per lineam, quæ magis accedit ad eandem superficiem, in qua plures adesse possunt causæ, per quas eadem liquida inæqualibus motibus agitantur in partibus suis. Ex hac inæquali agitatione fit, ut eadem partes sanguinis numquam semperistantur ad contractum, in aliam lineam abeuntes mutant positionem in centrīs suis, excitanturque proinde non solum in diversam motus directionem, sed deflectentes a laterum contractu majori momento agantur. Unde inæqualitas illa momentorum a positione seriei globorum liquida constituentium confurgit, ex quo fit, ut eadem partes nunquam certo locoistantur ad certum semper contractum; ob quam motus inæqualitatem, positionem variam, & vini liquidum perductum ad immixtarium, si ita dispositum sit, ut partes ejus anteriores in latera truantur, nitentur quaquaversum in superficiem ejus internam, & in ipsum emissarium incidere oblique, & separabuntur.

Sint ulterius particulæ corporeæ aliæ coherentes, aliæ sese tangentes ut acervus arenæ, (si lubet mere fluidum cum fluidis, & humidis comparere) quæ diversis resistendi modis vini impulsivam projicientis a tergo urgentis imminuunt, eamque retardant. Resistentia quæ primis refertur, pendet ex glutinosis fibris, quibus implicantur prædicta corpora, atque vis divisioni resistens est illa, quæ retardationem infert velocitati ipsius projecti; posteriores vero si sint talis figuræ, ac levitatis, ut possit una earum inter alias excurrere, & contorqueri, tunc quidem propulsæ insinuantur inter alia, & exercentes actionem cunei in alias particulas resistentes insinuantur, quæ non solum impetum projecti retardare non possunt, sed resistentias particularum superius expositarum continenter imminuunt. Fit igitur retardatio tardius, aut citius, prout plures resistendi modi in sanguine concurrunt, quæ resistentia constat ex innumeris peculiaribus retardatiunculis una post alteram confectis, a quibus omnibus contraria reactione, ac repulso, vis & energia, ictus, & impetus enervatur.

Ex hoc diu perpendens cum doctissimo viro Michielloto, quod ut fluidum separatur, debet esse divisum in partes, quæ non habeant rationem majoris inæqualitatis ad minimam osculorum orificii diametrum, & quod hæc partium divisiones se in puncto contactus tangentium oriuntur ex mutua fluidorum collisione, se invicem attritentium, & compressivo solidorum conatu, colligo, quod hæc partium solutio debet imminuta fluidorum attritione, & solidorum nifu, & cum hæc omnia debilitentur, vel augeantur debilitato, vel aucto motu, patet in debilitato motu, vel aucto imminui, vel augeri liquidorum secretiones: igitur non quæcumque velocitas ad quamcumque naturalem separationem fluidorum, sed determinata requiritur.

Corpora insuper, quæ separanda sunt, non solum nitantur invicem in aliorum contactum, sed ipsa se contangant cum nifu, ut repugnent remotioni ab eodem contactu; cum illa determinata positione contactus persistent corpora in eadem cohesionis vi, quorum corporum coherentium directiones a mutua obliqua, vel in directum posita, aut perpendiculari situatione non avertentur, quousque illa corpora eodem nifu in contactum, eodemque directionis momento in eandem positionem nitentia, in eadem cohesione persistent. Mutatis igitur gradibus nifum, & variatis positionibus directionum, atque corporibus a contactu cum nifu urgente remotis, non solum mutabitur directio nifum, & gradus motuum, verum cohesionis vis plurimum mutabitur, cujus simplex in contactu coherendi modus necessarius est ad perficiendum artificium secretionis. Machina autem hujus operationis a mutuo nifu in contactum coherentes fluidi moleculas removens, & impedimenta illa arripiens ob quæ in canalibus a separatione prohibentur, est impulsus liquidorum in solida, & solidorum nifus, & renifus in fluida, ex quibus omnibus fit demum in textibus reticulantium arteriarum sanguinis solutio maxima, ob quam colligatæ particulæ ab eadem cohesione ita divelluntur, ut sanguis, superatis plexibus retiformibus, non solum conservata solutione, quam subit intra cordis ventriculos, & pulmones per totam canalium longitudinem, vasculorum ambagem, & contorsiones ad usque plexus retiformes, verum eadem solutione in eisdem plexibus plurimum aucta glandulas facile ingreditur.

Cum autem mutua particularum cohesionis vis, & unio a parietibus cordis allisæ, pulmonum pressione concussa, & solidorum viribus, & oscilli, diffractis vinculis in minutissimas moleculas dividatur, poterunt mutuis contactibus diversæ particulæ uniri, & varia filtra pro diversa indole, ac modificatione, quam situs, positura, ordo, & particularum combinatio permittit, separari; unde cum cor semper eodem gradu nifus, & solida quæque non nitantur in fluida, cohesio illarum partium ob diversum impetus momentum excurrentibus miscilibus impressum ab occurrentibus resistentibus plurimum modificabitur, a quibus simul sumptis immediate dependet sanguinis solutio major, vel minor. Hinc si minuetur solidorum impetus, & vires, augebitur nifus partium in contactum, unde sanguis non solum in eadem cohesione persistet, verum in majorem, & validiorem unionem promovebitur, & hoc subito fiet, si vis illa, qua coheret partes, sit momenti majoris, quam momentum solidorum atterentium. Posita autem cohesionis vi, & plurimum promota, cum ad separationem requiratur simplex cohesionis contactus, evidens est, vel nullam, vel tenuem admodum fieri secretionem. Ex hoc deducitur, ad quamcumque separationem non sufficere quamcumque sanguinis velocitatem: quia potest dari ille

Cum igitur, ut ostendit insignis Bellini proposit. 20. de motu cordis, facultates contrahentes moventur, canales figuram mutant ea ratione, quam secum fert proportio velocitatum, quibus eadem facultates intra canalem moventur, & portio illa velocitatum pendet a momentis, quibus facultates instructæ sunt, & cum momenta in canalibus pendeant a crassitie villorum, a quibus facultates illæ constituuntur, facile intelligis, quo momento contractionis opus est ad hujusmodi velocitatem acquirendam in hac, aut illa arteriarum parte, quo inde addisces, quæ crassitie villorum opus fuerit, ut tale habeatur contractionis momentum, quod cum determinetur a diversa villorum crassitie, non solum inæqualis habebitur directio motus, tum solutio sanguinis major, vel minor, sed tum figura in glandulis plurimum mutabitur ea ratione, quam secum fert proportio velocitatum fluidorum, & positio solidorum, eorundemque contritio, & resistentia. Quapropter sanguis cum juxta majorem, vel minorem divisionem ortam a connisu solidorum & reactione fluidorum particulas conglutinatas dissociante, & inertes atterente, majori, vel minori in glandulas impingat velocitate, sit ut diverso gradu velocitatis instructus per varia viscerum filtra præterfluens congruis vasorum separantium orificiis fluidorum impetum recipientibus apponatur; hinc inde a pressione particularum a tergo urgentium impulsus in dispersis viscerum glandulis substantias deponit; & quoniam ab impetu primo sanguini a corde impresso, ejusdem molecularum velocitas, atque solutio debilitatur non solum a proportionali arteriarum afferentium, & venarum deferentium resistentia, verum occursum resistentium varietate, nimirum ab arteriarum spiræ, & cono, a mole corporum fluentium, pondere, & elatere comprimentium impeditur, promoveturque; ideo per totas animalis lacunas, & viscera sagax natura disposuit filtra, ut diffluentium molecularum impetum, & diversas fluidorum solutiones sibi proportionales reciperent. Hinc quamcumque sanguinis glandulas percurrentis velocitatem ad secretionem animalem sufficere redarguunt partes secernendæ, quæ debent esse actu divisæ in minima, ut se tangant simplici contactu; repugnat enim sanguinis separandas moleculas esse actu divisas, & simplici se tangere contactu, nisi admitatur illa velocitas, quæ conglutinatas partes dissociant, quæ debet esse directe quodammodo porportionalis illarum cohesioni.

Quis inquam est mentis tam præjudicata, quod quotidie non videat ab accelerata, vel imminuta sanguinis velocitate accelerari, vel imminui liquidorum separationem? si quæcumque sanguinis velocitas ad quamcumque humorum separationem sufficeret sine ulla prorsus figuræ diversitate, explicari non posse videtur, quomodo producatu iſterus absque filtri separantis injuria, quem sane vidit Sylvius cap. de Iſtero a spiritu volatili, potuque generosiori absque ductus biliarii obstructione productum. Bilis enim a spiritu copiam in fluorem nimis eversa ob sui motus accelerationem in acinis hepatis glandulosis minime coercita, ad vascula majoris resistentiæ, & sui motus impulsui proportionali defertur, in quorum conis, & spiris retuso impetu, & corporum elatere comprimentium imminuta motus acceleratione ad cutanea loculamenta inficienda sibi viam sternit.

Sic quando sanguis præter rationem tardius currit, tardius quoque procedit evacuatio. In puerperis observante Baglivo, superveniente febre ardente lochiorum fluxus supprimitur, eodemque febris incendio lac evanescit in mammis, reditque remisso calore febris. Igitur cum Pitcarnio, & laudato Michielloto a Borello, & cribratoribus Mechanicis glandularum orificia datæ figuræ corpus tantum recipientia admittentibus dissentiunt, quoniam omnis glandula ex tunicis contractilibus, & distractilibus, & facile cadentibus machinulis coalescit: quibus non sufficientibus requiruntur mutati velocitatis gradus, accelerata, vel retardata percussione impetus, qui a corde sanguinis miscilibus impressus, juxta molecularum ad motum resistentiam, quæ a corporum cohesione, vel gravitate dependet, augetur, vel imminuitur. Attamen quid curiosi, quod mirabilis natura parit in crassis, tenuibusque liquidis separandis solliciti inquirentes ingeniosissimi viri ultimam in hac re mechanicam eruere non poterunt. Nec mirum si in re tam ardua, tam difficili in dubium manebat, ut Lucretius, quod latet; Ultimæ enim rerum differentiarum ob datorum defectum ad Mechanicæ doctrinæ leges, methodosque adduci nequeunt.

ARTICULUS IV.

De usu salivæ.

SI nulli rei destinaretur salivæ latex ab arterioso sanguine per glandulas in os, & œsophagum eructatus, inanis foret naturæ lusus glandularum illa productio a tota cavitate palati erumpentium: quapropter cognitæ salivæ ductibus, & opificio secretionis perpensis, usus ejusdem in œconomia animali eruendus est. Qui enim glandularum secernendæ salivæ, maxillarium nempe, parotidum, tonsillarum, tyroidearum, buccarum, palatarum, & œsophagæarum numerum, e quibus maxima salivæ copia continuo separatur, serio perpenderit, atque ab eis ventriculum indefinenter exonerari serio considerans, plurimi momenti esse salivalem humorem a provida natura multis usibus destinatum, animadvertet. Hic enim triturationem alimentorum in ore faciliat, eorundem deglutitionem promovet, sapidam a cibis tincturam elicit, quæ sensus gustus determinat, fauces, & œsophagum humectat, sitim nimiam compescit, ad vocis prolationem aptiorem reddit linguam, ab ejusdem cum alimentis in ventriculo admixtione inchoatur eorundem dissolutio ad chyli elaborationem ordinata.

Salivale menstruum quosdam a veritate alienos in tantum sui admirationem rapuit, ut solvens mineralibus inde sibi promiserint, & materiam universam, in ipso tamen deliramento decepti, quarerent; horum quamvis figmentis minime subscribam, activitatem tamen illius laticis evincit elicitus sapor ex alimentis momento tantillum in ore volutatis, cujus miscela eorundem liquefactio, atque dissolutio inchoatur. Dum cibus incisioribus, & caninis diffingitur, in minutas partes subdividitur, qui molaribus commissus, & hinc inde motu linguæ jactatus, undequaque ab effluente saliva irrigatur. Mirari quis desinat, separationem salium tunc contingere, qui ab aqueis salivæ particulis eliquati vi suæ gravitatis, & pene-

trationis vim cunei exercentes in membranam nervorum apices obducentem, papillarumque copulas efformantem pluribus foraminulis perviam impingunt; & motu linguæ vario undique impulsu, aerisque vi elastica perpendiculariter, & lateraliter, rotati in nerveas linguæ papillas adiguntur, quarum siphunculi linguæ implantati, & apice suo erecti angustissimis osculis occurrunt salibus, qui in nervorum furculis intimius illapsi, aut per organum gustatricis potentia confestim repentes cuspidalis ita titillant, certumque motum directionibus suis nervis gustatoriis imprimunt, ut modo constringendo, modo laxando, modo pungendo determinata undulatione afficiantur in nervis contenti spiritus, de quibus motibus anima compos ideam suavis, vel ingrati saporis efformat. Hic salivæ actio non definit, sed ut per continuam dentium collisionem, mutuamque attritionem chyli rudimenta evolvantur, opus erat menstruo aqueo salino, quod per contractionem muscutorum temporalium, & massacterum potissimum in actu masticationis, compressis glandulis, jugiter in os conflueret, quousque salinis moleculis plurimo aere refertis, & gravitate nativis subeundo alimentorum vincula, eorundem nexus, coherentesque particulas vi sui elateris exagitando, cum partium intra alimenti poros coercitarum exclusione commodius alimentum ipsum macerare, ac subigere posset.

Cibus ita permixtus, & attenuatus versus fauces protruditur, & prius ore clauso per contracta labia ope laborum sphincteris, de arcuato oris cavo actione buccinatorum, & zygomaticorum, tumque simul motum cibi urgentibus basiloglossis, & ceratoglossis una expresso succo lubrica linguæ, & palati, juvante ipsius figura, & superficie, fertur cibus utque ad linguæ radicem, ubi appulsus irritando convellit musculos geniohyoideos, mylochoyos, & stylohyoideos; a quorum vi attollitur radix linguæ, larynx, & os hyoides; harum elevatione impulsus cibus epiglottidem deprimit. Hinc relaxato œsophagi sphinctere a musculis genioyoglossis, & geniohyoideis ope myloglossorum, & styloglossorum truditur cibus ingulam apertam, contractisque fibris tunicæ œsophagi muscularibus oblique decurrentibus ad principium ventriculi usque promovetur. Illapso cibo in ventriculum a liquore salivæ simili docente Malpighio posth. 28. ex alimentorum distensione, & compressione tunicæ glandulosæ ex pluribus ramusculis elicitæ, motus intestinus massæ conciliatur, ut facilius liquefcere, dissolvi, ac subigi possit a fibris muscularibus, aliarumque tunicarum ventriculi attritione, & pressione, quorum auxilio, & diaphragmatis cum musculis abdominis inchoatæ ingestorum solutiones, ambientium viscerum calore fovente intimius comminutæ quasi in partes ultimæ compositionis resolvuntur. Vel si Listerum audiamus, ut saliva intra alimentorum inania coercita virtute septica expeditius alimenta in chylum resolvat, a cuius acri adurenti, & putrescenti naturæ concoctu difficilia putrescunt, & macerantur.

Sed non solum saliva variæ naturæ cibos ob salinam quam habet substantiam, vim cunei exerens, omnes penetrando digerit, incidit, ac solvit, verum perenni hoc fluore irrigatæ ventriculi tunicæ ejusdem salibus in contractionis motum validiorem excitantur, quæ ratione in debito tono cum plicarum crispatione, ad facilius expediendam triturationem, detinentur. Perenni hoc salivali liquore humectantur fauces, interiora oris, & œsophagum, madore laxantur, irrigaturque lingua, ut assiduo motu vocum exsucca ne reddatur; alias rigida facta cum faucibus arefcentibus, motus flexibilitatis jacturam facientibus anilis tracheæ, vocem edere difficilem, ac raucam; non irrigatis enim fistulæ pulmonaris salivali humore fibrillis, aer hinc illinc ab anulis non leviter concutitur, sed in latera illorum impulsus fortiter repercutitur; quod non aliunde videtur fieri, nisi quod rigida fibræ asperæ arteriarum, dum vi percussione aeris aliquatenus e loco suo distractæ conantur sese restituere, aerii rigidum tremorem imprimunt, adeoque raucus vocis resonat sonus.

Quamquam, si gustui credendum, insipidus humor videatur saliva, contrarium inculcat Galeni experimentum, scilicet scorpionem jejuni hominis sputo bis, terve aspersum protinus interire. *Saliva hominis inquit Aetius tract. primo serm. XI. reptilium venatorum generi maxime contraria est. Ego enim citra omnem incantationem ex solo jejuni sputo scorpionem pereuntem vidi. Omnibus hominibus inest venenum, feruntque illos salivam, ut ferventis aque contactum fugere, quod si in fauces penetraverit, etiam mori: idque maxime humani jejuni oris. Plinius lib. 7. & tamen omnibus contra serpentes inest venenum, feruntque istius saliva, ut ferventis aque fugere contactum: At intelligenda est jejuni hominis saliva, quæ utpote acrioribus salibus referta, veluti aquæ ferventis contactus, serpentes fugat; inflicto quoque a serpente vulnus, si confestim saliva illiniveris, non lethaliter sæviet, sed cohibito venenum, nec ulterius diffusum sponte evanescet: Hinc Lucanus lib. 9.*

Nam primum tacta designat membra saliva,

Quæ cohibet virus, retinetque in vulnere pestem.

Venatores serpentum, ut Aldrovandus de insectis lib. 1. statim ac illos cepere, saliva confricant, cujus contactu, præeunte Marco Aurelio Severino de Vipera, non tantum vilescit violentia veneni, sed si in os illorum diductum expuas, saliva in eorum ventrem delata tantæ feritatis illis est, ut sensum contabescant. Hac ratione nimirum partibus suis salinis confricatæ curantur lichenæ. Saliva hominis jejuni est medicamentosa; etenim in saliva adest virtus absterfiva in ulcusculis, licet minori gradu, quam quæ sit in scaroticis. *Levis papula, ait C. Celsus, si quotidie jejuna saliva defricetur, sanescit.* Saliva cancerum mammarum ob suas subtiles attenuantes moleculas discutere valet, ut docet Paulus Ammianus Med. Critic. & ratione alkali acido herpeti contrario reddit Schenckhius herpetem curari. Salivam robur asferre infantibus, inquit Matthiolus in 2. lib. Dioscoridis. Pusillas Crato, scrophulas Hildanus salivam resolvere promittunt; & si animus esset mihi referre, quæ apud Auctores perlegi, quos reor, aut deceptu faciles, in quorum re ali decipiuntur, aut denique vanæ gloriæ, atque ostentationis nativa hominum indole affectantes, in multo grandiorum admirationem facili negotio rem tumefacere possem. Verum sollicitus fui, non plures narrationes conscribere, quas vel invicta mea ad credendum innata tarditate assensum meum extorquere, non sensi, quæ nondum exploratæ non videntur iis probabiliores, quam quæ irritæ jam deprehensæ fuerunt. Quæque hujusmodi salivæ experimenta scrophulas, nodos gallicos, cancerum mammarum solventis, nusquam reperire dentur, præterquam in quorundam auctorum vana jactantia, tum-

mentibus libris, atque promissis, ut quisque, ni fallor, experientis deprehendet, quam parum eventus sui conatus laboribus, & illorum assertionibus responderint.

DE SALIVA, ET SALIVATIONE

Præter naturam.

C A P U T II.

A R T I C U L U S I.

De Vitio salivæ in quantitate.

HActenus salivæ humanæ natura, secretionem, & usum, qua licuit perspicuitate, investigato: proximum nunc est, ut ejusdem statum morbosum solentius excutiamus.

Quando a naturali crasi, & molecularum nexu desleat saliva, humani corporis harmoniam subripiens, alienis imbuta particulis, morbosisque infecta miscilibus, a naturali statu recedit, majori, quam pars est, labe sanguinem afficit, cujus varia constitutione fluidorum partibus varie labefactatis chronicorum, acutorumque affectuum luctuosus sæpe panditur numerus. Ut igitur horum morborum idea certior, atque clarior percipiatur, a re longius non erit, vitium in aucta quantitate brevius exponere, quod ad investigandos exactius ipsius morbos, plurimum conferre videtur.

Peccat saliva in quantitate, quotiescunque subtrahit sanguini nutritio pabulo, perenni fluoris ad salivales glandulas appulsu, confertim e ductibus effluens in ore undequaque exundat: cujus effluxus jugiter profluens nullo gravium symptomatum comitatu, nullaque saporum malitia conjunctus ptyalismus vocatur.

Si alimentum succi gastrici inertia, laxa tunicarum contractione, viscerumque circumpressionem ruditer in ventriculo elaboratur, non evolutis sulphureo-balsamicis particulis in chylum aquosum nimis facefit: qui in sanguinem delatus, & per omnes cavos fibrarum tubulos cum sanguine circumductus (cum seroso-aquosa ejusdem moleculæ a solidorum impulsu ad fibrillas appellii coactæ, ex defectu gelatinosæ portionis nutritione indigis partibus non apponantur) necesse est, ut aqueis particulis turgidis ad superiora trajectus in glandulas salivales transcoleatur. Quæ laticis separatio, cum intra ipsas glandulas subsistere non possit, a pressione particularum confertim succedenti, & jugiter ad glandulas confluentium, retroque urgentium in os indefinenter derivetur.

Porro mirum est, si orificia, ac tubuli glandularum diametro gaudeant juxta ampliori, una cum tumore jugularibus venis incumbente in colli lateribus, reprimente sanguinis refluxum, quantum secretionis penum adaugeant. Hæc pororum compages dilatata, ac tubulorum vitiosa amplitudo a laxa fibrillarum coherencia exorta, salium nifum, & machinularum terebratione a proprio termino recedentium ita distenditur, ut dehiscuntibus glandularum osculis a stimulo solidis inhærente irritativo, & salium cuneis tuborum villos vellicantibus perperam labascant. Harum minimi fibrarum fasciculi ad ampliora spatia redacti, si impetus sanguinis augeatur, & a confluyente humoris copia novi distensis tubulis edantur impulsus, vel si salium spicula stimuli vires exerceant, ab invicem divelluntur, ut conatibus salinorum cuneorum discissis fibrillis cum suo connatis momento non valeant superare fluidorum impetum, ab impellentibus liquidi moleculis in nimia distractione coercentur tubuli, & ordinarum partium mechanismus fatiscet, atque exesis vasculis pene destruetur. Unde denegato in glandulas spirituum animalium effluxu, illæ symmetria, tonoque partium attritæ, nec naturali tensione, debitoque elatere munitæ turgentibus particulis aqueo chylolis ad glandulas appulsis minime valent contraniti, sanguinique impulsui resistere nequeunt, undequaque non irrumpat salivæ humor, & depluat. Hoc in flacciscentibus glandularum fibris ab infartu, & pressione nervorum cum largiori affluentis salivæ copia, atque in ægris in utroque latere paralyti affectis, sæpe videre est.

In scorbutica diathesi maxime calidiori, quoniam ob salinas in fluorem evectas particulas, quicquid inest sanguini, est acerrimum, tenue, atque urens, sanguis non potest novum chylum sibi assimilare: ideoque quia colligari cogit ac fundi quicquid in fluxum agitur, partes chyli gelatinosæ in orbem sanguinis circumductæ a salium cuneis nimium solvuntur, adeoque suo naturali lentore destitutæ libere vagantes per corpus sanguinis continuo fluxu per glandulas salivales excernuntur. Præ nimia hac salium, & acridinum copia glandularum diametrum distendente, non tantum saburra veteris effert, & inutilis chyli, verum etiam novi, & oleosi major portio in ipsas glandulas continuo depluit. Irritatis enim villis nervorum, tenduntur capillares arteriolæ, unde sit major fluidorum appulsus, quæ dum in distractiles vasorum tunicas impetus faciunt, ex earundem distractione restitutis villis vigoratur renifus in contenta fluida, quo fit, ut aqueo serosa portio per validiorem sanguinis motum ad glandulas uberior delata, a solidorum pressione, & fibrarum oscillatione magis commota, in pervia glandularum ostiola irrumpat, & abundantior salivæ excitat affluxum. Hic exprobranda est sputatorum connata consuetudo, qui sola expuendi libidine alliciti, ut vilis facibus cunctis excrementum continenter salivam effundunt; quo spuendi conatu, & perpetua muscutorum contractione irritatæ, & compressæ glandulæ sollicitantur jugiter ad novam, & uberiorem urgentur excretionem.

Causæ externæ, quæ quantitatem salivæ adaugent, in sex rebus non naturalibus deprehenduntur. Aer enim frigidus particulis nitro salinis segnius rotatis, nec satis evolutis plurimis refertus poros cutis premendo effluviis corporis insensibilem transpirationem inhibet. Ut humidus aqueis moleculis turgescens lentescens sanguinis solutionem, laxando fibras imminuit, ut inde aquosa portio sanguinis adaucta urinæ, & alvi excretio, & non raro largior salivæ effluxus promoveatur, ut Sanctiorius animadvertit: *Aer externus per arterias in profundum corporis penetrans potest reddere corpus levius, & gravius: levius si tenuis, & calidus; gravius si crassus, & humidus.* Cibi admodum aquosi, somnus, & quies naturalia excedentes stadia, excretionem aliarum partium imminutæ humoralem massam incoctas, hisce accedentibus animi mœrore, & timore diuturno coctionis opus labefactante, ut affectiones cum motu fluidorum momenti minoris conjunctæ, & contractivæ vasorum influxum, & liquidorum attenuationem hebetantes, salivæ materiem accumulare videntur.

Cum igitur in sensuum omnium silentio, & torpore cum membrorum illa concidentia, quæ somnus vocatur, necesse sit in decubitu horizontalis situs, ut laxetur fluidorum compages, & remittatur tensus solidorum tonus; nil mirum, si laxiori reddita sanguinis cohesione, ibidemque magis enervata fibrarum elasticitate, licet sanguis in perpetuo sit motu, currahinc inde, recurraque per membra vario ab inferioribus ad superiora, & contra vim inuata suæ gravitatis ad superiora pelli cogatur, tamen per musculos, viscerum lacunas, viasque partium obliquas, curvas, & flexuosas triacas languidius trajicitur, & filtratur, quibus gravitatis suæ contrariis motibus debilior reddita sanguinis compages minori vi solida impellit, cujus languida vibratione, & diminuta impulsione magis, semperque magis relaxatur partium solidarum robur; ex quo fit plus æquo progrediente somno; ut fluidum ad illam perveniat motus determinationem, quæ ad secretionem singulis in partibus peragendas idonea non est donec tandem non acquisito a singulis sanguinis moleculis proprio gravitatis centro, nec ad naturale æquilibrium perductis plurima congeratur humiditas, quam, necessarium ad retinendum solidis, & fluidis amissum ob laxatam compagem robur, restituendum ineptam, nimiam salivam inde suppeditantem passim experimur. Hinc solvitur nodus, cur melancholici sputatores existant. Quoniam melancholici in vanis cogitationibus defixi, atque inhærentes tristitia cogitantes, eaque pensitando timentes, impediunt, ne spiritus impetus facientes in fibras cordis contractiles, in eadem motu conciti exerant elateris vigorationem, quæ uberiori spirituum affluxu destitutæ debiliori impetus nifu se contrahant, ex quibus languescere magis sanguinis motu per vasa, imminuitur ejusdem attritio, atque hebetatur per glandulas transpiratio, debilitatur cordis, & vasorum motus. Unde tenues, & sulphureo inflammabiles sanguinis particulæ crassioribus implicantur, donec humorum illuvie quasi obrutæ, & veluti carcere detentæ coercentur. Ob hanc partium cruditatem in fluorem vitiosum evectus sanguinis saculentias aqueas ad salivales ductus deponit.

Ob nimium hunc salivæ proventum balbutie plestuntur infantes, quorum fibrillarum tonus mollius, atque raræ texturæ salivæ copiosioris affluxu humectatus sic labascit, ut cum nativa muscutorum linguæ, atque palati flacciditate cuicunque sanguinis, & spirituum appulsui facile cedente, minus concinne, & suo perfecte enunciaré addiscant. Ab hoc vitio affecto Batto Regi, qui Cyrenas in Africa condidit, de sua balbutie Oraculum Delphicum consulenti, Pythia imperavit, ut in Lybia Regione calida vitam degeret; sic Herodotus. Ad hunc censum refertur deficientia vocis in aphonis, quorum laryngis muscoli a nimio aquei humoris proventu ita enervantur, ut fibris carneis resolutis flaccidi, & ipertes fiant ad motum. His laxatis, sonitu per fistulam pneumaticam a motu lateribus annulorum non alliso, nec hinc inde varie repercussio, qua aeris verberatione, & inflexione vox efformatur, æger nullam valet vocem effari. Manifestum hujus rei eventum refert Tulpus libr. 1. observ. c. 39.

Si vero hæc aquosa salivæ meustrui copia a glandulosa ventriculi tunica jugiter exprimatur, sua aquositate liquorem gastricum ita inficit, atque inertem reddit, ut chylicationis opus plurimum labefactetur, menstruo particulis aqueis perperam referto alimentorum contextu reluctante. Inde sensum collectis cruditatibus vitiosis fibrillæ stomachi debilitantur, laxatur tonus earundem nimis, obruiturque sanguis, in quo copia humorum aqueorum exundans parum alimenti ad attritos solidorum villos ducetur, quod si naturali simile, & alendo aptum, sed quicquid ad partes adducetur, erit plane aquosum, cogetque sanguinis massam iter suum lente per totum corpus absolvere, ut habito respectu ad modum, quo sanguis propellitur, ad spatium, & velocitatem, qua percurrit, & vascula perluit, impossibile sit, quin resistentiam illam offendant, qua eodemque impetus momento oclusa vasculorum laterum, & villorum ora permeare possit, ita ut nec a systaltico fibrarum motu major tenuiores sanguinis partes ad cavas lacunas possint urgeri ad vectes fibrarum inslandum.

Quoties igitur sanguis per repetitos circuitus ruditer attenuatur, efficitur erit crassioribus partibus, & aqueis, adeoque illo motu urgebitur, quo impetu non poterit ferri ad collapsos sacculos nutriendum, cum major sit nifus in contactum nitentium minimarum villarum fibras, & caniculorum componentium, quam sit irruentis sanguinis impetus. Quare particulæ illæ aqueæ minori, vel majori cohesione vi unitæ eam molem, & directionis momentum habebunt, quo per poros carneæ substantiæ permeare non poterunt; unde cum reliquo sanguine ulterius circulates venas pervadent, & fucatæ nutritioni eo usque inservient, quousque male aletur animal, & cachexia continget. Hinc fiet, ut solida ad tantam imbecillitatem redacta fluere quaquaversum permittant humores aqueos, qui in cavitatibus majoribus, vel vasculis cutis membranosis collecti, vel ad partes robustiores appulsi lentescentes validam generant obstructionem, ut in durum tumorem attollantur partes ad contactum venarum, ductuumque lymphaticorum positæ, a quo vasa illa tenera coarctata, & compressa, cum liberum transitum præbere non possit lymphæ, vel chylo, indeque continuo appulsu novi liquoris ad partes vasorum compressas tendentis, & præterfluentis tergum prementis ultra tonum naturalem distensæ tandem rumpuntur, ob quam vasorum exilium rupturam in habitum corporis serum effluit. Ab hac pituitosorum humorum in stomacho accumulatione ibi neccente moram convelli potest ventriculi musculus a majori spirituum copia per nervos fluyente, ut enata fibrarum inferius ventriculi constrictione contenta per os ejiciantur, vel nausea, si inanis, & solus erit vomendi stimulus, producat. Quod si afficiantur rami nervorum ventriculi cordi communes, ut per ipsos fiat refluxus vividior, & copia spirituum naturali major, & frequentior ad cordis auriculas, spirituum energia easdem in perpetua contractione detinendo, superans pressionem sanguinis affluentis per truncos venarum majorum eludet impetum ejusdem ad ventriculos tendentis: unde sanguinis pressione non referatis auriculis, sed in contractione persistentibus, intercepto sanguinis, & cordis motu, succedant oportet languores cordis, & animi deliquia.

Si vero chylus nutritius in sanguinem continuo delatus alitioni partium ineptus, effato succo inde massa sanguinis veteri saturata per glandulas salivales copiosa succi nutritii jactura indefinenter erumpat, per hanc succi euchymi subtractionem tota sanguinis massa

oleoso balsamico pabulo privata accedit, & turbato ob indebitam nutritionem liquidorum cursum in varios siccitatis morbos delabitur; ob quod minimam musculosis partibus nutritionem præbens, cum partium solidarum colligatione incallescens totius corporis atrophiam inducit, cui calor hæsticus in toto habitu paulatim subrepens in omnibus partibus solidis accenditur. Hinc calidum, & acre sanguinis serum per molle & glandulosum pulmonum parenchyma continuo trajectum, eos tandem infartu aggreditur, inflammat, exulcerat; quo fit ut atrophia, quæ erat in habitu corporis, in tabem pulmonarem paulo ante fatales dies, terminetur.

Verum si chylus per ductus salivales jugiter excretus naturæ incassum in sanguinis reparationem continuo suppeditetur, ne ab hoc perenni chyli effluxu depauperetur, & incalcescat sanguis, adeo ut insigniter languentibus viribus a nimia subtractione succi nutritii in statum lethalem, & insanabilem redigatur, ad usum diuturnum lætæ diætæ æger relegendus est, quo sanguinis lenitur, & salia stimulantia demulcentur. Deinde aeri aprico, & benigno commissus, liberali, sed cauto ciborum euchymorum usui refarciatur, ut inde aquas minerales chalybeatas bibendi non impar fiat, quarum beneficio massa sanguinis sensim emollita, etiam succi nutritii colligatio sensim evincitur; atque inde non tantum a salivatione æger, verum etiam sanguis a salina acri diathesi vindicatur. Pthyalismo autem hisce incassum advocatis incertis intervallis recrudescente, cum insigni virium deperditione, æque ac per glandulas salivales feri colligatione, rite continua salivæ deglutitio in symptomatum allevationem præscribitur, qua non tantum salivationis progressus, verum chylus per ductus salivales excretus, naturæ in fluidorum reparationem pedetentim remittitur. Si saliva unicuique non cogitanti sponte in os confluat, atque copiosius eo alliciatur ob ductus salivales potentiores, laxioresque, quam par est, existimo oris colligatione, maxillarumque fomentatione ex subadstringentibus, & blande aromaticis decocto posse curari, tum interne modo laudata subadstringentia commode usurpári, quorum ope paulatim arctantur, ac roborantur ampliores viæ, dummodo defuescant ægri a continua spuerendi libidine in consuetudinem perperam adscita.

ARTICULUS II.

De Salivæ defectu.

Cognita quænam ex largiori salivæ affluxu expectari mala possint, nunc juvat in salivæ inopia excutere noxas. Nam non minus ab excessu concidit hominis sanitas, quam a deficiente salivæ penu labatur.

Vitium salivæ excretionem invertens plus minus impediens, vel penitus inhibens, nunc glandulis, & tubulis excretoriis inhæret, nec in ipso salivali latice, motuque sanguinisprehenditur; ut si enumerare hic vellem ingentem morborum seriem, & maxime chronicorum, qui a sanguine salivali humore non suffecto pendent, fero dicendi finem facerem.

Nativa tubulorum salivarium angustia, humor viscidus salinofixus glandulas infarciens, ac poros opplens, vasculorum compressio oscula occludens, minimarum arteriolarum crispatura glandularum cava, & tubulorum ora coarctans, aut diameter earundem nimis connivens, ac tumore aliquo extus incumbente compressus viam salivæ præcludunt, quæ a conniventibus salivæ ductibus quoquo modo obstructis, aut compressis, ne secernatur præpedita, licet cum sanguine confertim profluat, tamen cum ipso circumducta ad alia filtra circumvehitur, in quibus secretionum penso adaucta, glandulis diversis committitur. Quod si chylus jugiter in sanguinem irrepsens salivalibus non turget particulis, nulla prorsus materies glandulas trajectory per carotidum divisiones cum sanguine ascendet; igitur in toto deficiet saliva, ut sæpe occurrit in ardenti febre correptis, in quibus sitis extingui non potest, ac siccitas summa non solum ad fauces, sed per universum corpus diffunditur: in quibus cum calor intensior absumat quicquid humidi ingeritur, & cum sanguinem diluentes moleculæ aqueæ evaporentur, sanguis privatur ea materia, quæ corporis partes humectat. Tamen si ulla inhæret sanguini serosa portio, a singulari solidorum ariditate statim absorbetur, quæ inter duas quasque particulas introducta permittit fluere idem liquidum, quod alioquin subsisteret, nisi ab aqueis sanguinis moleculis disjunctæ essent, quæ a concitato motu ad minima diverfæ, & a congregantibus aqueis particulis ad summum solutæ ob turbatam, & confusam fluidi mixtionem diverso cohesionis modo combinati, diverso a naturali impulsu, nisuque rotati, secretionum leges non observant; unde propulsi a validiori, & celeriori cordis contractione, dum majus supra glandularum obicem contranitentem exerunt momentum, non solum in reticularibus illis canalium textibus sanguinem vehementi factam solutionem conservantes, sed a nodis glandularum, & vasculorum lateribus in ulteriorem solutionem promotæ, citius ora venarum ascendunt, quam oscula ductuum offendant. Quod si satis liquidi non turbato motu exagitati in sanguine hæreat, sed generetur lentor in arterioli materiem salivæ deferentibus ad glandulas oris, & faucium, tamen nullus dabitur affluxus humidi ad easdem partes, igitur siccitatis sensus, & sitis. Si vero non assumatur ex toto liquidum, effluet e glandulis salivalibus saliva viscidior, quæ in os derivata producet infantum in villis linguæ, & faucibus hærentem.

Inter causas externas occurrit aer particulis siccioribus, & calidioribus refertus, qui in sanguinem indefinenter impulsus crassiora attenuando, & extus ut ambiens leviter comprimendo glandularum cutis folliculos a fluidorum appulsu facile expansiles, videtur diaphoresin augere. Aer calidus, nisi obstat crassa, ait Sanctorius, juvat quoque perspirationem, & aqueo serofas particulas alio divertit. Aer enim superincumbens cylindulis suis gravitat, ac premit partes sanguinis, quæ dum leviter mediante aeris interni elasticitate compressæ majorem semper, quem amiserunt situm omni opere recuperare conantur, facta pressionis aeris incumbentis æquipollentia pressionis, sive altitudini sanguinis majori, vel minori, servata semper proportionem specificæ gravitatis liquidorum, dividuntur, subtilianturque. Arboles liquida copiosa, & gravis aeris externa non possit cum interno se facile æquilibrare, nisi misceretur cum mole liquida sanguinis; corpora enim fluida, ut simul mixta in ratione suæ gravitatis æquilibrantur. Cum autem flante borea, & cælo sereno aer gravior, sit quam flante austro, & calida constitutione, ut barometro experimur, boreali enim tempore aer sit densior, magisque

compactus, adeoque magis gravis; in austro vero, & calore magis rarior, inde minus gravis, adeoque pressus gravitate sua in sanguinem nobis ne advertentibus quidem ingreditur, eundemque sua elastica vi magis aucta, & gravitate sua urget, propellit, atque facillime in ea loca, in quibus minorem invenit resistantiam, & locum capaciorē sese expandendi, impingit. Cum autem capacissimam cavitatem reperiat in cutaneorum glandularum lacunis, ubi magnam vim elasticam acquirens, easdem mirum in modum distendit, per quas ad majus spatium dilatatas fit inde, ut ad minima divisis feri moleculis turmatim foras avolare nitentibus minus resistant aereæ moleculæ. Rarefacto igitur aere, dilatatis glandulis, ab earundem systaltico motu promovetur transpirationis insensibilitas, & eo magis si serum & aer erunt cum fluidorum cylindulis æqualis magnitudinis, sed inæqualis ponderis ad motum dispositi. Ille enim cylinder primo movebitur, qui gravior erit altero; quoniam primum punctum corporis, quod movetur, est centrum gravitatis, ad quem centri gravitatis motum tota moti corporis moles tendit. Si igitur verum est centrum gravitatis duorum liquidorum æqualis molis, sed ponderis diversis in ea parte retidere, quæ gravior est altera, necessario consequitur, ut ob aerem externum, qui nec levior interno, nec gravior supponitur; æquali gravitate interno contranitens pari energia vim interni sustinet, in calidiori temporis constitutione serum ab aere indissociabile primum, & jugiter avolat. Huc referri possunt hæmorrhagiæ, dysenteriæ, sudores ab exercitio nimio copiosi, vel colligativi, largior urinæ effluxus, vigiliæ nimis humidum assumentes, vel aliorum copiose ducentes salivam imminuant. Ira, indignatio, ut effectus cum motu majoris momenti conjuncti, aucta cordis contractione, & sanguinis velocitate, cum saliva suum exigat separationis tempus, poterunt in glandulas derivationem, multoque facilius influxum salivæ liquoris prohibere.

Saliva igitur in sanguine non existens, vel ad glandulas non appellens in os effluere non poterit; unde in ore siccitas, & sitis ad fauces, quæ si diutius protrahatur, exsiccabitur magis lingua, ad superficiem maxime, cujus villi tunicam constituentes valide contrahentur; cum vero corpus linguæ non cedat, sed contrahatur validius villorum contractioni, fiet ut iisdem villi divellantur, hic illic lingua in fissuras diffiliet: quibus si addatur faucium œsophagi, & musculorum laryngis summa cum siccitate rigiditas, prohibita earundem contractione, quæ ad formationem vocis requiritur, rauco, vel loquendi difficultas succedet. Quod si ex toto deficiat in sanguine salivæ humor, excitabitur tabes cum siccitate conjuncta, quam in excessu salivæ attulimus, de qua canit Lucretius:

Jam marcent venæ, nulloque humore rigatæ

Aereos alterans angustat pulmo meatus.

Ab alimento opes triturationis in pollinem in ore redactæ ob denegatum salivæ laticis influxum insitæ salium moleculæ non evolvuntur, ut a laxato ciborum nexu sapida tinctura elici possit, cujus defectu non delatis particulis salino-sapidis ad nerveas linguæ papillas sensus gustus fere concidit. Quo in casu, quoniam imminuta, vel deficiente saliva nullus liquor digestivus a glandulosa tunica expressus eructatur in cavitatem ventriculi, qui vires suas in stomacho convertendo, dum in ipsius tunicas, & filamenta nervorum impingit, eliquata salina aqueis ramenta in fibras validius infigit, ut vehementius stimulis nervorum villis, internæ ventriculi plicæ inter se mutuo atterantur (in quibus ratio famis consistit) appetitus imminuitur, vel abolefcit. Ingeritur tamen alimentum, ne vires statim labantur, a quo rudi componentium solutione elaborato dependet in ventriculo perperam inchoata concoctio, quæ nequitiam in intestinis absolvitur; chylus enim agre in stomacho confectus ob principia ciborum activa minus exaltata, atque dissoluta inertibus corpufculis coalescens ad intestina propellitur, ubi naturali earundem compressione, lenique vermicatione promotus in sanguinem irreptit, crudus, impurus, falsos exhalando vapores. Quapropter præcordiorum anxietatem, variosque capitis, & stomachi morbos producit. Chylus itaque non absoluto chylificationis artificio, nec in purissimum rorem mutatus, impuris abundans partibus, lactearum papillas impingit; hinc per lactea ad sanguinem usque delatus fluidorum compagem varie lædit, perpetuoque œconomiam animati corporis tendit insidias.

Cum igitur parcior, quam decet, generetur saliva: primo defectu materiæ, quoties ista non reparatur: secundo canalium vitio, obstructis nempe, compressisque vasculis, per quæ defertur ad glandulas: tertio glandularum vitio ad munus hoc absolvendum ineptarum, triplex indicationum species insurgit, quæ triplicibus morborum speciebus correspondet. Prima absolvitur alimentis convenientibus, qualia videntur potissimum esse juscula ex tenellorum animalium carnibus deprompta, tenuis potus, cerevisia puta diluta, lac, aqua lactis, linacum, caponum, gelatina, cornu cervi, ebôris, ut inde aquarum usu, & liquorum sanguinem demulcentiam sub forma potus copiosa, atque continua eorum inguigatione sanguinis siccitas temperetur, quibus exhausta humorum in habitu corporis delitescantium minera suffecta, morbida sanguinis crasis jam penitus vere eversa longo earum usu paulatim restituitur.

Vasculorum obstructio, aut compressio curatur medicamentis attenuantibus incidentibus, quæ crassos simulque lentos respicientia coherentes invicem humorum particulas comminuant, impactasque divellunt. Hæc sunt, quæ particulis volatilibus, salinis, acerbis, aromaticis, oleosisque scatent, nec non quæ alkalinis absorbentibus, fixis, & lixiviosis amaricantibus abundant, a quibus motus adaugetur, & magis proprius resistantiæ particulatum quiescentium imprimatur, itidemque cœneus solvendis fluidorum particulis intermiscetur, qui motu, parti tenuitate, & figuræ aptitudine ad penetrandum non solum compactos humores disgregat, verum sanguinem, ac lymphæ fluiditatem denuo conciliat.

Postquam innotuit glandularum vitium non nisi labore improbo, iteratoque in dies comparatum, illi aptum inveniendi remedium plurimum augebitur notitia, cujus opæ, roborantibus externis medicamentis, plerisque aromaticis, salivares glandulæ suffragantur, a quibus si cominodum non accipiat æger, melius ferret pinguia, & emollientia, quibus frigiditas solidiorum ex nimia volatilitate humoris in glandularum poris, ac folliculi conclusi fibras nimium corrugante, vel acrimonia nervorum fibrillas irritante, adeoque oscula constringente, unde affluxus liquorum inhibetur, paulatim lenitur, atque laxatur.

ARTICULUS III.

De aciditate salivæ.

SAL in aquea salivæ portione delitescens, quoties in libertatem vindicatum, salivæ spiritu fatiscens, depressoque sulphure, cæteris præpollens nimium in fluorem evehitur, ejus spicula angulata salina per aqueas moleculas conspersa aliorum miscibilium superato jugo, cæterisque particulis compede injecto, mutata directione ad occursum cæterarum partium coalibilibium in proportionem remanentium, confertim in linguæ papillas impellunt, ubi in nervorum filamentis validius infixis salibus, sensorii fibrillas acriter titillant, easdem pungunt, atque convellunt.

Hujus naturæ moleculæ cuspide tereti, & acuta, & dein corpore instar cunei majorem in molem aucto constantes, adeo ut quovis modo sensorii fibrillis applicatæ ipsas pungendo, & non nihil comprimendo constringant, hunc saporem eminenter ostendunt. Hæc aqueis obvolutæ particulis sanguinis effervescentiam, ut nimiam ejus dissolutionem refrænant, & blando coagulo compescunt. Vel nisi mavis, dicas moleculas acidi esse tetraedras, & non cubas, quæ undequaque suis angulis munitæ, & ab omni parte æqualiter aculeis instructæ linguam facilius vellicent, & quasi pungant. Quod si aliter figuratas esse contendamus nimirum vel læves, vel teretes, fieri posset, ut acidi particularum facies non angulosæ incidant in fibrillas sensorii, & sic has non diffingant, nullamque proinde vellicationem pariant, quod omnino est contra acidorum gustus perceptionem.

Si causas mediatas rimemur hujusce crudæ aciditatis, illæ videntur attingi, atque chylo in hære in primis viis perperam elaborato ob fermentorum inertiam, aliarumque liquorum minorem in intestinis volatilitatem acquirenti; qua quidem depravata concoctione, chylus non redditur blandior, quatenus ventriculi humor visciditate donatus in tunicas tremoris motus non inducit, & succi digestivi crasim sabvertens, sale volatilem, & aquea alimentorum corpuscula non exolvit; unde non laxatis salium calore meatibus, haud in particulas flexiles leves, atque rotundas, sed adasperas, & inæquales accedens incoctus, & acidus, aculeatissime particulis tumescit, ex quo non nisi incongruus, atque salium & acidorum enormium particulis refertus, massæ sanguineæ, & languentibus solidis committitur, qui per impetum naturalem sanguinis, licet pluribus millibus vicibus per pulmones, & per reliqua viscera, ac partes corporis fluat, paulatim in glandularum lacunis accumulatur, ita ut eodem servato cohesionis momento per minimas acidorum particulas continuo influat, quousque sensum aciditatis excitans, & reliqua cum ipso corripientem, fluidorum præcipuas crases alterare valeat, atque sensum inficere, ut effecto succo jugiter reparata labem scorbuticam accersant. Hinc scorbuticorum saliva acida plerumque deprehenditur. Quandoquidem enim in sanguine depravato recrementa plura acida congeruntur, quam ut diaphoresi, vel per urinam satis secerni possint, quæ ad oris emunctoria sero irretita detruduntur. Quoniam liquida sanguinis partes componentia, & quæ in cohesionem mutuam nitentia per motum, quoties in acidas particulas abeunt, transeunt e statu durioris in statum liquidioris corporis, omnes illæ liquidi cruoris moleculæ, quibus componuntur, in libertatem, & facto impetu diffactis vinculis in motus majores veniunt, a quibus per resistantiam cohesionis cohibebantur, & producent illos effectus, quos debent ex vi suorum motuum, & figurarum, cujusmodi sunt pungeri, quadam compressione ferire linguæ villos. Elementa igitur feri partes sanguinis componentia non ab intrinseco in ejusmodi solutionem venientia, sed repugantia, a causa violenta, & morbosa in illam cohesionis vim coguntur, atque detinentur, quæ ita urget partes ultro coherentes ut a prima cohesionem sese expedire possint, atque totum mutare compositum per illam occasionem, quæ cogit partes componentes ab illa cohesionem cessare, & solutas in novum adire compositum. Quid autem si quid e suave sapidum, ingratis sapidum, ex non acido fiat acidum? nonne dicitur compositum primum ultro immutatum, cum effectus, qui in prioris locum succedant, contrario modo se habeant? sed hujusmodi sunt partes sanguinis componentes, quæ ante illam solutionem sunt quoddam compositum, quod post solutionem mutatur; igitur partes illæ in statu fluidorum salium exaltatæ dicuntur mutatæ.

Cum autem nullum compositum per vim instam destruat, oportebit, ut vis, quæ salina concreta fundit, sit his iisdem liquidis externa, quæ a solidorum ictibus in salia urgentiori impetu nitentibus deducitur; quare facultatis illius momentum, quo concrementa salium a mutuo contactu recedunt, & in cuneos acutos coeunt, momento, quo salinæ partes divisioni resistunt, erit majus. Unde partes salia componentes ex vi hujus potentioris causæ se subducere a fusionem non poterunt, nisi tollatur momentum illius causæ agentis, & detinentis ad solutionem, aut addatur momentum resistantiæ componentibus salia partibus, ut cogantur a majori cohesionis vim non dimoveri. Ubi igitur salis moleculæ adherentes invicem in medio fluidi per motuum ambages attritæ, miris modis exaltatæ, commotæ, contrarioque nisu rotatæ in minima solvuntur, ad eam devenire poterunt angulorum acutiem, quæ superet cohesionis vim aliarum molecularum summe evectis corpusculis resistantem, & supra datas partium resistantias vires suas exerentes, exinde ab aliarum commercio liberatæ, & præcipue a spiritu volatili dissociatæ in salivam turmatim affluens, a quibus ingratis sapiens, & aciescens saliva emanabit.

Aeris vitio salivam acidam induci nullum crediderim inficiabitur; aer equidem pluviosus laxato fibrarum tono potos, ac meatus cutis suo humido infarciens sanguinis effluvia reprimere videtur: Aer, inquit Sanctorius, *cansior, & ponderosior, convertit invisibilem transpirationem in ichorem, qui retentus, & deinde non resolutus in cachexiam facere solet*. Ab eodem inspirato salia, ac sulphura redolente spiritus sanguinis valde deprimitur, hinc salino-sulphureis ejusdem particulis sanguinis crasis sensim mutata in mephitici acidam mutatur. Ad talem humorum diathesim non parum conferunt cibi acidi, sale conditi, acidum foventes occultum, austeri concoctu difficiliore de acidis fixioribus, & succis tenacioribus, ut pisces marini, pasta farinaceæ, participantes, vina austera, animique passionem.

In qualitate salivæ immutata loco naturalis saporis acida cum magna aliquando virium laxitudine, & inappetentia contingit, quibus paulatim accedentibus aliis ingruentis mali symptomatibus spe morbus tandem erumpit. Ab acida salivæ impressione in linguæ papillis primo depravatur gustus: a particulis nimirum acido-aqueis nervorum papillæ e poris linguæ protuberantes obductæ, acidique innatantibus spiculis salinis laceffit ita exagitantur, moventurque validis tremoribus papillarum nervi, ut aliis tremoribus oscillare prohibeantur; unde ex incuneatis salibus in nervorum fungulis, non flexis nervis in aliis partibus, eadem undulatione afficietur gustus organum. A falfamentis istis acidis effecto sero dilutis molles, & spongiosos gingivarum carnes subeuntibus intumescunt fibrillarum earundem fasciculi, qui dein nutrimenti defectu marcescentes a continuo materiæ erodentis affluxu exeduntur, a quorum putrescentia, & humorum a salivalibus vasis exundantium expiratione graveolentem oris foetorem olfactamus.

Quia vero ad hoc, ut animal possit ope sanguinis nutrir, non sufficit, hunc ipsum sanguinem esse quidem ex alimentis, ac certæ earundem ratione compactum; sed insuper requiritur, ut ex ipsa derivari possit quicquid fluere debet per nutriendos animalis ductus, & quicquid ad ipsius reparationem exigitur. Hiuc fit, ut quoties quantitas sanguinis cæteroquin in quantitate nihil vitiat ob aciditatem immutabitur, ut per glandulosam palati tunicam serpens, ejusdemque substantiam depascens ad usque illud aditum, atque intumens progrediatur, ut villi, in quos influit, validus, atque frequentius ab invicem divellantur; unde fibrarum erosio, & ulcuscula in oris cavo luxuriant. Quod si e glandulis non erumpat, sed in canalibus suis subsistendo, eosdemque proinde extrorsum extendendo glandularum folliculos obstruat, vasaque nimis infarciat motus sanguinis per vasa propulsi fiat tardior, continget tumor, qui sanguine non fluente ad notas leges sui circularis motus, canales faucium, & gutturis leviter comprimendo, aut ex toto allabantis liquidi influxum prohibendo, coget villos extendi, & a fluentibus humoribus laxare; unde motus respirationis, & deglutitionis leviter lædens spuriam producat anginam.

Hæc saburra acida cum viscosi in ventriculo collecta dum fibrillas ventriculi nerveas irritat, spirituum animalium influxum non solum uberem ad stomachi membranas promovet, verum ventriculi glandulas infarcit, & in moleculas digestivi liquoris sese insinuans, ita ventriculi fermentum afficit, ut a glandulis expressum, sensum non naturalem producat. In hoc igitur statu non naturali ventriculi per acidi affluxum dabitur ciborum averfatio, cum detur intra ventriculum id, quod proinde una cum tetræis, ac salinis partibus valet intensius vexare, & ita fibras ventriculi vellicare, ut per illum humorem sese in membranas intrudentem aperia, vel anorexia succedat. Ex hoc chylus minus fluidior, ac purior fæculentiis acidis, ac ponderosioribus ad intestina protrusus, delusa omnium succorum activitate, lento intestinorum motu, fibrarumque contractione ad osculorum lacteorum papillas descendit: quorum orificiorum angustia cum ab illis corpusculis, quæ sunt majoris molis, quam quæ discludere, & superare possint vasorum resistantiam, non deducatur; inde fiet ut a lacteorum capillamentis exclusus chylosus succus non possit minoris diametri chyloferorum oscula ita facile ingredi, sed cum cogatur impingere in profundiores colli cellulas, ab ejusdem plicis excipietur, qui sensum coarctatus infectus evadit, & a massa super affluente ita superque turgit, ut fibræ intestinorum sensiles perperam distendantur, & humore contento distractæ, atque incuneatis salibus ab invicem divulsæ, impetuque aculeorum laceffit, corrugationibus valde molestis, & dolorificis torqueantur.

Ut acidior saliva emendetur, non tantum abstinendum ab acidorum abusu, sed temperanda plantis plerumque odorem actu ferentibus cum suavitate, ac fragrantiam quandam spirituofam, & aromaticam redolentibus, quæ omnes sulphureis particulis, seu salino-oleosis volatilibus abundant. Horum autem aromaticis particulis depressa sulphurea corpuscula in sanguine excitantur, segnitèrque commota exagitantur: Hinc coordinatarum partium mechanismus, ac crasis sanguinis quasi fatiscens restituitur: interim vero cruditas acida ventriculi corrigatur vegetabilibus sale volatili oleoso abundantibus, ejusque fermentum acida quadam, ac terrea constitutione glutinosa torpescens attenuetur, quibus elasticitas fibrarum roboratur, atque iners excitatur digestio.

ARTICULUS IV.

De Salivæ falfedine.

NON adeo acuminatis, qualia in salino-acidis apparent, spiculis, falsus salivæ contextus coalescit, sed falso terris involutis salium particulis emergit, cubis nimirum, quæ planorum inclinationibus, & lineis ad plana insistentibus constantes, in angulos rectos coeunt, seroque salivali confertim innatantes laterum aciebus aculeatis sensorium quasi incidendo non nisi falso-sapidum saporem imprimere valent.

Ob angulorum rectitudinem salium moleculæ aqueo latici conjugatæ minus efferam acutiem sortiuntur, atque in linguæ papillas jugiter incidentes minime poterunt in nervorum propagines vimrigidæ cuspidis exerere, sed acidorum mole majores, lenique motu in protuberantes nervorum fungulos debiliores percussione impetus exercent, adeoque minus a rectis salium ictibus patietur sensorium; ex quo fieri, ut nec ab enormi fibrarum irritatione a salium acutè inducta difficius gustationis nervus, nec particularum oleoso-levium demulcedine oblitus percipiendæ falfedini se se accommodet. Quapropter oportet, ut massa humoralis scatens seroso-salinis, falsoque acris particulis abundans plus minus salis sero solutis per glandulas, ac pervias palati membranas indefuenter trajiciatur, tandemque falso-aqueas exuvias in oris cavo abjiciat.

Chylus ob terreo-salinam fixitatem liquidi digestivi perperam in stomacho conficitur, & intensa biliosi succi-acredine imbibitus galaxiam ingreditur, per quam moleculis acrioribus turgidus sanguini commiscetur, a quo reparatus sanguis, & falsæ acrimonie depravato latice saturatus facile in cacochemiam scorbuticam, aut melancholicam faciescit, in qua falso-acres particulæ luxuriant, atque debacchantur. Igitur terrestria salia in sanguine soluta, vel cum chylo falsa acrimonia

monia redolente in sanguinem devesa salini ejusdem saporis causa sunt, quæ supra sulphura prædominium potita cum insipidis partibus aqueis separantur, donec pinguibus involvantur, & terreis absorbeantur, quibusque dulcoribus, & glutinosis irretita particulis,amenta sua salina demittunt.

Hinc cibi plurimis, atque copiosis particulis falso serosis scatentes, carnes salitæ, pisces fumo indurati, & sale conditi, fervidæ qualitatibus miscibilium mutata coordinatione: ita promptis calidior aer, cuius calorificæ particulæ motu turbinationis agitata, dum in coherencia sanguinis corpuscula impingunt, sui impetus momenta imprimunt circulanti fluido, ut intestino motu salini corporis rotatae moleculæ, aqueis particulis occurrentes ab hisce eliquentur, fundanturque. Unde coherens vi miscibilium salinorum superata resistentiæ ex motu percussione partium fluidi se invicem attenuantur, contingit salium fluiditas certa proportionem, majorique in seroso-aqueis coeuntium, qui in salivali latice acervatim collecti, ac sui juris facti, salum promovent aperte saporem.

Sic in febribus diuturnioribus a crebra, & nimia sanguinis despumatione tota humoralis massa vapescent colliquari permittit quicquid acre in sanguine continetur, ut libere proinde fluat, ducanturque per sanguinis salis particulæ, a se invicem discedere, atque mixtionis vinculum dissolvere nitentes, quæ humido agglutinante exolutionem prohibente destitutæ in libertatem vindicantur, & inter quasque fluidi particulæ nitendo sanguinem fundunt: qua salium eliquatione in intemperiem nimis salinam, & acrem vergit humoralis massa; unde ejusdem partes salinæ dissolutæ, & cum sanguine fluentes per vasa ad quascunque glandulas corporis derivabuntur, & per illas secernentur, in quibus naturaliter delabitur illa humoris compositio, in quam solutæ partes abierunt.

Inter plurimos morbos a falso acrioris salivæ proventu ortum habentes præter gustus depravationem, quam pluries tetigimus, occurrunt animi deliquium, quod quidem succedit, quotiescumque a falso serosis salivæ acrioribus redditis particulis officium ventriculi valde sensibile multiplici nervorum propagine intertextum vehementissimis doloribus afficitur, qui per nervorum furculos acri humore obfessos, & in spasmos concitatos ad cor propagantur, ex quibus contractis cardiaci nervi fibræ in contractione detinetur auricularum musculus, qui cum superari non possit a pressione sanguinis affluentis, auricula claudit non patitur, & in contractione persistet; quo fit ut æquabili spiritum, & sanguinis affluxu interrupto motus, ac sensus facultas simul concidat, homine animo delincente. Quando vero hujusmodi liquor acrioribus constans moleculis villos stomachi tantum laceffit, eum ad placidum contractionis motum sollicitat, & tunc solus vomendi oboritur stimulus. Quod si validius nervi irritati, & enormi correpti crispatione magis, magisque urgeantur convelli, contenta fursum propellent, & suscitabitur vomitus. Unde autem nervæ fibrillæ spasmodicæ contractionis eludunt impetum, alkalinae particulæ e villosa ventriculi tunica erumpentes undequaque in stomachi villos impingunt, qui salibus sese in machinulas illas intrudentibus adhuc irritantur, stimulantur, & sensim corroduuntur. Hinc ventriculi internæ plæcæ valido impetu instructæ inter se mutuo nisu atteruntur, unde bulimia cum soda originem habet. At quia a continua partium collisione, & mutuo earundem contactu divulsis fibræ, perennique acrium humorum affluxu pedetentim aliquid ex ipsis partibus decedit, atque deraditur, villorum compages salibus macerata fatiscit, utpote vi salium, & potentia motricis adaucto momento cunei, a quibus molliores substantiæ partes, quæ non tanta pollent soliditate, patiuntur divelli, ut ab invicem distractæ divulsionibus tandem repetitis dissiliant. Cum hac solidorum abrasione inquinatur chylus ab acri menstruo, & a salino acri fluidorum crasi eliquantur sanguinis humores, qui succo acriori quoque restaurati, dum ad intestina uberiori confluxu propelluntur, ea acrius convellunt, & irritant, ut illi perperam laceffiti in validiorem, frequentioreque expulsionis motum concitentur, unde suæ molis, ac figuræ momento humor ille, sive ventriculi, sive alium viscerum superabit vim constrictionis intestinorum, cum eorundem resistentia ipsi superanda, que dependet a flexione tortuosa, & eorundem longitudine minor sit irritantis stimuli, & vis illa, quæ a diaphragmate in intestinis ventriculo alligatis, & musculis abdominis continuo viget, nitetur majori pressione contra intestinorum resistentiam, & tanto facilius, si erit tam acris, adeoque tanto impetu nitetur, ut momento suæ molis intestina distrahare possit, atque dilatare, quod cum fiat deorsum, alvi fluxus continget.

In curatione felici hujus salivæ in id nitendum maxime, ut falsa acrimonia in serosa sanguinis parte delitescens non exasperetur catharticis validioribus: sed incipiendo a blando, ac lenienti pharmaco transitus fiat ad attenuantia, desinendi causa in specificorum maxima copia liquidorum lenium facile meabilium antiscorbuticorum, simulque lenem promovendo sudorem. Hinc liquet cur serum lactis, lac ebutyratum, phisana diluens blande solvens, humectans huic morbo opem non raro egregiam præstent. Hac ratione correctioni feri salivatis per sassafrasata, thymum, citratum, acidosisucos horæi maturus, rad. elenii, corticem citri, granatorum, limonium, aurantium, acetosam, acetosellam, specificis operam dantibus juyamen falsedini certo allatuos crediderim. Præter jam memorata falsæ salivæ ratione conducentia addenda insuper, quæ salis humoribus prodesse docet experientia, ut pillulæ de cynoglossa, gummi tragacanthum, thus masculum: sæpius, ut sensim corrigantur peccantes tumores, & subinde producendos evertant.

A R T I C U L U S V.

De Salivæ amaritudine.

Intimus salivæ amaritiei mechanismus exoritur a certa proportionem, certoque nexu ipsius miscibilium, quorum salino acres, & urinoso-volatiles moleculæ motu rationis, & permixtionis agitata, dum in oleoso sulphureas impingunt, sui impetus velocitatem, & directionis nisum deperdunt, ut salium devolutæ moleculæ oleosi corporis particulis occurrentes ab hisce irretitæ refrangantur; unde hebetata salium angulorum acutæ, & cuspidibus eorundem inflexis modificantur salinæ substantiæ, quæ non nihil resinosis, asperis, hamulatis aculeis, furcatisque acuminibus gustus nervos divellendo, & sensorium non alte, sed superficie tenus fodiendo, in salivali liquore solutæ in linguæ papillas ideam amaritudinis imprimunt.

Sydenham Opera Medica.

Massa sanguinea scoriis sulphureo-oleosarum partium inquinata, & adustis salium recrementis turgida fluidorum crasim sensim subvertens, cacochymiam biliosam inducit, cujus salinæ acrimoniæ corpuscula terreo-acidis particulis inflecta, ita coctionis vim, & directionis momentum in fibræ commutant, ut ad acinos hepatis glandulosos non coercita, sanguinis motu abripiantur in alibiles, & excrementitios succos, qui a partibus salinis non fluentibus per suos canaliculos reparati turmatim in glandulas volant, ubi aqueis commixtæ in saliva amarorem deponunt. Hinc regio morbo marcescentes sapore amaro sæpe falluntur; acrius enim ab incuneatis in nervorum linguæ papillis salium inflexis, furcatisque aculeis, etiam si a mellitis demulcerentur nervei funguli, jucundique salium obliquentium delectatione afficerentur fibrillæ, diversus tamen non perciperetur sapor, sed suavia papillas impellendo excitarent infixi salis impressionis impetus, quibus eodem in nervis remanente tremore ex amarulentis concepto, omnē dulce linguam quoque blande demulcens equidem amaresceret.

Quod si hepatis laxata fibrarum crispatione, referatis ductibus, & perviis glandularum ejusdem folliculis adhuc occurrat salivæ amarities, opinari ducor, particulas sulphureas, & salino fixas enormiter exaltatas in cruoris massa uberius, ac citius in bilem faceffere, quam quæ per tubulos felis secerni, aut ab ipsis eliminari queat. Dum cor validius, atque frequentius contrahitur aucto solidorum nisu augetur sanguinis impetus per vasa naturali major, adeoque a celeriori liquidorum motu ad latera nitentium particularum coherencia dimovetur, & nisum directione commoti salini cunei intra nexus sanguinis tenuiora coercita salia excluduntur, ex quibus imminuta vi resistentiarum in sanguinis coherencia, particulæ salinæ sulphureis conjunctæ intra se invicem exagitant; nitunturque, ut in partes minutas deciduæ ad summam mobilitatem evehantur, atque in poros, & meatus, per quos erumpere possit, ubique novos appellant. Igitur bilis a glandulosis jecoris, ob adauctum sui impetus momentum haud coercita, angustis, a sanguine cum sero ubique decedit, cum quo ad glandulas oris delata erumpenti salivæ tincturam amaram imprimit. Hac de causa in febribus ratione caloris, & motus magis agitantis, fit, ut partes subtilissimæ, & summe mobiles vagentur libere per corpus sanguinis, quæ non cohibet a partibus humidi suo fræno destituuntur, & nisum quemlibet vehementiorem exerentes, citiorem, acrioremque reddunt sanguinem. Posita autem hac fluidorum labe sanguis nactus bilioso acrem indolem, ubi recrementa salium, ac adustorum sulphurum uberius expandens, serum saturabit sensum bilis sapore, quæ in ventriculum repens sursum ascendet per superficiem œsophagi, vel cum sero in glandulis cumulata in oris cavum decedet, inficietque amaro linguæ papillas.

Diutius detenta fluida in salium efferatione per tantum temporis spatium, quantum satis est, ut plurimum salis in sanguine eliquetur, alia aeri æstuant, ac præfervido inde associata a partibus aqueis sejunguntur, a quibus, cum non temperetur eorum impetus, erit sanguis universus in suas partes siccus, & salino fixas, atque mobiles maxime solutus, a quo cum exprimantur salia, & continuo solvantur, non poterit a canaliculorum superficie non abripi, & in naturale liquidum redigi, ut evadat tam fluxilis, tam coherens, ut pedetentim per vasa circumfluens uberiori amaritudinis penu non elaboretur.

Dum particulæ salivæ amaricantes linguæ poros subeunt undequaque nervorum fungulos continuo laceffentes, ita tenduntur irritatæ nerveæ fibrillæ, ut quicquid particularum e cibis latici salivali elicitur, suum nequeat genuinum pandere saporem, sed potus, cibi que omnes amarore ingrato inquinati creduntur, unde fatiscens gustus falso deceptus amaro dulce exhorret. Hoc sapore infecta saliva in ventriculum defluit, ubi in liquore gastrico exundans molestia afficit ventriculi tunicas, quarum fibrillæ ab acris, & erodente humore sese intrudente in membranarum poros intensius confossæ divellunt. Igitur excitato sensu erosionis, & punctationis dolor stomachi, & cardialgia.

Sit insuper humor ita vitiat, ut continuo fibras pungendo cogat spiritus, impetum, & nisum majorem in emissaria nervorum intra villos musculi ventriculi constrictiones exerere, ut ab ipsis in perpetua contractione detentus constrictor musculus convelli patiatur, quo statim singultus enormis producat. Si vero amarities visciditati associetur, & absumentur humiditas quoscunque villos humectans, producat lentor ad arterias, glandularum salivalium obstruens emissaria, a quo impedita saliva, ne libere fluat per suos canaliculos, proveniet necessario linguæ siccitas, cujus superficies a fixo, & sicco sanguine hærente ad linguæ canalium extremitates, in lividum colorem abeunte, sensim infecta colore illo, alius in linguæ fibræ repente in nigrum faceffere poterit. At vero traducto bilis lentore, & viscida ejusdem amurca intra ventriculum, partes ejus acriores per œsophagi superficiem repentes non solum palatum, sed & linguam suo amarore, suisque coloribus inficiet. Verum per affluxum biliosi succi in motum contractivum excitabitur ventriculus, qui in valida corrugatione detentus a vellicante, etsi minoris quantitatis erodente liquido, cum non possit superare propter adhesionem mucidæ bilis ad membranas resistentiam contracturæ tunicarum, spasmus dolorifico corripitur: ab quam affectionem intensius vexato dabitur ciborum averfatio cum nausea, quæ mutabitur in vomitum, si humor copiosior fuerit, & in totam cavitatem ventriculi uberius derivabitur.

Sedulo perpenfa natura bilis, ejusdemque commixtione cum saliva, observandum maxime, si salivæ amarities ex amurcosa bile, viscida, inerti circa Jecur impacta, oclusis hepatis glandulis, sensimque affusa sanguini producat. Tunc huic indicationi satisfaciunt aperitiva stimulantia, quæ figura, partium mobilitate vasculorum fibrillis impacta vim eorundem contractilem augendo, succos stagnantes dimovent. Inter hæc eminent salino volatilia oleosa, & aromatica, uti plantæ omnes, quæ sale alkalino, oleosoque aromatico abundant; inde tartarea omnia, quibus accedunt alkalina salina lixiviosa, vel composita, vel naturalia, uti salia essentialia acrim plantarum. Quod si amarities a bilis copia exoritur, quæ simul acedine peccet, præstantissima erunt, quæ bilem imminuunt, & acedinem temperant: ut decocta ex amaribus hepaticis frigidioribus rad. gram. ruschi asparagi, cichoreæ, fragariæ, foliorum taraxaci, fumariæ, agrimonie sem. alckeckangi, additis salibus essentialibus plantarum, acerosæ, chichorei, agrimonie &c. exinde tollatur bi-

his copia a ramis ductibusque hepaticis per emetica antimomalia. Si bilis potentius ad os eleveetur ob sui volatilitatem auctam, ob copiosiores spiritus volatiles ipsi admixtos, amaritatem ejusdem corrigunt acida tartarea, spiritus minerales acidi dulcificati; inde albedine terreo-fixa absorbentia, ut e. c. ebur sine igne, coralia rubra, margaritæ, oculi cancr. antimon. diaph. bezoart. mineral. bezoar martiale. In hoc censu reponuntur acida austera, ut pruna sylvestria, succus berberum, granatorum, aquosa quævis diluentia, emulsiones a seminibus frigidis, salina, ut est sal gemmæ, marinus, nitrosus; quod inde totum perficitur alimentis potibusque cito acefcentibus, quorum ope sal amarescentis salivæ volatile magis reprimatur, & paulatim emendatur.

ARTICULUS VI.

De Salivæ Dulcedine.

Salivæ dulcedinem constituunt globulosa corpuscula mollior a-cuminata, ex oleosis flexibilibus moleculis acido acris salium particulis inter se mutuo agentibus, quæ a determinata partium coordinatione resultantes, ac refractio salium nifu se invicem attemperantium exortæ, peculiari inter se combinatione in aqueis insipidisque corpusculis dissolvuntur; quorum salium asperitates sola particularum collisione nulla edulcorantis cujuspiam facta additione ad sphaeram accedentes fere omnem acrimoniam exuunt. Hænim salivari liquore commixtæ fibrillas linguæ impingentes mollior nervorum papillas titillando oleosis salibus succulentam grati, suavisque saporis substantiam organo gustus exhibent. Non secus ac testante Boyle de Mechanica saporum ex insipido corpore, summeque corrosivo substantia dulcis elicitur. Selectum enim minimum si purificatæ aquæ forti, aut spiritu nitri affundatur, donec in se mutuo calore agentibus, requisita metalli portio dissoluta fuerit, menstruum instar sacchari dulce supeditabit.

Chylus itaque pluribus refertus particulis salino acidiusculis, oleosis tamen quibusdam, & mucilaginosus involutus in sanguinem ab aqueis dissolvitur, jugiterque irrepens ob partium ramosarum intra viscosas unionem, substantiam congrue mollem, æquabilemque salis, ac sulphuris gustui exhibens linguam quodammodo oblinat, ejusque partes blando tractu præterfluens leni titillatione afficit, lenique affricu sensorium titillat, ut exinde resolutis per sensorios nervos in molles aculeos particulis antea implexis jucundus voluptatis sensus excitetur. Hæc euchynii succi substantia a motu cordis ita exagitur, ut longiori inter partes sanguinis attritu, & valido ad vaforum latera per repetitos circuitus allisu naturale ejusdem gluten perperam eliquetur, a quo turpiter fuso collabentes partes non inflantur. Succus iste primum sanguinis rudimentum in minutiores particulas divisus relinquit flaccidorum villorum cava, in quorum sacculis diutius detineri non potest. Hinc ratione minimæ molis, & tam paucas inter illius componentia cohesiones oleosæ chyli partes fluido eo confusæ ad tantam solutionem rediguntur, ut eodem impetus momento non major resistentia paretur a partibus chyli gelatinosis, quam a particulis aquæ, non erunt majoris molis, nec minoris, aut majoris momenti, ut ad glandulas salivales simul urgeri non possint. Quoties igitur sanguis aqueis chyli moleculis plurimum scatens, aut non poterit extendere vaforum lateraliū sacculos, aut a distenso sacculo vi fibrarum compressus in venarum oscula rapi, urgebitur quidem tanto impetu, ut possit ferri ad inflandos sacculos: At cum major sit circulantis sanguinis impetus, quam nifu minimarum particularum componentium in cava fibrarum nitentium, particulæ illæ habebunt eam diametrum, quo ad villorum poros permeandum requiruntur: sed ulterius circulantes eo usque dividuntur, quo usque impedito in solidis partibus irroratu, cum sanguine refluentes a salivali menstruo possint absorberi, ut suavioribus corpusculis, seroque innatantibus turgidula saliva dulcedine nauseosa corripitur. Quod si fluor lactescens ob particulas diversæ gravitatis, ac potentia fluido universali confusus, & vertiginoso motu exagitur, nullam sui patitur mutationem, sed per universum corpus diffusus ostiola tubulorum salivæ inveniat plus ju. stopatentia (antequam particulas nutritias partibus cunctis attulerit, cunctaque viscerum fermenta, atque utiles humores reparavit) per ipsa confertim effluet. Laxatis enim tubulorum fibrillis ob naturalem tensionem, & villorum tonum collabentem, corrumpunt fibræ folliculorum salivarium circulares, quæ cum repellere non valeant impetum impingentis fluidi, & in pervios glandularum poros erumpenti chylo contenti, aqueus humor cum volatilibus salibus, atque oleis tenuioribus cum paucis acidis, ac terreis implicatus in salivam mutabitur.

Inter causas externas hic occurrant potus, cibique errores, qui cum plurimi præcesserint, quales certo sint, non est operæ pretium determinare. Aliquando febre tertiana laborantes dulcedine admodum fastidiosa afficiuntur, a succis primarum viarum depravatis exorta, quod Bortichius in ephemer. Nat. cur. in muliere post febrem quartanam tertiana correpta observavit.

A dulcibus salivæ particulis flexibilibus nerveas linguæ papillas blande titillantibus non solum leni spirituum animalium motu dulcedinis idea in anima excitatur, ut omnia ingesta dulci sapore prædita reddantur: sed ab iisdem acido acris refractis, ac remissis salivæ corpusculis jugiter in ventriculum deglutitis, atque a reliquarum particularum conjugio liberatis nervorum fibrillæ molestis vellicationibus afficiuntur, ut a stimulo irritativo contractionem sui convulsivam patientibus nausea corripitur æger. Et cum intima ventriculi superficies obducta sit glandulis, in quibus secernitur humor salivæ similis, qui ejus tunicis inhærens, dilabens, sensimque repens easdem quodammodo convellendo producet sensum summo cum fastidio, quod propter paucitatem, & inertiam spirituum in angorem stomachi mutabitur.

Gastricæ hujusce lymphæ molli, & flexibili molecularum contextu combinatæ digestivæ vires facile eludent alimentorum resistentiæ, quorum coherentes particulæ intra ciborum nexum coercitæ retuso menstruo reluctantur, & inertes solventis cuneos hebetant; unde non dimotis ipsius solubilis particulis, nec alimentorum compage intestino motu resoluta, eorundem concoctio imminuitur, atque depravatur. Cum autem ciborum in stomacho incoacta dissolutio sit ad chyli elaborationem ordinata, clare patet, si alimenta non fuerint satis in ventriculo dissoluta, ab iisdem non posse elici particulas

seroso gelatinosas, quæ in chylosam substantiam mutantur. Quoniam vero supra sulphura salibus prædominio potitis liquores prius dulces fiunt acidi, ut Piso in Brasilia observavit, succum, ex quo saccharum concrevit, a plantis elicitum intra breve tempus acefcescere, ne miraberis si in hac chyli morbosa dyscrasia cum acido motuum turbinationis, atque ebullitionis dulcia, & saccharina ineuntia dolorosas in lateribus cieant commotiones, appetitum compescant; ructus nidorosos excitent, ac flatulentias.

Hanc dulcedinem salivæ nauseosam corrigent in primis acida, subinde amara. Quoniam sive extrinsecus ab aere, sive intrinsecus a motu certus caloris gradus certaue internarum partium salivarium constitutio exoritur, quæ varia ac imperceptibili transcurfione eadem mutuo sibi allidens tenuior, mollior, minus rigida atque magis quam prius congrua fit corpusculis salivalibus imprimatur ille motus, a quo non acriter, sed blanda, lenique titillatione afficitur gustus organum. Hoc ex eo conjicere licet, quod sales vegetabilium salibus asperiores aciem suam, atque saporis acrimoniam sola particularum collisione exuentes, in substantiam mitem gustui gratam pepe dixerim reducuntur. Quod autem ab acidis, & amaris elicitæ corpuscula chylum congruentia, tenaciorem, quam prædicta dulcia corpora solent, linguæ saporem imprimant, mirum nemini videri poterit, qui advertere voluerit, quousque sola constitutionis, mutatione, mutuoque partium inter se conflictu dulcis corporis particulæ, ab amaris, & acidis corpusculis penetrentur. Acutur enim corpuscula dulcia, & compositum salivare mutabunt. Hinc acido salia, ut tartarea, vitriolata, elixir proprietatis saporem ingratum, & nauseam dulcedinis emendant.

ARTICULUS VII.

De saliva præter naturam. Prout habet rationem remedii, ac motus critici in morbis.

Non aliunde Medicorum impatientia tam aperte cæcutit, quam ab attempta motus critici lædentium, & juvenum speculatione neglecta, aut ambiguitatum obscuritate latitante, minimorum quoque exactissima perquisitione non æquissima lance perperfa. Quisquis enim artem faciendi absque sedula remediorum, & moris naturæ contemplatione peritus, est furibundus, atque cum ense cæcus in hostem gladiator, qui in minutis cespitans, veluti spretis insolitæ flammæ scintillis, incaute suæ famæ prospiciens, magnum, tam ad ægri salutis jacturam, quam nominis Medici ruinam sæpe excitat incendium, quod miserrime serpens medentibus inscitia notam quotidie inurit. Hinc in hac longa remediorum cognitionis experientia superbire senes, ingenio, & perspicacia æmulari juvenes juxta meum in magnam admirationem, ita rapit ingenium, ut tanta nostri sæculi felicitate in hac arte quandoque oculatum tyronem (qui variis mathematicis præceptis, utpote staticis, hydrostaticis circa structuram animati corporis recte philosophans, humanum corpus in structura æque, ac in effectibus a tali structura pendentibus numero, pondere, & mensura rimatur) valere credam, quam magistrum non curantem, qui dum insolita naturæ tentamina observat, indebitis remediis statim, rectosque naturæ motus perturbat. Hujus inquisitionis severitatem cum per ratiocinia attingere non possumus, a tali expulsiōne morborum allevationem, vel eorundem recrudescentiam religiose observare debemus, ut ab illo motu non divertatur natura, aut removeatur, ut exinde præcepta ad exornandam praxim eruamus. Cæcutiente igitur in arduis morbis ratione, conatus naturæ utcunque fuerint detegendi, nullisque inanum speculationum fucis adulteratæ menti proponendi ut olim Asclepiadorum more eleganter sine coloribus pingentium, quicquid obscurioris morborum causæ inest, per certam, constantemque morborum crism felicius eruatur. Medentes itaque plus quam par est in theoriarum elucubrationibus luxuriantes indigestis cogitationibus sapient, nisi diuturnæ insolitæ criseos contemplationi in exercenda praxi omnino se commiserint. Morbi enim absconditum quid sunt, sive ut Hippocrates, *divinum quid in morbis inest*, suasque causas medis tam reconditas, & ab humana mente adeo remotas involvunt, ut difficile sit quidquam in his investigare, nisi attenta, & nunquam intermissa circa morborum judicationem adhibeatur observatio, in qua si consensueret Medicus prognosticandi disciplinam observando acquisitam, apprime calculet. Quare summo pete mihi aridet in morbos illos, qui per salivationem judicantur, detegendos, laborem impendere, ut inde post sedulam accidentium contemplationem ad rationalem disciplinam reducantur. Natura enim, quæ est omnium morborum vera medicatrix, pro sanguinis despumatione, & efforti humoris evacuatione salivationem feligit, & uliginosas exuvies ad has glandularum salivarium syrtes nonnunquam deponit. Ita febrem ardentem naturali ptyalismo profligatam exhibet Guer. Rolfinckius ord. med. lib. 3. Vertiginem salivatione sponte orta solutam observavit Nicolaus de Blegni zod. Med. Gal. annot. 1. Salivationem naturalem in ptyysi salutem observavit D. Joannes Paulus Vulflain Archiater Cæsareus, & Academiæ naturalis Curio, ephemer. diligentissimus in dec. 2. anno 1. miscel. nat. cur. observat. 122. & scabiem foedam in milite orta salivatione nullo alio præsidio adscito sanatam cum D. Hieronymo Baruffaldo notavit Joseph Lanzonus Sylvius Deleboe; *Contingit, ait, quidem aliquando licet variis salivatio sponte, quod in hisce regionibus factum observari, & quidem cum notabili ægrorum commodo, & liberatione a morbis chronicis a pituita semper pendentibus*. Sydenhamius sub finem accedebat, si nempe nulla insignior præcesserat evacuatio, atque ego julapia refrigerantia imperata fuerant, quo quidem si nec evacuationibus, nec usu medicamentorum calidorum fuerit interceptus, morbus ultra spem omnem fugam sibi querebat. Nobis contigit sæpe mulierem Hystericam spasmodicis affectibus passim recrudescentibus forti suborta salivatione prompte relevatam, observasse.

Hic salivationis spontaneæ motus optime cessit in horum morborum curatione, ad quam quidem aptus natus præ cæteris mihi videtur, cum agris noctu, diuque miserrime per annos excruciatissimum vamen attulerit. Natura peculiari quadam lege morborum causas evellit, nisi Medicus intempestivo, & stulto remediorum usu criticos conatus turbaverit. Sic subdit laudatus Sydenhamius: *Jam vero, ut supra monuimus, febris hujus solutio ut etiam variolarum (que*

feror ejus germana merito audiunt) per salivationem non raro fiebat, quæ quidem nunquam non salutaris fuit, ita ut eadem liberalius produmte tam maculas revera purpureas, quam febrem ipsam evanescere oculis viderim meis. Oborta itaque salivatione nulla omnino evacuatio convenit, neque quæ vena pertusa, nec injecto quæ sit enemate; cum ab utraque periculum sit ne humor alio divertatur. At serum lactis, atque alia refrigerandi vi pollentia necessariam in salivatione elicienda operam navabunt, ut contra cardiaca, & quæcunque alia calefaciebant materiem impissando, ejusdem educationi officiebant.

Nec mirum sit ægros ab effectibus chronicis salivatione spontanea feliciter evadere, si diuturni morbi a sero acti falsuginoso, falso acido, falso muriatico, fixo volatili glutinoso, in massa sanguinis redundante plerumque excitantur. Sanguinis salibus turgescens ad salivæ glandulas dum copiosius impingit, a sero sensim adventante, & a sanguine perpetim urgente distenduntur. Cum enim novus serosus latex ad dilatandos glandularum folliculos, in quos nititur, pervenerit, cum liquore in illis jam contento commixtus vim supra expansarum fibrarum connisus, facile exerit, adeoque nullo glandularum salivæ orificio, earundemque fibrarum fasciculo cohibitus sese in fluoris motum vindicat, cæterarumque fibrarum jugo excusso in os indefinenter erumpit, & humores serosi acres, nunc fluidiores, nunc tenaciores cum ægotantium commodo ex ore fluunt, exciduntque.

ARTICULUS VIII.

De saliva ut signum.

Nullus fere morbus ægros inopinato perimet, si sedula salivæ observatio, & attenta linguæ inspectio, utpote, quæ lymphæ, sanguinisque statum certius ostendit, & morbos occultos, eorundemque difficile solutionem denotat, medentes consulat, quos per salivam diligenter singulorum morborum naturam expendentes, tantoque signo praxim locupletantes, nullus falsitatis, aut ignorantie accusabit, nisi qui artem prognosticandi deridens; hanc incertam medicinam pronunciet, quo fit ut impetu animi de hac differens ingenio suo, & inutilibus commentationibus magis addictus, quam naturæ monitis innixus, Hippocraticæ sectæ criseos, & coctionis leges adamussim speculanti, quæ tantopere viguit, ruinas adstruat, & etiamnum calumniis proscindat. Quamobrem ne medentes ignominia obruat, eventum morbi prænotionem Medicis maxime opportunam fore arbitror, ut si homo aliquo pernicioso morbi turbine forte conjiciatur, a Medico naturæ vaticinio instructo procul prospiciatur; & ut hujus artis nauticæ peritissimus scopulorum, & syrtum prævisor, ventorumque, cælique aspectus observator futura cognoscat, ne nova inopinato ingruente tempestate opus improviso ruina quatitur. Ut igitur ad praxim nos via stabili exornandam dirigamur, impavidique reddamus in præfagiendo morborum eventu, ne aliquis contra medentes cæcus imperitorum impetus fiat, per longos, & patientes experimentorum decursus, & juxta veterum monumenta prognosis instituat, quibus ad exitum ægrum tendere, vel ad salutem prævidentes Medicorum existimationi consulere videbimur, nec de futuro damno inculpabimur; unde medicinæ parens Hippocrates lib. prænot. hæc habet: *Cum etiam si divinum quidpiam nobis inest, hujus quoque prævidentiam perdiscere. Sic enim optimo jure & admirabilem, & bonum se præstabit Medicus: Quos enim superstites fore cognoverit, eos rectius quoque servabit, utpote ex multo tempore singula consuevit perpendens. Itaque morituros, victurosque præsentens, atque denuntians omnem prorsus calumniam vitabit.*

Idcirco ut morborum eventus ex saliva nobis innotescat, Hippocratica observata nobis experimentorum additamentis confirmata perquirere licet, quibus occasionem præbet in observatis Hippocratis moriendi cupiditas, & inde dolorem capitis primo experientia consulendi, quem levare a sputo crasso, & non olenti in Coac. prænot. docet, ubi ait Hippocrates: *Capitis dolorem solvunt sputa crassa, & non olentia.* Quoniam decubitus cujusque humoris tenacioris, lenti, motus crassi, frigidi ad membranas cerebri, sive pericranium, tanti est nifus, ut membranæ, & nervorum fibrillæ ita comprimantur, urgeanturque, quousque in hac positione silli, absque majori fibrarum divulsione non possint, neque compressi villi contrahi, nisi per copiosorem spirituum influxum compressionem illam superantium, nec spiritus per compressos nervorum tubulos fluere possunt, nisi violento, & majori nifu in motum rapiantur, quorum motiones a pressionibus provenientes, augent tremorem in fibris momenti plus æquo majoris, a quo desiliantibus quaquaversum villis majori cum impetu cerebrum concutientibus, derivatur dolor. Ab hac doloris vexatione liberatur æger, si humor summæ inertie in partibus minimæ pressionis consistens, vel villos cerebri comprimens, in sanguinem trajiciatur, qui per sanguinis circuitum tandem producit ad salivæ glandulas ex venis in arterias, ac demum per has in glandulas derivatus. Igitur si copia humoris in salivales glandulas e cerebro trajecti sit crassa, & suis partibus maxime cohærens, diffuset a capite doloris materies, adeoque levabitur dolor. In quibus enim sputum olet, cum id quod intus remanet putrefieri valet, fere sphacellari, vel saltem corpus occulte infici portendat, suspensam semper attingit bonitatem, nec remittitur dolor. Pro hujus textus coronide inquit Hippocrates de morbis acutis: *Si e naribus effluerit sanguis, solvitur ægritudo, atque si sudores supervenerint judicatorii cum urinis albis crassisque, & lenibus subsistentis, & abscessus aliquis factus fuerit; verum si absque his solvatur revertetur ægritudo, vel coxa, vel crus dolebit, expuetque crassa, si sanus est futurus.* Cum in morbo acuto humores nimia effervescencia commoti, torpidi, aut parum mobiles per vasa nituntur, cave ne stulto, ac intempestivo purgantium, & diaphoreticorum usu motus naturæ diveritas, in quibus si quiesces, paulatim relaxato solidorum tono, orietur laxitas debita in humorum fluentium compage, quibus mutato inter fluidorum impulsu, & solidorum pressionem inæquali æquilibrio, liquida hinc illinc, quod debent, excurrunt, celeritate fibrarum proportionata, circum quas dum pererrant, nituntur in arteriolas quaquaversum. Unde si occurrant vasculis capillaribus narium tenuiorum, vel a membranarum porulis colligantur, aut ad glandulas urinæ, sudoris ita impingant, ut sustinere impetum illum non possint, in forma sanguinis, aut aliorum crassamentorum secernuntur, indeque morbus perfecte tolli aut subigi poterit. Verum si

Sydenham Opera Medica.

absque hisce solvatur, quia videtur potius sopita quam resoluta causa morbifica, prorsus revertetur ægritudo, vel coxa, vel crus dolebit, & tunc si evadat æger, & sanus sit futurus, expuet crassa, cum juxta Hippocr. de morb. signum concoctionis sit crassities in urinis, in egestionibus, in sputo, & in pure.

De sputo autem hic maxime solliciti sumus; quoniam humores mille modis, & gradibus virium inter semiscentur, unde diversitas accidentium in morbis a diversa permixtione humorum exorta non semper idem indicat. Hujus salivæ proventus in mentis torpore occurrens cum a maxime flaccidis, & coincidentibus glandularum villis cohibeatur, ita ut per membranarum mollitiem fluere possit quantum feri opus est ad generationem salivæ naturali quantitate majorem, fieri non potest, ut solidæ nervorum partes ad mollitiem naturali majorem redactæ in undas veniant sensibus excitandis necessaria: hinc lethargus, cujus signa describit Hippocrates lib. 2. de morb. *Tussis oboritur, & salivam sputat multam, ac liquidam, & nugas garrit, & ubi nugarum desierit, dormit.* Ex lethargico autem salivam multam spuente tam aperte patet humorum frigidorum collectionem esse veri lethargi causam, ut nihil sit opus in causarum examine ulterius immolari, eoque magis quod si quid esset explicatum difficile; facile ipsius necessitas ex Hippocrat. lib. 3. de morb. curam tradente explicatur, dum ait: *Ut plurimum sputat, & calefit, & a vino abstineat.* Cum autem partes flaccidæ, quæ particulis suis minus cohærent, quam in naturali statu, cedant per minima, & vix resiliuntur propter mollitiem, quæ a crasso lentore cerebri glandulas infarciendo provenit, si forte contingat, ut moleculæ salivæ, quæ fibræ nimio saturatæ mollitiem acquirunt, cum sanguine ita fluere incipiant, ut confertim separentur in glandulas, dura, piaque mater elaterem prius relaxatum acquirens remorantis fluidi resistantiam superat; qua ratione intensus crispatisque fibris oscillatio villorum cordis, meningum, pressionibus æquilibrata sanguinem æquali motu in gyrum propellit, unde salivæ fluxus lethargo superveniens afferet spem salutis.

Ut vero ob salivæ copiam caput infarciens evadit homo lethargicus, ita dum exiccatur, in ferox delirium rapitur, quod fassus est Hippocr. in prædit. *Lingue asperæ, & resiccata phrenetica sunt.* Quoniam in phrenitide ab humoribus solutis in calorem abeuntibus excitata sanguis toto impetu jactus per universum corpus celerrime rapitur. Ex illa partium minimarum attritione exuberans calor, cum absumat quicquid humidi inter duas quasque sanguinis particulas continetur, non affluere permittit illud liquidum ad glandulas, quod cæteroquin a partibus humidis non disjunctum continuo impelleret, adeoque destitutum suæ lymphæ vehiculo urat oportet villos linguæ, cujus villos adusto sanguine combustæ summe arescunt. Per calorem autem resiccatis linguæ papillis earum villi in superficiem assurgentes penuria humidi invicem se juncti instar cunei digitos ferunt: Hinc arescet lingua, si phrenitis orietur.

Capitis morbis succedit faucium inflammatio, quæ in Hippocrat. lib. 2. de morb. habetur: *Febris, & dolor concipit, & fauces inflammantur, itemque maxillæ, & salivam deglutire non potest, sputat autem crassam, ac multam, & difficulter loquitur.* Quoniam in angina humorum copia ad fauces ita subsistit in canalibus suis, ut minus vivide in fluxum acta, vel arteriolas distrahat, vel e canalibus in interstitia derivata vasa infarciat, in quæ depluit, adeo exundat in glandulis ad summum oesophagi positis, aut laryngi proximis, ut ad quem cum hient glandularum ductus in os ducentes, materia quælibet salivæ ad lacunas glandulosas perducta, ibidemque pressa per impetum sanguinis superfluentis exprimitur: & quia ratione pressionis, & humorum copia musculus ad basim linguæ, crassis, lentisque humoribus obrutus plane pervertitur, æquo flaccidior nervus erit, adeoque ita concidet, ut prohibeatur linguæ motus, unde *sputet crassam, & difficulter loquitur.* Sputa autem viscosa, crassa, valde alba, quæ violenter educuntur, mala sunt, inquit Hippocrat. in Coac. prænot. Si igitur obex inflammationis, quo impeditur, & retardatur motus sanguinis per arterias, sit tantus, ut per continuum sanguinis affluxum a minimis canaliculis tenuior pars subsistentis liquidi exprimitur, vel in motum ducatur, remanebit siccitas, quæ coget villos, ut humoribus affluentibus non cedant, eoque magis lentor cum siccitate conjunctus fiet minus ad motum facilis, qui connitentibus fibris subsistere cogetur frustra nitens in fluxum agi; per continuam autem, & validam fibrarum oscillationem toto impetu exprimitur crassior, & viscosa saliva, quæ violenter educata, cum ostendat fibram non laxari, humores non concoqui, mali ominis esse videbitur.

Quanti fecit Hippocrates, ut in angina saliva fluat, apparet in 2. de morb. ubi ait: *Si saliva supprimatur myrti ramulum complanatum sumito, & tenera ipsius summa parte incurvata, & molli lana obvoluta in fauces immissa salivam expurgato.* Si materia salivæ ex suis canalibus in glandularum cavitates derivata adeo villos glandulosos infarciat, ut humores retro urgentes ad fauces subsistere cogantur; adeo præ humorum copia tendentur villi, ut per continuum, & validam distensionem jugiter in distractione persistentes inepti expulsi ejus materiem reddantur; natura propter copiam ejus non valet ipsam totam secernere intra illud temporis spatium, quo ex fluido sanguine eandem recipit angina velocitate minori instructo, quæ si confertim proluciat a myrti ramulis, statim deplentur vasa, quorum fibræ nimio fluido eas distendente depletæ, ita assidua motus exercitatione roborantur, crispantur, ut per fortissimam illarum fibrarum constitutionem majori velocitate, ac impetu excurrat sanguis, cujus subsistentes ad fauces moleculæ, vel ad contractum fibrarum circulantibus, tardiorique gradu progredientes ad solidi leges recipiendas ulterius aptæ pressionibus subjiciuntur, & a vivo fibrarum elatere, ac proinde potentiori resistantia fluidi impellendi vi, hinc inde exprimuntur: ex quo Hippocratis consilium ex voto succedit. Deficiente autem ex toto saliva in angina summa perniciēs est, de qua Hippocrat. lib. 3. de morb. vulgaribus ægor. 7. ait: *Illius anginosæ, quæ apud Britonem aiebat primum a lingua cepit vox esse obscura, lingua rubens desiccata erat primo die, horrida incaluit, tertio rigor febris acutæ: tumor colli, & peccoris ex utraque parte, subruer durus, extremitates frigide, & livide devorare non valebat defectiones, & urina subsisterunt, quarto cuncta exacerbata sunt, quinto periit.* Hæc formæ apud Britonem agentis genuina faucium inflammatio fuit, & fortis, in qua a sanguine nitente propter obstructionem ad fauces erubuit

lingua, quæ magis sicco per vim caloris proxime ad fauces hære-
re lentore liquidiores salivæ partes absorbente desiccabatur, in qua
quoniam a siccitate fibrarum, aut per solam compressionem nervo-
rum, tum obstructionem vasculorum, qui ad linguæ basim ducun-
tur, poterat impediri, aut tolli motus ipsius linguæ; adeoque, *pri-
mum a lingua cœpit vox esse obscura*. Penuria igitur salivalis laticis
desiccata lingua, humor calidus, & valde acris cumulabatur inti-
me intra collum, qui ad interiora æque, ac ad exteriora excrefcens
ita comprimere potuit arterias carotides, & urgere canales faucium,
ut intra ipsos subsistente sanguine, & deorsum repercussio extubera-
ret tumor pectoris ex utraque parte *subruber durus*, qui pulmonum
fistulam comprimens excursum aeris ita prohibere potuit, ut respi-
rationis via occlusa *spiritus sublimis* educeretur. Unde defectu mo-
tus sanguinis in refrigeratis extremitatibus, & quiete ejus livescen-
tibus, cum quarto cuncta exacerbata fuissent, quinto periit.

In raucedine sputa viscosa salsuginosa mala subdit Hippocrat. in
Coac. prænot. quoniam intima tunica asperæ arteriæ confertissima
est glandulis, quæ subviscidum quoddam, & mucilaginosum perpe-
tuum affundentes, adeoque in cavitatem ejus derivantes jugiter fistu-
lam pulmonariam lubricantes emolliunt: si igitur copia humoris e
vasculis sanguinis in glandulas trajecti sit tanta, ut tracheam, &
glandulas omnes inundet, atque suis partibus maxime cohærens dif-
ficile diffuset, ut ipsas multo magis afficiant: debitum lymphæ
proventus asperam arteriam humectantis non solum interciperetur,
verum relaxabitur, vel constringetur tunica glandulosa, & partes
glandulosæ circa superiora asperæ arteriæ sitæ magis intumescent:
Hinc fiet defluxio in vasculis pulmonum, unde raucedo, quam
excipient sputa viscosa a lymphæ magis compacta, & in glandulis
stagnante, inde salsuginosa ab acris humore, & solutis salibus exorta.

Cum autem glandulæ asperæ arteriæ sint maxime molles, & ab
huiusmodi humoribus vellicabiles, atque solubiles, facile irrepet-
tabes, si salium soluta compages cum lentore combinata in vesicu-
las pulmonares diffuens pro diverso acrimoniæ gradu partes solidio-
res pulmonum corrumperit, unde sputa viscosa, & salsuginosa mala.
Si majora quæris, plurima pulcherrima vide Coac. prænot.

Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa fit, hi septima die
judicantur, quibus autem tertia, aut quarta die, circa nonam. Lin-
gua biliosa, & crassa, quoniam materiam crassiorem intra pulmo-
num arteriolas cumulatam e vasculis dissolvi, & ad concoctionem
tendere significat: si huiusmodi linguæ color contingat circa ini-
tium morbi, quo scilicet tempore non nisi parva materiæ collectio
facta esse potest, nec membrana pleura violentiorem distractionem
passa est, septima die morbum judicari indicabit: *Bulla vero subli-
vida oriente in lingua in principio, quali est ferri tincti in oleum,
difficilior solutio contingit, & judicatio ad decimam quartam diem per-
venit, sanguinem autem plerumque spuunt*. Cum autem color ob-
scurus, & nigro oleaginosus arguat & lentorem humoris, & cruo-
ris nimiam densationem, & pravam quantitatem ejus, quæ diffi-
cile subeat pulmonum canalia, & difficile ab illorum tunicis divel-
latur, non ita facilius discutietur; unde pulmo pressus a distracta
pleura redditur minus aptus extensioni, quo fit, ut vasa sanguinis
pulmonum ita comprimantur, ut ex his exprimi sanguis possit, vel
a compressis vasculis ita retineatur impetus sanguinis, ut intra ipsos
pulmones detineatur, quo sistente, & novo semper ac semper im-
pingente sanguine ita divelluntur per minimas partes vascula, ut
distractionis nifum sustinere non valeant, unde sanguinis sputum
plerumque contingit. Inde peripneumoniacis, quibus lingua tota al-
ba, ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflammatae sunt. Linguæ
membrana cum interiori pulmonum, quæ bifida est, continuata
juxta pulmonum inflammationem exasperatur, ac exsiccatur, quæ
inde in ipsa sicciore salivæ parte ob humidum crassum inter papil-
las fere magis hærentem, ac spumescentem albescit, cum quod hu-
midius est, ac tenuius abeat in auras. Hinc cum admiratione, &
maxima cum voluptate hanc distinctionem notat Verna de pleuri-
tide, in qua Hippocr. lib. 1. de morb. si contingat nimia salivæ
copia, ut æger expuere nequeat, suppurationem formidat. *Pleuri-
tici præ salivæ copia expuere nequeunt suppurati fiunt, & partim pe-
reunt, partim evadunt*. Humiditas enim nimia villos ad laxitatem
disponens parit concidentiam membranarum, & dilatationem glandu-
larum, quæ ratione minimæ virtutis, qua villi ad mutuum con-
tactum niruntur, & ab illo dilabuntur, a quocumque lentore faci-
lius occluduntur; unde laxatis villis nimio humore irrigatis, &
occlusis canalibus impetus sanguinis minor redditur crassitie, ac
torpore suarum partium per additionem humoris, ad pulmones
fluentis, qui cum subsistat ad partes minoris impetus, nisi poterit
e vasis dissolvi, nec a vi pectoris ab imo pulmone sibi viam ape-
rire ad usque superficiem pulmonis, transibit in suppurationem,
cujus humoris in cavitatem pectoris defluxus, si extendatur supra
universam pulmonum superficiem a singulis ejus folliculis exsudans
poterit usque ad fauces parvo cum impetu reddi, adeoque ægrum
evadere. Quod si suppuratus humor statim per sputum non redda-
tur, produceretur ulcus pulmonum, vel vomica, sinus nempe ma-
gnus, qui putrefactus demum in lethalem lapsum terminabitur.
Unde Hippocr. de morb. de peripneumonia ait: *Quod si saliva non
probe purgetur, & spiritus fuerit frequens, prædicendum est nullam
spem vite reliquam esse*. At vero de locis in homine, cum in rho-
racem fluxerit, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit, dolor lateris
mollitudinem occupat, & claviculam ejusdem partis, & febris adest,
& lingua superne pallida, ac viridis fit, & excreat impacta, hujus
morbis periculum septima, aut nona die instat. Si igitur supprimatur
inflammatio, & pars pulmonis affecta sit sub tunica, vel in uno
pulmonum, adeoque undequaque a pectore prematur pulmo, ut a
folliculo, vel a membranis pus exsudare cogatur: Hoc cum ab
impetu sua gravitate minori non reddatur per asperam arteriam in
cavitatem pectoris colligetur, quod inde manifestabitur a dolore
lateris mollitudinem occupante non sine febre, ac lingua viridi,
ac pallida, quæ illo colore afficitur, quoniam summe viscida sali-
va ita resistit remotioni ab interioribus linguæ papillis, quibus al-
labitur, ut minime ab ejus tunicis divellatur; cui si obstructione
pororum aucta admisceantur particulæ biliosæ, color ille pallidus
in viridem abibit, quod in septima, aut nona periculum adesse
denunciat.

Signa ex saliva hydropico salutem indicantia scribens Hippocrat.
in prædit. ait: *Neque sitim esse in hydropo oportet, nec linguam re-*

ficcari. Quia ex vasis lacteis, vel lymphaticis alteris, aut simul
utrinque divisis, aut apertis serum a massa ejus dissoluta nimis de-
ciduum, vel chylus e propriis ductibus effusus ventris imi viscera
pleramque in hydropo inundat, aut sanguinis pars aquosa ab oscu-
lis nimis laxatis valorum exundans in viscerum cavitates, aut mem-
branam lacunas extravasatur, non potest humor ille serosus ad
totum corpus, & præcipue ad salivæ glandulas distribui, unde sitis
adest, & lingua arefcit. Sitim vero non esse, neque linguam re-
ficcari, cum denotet sanguinis cursum non præpediri, nec serosum
humorem intus cavitates coerceri, bonum omen portendit.

Quibus febrientibus cibi fastidia sunt, & oris ventriculi morsus,
& multum saliva, iis vomitus fit in Coac. prænot. habetur. Quo-
niam etenim per statum febrilem sanguinis ratione partium terræ
præcipue, ac salis, quæ licet multa saliva dilutæ, minus tamen,
quam par est, temperatæ per humidam admixtionem ad minima non
dissolvuntur, nec in liquidum rediguntur, fit, ut non evadant tam
fluxiles, ut refluerent in sanguinem possint, sed exprimat solum ab
illis, quicquid est liquidius: adeoque cum a superficie ventriculi
divelli, & abripi non possint, liberius vellicabunt, & acrius urge-
bunt ipsius tunicas, a quarum stimulo vellicante nimis excitabitur
sensus summo cum fastidio, qui in ventriculi morsum terminabitur:
ex hoc sensu doloris crispatis fibris glandulæ omnes ventriculi
in expressionem liquidorum nitentur, & villorum contractione ex-
pressum liquidum sursum urgebitur, ut magno cum impetu ascen-
dat ad oesophagi superficiem, unde vomitus.

Quibus vero circa dentes in febribus quidam lentore nascuntur, iis
forte fiunt febres. Hippocr. Aphor. sect. 4. cum lentor febrem pro-
ducens est tam tenax, ut difficiliter in fluxum agatur, pars ejus li-
quidior per ramulos non carentes pressione distributa difficiliter ita
urgebitur, & solvetur, ut ab arteriis abripiatur solum portio ipsius
minus viscida, quæ in glandulis salivalibus derivata, cum sit natu-
rali saliva viscidior, iisdem partibus adhærebit: Unde cum liqui-
dior pars a glandulis expressa non sit naturali sero irrigata, sed
magis viscido lentore pefusa, ita in cohætionem venient partes san-
guinis, ut generetur lentor circa dentes cum febris forte corripiens.
Contra vero morbus diuturnior, ac difficilior est, si salivam tenuem,
ac spumofam primum spuit, lingua flava est, verum progressu tempo-
ris nigrescit: si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur, si
posterius, tardius, tandem vero etiam rumpitur lingua. Hippocr. in
VIII. de morb. febr. Cum igitur saliva componatur ex particulis
chyli, atque liquidis aqueis sanguineis, & illæ ex initio febris cru-
ditiore sint, per febrilem motum, & pressionem illam exprimitur
mere aqueum, seu quod liquidissimum est, & summe tenne sejun-
getur ad glandulas, cui si succus viscidior ex perenni febris fermenta-
tione compactus in initio adeo conglobetur, ut ratione solius len-
toris per ostia canalium salivalium in os sub spumæ forma deduca-
tur, cum spuma sit quid compositum ex aqueo viscidiori, & aere,
tum nimiam cruoris lentescientiam, tum ejus lymphæ invincibilem
visciditatem ostendit, adeoque saliva tenuis diuturniorem, ejusque
spuma difficiliorem morbum denunciat.

Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in calore vero permanet,
progressu autem temporis exasperatur, & livescit, & rumpitur, lethali-
s est. Si vero valde nigrescit in quarta decima die indicationem fore
significat. Periculosissima autem est nigra, & cum virore pallida.
Lingua circa bifidam sui partem veluti saliva alba obduci, febris
remissionis signum est: si quidem id quod superindutum est fuerit cras-
sum, eadem die, si vero tenuius, postmodum, si vero adhuc tenuis, ter-
tia die. Hippocr. in Coac. prænot. Si in principio febris lentor fe-
brem producat, non sit ita fusus, ut per salivam reddi possit, sed
motus sanguinis sit tam naturali similis, ut detur illa velocitas,
quæ necessaria est ad separandas partes cum aqueis, naturalem si-
mitem salivam constituentibus, in colore suo permanebit lingua,
quæ si progressu temporis exasperetur, livescat, & rumpatur, cum
exasperetur exsiccatis villis, & a subito stagnante lentore nigro
oleaginoso tingatur virore ærugineo, a cujus sicciore parte inter pa-
pillas magis hærente ita lingua contrahitur, ut a proprio termino
recedentibus papillis divellantur fibrillæ, atque diffilient, pessimæ
conditionis febrem ostendunt, unde lethalis erit. Si vero in decima
quarta nigrescat, cum materiam crassiorem e vasis dissolvi, & ad
concoctionem tendere significet, morbi judicationem indicabit, quæ
faciliter continget, si lingua circa bifidam sui partem crassa obdu-
cetur saliva; tunc enim per derivationem lentoris, & liquidi len-
torem producentis ad salivæ glandulas remittetur febrile incen-
dium, eoque magis, si id quod superindutum est, fuerit crassum.

Inde Hippocr. in Coac. prænot. ait: *Lingue denigrate in alvo
liquida celerem mortem significant*. Quia vero ut concoquatur mate-
ria morbi, requiritur ut fiat fluxilis; fit autem fluxilis facilis, si
liquidiores a corpore non secernantur; igitur in denigrata lingua
si deiciatur per alvum quod est liquidius, incoctilis humor, & pars
ipsius durior subsistet intra vascula, unde si adhuc stagnante lentore
sanguinis alvi profluvium superveniat, malum. Longum hic es-
set investigare solertius præternaturales salivæ particulas in sangui-
ne redundantes, ex quarum varia cum cæteris combinatione, &
parva earundem constitutione chronicorum, acutorumque morbo-
rum idea certior desumitur. Quanti fecit magni medicinæ Parentis
Hippocratis verus sectator Baglivius linguæ, & salivæ observatio-
nem ad dignoscendos morbos, eorumdemque eventus præfagiendos,
ex ejusdem operibus ediscitur, qui expertus est eos in febrem, vel
gravem viscerum, & præcipue naturalium morbum incidere, qui
per plures dies loco naturalis saporis amarum, viscidum, salum,
aut acidum præsertim circa horas matutinas percipiunt, quibus si
accedat magna virium laxitudo cum inappetentia, aut alterius ma-
li ingruentis symptomatis comitatu morbus irrumpit. Cum enim
saliva morbosus, atque peregrinis salibus infecta intime mixta in
ventriculo vires suas explicet, fieri non potest, ut ventriculus præ-
servetur a labe, ut inde appetitu defecto tonus ejus magis non re-
laxetur, atque a præternaturali salivæ cum sanguine permixtione
fluidorum compages non fatiscat, quæ coagulationi prona magis
torpedine membra vincit, fluentis sanguinis cursum retardat, & ad
morbos plurimos disponit.

DE SALIVATIONE ARTIFICIALI,

CAPUT III.

ARTICULUS I.

De indicante, & prohibente generico.

JAM vero hisce, conjectura mea ita favente, absolutis, opportunum fore arbitror, ut salivam arte pellicitam deinceps considerem; cui sane rei laboris, & observationis plurimum impendi par est; si vel ipsius vires species, vel utilitatem. Siquidem non desunt homines ingenii acutie, & studii commendatione florentes, qui cum salivationis ultro agnoscant utilitatem, tamen in ea excitanda decepti, vel illam in crimen vocant, vel non amore prosequuntur. Horum cavillis, & dubia æstimatione fit; ut plurimi veritatis incertitudine deteriti de salivatione artificiali non solum indigne, & turpiter sentiant, sed illam erroribus involvant, & silentio excutiant. Unde forte miraberis, & humaniter quæres, quid potissimum me impulerit, ut anxie sollicitus sub iis salivæ artificialis auspiciis rem prælo committerem. Cum enim mecum ipse perpenderem, serio ne, seduloque monuerim absque veritatis convitio subtrahere me Reipublicæ Medicæ non posse, quod pro re nata sine mendacio suffragandæ in hominum animos salivationi peridoneum sentio; rudibus illam a mendis vindicare, & severiorem illorum censuram, manco quodam, mutiloque fundamento, nescio quo caducitatis infortunio, innixam diluere censui, si utilitatem spectantibus viam probe ostendero, ut noxium exuant mendacium, vel excellentiam spectavero, ut male sentientium illa opinio eximatur. Quod si non alienis rixandi studio parum arideat, celebre apud veteres scias dictum esse, *nec Jovem ipsum omnibus placere potuisse*. Et profecto tanto numero, & tam varii generis sunt, qui licentia longe minus tolerabili salivæ artificiali fabellas callide conficiunt, atque in hanc impingunt verba æque ac facta male consulentes, ita ut mihi non minus admirationis, quam doloris parent, nisi intelligerem, quantopere humani generis hostis in hoc vertitur, ut bonæ salivationis, & ejusdem scripta evilescent, quæ suo existimata pretio contra illorum inscitiam, & ad eorundem consiliorum subversionem maxime valent; nec non recorderer (quod est hominum proterva indoles) Ciceronis admonentis, *vitari non posse reprehensionem nisi nihil scribendo*. Jam vero, ut consilio meo congruenter faciam, quod hic palam profiteor, ne incohærenter dicta, denique levia, & exigui momenti videantur, in quibus nulum videtur apparere dubitationum vestigium, citra eorum existimationis injuriam, salivationi artificiali religiose adhærere in pretio habeo, quæ licet a tot retro sæculis non intellecta, aut contempta, in ægrorum tamen solatium, & gratiam a natura inventa uberius nunc artis consilio augetur, & latius ita in eorundem emolumentum diffunditur, ut inter universales evacuationes enumeranda reputetur; quam conjecturam nemo, opinor, ratione destitutam judicabit, cui modo critica plurimorum morborum solutio, vel per naturalem salivæ expulsionem eorundem revelatio non latebit: & quidem felicium eventuum consideratione eorum cavillis occurritur, qui salivationem calumniant, vitiis, ac flagitiis exprobrant, ex quorum clade, ac nequitia (face præferente natura) artem illam salivatoriam, quam usque omnium scire interest, sine vitæ periculo addiscimus, atque experimur.

Hujus salivationis artificialis genericum indicans est depravata sanguinis labes, & status aliorum liquidorum vitiosus, quo ipsa minus fluxilia, vel mobilia liquida redduntur. Hinc generalis indicantis naturam induit quicquid extranei in sanguine inest lenti, aut glutinosi, quod a sialagogis potest ita fundi, & eliquari, ut ejusdem fusio in glandulas salivales impingens possit per hiantis eorundem orificia, & ductus eliminari. Quod indicans miror sane plurimos negligentia contemptum reliquisse, cum in tota salivandi arte nulla sit pars magis necessaria, & quæ Medicorum consilia exposcat, quam ista, quæ ad intuendam morborum salivationem petentium ordinata naturam, medentium praxim exornat, statuitque in salivandi palæstræ artis terminos, aut fecunditatem: Cujus ope indicata salivatio ad evellendas morborum radices unice par experitur; at a maiorum prohibente coercita, & temerario conatu adhibita plurimos post sævas ærumnarum perpeffiones in orci fauces ægros miserrime compellit.

Salivationis artificialis generale prohibens est humorum vitium, quod particulis sanguinis inquietis, seu impetuose commotis peculiariter inhæret, ob quas mediante salivatione potest ita fundi, & laxari fluidorum compages, ut fibrosa pars penitus destratur: vel si licet generico addere specificum prohibens est ita pressa, mutuoque cum cæteris miscibilibus in aliquo viscere amplexu unita, ut absque canalium dilaceratione minime laxari possit; quibus si solidorum liquida vehentium in visceribus naturalibus, aut spiritualibus delitescunt mollities, laxitas, flacciditas, aut soluta unitas accedat, omnibus circumstantiis stipata totum vere prohibentis onus exaurit.

ARTICULUS II.

De diversitate remediorum salivalium, eorumque usu, & utilitate.

UT sialagoga mercurii natura penitus nobis innotescat, juvat hic exponere remediorum salivalium diversitatem, quæ imminutum salivæ fluxum ad fauces promovent, & quicquid ibi hæret una discutiunt. Quando enim per glandulas palatinas in summitate palati dispersas, vel per sublinguales in radice, & lateribus linguæ hiantes una cum parotidibus juxta aures, salivales succus in oris cavum non infunditur, in ipsis tubulis moram necit, ubi diu subsistens, & in partibus capiti vicinis sensim collectus infestus evadit, ibidemque coacervatus novas operandi vires acquirit; indeque vitiato molecularum nexu male olens, varie morbosos inducit affectus. Ne igitur fluoris salivalis motus retardetur, ut proprius iste, & copiosius eliciatur, inventum fuit subsidii genus apophlegmatismi nomine insignitum, quod pituitosos humores in glandulis oris impactos, & tubulis inhærentes, fluxiles reddit, atque ad motum concitans in tantum emicuit, ut e peculiaribus evacuantibus veluti abreptus ad universalium classem elatus fuerit, quod eatenus con-

Sydenham Opera Medica.

cedi non potest, quatenus non totum corpus per ipsum ad has tubulorum syrtes suam deponit uliginem, sed particularis glandularum salivalium morbus tantum tolli posse videtur. Ubi autem humores in tota sanguinea massa, totoque adeo corpore implicati æquali motu per vasa rapiuntur, sed ad oris glandulas appellentes circa faucium tubulos resistant serosi humores, tunc ut ad motum fiant aptiores, & fluxiles reddantur, apophlegmatismi inciduntur, attenuanturque, ut feliciter proluciantur. Quod si quis mentis hallucinatione captus istos vitali nostro calori committi, ad ossa quasi usque penetrare, & inter fibrarum poros, & glandularum omnium spatiosa se insinuandi efficaciam suam manifeste admodum in morbis longe gravioribus contendat, in actu hærebit illi aqua. Horum enim agendi modus in glandularum laxitate vel vasculorum irritatione consistit. Quoniam igitur salia volatilia acia urinosa ex objectis in ore elicita, in nervorum fibrillas citissime irrepando urgent villorum oscilla per intervalla minima, fit ut per tremorem illum partes, quæ validiori flexione sese tanguant, in aliarum contactum magis nitantur; adeoque si quid est niobile per nifum illum vividius urgebitur, atque etiam abripietur quicquid est ad contactum membranarum positum, & intra villos contentum. Quare villorum nifus naturalis si partes magis impactas dimovere non possit, cum aucta vi stimuli minorem inveniat in fluidis resistantiam, in contenta liquida nitendo fiet ille vividior, & fluidorum motus ad partium contactus adhuc major; unde ratione aucti utriusque impetus lentescens liquor facilius dimovetur. Quod si fibræ glandularum ita corrugentur, ut appulsui salivæ renitentes effluxui non cedant, optime, feliciterque laxantur emollientibus vegetabilibus. Hæc sensim suaviter fauces afficiunt, anodyna vi poros demulcent, & partium nervosarum insigniter leniunt: qua ratione blando tepore laxatis fibris, flexilibus, mollibusque particulis membranarum partium tensione obliterata, uberior salivæ affluxus per hiantia vasculorum repagula confertim appellens jugiter a dilatatis poris extillat. Hinc latus est in praxi apophlegmatismorum campus sub forma massicatorii, electuarii, trochisci, pilularum, & gargarisii exhibendus. Juxta igitur pororum infartus, & glandularum morbos cietur saliva, quæ si ob fibrarum torporem, & languidam villorum oscillationem in tubulis hæreat, commodius prolucitur a massice, cujus granula ut lacrymæ transudant ex lentisco arbore sauciata, grato odore palatum afficiendo, glandularum atoniam resarciunt, & rotundis suis particulis suaviter titillando effluxum salivæ promovent. Attamen si serosus humor sit tanti lentoris, ut per conceptam nervorum undulationem, & illum villorum nifum in expressionem liquidorum nitentem a glandularum exilissimis ostiis dimoveri non possit paulo acriori stimulo, ut decocto mellito ex betonica, lavendula, majorana, rore marino, ruta, cubebis, pulegio, & nasturtio irritentur fibræ, ut majori contractione correptæ rigidiores, ac breviores fiant; unde adhuc majori nifu imperus sanguini ad partes oris in glandulas stagnanti communicabitur major, quo fiet, ut a villorum pressione attenuato spisso, & lento, aucta velocitate fluidorum, & solidorum tremore salivæ feri valdopere augeatur affluxus.

Si ob vitium villorum minus sensibilem, vel adhuc crassioris lentoris resistantiam divelli renitents prohibeantur saliva, commodius aptentur sulphurea, resinosa, quæ particulis salinis volatilibus acrioribus magis explicita, ut tabacum, nigella sylvestris, radix gentianæ, zinziberis, quibus referri potest radix nicotianæ, modo observetur, ne tantillum deglutita saliva, graves vomitus, & sedes concitentur, valeant intimius commovendo fibras, serum quietem meditantem evacuare, & expressionem liquidorum facilius promovere. Sic in linguæ paralyti liquida e sinapi, theriaca, confectio anacardina, & aqua apoplectica optimi sunt usus. Dum enim nervorum linguæ papillæ acrioribus particulis stimulatæ vividius oscillant, contentæ fluidi hærentis moleculæ ob tremoris solidorum motum fortiori agitatione commotæ sensim a vasculorum angustis abripiuntur. Ita nullo impedimento per linguæ substantiam repente fluido, & intra villos fluente libera permittetur musculorum fibræ contractio, unde resolvetur paralytis. Ad dentium dolorem a sero stagnante radix pyrethri massicata, tinctura Wedelii odontalgica ad copiosorem salivam eliciendam est expertissima. In gingivis scorbuticis, tumentibus glandulis, hinc in frigidis capitis affectibus, apoplexia nimirum, lethargo a crasso humore exortis, in quibus serum spissius evadit, cum ægri euphoria adhibentur massicatoria. At si tenui acrimonia vel fluxilitate nimia peccet humor, vel deficiat serum, ut in hæcticis, vel pessimo succo affectis, tutius erit abstinere. Hoc consilio in asthmate, in hemophysi, in facile vomitibus, faucibus inflammatis, & anginosi affectibus, ratione irritantis stimuli, tanquam noxia fugienda consulimus.

ARTICULUS III.

De Mercuriali Salivatione.

POST medicinæ exortum aureo artis sæculo, licet improbo experimentorum labore laxata ingenia, & subtilioribus philosophiæ ratiociniis suffulta sublimiores de natura rerum cogitationes, medicaminum vires, & quancumque morborum, causarumque contemplationem e penitiori physices recessu severiori indagine eruere conarentur: Horum tamen mira solertia fieri fugitivi in tenebris latantis, & quasi silentio involuti, dubiis tantum innixa fundamentis ignobiliores usus nullis experimentis ornata elicere potuit.

Post casum exemplo monstrante viam invehens in arte mercurius, qui prius ut scepticus, summeque deleterius a veterum schola lethalibus infamatus erat exemplis, nunc tandem caput exerens in primis artis subsidiis reponitur. Cum dira lues celtici semini non prius nostro cognita cælo mortalibus irrepsit, & primis illis temporibus subdole, ac clam summa hominum pernicie, ac clade sævire cœpit, atque in humorum corpus debacchari, omnia medentium auxilia illuxit: qui medicorum cœtus cum viderint homines inopinato, & non intellecto morbo peremptos, indefesso conamine melioris auxilii medelam investigantes, saniori forte consilio ineuntes ad validiora Arabum medicamina pro scabie deveniunt, quæ hydrargyrum recipiunt, insuetoque delusi morbo luem gallicam cum scabie perperam confundentes, illis medicaminibus, in ulceribus gallicis uti cœperunt, quæ cum ex voto successerint, ex falso verum

ducentes casu reperire, quod conjectura fallax distavit, & ratio invenire non potuit; unde mox pro gallica forde, & luis inquinamentis hydrargyri illinitione reperta, Carpenſis ille Chirurgus, ut testatur Fabritius Fallopius de morb. gal. & Ramazzini, fere primus hanc medicinam callens, summo artis incremento a populari pelliculus aura, & novitatis aucupio sibi viam sternens ad medicinæ culmen, licet sæpe cæsis hominum victimis litans, feliciori tamen sæpius eventu plurimos obliniens tantos obtinuit plausus, ut in magnalia artis adscitus quinquaginta millia ducatorum aureorum lucraretur.

Harum observationum præsidio instructa mens hominum post repetitas, atque accedentes in dies novas observationes sibi mutuo faciem præferentes, cœpit solertia mentis, hominum naturæ methodique pedissequa, novos mercurii usus explorare, & circa ipsius naturæ arcana disputare; ex quo regente rationis lumine in usus varios adscitus mercurius, atque diversæ indolis morborum ad curationem nunc investus, summas diffidias in medentium seclis, & in quorundam scepticis Clinicorum ingeniis sola innovandi libidine præjudicatis, excitavit, a quibus sectarum litigiis malefano hominum iudicio fundatis, in germanæ artis subsidium advocatus mirum non est, si post abdicatum empiricum studium, & subreptum theoriarum cultura luxuriantibus tantum intricatis hypotheson erroribus, & conjecturis, & quasi in arte coercitus ultimos medicinæ fines non attigerit.

Ut jam ad variam præparationum methodum mentem dirigamus, primo unctionem mercurialium cutis illiniendæ, quæ in lue venerea curanda præscribi solent, selectiores quasdam formulas referre necessarium existimo: in quibus linimentis, licet plurima componentia ingrediantur, horum tamen basis est mercurius cæteris quibusvis validior. Unguentum, quo Paræus lib. de lue ven. cap. x. feliciter usus est, conficitur ex particulis sublimati corrosivi, & sulphuris in pollinem redactis, quibus affuso argento vivo, simul cum axungia mox, & vitellis induratis, omnia diligenter permixta agitantur, donec minima commota optime se tangant. His exacte combinatis rursus affunditur argenti vivi, axungia, & vitellorum portio, ut priori massæ incorporaretur, cui additis tandem oleis therebinthinæ, & lauri, mox theriaca, & mithridato paratur mediocris consistentiæ unguentum. Juxta mentem aliorum Chymicorum mercurius vivus extingitur saliva hominis, vel oleo therebinthinæ, liliorum, vel lumbricorum, qui inde ab unguento de althæa Fernellii exceptus, oleoque succini associatus in unguentum coalescit. Sed melioris fortasse notæ compositio indicatur a Junckenio, & Sydenhamio, quæ ex crudo mercurio, & axungia porcina conficitur. Nec oleum aliquod, nec aliud quidpiam admiscet, cum deterius fiat unguentum, si quod adjunctum laxet habenas, vel hoc frænum injiciat, nihilque efficacius, si nil prorsus agat. Fortassis additamenta scrupulose expensa sunt inanes temeræ suppetiæ, quæ hydrargyri viribus, ac proinde frangendis mercurii conatibus, aut in internas partes penetratione cohibenda impares nil opis conferunt, nec malignitatem stulte petitam mercurii corrigunt: sed poros cutis occludendo mercurii efficaciam quoquo pacto infringunt, ut in oleosæ substantiæ amplexu torpidus paulo hærens, dein oleorum conjugio liberatus impetuosius in sanguinem evehctus celeri motu ruat, donec visciditates in corpore hospites incisæ, atque attenuatæ per ductus salivales ejiciantur. At ab eorum usu, ut ab alea suspitione plena, nisi morbus vehemens inunctionem extorqueat, consultius est abstinere, cum languidius, vel validius, quam par est, fluxum salivalem commoveat.

A mercurio non excitatus fluxus oris, quotiescunque in linimento paratus uberius alluit spongiosas glandulas, & vasculorum lacunas, vel quia nervi in memoratis partibus conferti stupore afficiuntur, atque adeo distrahuntur, ut singuli villi laxo machinularum federe, & fibræ minori resistantia inter sese connexæ prementi nisu discludantur, quarum ope ubique humores miris modis agitati ulterius superare debent asperitatem parietum, resistantiarum occurſus, & postrema fistularum, ductuumque emissaria. Nunc vero si vis distarum machinularum distractionum minor fuerit vi ponderis eorundem liquidorum, quæ in reticulari fibrarum, glandularumque contextu continentur, cum in memorata partium distractione mercuriales particulae, ob resistantiam, quam sibi ipsis faciunt, ad invicem non possint a languido solidorum nisu, & liquidorum a tergo urgentium pressione in gyrum rotari, facile in interjectis loculis, & fibrarum laxitate stabulantur, & suspendatur oportet eorum influxus oscillorum connisum violenter exhauriens. Machinula igitur fibrarum valde distractæ, & nimis laxatæ, etsi sponte sua denuo sese restituere conantur ad naturalem terminum, ut videtur in arcu, & qualibet machina, quæ violenter distracta, summeque distensa in pristinum statum reducitur, pondere nimio gravatæ non restituentur, ex quibus fieri non potest hydrargyri circuitus cum liquidis omnibus eo, quo fas esset, impetu; ideoque mercurius magis ad invicem pressus in illis spongiolis moram necit, nec ejusdem stagnantes particulae sursum impelli possunt, tum quia resistit naturalis ejusdem gravitas, tum quia laxitas fibrarum, & villorum omnium vis macerata labascit. Hinc præ nimio infatu, ac pondere circumfusi humoris superatur nisu, & villorum resistantia, ac idcirco immodica humorum sarcina inanitates spongiarum gravantur, ejusque ligamenta exolvuntur, atque divelluntur.

Si vero uberius mercurialium corpusculorum copia consentientibus fibris, rigidisque villis occurrat fluidi particulis, earundem implexu tanquam vinculis coercita paulo detinetur; at soluta fluidorum compage sui juris facta intensius exagitur, & turmatim avolare nititur. Unde impetuosius concitis fluidorum solutionibus, uberiori nimis salivæ eruptione sputatio ciebitur; quo fiet, ut materiæ partibus gelatinosis impactæ saburra perquam immensa commota, tota confertim nimis versus ductus salivales irruens circa gutturis partes cum suffocationis periculo aggeratur: adeoque serosi laticis agitatae moleculæ fugam molientes, & hinc inde ad glandulas oris ingiter confluentes, cum nullo fræno cohiberi possint, non raro contumacissimis cruciatibus spuentem ægrum miserrime jugulant.

Mihi Venetiis narravit vir in mechanicis disciplinis versatissimus, & æque in exercenda praxi felicissimus, quod venerea lue ægrum tabescentem aggressus repetitis illinitionibus, cum nec quarta inunctione potuisset salivam promovere, imminenti remedii periculo consultus, & futuræ cladis fortasse conscius interdixit ægro mercurii inunctiones. At invocata alterius medentis ope inunctiones renovare consulens, in septima inunctione ardenti febre correptus,

summoque animi angore incallescens patiens deliravit. In hac morbi sævitie posterior Medicus suo errore deteritus curationis abdicavit imperium; nesciens quo facto, quave medela consultæ calamitati occurrere posset: prior tamen ut acrioris ingenii Medicus omne artis opus ruminavit. Catharticus irritò conatu adhibitis, aurum in subtilissimum pollinem redigi jussit, ut hydrargyrum miro aurum amplectens amore per aliquod cribrum eveheretur: sed minutissima auri scobs non levitate sanguini æqualis sibi viam per alvum paravit. Unde quasi lumine afflatus, ut ægri corium auri foliis tegetetur auctor fuit; protinus inde aurum argenteo hydrargyri colore palleſcere videbatur, ita ut mirum fuit, quanta mercurii copia auro allicita educeretur. Hinc laudabili hydrargyri quantitateeducta ingenti ptyalifino parotides, salivales omnes intumescere glandulæ, per quas aqueis, & salino-fixis particulis ad fluorem, evehctis jugiter erumpentibus, non minus intestino sanguinis motu in furorem concito, quam a mercurii pondere enervato solidarum pattium robore, patientem jam eversum in naufragio vitam invenisse merito diceret.

Sanguis igitur in gallica fluidorum dyscrasia ob strictam, & densam nimum texturam naturali cordis, & arteriæ parietum motu allisus, debitoque fluore non gaudens suis partibus ita cohæret, ut licet assiduis villorum contractionibus, cruorisque præterlabentis pressione agitur, in dies intestinus ejusdem motus oblanguescat, cæterarumque partium tonicis motus pedetentim resolvetur oportet. At si graves ingiter diffuſentes mercurii moleculæ, id est majori momento pollentes, in sanguinis massam majori copia quaquaversum cum impetu confertim ruant, solventur subito partes sanguinis leatorem implicatæ, & in libertatem vindicabuntur, excitabunturque motus species vivo tum liquidorum, tum solidorum momento respondent, & ratione eorundem impetus velocitatis, & violentiæ floet per canalia sanguis maxime liber summa velocitate, atque valido impetu præditus, nisum quemlibet vehementer exerens. Posito autem hujusmodi sanguine maxime soluto, ac celerrime raptò, partes subtiliores, & maxime mobiles, quæ non cohibentur nisi a fibra sanguinis, suo fræno destituuntur, adeoque vagantur libere per corpus sanguinis toto motu nitentes, ac proinde totum perturbato motu liquidum movebitur, unde febris ardens. Hinc per pervos magis confusi vagantes spiritus, & extreme soluti maximoque impetu instructi derivabuntur in fasciculorum nervorum tubulos, qui undequaque irrumpentes, nullo certoque ordine moti delirium excitabunt constans, atque continuum. Cum vero in accelerato liquidorum motu, licet fluidum sit ita divisum in partes adeo minimas, ut diameter orificiorum glandularum ad diametrum fluidi separandi habeat rationem majoris capacitatis, cum in glandulis separandum suum exigat sejunctionis tempus, & determinatam velocitatem requirat; perspicuum est separandas in fluorem evehctas ab hydrargyro particulas, & cum sanguine ad orificia glandularum salivam secernentium appulsas, in ipsamet vasa non influere, nec ullum posse derivare liquidum, quousque solidorum nisu, & velocitas sanguinis aucta conservetur eadem. Quare educto mercurio validiori momento sanguinem rapido cursu per glandularum angustias impellente, copiosa sputatio incœpit, ob sanguinem minori velocitate in easdem glandulas inpingentem. Igitur caute procedendum in salivatione instituenda mercuriali illitu. Nec, inquit Deleboe Sylvius, *sufficit feliciter successisse Medico salivationem in ægris suis excitatam, quin videndum, ne unquam succedat male, cum plus dedecoris accedat Medico ex uno eventu malo, quam honoris ex decem eventibus bonis.* Verum si post peractas illinitiones nulla symptomatum perniciæ procedat salivatio, & felici eventu stadium exequatur; adhuc tamen si a moleculis hydrargyri per inunctionem institutam intra sanguinem cohibitis salibus virus intime non extirpetur, completa salivatione recrudescit morbus, atque superstes dein vitiosa sanguinis labes, & humorum indoles in elementaribus sanguinis particulis primitus constitutivis eradicata pullulat; a qua incerta liquidorum solutione ocius, quam par est, instituta, eventum inconstantia consequitur, quæ artem contumeliæ redarguit.

Sedulo vero medentes unctionem ægris non tantum gravem, & molestam, sed nonnunquam etiam lethalem fuisse animadvertentes, mercurialia suffumigia investigarunt, quæ parantur cinnabari cum mastice, thure, mirra, vel succino in pollinem redactò, quod prunis injectum ignem concipit, simulque cum sulphure resolutum totum in fumum densum, gravemque evolare nitens per infundibulum vitreum ore excipitur, capite bene tecto, ne quid ejus peccat, aut abeat in auras. Vel hydrargyro in therebintina extincto, bolo vulgari, & carbonum pulvere massam conficiunt, quæ inde sub umbra exsiccata candenti igni imponitur, ut fumosa nubes in altum prorepens pressus in tubo agglomerata, & dehiscencia oris vascula versus promotas minimas quasque corporis partes venerea lue affectus præreptet. Verum quantum efficax est mercurii fumus ad saniosam, putidamque salivam promoveendam, tantum ex ejus usu recidivam patiuntur hi, qui gummatibus, nodisque plexi, & sævissimis ex lue venerea doloribus cruciati certum mercurii fumum intus non admiserint, quod partes omnes a seminio venereo infectas non valeat subigere. Hinc est, quod ab indeterminatis agentium viribus ab incerta quantitate mercurii in fumum resoluti, & intus elapsi pendentibus, fortiture eventum inconstantia, quæ licet repetitis tentaminibus, rationeque expiata, dubiam semper, infidamque methodum constituit.

Nec feliciori successu cingula jam veteribus pro cura scabiei adhibita in gallica lue experiuntur. Mercurium salivæ, & sevo extinctum in ovi albumen includunt, illinuntque supra gossypium, quod in cinguli modum consuunt. Hinc cuditur famosum illud sapientiæ cingulum, seu mercuriale Rulandi, quod est pannus lineus unguento mercuriali illitus, qui ad lumborum regionem applicatur. Attamen ab hujusmodi topicis ex magna rerum innumerarum congerie conflatis Medicus cautus sit, ne confidenter nimis expectet bona, audacterque nimis utatur: si hæc mercurii per poros cutis in sanguinem repentis genuina, ac certa nondum innouit methodus. Unde forte remedio magis, quam morbo confecti libithinam non valent effugere. Excussis itaque dubiis, ac incertis hydrargyri, externo illitu, suffumigio, & cingulis, ad accuratiores mercurii præparationes absolvendas, mihi volupe est mentem revocare. Modo vero ad salivationem ciendam plurimi utuntur turbith minerali, quod est mercurius spiculis acidis olei vitrioli farcitus. Mercurius

vivus olei vitrioli combinatus ad minima dissolvitur: post dissolutionem igni lento committitur, & distillando educitur humiditas; inde in fine aucto ignis gradu ultima pars spirituum dissepitur. Resistans massa dein in aquæ tepore sufflata in pulverem flavum momento temporis evanescit, quæ leviter mellita paucis lotionibus valide vomitur, & sedes concitat. Spiritus acidi præcipitati forma mercurium induentes excitando in fibris speciem motus momenti majoris impetu acutorum salium vehementiori eas ita urgent, vel his ita occurrunt, ut ad stimuli locum partes nervorum in eo sita ad contactum positas, & in ipsos occurrentes, quasi divellant ab invicem. Ab hac vi stimuli divulsæ membranæ, & universi corporis villi naturali contractione contractiles validius contrahuntur; adeoque per nifum partium majorem, & vividiorum fibrarum flexionem vividius urgebuntur, quicquid est ad membranam contactum, sive intra ductus, e glandularum inania positum. Unde dimovebuntur magis contenta liquida, quam si nervorum fibrillæ leviter oscillarent: per tremorem autem illum, & spasmodicam tunicarum contractionem, si quid erit mobile, & expressile, a dehiscuntibus ventriculi glandulis intestinorum osculis, papillis, ductibus, qua poterit, derivabitur. Retusis vero speculis, aqua communis pluries edulcoratis, & sæpe ablundo hebetatis, mercurialis pulvis omni acredine, & falsedine spoliatur: Ita pungentibus salibus, & purgantibus exutus felicius sanguini fermento gallico effæcto commiscetur, ut promptius cum fluidis effluens oris fluxum promoveat.

Verum genuinum minerale turbith a peritis chymiatris, non a mercurio vivo cum acidis educitur, sed ex sublimato præparatur. Mercurius sublimatus dissolvitur in aqua pluviana calida, solutio aliquoties filtratur, filtrato mercurio guttatim infundatur tantum olei salis tartari, quantum putetur requiri quoad in fundo subsistat pulvis rubeus, qui aqua communi edulcoratur usque dum destituatur omni acredine; inde cohibetur cum aqua mellis optime rectificata sex, vel septem vicibus, quibus terminatis eximatur pulvis, qui in vini alcohol suffunditur, continuoque motu circumfertur, donec vini spiritus protinus assumatur.

Si vero mercurius cinnabari elicitus dissolvatur spiritu nitri, cujus dissolutioni aqua sale marino confecto projiciatur, inde volatili spiritu superaddito salis armoniaci in summe albicans præcipitatum mutabitur. Hoc ipsum aqua fontis abluatur, ut a scoris salinis, & partibus terrestrioribus vindicatum felicius salivam movere possit. Sal marinum, vel ejusdem spiritus ex rigidioribus moleculis, & crassioribus corpusculis conflatus in hanc dissolutionem impingens sui impetus percussione, & directionis momento nitri spicula diffringit mercurialibus particulis turgida. Unde mercurius a nitrosis salibus dissociatus suo pondere ad vasis fundum sese compellit. Sic quoniam spiritus salis armoniaci volatilis ratione salis alkali est majoris motus, & momenti, ut possit liquoris particulas salis marini excutere, cujus moleculæ minoris agitationis, & impetus non appellant, penum præcipitationis auget.

Alius paratur mercurius in spiritu nitri dissolutus, qui lento igne diffusa humiditate in candidam massam facessit, & ignis torturam patiens dum calcinatur, rubescit. Spiritus nitri, & mercurii corrosiva ramenta, dum calcinatione per ignem exagitantur, mutuis nifibus in se invicem agunt, eorumque renifus aculeata salia retundens subtilioribus metheorizatis septicam materiæ coalescentis aciditatem demulcet, quæ licet calcinatione minus gravis, & caustica fiat, fungosos tamen villos exedit, & ad salivationem excitandam periculo non carer. Hæc vero spiritus vini rectificatissimo pluries combusta resolutis salium aculeis ita oblinitur, ut omnibus votis salivationem compleat.

Galli saniori consilio panaceam venerea lue confectis tutius exhibent. Hæc enim est sublimatus dulcis salibus terreo-erosivis spoliatus, & pluribus sublimationibus lenitus, qui supra porphiritem contritus in alcohol redigitur. Hic pulvis in cucurbita vitri coarctus spiritu vini irroratur, dein eburis spatula passim agitur, ut hinc post plurimum dierum infusionem in balneo-mariæ projecto totus vini spiritus destillando eliciatur. Quo spiritu in vapore sublimato panacea in fundo vasis reperitur. Vel sublimatus dulcis dissolvitur in spiritu vini, ejusdem solutio filtratur, & spiritu vitrioli præcipitatur. Hic mercurius vasis fundum dum petir, ut nix candescit: Inde aliquoties aqua calida dulcificatur, ut in saccharinum abeat præcipitatum: tum demum huic superfuso spiritu vini destillatur ter destillationem reiterando. Reperitæ diu destillationes, sublimationes salium spicula rigida sublimati corrosivi rescindunt, aut eorundem salium ramenta partim detrahunt, quibus si intine erosivæ acredinis aculei non diffingantur, particulæ sulphureæ spiritus vini intra poros sublimari conclusæ furentia salia oblinient, partibusque ramosis ævigent. Ab hac panacea non multum differt illa Valentini, quæ æque tuta, ac jucunda in oris excitando fluxu sancitur. Hæc panacea absque glandularum exulceratione levi labiorum dolore, & minima generum inflatione salivæ cursum molitur, qua in molis, ac tenellæ constitutionis hominibus passim utimur. Cum vero virulenta ulcera, & sordida, tophi, & saniosæ crustæ corpus defædantes vehementibus ubique doloribus obsident; tunc virus illud liquidorum crases prorsus evertens panaceæ blanditia sæpe integre non pellitur, & superstes deinde depravata Sanguinis constitutio majori fluidorum solutione expugnatur.

Quamobrem mercurium dulcem in forma pillulari tanto hosti unice parem commendo. Mercurius ab acido salinis aculeis penetratus in minimos, & infinitos scinditur globulos, quos undique acida spiritus nitri corpuscula permeant, eorumque ramentis irretiunt. Hæc massa alba resistans, evaporata igne lento arenæ humiditate, æquali vitrioli calcinati, & salis decrepitati portioni commiscetur, quæ mixtura in matraccio reposita igne exagitur, donec in vasis culmen repens secum trahat corrosivos spiritus, a quibus repressa volatilitate, & ab acidis cohibita dissolutione in spiritus, concrefcit in crystallos. Hujus sublimati particulæ, & motus parvulorum globulorum calore promotæ, impetuque rotatæ, quasi minimis cultris fibras dilantant, unde summum venenum audiunt. Acutorum salium in mercurio delitescuntium & in parvo spatio coeuntium impetus cylindricis suis ad pyramidem in fine basis, & apicis accedentibus ad angulos rectos in fibris membranisque occurrentibus eo urget momento, quod ad membranam poros, & cohesionem fibrarum superandam requiritur. At mirum, dum acuta spicula sublimati corrosivi in matraccio circulantia, in pallas mercurii vivi validius rotantur, mutuis nifibus congregientia frangunt.

Hinc per solam hydrargyri additionem repetita ignis actione in novis sublimationibus retusis salibus, eorumque cuspis novo mercurio imbibita in sphaeram evadens, vel complanata omnes partes æqualiter impetit, adeoque ab eis æquali momento collisa, & ad quem reddit rapercussa ab ambientibus solidorum membranæ absque septicæ facultate irrumpit in spatium liquore plenum, & ante sui exclusionem diversa mole, & gravitate, adeoque diversa motus quantitate instructa in resistentia corpora vires, impulsus, motus variæ directionis, & allisionis exerendo intra sanguinem viscida solvendo labitur. Mercurium dulcem non inferioris frugis conficies ex mercurio sublimato & mercurio vivo, ex quo fonte promanat Clarissimi Riverii chalomelanos, quod ex mercurio, sale, & vitriolo compositum duodecim sublimationibus ad summum excellentiæ gradum evahitur, quibus mercurius vitæ additur eo modo, quo a Riverio describitur. Recipiat mercurius sublimatus, & argentum vivum cinnabari elicitum, & misceantur exactissime, donec mercurius vivus non amplius appareat, postea sublimentur, & duodecies sublimationes reiterentur. Hujus mercurii dulcis cum mercurio vitæ quadrupla, qui amiserit totum intus latens venenum per exhalationem tetri ac fœtidi fumi, ne vomitum cieat, quadrupla inquam major misceatur, & fiet pulvis colore griseus.

Hæc sialagoga medicamina indicantur a speciali humorum vitio, & peculiari sanguinis dyscrasia, quæ viscidæ, crassæ, glutinosæ acrimoniæ volatili innitur, in qua crasi omnium quasi liquidorum vitiosa salino-volatiles moleculæ fluorem acquirunt, & lymphicæ sanguinis crassoque terreæ particulæ figuntur, ut inde salibus acrioribus imperiis nactis, & parte sanguinis viscida ulteriori coalitum unita glutinosum cum acrimonia conjunctum amulentur. Hæc glutinosæ acredinis sordes per coitum impurum poros urinarii meatus, & prostratarum glandulas coinquinat: inde subdole fluidis in gyrum rotatis impressa sua aciditate erosiva volatili maxime cavos glandularum folliculos post infartum exedit, membranarumque substantias cum vasculorum erosione, & pustulis ulcerosis depascitur. Hæc, inrima magis proserpens ossium periochia cum dolore præcipue nocturno lancinativo medios artus occupante, & flexurarum rigiditate convellit, divellitque, ossaque carie, tophis confecta fascinat. Igitur coinquinatæ omnes sanguinis moleculæ, & ulterius pressæ ab ejusdem acidis coagulantibus fortiori amplexu cohibentur: cæteris interim mobilioribus & salino acrioribus fluidorum dilabentibus particulis ipse sanguis crassus, atque mucilaginosus evadit; quo magis mobile sanguinis implicatur quoque ac torpore afficitur, ut ægre pensum circulationis expleat; inde a fibrarum tono ex indebito liquidorum appulsu non suffecto, & sanguine salibus volatilibus, & partibus crassioribus turgido non reparato, tum liquidorum, tum solidorum morbus passim contingit.

Liquidorum vero prohibentium conditio est salina materies magis attenuata, quæ involventibus acidis orbata sit acris, & cum oleosis tenuioribus permixta volatilis fœtens evadit. Altera autem pars sanguinis fixioribus salibus, & oleis ramosioribus simul tenacissime combinata in densam faciem, & salino adustam muraticam concretionem: illa ob acrimoniam alkalina volatilem producit in sanguine partium solutam cohærentiam, quæ solutio actiones omnes solidorum, & liquidorum partium turbat, & destruit; hæc minimorum canalium coalitum facit, & in glandulis obstructions pertinaciter firmat.

Quoniam per acriores mentis conjecturas oculatissimo examine prosecutas, perque repetita tentamina solentissima Medicorum experientia suffulta a pluribus simulque latentibus melancholici humoris proprietatibus, ac viribus exortum morbum salivationem contemnere compertum fuit; ne experimentalis veritatis incrementum litemur, fateamur oportet, sanguinis particulas salium adustas nimis evectas, fluoremque patientes, summe activas mercurii vires eludere, terrestrioribus sulphuris corpusculis associatas. Cum strictiori amplexu salium particulæ adunatæ ita pertinaciter cohærent, ut cuicumque solventi impervix reddantur, arctissimæ eorum meatuum complicationes, a nexu laxari, & in mensuri amplexu rapi non queunt. Quocumque igitur vinculo se invicem associantur salium concretiones, ut retuso impetu mercurii, ejusdemque particularum penetrationes a solidiori concreto repulsa difficillime divelli, & in minutissimas partes confringi resistent, eorum solidæ concretionis compages prius laxata, nec reclusa auferri non poterit. Tantum intercedat oportet mercuriales moleculas inter, & adustas salium concretiones, varias quoad qualitates, & corpusculorum nexum unam in massam coalescentes, discrimen, ut cum mutuis coalitionibus arcte adeo complectantur, ut parvula nulla intervalla, porolve improporionatos relinquunt, mercurialia corpuscula in salina concreta offendentia facile excludant; quæ sane maxime licet poris instructa discrepantibus, tamen naturæ ageris, in agredientis prementis impetus nitentes, facile supra solventis nifum resistentias exercent; Itaque intra melancholici humoris nexus tenuioribus mercurii corpusculis non coercitis, concrementi partes eorum motu ab invicem non divellantur.

Hinc carcinoma recuentes adustæ salium moleculæ, si volatilibus sanguinis partibus in auras resolutis, copiosiorique aquearum particularum dissipatione, resolutis spiritibus exhausta, nimis evectæ, fluoreque potitæ cum vitriolicis, acidisque particulis, & terreo-sulphureis crassioribus combinantur, quæ ad ductus glandularum delatæ firmius in earum fibris inhærentes folliculo includuntur, dimoveri inquam non possunt ab earum complicatione, licet ab impetu mercurii percussæ, quarum tumor, si fortiori ptyalismo oppugnetur, ejusdem subtiliores particulæ a gravitate impellentis sæpius commotæ, ejusque impetu allisæ, dum mutuis nifibus agitantur, salium ramenta validius concitata momentum acquirunt, inde in comprimentes fibras cuspidula infigunt, & villos glandularum ab invicem divellant, quibus sensim discissis, ac corrosis cancer sub forma tumoris delitescens fatali clade inopinato prorumpit. Ex quo satis liquet, componentes canceri particulas, aut a mercurio non diffringi, aut ab eodem accendi; unde illud Nasonianum:

Curando fieri quedam pejora videmus

Ulcera, quæ melius non tetigisse, fuit.

Felicitari licet eventu eruptiones omnes papillarum squamosæ evanescant, dum in graviore impetigine, & lepra salivatio cietur: tamen nova eorum morborum seges pullulare incipiens brevi temporis spatio solitam feritatem attingit, ut observavit Villis in qua-

tuor ægris impetigine laborantibus. Effectus huiusce causa in eo consistit, quod intimus pattium sanguinis mechanismus particulis non solum acido-salinis, tartareisque diversimodi status, ac indolis effectus, sed salino acri volatili alkalina materia turgida a salivatione penitus subigi, ac prorsus resolvi nequeat; adeoque superflues labes sanguinis, & humorum acrium indeoles primitus constitutiva post evanescentes papillarum corymbos, iuxta materiam supplementa in concretiones tartareas faciens in cute defigitur, ubi papillarum eruptionibus, quasi totidem huiusce morbi loculamentis incoactis, processu temporis aucto morbificæ materię cumulo, superficies cutis omnis incrustatione squammosa, ac plane ad lepræ confinia evecta obducetur.

Ut enim adustam salium concretionem inani molimine phtyalismo pessundamus, ita eadem debiliores, vitioque plurimos laborantes pulmonum, vel hæmophthisi confectos, infami errore necamus. Si enim naturalis pulmonis vasculorum capacitas, ac fibris mollioribus, summeque deductilibus coalescentium augeatur nimis, ut partes canalium constituentes sic divellantur ab invicem, ut minimis oscillationibus nitantur in fluentia liquida, colligari fluores confertim per eorundem cava trajecti, cum intine non sint soluti, ut per impetum a corde susceptum supra omnes resistentiarum vires excurrant, facile in distensis vehementer fibris, in cellulosis vesiculis, & inanibus spatiis intercipientur, quibus novo semper, ac semper affluente humore per capillaria ramuscula, vesiculæ ex illis prodeuntes, & racematim adherentes mirum in modum ita intumescunt, ut humor ratione inertię non diffusus in parva tubercula excrecat, quæ dein dum a pulmonum pressione, motuque incessanti incallescunt, in suppurationem abeunt, & in tabem lethalem terminantur. Quod si ultra tonum dilatata vasa a pondere mercurii in maiorem extensionem deducta, licet ex majori distensione maiorem nata sint ad comprimendum vim: tamen ab impetu sanguinis majori in arteriarum parietes nitentis, & particulis mercurialibus eadem ad ulteriorem distensionem cogentibus, tandem distractis plurimum arteriarum membranis eo distensionis deveniunt, ut vim urgentis ad latera sanguinis, ejusdemque particularum momentum impetus ad vasculorum contactum motarum sustinere non possint; adeoque aucta potentia sanguinis arteriosi extrorsum arteriarum minimarum membranas urgente, & earundem imminuta resistentia ob maximam distractionem subito divellantur fibrillæ, restitutionis vim in nimia distractione non observantes. Horum autem potentia ad se restituendum cum in partium coalitione consistat, hæc ex frequenti sæpiusque repetita distractione enervatur; adeoque restitutionis robore plurimum imminuto, muscularis fibra arterię sectione angustari nitens inofficiosa subsistit. Igitur opus est, ut arteria existente distracta, novaque majoris momenti potentia fluidis applicata diffingatur, vel laxetur fibrarum componentium nexus, per quos sanguis inopinato prorumpit, & sanguinis sputum plerumque fatale subsequitur, quod observavit Nicolaus Lemery in suo cursu chymico lethali experimento.

Aliquando in spongioso, & molli pulmonum parenchymate cretaei lapides sæpius concrescunt, qui ubi angulati sunt pulmonum motu, & gravitate mercurii commoti teneram eorum substantiam lacerare solent; quo tussis vehemens, atque arida, dolorque thoracicus non raro cum sanguinis profluvio satis insigni, atque exinde ulcera cum signis phthicos pulmonaris nascuntur. Verum isti lapides sint læves, neque qui pulmonum parenchyma terere, vel lacerare possint; at candiant canaliculorum partes facile dilabentes, ratione imbecillæ virtutis, qua ad mutuam contactum sistuntur, quorum minimi villi, qui sunt veluti totidem languidi vectes uniti, adeoque parvarum virium capaces, dum ad motum a fluenti corpore majori impetu instructo excitantur, iners illa efficitur vasorum vis & fibrarum minor ad contractionem visus, qua debili minimorum solidorum energia sistitur ad partem fluidorum motus, indeque fit, ut mercuriales particulæ a resistentiæ loco repulsæ, a repercutiente validiori impetui momento instruantur, atque vires percussione in continentes villos exerceant; quorum teneræ, ac laxæ fibrillæ maxima distensione coactæ a nova jugiter affluente materia infirmius nituntur in contenta fluida; & cum a languido nisu villorum, particulas fluidi viscidiores, & motui magis resistentes premente, non fiat lentor liquidior, ut se jungi, & sese expedire possit, evadet ille ad motum difficilior, & ratione lentoris tenacius hærentis extremitatibus canalium augebitur pulmonum infartus, quo vasa illa tenera coarctata, & compressa liberum transitum præbere non possunt circulantibus fluidis: indeque continuo appulsu novi liquoris ad partes pulmonum compressas tendentis, & prætersurrentis ad latera urgentis, vasa ultra tonum dilatata, & distenta tandem rumpuntur, quæ viam ad pulmonarem phtysim sternere solent. Unde quotiescumque liquidorum lentor universalis, & vasculorum infartus tollendus erit, sed aderit pectoris dolor, tussis, aut tubercula delitescencia, imminuetur quidem fluidi crassities, at cruda pulmonum tubercula parvo dolore latentia salivationis agitatione incallescunt, & inflammata suppurantur, quæ in habitu primo phtyicos delitescencia in irreparabile exitum terminantur.

Nec feliciori eventum certitudine in nervorum tremore salivationis expetitur. Cum autem ad motus requiratur contractio musculorum maxime aquabilis, atque continua, si spiritus per nervos influat minori copia, quam par sit sustinendæ tensioni fibrarum, nervorum tubuli dato temporis spatio a derivatis spiritibus solum inflati elevabuntur, & demittentur alterne, unde continget tremor; cuius tremoris species in villis impressa, si a comprimente aliquo, vel obstruente, adeoque spirituum influxus intercipientem inferatur, salivatione plane tolli, atque averti poterit. At in senibus, & imbecillibus cum tremor a debilitate nervorum, & læta spirituum proveniat, erit ille compositus ex repugnantia nervorum ad excipiendam pressionem in fibris a spirituum expansione, & nisu, quasi laxatis per membranarum divulsionem diuturno tremore fatiscientium, & inertii nervosi liquidi elatere flexuosos canaliculos, minimasque tilias non replente, qui in labentibus villis obvis, & earundem distractione subortus, cum eorum tenuissima filamenta ad æqualem contrarium inepta tonico motu non æquent mercurialium percussionum vibices, tremor idem non modo persistet, verum major succedet.

Ratione non longe diversa male sputatio ciatur in eo, qui motibus convulsivis a lædente externo illatis obnoxius evadit. Ita quicumque cerebro debili, aut nimis rara, & laxa nervearum fibrarum

textura præditi ex adunatione partium minimarum connisu in cohaesione tam parvo suborta, ut levi motu solvi queat, morbis nervosis tentantur, aut paralyti ex magna villorum siccitate musculorum fluxione dirigentium prohibente, vel ab eorundem resolutione motum coercente (quorum pars affecta protracta morbo contabescit) a mercurialibus obducantur. Gravia enim mercurii corpuscula nimis mobilia fluendo per propriam nervorum substantiam, immo, superatis innumeris diverticulis, & impedimentis, motus suos ubique perperam diversis directionibus, ac velocitatibus, quibus pollent, communicant singulis machinulis totius nervorum fabricæ, & poros impervios memoratæ particulæ commeantes hac illac inæqualiter nervos excutunt; & quia eorum meatus, inanitates, & interjecta spatiola sunt mollia, contracta, & diversis sæculentiis referta, impediunt flexuosos trices, atque interfecationibus invicem inclinatis, ne mercuriales moleculæ cursum molientes æquali undique nisu spongiolas fibrarum penetrent, fit ut motu eleri & perturbato machinularum dimoveant nexum, indeque deflestantur quocunque, tanta cum virium inæqualitate, quanta videtur necessaria ad implicatam nervorum substantiam raro villorum fœdere copulatam diruendam, variisque quassationibus villos contractiles, nervorum filamenta, & fibras membranarum assidua stimulorum vi lacessendas ordinata; adeoque imminuta vi cohaesionis inter exilissima corpuscula ita enervatur villorum, & filamentorum connisus, ut humoribus tiliam madefcentes ad instar spongiæ tanquam cera emolliantur, & pondere mercurii maceratæ a proprio termino recedant.

Hinc cum mercurius vivus insensibilissimus sit nerveis, ideo qui pro salivatione unctionem passi, sæpius laborant gravioribus nervorum affectibus, a residendis (ut plurimum Chymicorum cum Lemery fassus est) hinc inde mercurii particulis, optime auro curantur, testante Etmullero: unde Zacutus Lusitanus unguentum mercuriale conficit ex auro, ut crassiores mercurii particulæ per totum corpus diffusæ post salivationem in fibrarum interstitiis resistentes, promptius se insinuent in aurum. Si intra nervorum spongiosam substantiam viscidis implicatæ subsiderent crassiores mercurii particulæ, nequaquam elicerentur ab auro. Verum quidem est, si aurum atteratur (si vero atteri potest) in partes adeo minimas, ut earum corpuscula, habita ratione molis, & gravitatis energia, reddantur sanguinis particulis levitate paria, & rapi cum fluidis apta, veneream luentius auro, quam mercurio sanari. At licet aurum in minutissima sui corpuscula redactum sit, adhuc continet moleculas, quæ a sanguine evehi resistunt, quæque nullo artificio hæcenus cognito ad tantam attenuationem reduci possunt, ut in minimas atomos confectæ sanguini hærent, motuque fluidorum rapi possent. Qua ratione licet mole æquales, sanguine tamen graviore auri particulæ a liquidorum commercio seclusæ, nullas in mercuriali sulphure vires exercere poterunt. Quibus vero mollem fibrarum texturam finxit natura, aut qui in mercurii fodinis continuo marcescunt, nervorum labe non carent. Ob jugem solidorum colloquationem, & fibrillarum macerationem a mercurialibus corpusculis intus susceptis, contabescunt nervorum fasciculi, qui perperam a nimio mercurialium impulsu indensimenter laceffiti fatiscunt; unde vasorum tono subrepto, tollitur eorundem nitus in fluida, ex quorum retardato motu, & virium solidorum inertia complicatus morbus emergit.

Cum vero sanguis præfervidus existens a recta temperie desciscit, & ejus sulphureæ particulæ prædominio potitæ sibi salem asciscunt, quæ invicem allisæ, proindeque in minimas solutæ moleculas nimium in fluorem evehantur, liquoris mixtione alterata intimeque fusa ejusdem naturali consistentia inordinate solutus dyscrasiam sulphureo salinam, & falso-muriaticam acri-alkalicam indolem induit, cujus sulphuris, & salis concretiones perpetim perpetim huc illuc dispersæ, exterius suffusæ maculas, & ulcera, interius depositæ dysenterias, & dolores pariunt. In hac sanguinis soluta fibrarum coherencia, in qua nimis tenue cogendum, & acre involvendum, doloris artis opus erit hunc morbum solventi ullo sialogogo tentare.

A R T I C U L U S IV.

De Mercuriologia.

Quandoquidem multis retro ab hinc annis ab explorandis mercurii viribus, reluctanti licet animo totus abstinerem; animus tamen nunc meus in illius contemplatione ita rapit ingenium, ut mihi videatur non absque aliqua animi voluptate, & me non injucundo munere versari, si extricatis specierum mercurialium præparationibus mercurialibus, quibus ambigæ communium auctorum notiones nos involvunt, examinandas attentius mercurialium vires intentavero, dum eas simul colligere conor, quarum delectatione non immerito allicimur ad elevandas cogitationes, mentisque aciem acuendam, quibus sublime de tanta mercurii excellentia nostræ utilitati comparata cum Chymicis gloriamur. Totus admirationis nostræ scopus in eo vertitur, ut nobiliores summi illius entis mercurialis usus depingamus, quod quo diutius contemplamur, eo magis ad sui admirationem rapimur. Hanc autem occupationem qui abjectam, minusque utilem putaret, ipso etiam in medicinæ cælo felicitate careret. Licet autem meam sub eadem tenuitate sincero sensu animadvertam, nova tamen in dies phenomenorum, & præparationum materia cognitionem suppeditat, ut nec ullatenus dubitem, quin exactioribus adhuc posteritas experientiis, ignotas nobis tum vires, tum præparationes detestura sit. Non est ergo cur metuemus, ne nostra mercurii cognitio de novo antecedentium aut subsequen- tium defectu expiret, aut deficiat. Infinitus hic oceanus virium, proprietatum varietatem continet, de quibus longedifficilius cognitionem acquisivero, quam easdem percurrens hausero, aut enumeravero.

Ut autem rem ab ovo incipiam, contra Galenum rixas concito, qui lib. 9. simpl. medicam. sibi minus constans, infido, & malefano artis convitio argentum vivum ex sponte nascentibus non esse, sed ex his, quæ præparantur, velut cerussa, ærugo, lithargyrum, contendit, fateturque se nullum huiusce medicamenti fecisse periculum, an interimat si devoretur, vel ubi foras fuerit admotum. Alii porro, Philosophorum, & Alberti Magni lib. 4. min. cap. 70. sententiam secuti, cum viderint argentum vivum quasi omnibus associari metallis, ipsique facilius contactu inhærescere, materiam ad omnem metallorum generationem commenti sunt, quæ in utriculis reposita, nullisque fictilibus vasis coercita, lignea vasa obvia quæque per-

Perrumperet; quo fit, ut Dioscoridem mirari subeat, qui ab hydrargyro vasa cuncta exedi, ac metalla quibus inhæserit destrui autem, lethalem potum esse cum Plinio lib. 33. cap. 6. & 8. falso deprehendit, quod internum cordis humorem, vitales sanguinis spiritus subinde congelans, suo pondere interna tandem diffingat. Galenus vero quamvis testetur alibi nullum fecisse experimentum, contra Dioscoridis sententiam ait, mercurii calorem eo perducere, ut per erosionem interimat. Conciliator ab his recedens in tract. de ven. cap. 6. dicit, quod argentum vivum ore sumptum, inducit hominem ad epilepsiam, aut apoplexiam. At dolendum sane, infugiferis conjecturæ cespitibus, dubioque experimentorum successu rem longe attigisse: quorum cœtus discordes, aut senio confecta mendacia renovare, aut commenta deliranti figmento excolere animus exhorret, quæ in artem investita convitia fidenter convellit Agricola de re metallica: *Nuper autem, inquit, cum improba uxor marito aliquot vicibus argentum vivum dedisset devorandum, id sine ullo nocumento ejecit per alvum, quo mercurius uxore humanior optatum scelus non complevit.* Hinc cecinit Ausonius:

*Toxica zelotypo dedit Uxor mœcha Marito,
Nec satis ad mortem credidit esse datum.
Miscuit Argenti lethalia pondera vivi,
Cogeret ut celerem vis geminata necem.
Dividat hæc si quis, faciunt discreta venenum,
Antidotum sumet, qui sociata bibet.
Ergo inter se se dum noxia pocula certant,
Cessit lethalis noxa salutare.
Protinus ut vacuos alvi petiere recursus,
Lubrica dejectis, qua via nota cibis.
Quam pia cura Deum! prodest crudelior uxor;
Et cum fata volunt, bina venena juvant.*

Samberlitanus in commento ad Avicennam vidit hydrargyrum abortus promovendi causa mulierem ad libram sumpsisse sine noxa; & hoc ipsum confirmatur a Fracastorio in lib. de simp. Brasavolus Medicus Ferrariensis vir sane illa ætate clarissimus, in suo de stirpium examine, sæpius dedisse fatetur argentum vivum devorandum vi vermium semimortuis infantibus, a quo velut e faucibus orci protinus a morbo evadebant. Ita Goritienfes obstetrices, ubi gravide diu in partus labore, & cruciatibus inani conatu urgerentur, statim argentum vivum scrupuli pondere nullis incommodis, immo partus dolorem, & difficultatem lenientes potandum exhibebant, testante Matthiolo lib. 4. in lib. 5. Dioscoridis; ex quo nihil mirum, quod scripserit Avicennas, *non deesse, qui bibant argentum vivum, & nullam inde sentiant noxam, quod facile e corpore exeat, dummodo haurientes continuo huc illuc deambulent.*

De qualitatibus mercurii Fallopius disputans, unam in superficie, alteram in intimis partibus deprehendit, quæ calidæ suapte natura, atque siccæ, habent extrinsecus cum Aristotele partes aeris admixtas, a quibus impedita mercurii concretione in fluidum corpus servatur. Avicennas tamen frigidum, & humidum esse in secundo gradu existimat, cui consentit Averroes, ut refert Pandectarius. Fernelius de abditis rerum causis frigidum, & humidum in quarto gradu, quod confirmat Matthiolo lib. 6. cap. 28. & solvit ambiguitates circa ejus temperamentum exortas, ubi cum Plinio hydrargyrum vomitam ignis æterni, & sanguinem sistere asserente, addit, argentum vivum interimere, si largius bibatur excessu summe frigido, & humido ex quodam seplasiario convictus, qui ardentissima febre correptus, siti intolerabili vexatus, delirio oberrans in pharmacopolium descendit, ut, quod laxaret sitientia, summeque arescentia labra, inveniret, & casu incidens in vas argenti vivi, pro aquæ fortassis vice multum ex eo potavit; sed paucis post horis congelatus migravit ad superos; dein patefactis visceribus in ventriculo innatabat argenti vivi libra, & circa cordis vasa sanguis concreverat.

Ex supra recensitis fati innotescit, antiquiores Græci, qui horrore quodam percussus illum nec extremis digitis tetigere, quam admodum tenuem de hydrargyro habuere notitiam: quorum vestigia calcant mihi ex rudioribus Medicis solo nomine mercurii deteriti, qui quorum virtus turpis est inscitia, & inanis existit suspicio, malunt ægros certo mortis periculo relinquere, quam anceps experiri remedium, despicientes illud Celsi, *tutum esse quod est unicum.* Horum dubitationis stultitiam convellit Junkenii observatio. Mulier quædam utero gerens, puello ubera porrigens curriculo viginti mensium Gallico seminio inficitur. Hæc leviter inuncta mercurio, cum tenello infante, etsi non lenito, salivationem patiebatur, donec mater, & puellus a celtica lue feliciter evasere. Inde post circiter labente mense inculpatæ salutis infantem enixa est. Ex quo, silentio prætereo praxin eorum, qui nec mente, nec digitis mercurii vires adumbrantes, exhorrent, ne mercurius a calore vitali excitatus, quasi a Chymicorum igne commotus in sanguine sublimetur, quo septicus, atque erosivi salis indolem nanciscens veluti a veneni furore ac claude, homo de medio tollatur. At in corpore fluido leni solidorum impetu promotus, qui calor, precor, gliscit urens, ut mercurii partes sublimet instar subtilissimi, ac erosivi cunei acutatus?

Ut modo accedam unde digressus sum, homogenei corpori mercurii explicatio tot hucusque fuit involuta difficultatibus, ut nisi feracior in his resolvendis posterorum industria, quam majorum nostrorum, & nostra fuerit operosa felicitas, illud pensum esse censeo, omnes non tantum unius Philosophi conatus, sed plurium sæculorum tentamina extorquens; cum Chymicorum quoque examina, & sedula Philosophorum solertia propius intimam istius Prothei naturam solertissime investigantium, ad hunc usque diem plus admirationis, quam cognitionis, plus dubitationis, quam certe demonstrationis palam fecerint. Revera naturam, & causas adæquatas mercurii perspicue rimari, atque eruere, gravissimum mihi videtur onus, cui solide absolviendo parem quemcunque hominem fore semper suspensus hæreo. Ut autem hoc in negotio non longerem, & felicius scopum attingam, utque hydrargyri proprietatem, ac virium maxime veritas clarius eluceat, veritatis auspiciis in arenam descendendo, placet spargyricam ingredientium præmittere analysim. At cum curiositatem meam intra Chymicorum experimentorum cancellos non coerceam, ego adhuc juvenis non nisi angustam hætenus eorum supellectilem mihi paravi, quibus absque Ariadnæ filo possim egredi, ut tam gravis, difficilisque pensus rem aperire mihi liceat.

E subtilissimis autem effluviis æthereis, ac fluidissimis conflatur mercurius, quorum volatilibus moleculis, & specificis particulis me-

tallicis saturatus in florem evehitur, dum rotundæ materiæ primi elementi moleculæ in mercurio eminentes irretiri non possunt, in puncto contactus invicem collisæ perenni motu exagitantur. Spiritus hic mercurialis æthereus in subterraneis antris, & debitis feminii matricibus coercitus, in metallicas minutias appellens sui generis, his amico fœdere associatur, quas in minimamenta exsolvendo in fluoris motum concitat, ac fluxiles reddit; adeoque compositus emergit perennis fluor, qui mercurius vulgi nuncupatur, cum in suis etiam repertus mineris, licet metallorum mercurio non destitutus, recremento potius metallico constet, a quo si partes terræ metallicæ, quæ sunt ingenitæ, ac originariæ metalli labes, artificiosa enchyrisi separari possent, quas per artem dissociare omni, sed inani conatu laborant Chymici, sublimior haberetur spiritus ab omni metallorum consortio vindicatus, qui jactaretur ab illis per ignem, Philosophis mercurius de mercurio dictus; quippe qui metallorum mercurius nusquam reperire detur nisi in Alchymistarum vana jactantia, inutili molimine, & falsis promissis, quod eorum quidam eo usque progressi sunt, ut stigma inusserint his omnibus, qui talem mercurium facere posse sibi arrogant, vel credulorum his, qui eundem confiteri posse sibi persuadent. Huic opinioni famulatur alchymistarum coriphæus Geber, ubi inquit: *Continet argentum vivum in se spiritum internum viventem, & convertentem ignem, si de potentia in actum promovebitur.* Huic consentit Helmontius, qui tract. progyna. §. 14. sulphur externum, originariam metalli labem, separare jubet a mercurio vivo, ut fiat mercurius de mercurio, qui deinde nullo igne poterit in formam terræ præcipitari ob maximam sui simplicitatem; cum sulphuris terram amiserit, nulloque igne mutabilis erit. Ita Lullius sulphur inesse hydrargyro opinatur ex eo, quod nullum argentum vivum promptius convertatur in substantiam sulphuris, quam illud, cum sulphuris moleculæ ab origine sunt profundissime dissolutæ, atque per dissolutionem intimius commixtæ: *Nec ullum sulphur promptius congelat argentum vivum, quam illud, in quo sulphuris qualitates per dissolutionem in mercurio cohibentur;* ex quibus concludit, argentum vivum non solum e spiritu volatili, sed etiam e subtili sulphure compingi, ut in corpus summe fluidum coalescat. Hoc metallorum sulphur est internum ipsi mercurio, ideoque non magis ab omni corrosivo, quam ab ignis actione intactum remanet.

Mirum est, quantum se torquent præoccupata Hermeticorum ingenia, omnes ferme in eo desudantes, ut mercurius purissimus æthere saturatus ab impuro carcere educatur, in quo latitans spiritus ille (ut Geber lib. 2. pat. 1. cap. 4. Alchymist. Magister) felicius extrahi possit ad optatum finem; sed ah quantum deplorandum dolendumque! post improbum enim, & inanem laborem dolosæ artis fundamento innixum, credulos decipiendi gratia, & a dolo fruges captandi, tandem scopo aberrant, ad quem collimant, atque orientem in occasu quærentes cum veste Dianam acquirunt. Extera quidem facie mutabilis est mercurius, ut varias induat larvas, & ludat corporum formas, & si eo redigatur, ut nonnihil ab acidis coercitus aliquot horas fortiores ignis torturam patiat: nihilominus vel sponte denuo caput exerit, vel facili negotio in vivam formam per alkaliæ resuscitatur: Qua ratione in terræ poris in liquorem albicantem conversæ ita pertinacissime se invicem adherent, ut licet minutissimi globuli per microscopium adhuc in conspectum veniant, tamen varie revoluti, atque ita intertexti, ut a nullo Chymicorum labore ad hunc usque diem eorum nexus potuerit exolveri, a quibus curiosi Spagyristæ maximo errore falluntur. Jam satis superque innotescit versipellis præparationibus larvari mercurium in habitu ejus externo, dum a diversis mensuris mutatus modo in liquorem cum oleo vetrioli subflavum, modo cum sulphure in volatilem cinnabarim transformatus: quippe qui salinis corporibus sursum raptus, salinum formam, cum regulo antimonii, butyri, oleique substantiam induit; nihilominus addit Fridericus Hoffmannus, tantum abest, ut hæc involucria salina, aut sulphurea, partes sint mercurii constitutivæ ex illius substantia elicite, ut potius composita sint corpora ex mercurio, & menstruo ad ipsum larvandam adhibito, uti exinde ex reductione mercurii in pristinum florem abunde elucet. Ideoque cum altioris sit indaginis intimus mercurii nucleus, non attingitur, quo a mutuo amplexu desciscientes elementares moleculæ in salia, ac sulphura facessant. Igitur licet variis modis tractetur, nullo modo est coercibilis, quin ubi optime fixatus putatur, insalutato hospite fugam molitur. Ita Bartholus summus Astrologus mercurium ad tantam coegit fixitatem, ut nesciret quomodo in convenienti illum includeret vasculo: sed nescio quo moratus, fortissimo addito igne, inopinato mercurium igne rapi conspexit: tanti nempe laboris est genuina ejus fixatio, ut cum vitriolo, & alumine in corpus mediocriter fixum redigi possit.

Borrichius, cum lamella martis in mercurium vivum projecta intra vas coercitum, & brevi post tota in rubiginem conversa reperitur corrosa, acidum metallicum occultum intimius hydrargyro associari fortassis, si conjecturæ præstanda fides, a recto non aberrat. Hoc si in debitis vasculis contentum igni exponatur, miram aquæ insipidæ copiam elargitur, intacto semper manente mercurii pondere, ut Raymundus Lullius docet, Boyles in chymistia septico, & Joannes Agricola in Poppium testantur; sed aqua educta, cum remaneat mercurii pondus, de quo dubitare licet, (si ab aere non subministratur) num sit primorum miscibilium constitutiva, adeo ut nuda ignis actione possibile sit mercurii partes ita secundum novos, differentesque modos disponi, ut modo hanc, modo illam habeant corporis formam, licet ignis impetu commotæ parte in alias substantias omnino diversas coalescere non possint.

Alia metallâ ingredi hydrargyri naturam censet Boyles in tract. de coloribus, ubi solutiones mercurii ab aqua forti peractas, non raro virides, observavit, qui color (ut inquit una Fridericus Hoffmannus de cinnabari nativo) sine dubio dependet a particulis immixtis veneris. Sed accuratius paulo si lubet pensato experimento, suspicio non levis notæ innuitur. Cum spiritus aquæ fortis acidus aggrediatur globulos mercuriales, seque intime ipsis agglomeret, atque interponat (solutio autem nil aliud est, quam intima interpositio particularum solventis intra poros corporum solvendorum) particulæ veneris in spiritu vitrioli in aqua forti eminentes, in mercurii corpuscula nituntur, & reactionem passæ exolveri possunt; unde solutio illa vitrioli veneris cum solutione mercurii commixta fas est dubitare, an solventi menstruo, vel soluto corpori debeat.

Descriptiones, quas nobis de istius corporis ingredientibus tradunt,

dunt, adeo impleta sunt, ut etiam illi qui notiones chymicorum conati sunt polire, atque illustrare, fateri teneantur, nescire se quid velint. Igitur spiritus æthereus subtilissimus, & summe mobilis, cum metallicis particulis primogenis constituit vulgi mercurium, cuius sphæroidei globuli agilitate naturæ suæ propriæ, sive metallicorum corpusculorum ad hoc necessaria figurarum mutatione, & solidæ cohesionis resolutione, in puncto contactus sese tangentes, his intexuntur poris, quibus agitari queant ab æthereâ substantia, utque particulæ admodum minutæ, licet pressæ ordinationi corpusculorum coordinatæ, non quietis expertes, multifariis, & desinenter suis motionibus corpus metallicum in statu fluiditatis servare queant. Nec fluida forma corporis mercurialis levitatem redarguit, cum idem constet particulis in minimo volumine tam solidis, & tam numerosis, ut non obstante intestina eorum motione, corpus, quod componunt, summe ponderosum esse queat.

Licet aurum admittere recuset ullum corpus ad se ullatenus intime, aut permanenter ipsi associandum, ut illud satis firmiter ei agglutinatum possit intrinsece alterare: tamen mercurius vivus ita redditur idoneus ad aurum usque adeo penetrandum, & cum eo sese tam intime permiscendum, ut huiusce metalli particulæ, quæ tam arcte quandoque agglutinantur, ut, inquam, non sine difficultate ab auro divellantur. Mercurius constat particulis ita apte figuratis, ut in auri commissuras ad ejusdem solidarum partium tricas investigandas sese possit insinuare, cuius corpuscula nec majora sunt, quam ut poros, aut corporis auri inania introire possint, nec minuta adeo, ut eadem facile lucis ad instar trajiciant, vel ut ob exilitatem nimiam partes, quas invadunt, solvere nequeant: sed potulorum auri diametrum exacte adæquant. Quæ mercurii corpuscula cum sint agilia, aptaque ad motum, ut impetiti corporis albare queunt partes, ab ipsa atmosphæræ pressione impelli, intrudique possunt in poros auri non impletos substantia, quæ tantum resistens, quantum communis aer, æquali nisu non nititur in urgentem mercurium, gravitate, ac pressura ambientis prævalentem. Cum autem mercurius per accuratas auri commixtiones dividatur in particulas summe tenues, & per externam hanc commixtionem acquirat multo plus superficie, quam prius habuerat, undique fere tangit auri particulas, quæ in sua superficie mercurialem massam exhibere videntur. Agitatione deinde mercurii corpusculum his in auri poris, ac commissuris a libere vagante materia æthereâ promoveri potest auri motus, & incallescencia, ut Boyles experientissimus pluries observavit de producibi: chymi: principi: aut ex repetitis ictibus, variisque innatantium ipsius mercurii corpusculorum pulsibus; hinc intromissæ particulæ tot veluti cunei intro adacti, partes auri, inter quas insinuant sese, emolliunt, aurumque incallescens duritiem amittit.

Virtus anthelmintica summa viget in mercurio, quæ vermes occidit, fugatque lumbricos. Cum implicita venenium substantia sit molli, & distractili vasorum fœdere copulata, tum diversarum pressurionum, tum quassationum, accommodatur ad recipiendos illos humores, qui facile penetrant inanitates spongiosas, & vasorum diverticula, atque glandularum, immo villorum omnium cava, quorum pervia, levisque earundem machinularum textura exsugit non sustinendi ponderis invadentes particulas, quæ minima mercurii segmenta mire solidis vermium partibus irretita, nova majorique motus vi dimota in petrum acquirunt: idcirco dum sese liberant a vinculis pororum, atque vermium anfractibus innumeris ictibus, simul percutiunt singulas villorum machinulas, eas distrahunt, resistentias inertes dissolvunt, ac propterea innumerabilibus percussibus, ac impulsibus depellunt huc, & illuc non solum humores totam vermium fabricam, itemque eorundem nervorum tubulos accolentes, ut debite non respondeant viribus solidorum; verum flexuosis tricis, arque intersecationibus invicem inclinata vascula divellunt, ut eorum fibrillæ non resistant particulis nimis mobilibus, eorumque sphæculis penetrantibus, conficantibus, & pene dixerim erodentibus solidorum substantiam, quæ tametsi aliquantum mercurialis liquidi impulsui resistat; nihilo minus corporis jugiter gravitantis irritationes, & distractiones cujuscunque partis ita sensim intenduntur, ut omnes villorum tiliæ a ponderantibus cum fluidis vermium circummeantibus particulis potius percussæ, quam lustratæ dissiliant ab invicem. Hinc plus justo urgentia liquida, quæ tangunt, plus æquo distrahunt, eaque ita dissolvunt a mutuo fœdere, ut resistentiæ vasculorum, & laxi eorum hiatus fluentibus, ac refluentibus undis exagitati prorsus confringantur, ex quo (ut observavit diligentissimus Rhedi) facile concipimus, cur lumbrici a præsentia mercurii primo moveantur, dein irrequieti sese contorqueant, inde moriantur. Quotiescunque mercurius sui aliqua saltem tenuiori portione fluit, atque humoribus vermium intermiscetur, tunc fluunt, & refluunt a mercurii pressione, & validius urgente liquida plus æquo provocata: fluunt, inquam, & per omne vasorum genus circulum agentibus humoribus, spiritus fieri incipiunt nimis liberi, atque mobiles, adeoque acres, ut illorum minutissimæ particulæ pungentium ad instar, atque acutorum stimulorum penetrent fibras ad partium contactum positas. Ex hoc propterea exoriuntur tot contractiones, & distractiones, quot sunt fluxus, & refluxus undarum emergentium a nimis jactato nervorum succo, immo quot sunt contactus particularum impellentis fluidi, & incisiones, & diffusiones agentium fluidorum in singulos villos, a quibus omnibus si indefinenter mordeantur vasculorum parietes, & tali incutientis stimuli vi, ut in fibrarum poris distensis, & inanitatibus dilatatis congerantur, mobiles, atque elasticæ graves mercurii moleculæ sensim diffundantur, vermes nunc convulsionibus variis, nuntensionibus universi corporis corripuntur. Idcirco cum nulla sit fluidorum molecula, quæ non concitetur, concutiat, jactetur, ac veluti urgentis mercurii pondere prematur, proindeque cogatur summa celeritate moveri, penetrare, & magna concitatione irruere in omnem, etsi minimam, solidorum particulam, ita ut nulla sit fibra, quæ vim non patiat, ideoque inæqualiter contrahatur, laxetur, commuteturque contactum, atque connisum, motus violenti distractionis villorum summopere augentur; adeoque liquidis mercurio interspersis memoratæ partes, quasi maceratæ laxantur, immo maximis stimulorum cuneis concussæ, simulque partibus diversæ, & urgentis figuræ nisu perterebrantur, ut propriam resistentiam amittant; ex quo lacertatis villis, & omnigenis filamentis confossis tota interiorum fabrica invertitur, & prorsus dissolvitur.

Partus difficultas, quæ naturæ leges non servat, mercurio nunquam suffragatur. Ut partus debito procedat termino (ultra in-

finita alia) requiritur, uteri fibræ mutuo flexæ, arctique irretitæ, & per earundem protensiones mire implicitæ, & membranarum villi modice extendantur, ut in conatum expulsum niteantur possint moderate contrahi, & versus inferiora fœtum validius impellere. Si vero liquidorum materies adaucta, & magis pressa ob infartum contractilium villorum velocitatem suam amittat, uteri villi evadent machinæ rigidæ ad instar, non valentis se flectere, qui cum non possint se contrahere, minus æquo agent, & languidius urgebunt; quo fiet, ut in dies magis non solum multiplicata fluidorum aggerie imminuatur fibrarum energia: sed veluti prælo constrictis humoribus uterum quaquaversum gravitantibus, & in ejusdem vasculis hærentibus, pori, locula fibrarum obstruantur magis, ac propterea uteri vasa cuncta majori conatu invicem comprimantur, quam eorundem ferat resistentia; adeo interjecti humoris quiete præpeditur conatus impulsivus, compressivus, ut fibræ non impellant tanta vi, quantam exigit energia fœtus resistentis. Harum ex dictis hæcenus causis, cum vasa uteri lentis humoribus imbibita, proindeque dura, ac tensa impediunt spiritus, ne villosis filamentis impartiantur necessarij conatus: fibræ sua duritie instar funis a lentore liquidorum, & glutine tensæ, cum supra vires proprias inveniant momentum resistentiæ, vim compressivam expulsionis fœtus necessariam nequibunt moliri; ideoque cum mercurius tot partibus, tot machinis urgentibus refertus, totque nunitus retusis cuneis, quot sunt minimæ ejusdem elementares moleculæ, hanc uteri fabricam urgeat, percutiat, & satis dissolvat inutilia, abradat, depellat humores infarcentes, distrahentes fibras, ac proinde vasculorum infartum, energiam, ac actionem villorum destruentem resolvat, singulæ fibræ, & membranæ tegentes fœtum in naturalem contactum, & ad partium cohesionem accedunt; unde opportunum conatum cum elastica vi acquirētes validiori connisu fœtum urgent, & validius impellunt.

Externe sanat scabiem in glandulis cutaneis constanter residentem, quarum contextus rectiformis constituitur ex innumeris filamentis vasculorum cujuscunque generis mira arte invicem implicatis, per quorum vacuas ambages paralleli emergunt ductus excretorii, qui a Stenone observari ex glandulis subjacentibus oriuntur. Hinc papillæ quædam pyramidales a nervis prodeunt a celeberrimo Malpighio inventore detectæ, quæ a partibus lymphaticis ex ductibus illis exsudentibus perpetim irrigantur. Cum enim serosus ille latex a sanguine elicitus salibus acido-salis turgat, ejusdem particulæ viscidiores non tantum utrinque acuatis, sed etiam tenuioribus salium mucronibus inmixtæ, glandularum lacunas, & cutis poros, per quos fluere debent, & insensibiliter erumpere, leviter opplent. Fibræ autem nervæ in glandulis cutis disperis a salinis particulis subtiliori aere exagitatis commotæ, ac vellicatæ, molesti pruritus sensationes inducunt, a quibus nervorum, & villorum irritationibus, crassiores lymphæ partes, licet agitatæ, cum difficulter sejungantur ab invicem, parvas in cuticula pustulas excitant, quæ a sero indefinenter ad glandulas confluentem in acumen elevatæ, inde a multis salium aciebus, quorum motui non valde resistunt, perterebratæ, acido-sallos succos confertim effundunt.

In curatione hujus pruriginosi affectus, & hujus cutaneæ sordis, eo innititur, ut acida acrimonia temperetur, & glutinosa lymphæ incidatur, in quem finem mercurius extollitur, sine quo difficillime absolvitur curatio. Hic enim nullas patiens inducias, nullaque resistentia coercitus, ad quamcunque corporis glandulosi partem sibi viam parat, & gravitatis viribus impedimenta dejicit, nunc jactat singula, quæ lustrat, & percussiones singulis partibus incutit; nunc citius penetrat filamenta, cunctosque villos, in quos irruit, arctamque feri cohesionem, & salium mixtionem intervertit, quin immo in solidorum machinulas adeo momentum tremuli motus imprimit, ut ex illarum perenni oscillationum vi, rursus atterantur, atque agitentur, tam cutis glandularum inertes succi, quam illi qui per arterias, & venas fluunt, qui quidem ita jactantur, invicem confunduntur, atque alliduntur, ut post certum tempus reddantur tenuissimi, ideoque comminutæ feri, inde demum attritæ salium particulæ, quorum minima segmenta dividuntur, jam divisæ abeunt in auras.

Verum si scabiæ affectus in glandularum papillis, & cavitatibus vermiculus insideat, modo huc, modo illuc fortuito tirillans, ut apprime docet exactissimo microscopio armatus oculatissimus Redi, tu, qui hæc meditaris, revoca in mentem, quæ superius attulimus de vermibus.

Observat Daniel Bartholi Societ. Jesu de glacie, in hydrargyrum demersa, aquæ in glaciem concretæ ramenta protinus aquæ fluorem suscipere. Quoniam liquidorum fluiditas in corpusculis divisibilibus maxime consistens, quæ partibus suarum superficierum, dum se invicem tangunt, separatim hinc inde agitata facile inter continuas eorum partes, & numerosa interstitia juxta suas invicem superficies volvuntur, usque adeo fluoris motum conservat, donec irrequieto motu agitata in resistens corpus incurrens debitum impetus momentum deperdat. Ita Renat. de Cart, Boyles, & Alphonsus Borellus cum quibus Gallilæus nel trattato de Galleggianti. Fit igitur, ut aquæ moleculæ in quiete constitutæ, spiritui æthereo mercurii, & subtilissimo, laxato glaciei vinculo intus commotæ, & hydrargyri gravitatis impetu in corpuscula satis exilia divisæ ad eam levitatem, & volubilitatem redigantur, ut libere sese quaquaversum ferentes in fluidum corpus reducantur.

Non longe diversa ratione Isaac Newtonus sancivit, illud esse fluidum, cujus particulæ quæcunque vi commotæ, parvoque moli-mine impulsæ moventur, ac facile inter se concutiantur, licet fluidum immobile nulloque intus turbinari motu oculis subeat. Fluida quorum partes debilioribus viribus eas dissociare conantibus non resistunt, inter se colica in particulas infinite parvas resolvi queunt. Ex tenuissimo ergo partium contextu fluidorum oritur illa minima resistentia, quam moleculæ in fluidis leviter commotæ diffingunt, & superant. Et licet ad fluidorum constitutionem parvæ, ac exiles requirantur particulæ, non videtur absolute verum, corpus illud esse fluidum, quod ex minimis moleculis coalescit; quippe componentium corpusculorum parvitas ea poterit cohesionem firmari, ut eorum rano-sitate, curvitate, asperitate, particulæ, licet sub parvo volumine implicitæ, adeo sibi mutuo irretiantur, ut sese extricare difficillime queant; unde a levissimo pulsu corporis impingentis non propulsæ solidum corpus vel tenacius fluidum constituent.

Delibata mercurii proprietate, & minus tutis usibus perpensis, operæ pretium nunc est investigare, quibus elementaribus principiis, salinis

nis nē, aut sulphureis, in quibus impressa est, lues exterminetur. Acida salia auræ celticæ, chymici intra poros mercurii (cum sit alkali volatile) implicari contendunt nonnulli, quæ a colore, & fluidorum motu ad superiora propulsa sublimantur, ubi viarum irritatione apertis salivæ ductibus pituitosa materies jugiter erumpit. Sed gratis omnino in mercurio alkali dicitur inexistere; neque enim huic corpori, cui quodam quasi experientia testimonio inesse creditur aliter probatur existere, quam ex hypothesi, quod alkaliorum effectus ab assumptis Chymicorum principiis oriatur. Nec assertiones tam late patentes, tantique momenti admittendæ sunt, nisi validis firmatæ rationibus. Immo dum aliam in medium proferre hypothesim aggredior, meum esse censeo rationes adducere, quæ dubitanti causam vindicant, & prolatis assensum prohibent, ne gratis confutationem exornem, multoque minus confidenter nimis sententias convellere infimuler. Hoc vero absque convitio, dum id mihi arrego, illam mihi indulgendam iri veniam, quam quisque sibi philosophanti deberi pensitat, confido. Cum alkalinum subjectum ex frangibilibus, rigidisque spiculis coalescens, annuentibus ipsis, coerceatur ab angulosis acidorum ramentis, particulas mercuriales involventibus, eorumque motus retundentibus, acida salia venereæ luis supra mercurii corpus vires exercendo glutinosi liquidi cohesionem augeant; nam particulæ alkali sinuosus angulis intexuntur, adeoque particula acidi impingens in moleculam alkali locum invenit, a quo in earundem sinum recepta alkaliorum vires diffringit. Si vero in gyrum rotata alkalica mercurialium corpuscula acidorum aculeis coherescerent, eorundem angulorum acumina juxta variam alkaliorum porositate, & molem, additorumque corpusculorum allisionem in se invicem coeuntium, in tam obtrusa latera sese mutuo molarent, angulosque adeo retusos, ut post variam utrinque luctam, mutuolque amplexus iterum eo unirentur modo, ut eorum cunei certa rursus copalescentia sibi invicem conflati, parvula possint exhibere prismata, quæ particulis pungentibus, & salinis sensim expedita, liquidum, cui innatant, omnino inspidum, & ab acore erodente discrepantem suppedirent. Ita Boyles de mechanica saporum observat; quod si liquori fixi nitri per deliquium facti, caute spiritus nitri guttatim affundatur, donec omnino alkali saturetur, paucis momentis post levem evaporationem crystalli obtinentur, non actis, nec alkalizati saporis. Ex mutua horum corporum reactione, & passione, alkalizata, acidæque particulæ in fluida coeunt, & post validam corpusculorum allisionem sibi invicem conjunctæ, prisma ejus figuræ exhibent, cujus extrema nimis utpote obtusa, inurere non possunt; ex quo corpus medium resultat. Ita alkaliorum mercurii cum acidis unio, solidorum erosioni non occurrens, at fluidorum consistentiam, crassitiemque promovens, remoto impetu, & in agendo seclusa gravitate, stimulo carebit tenaciores acidorum concretiones solvente.

Sed inquiunt, alkalia sunt corpora poros habentia proportionatos ingressui angulosarum particularum in liquido natantium; igitur si vis illa, qua liquidi partes mutuo sese urgent, & æquali undequaque nisu manent librata, inveniant locum minus resistentem in alkali poris, utpote aere subtilissimo repletis, in eosdem fluidum impellet, adeoque acida cuspis in spatia inania alkaliorum impingens, in his recondetur, & ab eorum præsentia liberatum fluidum pristinam crasim recuperabit. Verum quidem est ab irretitis salibus inter alkalia corpuscula fluidum edulcorari, at acidi salis particulæ cum alkalibus combinata, & veluti carcere detentæ in poris alkalium majorem ex unione nactæ ponderosam molem, cum fluidis circumvehi non possent, quæque pondere majori a liquidorum commercio seclusæ diarrhæam potius, quam ptyalismum promoverent. Cum igitur ratio acidi & alkali consistat in proportionem pororum vacuum ad spicula acidorum, sane nulla apparet necessitas, quod mercurius sit certi schematis, & magnitudinis, ut configuratas acidorum particulas absorbeat: immo ita in minima dividitur, ut a nonnullorum angulorum terebra, & cuneis possit permeari: adeoque non mirandum, si particulas in majorem molem fastigiatas, & turbintas, nec suis poris commensuratas, ex ipsius parvitate molis excludat. Attamen non imus inficias, quod plus, quam minimas non præferat interspersas porositates, & particularum tales ad invicem contactus, qui a gliscitibus inter partes, & partes fluidi erodentis globulis non possint repleri, prout variæ ad invicem aut cum aliis salinarum particularum superficieculæ coherent. Partium enim mercurialium nexus tam æctus existit, vel ea est compages, ut aut si non desint pori subtilissimis angulis permeabiles, ea tamen est parvitas mercurii, ut a glutinosis particulis nullo modo penetrari possit; cum ex una parte non existat in his gravitatis momentum, quod valeat partes viscidas ab invicem dissociare, & in minimos cuneos dividere, ut poros mercurii penetrare possint. Ab hoc solo virium defectu excluduntur ab ejus poris salinæ viscido involutæ particulæ, licet pressæ a totius fluidi superincumbentis altitudine. Ex altera parte particulæ salis ex tenuitate molis, vel crassitie possunt adeo parvi motus fieri, ut vicareant superandi mercurii resistentias, quas opponit motui illa qualiscunque sit adhæsiō, quam habent in intrinseco mercurii globuli ad invicem, tanto majorem in resistendo effectum producturi, quanto minores erunt corporis mercurialis superficies; ex quo mercurius non potest penetraria viscidis particulis, quia poris caret glutinosum admittentibus. Minimi pori mercurii penetrationi per aqueo-viscidas moleculas faciendæ resistendo, instantibus salibus, & urgentibus spiculis aditum non permittunt, quæ tunc eo tantam non habent, quantam exigent ad eos pervadendos tenuitatem, & impetum. Si verum est, particulas mercurii unius figuræ esse, sicut persuadere videntur summa ejus simplicitas, & incapacitas corruptionis; si verum est, eas esse sphericas, vel aliqua ex figuris ad sphericam accedentibus circumscribi, quemadmodum ostendere videntur plures ejus proprietates, non posset esse in mercurio inanium spatiorum diversitas; nec ea ad quamlibet figuram congruentia, quam expostulant plures Chymici. At pororum in mercurio quæcunque sit existentia, & quæcunque eorum amplitudo, an sine gravitatis momento partes salium concretorum, quæ in sanguine existunt, ab invicem separari, & scindi poterunt? hæc non nisi conjecturæ sunt rem adumbrantes magis quam probabiliori ratione applicantes; immo Philosophorum iugenia earum facilitate allecta ab ulteriori licet utiliori distrahantur examine.

Quocirca ad tollendam aciditatem a corpore aliquo fluido præferendum opus est, ut a particulis acidum sustinentibus fundamenta aciditatis detrahantur, vel illæ a corpore ablegentur. Cum igitur fun-

damenta aciditatis in acutie angulorum consistant, requiritur, ut acuti anguli emolliantur, ut in rectos vel obtusos faciant, aut omnino tollantur in curvam superficiem murati. Angulorum autem ex acutis in obtusos transitus fit per rupturam acutorum cuspidum a validiorum agentium nisu diffringendarum; argumento admodum probabili, multam in mercurio requiri gravitatem, & imperum, qui salium evektorum spicula coherentibus moleculis implicata possit infringere. Nec reponant posse retundi acutos acidorum salium angulos unione aliorum corpusculorum. Duo enim anguli acuti verticem communem habentes, & secundum latera sibi invicem coherentes rectum, vel obtusum angulum fere semper constituunt. Sic involvuntur acutæ cuspidēs lentis, mucosæ, & pinguibus substantiis, ac veluti intra vaginam anguli acumen conditur. Hoc artificio salium spicula in sapone mitigantur; sed si hoc fiat, est tantum acidum edulcorare, non in minima resolvere, non destruere, non partes conglutinatas discindere; adeoque si in particulas salinas coherentibus nuptas non impingat aliquid, quo non sit ei specificæ gravius, magis mobile, & in minima divisibile, nulla spes erit, ut possit una ab altera separari.

Nec magis aridet eorum ratio, qui explicantes actionem mercurii per vasa ad fluida difficulter mobilia impellenda trajecti & salivam vehementer moventis, venas præcipue lymphæ ferendæ dicatas torpore quodam infestari ex quadam vi hydrargyri stupefactiva non dubitarunt. At si propter teneritudinem lymphæ ductum ab hydrargyri inunctione stupore facile affectum, ob intensum hydrargyri frigus, amisso tono, & fibrarum vigore, debita lymphæ separatio redditusque in venas impeditus intra sanguinea vasa cohibetur, qua arteriosa canalia supra modum distensa ad salivæ emissaria depleri cogantur: quæritur qui fiat ab exinanitis lymphaticis topus discindi, osiumque cariem emendari. In lymphæ morboso liquido totus fortasse latet fomes; sed si quoque lateret, qua ratione hydrargyrus in mercurium dulcem confectus per minima sanguini unitus, & impetuoso motu per vasa raptus vim suam indolemque denuo exercendo lymphæ ductibus torporem conciliabit.

Sane ut rem acu attingam, ne me assumptis pluribus, minusque notis conjecturis, & præpostero hypotheson conatu philosophari videar, quisquis rem attentius contemplatus fuerit, corpuscula mercurii constituenta irrequieto motu exagitata a fluidorum pressione, & circuitu diffari posse per orbem, facile per sanguinem in minima dispergi adverter, quæ mercuriales in statu fluoris particulæ non facile eveherentur per vasa, si earundem componentium unio intricata, adhæsiōque tenacior esset: hæc enim mutua suimet invicem implicatio, alterius ab altera separationem prohiberet, ipsaque molecularum conjunctio easdem ponderosiores efficeret, quam ut simul fusque deque attolli, & vertiginoso liquidorum motu rapi possent. Liquidum mercuriale cum sit in minutissimas divisum particulas, facile cum altero fluido, vel solido, quoad omnes partes in illius poros se insinuando, in alterius penetrando, misceri poterit: & postquam est mixtum, mercurii moleculæ cum sint a continuo gravitationis motu concussæ, alterius liquidi solidioris obvia corpuscula non difficulter discindere valent. Hinc ab invicem commixta & minima minimis conjuncta, necesse est, ut corpora agentia possint agere in particulis patientis, non quiescant, sed sint intestino motu agitata, aut in rapidissimo cursu constituta instar cuneolorum, quotiescunque in alterius corporis particulas illis congruentes, vel ad recipiendum gluten, caveas habentes, impingunt, hasque easdem divellunt impedimentis semotis, & fortissimis quibusque obstaculis dirutis; idcirco tamen in sua maxima divisibilitate eorundem gravitas nihil evanescit, interrumpiturque: sed quodvis corpusculum infinite divisum, licet mole minus cæterarum fluidorum particularum, gravitate majus, a solidotum nisu cum sanguinis circuitu promovetur, quod ubique celeritate sanguinis majore instructum, a dato cordis impulsu plus momenti suscipiens, majorem impetum in resistentiarum accursus exercere valet: Unde quantumcunque parvus sit impetus sanguinis fluentis cum semper resistentia minor sit momento impellentis mercurialis liquidi undecunque nitentis, agitur intra omnes villorum plures nihil resistens influxui tentantis fluidi, cujus vis tumoribus, & fluidorum lentoribus occurrens innata gravitatis impetu, & in stagnantia liquida ad membranarum contactum posita sese agere nitens, quasi cuneus coherentes particulas dimovebit, quæ a subtilissimis mercurii ad nullam formam determinatis corpusculis, hinc inde intus commotæ, & jugi eorundem circuitu in motum concitæ, inciduntur, attenuanturque, & qua data potentiori porta ruunt, quæ sæpe per vehiculum salivæ evectæ in eorundem ductus ejiciuntur. Hinc resoluta, & subacta fluidorum lentore, spiculis salium retusis, vasa, polique obstipati a tartarea feculentia stagnantibus sordibus liberantur, atque expediuntur, adeoque flores omnes totius corporis in ordinem, ac motum rediguntur, & sic pene omnibus morbis, cum a visciditate humorum, & obstructione ductuum ortum ducunt, mercurialia medentur.

Tophi, & gummata non nisi remediis maximo impetu instructis evelli possunt, quorum validi momenti particulæ sanguini intrusæ, diu in osium excrecentias impellentes vires suas imprimendo peritus redditusque corporis impingentis, penetrantisque gravitationem, obvia quæque discindere, ac renitentes tumores resolvere valent; quæ combinatorum partium resolutio neutiquam in nobis contingeret, si appellatione corpuscula supra data obstacula, & resistentiarum aggregata excurrentia, terebræ, & cunei vires in occurrentes lentores non exercerent; quo fit, ut mercurii gravitas cæterorum mineralium major, non solum ubique celeritati sanguinis æqualis, sed validius momentum suscipiens, impetumque majorem exerens ad loca maximæ resistentiæ, ubi fluidorum motus quasi evanescit, partium cohesiones tollat, & immotas tophorum particulas dimoveat, quæ a repetito promoventis impulsu commotæ sensim abraduntur, & intimius eliquatæ novæ sanguinis circulationi committuntur. Igitur quoties salina spicula intra fibrarum contextus incuneata, vascula, & fibratum tilias depascuntur, hæc corrosiva salia hebetantur duntaxat a maxime penetranti mercurii energia, quæ cum in omnes ægri partes sese insinuet, acido salinas moleculas occurrendo cicurat; quo interea vis partium elastica vigorem acquirens ad evektorum salium enormitatem una cum mercurii expulsiōne insurgit, ac sit plurimum per putentissimum ptyalismum ad oris emunctoria celticum venenum demandat, qua expurgatione completa lacescita quiescit natura, & vires labefactatas resumit.

ARTICULUS V.

De morbis per salivationem mercurialem curabilibus.

SI quis unquam est morbus, qui facili Marte a mercuriali salivatione discutiatur, est venereum contagium, quod crudeliter in corpus humanum debacchari cepit anno 1494. nimirum dum Carolus octavus Galliarum Rex cum Alphonso Rege bellum gerebat, ingenti militum phalange, strictissima Neapolin obsidione tenuit; Neapolitani magis fame, quam bello enormiter vexati, imbellem ac mollem foeminarum turbam ab urbe egerere. Galli milites, quos non pudebat cum turpissimis foeminis coire, Hispanorum versutias ignorantes, earum pulchritudine, ac blanditiis allesti nativum libidinis castrum in foeminas fornicando sociavere: Inde totis amoribus nequam vitiatus exercitus, insuetoque delusus dolo ultro horribilibus se cepit pandere morbis. Hinc eruditè Fracastorius:

*Qui casus rerum vixit, quæ semina morbum
Insuetum, nec longa ulli per secula visum
Attulerint: nostra, qui tempestate per omnem
Europam, partemque Asiae, Libiaque per Urbes
Savit; Latium vero per tristia bella
Gallorum irruit, novienque a Gente recepit.*

At incertum est, cum incipit inter homines grassari, si prius obsidentes Galli hanc lue[m] experirentur, antequam obsessi Neapolitani contraxerint; Neapolitani Gallos, Galli Neapolitanos inculcant, & Hispani utroque Neapolitanos, & Gallos vicissim exprobrant, & unaquæque eorum natio reliquis hoc facinus vitio vertit. Sed fortasse melius se pandit ipse morbus.

*India me genuit, peperit me Gallia Mater,
Me alit Parthenopes, dic mihi quæ Patria?*

Hæc venerea lues licet in veterum auctorum monumentis, & observationibus non se pandat; tamen cum ab Avicenna, & Galeo V. de comp. medicam. VI. de simpl. nu. XI. de simpl. facul. VI. de locis affectis cap. VI. describantur tumores, ulcera, ac pustularum species, quæ luis venereæ affectionibus adæquate respondent, credidere nonnulli, hanc veneream lue[m], dum Galli Neapolim obsidebant, antiquis morbis fermentale tantum addidisse virus: hinc in Celso, sycofin, mariscas hominem olim fœdassee legimus. Fit vero ait utrunque in his partibus, quæ pilis conteguntur; & apud Martialem lib. VII. Epigrammatum:

*Ficosa est uxor: ficosus & ipse maritus:
Filia ficosæ est, & gener, atque socer.
Nec dispensator, nec villicus ulcere turpi:
Nec rigidus fossor: sed nec arator eget.
Cum sint ficosi pariter juvenesque, senesque,
Res mira est: ficos non habet unus ager,
& Juvenalis satyr. lib. 2.
Quis enim non vicus abundat
Tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis
Inter Socraticas notissima fossa cinædas.
Hispidæ membra quidem, & duræ per brachia setæ
Promittunt ferocem animum, sed podice leves,
Ceduntur tumida medico ridente mariscæ.*

adeoque antiqui torquebantur quidem ulceribus, pustulis, lepra, scabie, tumoribus, at veterum monumenta homines in scortis avidè luxuriantes hac lue fœdatos topiorumque cruciatu perpeffos fuisse non pandunt.

Ex prægresso igitur concubitu cum muliere venereo semineo conspurcata, malignum virus, & halitus contagiosi a pollutis, & turpibus obscenis prodeuntes, in uretræ virilis poros se insinuant, inde penetrata uretræ epidermide ad prostaticarum glandulas diffunduntur, ibique excitata inflammatione, succi intus contenti acrimonia, acida, salino corrosiva commoti, acidis, & cuspidatis eorum particulis vehementius fibras pungunt, distendunt, & lancinant, quæ inde a nutrimento in sanie[m] converso magis exulcerantur. Unde in laceratis villis ulcus succrebit, a cuius ulceris impuritate saniosus fluxus, & acre liquamen jugiter effluit, quod fœtida crassitie in subtilissima epidermidis membrana feriendo salinis spiculis, ejusdem fibrillas divellit, atque exulcerat. Non solum a glandulis prostaticarum exulceratis, ut uretræ exilis poris extillat putida illa sanies, sed cadaverum sectione retulit, reperta esse ulcera in orificio vesicæ, & vicinis partibus cum flueret gonorrhœa, Ballonius Epid. l. 2. pag. 16.

Hoc acidum acre dilatatis poris, & apertis vasculis a sanguine absorbetur, & mediante circulatione per minimas arteriolas ad glandulas inguinis devehitur, vel in lymphatica inguinis glandulosa irripit, in quibus acriori parte stimulante, & viscidiori moram trahente, per vim stimuli augetur liquidorum cursus ad partem, novoque indefinenter confluyente humore, infarcitur corpus glandulosæ tunicæ, ex quo in dies excrecente dolore morbosa liquida ad inguina augente magis, malignus extuberat tumor, qui artis auxilio facile ad supurationem disponitur, & ferro discinditur, vel caustico aperitur. Ab hoc venereo veneno infectæ sanguinis particulæ glandularum cavitatem accolentes, a naturali statu sensim desciscunt: hinc in fluorem evectæ impetuosus motu rapiuntur, quæ tamen dum se quaquaversum explicare nituntur, crassiores particulas glutine implicatas offendunt, a quibus mutuis visibus invicem obvolvuntur: interim acrium salium, & subtiliorum visus a terræ moleculis, & crassioris sulphuris plurimum remittitur, donec sordes, ac virulentæ sanies, vel suppressæ, vel non extinctæ, sero per partes illas circulanti sanguini communicentur, & clam in sanguinem serpent; ejusque salinæ moleculæ a fermento venereo exaltatæ, & in fluorem evectæ, cum viscosis combinantur, quæ in periosia, & pericrania impingentes, in eorundem porulis impliciter detinentur: Harum salina spicula intra fibrarum fasciculos induneata, cum nec a solidorum visus, nec a calore possint insensibiliter resolvi, sensiles membranas lacerant, continentia vascula distrahunt, eorundemque villos ita convellunt, ut dolores in cranio, & ossium membranis sævissimè passim sentiantur, qui ad vesperam excruciant, & magis ingravescent, dum a densiori aere repressæ, & lecti calore agitatz, ac mota particulæ viscido-acriores, nervorum machinulas, & membranas perperam lancinant. Hæ effert salium acrium, acidoque salinæ moleculæ in latice sanguinis hospites, in laxam, & spongiosam tonsillarum substantiam delatæ, ibique exaltatæ, earundem fibrarum plexus exedunt; adeoque

hujus indolis inquinati succi glandulas oris, palati, labiorum, & gingivarum, ultro citroque villos committentes, hic solidorum machinulas jactant, illic ita concutunt, ut permutatis liquidorum viribus, figura, atque mixtione, una villi, & fibræ membranarum, vasorumque convellantur, & distrahantur; adeoque a proprio termino recedentes, inficiuntur ab illis angulosis salium particulis, quæ interjiciuntur ad instar cuneolorum inter machinulas jam fluidas, & pene solutas; quæ licet in variis implicationibus, & reticulari contextu non permittant discludi ex toto, nec humores ex toto præterfluere patiantur: tamen a fluxu, & refluxu humorum erodentium in dies magis laxantur, & inquinantur, a quibus proinde depravatæ indolis succis, quasi ab insinuatione totidem cuneorum tenuissimæ substantiæ sese quaquaversum volventium, atque fibrarum contexturam exsolventium, lacerantur vasculorum villi, adeo ut ad instar stillicidii ubertim fluat, & erumpat saniosus liquor, qui sua partium scabritie, ac inæqualitate membranosa, & glandulosa locula magis exurere, & dilaniare poterit, ut in earundem epidermide, vel in membranis gliscentia liquida, motus inertia distensis vasculis, eorum putrefactione, & salium aculeis laceratis, terebratisque villis, depascantur glandularum fibras, easdemque partes ulceribus fœdent. Si inter ossa, & periosii poros hamosæ particulæ, & rigidiores compactæ artius cohærescant, & membranarum fibrillæ enormiter distentæ sensim intumescunt, & instar spongiarum inflantur. Unde viscidus liquor salis rigidis, acidoque acribus maritatus in has partes firmius successive impingens simul in coactionem compingitur, & præ crassitie per poros excerni, nec minuta venarum oscula cum sanguine reliquo subingredi potens, hæreat oportet in illis angustiis, ibique interceptis acidis, acribusque particulis invicem implicantibus, in tophos atque nodos coalescit, qui inde acidis, atque corrosivis scatentes liquaminibus in ossium cariem degenerant. Dum corrosiva spicula in tendinosas ossium fibrillas se insinuant, ossis ad intima penetrando, ejusdem canaliculorum seriem & ordinem diffringunt, a quibus sensim alterata ossium structura, & succis eorundem alibilibus coinquinatis, in ossibus caries suboritur.

Confirmata lue pustulæ, & earum pustularum cognatæ cutis affectiones phytènes, impetigines erumpunt, modo orbiculares, vel acuminatæ, modo pruriginosæ, squamosæ, nil ichoris effundentes, faciem, vel manus, crura, vel pedes, & nonnunquam universum corporis habitum obsidens. Viscidæ enim, ac terreo-salinæ, acres, austetæ particulæ ad nostri corporis partes appellentes, glandulas nimirum, a quibus deberent revehi per lymphaticam in sanguinem, fibras tubulorum cutis, per quos fluere debent, fermento gallico afficiunt, & glandularum partium meandris constanter infixæ aculeis suis magis vel minus rigidis, acutisve fibrillas cuticulæ, ejusque tubulos discindendo, & erodendo pruriginosa labe, & ulcerosa commaculant; ut inde obortæ pustulæ in glandulosis cutis rubulis, adeoque solidorum erosiones pro majori vel minori acredinum gradu, pro multitudine diversarum glandularum, & vasculorum exesorum sanie, dolore, & crustosis squammis inter se solum differant. Hujus fœcundæ messis semel tacta seminio venereo efflorescens, suisque successivis germinationum periodis renascens, nunc scissuris volas manuum affligit, nunc rimis mammarum papillas occupat, quæ modo saniosis scatens humoribus spongiosam carnis substantiam depascendo serpit, modo in fœda ulcera excavatur, quæ cutem profunde penetrando, labiisque callosis, & prætumidis, sanguinem sanie confusum si contrectentur, effundunt.

Quando particulæ acido salinæ angulatis corpusculis a lymphæ copia dilutæ, & assiduis solidorum oscillis comminutæ, cutaneas glandulas leviter obstruunt, ad corporis superficiem spumescences cuticulam levi pruritu exasperant, erumpentibus interea bullis tere inconspicuis. Salia paucò sero diluta, cum a lymphæ debito viscosiori, fugatis in aera aquis, eorum vis infringatur, & illorum acumina obrundantur, squamosam, seu crustosam cutis elevationem inferunt. Sub crustis squamosis effusa lymphæ, cutis, & cuticulæ fibras, in quas impingunt, punctione particularum acutarum, & effusi seri acredine gravius pungit, ac lancinat, ustionisque sensum, ac pruriginis inducit. Cum autem ab aliis jugiter de novo confluentibus salinis particulis compellatur humor, cuticulæ porulis salina ramenta infigit, a quorum angulis minutim secata cutis fibrillæ in fursura abeunt, & veluti squammæ in superficiem exteriori exsiccatæ a cute dissiliunt: Hinc ægri pruriginoso sensu affecti indefinenter cutem scalpentes saniosum ichorem effundunt, qui erodentibus particulis effœtus per vicinam, sanamque partem proserpit, donec ulcusculis cum foraminibus profundis universum corpus obsidentibus in putrescentem morbum terminentur.

Verum quia venerea lues per se nullum morbi genus constituere videtur, qui cuicunque morborum speciei adeo insolubili nexu confunditur, atque permiscetur, ut pressus eorum naturam æmulari videatur, cum aliorum mille larvetur formis morborum, ne miremini si olim celtica labe inquinati in morbos inciditis, quorum radix non intellecta medentium opem eludit, atque deplorabili ærumna vos turpiter extorquet.

Mercurialis salivatio non coercetur in solo celtico, sed mercurii virtus tam efficax in consummatis, & obstinatis morbis sanandis comperita est, ut Medicos illo, tanquam modo curandi perverfo, uti recusantes, in malorum omnium pertinacia ex acri glutinoso suborta vulgaribus reluctante remediis hætenus non adhibuisse, cum Boyle valde admirer; In his enim ejusdem virtutes æque, ac in morbis a contagio venereo susceptis, efficaces esse non me effugit, quin efficaciores quam aliorum remediorum esse arbitror, ut plurimorum experientis pulchre arridet.

Dum autem de operationibus mercurii ad alienos morbos innitatos relatis loqui decerno, historiam minime vulgarem a Boyle recensitam non possum non referre. Vir quidam, ait, adhuc superstes, Præfectura Legionis Helveticæ in Gallia celeberrimus, aliquot annis castra in Belgio secutus, morbum quandam oculorum passus est, Medicorum juxta, ac Chirurgorum opem omnium recusantem, qui paucorum mensium spatio sensim elabente visione, utriusque oculi jacturam fecit, donec accersitus Empiricus, cui se curæ tormentis subjecit, ipsi ab utroque narium ad grani pondus atrahendum quandam pulverem mercurialem exhibuerit, a quo statim vomitu, sudore, urina, saliva, & lacrymis per duodecim horarum spatio exagitatus adeo commotus fuit, ut caput ejus plurimum intumuerit: tertio tamen, vel quarto labente die, gradatim visum recuperare incipiens, post quadraginta dies, acutiore visu quam omni vitæ antea scie decursu gavissus est.

In colica diuturna, ac pertinaci, cum remedia quævis nil juvant, mercurialia sialagoga exhibeantur, quæ cum maximo ægrotantis levamine observavit Willis materiam morbosam in plexibus nerveis uberius aggestam, salivationem movendo hinc illuc varie dispellere, & tandem prorsus dissipare. Licet sanguinis particulæ per jugem ejus motum, & agitationem atterantur, subtilizentur, ac lævigentur, sensimque ita disponantur, ut per poros cerebri transferri, & per nervorum filamenta urgeri queant: Existimo inrerim ab impetu sanguinis fortius a tergo urgente posse abradi particulas diversæ molis, quæ per nervorum canaliculos deciduæ in mesenterii, aliisque abdominis plexibus inter se variis modis uniantur; nimirum quod suis ramositatibus invicem intricentur, vel quod cuspis unius intret poros alterius, denique quod earum superficies læves, & æquales ita arte conjungantur, ut nihil sit intermedium, adeoque hæ non admodum subtiles, nec facile dissipabiles, cum per lymphæ ductus non diffidentur, sensim stagnent oportet, & coacerventur in partibus illis per villorum poros expirare nesciæ, quæ in nervorum tubulis penitus compactæ, ac fibrarum oscillis compressæ, cum semper in motum expansivum nitantur, licet minori impetu, subsistendo intra eorundem canaliculos, eisdemque proinde extrorsum urgendo, fibras, nervorumque propagines inflant, ac distendunt, quarum distensione divulsis villis intestinorum, & eorundem laceffita conpage violentam, suscipiente vibrationem, oritur colica affectio, cujus violentus impetus in distensione fibrarum residens, laxari non posse videtur, donec congesta materies a nervorum filamentis penitus discussa, aut subacta non fuerit; quæ si ab aliis medicamentis dimoveri non possit, a particulis mercurialibus sese quaquaversum nitentibus in minimas dividitur moleculas, & huc, illuc varie in motum acta dissolvitur.

Hic exoriri posset suspicio, cur a Medicis non sine ratione mercurius credatur generis nervosi inimicus, aliarumque in nervis cerebri perturbationum concitator, & fortassis sciolus quispiam negabit in paralyfi detentis hisce remediis esse utendum. Speciosa hæc quidem dubitatio prima fronte videtur; sed tamen vanam esse reperio, ubi contraria hæsitatiōi experientia ad accuratiorem sui inquisitionem me invitat. Plures morbo Herculeo, & vertigine diuturna correptos salivatione per mercurium excitata in ind. med. pract. lib. 19. sanatos refert Bonetti, & quosdam paralyticos ab ipsa sanari Willisiano experientia effato edocemur. Attamen hoc remedii genus nolim, ut furiosa violentia extimescendum, cuiquam commendes, nisi sedulo Chymicorum simul artificio elaboratum, ac Medicorum consilio exhibitum, donec exactiorem sui præparationem, & usum nanciscatur. Hoc vero securius confecto in epileptico morbo inconsulto quispiam temere ne utatur, ut prius perspecta causa fitmo rationis talo hoc opus animose cōflagrēt.

Cum epilepsia sit totius corporis concussio, qua statim & ipsi nervi convelluntur, causam hanc latere conjicerem, aut in solido nimis laxo, vel rigido, aut sicco, aut in fluido nimia copia peccante, in sero acri-glutinoso, in crassitie sanguinis, aut spirituum, in quocunque viscere lentore referto, aut in sola acrimonia tum sanguinis, tum spirituum tenuiorum, magisque mobilium. Sint enim tubuli nervorum in cerebro constituti nimis laxi; igitur copia sanguinis naturali major cujuscunque liquidi nervei, quod intrudere se possit inter omnes fibrillas nerveorum fasciculos componentes, nitetur in nervos influere, adeoque, contranitentium villorum vis, cum non sit in æquilibrio constituta cum fluidis, minimæ cuicunque facultati cedit: & cum a quocunque spirituum appulsu nervea fibra distrahatur, dilateturque, impleri poterit liquido, cujus particulæ nervorum funes sensum madefacientes, veluti totidem cuneoli sese in nervorum dilatatos poros insinuando, illos contrahunt; adeoque laxatis nervis, & copia liquidi naturali majori repletis fibris nervorum tonus, & villorum harmonia tota concutitur.

Sit insuper siccitas in solidis minorem copiam humidi ita continentibus, ut humores quilibet producantur acriores, spiritus tum similiter acriores; mobiliore impetu, & nisu majores in emissaria nervorum producantur, adeoque irritando, lancinando membranarum fibrillas, maximo cum impetu efferentur, & inordinate moti poros cerebri ita aperiant, ut quaquaversum per nervos diffiliant: Unde nervorum fasciculi vehementer dilatati, hinc, atque illinc, intus violenter moti spiritus concussi, inopinato spasmodica crispatione corripuntur, & animal sibi deficiente spiritu in centro gravitatis molem corporis sustentante, derepente corrueat. In hisce igitur causis a solido nimis laxo, & fluido magis mobili, & soluto, quoniam mercurius est majoris impetus, & ponderis, quam quod possit a languida fibrarum energia, & vi sustineri, suspicione salivationis non caret; quæ ratione impetus, & gravitas cum videatur calcar addere liquido in furorem nimis concito, male mederis, si malefana mercurii inunctione materię peccantis in sero existentis solutæ copiam violentius ad partes superiores, ipsaque adeo cerebri penetralia propelles. Propter hanc inunctionem mercurialem in scabie insitutam exortum fuisse comitialem morbum, exemplo patris, & filii Trincavella confirmat.

Contra vero cum Hippocrate de morb. sacr. & Gal. lib. 2. de sympt. caus. cum vigeant in sanguine humores lenti, viscidis acidiores, qualis pituita pungitiva; spiritus igitur magis crassi minorisque impetu gignentur, qui propter crassitiem partium, ex quibus componuntur, cum non se diffundant quaquaversum cum nisu, non poterit universa eorum moles fluere per poros villorum, immo portio crassior intra eorundem villorum ganglia subsistet, proindeque eisdem magis extrorsum urgendo, impedit, ne ex toto restituantur nervi, sed in aliquo gradu contractionis persistant; per successivum autem influxum, & effusionem eorundem liquorum intra nervos, cum reliquum crassius intra majorem villorum angustiam semper subsistet, in majori contractionis gradu persistent nervi, & repetito pluries spirituum influxu, cum restitutione magis, ac magis nervorum imminuta, fiet demum, cum non possit ganglia nervorum spiritus superare, & per eorum extremitatem expirare, ut nihil spiritus ulterius influat: quo in casu retro impulsus majorem ad latera nisum ad nervorum principium usque exercet: Hinc successivo spirituum repulsu, & eorundem jugiter appulsu ad cerebri nervos, violentius ipsi concutuntur, ejusque subtilissima fila lymphæ spiritus vehentis mordacitate stimolata crispantur; adeoque nullo, certoque ordine impulsus spiritibus, æger subito in terram prolabitur, violentis contorsionibus detentus. Modo quotiescunque morbus caducus excitatur ab illis succis, qui ad majorem partium cohesionem fluentia liquida reddunt, aut ab infartu alicujus visceris per consensum ortum ducit, mercuri-

rii viribus facile cedit, qui vi suæ gravitatis per impervios quosque spirituum canales lenta materia obfessos sibi viam sternens ad minima resolvit, & mucosa fluida extra corpus propellit, unde bene ait Hippocr. de morb. sacr. *Qui salivosi sunt, ac mucosi, morbo sacro fere non apprehenduntur.*

Hæc ratione salivatio in paralyfi, quæ in sanguine sale, & sulphure fixioribus magis referto causam habet, cum stabili nervorum, & firma fibrillarum cerebri structura, opem non raro egregiam præstat. Cum ad motum requiratur musculorum contractio, cujus machina ex pluribus filamentis, carnearum fibrarum fasciculis, & tendinosis fibris conflata per se iners est, & demortua, nisi adveniat facultas motiva, quæ est influxus sanguinis per tubulosas musculorum fibras, easdem instantis, & liquidi per nervos subito arescentis intra sinus villorum, & sese quaquaversum effluentis per tensam fibrarum compagem, ut carneæ fibræ ab impetu particularum arescentium, veluti a totidem vectibus possint urgeri, quæ inquam imperium afferant, easque a torpore, & sopore excitatas fibras ad motum impellant; igitur si neutrum vel alterutrum liquorum non influat in sinus, & intra villos fluere non permittatur, non poterit inflatio fieri tubulorum, quæ requiritur, ut villi concipiant impetum, & suam indolem, vimque motivam exercere valeant, ut funis denegatis aquæ globulis non inflatus; adeoque fasciculis nervorum ad emissaria infartis, vel obstructis a sanguine intra cava fibrarum latibula partium crassitie, & terrestreitate stagnante, licet recurrat spiritus, & sanguis, per ductus non excident in sinus fibrarum, sed frustra ad canalium emissaria nitentur; unde contractio musculorum, & motus tollitur. Itaque dum in paralyfi, in qua materia viscida, ac quasi lapidea in nervis, ac minimis vasculis musculorum solide viget, sudorifica nullius efficaciam sunt ad excutendum in nervis, & fibrarum lacunis impactos humores, felicius salivatio ciatur, qua apprimè concreta salia inciduntur, dum particulæ mercuriales in fixa liquorum corpuscula impingunt ab invicem, ea dissociando facile dissipant; dein cerebro trajecto ductus nervorum subeundo, coacervata fluida in minima dividunt, & spirituum vias referant: hinc inde porciones subtiliores sanguinis summe tenues, atque elasticæ, partesque tenuioris lymphæ ab alterna meningum constrictione in pervios nervorum tubulos propulsæ, in latera earundem validius nitentes, ordinatas ad muscularem motum fibras inflant; adeoque extensis fibris, & machinulis musculorum spiritu irrigatis, non solum oscillatione propagatur sensibilibus impressio ab extremis nervorum filamentis concepta; sed apertis arteriarum osculis, & nervorum fasciculis in pristinam libertatem restitutis, concinne remittitur sensus, atque motus.

Nunc quoniam mercuriales particulæ per tenuissima vascula, & spongiosas substantias trajectæ in eorundem ductibus lentescunt, inertes fluidi moleculas in motum concitare valent, eodem conatu, & feliciori eventu, ut optime addit Dolæus c. 7. de scirr. tumores scirrhosos dissepcent, & calculosam viscerum duritiem dissolvent, cujus generatio subsequitur a succorum in cellulis glandulosis diversæ indolis coagmentatione. Cum sanguis acido-salinis terreisque scatet particulis, testudineo motu partes corporis perluit, & ad angustos glandularum ductus per arterias delatus, crassiores in ipsis vasculis porciones relinquit, quæ venarum ostiola subintrare nequeunt. A glandularum porro circumpressione, & motu, subtiliores sanguinis in vas contentæ particulæ in motum adactæ, dum a graviorum connubio desciscunt ad ora venarum impingunt, crassiora salia, & terreo-sulphurea in parte remanent, quorum acido-terreæ particulæ a sanguinis præterlabentis appulsu validius pressæ, in alkaliorum poris, & sulphurum ramis altius involvuntur, inutuoque nisu inter se ita combinantur, ut undequaque pressis propius ad se invicem accedentibus exhaustis tenuioribus aqueis, tumor exurgat. In hoc graviore casu, licet mercurialia educere possint viscositates sale, acidoque effœtas per glandularum salivalium tubulos, raro tamen, nisi post defatigatum medentium opus, usurpentur. Quoniam scirrhus tumor in partibus mollioribus genitus per successivum fluidorum appulsu, laxas tubulorum, ac cellularum fibrillas inflando ita distendit, ut vehementius distractis glandularum villis, fortius ab invicem divulsæ non resiliant in contenta fluida, fit, ut a vehementiori fundente, & impellente majori, novus distensis fibris addatur impulsus, quæ ad susceptum impetus momentum sustinendum impares, uberio-rem materię copiam ad laxos membranarum poros deferri patiuntur; unde concrementum quasi lapideum in folliculis conclusum, a solidorum nisu nec ullo incutiente commotum, ab appellentibus succis jugiter irrigatur; atque ex plurium fibrillarum fasciculis a fibroso sanguinis crassamento mediante salivatione depromptis majus conficitur; adeoque in dies magis increfcens lapidum ritu in insignem molem extuberat: proindeque in morbis, si summa adsit fibrarum mollietates, quarum resiliationis vires a quocunque percutientis impetu facile frangantur, licet jam dudum a mercurio averruncetur morbus, redit tamen, ejusque radix in ipsa villorum flacciditate, & fibrarum laxitate parva vi extendenda regerminat, ut observavit Wedelius podagricum salivatione liberatum, post tres annos in eundem morbum incidisse, sed mitiorem.

Scorbaticam affectionem Septemtrionis, & maris incolis frequentissimum morbum per salivationem fugari, fatentur Joannes Burgius in dec. 2. annor. 3. Joannes Acholus in decif. 2. annot. 9. at duntaxat in illo scorbuto, in quo sale evecto, & fluore potito mobiliore sanguinis particulæ crassioribus implicitæ detinentur, atque crassam, & veluti acido-mucilaginosam consistentiam induentes, pigre in vas circulantur, a quibus sanguinis massa compage magis restricta, & crassiori donata, salibus quidem acutis, sed glutine cohibitis, simulque incuneatis detenta, torrentis instar lutum secum rapientis, lento progreditur motu ad viscera minimæ pressionis, & ad vasculorum angustias delata in ipsis feculentias quasi limosas affigit. Tunc in hujusmodi diathesi scorbatica, in qua crassum est attenuandum, stagnans mobile, & cohærens fluidum reddendum, salivare erit sanum facere.

Hoc consilio in amaurosi, sine optici filamentum dilaceratione, & absque eorundem antiquata obstructione, festinanda est salivatio, si a crasso humore in nervorum meatu illapso, vel ab arteriolis retinæ compressis obstructisque denegetur tremor nervorum ad sensorium, vel a tumore in cerebro nervos opticos premente (ut doctissimus Platerus observavit) impediatur directio opticomum, & pupillarum planities, ut angustatis canalibus, vel in ipsis hærente glutine, adeoque spirituum via impedita aboleatur visio. Ad hunc humorem ex opti-

opticus evellendum, & tenacius in capite impactum proliciendum felici successu mercurialis salivatio procedet. Sic artificiali pthyalismo suffusiones curatas testantur Riverius, Fonseca, & Schenckius.

Ubicunque serum, vel lymphæ sanguinis extra vasa decidua in cavitates aliquas exudando colligitur, vel sanguinis cursu pigre fluentis pars ejus aquosa præter modum vasa distendens tandem eadem emollit, ut partium vigore non restituto, & fibrarum elatere sufflaminato extra venas, vel lymphaticas erumpat, hydrops succedit, quem vidit D. Andreas Ernius misc. c. dec. 2. annot. 4. obser. 36. a salivatione artificiali de medio sublatum. Verum ne salivatio a scopo aberraret, ad quem collimat, in hydropse thoracis a pulmonum labe congenito fugiendam consulo. Pulmone hydatide, vel vomica aquosa turpiter affecto, inter ejusdem sinus lymphæ accumulatur, vel rupta vomica in thorace recipitur, quæ quousque in fistulosis pulmonum vesiculis hæret, cognoscitur a tussi sicca, dispnoea, dolore gravativo, quibus additur hoc unicum tanquam pathognomonicum a Riverio relatum, quo solo hydrops pectoris a cæteris difficultatis respirandi speciebus distinguitur, quando nimirum spirandi difficultas primo quoque somni tempore invadit, ac per noctem magis urget, quæ adventante sensim die lentescit. A practicum vulgo hic morbus confunditur, licet graphice ab Hip. delineatus sit 2. de morb. Febris, & tussis tenet, acervatim respirat, & pedes tumet, contrahuntur, & patiuntur talia, qualia is, qui suppuratus est, sed debilius, ac diuturnius; & si quid infundas, aut forum aut suffitum adhibeas, pus non sequitur, atque ex hoc sane cognoveris, non pus, sed aquam intus esse; & paulo post subdit: Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentavit, ebullit intus, veluti acetum; laceratis inde sinibus, & vesiculis lymphæ foetore olens diaphragma inundat, quæ in thoracis cavo collecta distinguitur a novo dolore, & pondere diaphragmatis fornicem premente, hinc a decubitu in latera cum strepitu lymphæ motus advertes; huic supervenit hæctica febricula, fames sublata, rubor genarum, anhelosa, difficilis, & erecta respiratio, tussis perpetua sicca cum metu suffocationis jacenti, quibus addit Gal. 5. de loc. affectis cap. 9. fluctuationum: Nam ubi quis, inquit, affatim a decubitu transmittatur, idque maxime si ab uno latere in aliud se convertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri, haud dubia conjectura est.

A vasorum lymphaticorum laceratione subortus hydrops, prout omne auxiliorum genus spernit, sic a salivatione mercuriali exasperatur. Juvenculam viginti quatuor annorum dissecuit Theophilus Bonetti, quæ per sexdecim annos ascite detenta, indeque tandem mortua, in ipsa nullius visceris vitium invenire potuit; crudeliter hæc enim in pueritia tractata, istibus pedum sæpissime casta, ob lymphaticorum disruptionem occubuit, quæ per tot annos vitam produxerat misella, ob viscerum labem non subsecutam. Affectus hic pro ut curatu, sic etiam cognitu difficillimus est; nam licet exterior ventris subdurus tumor una plurimorum judicio evidentissime percipiatur, attamen quæ sit causa tumorem producat, & quomodo in ventre progignatur, aut aliunde illic adveniat plane nescitur; idcirco hujus morbi naturam, & causam latere arbitror, quia cum prima ejus initia non advertantur, subito in immensum excrefcens, flatu ejus peracto aliam sibi consciscit naturam, & suam amittere videtur. Quapropter opinor, ubi sanguifera vasa, nempe illorum oscula nimis laxa non existunt, aut vasa lactea, aut lymphatica non sunt disscissa, innatum cordis vitium, & solidorum mala conformatio hydropem foventium in suspicionem non cadit; excrefcientiam enim ramosam in utroque ventriculo cordis infixam, & per vasa in pulmonem delatam in sectione hydropici reperit Gaspar Baubini apud Ger. Herxium tom. 1. Loverus historiam de Pericardio in tract. de corde c. 2. fortiter cordi adhærente recenset: post cordis palpitacionem ascitem irreplisse observavit Bonetti lib. 2. de palpit. cordis, cujus cadaveris cor relaxatis involucribus circa septum transversum descendens os gerebat; salivationem inquam, seposita recensita organica vasorum, & viscerum labe, esse in hydropse fortassis unicum auxilium, quod valet cæteras hydropis causas dispescere, antequam æger tenuiori mendentium genio indulgens in lethalem hydropem incidat, in quo fauciatas lacteis ductibus minima spes salutis affulget.

Nemini latere puto, omne hydropis genus produci primo ab omni causa, quæ valet serosam sanguinis partem ita coercere, ut redire nequeat in venas, aucta deinde vasa distendit, & tumida reddit, in distensis proinde vasculis elastico robore orbatis sensim restagnans, eadem ita obstruere potest, ut in hisce partibus liquor concreascit, cujus humoris concretio comprimens, aut obstruens, ora vasorum obliterando, vel arcendo icterum, vel cachexiam parit, donec tandem læsio viscerum inde procedat, tumque hydrops priores effectus sequatur. Omnes itaque ægros pertinacibus viscerum obstructionibus hydropem minantibus affectos mercurio curarem. Dom. Panarolus pentec. 4. obser. 24. helluonem hydropicum secavit, cujus hepar in tantam molem excreverat, ut universam fere diaphragmatis cavitatem repleret, totus durus, & magnitudine monstruosus. Pet. Panujus obser. 13. virum, qui hydropse obierat, secuit; huic lien adeo intumuerat, ac induratus erat, ut tres libras lance libratus penderet; jecur inde optime constitutum, & naturali temperie præditum invenit. A renum calculo ureterem obstruente hydropem notavit Hollericus ad c. 39. lib. 1. de morb. Ab iisdem pinguedine undique obstitis observavit Albertus Kiperi. Mesenterium fere innumerabilibus strumis per totum ventrem se offerentibus reperit Franciscus Caille Genuensis, ut fere ab illis obliteratum esset, hinc in hydropis cadavere, qua obiit, causam inquisivit. A glandulis mesenterii obstitis hydropem refert Christianus Rudnicus in miscell. curios. anno 1673. observ. 159. Olaus Borrichius in actis Medici Barthol. cadaver dissecuit, quod ex hydropse obierat, habens glandulis omentum scirrhis referentem. Hujus census infinita extant exempla, quæ hydropem a viscerum obstructionibus oriri non ægre pandunt.

Ea enim est universi corporis, & vasorum omnium harmonica constructio, ut humores per intervacuos loculos, & spongiosas inanitates circumfluentes per eorundem ductus æque, atque per poros undequaque elabantur: ex hoc inoffensam mixtionem servantes per pervios fibrarum canaliculos trajecti omnes machinulas instaurant, & partium æquilibrium conservant, tandemque quicquid supervacaneum est per innumera cribra separatur; verum si obstruantur ductus, illic comprimantur, alibi sordibus alluantur, fibræ, villi contractiles, glandulæ, & diductilia vasculorum filamenta debitam liquidorum quantitatem nec absorbent, nec æquali nisu in fluida nituntur, nec

contra fecernibilia separant; hinc ab obstaculo obstruente, vel circumpremente præpeditis facultatibus contractilibus, non solum retardatur influxus liquidi, ne per totam longitudinem, & canalium amplitudinem diffundatur: sed cum non possit extrudi a contractu vasorum quicquid est inutile, & stagnat, magis mobile per poros fibrarum exsudat, aut per glandularum vascula erumpit in membranarum lacunas, & paulatim viscerum sinus, atque cavitates laxat, & alluit. Causæ hujus collectionis aquarum est stagnantium fluidorum in glandulis inertia, vascula occludens, & membranas distrahens, quæ præpeditens virium ac facultatum exercitationes, privat fibras contractionum, & distractionum vi, ac proinde pressionum ac circumpressionum momento, adeoque stagnantes liquidorum particulæ a machinulis villorum atque fibrarum valde distractis, ob violentam distractionem, atque tunicarum extensionem ad pristinam cohesionem, & naturalem statum non restitutis, in circulum impelli non possunt; ita affluentes, & undequaque impellentes fluidorum moleculæ, vires, & fibrarum resistentias extenuant, ut impetum appellentis liquidi, & pondus stillantium guttularum sustinere non valeant, ne poros fibrarum præterfluant, ac in cavitates aliquas decendant. Igitur salivatione artificiali moliri poterunt separationes opportuna, antequam ob villos contractiles nimio conatu dilaceratos in interjecta spatiola, inter oscilla infracta vasculorum, latentia inter filamenta, spongiolas, atque fibrarum moleculas extra suum locum sitas derivent humores, qui ab hiantibus vasculorum oscillis, & fibrarum poris in proximiores lacunas indefinenter erumpunt.

ARTICULUS VI.

De Phenomenis salivationem concomitantibus, & consequentibus.

Mercurius per plures dies exhibitus, parvaque quantitate assumptus, quaquaversum pergit, atque tam suæ gravitatis, quam impetus ratione, crassos liquidorum pigre circulantium lentores incidit, solvit, ac fluidos reddit; quin paulatim, inde confertim, & magna copia per arterias ad glandulas salivales deducit, donec salivatio succedat. Humores in glandularum cavitatibus existentes, & in arteriolarum capillamentis summe distensis a successivo & indefinente liquidorum appulsu moram trahentes, pituitosi, & glutinosi, acresque soluti, exitum sibi parant per salivæ vias, quæ vitiosis humoribus enormiter inflantur, ac propterea incipiunt intumescere gingivæ, atque angui, dolere tonsillæ, inflammari maxillares, ardere fauces, dum magna copia se ferente ad salivales glandulas pituita, non tantum glandulæ superiores, sed & inferiores inde replentur, ac intumescunt, verum tota oris, & faucium tunica glandulosa eodem glutinoso sero tunc impletur, ac distenta levem, & nonnunquam periculosam producit (si nimirum festinetur salivatio) in faucibus angustiam, quæ saliva viscosa subsistente in canalibus suis, ac proinde eosdem extrorsum extendendo in tumorem attolluntur, a quo glandulæ vehementer distractæ dolore, atque ardore plectuntur, & cum fibrarum distractio fieri non possit absque eo quod membrana canalium, & quarumlibet aliarum partium in parte, quæ distenditur a proprio termino recedant, neque a sua positione distrahi, quin ab invicem dividantur, poterit aliquando succedere laceratio aliquot canaliculorum, & multo facilius, si acris, ac effera soluti lentoris saliva fibrillis infingantur, & ipsa sint tanti momenti, ac impetus, ut vasculorum constrictum, & resistentes glandularum villos superare possint, ex qua canaliculorum laceratione contentus liquor jugiter effluet cruentus, sincerus, mixtus, qui absque illa laceratione poterit pedetentim in os derivari, si per simulum contractiones, & fibrarum distractiones sint tanti impetus, ut quæcunque continentur intra partem, quæ contrahitur, atque distrahitur, exprimere possint extra glandulas, & eo facilius, quo illæ fuerint vividiores, & cum sensu doloris conjunctæ.

Tumefactis gingivis, quæ ulterius firman, & stabiliunt dentes in suis alveolis profundis, maxillis insculptis impares fiunt (dum a ligamentis succingentis membrana distensis trahuntur, pellunturque) resistentia distractionum fibrarum viribus, eaque ratione vacillantes, ac proinde minus firmi extra ordinem quasi per novos alveolos prodeunt, ut excidere videantur, semperque quasi tremore quatiantur; quo casu ut plurimum extrorsum, introrsum, ac si nova foret dentium series protrusi a mercurio, veluti ab hasta Achillis, quæ vulnerat, & sanat, pedetentim firman, & suis fossulis detumescuntibus gingivis denuo recommituntur.

Mire commoti, & ad fauces in primis propulsi humores glutinosi, alique eis admixti per universam sanguinis massam, immo corpus universum diversis in glandulis oris aggeruntur, & spumæ ad instar male olentis continuo ab ipsis extillant, adeoque sætor anhelitus qui stagnantis lentoris eruptionem in procinctu esse manifestat, & salivationis stadium plerumque comitatur. Subsistente glutinosa saliva intra arteriolas, & glandulas, easque proinde distrahente, particulæ succorum quorundam acutissimæ cum ipsa conjunctæ, dum transitum nullo obice impeditum non reperiunt, in vicinas illas fibras vehementius agunt, & impetuosius pelluntur, easque discindendo, non tantum dolores graves, & molestias immanes producant, quin confertim, effluente humore acris, oris ulcera, & linguæ relinquunt.

Salivatio itaque cum fiat per humoris pituitosi ubique, ac in primis in sanguinis massa dissolutionem, hinc ad salivæ glandulas deductionem, quoties paulatim, ac successive a mercurio similis materiæ pituitosæ secretio contingit in glandulis pancreatis, & ventriculi, toties humoris pancreatici, & stomachici, & quidem viscidioris, & acrioris ita contingit copiosior separatio, ut ad tenue intestinum, ac ventriculum copiosius diductis humoribus, irritetur potentius eorundem utraque pars. Ab illa enim molesta vellicatione exprimitur copia liquidi summe mobilis per nervos majot in ventriculi muscolum, aut in fibras intestinorum, unde illius motus peristaltici violenta inversio, atque inde cum subita, ac valida ventriculi constrictione, si quæ sint contentorum, per os ejiciuntur, atque proinde a confluentibus in intestina humoribus, ibique agitatibus ad illorum expulsionem eadem convelluntur, & alvi fluxus satis gravis, & nonnunquam periculosus consequi solet.

Quoniam vero inflata lingua, in tumorem elevatis faucibus, canales cibi & potus ita comprimuntur, ut naturaliter non pateant, & libere moveri non possint, non solum prohibetur pharyngis motus, sed fibræ muscutorum buccinatorum, zygomaticorum, elevatorum, depressorum labiorum cum cæteris musculis cibum in œsophagum pro-

protrudentibus, humorum copia adeo contrahuntur, & vasorum tili infarciuntur, ut materia quælibet deglutienda ad palatum perducta per impetum a linguæ motu vitio conceptum, & musculorum vires in cavitatem œsophagi exprimatur difficilior. Prout igitur glandularum, & musculorum tumor canalem comprimet, ex æquo vitabitur deglutitio, & eo magis si pharyngis musculus plus jussu lædatur; Hinc aliquando in artificiali hac per mercurium excitata salivatione, prout comitantur oris ulcera satis ampla, genas in primis & linguam depascentia, dum effluit saliva acris ac exedens, ubi eadem sero ad curationem tendunt, cicatrices molestissimas relinquunt, quæ quoniam motrices fibras ad majores contactus eas crispando redigunt, inde partes nimis arte colligunt, ex quibus denuo non explicatis fibrillis, non raro linguæ motus manet impeditus, ex parte prohibetur deglutitio, genarum motus vitatur, & propter fibrarum inflexilitatem constituitur pars veluti rigida, ut mihi semel in praxi videre contigit, quæ ob influxum sanguinis, & liquidi per nervos impediti, a nulla vi, a nullo volente in motum agitur; unde illa pars paralytica fiet, & quamvis linguæ, labiorum, genarumque motus, gargarismis, (si in tempore præveniantur hæc mala,) qui humores acres temperant, ulcera mundant, atque blande exsiccant, restitui possit; cavendum tamen, ne confertum, & diutius promoveatur salivatio, dum non tantum glandulæ successive replentur, atque inde intumescunt; verum tunica glandulosa post peractam salivationem jugiter pituita impletur, & relaxatis fibris distenta molestum & nonnunquam periculosum ptyalismum continuo fovet.

Post longum salivationis cursum tum sanguis arescit, tum copiosa excretionem succi nutritii per glandulas salivales facta partes musculæ debita nutritione privata in naturalem quasi atrophiam incidunt, quæ tamen non succedente exandescencia sanguinis, & spirituum, adeoque calore hæstico fixo non irreperente, & colliquante in partibus solidis, ulterius magis non marcescentes a novi oleosi chyli pabulo in sanguinem continuo delato, indies reparantur, atque inde tota nova massa sanguinis succo jugiter saturata, magis apta alitioni partium redditur, & consequenter massæ sanguineæ emendatione atrophia totius corporis sensim evanescit, adeo ut inde novo euchymo, & oleoso succo in pristinam oleosam, & nutritioni aptam naturam sanguinis crasi restituta, melius in dies se habeat æger, quo vires carnesque continuo refarciuntur, usque dum sanitate firma, & athletico corporis statu fruatur.

ARTICULUS VII.

De Methodo Salivatoria.

Nunc præstat Gallica sorde marcescentes, ut cum Celso sternatur via Medicamento, mercurialium suffragia, non ornatum cum ipso Celso edocere, ut sciant ubi syrtis, & scopuli lateant, & quomodo sint vela trahenda, quibusve plagis advertenda prora, ne mentis lenocinio, ac blanditiæ laboris decepti, præcoci nimium experimentalis impatientia amplectendæ salivationis defudantes, artis constantiæ, & salutis officiant, & incremento. Utile quippe, ac pulchrum est experimentalis, ac empiricæ rationali rei medicæ veritati inniti, ut celtici morbi curationem a rudi experientia vindicem, & in rationalem methodum discitentibus æque ac docentibus pronam convertam; experimentorum laboribus mixtorum rationali analysi operam navans, intimamque ab ipsis naturam extorquens, in hac re plura phænomena obscuritate naturæ involuta, pluresque agentium facultates aperta luce mihi paravi, quibus ad ea, quæ in corpore humano salivando operantur, accommodatis, iisque tanquam causis in agendo ad praxim demonstrativam adhibitis, non exiguæ vires arti salivatoriæ accessere, quæ mentem artificis in experimentalis inventionem excitando, eam in observatorum exaninie, ac judicio exacuit, ut in percipiendis viribus, ac corporum legibus expendendis securior facta, minus erroneam, ac commentitiâ methodum constituat. Itaque per ipsam ad quoddam veri specimen perducti, si nescimus adhuc, quid sint venereorum morborum radices, addiscimus saltem (pluribus inaccessum) quibus curantur; quo fit, ut disruptis Theoriæ medicæ repagulis, ac veluti mei juris factus, per immensum salivationis æquor discurrem. Explanatis igitur difficultatibus, & excisis ab arte alienis phylatorum aberrationibus, erigitur animus, & me ad jattica prælia revoco, ut certi sciendi docendique in arte salivatoria omnium vastissima limites statuamur.

Cum vero, ut propius ad rem accedam, venerea lues eousque invaluerit, ut durior hujusce morbi feritas extirpari non possit, nisi per salivationem mercurio excitatam, mihi onus incumbit, quæ in ea promovenda, tum etiam regenda observatio mihi dictavit, edisserere; cum enim eo res redigitur, ut non adsitis temere suppetiis salivatio promovenda sit, nulla ratione quidem assequi possum, qui fiat, ut ad frangendos luis conatus, æger adhuc viribus vegetus, sanguinis missione rectius subjiciatur mercurio, cum testante experientia nulla sanguinis evacuatione debilitati, proindeque pares mercurii conatibus, salivationis impetum nullo labore sustineant.

Cum sanguis non solum impellatur a corde, & nisi succedenti sanguinis, quem exercent particulæ quæque ad contactum positæ intra vasa a tergo urgentes, sed etiam ab arteriarum tunicis impingente sanguine distactis & sese post dilatationem restituentibus, fit, ut villi membranas arteriarum textentes nimio sanguine distenti, indeque prohibiti, ne possint se plane contrahendo in sanguinem niti, sanguis fluat minori velocitate, quam quæ requiritur ad mutuam partium cohæsiōem divellendam, & eo minus in divulsionem nitetur, quo in arteriæ distensione minor vis attritionis dabitur; adeoque quoniam per sanguinis missionem fit, ut ipsius particulæ in mutuum contactum minus nitentes a frequentiori, & celeriori arteriarum oscillatione majori nisu agitentur, sequitur, ut quicquid sanguinis relinquatur in vasis, validius in motum agatur, & si nifus major fuerit resistentia a partibus cohibentibus, & coactis proveniente, intime dimovebitur liquidorum cohæsiō a motu prohibens partes magis mobiles, & reliquis impellendis aptas; quoties igitur in celtico morbo dabitur sanguis nimis coactus, & arteriarum tunicas ita distendens, ut partes sanguinis succedentes, dum in antecedentes impingunt per illam pressionem non possint se invicem allidentes divelli (quæ major allisio faceret, ut una particula fortius attrita majori vi divideretur ab alia) ille igitur coalitionis nifus per sanguinis missionem minuendus erit, & arteriarum distractio removenda, ut partes divulse

extricentur, & a solidorum inertia cohibita in majorem motum nitantur.

Si vero hic, cui mittitur sanguis, sit imbecillioris, & minime constantis roboris, ut videtur sæpe contingit in venerealibus confectis, e sanguinis detractiōe concidat oportet virium robur, e sanguinis enim quantitate minore in arteriis contenti minus extenduntur meningum fibrillæ, a quibus minori momento impelluntur per nerveos spiritus; unde minor quantitas spirituum in villos cordis derivata cum ejusdem contractionem remittat, cor in sanguinem nitens, sique motus impertiens iners pressionis momentum, debiliorem nifum fluenti sanguini imprimet. Hinc successive ob rariorem, & solidorum debiliorem motum augentur liquidorum resistentiæ, unde sanguis recedens minori velocitate per vasa, quam ante missionem, minori momento alliditur; & cum facultates fluidorum attritionem molientes sint maxime infirmæ, earum momento non majori momento cohæsiōis sanguinis non poterunt particulas inter se coherentes dimovere; idcirco lentor in sanguine augebitur, qui major non fieret, si sanguis emissus, enervata cordis contractione, resistentias fluidis non adderet. Quoties igitur certus esse poteris, majorem quantitatem sanguinis, quod perraro videre est, quam quæ fluere potest per canalialia sine vehementi diductilium laterum distensione cum particularum pressione in gyrum languidius rotari, nedubites, ut motus, & resistentiarum æquus existimator sanguinis missione ægro opportune occurrens, nocere possit; alia missio damno hujusmodi præjudicio, in omni salivatione feliciter excitanda præmittendum est catharticum aliquod, quod humores in ventriculo, ac intestinis collectos per alvum educat, ne imprudenter prius adhibitis medicamentis salivationem excitantibus, vomitus, aut ventris tormina exurgant: inde phtisana humectante, & laxativa ægri lue tabescentes præmuniantur, quæ conficitur satraparilla, radice bardanæ, graminis, semine ordei, pasculis exacinatis, liquiritia, & aqua fontis, quæque pro-modulo potus uberi copia, si fas sit, per duodecim dies exhibeatur.

Quoniam celticus lentor a fluidis concrecentibus inspissatus, sanguinem privat ea portione, quæ corporis partes humectando ad motum disponit, lente rapitur per vasa, nec potest intime ab ullo solvente recludi, donec humido omnium fluidorum vehiculo occurrens, laxato nexu cohæsiōis, promptius non compleat circuitus; hinc aqueæ moleculæ intra poros viscidæ sanguinis conclusæ ejusdem contactum dimovent, resistentias lentoris imminuunt, quibus pariter laxatur rigida solidorum tensio, & elasticitas, ut possit ab impulsu gravi mercurii distensa alternatim restitui: rigidorum vasculorum tonus valide contranitens mercurio momento, ejusdem impetum eludit, at corpus illud, dum diuturne in tunicas arteriarum impingit, sui motum villis impertiens, successive tandem totum in ipsos transfert; impresso autem fibris impetus accelerati momento, solvitur virium contranitentium æquilibrium; unde cum arteriæ nec majori impulsu distraherentur, nec impellentis corporis sustineant nifum, a se invicem diffiliunt. Idcirco prius præparato ægro laxativis diluentibus, mercurio dulci in pillulas efformato cum gum. tragan. vel cum conserva viol. paulatim, ac successive salivationem promoveo, adeoque caute procedens lente moveo. Post quartam, vel quintam diem gingivæ intumescunt, & ptyalismus suboritur; cum æger expuere incipit, gradus salivationis summa diligentia expendo, an erumpenti salivæ frænum, vel calcar sit injiciendum: ubi autem ptyalismus eousque evectus fuerit, ut nycthemeri spatio quatuor libras expuat æger, nullum amplius stimulum addo, ut non intendatur salivatio; & cum hoc modo illa satis procedat, caveo ab omni mercurii usurpatione ulteriori, ne a nimia quantitate delatis ad salivæ glandulas humoribus glutinosis, æger in vitæ discrimen conjiciatur. Hoc modo protracta salivatio, si forte prius elanguet, antequam morbus penitus evanescat, novo subinde stimuletur mercurio, quousque mephiti mercuriali, salivæ lentore, & sputi salisitate glutinosa omnimode cessante, æger in totum convalescit.

Quandoquidem accidit, præsertim in corporibus facibus impuris refertis, ut simul ac mercurio sanguis afficitur, tormina ventris, & dejectiones mucosæ quasi dysentericæ eveniant, quibus non solum curatio morbi retardatur, perturbaturque, verum impeditur, ne salivatio succedat; itaque in urgentibus hisce malis cohibenda est diarrhœa, & sedandus dolor opiatis, & paregoricis pharmacis, quousque hæc symptomata penitus evanescant, atque salivatio satis procedat. Cæterum bene procedente salivæ purgatione, quoniam in diuturno salivationis stadio non tantum sanguinis fibrosi, & serosi colliquatio, verum etiam saburra veteris effœti, & novi chyli oleosi copia per salivæ ductus libere indefinenter excernitur, fit ut ob continuam sanguinis depauperationem partēs corporis solidæ debita nutritione privata prorsus marcescant; idcirco ad præcavendam hanc vasorum inanitionem, & carnis marcorē, massa sanguinis novo jugiter aquearum succo tempore salivationis saturatur, quo rasura c. c. pasculis, aniso, & aqua fontis confecto solidorum colliquatio, & consequenter atrophia totius corporis reparatur. Si in sustinendo urgenti gingivarum, & linguæ dolore impar sit æger, colluatur gargarismate ex rad. alth. liquir. sol. mal. sem. hord. decoctis in aqua fontis, addendo syrup. de hybisc. Si vero cum gingivarum dolore in dies cum suffocationis periculo augeatur ptyalismus, opiatis, & anodynis liquoribus compescatur, vel alio divertatur cathartici; cæterum ægri regimen id tantum exposcit, ut a vi frigoris se defendat, & cibis euchymis moderate vescatur.

A venerea lue liberati hujusmodi ægri, si œconomiam illorum corporum everfam, & vires prostratas refarciendi minus idonei sint, sed sanguine eorum acescente incalescant, ne in lethalem tabem incidant, siccoque marasmo afficiantur, ad juscula avenacea, gelatinas, & lactea, spiritus defatigatos, & vires deperditas restaurandas apta delegantur. Interim ægro convalescente post salivationem peractam, nec cathartica, nec sudorifica alia in usum revocanda veniunt. Attamen nescio qua ratione quidam freti quicquid malignitatis a mercurio, ut vulgus ait, in corpore relinquitur, aut mercurii reliquias per catharsim, aut diaphoresim expellere conantur. Hujusmodi autem hallucinationes in practiciis illorum præjudiciis fundatæ, ita in eorum animis insiguntur, ut pro Junone umbram captantes, delirantium insomnia profundatis principiis concipiant. Serio vero cum Sidenham animadvertendum est, in quibusdam reperiri idiosyncrasiam, quæ ita salivali purgationi resistit, ut nullo modo excitari possit salivatio, quæ ad eradicandam mali radicem par sit; igitur ab isto evacuationis genere recalcitrante natura, ne loco perfectæ salivationis dolores

lores ventriculi sudores frigidi, dejectio dysenterica cum ventristorminibus insurgant, cave, ne obstinate salivationem impertunius urgeas.

Cum igitur allata methodus, nec dies præparando corpus ante salivationem inutiliter consumat, nec decoctis post salivationem ægros extorqueat, quisque experimento discat in praxi versatus, eandem longe faciliorem esse, magisque tutam. Nec vos deterreat deglutitionis difficultas, oris labor, & dirigendæ salivationis requisita solertia: Quid autem pulchrum in accurato naturæ, & artis experimentali labore pluribus inaccessio, quod non idem arduum! Ad hanc itaque salivationis methodum per repetita experimentorum tentamina, perque nunquam intermissas historiarum notationes consecutam, nuperisque historiis exultam animos erigite, quæ eventuum certitudine, & virium constantia, in laborum tædio rationalem disciplinam constituit.

HISTORIA I.

GAllus homo originaria veneris labe fœdatus, sensimque febrili algore emarcescens, universali quasi inacie conficitur; pedetentim in dies increfcens, tophus in septima prope os pectoris, ubi os definens cartilaginem recipit, costa protuberat. Venetiis veris tempore cum decocto exsiccanti, & sudorifico hypocaufto committitur; ut post octavam circiter diem copiosis sudoribus subtilioris feri depauperatus sanguis, magis perenni febrili stadio incalescit, atque tophus febrili incendio magis urens doloribus ardet. Hinc calore sanguinis inflammata tophi particula, motuque ejusdem urgentiori commota, ita ad se invicem allidebantur, ut concretionis nexum distringerent; sic in suppurationem abeunte tumore ulcus satis ingens, graveque olens cum ossis erosione circumscitas fibrillas depaſcebatur. Verum benignioris auræ lumine afflatus ab hypocaufto recessit, & successive solventi blando liquore, sed aqueo continuo rigatus, inde salivationis cursum feliciter exegit: Interim solo spiritu vini camphorato pro ulcere adhibito absque ulla symptomatum sævitie, & doloris recrudescencia perdomata febre, repurgato, & consolidato ulcere, ultra expectationis spem triginta diebus evasit.

HISTORIA II.

JUvenis bilioso-melancholici temperamenti, gracilis habitus, angusti pectoris celtica labe autumnus, & hyeme grassante affectus emarcescit, & magis febre lenta, quandoque etiam quotidiano typo algens, atque incalescens, nocturnis doloribus ad artus fere omnes torquetur cum sicca impetigine faciem, ac fere universam cutem fœdante. Æger ab enormi fluidorum vitio, & subsecuta solidorum labe vexatus, veris tempore salivationi committitur, quam post largum viscidissimi phlegmatis effluxum circa summos labores trigessimum circa diem remittentem, excepit (præcesso dolore pectoris cum tussi) purulentum sputum, phthisis lethalis epiphænomeno a pulmonari insertu, aut tuberculo ante salivationem in pulmonibus latente, salivationis tempore suppurato, aut disrupro; interea ad diluentia, balsamica, & lactea irrita medicamina delegatus, a nova tuberculorum inflammatione, & pulmonum exulceratione una cum colliquativa diarrhæa e vivis funeste sublatus est.

Hoc eventu videtur mercurialia salivatoria proficiscenti tabi pulmonari calcar addere, & quæ extergendis, exsiccandisque internis aliis, externisque partibus, ulceribus præstantissima passim experimur, in infartus pulmonibus crimine non carent. Clarissimus Morton in phthisi symptomata a celtica lue haud veretur mercurialium usum. Ideoque, inquit, *nil melius excogitari potest, quam ulcerum pulmonarium sanationem, & crassi sanguinis a fermento venereo eversa restitutionem mercuriali aliqua salivatione tentare.* Hac fortasse adhibita in tertio ejusdem stadio post tuberculorum supputationem ad extergendum, & exsiccandam consequens ulcus, non vero in eorundem cruditate, aut in pulmonibus prius obstructis, & in phthisim dispositis; cum in hoc casu videantur mercurialia sponte irreptentem phthisim promovere, adeoque ad inhibendam tuberculorum latentium inflammationem, & suppurationem inepta, licet fortasse ad eorundem exulcerationem abstergendam, exsiccandumque consequens ulcus apta.

HISTORIA III.

JUvenis quidam circa annum ætatis suæ vigesimum octavum, lascivus, & nequam post concubitum venereo veneno per contagium adeo inquinatus fuit, ut non obstante plurium medicaminum anticelticorum ope a Medico instituta, aliisque curationis methodis incasso molimine accersitis; post uvulæ erosionem, atque alia luis venereæ stigmata foris, & intus excrescentia, in summam incideret deglutitionis difficultatem a tonsillis intumescens, atque inflammatis cum febre, & totius corporis emaciatione incipiente. Ob glandularum folliculos a contento fluido summe turgescens maximam indebat formidinem mercurialium usus, utpote ab intus commota materie fluidorum, & ad glandulas jugiter affluente tonsillarum inflammationem promoventium; Verum salivatione promota, dum cæteræ salivæ glandulæ a confluyente liquido distentæ intumescunt, simulque exulcerantur, ab ipsis tonsillis depluentibus sanioris fluxus filamentis, sensim humorum infartus in ipsis gliscens detumescerebat, quousque perenni fluxu viscidus, atque erosivi phlegmatis erumpente perfecte patiens, & sine ulla recidivatione a tonsillarum tumore, ulceribus æque, ac reliquis luis cruciatibus penitus vindicaretur.

HISTORIA IV.

Mulier ante gestationis tempus lue venerea affecta, dolore, febre, tophisque in diem increfcens circumsepta, feliciter mercurialem, cum diræ luis feritatis remissione salivationem transegit: at post stadium salivationis transectum fœundationem passa, utroque gerens, in quarto mense celtico veneno denuo inquinata, aut recrudescens (ut sæpe recidivam patiuntur hi, qui vario lenocinii apparatu phthyalismum demulcent, aut salivationis tempus non explent) lenta febre & inacie denuo conficitur, in osse frontis no-

vus extuberat, aperiturque tophus, ac recens ulcus supra uvulam palatum exedit; a quo exorta deglutitionis ingenti difficultate, tum solida, tum fluida materia per nares regurgitante, summus virium lapsus augeſcit. In hoc gravi morbi statu alteri salivationi subijcitur sialogogis pillulis, hisque repetitis, aut intermissis juxta tardum, aut celerem phthyalismi impetum, nulloque interim uterino symptomate obvio, quod abortum prænunciaret, copioso sane effluxu mucosi, ac uliginosi phlegmatis salivatione peracta integre convalescens, filiam completo gestationis tempore salubrem, absque sui ipsius recidivæ metu, obstetricante mercurio peperit. Igitur quam sit male sanum commentum, & inanis timor eorum, qui in prægnantibus mercurialium usum abhorrent, aperte evincitur, & clare elucet.

HISTORIA V.

Vir quadragesimum annum natus admodum robustus, laxatis viribus habens, & cum scortis avidissime luxurians, nulla virulenta infectus gonorrhœa, celtico rheumatismo gravissime afficitur, maxime noctu prædictis cruciatibus in capite, mediisque tibiis, brachii dexteri contractione, alibique corporis citra unum tumorem sævientibus afflictus, ut nec cubili se continere potens, nec lecto affixus miserrime traheret spiritum; in dies increfcens dolori accessit febris, postquam perenni circuiſu increſcentem gummosus tumor diu delitescens in sincipite dextero versus oculum protuberans se manifestavit. Remedia minora fere innumera sine ulla symptomatum allevatione adhibebantur: mercurialium usu cathartorum primo melius habere visus; exinde tandem deterior factus, eo tempore præ immani cruciatu ferro tumorem discindi passus est, sed frustraneo conatu. Quapropter cum methodus quæpiam nihil opis contulisset, sed recrudescens lue, salivationem, remedium cæteris quibusque validius ultimum, experiri consulitur. Statim corpore per cathartum, & prisanam humectantem rite præparato, salivationis stadium sublimato dulci inchoavit, qui ad finem morbi anhelans per quinque dies 37. grana mercurii in dulcem confecti devoravit; a pharmaco quinta vice repetito sputatio copiosa, & laudabilis incœpit, quæ sine malo quovis symptomate per mensem processit, & decreſcente salivationis visciditate, ac pondere ad residuum spumescens glutinis compescendum novo usu mercurii per paucos dies ad 3. 5. interjecto curam confecit. Ante cursum hunc phthyalismi finitum, dolores omnes cum febre evanuerunt, indeque a gummate ulceroſo exſiccato, licet longo morbi decursu defatigatus æger, intra quadraginta dierum spatium integre convaluit.

HISTORIA VI.

JUvenis eques vix celtico seminio tactus, jam primum lue inquinatur, & virulenta gonorrhœa torquetur, a qua, nescio quo, & fortassis malefana medela vindicatus, doloribus vagis incalescens accensa febricula inhorruit, a qua statim ingravescent morbus brevi ad feritatem perveniens, cum ossium carie, & gummatibus cranii ad musculos temporales protuberantibus, irrita tum una, tum alia quacunque methodo, per tres annos tyrannidem suam exercuit. Quare remedia diversimoda cujuscumque fere generis tentata cum potius exacerbationem intulissent, animatur æger salivationis cursum subire. Itaque ex consilii votis mercuriali salivationi committitur, a qua tumefactis glandulis, & fluidorum impetu dehiscens tubulis, crassa saliva ab oculis vasorum apertis indefinenter effluit; unde nullo amplius salivationis stimulo incusso, nulloque addito impulsu phthyalismus per mensem ciebat. Octava tamen die salivæ saburra confertim nimis versus ductus salivales irruens compescerebatur syr. papav. & opiatum liquoribus. Hinc mitigatis gingivarum doloribus, & compede injecto uberiori salivæ effluxui, lento morboſi liquidi cursu stadium salivationis peragitur, quod curriculo dierum triginta pertingens a repetito mercurii usu trigesimo quinto omnino desit. Hac æger cura consumpsit centum grana mercurii, quibus tophus, febris, dolorque capitis ex toto cessavit.

HISTORIA VII.

Fœmina quædam sanioso gonorrhœæ fluxu miserrime plexa, inde doloribus nocte recrudescens vehementer conqueritur. Verum quia parum primo in affecta parte doloris sensit, tanquam leve malum contempsit: subsequenter inde diebus evanescens sanioso icore, tumor quidam in sincipite interdum indolens fere succrevit, qui nullo negotio a periti Chirurgi industria sublatus, novos in vertice moliebatur tophos, extuberantes successu temporis in palato plures pustulæ in ulcera cachœtica, & putrida terminarunt. Hæc fœmina dum patrati sceleris sordes expiare cogitat, tuberculum exiguum in mamma dextera protuberat lente prosperens, & vix pisi magnitudinem exæquans, quod inæquali pede, & mole concreſcens, venis in ambitu turgidum cum colore livido, & obscuro, tactui insuper renitens dura veluti crusta obducitur, firmiterque subjectæ parti adhærens deterrimis, ac gravissimis symptomatibus excruciat. Mulier de incolumitate sollicita, licet plurimis morbis labefactata, curæ salivatoris se concredidit, quæ sputationis cursu per mensis spatium repetito, indeque pustulis, & tophis, fœtidisque ulceribus ubique evanescens, tunc ad valetudinem se recuperare videbatur; verum gallica totius corporis defœdatione ex istius votis intime perdomata, recrudescit diu delitescens cancerosus tumor punctationibus quibusdam, ac si acu fierent, se patefaciens. Porro ex hoc in dies actus tumor tot ærunis reviviscit, præque diro dolore ita ingravescit, ut de repente ad ultimum stadium perduceretur, in quo apertis, & corrosis folliculis, & glandularum fibrillis, putris sanies, mox nigricans continuo emanavit, quibus diu obnoxia mulier tandem in lethalem lapsum incidit.

Hoc lethali morbi experimento per salivationem habitus turpi inficitia puniuntur, qui mercurialibus carcinoma discutere, ejusdem coagulum resolvere, atque salia corrosiva cicurare nituntur. Nucleus enim cancri, qui longos in annos naturæ, & medicamentis suavioribus inexcussus manet, incidentium, & resolventium usu commotus agitur, inflammaturque: unde incalescentibus acrim salium coactis moleculis, non mirum, si in apertam cladem terminetur.

I N D E X

P R I M Æ P A R T I S

M E C H A N I C E S M O R B O R U M .

<p>A</p> <p>Aeris quantitas contenta in quasi sphaerica, & in quasi sphaeroidali vesicula inquiritur. pag. 303. & seq.</p> <p>Aqua ascendit ad pedes. 309</p> <p>Arteriae magnae Diameter. 301</p> <p>Area arteriae magnae. 305</p> <p>Aneurysma quomodo fieri possit. 301</p> <p>Arteriae, & venae ad instar retis per pulmones excurrunt. 302</p> <p>Arteriae magnae descendentes area. 305</p> <p>ascendentis area. ibid.</p> <p>Apoplexia a quam causa. 308</p> <p>B</p> <p>Bronchiorum vesiculae quasi sphaericam superficiem describunt, aliquando sphaeroideam. 302</p> <p>Bernoullius Jacobus & Joannes laudati. 303</p> <p>C</p> <p>Calor in quo consistat. 296</p> <p>Cephalaea, Cephalalgia. 307</p> <p>Gordis momentum determinari vere non potest. 300</p> <p>Curva spiralis an describatur a sanguine per arterias. 297. & seq.</p> <p>D</p> <p>Diarrhoeae & Dysenteriae causae. 306</p> <p>E</p> <p>Aequalis quantitas sanguinis continetur in dextro Ventriculo, ac in sinistro. 300</p> <p>F</p> <p>Flatuum vires, a quibus dolores & morbi plurimi fiunt. 305 & seq.</p> <p>G</p> <p>Globuli plano-ovales elastici sunt, & figuram mutant. 296</p> <p>Glandularum angustia non impedit aptam separationem. 297. & seq.</p> <p>Gravitas specifica sanguinis. 300</p> <p>seri (sanguinei.) ib.</p> <p>aquae communis. ib.</p> <p>Gravitates aeris, & aquae expenduntur. 304</p> <p>H</p> <p>Hepar quomodo separet corpora. 298. & seq.</p> <p>Hepatitis cur difficultatem afferat respirationis. 302</p> <p>Hemoptoici, & Hectici parum aeris excipiunt. ib.</p> <p>Hermannus laudatus. ib.</p> <p>Hemicrania. 307</p> <p>Hydrops pulmonum. 302. & seq.</p> <p>Hypochondriacae affectiones. 305. & seq.</p> <p>I</p> <p>Inaequalitates, intermittentes pulsum a quibus causis fiant. 301</p> <p>Inspiratio & expiratio quomodo fiant. 302. earum usus. ib.</p> <p>adjuvantur a motu peristaltico vasorum pulmonarium. ib.</p> <p>Intestina quomodo separent inutiles particulas. 306. & seq.</p> <p>K</p> <p>Kiellius laudatus opponitur Borello. 309</p> <p>L</p> <p>Lana Franciscus laudatus. 304</p> <p>Leibnitius Guilielmus laudatus. 302</p>	<p>Luminosae particulae per pulmones sanguinem ingradientur. 304</p> <p>M</p> <p>Massa sanguinis tribus motibus praecipue afficitur. 296</p> <p>Motus pressionis. ib.</p> <p>separationis. 298</p> <p>assimilationis. 299</p> <p>Michelottus laudatus Borellum tutatur. 301. refert vires elasticas aeris, &c. 302. 303</p> <p>Malpighius laudatus videtur tribuere motum spiralem sanguini. ib.</p> <p>N</p> <p>Nutritio quid sit. 303</p> <p>fit paulatim. ib.</p> <p>Newtonus Isaacus laudatus. 302. 303</p> <p>P</p> <p>Paralysis. 308</p> <p>Pondus sanguinis humani. 300</p> <p>seri humani. ib.</p> <p>aquae communis. ib.</p> <p>Polypus materiae qua ratione resistent sanguini. 301</p> <p>Pectus consideratur a Pitcarnio tanquam Sphaeroidis. 302</p> <p>Peripneumonia quomodo fiat. 303</p> <p>Pleuritidis legitimae origo, & basis. ib.</p> <p>sputum. ib.</p> <p>Polenus Joannes laudatus. 302</p> <p>Pulmonis substantia jugulum versus angustior est, versus vero costas spurias. 302</p> <p>extensior. ib.</p> <p>Proportio motus fibrarum glandularum. 298. & seq.</p> <p>Phthisis eura astat difficultatem respirationis. 302</p> <p>R</p> <p>Renum affectiones. 306</p> <p>Resolutio massularum sanguinis a quibus motibus fiat. 296</p> <p>S</p> <p>Sanguinis analysis. 296</p> <p>Sanguis cur albescat in cancri aliquibus. ib.</p> <p>Sanguis e capillaribus lentissime effluit. 305</p> <p>Sanguis quando ab arteriis in venas feratur. 306</p> <p>quam lineam describat ascendendo per venas. ib.</p> <p>Serum ad alia corpora est in ratione tripla. 296</p> <p>Separationis methodus ex Leibnitio, Bernoullio & Conoro. 298.</p> <p>Singultus. 306</p> <p>Stomachi dolores. 305</p> <p>T</p> <p>Timpanites. 306</p> <p>V</p> <p>Vallisnerius laudatus. 304</p> <p>Vena subclavia non descendunt recte, sed inclinate. 308</p> <p>Ventriculus dexter cordis debilius est momento suo, quam sinister. 300</p> <p>Volvulus. 306</p> <p>Viscera quae libet Animalium suas habent glandulas specifica figura & textura donatas. 298</p> <p>Uncia sanguinis probabilius expellitur singula systole. 300</p> <p>Z</p> <p>Zendrinus Bernardinus laudatus. 309</p>
---	---

I N D E X

S E C U N D A E P A R T I S M E C H A N I C E S M O R B O R U M .

<p>A</p> <p>Apoplexia. pag. 313. & seq.</p> <p>Anima organo compenetrata est. 314</p> <p>apta est dirigere, extendere &c. machinulas Sphaeroidales musculorum. 315</p> <p>Auditus sensatio &c. 322. & seq.</p> <p>Vitia. ib.</p> <p>B</p> <p>Bellinus laudatus. 309</p> <p>Borellus Alphonfus laudatus. ib.</p> <p>Bornoullius laudatus. ib.</p> <p>C</p> <p>Contractio & distractio fibrarum naturalis & praeternaturalis, &c. ib.</p> <p>Cephalaea, Cephalalgia quomodo fiant. 310. & seq.</p> <p>Convulsio & Motus convulsivi quomodo fiant, &c. 311. & seq.</p> <p>Cur sine dolore. 312</p> <p>Cur cum dolore, &c. ib.</p> <p>Capitis vulnera in parte dextra, cur afferant convulsionem in sinistram partem, & e contra. ib.</p> <p>Coma & carus. pag. 317. Coma vigil. ib.</p> <p>Caeci cur longevi sint. 320</p> <p>Cataracta. ib.</p> <p>D</p> <p>Dolor quomodo fiat. 310</p> <p>Discursus & Ratiocinatio. 317</p> <p>Delirium. 318</p> <p>Duplicatio objectorum. 320</p> <p>E</p> <p>Emprosthotonos. 313</p> <p>Epilepsia cum dolore, & sine dolore. ib.</p> <p>F</p> <p>Fantonus Joannes laudatus. 314</p> <p>G</p> <p>Gutta serena. 320</p> <p>Gustus sensatio. 323</p> <p>Vitia. ib.</p> <p>H</p> <p>Hermannus Jacobus laudatus. 309</p> <p>Hemicrania. 310. & seq.</p> <p>I</p> <p>Imaginatio. 317</p> <p>L</p> <p>Lethargus. 316</p> <p>Lana Franciscus laudatus. 321</p> <p>M</p> <p>Motus solidorum ab actione cerebri. 309</p> <p>Sydenham Opera Medica.</p>	<p>Motus contractionis & distractionis. ib.</p> <p>communis est omnibus fibris. ib. & seq.</p> <p>quomodo fiat. ib.</p> <p>Michelottus Petrus Antonius laudatus. 310</p> <p>Morgagnus Joannes Baptista laudatus. 313</p> <p>Motus fibrarum cerebri, alter absolutus, alter relativus. 317</p> <p>Memoria quomodo fiat. ib.</p> <p>Mania. 318</p> <p>Melancholia. ib.</p> <p>Maculae seu muscae volantes. 320</p> <p>N</p> <p>Newtonus Isaacus laudatus. 309</p> <p>O</p> <p>Opisthotonos. 313</p> <p>Oscillationes solidorum eruntur. ib.</p> <p>Ophthalmia. 320</p> <p>Odoratus sensatio & vitia. 322. & seq.</p> <p>P</p> <p>Pachionus laudatus. 311</p> <p>Paralysis &c. 314. 315</p> <p>Pia Meninx haberi potest pro sensus communis organo. 314</p> <p>Polenus Joannes laudatus. ib.</p> <p>Phantasmata quoniam sint. 316</p> <p>Phrenitis. 318</p> <p>R</p> <p>Risus Sardonicus. 313</p> <p>Reminiscencia quomodo fiat. 317</p> <p>Ronchallus Franciscus laudatus. 319</p> <p>S</p> <p>Spasmus Cynicus. 319</p> <p>Strabismus. ib.</p> <p>Sonus quomodo fiat. 320. & seq.</p> <p>Soni velocitas. ib.</p> <p>Sonorum diversitas & seq. 321</p> <p>Sapores quomodo fiant. 322</p> <p>T</p> <p>Tetanus. 312</p> <p>Tremores unde, & seq. 313</p> <p>Tactus vitia. 324</p> <p>Transpiratio & vitia transpirationis & seq. ib.</p> <p>V</p> <p>Vallisnerius Antonius laudatus. 312</p> <p>Vertigo. 316</p> <p>Valsalva laudatus. 323</p>
--	--

I N D E X

T E R T I Æ P A R T I S

M E C H A N I C E S M O R B O R U M .

A	H
A Er potest esse causa Diabeticæ & Diarrhœæ. Aque frigidissimæ potus damnatur. Quando permitti possit. Æquilibrium mixtionis massæ sanguinis quid sit.	pag. 332. 333 333 336
Calor præternaturalis in Sanguine quomodo fiat, & seq.	329
Divisio febrium in intermittentes & continuas.	326
Dolor capitis in febribus.	332
Diabetis causa.	ibid.
Elementa actiosa & elastica quænam sint, & elementa inertia quænam.	326
Elementa inertia majoris inæqualitatis respectu corporum elasticorum cohibere possunt elementa elastica minoris inæqualitatis per aliquam temporis differentiam.	ibid.
Elementa elastica majoris inæqualitatis respectu corporum inertium minoris inæqualitatis nullo modo frænari possunt a corporibus inertibus, unde fit calor sine frigore in febribus continuis.	332
Febrium definitio.	326
Febres fiunt a vitio mixtionis elementorum sanguinis.	ibid.
Fluida alia sunt homogenea, alia heterogenea.	ibid.
Frigoris causa in febribus.	329
Febriles accessiones cur statutis temporibus redeant.	330
Febres Organicæ quænam sint.	328
Quotidianæ regulares.	330
Quotidianæ duplices.	ibid.
Lymphaticæ.	ibid.
Tertianæ regulares.	ibid.
spuriæ.	ibid.
Quartanæ legitimæ.	ibid.
spuriæ.	ibid.
Ephemeræ.	ibid.
Continuæ.	332
Inflammatoriæ.	ibid.
Erysipelatosæ.	ibid.
Lypiricæ.	ibid.
Malignæ.	ibid.
Hecticæ.	333
Gulielmus laudatus.	326
Hermannus Jacobus laudatus.	ibid.
Hepatitis.	330
Lana Franciscus laudatus.	332
Media densitas, media crassities, medium pondus debent esse in statu naturali sanguinis.	326
Michelottus Petrus Antonius laudatus.	328
Morgagnius Joanne Baptista laudatus.	329
Newtonus laudatus.	327
Oscillatio fluidorum juvat, ut minimi canales aperti teneantur.	322
Potiones frigide cur dammentur in accessione frigoris.	333
Ratio reciproca momentorum corporum elasticorum & non elasticorum sanguinis: vel reciproca massarum & velocitatum corporum eorundem, ubi Lectorem monuimus, & Item ratio homologa fluidorum & solidorum.	326. 327 328
Pariter ratio homologa momenti distractionis & contractionis vasorum servandæ sunt in statu naturali sanguinis, & naturali mixtione ejusdem.	ibid.
Sanguis in febribus non semper peccat velocitate, sed tarditate.	326
Sanitas in quo consistat.	336
Sitis in febribus.	331
Sudores in febribus.	ibid.
Vigilæ in febribus.	ibid.
Vomitus.	ibid.
Valliserius laudatus.	333
Verulamius citatus.	328
Wolfius citatus.	330

I N D E X

M E C H A N I C E S M E D I C A M E N T O R U M .

A	S
A Atmosphæræ pressio infertur unioni, nexui & æquilibrium efficiendo, & conservando particularum massæ humorum.	pag. 336
Affricus corporum inter se sunt causæ caloris.	338. & seq.
Aque minerales bibendæ sunt cum moderamine.	343
Adstringentia quænam sint, varis species assignantur, & quomodo agant, explicatur.	346
Cur parva quantitate exhibitæ apta sint magnas quantitates humorum irritare.	ibid. & seq.
Alpinus Prosper laudatus.	349
Animalium fluida habent alia figurata.	337. & seq.
Circulatio sanguinis quot vicibus proxime compleatur singulo horæ spatio.	339
Cantarides cur vesicam lædant.	341
Cordialia non cordi tantum, sed etiam Cerebro, & Cerebello succurrunt.	347
Quænam sint cordialia.	ibid.
Quo tempore exhibenda sint.	ibid.
Cordialium abusus damnatus.	ibid.
China China quomodo operetur in febribus superandis.	349
Juvat concoctioni humorum.	ibid.
Concoctio humorum quid sit, quomodo fiat.	ibid. & seq.
Concoctio a quibus indicatur.	ibid. & seq.
Distractioni fibrarum est proportionalis contractio earundem in statu naturali.	336
Diuretica varii ordinis quomodo operentur.	343
Diuretica valida semper caute adhibenda.	344
Diaphoretica quænam sint, & quomodo operentur.	ibid. & seq.
Quomodo diaphoresis excitetur ab externis.	345
Caute tentanda.	ibid.
Elementa actiosa, & elastica quænam sint, quænam inertia, & non elastica.	334
Ægrotudo reddit animal vel in toto, vel in parte inæqualiter leve, inæqualiter grave, inæqualiter laxum, inæqualiter calidum, & inæqualiter frigidum.	336
Effluvia corporum habent minimas figuras similes figuris corporum majorum, a quibus emanant.	337
Fibræ primo simplicissimæ, deinde magis compositis fiunt.	334
Sunt repletæ fluido, ex quo nutriuntur, conservantur, & moventur.	ibid.
Impellunt fluida æqualia temporibus æqualibus in statu naturali.	336
Motu elastico donantur.	ibid.
Fibrosus compositus consideratur cylindricum, aut quasi cylindricum.	334
Figuræ herbarum ostenduntur a Fracastoro in Operibus Malpighii.	337. & seq.
Fluida moventur motu spirali in canalibus.	338. & seq.
Hellenium cur mures occidat.	341
Hypocacuanna quomodo dysenterias curet.	348
Lymphæ cur minus incalescat quam sanguis.	338
Lavagnolus Bartholomæus laudatus Professor Patavinus.	349
Mixtio particularum sanguinis faciendæ est in ratione reciproca, aut quasi reciproca earum, ut unio nexus, & æquilibrium fiant inter se in statu naturali.	337
Medicamenta emittunt effluvia, & qua ratione agant in fibras opere superficierum.	ibid.
Agunt opere figurarum.	ibid.
Agunt opere motus, & elateris.	338
Agunt in ratione composita molium, ponderum, figurarum, motuum, & elasticitatum.	ibid.
Medicamenta dividi possunt in partes minimas.	ibid. & seq.
Medicamenta purgantia cur aliquando electivè purgare videantur.	341
Mercurius cur palatum laceret, & salivam promoveat.	ibid.
Medicamenta specifica ut Hypocacuanna, China-China quomodo agant.	348
Mineralia suas habent figuras.	337. & seq.
Mixtio humorum feliciter fit per lineas spirales.	344. 345
Morgagnius Joannes Baptista Professor Patavinus laudatus.	329
Nux vomica cur canes occidat.	341
Opiata cur ligant fluida, & solida.	345
Cur aliquando dissolvant, & sudores promoveant.	ibid.
Ut sine noxa operentur quid agendum.	ibid.
Proportio reciproca momentorum particularum sanguinis, aliorumque fluidorum inter se; homologa proportio fluidorum, & solidorum inter se; & inter solida unius generis, & solida alterius habendæ sunt, ut habeatur unio nexus, & æquilibrium actionum, & reactionum in statu perfectæ sanitatis.	336
Purgantia cum plurimas materias promoveant per intestina.	341
Penetratio corporum facile obtinetur per lineas spirales.	344. 345
Præparatio humorum faciendæ.	342. & seq.
Ramosæ superficies corporum quomodo agant contra fluida, & solida, & quomodo adstringant.	349
Renum morbi quomodo fiant.	344
Sanitas in quo consistat.	336
Sanguinis massa quomodo successive densior reddatur in canalibus arteriosis.	ibid.
Sanguis in venis non amittit motum æquabilem.	ibid.
Sustinet unitatem, & nexum tam in arteriis, quam in venis.	ib. & seq.
Sanitatis status reddit animal æquabiliter leve, æquabiliter forte, æquabiliter constans, æquabiliter mobile.	336
Superficies medicamentorum leves, molles, & laxæ quid agant.	337
Asperæ, & inæquales quid operentur.	ibid.
Succulatæ abusus damnatur.	348
Torti Franciscus laudatus.	349
Vomitum quomodo fiat.	341. & seq.
Cur expedite, & prompto materiæ in vomitu per Œsophagum ascendat.	343
Cur aliquando specificæ materiæ evomantur reliquis retentis.	ib.
Vomitoria quibus exhibenda, & quibus prohibenda.	ib.
Urinæ oleosæ cur eveniant, & quomodo cognoscantur.	344
Valliserius Antonius laudatus.	303

S U P P L E M E N T U M
O P E R U M
M E D I C O R U M
T H O M Æ S Y D E N H A M .

SUPPLEMENTUM

OF THE

MUSEUM

THOMAS SYDENHAM



LECTOR.



UM nihil antiquius nobis in animo sit, quam bene de te, benigne Lector, deque eruditis Viris mereri, atque in unum hoc enitatur, ut non minus in horum utilitatem, quam commodum gemere nostra praela non desinant; hinc factum, ut nihil intermiserimus unquam, quod nostrum hoc studium magis magisque valeat usquequaque testari. Postremam igitur nostram editionem Operum doctissimi Viri THOMÆ SYDENHAM, Genevensis altera subsecuta novos exhibuit hodieum ineditos Tractatus Medicos, qui, quoniam Doctorum Virorum votis desiderari possent in hac nostra, quam alioqui accuratissimam tibi donare curavimus. Quapropter bono animo illos ipsos Tractatus hic in calce hujus Operis accipe insertos, nostros labores accipe, accipe nostros conatus in hoc unum incumbentes, ut tuis & studiis serviamus & commodis.

Tractatus in Genevensi Editione 1736. tractatibus Medicis SYDENHAM additi.

Dn. D. Caroli Friderici Loevv, de Febre Petechiali ann. 1683. Posonii grassata, & cujus descriptionem in Adversariis Paternis repperat, Epistola ad Clariss. Dn. Francisc. Frider. Possinger, Archiatrum Cæsareum.

Dn. D. Andreæ Loevv Historia Epidemica Hungariae, annorum 1688. 1697. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. ab ejusdem filio Dn. D. Carolo Frider. Loevv, Perillustri Lucæ Schroekio, Academ. Natur. Curios. Præsidi, &c. anno 1726. communicata.

Dn. D. Josephi Lanzoni Constitutio Epidemica Ferraviensis, ann. 1729.

Dn. D. Caroli Frider. Loevv, Historia Febris Catarrhalis, quæ ann. 1729. Mense Novembri & Decembri, per Europam Epidemice grassata est; cui accedit Constitutio Epidemica anni 1730.

Dn. D. Caroli Richa Constitutio Epidemica Taurinensis annorum 1720. 1721. 1722.

Dn. Caroli Friderici Loevv, de Febre Petechiali ann. 1683. Posonii grassata; & cujus descriptionem in Adversariis Paternis repperat, Epistola ad Clariss. D. Francisc. Frideric. Possinger Archiatrum Cæsareum.

VEniam dabit audaciæ meæ, qua ardua negotia turbare non sum veritus, par fastigio Tuo humanitas: tanto facilius, quo majori fide Tibi affirmare possum, non alia causa, quam Pietatis lege impulsus me ad hoc inscriptionis genus accessisse, ut extaret aliquando gratæ mentis documentum, pro illo insigni favore Tuo, quo Tibi me dudum tam in publicis, quam privatis consiliis reddidi obstrictissimum. Non facile succurrebat, qua ratione Tibi grati animi pietatem probarem: nihil ex propria suppellectile, quamvis plurima esse offerrent, ad dandam erga Te mei significationem, dignum esse censui: urgebat interim, quia relatum me gratiam affirmare non audeo, habendam saltem, & quavis ratione declarandæ gratiæ officium. Malui proinde ex re, non tamen prorsus aliena, nempe beati parentis, Virtutum Tuarum veneratoris, laboribus, aliquid depromere, quod Magnifico Tuo Nomini sacrum simul animi referendæ gratiæ cupidissimi publicum esse documentum. Suscipe igitur serena fronte historiam morbi petechialis, qui anno 1683. Posonii epidemice grassatus est, a Parente meo pie defuncto, sollicitè conscriptam, Illustrique Nomini Tuo inscriptam in lucem publicam emittendam. Si quantum per occupationes Tuas gravissimas licuerit, hanc qualemcumque publico bono destinatam opellam perlustrare volueris, invenies forte non plane contemnenda, & digna, quæ in publicum emittantur. Fiet autem hoc eo felicius, si, pace Tua, Perillustri Nomine Tuo sese hoc opusculum multis probaverit. Hujus summa, ut supra monui, est expositio morbi petechialis, qui Posonii epidemice grassatus est, ad fidem scripti, a beato parente relictæ. Initium hujus historice expositionis ducitur ab anno 1683. quo per Dei gratiam soluta obsidione Vienne, regno Hungariæ, misero fatalique bello miserrime afflicto, sigillatim mense Septembr. pax restituta fuit. Tunc vero copiis militaribus hyberne dimissis, & Posonii etiam per suburbia dispositis, mali semina sparsa sunt. Milites enim, quod gregatim in contuberniis arctius collocati erant, omnia squalore, tetra immunditie, & foedis odoribus compleverunt, ipsumque quasi aerem inquinantes, catervatim, & veluti per manipulos in febrem malignam petechialem inciderunt. Morbus brevi invalescens, quam plurimos ex illis consumens, in malum tandem epidemium degeneravit, & in incolas plerosque, sine ætatis discrimine, maxime vero in juvenes, maturæ robustæ ætatis homines, non modo plebejos, verum etiam nobiles & divites, vehementer grassari cœpit, ita, ut ferme nullam domum intactam reliquerit. Incepit morbus hic epidemius mense Novembr. anni supra citati, qui statim horrore artus corripuit, interdum intensiore, interdum remissione, nonnunquam per intervalla recurrente, quem pressio pede exceperit calor in principio levis, qui ægrum primis adhuc diebus vix a negotiis solitis detinuit, interiora tamen occupans sensum auctus est. Ob sanguinis ergo rarefactionem majorem, & noxam visceribus impressam multa statim oriebantur periculosa symptomata, nausea, anorexia, vomitus, cardialgia, sitis, nonnunquam remittens, dolor capitis, vigilie, lassitudo spontanea, quæ symptomata ad iv. diem sensim aucta perdurabant, tanta interea nonnunquam lenitate, ut quamplurimi vim morbi laxatam crediderint,

Supplementum ad Sydenham.

ejusque causam in errorem externum commissum rejecerint. Verum progressu temporis morbus malignitatem suam prodidit, intensissimi calor sui effluvia per totum corpus diffundens, horrendæque producens symptomata. In unico saltem homine mitior vis morbi observata fuit: in blandissimo per totum decursum calore nulla sitis, nullum oriebatur delirium, morbi de solo capitis dolore, & prostratis viribus querela fuit. Cæterorum fere omnium, hoc morbo laborantium corpora quasi incendio fumare, insolito calore gravari ac corripui visa sunt. Hinc observabatur lassitudo & idestatio totius corporis, subita virium prostratio, in nonnullis vigilie diuturnæ, quas statim exceperit delirium, nonnunquam in incremento, non nunquam in statu morbi, aliquando mitius, & per unum saltem diem durans, aliquando ferocius, non nunquam missitando proditum, non nunquam nullum fuit observatum, ut in pistoris cujusdam uxore, nunquam delirio correpta, & tamen die viii. prægressis convulsionibus mortua. Sed præstabat delirium ante nonnum accessisse diem, quam post nonnum; quoscunque enim post hunc invasit, omnes fere mortui sunt. Horum delirium non nunquam degeneravit in furorem, quo agitati surrexerunt, & robustissimorum alioqui hominum actiones ediderunt. In declinatione morbi non nunquam somnus obrepserat continuus, ita, ut ægroti & cibum & potum neglexerint. Sic & mentis emotiones taciturnæ in eo, qui alioqui facultate loquendi pollebat, ut plurimum erant periculose, quale exemplum in saponario quodam habui. Porro somnum ægrotorum plerumque turbabat inquietas nocturnæ: hinc delirare cœperunt, & absurda loqui. Tinnitus & sursurrus aurium ut plurimum in incremento jam huic morbo accedebat, quibus sese auditus difficultas, modo salutaris, modo funesta, collatis nempe reliquis symptomatibus periculosis, adjunxit, ut & oculorum dolor & ardor. Sæpiissime et illis coruscationes varique coloris figuræ observabantur. Vultus, imprimis apud moribundos, ferax fuit. Tremor manuum frequens, sed labiorum continuus, & semper exitialis, & intra xxiv. horas imminens mortis nuntius, quod videre licuit in duobus Viris illustribus, ut aliorum exempla prætereamus. Tremorem autem statim vel sequebantur, vel præcedebant convulsiones, non tamen adeo funestæ, utut periculoso satis indicio floccos legere cœperint decumbentes. Quorum aliqui moribus tandem convulsivis & ipsa epilepsia correpti, violentia morbi consumpti sunt, cujus exemplum præbuit quidam juvenis xxi. annorum, qui post convulsiones incidit in motus convulsivos, & ipsam epilepsiam lv. horas durantem. Curatæ tamen epilepsie huic morbo die xii. supervenientis, & per integrum diem observatæ exemplum habui in juvene quodam pannifice. Ad unum fere omnes caput rotari, seque vertigine laborare dixerunt. Vertiginis inseparabilis comes erat dolor capitis, qui & in artus & lumbos non nunquam sese diffudit, ut ingentes nephritides, uterique affectus adesse crediderint, quod in virgine quadam observavi, causam tamen semper a miasmate maligno infestante sanguinem, quod in majoribus venis & arteriis ad illas partes devolvebatur, deducendam esse duxi. Gustus sæpiissime plane fuit depravatus ac perversus in hoc morbo, ut ægroti non nunquam aquam pro vino biberint, poma citrina pro uvis recentibus, quod meo exemplo testari possum, comederint. Aphonia quoque, non semper tamen lethalis, observabatur, cujus per integrum ferme diem durantis, & tamen curatæ exemplum præbebat quidam juvenis viginti aliquot annorum. Respiratio sæpenumero difficilis fuit, & frequens, expiratio vero non nunquam quasi flammea, quæ semper mala, uti videre licuit in quodam saponario. Pulsus non nunquam, imprimis in principio, sanorum fuit quam simillimus, non nunquam celer, frequens, intermitens, debilis, inequalis, ut sæpiissime judicium de signis morbi prognosticis sefellere.

Erat tamen quoddam genus *pulsus*, quo præfente mortem certo prælagire potuimus, si nempe decumbentes ad contrectationem *pulsus* aut *manus* retraxerint *tremulas*, easque *introrsum* duxerint, vitæ quasi suæ timentes, aut si *tremens*, *palpitans* & *caprizans* observatus fuerit *pulsus*. *Anxietates*, *lipothymie*, *syncope*, in hoc morbo maximum cordi facessivere negotium, ut non nunquam per tres dies iteratis vicibus continuaverint. Tussis non nunquam in principio, ut plurimum in incremento & statu, aliquando *humida*, aliquando *secca*, sese exerebat, quarum posterior peior, & temper malignitatis arguebat præsentiam. Cardialgia correpti, præ dolore ingenti, solum de dolore & gravissima mole pectoris conquesti sunt, existimantes, hoc sublatum, se pristinam recuperaturos sanitatem. Morbi principium semper erat cum *anorexia*, *nausea*; interdum *vomitum*, qui si per aliquot dies duravit, nullisque medicamentis mitigari potuit, neque macularum eruptione superveniente cessavit, *funesti* semper exitus erat signum: aliquando *die septimo* aut *octavo* demum oboriebatur. Sitis in his symptomatibus cum morbo incrementum sumebat; non nunquam tamen ferme nulla, præfente licet ingenti & totum corpus quasi corripiente calore, observata fuit, quod *peffimum* erat signum. Singultu, huic morbo ut plurimum in statu superveniente, plerique, quos sub mea habui cura, sunt mortui, quidam tamen etiam *servati*, ut adeo singultus non semper signum imminentiæ mortis in febribus acutis infallibile sit; ut refert Epiphanius. Ferdinandus. Hemorrhagia quoque sæpissime hunc morbum secuta, *periculosa* primis diebus, & in ipso morbi statu, quod multis exemplis probare possemus, aliquando tamen critica, & sibi relicta, *salutaris*: sed imperitia chirurgorum *die septimo* suppressa, *funesta*. Sequiorem sexum morbus iste duplo gravius affligebat. Pleræque enim hoc tempore *menfes* erant expertæ, aliæ *primis* statim diebus, aliæ *nono* demum die, qui semper exacerbabant symptomata, ut paucissimæ evaserint; *benignior* vero fuit morbi vis in *mensium* fluxu destitutis. Sed nec *puerperæ*, & *gravidae* ab hoc morbo fuerunt immunes; licet non omnibus exitioso. Soror enim mea hac febre epidemiali correpta per Dei gratiam convaleuit, & robustum suo tempore enixa est puerum. Alvus quamplurimis per aliquot dies fuit obstructa, ut eam tandem suppositorio referare debuerimus. Nonnulli ægrotorum jam in principio diarrhæam perpeffi sunt, quæ si nullis medicamentis, ejusmodi afflicti alioqui maxime accommodatis, cedere voluit, *res desperata* fuit sæpissime tamen & in principio, incremento, & statu, remediis rite adhibitis, optimo cum successu sedata fuit, imo diarrhæa critica, *die VII.* cum ægri levamine, quæ infrequentibus diebus sua sponte cessavit, oborta est. Et fateri quoque debemus, fluxum alvi moderatum sæpissime non fuisse attendendum. Sic *vermes* tam in principio, quam statu *ægri* & *ægri* sat longos rejectos in duabus personis, quæ tamen evasere, vidi. Sudores sæpenumero sua sponte apparebant, interdum critici, qui omnes boni, interdum vero *resolutivi*, imminente inprimis morte, qui pessimi; totum enim corpus tunc temporis in vaporem & madorem resolvitur videbatur. Parotides permultis oboriebantur ut plurimum *die XIV.* & per *XIV.* ferme dies durabant, nunquam tamen *lethales*. Adhibitis enim mox sudoriferis per insensibilem transpirationem discussæ sunt, sine omni metu recidivæ. Lingua sæpissime erat fissæ, non nunquam *mucosæ albicantæ indurata*, inprimis adulto jam morbo, quasi crusta quadam obducta, ut etiam *potulentorum*, ob membranarum œsophagi fibrarum a calore ingenti exsiccatarum difficilem constrictionem, laboriosa fuerit deglutitio; aliquando *nigra*, quæ & faucibus peregrinum huncce suum impressit characterem, ut tandem *sphacelo* correptæ & exesæ fuerint, quale exemplum in pueri VII. annorum, hoc symptomatico affecto, & propterea metu dolorum *viginti* ferme dies neque cibum, neque potum, neque medicamentum assumente, habuimus. Exanthemata tandem aliis jam *II.* quod meo exemplo testari possum, aliis & ut plurimum *IV.* in aliis *VII.* erupere die, in aliis non *una vice* exiere, sed *tractu* quorundam dierum; alii secundum quoque eruptionem *die XIV.* experti sunt, cui aliquando superveniebat *vesica* in dorso, nuda magnitudinem æquans, & aquam limpidam continens, *funesta*, quam in Barone de Nobis conspeximus. Erant maculæ, quantum ad colorem attinet, *versicolores*, *rubræ*, *purpureæ*, *fusæ* & quasi *crocei* coloris, *albæ*, ut in *æthiopico* quodam, *nigræ*, *livide*, quæ duæ posteriores *peffimæ*, in primis in dorso, manibus, pectore, pedibus, naribus, non nunquam & facie, quæ non semper *funestæ*, interdum *magnæ*, interdum *parvæ*, *pulicum* morsibus similes, nullum tamen punctum in medio habentes, non nunquam *sparsim*, nonnunquam *conferatim* *miliis solis* & *sudaminum* instar, (*aspredines miliacæ* dictæ,) quæ etiam *malæ*, per septem, octo, novem dies, conspiciendæ. Sed cum morbus hic tam *varius ac multiplex* fuerit, ut non tantum nullo ætatis discrimine sævierit; verum etiam in omnes *sporadicos* morbos, si qui ægrum vexabant, sese transformaverit, ut aliquando *tussim*, sæpissime *catarrhum*, aliquando *colicam*, *podagram*, *pleuritidem*, *febrem tertianam*, servando exactissime *periodicam* exacerbationem, tempore nempe *apyrexias* evanescentibus maculis, ingruente vero *paroxysmo* redeuntibus, mentita fuerit, quis quæso omnia *symptomata*, quibus hic morbus *auctus* & *exacerbatus* est, enarrare queat? Sufficiat ergo, hæc fideliter, prout in *praxi mea* observavi, annotasse. Morbus hic non nunquam cito, non nunquam tardius sua decurrebat tempora, ut etiam *XXIV.* dies, licet rarissime, *funesti* fuerit; *die XII.* ac *XIII.* ut plurimum *graviora* ac *vehementiora* erant symptomata, proindeque accuratius attendenda. Et si vero in Hungaria frequenter est hic morbus, & quotannis observandus, grafari tamen *vehementius* more solito hoc anno cepit, ut ferme in solum contagium, corpora metu atque timore debilitata facilius corripens, rejicere causam ausi fuerimus. Principium quidem huic morbo debere *militæ*, utpote qui temperiem hujus regionis nec observantes, nec ferentes, sed vino nimium indulgentes in morbos inciderunt *malignos*, gregatim deinceps in contubernia arctiora coniecti non modo *commilitones*, verum etiam *inquilinos* contagione infecerunt, quæ latius serpendo & eundo tantas acquisivit vires, ut in morbum *epidemiale* degeneraverit, & plures e medio sustulerit. Anni tempestas malum hoc insigniter fovebat, nempe ut plurimum *humidior*, cum *pluvii* copiosis & fere continuis, *nebulis* foetidissimis, creberrimis toto fere *Novembri*, & *Decembri*, quo tempore *petechiæ* in homines gravius debacchatae sunt. Et si vero *vehementia* frigoris subsecuti mali hujus vim sublatam aut minutam arbitrati fuimus, tantum tamen abfuit, ut cessa verit, ut potius ferme eandem noxam ac *vehementiam*, licet alter *mensis* præ altero fuerit *benignior*, exeruerit, in *mensium* junium usque eam protraxerit, plures non modo familia-

rius cum ægris versantes, verum etiam nullam plane consuetudinem cum infectis habentes, & homines, qui ægrotos visitabant, fugientes, semperque domi quasi fixi hærentes, corripuerit, ut in ejusmodi homines ex sola imaginatione contagium manarit, correptosque sustulerit. Remedium præcipuum ac præsentissimum fuit *Venæ sectio*, a qua & curam semper ordiri, eamque in primis diebus repetere debuimus. Quam primum vero maculæ sese in conspectum dedere, quamvis plerique auctorum, & inter eos præcipuus NEUKRANZ de purp. id suadeant, penitus tamen abstinendum erat ab hoc alioquin præstantissimo remedio. Purgantia, quæ ad unum fere omnes admittunt scriptores, Vomitoria, etiam in principio, nullum hic invenire locum, imo omnes, quibus Purgantia exhibita sunt, brevi post expirarunt; eorum vero exanthemata semper apparebant latiora. Ex iis, qui Vomitoria assumpserunt, paucissimi, nempe ii solummodo, quorum robur nature adhuc erat inconcussum, evasere, in quibus & citius morbus sua decurrit tempora. Expellentia, alexipharmaca, confortantia, cordialia, temperata, v. gr. spec. liberant. sal. volat. C. C. fixat. unio. mar. C. C. philos. præpar. item Emulsionem, mixtura ex *mitbridatio*, confecti. alkerm. & aqua fumar. inprimis tempore *continuarum* *vigiliarum* data, ac sequenti die vesperti iterata, quæ ad somnum placidum ægrotos disposuit, ac deliria mitigavit, lap. bezoar. orient. præcipue ubi cordis anxietates vehementer urgebant, qui miraculosa fere ratione eas statim sustulit, omnes hic tulerunt punctum. Symptomatibus ex proprio fonte erat succurrendum; e contrario calida omnia, quæ majorem excitarent effervescentiam, vitanda. Antimonium diaphoreticum quoties fuit datum, fere semper excitavit diarrhæam; exhibitum vero in febribus malignis sine exanthematibus rarius, facile tamen terr. sigillat. vel mitbridat. sedata fuit. Fœminis, affectibus hystericiis obnoxiiis, extract. castor. præsentissimam tulit opem. Vesicatoria iusto tempore applicata, non modo in aphonia sæpissime ægrotis sermonem reddidere, verum etiam ferociam deliriorum, ac quasi phrenitidos debellarunt. Opiatorum usum, utpote in his regionibus merito suspectum, experiri nolui. Topicis quidem frequenter in perpetuis vigiliis & capitis doloribus, cum successu admiscui. Quod si jam ad auxilium pervenit morbus, sudoribus probe elicitis tandem spec. de gemm. frigid. de hyacinth. cum nitro ordinavi, quorum usum, quousque penitus remisit calor, continuavimus. Confortantia, cordialia, balsama in frequenti usu habui. Restaurantia jacula interdum & noctu aliquoties ægris exhibenda suavi, vini ac cerevisiæ usu omnes abstinere jussi, aquam coctam ex rad. scorzon. C. C. & ras. ebor. sem. fœnic. &c. pro potu ordinario præscripsi. Mutationem linteorum mundorum & indusiorum crebram, et si permittat NEUKRANZ de purp. p. 351. semper tamen ego, ob rationes certas & experientia stabilitas, dissuasi. Visito jam penitus morbo, & viribus aliquantum jam redeuntibus, tandem ad Purgantia descendendi, quibus reliqui excrementitii humores, ne recidiva subsequeretur, cum emolumento ægrotantium expellerentur. Hac ratione quamplurimos per Dei gratiam pristinae sanitati restitui. Hæc, VIR, LECTIONE & EXPERIENTIA CELEBERRIME, sunt, quæ illis temporibus observavi, & bona fide de hoc morbi genere litteris consignavi beatus Parens. Hujus paternæ industriæ monumenta plura possideo, gravissimo Tuo judicio, una cum meis rarioribus observationibus, subjicienda, & si Tibi ita visum fuerit, publico bono non invidenda. Nihil proinde avidius expecto, quam, quod sine Tua molestia fiat, Tuum de hoc instituto consilium. Si Tibi placuisse intellexero, affirmo Tibi, me existimaturum, mihi gravitate judicii Tui, & conatus meos juvandi facilitate id, quod maxime unquam cupierim, contigisse. Quod superest, Tibi CÆSAREÆ NOSTRÆ ACADEMIÆ spes fortunæque commendo, nihil dubitans, quin de hoc meo studio recte & benigne sis existimaturus. Dab. Vienne die VII. Febr. A. S. R. clō lcccxxx.

Dn. D. Andrea Loew Historia Epidemica Hungariæ, ann. 1688. 1697. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. ab ejusdem Filio Dn. D. Carolo Friderico Loew, Perillustri Luca Schroeckio, Academiæ Nat. Curios. Præsidi, &c. ann. 1726. communicata.

ANni tempora, prout variant, suos habere morbos certos jam pridem lib. 3. Aphor. 21. recte annotasse Hippocr. præfente anno abunde confirmavit experientia. Scilicet mense Julii & Augusti cum cælum quasi flammasset caloribus, & pluviarum ferme toto illo tempore expers fuisset, quibus alias intemperies aeris sicca temperanda & corrigenda, Febres solito magis in hac urbe grassari ceperunt. Quarum principia cum horrore, vomitu, nausea ægrum occuparunt, subsequenter statim caloribus, siti, dolore capitis, virium prostratione summa, cardialgia, ut plurimum dies noctesque durantibus, aut biduo post, adhibitis sudoriferis, in intermittentes ut plurimum febres, modo tertianas, modo quotidianas, imo quartanas, per intervalla secundum suum typum repetentes, terminantibus. Tantam autem hæc febres benignitatem in se fovebant, ut raro administratis legitimo modo remediis, h. e. V. S. Anti febrilibus ex card. ben. absinth. centaur. min. lap. cancr. chinchin. arcan. dupl. flor. nitr. aliisque, ultra octiduum sese extenderint, quin penitus remiserint. Non senserunt hæc febres tantum provectionis ætatis homines, verum etiam infantes lactentes & ablactati sine ullo ætatis discrimine. In nonnullis deprehendebantur continuæ, dies noctesque ægrotos affligentes, & V. S. sudoriferis ordinariis, nempe spec. de hyacinth. antim. diaph. spec. de gemm. frig. mixtura mea ordinaria &c. confortantibus junctis, tractatæ, omnes terminum suum elapso 15. dierum spatio benignissime absolventes. Hisce continuis annumeranda quoque fuit Pemphinx, vulgo Nessel. Kranckheit dicta, tunc temporis grassata, quæ ægrotos, (qui quasi urticæ uræntis vim essent experti,) excruciatum pruritum, tumore permagno variæ magnitudinis in toto corpore, modo imperialis, modo floreni, modo grossi, modo totius cubiti, superficiem cutis occupante, eamque in vesicas non adeo rubras, sed magis albas attollente, mox redeunte, aliisque symptomatibus febres continuas malignas alias concomitantibus. Quæ febris licet aliis temporibus benignissima adhibito sudorifero intra biduum remittere soleat; nunc tamen admodum maligna more continuarum sua decurrit tempora, propinatis autem medicamentis diaphoreticis, expellentibus temperatis &c. DEO benedicente apud omnes felicissime xv. die superata. Observavimus etiam, quod notatu dignum & perrarum, tunc temporis certam febrium speciem, quæ fuit complicata ex febre quotidiana continua

tertiana, una die binas habens exacerbationes, altera unicam, quam *Hemitriticum* appellare placuit. Fuit absque horrore, cum continuo calore, ingenti præcordiorum compressione, ut de continuis constrictionibus pectoris conquesti fuerint, siti inexplebili, intensioribus tamen hisce tempore exacerbationis, cum vigiliis, deliriis, diarrhoeis, in primis virium prostratione summa, ut semper animi deliquia metuenda fuerint. Febris hæc admodum periculosa continua ingentem reconditam habuit malignitatem; quapropter more aliarum febrium malignarum, v. gr. *V. S. sudoriferis, expellentibus, confortantibus mixtis, ordinariis*, ratione tamen habita symptomatum urgentium, tractata felicissime intra xxi. dies fuit sublata atque ejecta superflite quidem adhuc aliquali pectoris compressione, *Laxativo* tamen medicamento sub finem exhibito penitus sublata.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1697.

NON quis annus quovis sovet morbos, multo minus una eademque symptomata. Prout anni variant tempora, aerisque tempestates, sic quoque morbi, qui nunc benigniores, nunc peiores, multorumque funerum nonnunquam causæ existunt. Hoc jam dudum observavit, ac *toto libro III. Aphorismorum* nobis demonstravit maximus Græciæ Doctor, *Hippocrates*. Et quis non videt, diversum aeris statum humores modificare morbificos, eosque dispo- nere, pro diversitate locorum aliarumque circumstantiarum, ad producenda symptomata, quandoque graviora, aliquando mitiora. Id videre licuit *anno 1697. quo hyemem rigidissimam* experti sumus. Produxit intensissimum illud frigus non solum *varios pectoris morbos, catarrhos, coryzæ, gravedines, tussisque vehementiores*, & transpiratione impedita, lympham disposuit in coagulum pronam; adventante *vero*, liquatisque macrocosmi humoribus, lymphæ hæcenus torpida apud plurimos varias subiit mutationes; inde in quibusdam febres tertianæ subortæ, in plerisque febres continuæ, pleuritides *spuriæ, malignitatis expertes*; in plurimis, in primis *sub finem Aprilis, Maii, Junii, Julii*, quo tempore magis effusionem biliosæ ob excessivum calorem ambientem notabantur, febres petechiales *Epidemicæ*. Referam ex morbis, quos hoc anno perlustravi, solum præcipuos. Inceperunt petechiales more solito cum rigore, caloribus p. n. siti, anxietate præcordiorum, quandoque vomitu, doloribus capitis, infueto artuum languore, sine causa manifesta, cum insigni extremorum lassitudine, ut plurimum quarta, aliquando septima demum die maculæ effloruerunt petechiales, in quibusdam copiosiores majoresque, in quibusdam minores ac parciore. Deliria sexto jam, septimo, octavo morbi die supervenientia, boni fuere ominis. In illis enim decima quarta vehemens notabatur obscurdescencia, & decima quinta caloris, adeoque morbi solutio. Si serius, v. gr. 10. 11. 12. contigerunt deliria, atrociora symptomata, nec non malignitatem prænuñciarunt summam, nullusque expectandus fuit motus criticus, sed paulatim solutio. Observavi hoc in quamplurimis, in primis Cive hujus loci primario, ex itinere sexta morbi diere- ducere. Septima adhibito uno vel altero medicamento expellente, *bezoardico*, vidi corpus petechiis copiosissimis rubris conspersum, eodemque die notavi summam in somnum propensionem, vix non dispositionem lethargicam. Vescatoria quippe aliquot applicata æ- grum a somno abstrahere non valuerunt, & excitatus licet quan- doque comederit, medicamenta expellentia, sudorifera, epileptica, confortantia sedulo assumpserit, subito nihilominus in somnum re- cidit, salva manente respiratione; accesserunt 10. die deliria: ex- citatus enim ex suo profundo somno, & interrogatus minus appo- site, minus ordinate respondit, desubito in somnum relabens. Die undecima & sequentibus supervenerunt motus convulsivi, diarrhœæ, involuntarius urinae fluxus, summam, symptomata exitiosa. De- cima quinta calores p. n. observavi longe remissiores, pulsum natu- rali similem, somnum autem adhuc profundum. Si exuscitatus fuit patiens, neminem agnovit, torvis oculis vidit, ad interroga- ta mullando, minus intelligenter respondit, floccos frequenter le- gere continuavit. Morbum igitur hunc in pessimis signis constitu- tum ex *Hipp. Coac.* nec non 2. *Aphorif.* 27. difficillimum ac pericu- li plenissimum pronunciaui. Decima septima demum die, suborta obauditione, ad se rediit, stupidus quidem & obliviosus, præteri- torum immemor, vires tamen brevi resumpsit. Vidi in alio subje- cto, eundem morbum in optimis signis constitutum, duodecima, rarioribus tunc temporis existentibus jam maculis petechialibus, produxisse pustulas miliares, parvas, albas, acuminatas, innumeras, excessivam sanguinis ebullitionem, nec non malignitatem latentem prodentes, & 15. die, prægressis vix momentaneis convulsionibus, funestas. Observavi, malum hoc fuisse *epidemicum*, nullumque ata- tis habuisse discrimen, juvenes vero puerisque frequentius invaluisse, ac contagium in domo detulisse, aut substituisse, donec in reliquis fere omnes sævit. Qui valetudinis salutisque suæ solliciti fuerunt, ac in tempore, speritis præposteris medicationibus, meam postula- runt curam, ad unum omnes convalescerunt. Incepi, prævio unico sudorifero, pro ætatis diversitate prima & secunda jam die a *V. S. in brachio*, quam sequenti die pro rei exigentia in pede, ante exanthema- tum eruptionem, repetii. *Alexipharmaca*, (malignitatis enim hic summa est habenda ratio. *sudorifera ex spec. de hyacinth. Liberant.* & *diaphor. C. C. philos. prepar. lap. bez. orient. mithridat. &c.* mutatis mutandis, singulo octiduo exhibui cum sudoris imperio. Quam- primum mentem adverti vacillantem, imminens delirii prodromum, Vescatoria, nuchæ pedibusque imponi jussi, abdidique pulve- ribus sudoriferis confortantia, nec non epileptica, v. gr. pulv. epilept. *March. unicorn. man. specif. cephal. Mich. mag. ungu. alc. perl. &c.* Ni- mis vigiliis ac deliriis summis mixtura mea ex mithridatio cum *conf. alkerm. pulv. epilept. de gemm. frig. aut analept. &c. Syrup. papav. in aq. solut.* ut plurimum vesperi, & quidem cum fructu obviam veni. *Alvi fluxum stypticis* quandoque singulo trihorio aut quatrihorio exhi- bitis compescui: obstructionem enematis sustuli. Cum calores p. n. decrevere inceperunt, quod sæpissime sub initium decimi quinti diei contigit, contentus fui solis pulveribus præcipitantibus, v. gr. *spec. de gemm. frig. & analept. C. C. philos. fl. nitr.* quotidie semel aut bis in usum vocatis. Vinum ac cerevisiam prohibui, concessique solum aquam ex *raf. C. C. ebor. sem. fenicul. rad. scorzon. coctam*. Reliquis sym- ptomatibus ex suis fontibus prospexi. Sub initium quartæ septima- næ, appetitu jam redeunte, ne in priorem morbum reciderent, dedi *Laxativum*. Et hac methodo, DEO sint laudes, omnes pete- chiiis etiam pessime decumbentes, excepta unica persona, servati

Suppl. ad Sydenham.

sunt. *Morbilli* mense *Junio, Julio*, omnes fere pervaserunt domos, & observavi illos *epidemicè* grassatos, primis quatuor diebus ut plurimum gravissimos, apparente efflorescentia, quæ elapso quatri- duo evanuit, levissimos. Quibus legitima adhibita fuere remedia, expellentia nempe, sudorifera, v. gr. pulv. alexit. lap. bez. C. C. philos. unicorn. mar. omnes stando quasi ac deambulando detractati, et- iamsi convalescerunt, elapsis aliquot septimanis evaserunt. Qui in cura sunt neglecti, aut inamantis, aut in febrem inciderunt *exanthematicam*, (quam *Rossiam* nominare solemus; & consistit in maculis rubris, latissimis, in toto corpore densissimis, erysipelas quasi universales referentibus, post quartum diem evanescentibus; & squammularum instar decidentibus, cum ægrialleviatione,) cum caloribus continuis, siti magna, aliquando deliriis, nemini exitio- sam; aut reportarunt tumorem flatulentum totius corporis, perinultis funestum. Notavi simul, quando unus aut duo in domo morbillos superarunt, decimo demum quarto aut quinto alios ejusdem domus in ægotantium locum successisse, adeoque morbillosum contagium serpens a 14. in 14. delituisse ac substituisse. Mense *Junio, Julio*, frequens fuit *Icterus*, cum aliquali alteratione, appetitu dejecto, nausea, siti, oris amaritudine, deturpato cutis, inprimis oculorum, colore, pruritu, urinis croceis, cerevitiæ brunaceæ similibus, turbidis, excrementis quandoque flavis, copiosis, sæpissime albis, cine- ricis. Obstructionem ductus choledochi referavi, bilemque in mas- sam sanguineam, ac in habitum corporis jam derivatam reduxi; ejusque acrimoniam salino-sulphuream excessivam correxi *aperienti- bus salibus ex pulv. hepat. Tart. Vitriolato, sale cichor. acetosell. additis granis aliquot diagyridii*. Instar omnium fuerunt *acidule Croaticæ*, qui- bus bilem sufficienter diuini, atque felicissime spatio 2. aut 3. hebdo- madarum ictericos restitui. Præter *hydrapes, calculos, podagram, arthritides &c.* tempore autumnali more soluto, *Quartana* prodiit con- tumacissima, quam, si *Vena sectione, purgatione*, diebus paroxysmo- rum instituta, nec non medicamentis *Antifebrilibus chinatis* ter aut quater exhibitis infringere nequivi, reliqui intactam, optime gna- rus, multitudine atque frequentia medicamentorum facile ad *Ca- chexiam ac hydropem* disponi, adeoque magis destrui. *Natura* igitur opus hoc commisi, atque expectavi æquinoctium vernale, quo tem- pore natura, uno vel altero medicamento adjuncta, quandoque per se febrem hanc felicissime subigere solet.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1699.

DE Japonibus scribit *Wilhelmus ten Rhyne, Dissert. de Arthrit.* in suis notis, p. m. 92. quod quidem pestem ignorent, vario- las tamen timeant, cum ipsis maxime sint contagiosæ, atque sæva & multiplici hominum strage illorum terras depopulentur, ut ma- jor etiam mortalium pars his in Japonia aliquando succumbat, quam peste alibi, atque idcirco præ labis istius metu, parentes li- beros, mariti uxores, & quæcunque dulcia sunt vel sanguinis vel thori pignora, relinquunt. Unde japonæ & Sinæ liberis dotati, ubi interrogantur, quot soboles alant? regerunt totidem, quot va- riolis jam laborarunt; reliquorum enim vitam in ancipiti locant, adeoque inter permanentes proles non numerant. Idem responsum fere a nobis hoc anno nonagesimo nono tulissent *Curiosi*, si ex uno alterove quævisissent, quot filios aut filias habeat? Tot nempe, quot jam variolarum virulentiam superarunt. Etsi enim apud nos *Variolæ* non adeo aliquando observantur funestæ, hac tamen hyeme australi, tepidiori ac humidiori plus minus existente, illæ, pestis in- star, in infantes & adulescentes furere cœperunt, eosque pro diversi- tate tempestatum, magisve vel minus maligni ætheris, nec non hu- morum in corpore existentium, varie affecerunt. Inceperunt mo- dico cum horrore, quem excepit calor intensus, pulsus foris, o- culi turbidi, sitis intensa, aliquando jactatio iniqua, stertutatio frequens; nonnunquam jam primo aut secundo ebullitionis diæ ap- paruit una vel altera pustula in facie, dorso, ut plurimum vero sub finem tertii aut quarti diei eruperunt variolæ, primum rubræ, exi- les, rotundæ, figura nempe, colore & magnitudine regulari, cum febris symptomatumque, etiamsi hæcenus fuerint gravissima, atque nervoso generi periculosissima, remissione, aut notabili diminutio- ne. Hæ turgidæ maturaverunt brevi, jussuque tempore exaruerunt jam incrustatæ. In quibusdam subjectis pustulæ fuerunt admodum raræ, solito tamen majores, hinc inde sparsæ, valde discretæ, ita quidem, ut iisdem affecti in lecto vix contineri potuerint, quin deambulare voluerint, si ipsis concessum fuisset, quæ variolæ mi- nissimæ ac benignissimæ fuerunt. *Diarrhœa* nec non *hæmorrhagia na- rium*, diebus ebullitionis suborta omnibus saluti fuit, detracta nem- pe nimium quantum ebullientis ac æstuantis sanguinis, nec non se- minii variolosi parte, quod reliquum fuit varioloso fermentum faci- lius, in primis jam laxatis venarum spatiis, evolvi, digeri, ex- pellique potuit, & in his variolas observavimus discretas, raras, benignissimas, saltem hinc inde sparsas. Qualis enim status humo- rum ebullientium in corpore, in primis in centro, talis quoque se- exseruit & effloruit in extremis, habitu corporis; unde quo peior materia bulliens, eo periculosiores & deteriores variolæ. Sic spi- ritus quandoque a miasmate varioloso irritatus magis, quam oppres- sos observavimus, qui magno sæpe conamine quiquilias suas ad cu- tem amandarunt, serumque virulentum repurgarunt felici eventu, tuberculis tam magnitudine, quam colore & figura regularibus ena- tis. Notavimus e contra spiritus a miasmate hoc varioloso diebus jam ebullitionis obrutos ac fere oppressos, ut amplius sese sufficienter ex- pandere nequiverint, multo minus inquinamenta variolosa excute- re potuerint. Remansit ergo miasma virulentum in massa sangui- nea, quam ad coagulum disposuit. Tangebatur quidem cuticula ra- bedine quasi erysipelacea, ac tumore afficiebatur, nulla tamen aut fere perpaucæ apparere variolarum vestigia, potius loco harum rectia jam die maculæ in facie, dorso, natibus, pedibus, manibus, efflo- ruerunt purpureæ, quæ exacte morsus pulicum aliquo modo obsole- tos repræsentarunt, copiosæ, aut diebus ebullitionis, quarta nem- pe, antequam ulla adhuc comparuit pustula, aut ante plenam & suf- ficientem variolarum eruptionem, quæ semper manserunt parvæ, ses- siles, depressæ, confluentes, duræ, septima die lethales. Observaba- tur in his pulsus debilis, catarrhus suffocativus, ob nervos affectos, in- sultus epileptici, subultus tendinum, deliria, maculæ purpureæ, la- tissimæ, ac nigredinem spatio aliquot horarum tendentes, ante, aut post mortem largissimum sanguinis per alvum profluvium. Certissi-

na sane summæ inflammationis in massa sanguinea latentis, nec non instantis sphaceli, adeoque indubiæ mortis indicia. Unam habui virginem octennem, in qua maculæ hæ purpureæ jam disparuerunt, ut aliqualem reconvalescentiæ spem nobis fecerint; at tempore maturationis variolæ confluentes, imprimis in facie, manserunt sessiles, depressæ, duræ, cartilaginossæ quasi, cutis ipsa erysipelate fuit affecta, & intensa rubedine tincta, tumida symptomata novis accessionibus febrilibus fuerunt exacerbata, quæ tandem xv. die funesto terminarunt eventum. Unicum habui puerulum 7. annorum, ejusmodi maculis purpureis una cum variolis correptum, qui hæmorrhagia narium copiosa quarta die suborta a periculossimo atque exitiali hoc malo liberatus fuit. Reliqui omnes his petechiis purpureis laborantes, etiam si ex methodo medendi ordinaria & optima, expellentibus nempe, sudoriferis, alexipharmacis, bezoardicis, confortantibus, nervinis, antepilepticis, v. gr. spec. liberant. de hyacinth. pulv. pannon. lap. bez. orient. pulv. epilept. C.C. philos. unicorn. mar. diascord. Frac. mithrid. conf. alker. &c. tractati fuerint, mortui sunt. Sine dubio a veneno varioloso pestifero sanguinis compages nimis fuit soluta & jam in fluorem conversa, in primis serum acre, virulentum redditum, atque dispositum non solum visceribus, sed & partibus externis, mediante efflorescentia, necrosin induxit funestam. Neque gravior, licet alias naturæ consilio morbis epidemici immuniore sint, quam alii, ab hoc variolarum contagio fuere immunes, imo decubuerunt pessime, hæ semper sexta aut septima die abortum passæ sunt cum magna Uteri hæmorrhagia. Variolæ malignæ ut plurimum inceperunt cum lumborum & abdominis doloribus, qui si cum erupturientibus jam pustularum notis remiserunt, boni, sin minus, mali fuerunt omnis; ut plurimum enim in his variolæ aut non sufficienter eruperunt, aut, si prodierunt, confluerunt, & tempore maturationis depressæ manserunt, sæpe refugerunt & in fauces gulamque copiosæ incubuerunt, catarrhumque lethalem, imprimis circa morbi statum, induxerunt. In permixtis salivarioem in eruptione, & post eruptionem observavimus copiosam, qualis a mercurio absumpto oriri solet. Diarrhœa diebus maturationis oborta, pessima fuit, natura enim jam debilitata, & in negotio maturationis impedita, deducendo aliorum materiam variolosam succumbere debuit, variolis non bene maturatis, quin potius collapsis, aut catarrhis, aut convulsiones supervenerunt funestæ. Respiratio anxiosa, interrupta, vel sublimis, imprimis in morbi statu semper fuit convulsiva, & indubitatum signum malignitatis, quæ nullis medicamentis expelli potuit, quin potius humores in suo motu impedivit, atque sic lethaliorem intulit. Observavi in filio lo trium annorum, tempore eruptionis, die tertia & quarta morbi summam extremorum, pedum nempe, manuum ad carpum usque, nasi refrigerationem, sine ullo sudore, cum pulsu debili, calorem vero in reliquo corpore sufficientem ac præternaturalem. Meum sanguinis recursum, caloris languorem, & necrosin imminenti, adeoque frigus hoc brevi fore morticinum, in primis materia variolosa in centro retenta minusque expulsa, exhibitis tandem expellentibus variis, bezoardicis, nec non linteis calido applicatis, spatio bidui rediit ad extrema calor, variolæque prodierunt copiosissimæ cum summa symptomatum alleviatione, & maturatis tandem variolis, vitæ conservatione. Mense Aprili, Majo notabantur morbillosi, qui, si ex methodo tractati fuerunt, sudorque successit ex voto, in omnibus benigni, neque efflorescentia inflammatoria diutius mansit, quam per quatrimum; quo tempore una cum maculis squamarum ad instar deciduis, calor cessavit penitus. Observavi autem in quibusdam morbillosam hanc inflammationem effloruisse in dorso & facie ad instar herpetis, cum pustulis splendentibus, mox in rubedinem morbillosam ordinariam variæ figuræ abeuntibus. Fuerunt exanthemata hæ morbillosa mali moris, adeoque in cura probe attendenda, & expellentibus, sudoriferis, alexipharmacis sedulo tractanda. Mense Aprili, Majo, Junio frequentes fuerunt febres petechiales malignæ, quæ invaserunt cum horrore levi, nec manifesta sanguinis æstuatione, sed calore mitiori, quem aeris injuriis adscripserunt ægroti, neque crediderunt se ægrotare, donec calor, hæcenus effectum suum occultans, ingravescere viresque vacillare cœperint, ut jam ægroti decumbere coacti fuerint, magno cum damno suo tandiu contranitentes. Accessit anxietas præcordiorum, siris immanis, capitis dolor, vigilæ, scabrities, deliria, aliaque symptomata. Qui ab initio Venæ sectiones admiserunt, inedentumque open implorarunt, atque dicto præscriptove audientes fuerunt, evaserunt omnes; qui vero neglexerunt curam, eamque demum die vi. aut vii. inchoare voluerunt, ii plerumque die xiii. xiv. xv. xviii. xix. mortui sunt. Quicumque a Purgantibus credentes vitium hæzere in Ventriculo, curam inceperunt, ad unum omnes decesserunt, & in illis maculæ observatæ sunt longe majores ac latiores. Qui sudare ad varie assumpta alexipharmaca, diaphoretica, expellentia in incremento & progressu morbi non potuerunt, etiam si bene ac perite, alias tractati fuerint, morui præcesserunt sudores spontanei, copiosissimi, resolutivi. Subsultus tendinum in tangendo pulsu in statu morbi notatus semper exitialis fuit. Convulsiones epileptice, in primis distorsiones in ore & fronte variæ, funestissime. Sensus hebetior, si nempe ægroti se non laborare, sed optime valere dixerunt, manus tremulæ, respiratio difficilis ac frequens difficillima citra faucium tumorem deglutitio inevitabilem pronuntiavit mortem. Maculæ quo tardiores in efflorescentia, eo peiores, unde apud quos die demum septima, aut nona, prodierunt, ut plurimum observabantur funestæ, secus, si jam quarta eruperunt. Eadem ex rubro colore tendentes in lividum, nigrum extremam sanguinis eruptionem indicant. Circa Solstitium, mense Junio, morbus hic fuit pessimus multisque exitialis. Causa hujus febris petechialis malignæ, cum calor sæpe, in primis in inirio, non adeo sævus fuerit in prava & maligna indole quærenda fuit, quæ citra insignem calorem vi sua corrodente partes corporis fluidas & solidas corrumpit, dissolvit, destruxit, ac violentia sæpe materiam expulit, modo per alvum, crisi imperfecta ac funesta, modo per insensibilem transpirationem, ubi ægroti, in primis sub finem, sudoribus fere diffuserunt, qui resolutivi, pessimi. Sanguinem igitur ac serum in hoc morbo coagulari ac incrassari, sæpissime ex sale corrodente maligno summam contrahere acrimoniam, ex symptomatibus abunde claret.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1700.

Hoc anno infueta fere fuit aeris intemperies. Mense Januario, & Februario temperatum frigus extitit; mense Martio, nec non Aprili fere toto tempestas nivibus & gelu sævit, quo tempore grassari cœperunt febres continuæ exanthematicæ, solis confortantibus, blandissimis diaphoreticis remixtis, tractandæ. Etenim, qui more solito assumpserunt & continuaverunt, sudorifera, ex spec. de hyacinth. Liberat. & diaph. & volat. C.C. mithridat. illi omnes viribus, exinde exhaustis, & convulsionibus subortis migrarunt ad superos; qui vero in principio tractati sunt Venæ sectione, deinde blandioribus diaphoreticis, ut plurimum tamen confortantibus & epilepticis, v. gr. pulv. epilept. M. spec. cephal. pulv. analept. mag. gran. kerm. perlar. C.C. unicorn. mar. convaluere omnes. Calores non adeo intensi fuerunt, debilitates vero summæ cum vigiliis, sudoribus spontaneis, pulsu celeri, frequenti, tremoribus, nec non motibus convulsivis. Mense Junio, Julio plures pluviosæ notabantur dies, quam serenæ; mensis Augustus & medius September fuere serenissimi, calidissimi. Reliquo medio Septembri & toto mense Octobri tanta pluviarum fuit frequentia, ut post hominum memoriam his mensibus visæ non fuerint crebriores. Si enim de die non pluit, certe nocte pluit, imo post 14. dies pluviosos vix duo sereni apparuerunt, quos statim pluviae exceperunt continuæ. Per has igitur infuetas anni constitutiones sævierunt Typhes, rheumatismi, febres, in primis quartanæ, quæ in vicinis nostris locis fuerunt epidemica, apoplexie ipsæ; apud infantes frequentes fuerunt variolæ erraticæ. Senes experti sunt debilitates summas instar febrium continuarum, sed benignarum, recurrentes, quæ solis confortantibus medicamentis cesserunt.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1701.

Annus ineuntis hujus sæculi incepit eadem inconstantia, qua ultimus annus sæculum finivit. Januario quippe & Februario frigora uno vel altero die notabantur inrensia, tertio vel quarto valde remissa, unde ex infueta his anni mutationibus ortæ sunt defluxiones biliosæ in brachiis, osse ischii, pedibus, summe dolorificæ, urique sexui infestæ. Rheumatismi hi biliosi sudoriferis neutiquam tractari debuerunt, utpote quorum usu dolores semper exacerbati sunt, meliori vero successu digestivis ex salibus, v. gr. pulv. hepatic. rubr. & cichor. acetosel. & vitriolat. diagryd. sulphurat. quotidie adhibitis obtemperarunt, & intra xxiv. dies evanuerunt. Martius fuit valde benignus, Aprilis vero & medius mensis Maji ob frigora infantibus funestus, hi nempe valde infestabantur Vomitibus, catarrho suffocativo, colicis convulsivis, epilepticis. In Junio nil occurrebat notatu dignum, nisi quod mane hoc & præterito mense rorem in foliis arborum, in primis prunorum, instar mellis, nostrares vocant Honigthau, eumque fructiferum indicare annum credunt, copiosum observaverimus. Julius torus exæstuvavit, nil tamen mali, quod mirum, produxit, nisi febres tertianas, (quæ sexto paroxysmo abierunt,) & in senibus, adultis ac infantibus pustulas, sive exanthemata miliaria, quæ occuparunt totum corpus cum molestissimo pruritu. Causa sine dubio quærenda in efferationibus biliosis, in primis lymphæ ab externo calore valde intenso evocata, sed facile refrigerantibus, v. gr. pec. de gemm. frig. fl. nitr. lap. cancr. &c. & balneis hordeaceis repressa ac contemperata. Toto mense Augusto calores fuere intensissimi, pluviae paucissimæ, fere nullæ, noctes simul calidæ. Jam valde grassari cœperunt febres cum frigore duarum, aliquando rriuni horarum, insecutus est statim calor ultra 40. horas durans cum capitis dolore, siti, virium prostratione, linguæ & faucium ariditate, vigiliis, quandoque deliriis, ut jurasses febrem imminere continuam, sed post adhibita sudorifera. Venæ sectionem, remisit calor atque intermittentem febrem, ita tamen, ut vix aliquot horæ inter paroxysmum & apyrexiam interjicerentur; & sic una febris excipit alteram, afflixitque diu infirmos; rarissime enim ante nonum paroxysmum terminavit. Si Venæ sectione, diaphoreticis & præcipitantibus, cum malignitate non caruerit, rite tractabatur, nulli fuit funesta. Febres hæ maxime sævierunt mense Septembri, quem observavimus calidissimum, sicissimum, sine ullis pluviis. Mensis Octobris incepit cum pluvii, quæ per aliquot durarunt dies, insequentibus mox caloribus infuets, ac vix post hominum memoriam notatis. Continuaverunt æstuosissimi dies per Novembrem fere totum, ita, ut nullus senum tantæ æstatis & autumnii calidi, & constantis recordari potuerit, unde optimum & generosissimum crevit vinum, quod tamen successu temporis minus generosum evasit. Morbi fuere pauci, iique ut plurimum ordinarii. Sub finem Decembris exasperatum fuit cælum, & terra frigore obriguit.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1702.

Ac hyeme permutata quasi videbantur tempora. Frigora intensa solum durarunt ad sextum Januarii diem, septimo supervenerunt pluviae, subsequentibus diebus nebulae, cælum turbidum, mox serena, calida tempora. Toto Februario, exceptis vehementissimis ventis, eadem fuit cæli facies, nullum frigus, nullæ nives, ut plurimum siccitas, serenitas, ut credidisses imminere æstatem; nocturno quidem & maturino tempore quandoque aura observabatur frigidiuscula, sole tamen oriente statim fuit temperata, unde jam medio Februarii habuimus flores violarum, nec non flores cerasorum acidorum. Morbi his mensibus, præter catarrhos frequentes, vix notabantur alii. Martius, qui insecutus est, fuit siccus, quandoque ventosus, pluviae, quæ oboriebantur, fuerunt remperatæ, fertiles. Hujusmodi initium phthificis, hecticis, hydropicis valde fuit funestum. Circa æquinoctium vernale inceperunt copiosæ inter pueros grassari febres continuæ, ut plurimum malignæ, petechiales. Invaserunt illos levissimo rigore, lassitudine spontanea, succedente calore non adeo magno, subinde remittente, sed tertio, aut quarto die vehementius recurrente, quo ut plurimum in conspectum venerunt exanthemata, deliria brevi post comparuerunt, in quibusdam vehementia, & quidem cum vigiliis, in quibusdam breviora, maculæ erant parvæ instar morsus pulicum. Febres hæ epidemica diaphoreticis, præcipitantibus & confortantibus temperatis, non sudoriferis fortioribus, tractatæ, nulli fuerunt funestæ, sed valde contagiosæ. In adultis viris, maculas

et plurimum observavimus *latas*, successerunt statim deliria, convulsionum, epilepsia, & his fere omnibus decima tertia dies fuit exitialis. Duravit epidemica lues in Junium usque, quæ sine dubio magnis siccitatibus cum Hippocr. 3. Aphor. 7. adscribenda. Aprilis plerumque fuit serenus, calidus, subinde ventosus, frigidus. Hunc excepit *Majus* frigore quidem moderato, sæpe tamen, præsertim Borea interspirante, rigidiusculo: fuit variabilis, nunc calidus, nunc turbidus, pluviosus, mox frigidus, ventosus, unde vitis justo tardius & inæqualiter gemmas suas protulit. Frequentes hoc mense fuerunt *arthritides vagæ*, quæ solo reiterato *Laxantium*, minus *sudoriferorum*, usu tractari voluerunt. *Julius* fuit valde temperatis, calidus, ut & *Augustus*, si exceperis imbres & tonitrua horrendo fragore & fulguribus, in primis noctu, mense *Augusto* frequentia, & grandinibus insolitis, quæ aliquoties præsertim die 12. 13. 18. promontoria nostra fere omnia, & quidem optima, valde destruxerunt remixta. Fructus omnes horæi valde fuere insipidi, humidi, & ad putredinem proclives. Unde frequentes habuimus *febres*, primo intuitu *continuas mentientes*, adhibita tamen *Venæ sectione* & *sudoriferis*, tertio & quarto die in *intermittentes tertianas* degenerantes, tandem *precipitantes* & *laxativo* brevi confopitas. *September* comparuit uno alterove die serenius & amœnus, tertius & quartus serenum diei calum noctu tempestuoso tonitru & fulguribus terribilibus fœdarunt. Sequentes dies mox sereni, mox turbidi, pluviosi, aliquando frigidi, in primis noctu, & notavimus circa festum *Matthæi* his pruinas, sed plane innocuas. Hoc mense habuimus *Diarrhœas*, *dysenterias*, quibus adhibitis *rhobarbaro tosto cum myrobalanis*, & dein *adstringentibus ex corall. fl. ferr. cum mithridat.* cito medebamur. *Octobris* quatuor dies initiales fuerunt sereni, amœni, calidi, his quatrduum successit frigidum, ventosum, imbricum, nivofum, autumnii præludium, octava mane gelu & pruina nocentissima folia ac uvæ nondum maturas in omnibus fere promontoriis decoxerunt, & millena damna fecerunt. Jam remittere cœpit frigus, & cælum ad aliquot dies inclauit. Circa *medium mensis* fere octo turbidi, nebulosi, solis expertes, notabantur dies. Tandem circa 20. exortis ventis, nebulisque discussis cæli facies mutari cœpit, æstasque in autumno constans comparuit. Fuit enim ab hoc tempore ad sextum *Novembrem* serenitas, cum frigida tamen aura matutina. Septima tota die pluit, octava nix cecidit ingens; successit horridum gelu octiduum fere durans, quod & botros in copia adhuc in promontoriis existentes vix non in lapides convertit. *Medio Novembris* amœnior aura comparuit, caloreque fortiori nives uvæque glacie adstrictas solvit. Hoc tempore frequentes fuerunt *febres*, quæ nullum servarunt typum, quin potius *febres malignas* mentitæ sunt. Invaserunt cum horrore caloribus primis diebus fere continuis, summo virium languore, capitis dolore, siti, oris amarore, siccitate linguæ. Adhibitis *Venæ sectione* & *sudoriferis blandis*, tertia vel quarta jam die terminarunt in *intermittentes*, quarum paroxysmos *arcano duplicato*, *sale Card. Ben. cort. chin. de chin.* ac tandem *levi laxativo* suppressimus. In his notatu dignum fuit, quod, etiam si valde post febres comederunt, vires tamen per longum temporis spatium recuperare nequiverint. His mensibus copiose grassari cœperunt inter pueros & puellas *variola*, quæ observantur modo *benigne*, modo *maligne* confluentes, depressæ, adhibitis blandis *diaphoreticis*, sanguinem contemperantibus, verbi gratia *pulv. alexit. C. C. philos. pulver. epilept. spec. de hyacinth. unicorn. mar.* aliquando, si exire noluerunt, addito *sale volat. C. C.* nec non *lap. bezoar*, nulli funestæ. Accuratam insuper symptomatum rationem habere debuimus. Sic accidit, ut puerulus V. annorum ex variolis malignis convalescens *gingivis superioribus* repositaverit *ulcuscula*, quæ primo intuitu ab adstantibus pro *aphthis*, *Mundsaule*, judicata & tractata sunt, elapso 24. horarum spatio corrosivitate sua magnam jam maxillæ superioris & inferioris occuparunt partem cum summo fœtore & nigredine, maximoque imminentis *sphaceli* periculo. Adhibuimus frequentiores *injectiones ex decoct. rad. aristoloch. iridis flor. mastiche, thure, mundificantia, balsamica, v. gr. elix. Prop. sine acido, bals. peruv.* quibus tandem corrosivitas, fœtor, nigredo recessit, & puerulus pristinae sanitati restitutus est. Taceo *catarrhos, rheumatismos mense Novembris & Decembris* frequentes. Sine dubio morbi hi ut plurimum ex lymphæ a varia aeris anomalia, nec non erroribus diætæ, v. gr. fructibus horæis hoc anno valde putridis, viscedinem & spissitatem disposita, quæ in sanguine coacta eundem in tumultuarios motus concitavit, deducendi.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1703.

Anni hujus principium aura temperatiori, nivibus stipata illuxit, paulo post successit frigus intensum, quod brevi remisit, et pluvias abiit. *Februarius* gelu sæviit ingens, nivesque ceciderunt sæpissime, mox tamen accedente aura calidiuscula in liquorem solutæ. *Martius* comparuit caloribus amœnissimus, siccissimus, quandoque tamen interveniente Euro, rigidus. *Aprilis* simul præter morem siccus fuit. Habuimus his mensibus ventos vehementes, nives copiosas, quæ terram liquore balsamico sufficienter irrigare potuerunt. *Majus* & *Junius* fuere æstuosissimi cum paucissimis pluviis; unde uvæ circa festum *Viti* jam fere defloruerunt omnes. Hoc semestri notavimus *febres continuas*, non adeo frequentes, nec malignas, sine dubio, ob vinum nimis leve ac tartareum, quod præterito crevit anno, diureticum, minus sanguinem accendens. *Variolas* habuimus in copia, modo *benignas*, plerumque *malignas*, sessiles, depressas, quæ tamen si rite *bezoardicis temperatis, expellentibus, confortantibus, v. gr. pulv. alexit. sep. de hyacinth. antimon. diaph. C. C. philos. præp. pulv. epilept. lap. bez. orient. unicorn. mar. mithridat. &c.* tractatæ sunt, paucissimis, imo fere nullis funestæ. Et licet plurima tum temporis conspicerentur puerilia funera, causata tamen mortis magis adstantium incuriæ & negligentia, aut medicastro-rum præposteræ ac perversæ curæ & imperitiæ, quam malignitati adscribenda. Notatu dignum fuit, me his temporibus inter alios habuisse Comitissam valde sanguineam, corpulentam, jam fere quadragenariam, variolis correptam. Huic sub prima morbi invasione, quæ erat cum rigore, caloribus, cordis compressione, virium languore &c. curavi aperiri *mediam*, præscripsi *bezoardicos expellentes pulveres* more solito, *pulv. alexit. C. C. philos. lap. bez. orient. unicorn. mar. &c.* & ecce præter omnium expectationem tertia & quarta die erupere per totum corpus *variola* copiosissima, sexta ac-

cessit *immodicus mensum fluxus* ad instar puerperæ, retrocesserunt illico *variola*, quæ absque hoc fuere depressæ, sessiles, confluentes, verbo, pessimi moris. Mutavi medicamenta, dedi frequenter *spac. de hyacinth. corall. rubr. terr. sigill. mithridat. mag. smaragd. pulv. epilept. M.* non omittis *confortantibus*. Fluxus hic immoderatus continuavit octiduum, nec *stypticis* sili potuit: durante fluxu *variola* non creverunt, nec ad maturitatem tendere voluerunt, sed confluerunt, majoraque conciliarunt symptomata, etiam si *expellentia, bezoardica antepileptica styptica* semper consideratissime misceverimus; octiduo elapso fluxuque cohibito tandem parvula hæ *variola*, non fastigiata, maturitatem receperunt, symptomata remiserunt, & Illustissima Comitissa a varioloso hoc affectu, periculi pleno, præter omnium opinionem ac spem, liberata est. *Variola* hæ permultorum oculis valde fuerunt infestæ, & modo *inflammationem* reliquerunt pertinacem, modo *humorem deposuerunt contumacem*, ac coagulationi vel condensationi aptum, Priori feliciter medebamur *aquis opibalis micis ex aqu. plantag. rosar. chelid. tut. præp. sach. saturn. posteriori inflatione pulveris subtilissim. ex sach. canariens. antim. crud. lap. scissil. præp. perl. præp. & si opus fuit, Vesicatoriis*. His mensibus varios atque diversos notavimus *hæmopticos*, tam senes, quam juvenes; in quibusdam enim sanguis *αἷμας* & *βλαῖμας* ad aliquot libras sine ulla prægressa tussi excretus est, & in his fere nulla adfuit irritatio, sed sanguis floridus lubricavit sibi ipsi viam, & unica irruptione extravasatus per os affectavit exitum; in quibusdam quasi extussiendo sanguis pedetentim rejectus est, in his sine dubio vala pulmonum fuerunt erosa, & salinæ particula massa sanguineæ in-existentes teneras pulmonum vesiculas stimularunt, inde irritatione facta tussis producta fuit cruenta. His feliciter subvenimus *Venæ sectione* & *medicamentis adstringentibus ex compos. sperniol. Cr. lap. hæmatit. ocul. cancr. trochisc. de spod. de carabe, addito laudano de viribus in refracta dosi*. Si sanguis fuit sedatus, ordinavi *pectoralia traumatica cum solventibus mixta, v. gr. elix. pectorale cum ess. traumatica, nec non decoct. pector. ex fl. & fruct. pector. usitat. item gelatinam pectoral. ex rasur. C. C. ebor. cum herbis pectoral. factam, it. decocta ex herb. alchymill. scabios. pyrol. sanicul. millefol. tussilag. pulm. heder. terrest. rad. tormentil. sem. anis. fœnic. rad. chin. &c.* Mense *Junio* ex caloribus insolitis, nec non ingurgitatione aquæ frequentiori adultiores æque ac juvenes reportarunt *febres tertianas* frequentes, sed sumptis *salibus absint. centa. min. card. ben. cort. peruv. ac tandem purgante* brevi curatas. *Julius* non tam amœnus & serenus fuit, quam pluviosus, nocte dieque frigidus, ventris summe molestus, qui in primis a die quarto ad octavum valde sævierunt, & frumento, quod violentia sua excusserunt, quam maximum intulerunt damnum; circa 24. ad finem usque calidissimi notabantur dies. *Augustus* incepit cum frigore pluvius, quæ hoc mense fuerunt copiosæ, flante tamen austro suos alternavit dies, fuitque variabilis & inconstans. *September* extitit serenissimus, amœnissimus cum insolito aeris fervore, quandoque pluvius intemperiem solis contemperantibus atque terram irrigantibus. *Octobris* primi octo dies fuerunt pluviosi, frigidi simul, hoc tamen non obstante, tertia & sexta die observavimus tonitrua & fulgura; elapso octiduo cessarunt pluvie, & subsolanus superveniens radiis solaribus non solum terram madidam siccavit, sed & botros a nimis pluvius jam putrefactos valde exsiccat, illosque in pulveres fere redegit. Toto *Novembris*, nec non *Decembris* mense cæli temperies notabatur placidissima, ut credidisses verum adesse tempus. Circa natalitia intentum frigus ingruit, terraque congelavit. Frequens hoc semestre *biliosas* notavimus *febres*, quæ cum rigore, mox caloribus, vomitibus, præcordiorum angustiis pueros æque ac adultos invaserunt, primoque intuitu *continuas* mentitæ sunt. Duravit calor ut plurimum 40. horas cum dolore capitis, siti vehementi, ariditate linguæ ac faucium, adhibitis vero *Venæ sectione, diaphoreticis*, remisit, & in *ordinariam tertianam* cum *apyrexia* degeneravit, atque *antiseptibus salibus*, nec non *chinatis* rite tractata sexto paroxysmo cessavit. Memini, me plurimos habuisse, qui octavum sustinuerunt paroxysmum, & hi ex febre reportarunt *icticum*. Calor hic non adeo flavus, sed saturatior & fuscus fuit, sine dubio a particulis acribus, biliosis, sulphureis, quæ copiosius in sanguine collectæ tandem in habitum corporis sese diffuderunt, cutemque deturpato imbuere colore. Alvus in his omnibus sufficienter suo fungebatur officio, porum choledochum in duodeni & jejuni confinio non fuisse obstructum. His feliciter, & quidem intra paucos dies medebamur *pulveribus ex sale cichor. arcan. dupl. aut tart. Virriolat. spin. salis coagulat. pulv. hepat. additis non nunquam aliquot granis diargyd. sulphurati*. Verissimum itaque est *Dioclis* monitum, notante Celfo, prodesse nempe *icticum*, si post febrim oritur. His temporibus aliquos notavi *cachecticos*, nec non *hydropicos*, qui in *icticum flavum* inciderunt, quorum superiora corporis marcescebant, & mirum in modum flavescebant, tumentibus interim inferioribus & abdomine. Vesiculæ in horum pedibus obortæ stillabant liquorem summe croceum. Causa sine dubio salibus lixiviosis sulphur sanguinis ita modificantibus adscribenda. Cura ad tenacissimas obstructions tartareas, & dyscrasiam viscerum dirigi debuit, & profuerunt in specie *martialia, pulvis cachecticus, Tinct. mart. aperit. Myns. spir. aperit. Penot. Purgantia* singulo octiduo semel exhiberi debuerunt, v. gr. *Recipe pulv. rhubarb. ʒi. jalap. ʒss. ʒ absinth. gr. vii. g. g. gr. ij. ol. mac. gttj. M.* Quod si venter a *laxantibus* observabatur detumescere, bis cum successu singula hebdomada pro exigentia symptomatum & ratione virium propinari potuerunt; sin tumor post purgantium usum in eodem statu mansit, aut infirmus naturæ ductu frequentes defectiones sine alleviatione habuit, abstinendum fuit a purgantibus. *Diuretica* in casibus alias omnem absolvere videntur paginam, hic tamen cum summo judicio & discrimine adhiberi debuerunt, & si unquam, certe hic, urinæ status probe considerandus fuit. *Urina cruda, alba, tenuis* testabatur de sanguinis textura valde laxa, & hæc pro medela requirebat *salia lixiviosa*, ut pote *sal. stipit. fabar. ononid. junip. ebul. absinth. tart. virriolat. spiss. sal. coagul. &c.* *Urina rubra* docuit sanguinis texturam esse valde strictam, atque abundare salibus lixiviosis, unde præscribi debuerunt *salia volatilia, v. gr. succin. ʒ volat. tartar. buson. lumbric. terrest. in primis amara decoctum ex herbis, absinth. mij. eupator. mar. ʒ ʒss. hacc. junip. mij. rhapont. ver. ʒss. m. pro infuso &c.* *Scroto tumenti* maxime profuit decoctum ex fol. *rus. absinth. menth. mil. cumin. cum vino* factum, & cum spongia calide applicatum.

Febres petechiales, quæ observabantur, fuerunt valde benignæ. Alias, præter morbos ordinarios, *catarrhos* nempe; *tusses*, *raucedines* &c. nil memoratu dignum occurrat.

Constitutio Epidemica Sempronensis Anni 1704.

In Annuarius ineuntis hujus anni totus fuit valde frigidus, nivofus, *Februarius* e diverso præter morem temperatus, ut plurimum serenus, aliquando pluviosus, aliquando ventosus, quandoque nivofus. *Martius* incepit cum intenso frigore, solis tamen splendore atque serenitate temperato, quinta nix cecidit copiosa, quæ sexta jam in liquorem abiit, septima supervenit tempestas tumultuaria, valde nivosa, octava dies fugatis nubibus purgatoque aere mira illuxit serenitate, quæ tempestas pulcherrima, ventis mitioribus remixta, sicca, non solum ad æquinoctium vernale duravit, sed & uno quasi tenore in *Aprilē* usque continuavit. Imo *Aprilis* sua natura alias variabilis, hoc anno fuit amœnissimus, serenus, siccus, absque pluviis fere, cum caloribus ad finem usque prope æstivis: die 27. tonitrua & fulgura ingentia cum pluviis habuimus, sol tamen nubila mox serenavit, unde arbores justo citius folia & flores emisserunt suos. Tertia mensis *Maij* dies incepit cum pluviis, quas secuta sunt frigora, & quinta pruina matutina, quæ vineis nostris maximum damnum intulit, alias totus mensis fuit serenus, calidus, siccus, ventosus. Successit *Junius* serenissimus, siccissimus, pluviarum expertus, ventis tamen mixtus. His mensibus, imprimis superioribus, Morbona. æque ac Belona apud nos valde sævit. Hungari quippe a Nostris deditio-nem civitatis sollicitantes, sed repulsam reportantes rabie velut accensi hinc inde discurrerunt, nobisque excidium minati sunt. Civitatem d. 18. *Februar.* e longinquo obsidione cinxerunt, eam tamen supervenientibus adversis cæli tempestatibus, nivibus nempe & ventis insolitis, intra bidentium solvere coacti sunt, interim IX. septimanis nos undique tenuerunt conclusos, ut nullus exire ausus fuerit. Milites Cæsarei frigoribus & militaribus laboribus, imprimis tristi esuritione & aquæ potu valde hæcenus debilitati, huc tandem in defensionem civitatis dispositi ad novi defæctique cibi ac vini copiam, quæ miseris nostri large obtulerunt, gravati in periculosos inciderunt morbos, *castrenses* non absimiles. Conquesti sunt de languore totius corporis, nausea, stomachi gravedine, caloribus, siti, dolore capitis, vigiliis, accesserunt deliria, aliquando alvi fluxus, non nunquam petechiæ. Venæ sectio prima aut altera die instituta, nec non sudorifera ex spec. de hyacinth. C. C. philos. lap. cancr. antim. diaph. &c. sæpe in herba suppresserunt malum, unde ægri intra quatuor-duum convalescerunt. Purgantia & Vomitoria, etiam in principio adhibita, non conduxerunt, morbum potius exasperarunt, & malignitatem latentem evocarunt, qua tandem expellenda, imprimis *mithridatum cum confect. alkerm.* & *confortantia* diu continuata sustulerunt. Qui methodo ordinaria fuerunt tractati, evaserunt omnes periculum; qui autem citius justo nosocomiis valedixerunt, etiam si fere nullos in diæta errores commiserunt, ut plurimum in priorem morbum reciderunt. Inter hos unus febre maligna laborans ex delirio furibundus profiliit e lecto, & per fenestram secundæ contignationis sat altè in fluentum præcipitem sese dedit; in aqua hinc inde discurret, defatigatus tandem, & exanimis fere in lectum deportatus alexipharmacis, sudoriferis, confortantibus convaleuit. Morbus hic epidemicus a victu profectus primo mense militibus gregariis inhæsit, brevi post cives, qui curis, laboribus, frigoribus, excubiis diurnis & nocturnis inhiæris defatigati vino horno, generosissimo, dulci, etiam nocturno tempore præter morem indulserunt, invasit, atque in febres malignas petechiales degeneraverit. Sanguis quippe una cum reliquis humoribus ex erratis vitiosam diathesin nactus facillime malignitatem concipere potuit. Inceperunt mense *Februario* cum languore summo, calore moderato, qui in dies crevit, vigiliis, siti intensa, aliisque febrium comitibus symptomatibus. In his si exanthemata prodierunt die quarta, evacerunt omnes rite tractati periculum die XV. secus si maculæ in conspectum venerunt die septima: infirmi enim periculosissime tunc temporis decubuerunt, & 21. demum die mortis periculo liberati sunt. Mense *Februario* valde benignæ fuerunt petechiæ, *Martio* peiores, *Aprili* pessimæ. Observavi in quodam juvene sat robusto petechiis laborante, pustulas XIV. morbi die exeuntes pellucidas, seu crystallinas, partim millii seminis, partim lentis, imo multas pisti magnitudine hinc inde per totum corpus disseminatas, in dorso verò numerosissimas, aqua plena, summe maglinas; intendebatur enim febris cum anxietatibus, cordis compressionibus, convulsionibus; albescente tandem hæ vesiculæ & suppurare cœperunt, hinc exsiccata jam exaruerunt, & squamati circa 21. diem deciderunt, quo tempore pauperculus morti jam vicinus, præter omnem spem feliciter enavigavit periculosissimam hanc charybdin. In feminis semper notavi mensium fluxum, aliquando diarrhœam simul, quæ omnibus fuit funesta. Deliria præmatura fuerunt exitiosa. Sic robustus quidam Vir 45. annorum, quinta morbi die incepit delirare, sexta est mortuus; & femina triginta annorum similiter robusta tertia die delirans, quarta est mortua. Horum sanguis prima & secunda morbi die Venæ sectione extractus exhibuit in superficie pituitam densissimam instar crustæ vix separabilem, & croco quasi tinctam; brevi ante mortem bilis utrinque sese diffudit in totum corporis habitum, singula mortis prænuncia. In febribus hæc malignis frequens fuit attritio aut excoarctio in natibus, non solum a longiori decubitu, quin potius a sanguine suo modo malignitate corrupto deducenda; qui qua data porta, sarcinam suam deponendam & excernendam quæsit. Latuit autem ut plurimum gangrena & sphacelus, caroque tandem adhibitis adhibendis, v. gr. unguentum ægyptiac. ad os usque excidit cum ægrorum levamine. Mense *Februario* morbilli epidemicè grassari cœperunt, qui tamen ex methodo tractati benigni fuerunt, instante æquinoctio verno indies magis invaluerunt, & invaserunt infantes æque adultos, & puerperas, cum horrore, caloribus summis, stillicidio lachrymarum copioso, mordaci, oculorum rubore ac tumore, cum tussi ferina, gravitate & compressione pectoris, maculæ effloruerunt ut plurimum secunda morbi die, aliquando quarta, quandoque septima, & persisterunt quatuor aut quinque dies. Observavi hoc tempore morbillorum tres species, nequulas nempe latas, rubras, sine pustulis, adeoque non elevatas, neque superficiem cutis superantes; altera species cutim solum transparuit, & hæc duæ species inadvertenter evanuerunt, quas vulgus retrocessisse putabat; tertia prodit cum maculis parvis rubris, quæ

in dies auctæ, & supra cutis superficiem modicum elevata rateum-tim coaluerunt, quarumque protuberantia, digito leviter admoto tactu percipi potuit; post quinque dies, morbo jam remittente, maculæ per totum corpus latissimæ & maxime rubentes evanuerunt, atque squamularum forma deciderunt, cute farina quasi conspersa relicta. Morbilli quo citius prodierunt, eo benigniores, quo tardius, eo peiores fuerunt. Incessit sæpe hic morbus sub vario itipatus satellitio. Sic mense *Aprili* ad puerperam vocatus deprehendi morbillos copiosissimos, protuberantes, quibus interspersæ fuerunt maculæ petechiales, deliravit valde, imo tubarum in vicinam inflatarum cantus & pulsati tympani sonos, inter difficultates somni per phantasmam oblatos articulata imitata fuit, frequenter risit, convulsa & aphona tandem jacuit, neminem novit, 15. tamen morbi die, adhibitis expellentibus alexipharmacis temperatis, cordialibus, ad se rediit, atque debellatis symptomatibus gravissimis convaleuit. Eodem tempore gratiosam habui puellam 6. annorum, variolis veris laborantem, supervenerunt nona morbi die, variolis necdum in statu constitutis, morbilli copiosi, gravissime inde decubuit, sed ex duplici hoc morbo feliciter emerit. Verissimum igitur est Axioma medicum: Qualis humor effervesceat in corpore, talis efflorescit in cute. Morbilli hi, si perite expellentibus, v. gr. pulv. alexit. de hyacinth. lap. bez. orient. pulv. epilept. C. C. philos. antim. diaph. unicorn. mar. cum pectoralibus & confortantibus mixtis, nec non servato simul idoneo diætæ calorisque temperamento, tractati sunt, omni vacarunt periculo, neminique fuerunt funesti; neglecta autem, aut præpostera vel perversa morbillorum cura, aut præmatura, superatis jam morbillis, aeris mutatio, vel inordinata rerum non naturalium diætæ, præcipitavit quam plurimos in tussim ferinam, febrem continuam, respirationem difficilem, pectoris compressionem, catarrhum ita dictum suffocativum, lethalem. Mense *Majo* & *Junio* continuaverunt adhuc morbilli, febres continuæ, tertianæ intermittentes, variolæ, quæ sporadice hinc inde vagatæ sunt, sed fuerunt sine malignitate, adeoque convenienter tractatæ facile curabiles. *Julius* fuit amœnissimus, sed cum summis caloribus, quarta coorta est gravissima tempestas cum frequentissimis tonitribus, flammæque fulgoribus, nec non grandinibus insolitis, quæ in civitate ut plurimum magnitudine juglandis, imo ovi gallinacei, prægresso imbre, ceciderunt, ad vineas tamen sparsim venerunt adeoque illis exiguum intulerunt damnum. Sub initium *Augusti* remiserunt calores, sed sexta audiebantur tonitrua terribilia, grandines cadebant insolitæ, copiosissimæ, quæ in optimis nostris promontoriis & vites & uvas prorsus destruxerunt. Jam successerunt æstuosissima tempora, quæ vix sustinere potuimus, neque spirant etesiæ, nullæ fuerunt pluviæ, quæ fervorem solis temperassent, imo eadem aeris constitutio erat in *Septembri*, *Octobri* nec non *Novembri*, ut credidisses, autumnum in æstatem fuisse convertum; habuimus quoque d. 25. *Septembris* vesperti tonitrua & fulgura sufficientia, unde in residuis promontoriis, quæ a grandine intacta manserunt, generosum crevit vinum, imo generosius crevisset, si nobis ob metum tumultuantium Hungarorum ferius vindemiare licuisset. Finitis enim jam vindemiis æstiosa & sicca adhuc continuaverunt tempora, sine ullis fere pluviis. Sub finem *Novembris* & initium *Decembris* nives deciderunt paucæ, & moderata subsecuta sunt frigora. Mensibus æstivis, *Julio* nempe & *Augusto*, existente cælo maximæ æstioso, diarrhœæ & dysenteriae satis fuerint frequentes, & magis pueros adultiores, senes, minus infantes sporadice afflixerunt. Præcessit diarrhœa cum ciborum fastidio, languore totius corporis, siti, dejectionibus copiosissimis, serosis, ut plurimum biliosis, viscosis nec non pituitosis, valde foetidis, mox insecuta est dysenteria cum dejectionibus cruentis & purulentis numerosis ad 70. 80. intra diem & noctem, aliquando velut momentaneis, ut miseri vix sellam foricariam delevare potuerint, & circa noctem cum majori exacerbatione, ut plurimum caloribus, quamvis non adeo urentibus, pulsceleri, siti, inquietudine, acuto intestinorum & ani dolore, iuvani, licet frequenti, desidendi cupiditate, præcordiorum anxietate, vigiliis, in progressu morbi blanda accesserunt deliria, non sine malignitatis nota. Quandiu sanguis cum materia biliosa, mucosa, purulenta & saniosa, aliquando cum strigmentis & ramentis exivit, tandiu de vehementibus torminibus & doloribus conquesti sunt. Dejectiones nigre, foetidae in morbi statu, majoris corruptionis denotarunt gradum, indicio manifesto, imminere jam gangrenam & brevi sphacelum, unde in illis dysenteria antea cruenta & torminosa jam observabatur fere indolens, pulsus quasi nullus, extrema frigidissima, sudore copiosissimo resolutivo, frigido perfusa. Refrigerationem hanc infirmi non percipiebant, quin potius de calore interno & siti conquesti sunt, imo manibus glaciei instar frigidissimis res aut loca frigida capeffere desiderarunt; & hi omnes, salvis tamen sensibus motuque membrorum illæso, elapsis ut plurimum 48. horis, mortui sunt. Causa hujus affectus adscribenda fuit partim copiosis fructibus horæis, acido-aqueo acri fermentifico foetis, partim caloribus frequentissimis, bile inde acriori lymphæque acidiori & quasi corrosiva reddita. Succus nempe eminentes acres, mordaces neciendo in intestinis diutius, quam par est, moram, primo absterferunt intestinorum mucum, deinde illorum crustam villotam, sive velamentum bombycinum simul abraferunt, & alius penetrando ipsas glandulas eroderunt, atque ulcus, vel quæstale, instar vesicantium, induxerunt; inde membranis intestinorum sensim sensimque a sale corrosivo erosio vasorumque osculis referatis, non solum sanguis frequenter stillavit, sed & tristissima doloris sensus accessit, imo spasmodica vellicatio, qua intestina spasmo quodam irritata motu quasi vermiculari dolorifice sese torserunt, unde non mirum, successisse tandem inflammationem, gangrenam ipsam, nec non lethalem sphacelum. Quo enim major acrimonia, eo major spasmodica fibrarum nervarum irritatio, major fermentifica humorum fusio, glandularum, ductuum & vasorum intestinalium eliquatio, nec non cruoris simul cum plexibus glandulosis ac reliquis intestinorum contentis excretio. Proferunt sub initium morbi, non obstantibus torminibus & supervacaneis excretionibus, humores acres diluentia, & leviter Evacuantia, ut pote aqua Laxativa cum aqua cinnam. in primis rhubarb. tostum, quod blande laxando simul ob partes terreas admixtas adstringere, & leniter roborare solet, cum myrobalanis & elæosacch. cinnamomi propinata, nec non clysters abstersivi ex spec. emoll. Ford. vitello ovi, conf. rosar. lacte, aliquoties adhibiti. His præmissis, statim deveniendum fuit ad incrassantia demulcentia, adstringentia cum anodynis mixta, unde singulis qua-

mor aut quinque horis exhibui pulverem sequentem: 2℥. Corall. rub. præp. 3℥. lap. hæmatit. terr. japon. an. gr. viij. theriac. cel. gr. iij. laud. de trib. gr. 3. M. mutatis tamen mutandis, addidi læpæ terr. sigillat. 3℥. ferr. bol. armen. pulver. stypt. Cr. smaragd. præp. par. crystall. mont. pulv. dysenter. Crat. ex tragacanth. gum. arab. & corall. constantem, nuc. mosch. &c. in primis, ubi calores fuerunt ingentes, compos. sperniol. Cr. spec. de gemm. frig. unicorn. mar. spec. de hyacinth. &c. imo moderanda fuerunt medicamenta ad ipsius excretionis, malignitatis, & vitium modulum. Sæpe videbatur jam alvus adstricta, morbusque sublatu, brevi tamen malum recruduit, & exivit iterum aliquando cum, aliquando sine cruore materia mucosa in minima quantitate cum summis torminibus alvum ad excretionem stimulant; adhibitis autem frequentioribus clysteris ex decoct. bord. cum capit. vervecin. nec non continuatis pulveribus adstringentibus, ex toto cessavit. Tandem, ne propter derafos plexus ilei glandulosos fluxus alvi coeliaco non absimilis remaneat, ordinavi summo cum effectu balsamica, stomachica, bals. peruv. opobas. Tinct. corall. elix. Vitriol. M. pulv. stomach. elect. diacinam. Reg. nuc. in Ind. condit. Et sic dysenterici intra tres septimanas ex integro restituti sunt, quo usque etiam a vino abstinere debuerunt, contenti aqua cocta ex rad. tormentill. ras. C. & obor. mastich. &c. Quos invasit cum vomitu, hi pessime decubuerunt, & vix servati sunt, optime autem ipsis profuit balsamum peruvian. nec non opobalsamum cum corall. rubr. exhibitum. Adstringentia, sine præviis blandis Laxantibus, in initio & progressu morbi adhibita protraxerunt morbum, tormina exacerbarunt, & post se ut plurimum febres arthritides, pedum tumores, lenterias reliquerunt. Opiata hic fere omnem absolvent paginam, imo fateri debeo, me fere nullum dysentericum sine frequentiori exhibitione laud. de trib. commode restituere potuisse; exhiberi autem debuit, antequam dysenteria fuit consummata & plane ulcerosa, aut vasa majuscula exesa, aut sensus doloris jam periit. Mense Augusto frequentes habuimus rheumatismos ad brachia, scapulas, femora, lumbos, coxas productos, sine ulla rubedine, multo minus tumore, non tam articulis, quam musculorum interstitiis firmissime & diutissime inhærentes, cum motus impotentia, doloribus lancinantibus, profundis, fixis, qui noctu exacerbati somnum impediverunt: infirmi enim loco moveri nequiverunt, & quo statu fere primo jacuerunt ac decubuerunt, in eodem manere debuerunt, & sine cruciati ac vehementi dolore vix moveri aut attingi potuerunt; adfuit simul tensio & caloris acrisculi sensatio cum pulsu frequenti. Vulgus hunc affectum nominare solet delapsum cattarrhorum a capite, es ist cin Flus im Arm oder Fusi gefallen. Statuendum potius rheumatismum provenire a sero aut lymphâ acriori, flatulenta, retrogrado motu impedito, in specialem aliquam membranofam, tendinosam, nerveam & musculofam partem delabente, ibique statim patiente, & partes fibrosas, nerveas tendente, easque tristi sensu vellicante. Arthritis Vagâ hoc anno frequens fuit. Invasit homines prævio horrore instar febris, membranosas ac musculosas articulorum partes dolore, rubore, tumore & movendi impotentia corripuit, vagabunda fuit & ambulatoria, modo hanc, modo illam invasit partem, nulla tamen loco ultra 48. horas fixa mansit, remissionem sæpe, relicto solum tumore, simulavit, at opinione citius, imo vehementius rediit, & priorem locum occupavit, imo memoratu digna in plerisque fuit paroxysmorum invasio dolorumque motus, dum quo tempore humerum, carpum aut digitos dextræ manus, eodem tempore & genua sinistri pedis; & quo tempore sinistri brachii, eodem dextri pedis partes singulari alternatione & saltu dolorifico infestavit. Similiter hic peccavit serum, sine lymphâ acido acris, sed sale volatili intimius facta, quæ ad periosleum, sive sensibillissimas articulorum mobilium membranas detrusa, eas distendit, vellicavit, ibique sicuti spina infixæ sæviit. Cura arthritidis Vagæ & rheumatismi una eademque fuit. Venæ sectio, nisi adfuit magna febrilis alteratio, intensior arteriarum pulsus, nec non præcordiorum compressio, nil profuit, vires potius abstulit. Purgationes, utpote rurbationes & colliquationes liquorum naturalium exasperarunt magis malum; reiteratus autem enematum, in primis laxantium, usus, v. gr. Rec. pulv. hepat. 3℥. sal. cichor. acetosell. an. gr. v. diagryd. sulphurat. gr. vj. fecul. ar. gr. iv. M. aut decoctum ex fol. sen. S.S. 3℥. rhabarb. 3j. crem. tartar. in aqu. cichor. infus. addita manna & aqua cinnam. summopere profuit, in primis si vespertino tempore pulvis confortans sequens exhibitus fuit: Recip. pulv. analept. 3℥. epilept. gr. viij. lap. cancr. præp. gr. vij. laud. de trib. gr. 3. M. opiatorum enim vires hic summe prædicandæ sunt, morbi quidem causam non tollunt, somnum tamen conciliant & dolores mitigant: non autem necessum fuit singulis diebus opiatibus & laxantibus uti, dirigi & moderari potius pro re nata morbi indole debuit cura. Ab usu sudoriferorum nunquam felicem vidi successum. Post inunctionem spirituosorum, v. gr. spir. vin. camph. formic. sal. armoniac. junip. lumbic. &c. semper notavi dolores osteocopos, adeoque abstinendum fuit a spirituosiss, nec non unguinosiss, emplasticis. Optime autem, in primis sub finem morbi, profuerunt Thermae Badenses, aut balnea acidularum, imo in ipso morbo balnea ex aqua dulci cum hordeo parata. Atque hac methodo tractati felicissime intra 20. aut ad summum, si copia peccavit materia, 40. dies restituti sunt. Febres his temporibus habuimus frequentes, quæ utur prima die tragediam a pandiculatione, oscitatione, languore, frigore, mox calore satis intenso auspicate sunt, cum subsequente secunda die apyrexia, speciem intermittentia simulante; supervenientes tamen paroxysmi, qui fuerunt cum languore, pulsu magno, exacerbatione caloris aliorumque symptomatum, confirmantur intermissionem istam fuisse dolosam, & latuisse sub hoc cinere ignem continuarum febrium, nec non malignitatem ipsam. Ex post enim videbantur quandoque, in primis mane, remittere calores, nunquam autem intermiserunt. Crescente morbo, creverunt symptomata, imo convulsiones in statu morbi notavi frequentes. Deliria serotina, v. gr. die 11. 12. supervenientia semper fuerunt exitiosa. Febres hæc more continuarum Venæ sectione in principio diaphoreticis, bezoardicis, confortantibus tractari debuerunt. Ultimis tribus mensibus, præter febres tertianas, quartanas, catarrhos, vix alii notabiles occurrerunt morbi.

Constitutio Epidemica Sempronienfis Anni 1705.

Quo clementior anno præterito fuit aeris constitutio, eo rigidior sub ingressum anni 1705. comparuit cæli temperies. Ja-

nuarius quippe incepit gelu congelare aquas, imo continuavit frigus toto hoc mense sine remissione, nives ceciderunt paucæ, & spirans Euronotus induxit siccitatem. Nec mitior fuit Februarius, quin frigore & gelu longe rigidior, sine ullis nivibus. Martius illuxit gratiosa serenitate, & exoptato calore, sed quinta nives ceciderunt magnæ, sexta frigus, quod ad 12. usque duravit diem; circa æquinoctium vernale, spirante aere meridionali, frequentiores habuimus pluvias, fructiferas, quas serena, calida mox infecuta sunt tempora, adeoque Martius ut plurimum siccus extitit. Aprilis varias sustinuit ventorum mutationes, & frequentiores, vix non quotidianas, in primis circa finem, pluvias, oblectamenta vernalia inhibentes; imo & Majus fuit valde inamœnus, frigidus rotus, excepto uno aut altero die, pluviosus. Continuavit pluviosa & frigida hæc aeris constitutio ultra medium Junii: unde non mirum, uvæ circa festum Viti nec dum florere incepisse. Circa solstitium æstivum temperatio aura & calores desiderati denum redierunt. Morbi, qui in hoc semestre inciderunt, erant varii. In Januario & Februario continuarunt febres quartanæ, quæ tamen, uno vel altero Laxativo adhibito, nec non chinatis medicamentis cum arcano duplicato, præter morem ut plurimum superari potuerunt, neque ullam labem post se reliquerunt. Frequentes erant rheumatismi in pedibus, manibus, scapulis, lumbis, cum dolore acerbo, sine inflammatione, sine tumore; hi diaphoretica sustinere non potuerunt, sed solis temperatioribus cholagogis, v. gr. infusis ex manna, fol. senn. tartaro, cum aqu. cichor. &c. clysteribus, præcipitantibus, nec non balneis hordeaceis, & pro re nata, in summa dolorum exacerbatione, grano dimidio laudani de tribus, tractari voluerunt. Catarrhos habuimus copiosos, qui in febres degenerarunt continuas, non adeo funestas. Servati enim omnes sunt, qui statim ab initio adhibuerunt Alexipharmacis, eaque continuarunt. Mense Februario jam inceperunt febres petechiales, quæ pleuritides ab initio mentitæ sunt, inceperunt cum horrore levi, febre lenta, tussi sicca, dolore in pectoris regione, ad scapulas, claviculas ascendente, cum molestia ægri, si in partem sanam decumbere voluit; assumptis autem sudoriferis evanuerunt dolores, & quarta, imo in plerisque septima denum eruperunt maculæ. In aliis simularunt febres intermittentes. Sic in Virgine quadam XVI. annorum, sanguineo-phlegmatica, tunc temporis ordinario mensium fluxu laborante, notavi tres paroxysmos, more febris quotidianæ intermittentis, mane cum horripilatione, subsequo calore, circa vespertum intermittente, dolore capitis, gravativo, siti, lassitudine &c. quotidie recurrentes, quarto calores continuos, prioribus longe intensiores, nec non eruptionem macularum, septima hæmorrhagiam narium sat largam, decima deliria blanda, manuum tremores, lingue ac faucium ariditatem molestam, 12. 13. novam copiosorum exanthematum, prioribus jam evanescentibus, eruptionem; & ecce 16. morbi die, non obstante hæmorrhagia, quæ ex alleviatione morbi judicabatur critica, septima oborta, obiit. Maximam malignitatem exanthematica hæc febris in recessu gessit mense Martio, Aprili. Incepit cum horripilatione, calor in sanguineo phlegmaticis, quorum sanguis sero viscido abundat, mitis, sed subdolos; in sanguineis intensior, adfuit languor totius corporis. mox subita virum prostratio, membrum quasi lassitudine fractis, aut contusis, sitis non adeo magna, nausea, vomitus, pulsus naturali fere similis, unde magis de languore, quam calore, conquesti sunt; sexta aut septima æstus invaluit, atque malignitatem sequentibus diebus prodidit, supervenientibus gravioribus symptomatibus, utpote axanthematum eruptione, cardialgia, pulsu celeri, frequenti, vigiliis, vehementissimis capitis doloribus, deliriis, motibus convulsivis, linguæ ariditate & fissuris &c. Venæ sectiones prima aut altera die institutæ, nec non repetitæ valde profuerunt, serotina omnes nocuerunt. Laxativa, etiam sub initium morbi exhibita, rejicienda fuerunt, & memini in his exanthemata longe latiora prodidisse, quam in aliis, eosque gravissimis symptomatibus, tremoribus, nempe totius corporis, deliriis furiosis, tandem aphonia, convulsionibus epilepticis, tentatos fuisse, omnesque satis occubuisse: clysteris ex humectantibus & emollientibus confectis, nec non suppositoriis alvum adstrictam commodissime referare potuimus. Cura methodica maxime dirigi debuit ad vires, quæ conservari, ad humorum fervorem, qui contemperari, ad malignitatem, quæ corrigi debuerunt. Præstitimus hoc blandis diaphoreticis, bezoardicis, cordialibus, v. gr. pulv. alexit. sec. de hyacinth. C. G. philos. pulv. analept. lap. bezoard. orient. antimonium diaphoretic. unicorn. mar. conf. alkerm. mag. perlar. orient. &c. exhibitio singulo octiduo pulvere uno, aut portiuncula, Sic corpus mansit perspirabile, sanguini sua constitit systasis & crasis, atque malignitas exuperata fuit. A medicamentis spirituosiss, volatilibus, bezoardicis fortioribus, calidis, quæ in hoc casu magis obfuisse, jam a longo tempore in his calidis oris expertus sum, studio abstinui. Vinum omnibus interdixi, aquam solam ex rad. scorz. ros. C. G. chor. sem. anis. &c. concedens. Acutissimum capitis dolorem Vesicatoria nuchæ appositæ sustulerunt. Sæviit vehementer hic morbus æque in adultos, atque gravidas. Sic binas habui, harum una, tertia morbi die, gemelos vivos, nondum maturos, octimestres, qui intra aliquot dies mortui sunt, peperit; altera sexta morbi die filium æque octimestrem, qui sex diebus vixit, enixa est. Fortior hic sine dubio sanguinis motio & patefactio, qua apertæ & laxatæ sunt viæ, partus hos acceleravit, inde puerperæ valde debilitatæ, sed solis confortantibus, analepticis, bezoardicis blandissimis, aliisque pro morbi & symptomatum exigentia remixtis, tractatæ, binæ die XV. evaserunt ex morbo hoc gravissimo. Legitima enim & matura medicamentorum applicatio omnibus salutaris fuit, secus, qui a principio neglexerunt remedia. Sic inter alios novi mercatorem, Silesitam, eadem febre detentum, qui fere omnia respuit medicamenta, tandem delirio phrenetico correptus in lecto vix detineri potuit, die 12. demum prodierunt exanthemata, indubia mortis die 14. morbi subsecutæ indicia. In alio pauperculo petechiali febre extrema laborante notavi in dorso, brachiis, pedibus, naribus quam plurima ulcuscula, elevata, dura, cum intenso dolore, inflammatione, ad instar furunculorum, ichore plena, sed tubercula illa ulcerosa valde fuerunt maligna naturam anthracum æmulantia; caro enim in circuitu inflammata, tandem sphacelata & corrola, ubique tota excidit, adhibitis tamen expellentibus, Alexipharmacis & mundificantibus externis, præter omnium spem sanitati pristina restitutus est. Cæterum multiplici experientia edoctus ingenue fateor, etiam si omnia signa scellerunt, me tamen sequentia in prognosi nunquam dece-

decepisse: deprehendens nempe in tangendo pulsū contractionem aut subsultum tendinum, pro certo mortem prædicere potui. Sic ex lingue ariditate, fissuris, asperitate, scabritie, siccitate, quasi lignum attingeres, nigredine, in primis, si retorrido calore cum vicinis faucibus aruit, aut crusta quadam nigra obducta, quæ licet sæpius os fricando & colluendo deterfa, statim tamen nova repullulavit, infallibile summa interiorum partium inflammationis & siderationis, nec non mortis augurium habuimus. Lingua enim etiam in minima inflammationis suspitione statim resiccare incipit, & crescente inflammatione crescit pariter & siccitas linguæ. Hoc morbi stadium sæpe ultra XV. morbi diem fuit protensum, aliquando felici, aliquando funesto eventu. Sic memini quosdam 16. alios 18. imo 22. demum morbi die fuisse extinctos, alios jam integre restitutos ex levissima causa & errore diatæ recidivam reportasse, quæ tandem, inflammationis glandulis, in pectore, in primis pulmonibus sitis & exulceratis, in hefticos degeneravit calores, longo tamen medicamentorum pectoralium usu superabiles. Mense Maio febres petechiales desævierunt, & evaserunt ex his omnes, qui ex methodo tractati sunt. Eodem tempore Icterus frequens fuit, qui flavo suo colore deturpavit totum corporis habitum, speciatim vero oculorum politum ebur, nec non tempora. Conquesti sunt de pruritu in cute, maxime dorso, de caloribus transitoriis, lassitudine ulcerosa, doloribus capitis, somniis turbulentis, intensissima siti, inappetentia, oris amaritudine. Alvus plus solito adstrictior, & quæ exierunt excrementa, penitus albescentia, pauca, viscida, urina crassa, turbida, subnigra, in superficie oleaginosa, crocea fuerunt. Utrique hic fuit obstructio tubulorum biliferorum, a viscida lymphâ hepatis & acinorum glandulorum, nec non saburra tartarea proveniens: inde bilis ab acido fixiori plus minus austero, torpidior & spissior reddita, in motu suo impedita, neque per destinatos canales, tum ad vesiculam, non per ductum cysticum in ductum choledochum ad intestina delapsa, potius resistans, in venæ cavæ propagines, tanquam fontes suos recessisse, ibique serum cum sanguine, & exinde productos humores, nutritioni & excretioni dicatos, citrino suo colore infecisse necessum fuit. Martialia, rhabarbarina, aperientia non solum ductus illos obstructos feliciter reserant, sed & bilem peccantem, atque jam ad habitum corporis delatam eduxerunt per epicrasin, v. gr. pulv. hepar. cachect. croc. mart. aperit. cum salibus, rhabarb. Alex. spir. sal. coagul. sal. acetosell. absinth. cichor. tart. vitriolat. arcan. dupl. rad. curcum. &c. additis pro re nata, & quidem optimo cum successu, aliquando granis aliquot diagridii. Mense Junio continuant adhuc febres continuæ, sed fuerunt valde benigne. Jam inceperunt tertianæ, quartanæ, curatu tamen faciles. Julius incepit cum caloribus, subinde tamen nubibus exasperatum cælum, in primis die 19. & sequentibus aliquot diebus, flante Borea, frigidam effudit pluviam. Cum Sirii ortu etiam exorti sunt calores, qui cum insolito & vix tolerabili aeris fervore usque post ejus occasum, imo toto mense Augusto, sine ulla alternatione, continuant, excepto XIX. Augusti, quo cum imbris, tonitribus & fulgure grandines per mediam horam deciderunt copiosissimi, quæ promontoria nostra fere omnia destruxerunt. Totus September aut ventosus, aut frigidus, aut pluviosus fuit, adeo, ut vix quatuor dies sereni toto mense numerari potuissent. October extitit amœnus, calidus, siccus, & quamplurimum contulit ad maturitatem uvarum, quæ alioquin immaturæ mansissent. Hinc vinum nec quantitate, nec qualitate laudabile crevit. Novembris initium ventosum, utcumque siccum fuit, progressus ad finem usque pulcherrimus, serenus, calidus. Sub initium Decembris apparuerunt hyemis indicia, nubibus & nebulis aer turbidus, frigidus, mox infecuta est amœna, serena sine nivibus tempestas, ad finem mensis durans, nobis quidem grata, sed ob hostium furorem valde infesta, ferrea & ignea. Tumultuantes enim Hungari die 24. Decembris civitatem nostram arctiori obsidione cinxerunt, eamque circa prandium ex monte Leonhardi globis ignitis continuo ex machinis bellicis majoribus explosis invaserunt. Primam stragem sustinuerunt suburbia (non exclusis V. domibus in civitate interiori existentibus,) quibus flammea hæc procella, aut diversa incendia sacram Christo nascenti noctem in funestam cinerum diem verterunt. Die Nativitatis CHRISTI ignitis suis globis nova incendia facere, atque residuum in cineres redigere, sed frustra, tentarunt; pilis autem suis majoribus igniaris, Bomben, ingens damnum ædificiis intulerunt; tandem biduo post, re infecta, discesserunt. His temporibus, mense nempe Julio, Augusto, Septembri, Decembri, adhuc continuant febres continuæ, petechiales, & notavi inter alia honestas duas foeminas, sorores; quarum una mense Augusto febre exanthematica laborans, die X. morbi acquisivit frequentem diarrhœam cum torminibus & doloribus inflammatoriis, vigiliis continuis, caloribus intensissimis, die XII. extrema, sudore resolutivo perfusa, etiam de æstu gravissimo, potius anxietatibus, conquesta fuit, frixerunt, 13. mortua. Latuit hic sine dubio intestinorum sphacelus. Altera soror mense Septembri eadem febre petechiali correpta, sumpsit sub initium morbi, nil mali suspicans; ante macularum eruptionem, nescio cujus suavis, Laxativum, die 10. incepit delirare, adhibitis tamen adhibendis, die 17. calores remiserunt, & mens rediit, imo jam periculum evasisse ab omnibus judicata fuit; die 19. morbi in femore pedis sinistri ex insperato prorupit macula nigerrima, crustacea, instar anthracis, magnitudine duplicis grossi, quæ igneo suo fervore latius sese diffudit, carnem subditam exussit, atque die 21. pauperulam e medio viventium sustulit. Mense Decembri in alia foemina 46. annorum observavi easdem maculas petechiales tertia jam die prodeuntes, valde latas, non obstante Venæ sectione secunda morbi die administrata, tertia incepit delirare, quarta obiit. In his casibus utique peculiaris sanguinis corruptio, & singularis malignitas supponi debuit. Mense Augusto ex flagrantissimo sole aerisque siccitate ortæ sunt diarrhœæ, dysenterie cum tenesmo, vomitibus, siti, doloribus abdominis; ut plurimum conjuncti fuerunt calores, inde methodo ordinaria tractari non potuerunt, quin potius alexipharmacis, v. gr. terr. sigillat. Japon. bol. arm. theriac. cœl. spec. de gemm. frig. curam agredi debuimus. Ubi nullus adfuit calor, ibi optime profuerunt blandæ eductia, in primis rhabarb. tostum cum myrobalan. citr. aut aqua laxativa ipsa cum aqua cinnamom. sub initium exhibita, aut clysteres abstergentes ex bord. cap. vervec. lacte &c. frequenter applicari. Materiam adhuc resistentem acrem, aulteram, acidam, urentem feliciter deinceps absorbentibus, adstringentibus, ac incrassantibus, v. gr. corall. rubr. alabastr. terr. jap. sigillat. crystall. mont. &c. correximus.

Sic multum præstitit opobalsamum, nec non oleum nucistæ interne exhibitum; non minorem utilitatem attulit Cataplasma toto abdomini applicatum: Recip. pulv. centinod. burs. pastor. an. mß. fol. rosar. rubr. balauft. an. Zij. diacydoniat. cum pec. 3ß. nuc. mosch. n. ij. mustich. 3j. aryoph. 5j. F. Cataplasma, adde ol. myrtin. cydon. mastich. an. 3j. M. Hoc mense earysipelata frequentissima fuerunt, sed uno vel altero sudorifero exhibitio extincta. Nec his mensibus contigerunt febres quotidianæ, tertianæ, quartanæ, quæ circa finem mensis Octobris valde contumaces extiterunt, senibusque funestæ. Præter alios affectus, rheumatismos nempe, catarrhos, podagricos dolores, odontalgias &c. sequentem notavi casum. Honesta matrona, annorum 45. multarum prolium mater, circa finem mensis Novembris, prægressis jam a longo tempore spasms digitorum manus sinistra, agonizantem puellam in vicinia visitans, eamque morientem conspiciens, valde perterrita concidit epileptica, deportata domum, & in lectum illata tandem ad se rediit prætetitorum fere inscia. Ad ipsam vocatus nil intentatum reliqui, aperui venam in brachio dextro, ordinavi clysteres dedi antepileptica, v. gr. pulv. epilept. spec. cephal. M. castoreum, uncor. mar. ungu. alc. cran. human. aqu. hirund. c. castor. epilept. L. &c. affectum tamen curatius perpendens deprehendi spasmodum, vel potius pulsus & subsultum magnum in medio, annulari & auriculari digito sinistra manus, ubi frequenter & fere indefinenter illorum extremitates ad volam manus retractæ sunt; bihorio elapso; majorem persensit in prædictis digitis subsultum, mox paroxysmum epilepticum; adeoque celer motus tendinum veluti subsultorius, instar pulsus ordinarii, indubitatum instantis paroxysmi fuit præsagium. Sensit autem infecutas exacerbationes omnes manifestam originem traxisse ex extremitatibus trium digitorum sinistra manus, indeque in momento, quasi volando, auram quandam ascendisse per brachium ad caput, affectoque cerebro, pars corporis sinistri variis motibus valde agitata & concussa fuit, pes tremuit, oculos contorsit, spumeum quiddam circa os apparuit, reflexo capite versus dorsum, adfuit simul omnium sensuum perturbatio. Dira hæc symptomata, si remiserunt, durarunt autem quandoque uno horæ quadrante, quandoque brevius, ægra tandem sopore quasi oppressa jacuit, mox gravi suspirio ad se rediit horum omnium inscia, atque solum de gravitate capitis ac lassitudine membrorum conquesta est, ut plurimum, finito paroxysmo, modicum sanguinis ex nimio motu convulsivo in pulmonibus extravasati, ore rejecit. Sæpe velut ab utero suffocata rubeat insigniter, cum lassitudine quadam ac sensum oborientis febriculæ rudimento. Non quidem continenter horrendo hoc symptomate, sed interpolatis vicibus, modo serius, modo ocus, aliquando quotidie, aliquando tota septimana semel, commiseratione digna exagitata fuit, prout venenata hæc materia vel citius, vel tardius, auram suam subtilem, vel spiritus suos volatiles emisit, qui in cerebrum delati irritando sensiles ac nerveas fibrillas celerem illam, inordinatam & involuntariam concussione membrorum, cum conspicua mentis labe, ac terribili nervorum contractione illius potissimum corporis partis, ex qua malignus vapor speciatim in cerebrum fuit amandatus, conciliarunt, miseram nostram, si extra lectum fuit, cadere fecerunt. Malum hoc necdum radicatum quo ex toto tolleretur, nihil non tentatum fuit, cum per cathartica, v. gr. pil. coch. de succin. Cr. extr. castor. cum syr. de cichor. c. rhab. &c. tum per vesicatorium, ad elicendam materiam peccantem, regioni carpi impositum. Carpi deinde arctiori vinculo circumligari curavimus. Interne quotidie mane sumpsit pulveres epilepticos ex pulv. epilept. M. gr. viij. mag. cran. hum. gr. v. ungu. alc. præp. gr. viij. unicorn. mar. gr. iv. pulv. castor. gr. v. vesperi vero mixturæ sequentis guttas 30. Rec. Elix. uterin. Cr. eff. succin. sal. volat. oleos. an. 3j. M. his continuatis remiserunt symptomata, non tamen ex toto cessarunt. Unde sanguinem cruciatum ex brachio nempe dextero, & pede sinistro simul & semel detrahi curavi, tandemque mistur. simpl. cum elix. uterin. Cr. & eff. anod. exhibui, quorum beneficio malum hoc potissimum, una cum motu tendinum subsultorio in digitis intra tres menses devictum fuit. Pro roboratione membrorum & nervosarum partium, nec non avertendo recidivæ metu, ablegavi ipsam mense Maio sequentis anni ad Thermas Badavino-Austriacas, & quidem optimo successu. Pristinam enim recuperavit sanitatem. Thermas autem quotannis visitare debet, quod licet deinceps non observaverit, nullum tamen similis morbi indicium per multos annos amplius in conspectum prodiit. Et hæc dicta sunt de morbis, qui hoc anno apud nos observati sunt.

Constitutio Epidemica Sempronienfis Anno 1706.

Redidisses præteriti anni exitu & ferocientium hostium abitu, nos jam calamitatibus, molestiis, periculis vacuos, furoremque hostium erga nos in lenitate esse conversum. Sed ecce illorum furor mox abiit in rabiem. Cogitantes enim de nostro interitu & civitatis exitio, d. 2. Januarii ad pristinam stationem redierunt majoribus machinis, mortariis pluribus & requisitis bellicis probe instructi; 3. die Januar. summo mane, continuis tormentorum & pilarum jactibus tam ardentem ædificia pulsant, ut fulmina & fulgura de cælo descendisse putasses, imo sparsis missilium flammarum imbre nova incendia excitant, & quam plurima civium ædificia immani grandine quassata destruxerunt. Sed cum hostes viderent, se continuo machinarum bellicarum boatu & fragore inconcussam civium fidem & constantiam neutiquam evertere posse, sexto Januarii, summo mane, trino agmine & magno impetu mœnia invaserunt, adnotisque quamplurimis scalis, nec non globulis quamplurimis manu injectis, mœnium fastigia, quæ jam attigerunt, transcendissent, nisi nostrorum Civium & inhabitatorum pectora pro muro fuissent, atque continuis scloporum explosionibus, nec non clavis præferratis permultos de muro in subjectas fossas præcipitassent, hostesque pedem, relictis centenis & ultra mortuis, in pristinam suam stationem referre coegissent. Hostis itaque invictam civium constantiam jam expertus, adversis tempestatibus cæli quotidie magis magisque invalescentibus, die 10. Januarii obsidionem solvit, recessit, sed a longinquo nos cinxit. Cives interea insuetas in excubiis sub Jove frigido & humido per aliquot menses constanter continuant suas stationes, atque intrepide defenderunt sua mœnia. Alias hic mensis valde horridus fuit, frigore tamen quandoque remittente, placidior. Mollior aer sub initium Februarii observabatur, in progressu remissum aliquod frigus, sub finem nives, subsequo frigore congelata. Martii ingref-

ingressus rigidissimus subito cum sereniori ac blandiori aere commutabatur, circa æquinoctium frequentes fuerunt pluviae, mox nives, mox varii ventorum tumultus, adeoque Martius non siccus, sed humidus extitit. Aprilis comparuit nivofus, mox tamen serenior & amœnior factus calore suo veris delicias produxit, languentes animos excitavit, & ad finem usque siccus ac calidus permansit; die 30. ingens tempestas cum fulgoribus & tonitribus oborta est, quam præcessit magna papillonum cohors occidentem versus volitans. Majus fere totus mane subfrigidus fuit, siccus, circa meridiem calidus, cum paucissimis pluviiis. Toto Junio grata & exoptata habuimus tempora, calores intensos, sæpe venti, quandoque pluviae nocturnæ contemperarunt amœnissimæ. Medardi dies fuit serenissimus, & die Sancti Viti uvæ in omnibus promontoriis jam defloruisse notavimus, inde nostrates præcoccem vindemiam augurari solent. Toto Januario morbi, præter catarrhos, hyemali tempore non infrequentes, nec non quartanas, nostris desideratas dederunt inducias. Sub initium Februarii febres notavimus continuas, malignitatis tamen expertes, rheumatismos frequentes biliosos, defluxiones seroso-biliosas in capite, maxime pone aures, aliquando cum, aliquando sine tumore, cum modica febrili alteratione; summe dolorificas, suffumigiis ex olivano & cataplasmatibus emollientibus curatas. Continuarunt illæ in primis mense Martio, & invaserunt articulos maximo cum dolore, inflammatione, tumore, senibus, in primis podagricis, exitiosæ: in his rediit podagra, sed sine doloribus, quæ retrocedens materiam peccantem ad pectus transtulit, ibique catarrhos lethales excitavit. Sed miratu dignum fuit, quod præter hujus mensis indolem nullæ febres continuæ, exceptis paucis catarrhalibus, quæ senibus fuerunt funestæ, obortæ sint, cum tamen fœminæ cum prolibus suis, superioribus mensibus, maximum metum & terrorem ex turbis bellicis conceperint, & pro majori securitate diu nocturne squalida cellaria inhabitare debuerint, cives autem & incolæ omnes in excubiis quam maximos excessus sub Jove frigido & humido in vino commiserint, adeoque humores ad morbos generandos, aut suscipiendos disposuerint, in primis, cum absque hoc Martius sit humorum genitor, motorque dolorum. Beneficium hoc adscripsimus vino novo, quod præterito crevit anno, levissimo, clario, acido, tartaro crudo abundanti diuretico: hoc potenter viscidam bilem diluit, solvit, eamque per alvum & urinam eduxit, adeoque sanitati nostræ valde proficuum fuit. Aliis annis vina hujus loci nova, ubi calore solis & cæli benignitate ad summam maturitatem pervenerunt, generosa ac potentia tartaro subtili scatent, oleosa sunt, & nec dum defœcata, largius hausta bilem a naturali sua crasi dejiciunt, alcalicis suis particulis quam maxime sanguinem accendunt, visciditate autem sua hujus circulum retardant, toti corpori torporem inducunt, caput gravant, conspiciant, imo particulis suis hamosis salino volatiles maxime activas reprimunt, actiones animales simul lædunt, & varios morbos, in primis febres continuas, malignas petechiales conciliare solent. Mense Aprili, Majo, Junio repullularunt febres continuæ petechiales, quandoque cum, quandoque sine malignitate, methodo tamen ordinaria feliciter eradicatæ. Inter alia notavi gratiosam filiolam quinquennem, febre continua correptam, cum maximis abdominis doloribus, torminibus, vix non convulsivis, & imminentis epilepsiæ metu; loqui non potuit, dolorem autem ejulatu expressit, continuarunt calores sine ulla intermissione ad 12. diem. In horrendo illo ejulatu ob metum gravioris mali 11. & 12. morbi die dedi laudan. de trib. gr. ℞. cum pulv. epilept. M. castor. unicorn. mar. Δ. hirund. c. castor. &c. laudabili cum successu & subsequuta quiete. Durante morbo, & 6. septimanis post morbum ne verbum eloqui potuit, licet omnia bene intellexerit, & linguam quaquaversum movere ac volutare, bibere, comedere, deglutire potuerit. Topica præscripsi varia, verbi gratia unguentum ex conf. anacard. ℞ij. alkerm. ℞ij. extr. castor. gr. viij. ol. succin. gutt. iij. pro illinitione, & frictione faucium, linguæ & palati. Fomenta ex infus. major. salu. chamomill. hyssop. collo. in primis laryugi frequenter applicuimus, donec interior laryngis rima a siccitate coarctata ac contracta, aliquantum iterum humectata officio suo fungi potuit, atque sensim & sensim, licet sub initium difficulter, verba articulata expressit. Humores biliosos ex abdomine ad musculos larygis, inque nervos vocales, metastasi facta, delatos, præter calorem febrilem, interiorum laryngis rimam arefacientem, eisdem affecisse, conjiciendum ex prægressis vehementissimis, vix non convulsivis, abdominis doloribus, in tempore consopitis. Iisdem temporibus observavi in filiolo sexenni calores continuos sine ulla intermissione, vix remissione; ad 30. diem & ultra, non obstante legitima medicamentorum administratione, extensos, adeoque non sine malignitate, tandem tamen feliciter superatos. His mensibus rheumatismos & arthritides vagas notavimus frequentes; methodo autem nostra superius tradita mox profligatas. Mensis Julius fuit æluosissimus, noctes præter morem calidæ, sine ullis fere pluviiis: die 16. cælum opacis & atris nubibus de subito exasperatum, effudit imbrem largissimum cum tonitribus, in vicina cum grandinibus insolitis, maximo Rustensium vinearum damno. Sub ingressu solis in leonem, nisi quandoque grati spirassent etesiæ, calores vix fuissent tolerabiles; tandem ultima hujus, prægressis noctu crebris tonitribus nec non fulguribus, gratiosa ac tepida superveniens pluvia cum amœnissimis & subfrigidis ventis ingentissimum auræ calorem contemperavit, terram refocillavit, & omnia recreavit. In Augusto terra ter totum mensis cursum fervido solis calore fovebatur, subinde tamen nocturno tempore tepidis pluviiis animabatur, inde jam sub initium hujus mensis maturas habuimus uvæ. Ægidii dies mira & exoptata illuxit serenitate, & serenavit totum mensem exceptis 17. 18. diebus, qui fuerunt frigidi ventosi, pluviosi. Per Octobrem totum eadem gratiosa serenitas, siccitas & æstus amœnus duravit, cum nebulis matutinis, solis splendore discussis, exceptis 6. 7. & 8. diebus, qui sparserunt pluvias. Hinc vinum crevit generosissimum. Secunda Novembris primam demum notavimus pruina, & continuarunt amœnissima, calida illa tempora, præter ætatis anni morem, toto mense, nisi quod 14. 15. intervenerint pluviae, & 24. nives ceciderint ingentes, sequenti tamen die liquefactæ. Eadem cæli tempestas continua, serena nempe, calida, aliquando nebulosa fuit usque ad 17. diem Decemb. 18. vero, 19. pluviosa, nec non nivosa; die 20. ingruit gelu, quod post biduum remisit, reliquis diebus pluviae, nebulæ, venti ac calores alternarunt, quæ tempestas, prædominante calore circa Natalitia, pyrorum flores & turiones sambucinos elicit. Mensibus æstivis omnis generis febres, quæ conti-

nuas mentitæ sunt, nobisque ab initio imposuerunt. Invaserunt hæc cum horripilatione vix sensibili, insequente calore, ultra 30. horas durante, cum vehementi siti, capitis dolore, vigiliis, vomitibus, præcordiorum angustia, anxietatibus, virium prostratione, linguæ ac faucium squalore, ita ut febrem continuam fore metuerim; adhibita tamen Venæ sectione in brachio, & repetita in pede, exhibitoque uno vel altero sudorifero, remisit calor, & tertio aut quarto die ut plurimum in intermittentem tertianam duplicem terminavit; ast inter apyrexiam & paroxysmum brevissimum fuit intervallum, imo, saltem aliquot interjectis horis, nova febris, sine ullo frigore, accessio, & quasi composita ex tertiana & quotidiana, altera autem levior typum quotidianæ referens. Aut paroxysmum dedi antifebrilia ex salibus, arcan. dupl. cort. chin. lap. cancr. &c. in caloribus vero diuturnis, ob metum latentis malignitatis, nec non ingentem debilitatem, blanda diaphoretica, utpote lap. bez. orient. pulv. analept. M. C. C. philosoph. magist. perlar. conf. alkerm. &c. aliquando, in primis ubi capitis dolores fuerunt intensi, loco antifebrilium præscripsi spirit. sudoris. ℞ij. cum spirit. anod. ℞ss. & quidem laudabili successu: non enim tantum dolores remiserunt, sed & paroxysmi febriles brevi cessarunt, & ut plurimum soluti sunt spatio 15. aut 21. dierum. Febres tertianæ circa hæc tempora fuerunt frequentes, sed adeo mites, ut post quintum aut sextum paroxysmum, adhibito Laxativo, nec non antifebrilibus salibus recesserint. Febribus continuis corripiebantur permulti, sed sine gravioribus symptomatibus, & absolverunt jam die 15. suum cursum feliciter, hinc omnes servati, qui non incuria neglecti, sed methodo ordinaria tractati fuerunt. Mense Julio, Augusto, Septembri, diarrhææ, dysenteriae ex radiorum solarium, æstu invaserunt quamplurimos, sine ætatis discrimine, cum maximis torminibus, tenesmo, dejectionibus copiosissimis, purulentis, cruentis. Principium curæ sumpsimus a rhubarb. rost. myrobal. citrin. aliquando ab Aqua laxativa, in primis si ventriculus cruditatibus labefactus aut gravatus fuit, acrimoniam humorum temperavimus absorbentibus, v. gr. corallis rubris, terr. sigill. fl. ferr. crystall. mont. &c. continuas dejectiones & dolores correximus clysteriis ex decoct. hord. aut oryz. capit. vervec. vitell. sæpe injectis, nec non adstringentibus, incrassantibus, demulcentibus sæpius exhibitis, v. gr. pulv. dysent. Cr. nerv. catechu &c. mithridat. theriac. cel. laudan. de trib. imo sateri debeo, etiamsi singulis 5. aut 6. horis medicamenta adstringentia exhibuerim, me tamen sine opiatis nihil profecisse, adeoque Laudanum de trib. in accisa (refracta) dosi aliis additum & sæpe repetitum hic optimam tulisse opem. In quibusdam observavi neque hæc quicquam profuisse, quin potius infirmos aliquando evomuisse biliosa, indicio, ventriculum una cum primis viis, cruditatibus acerbis, biliosis, adeoque causa morbifica adhuc esse repletum, iis bis dedi rad. Ipocacuanb. & quidem pro dosi ℞ij. inde frequentiores habuerunt vomitus, pauciores dejectiones, quo facto, reliquum curæ adstringentibus, incrassantibus, anodynis, v. gr. sequenti pulvere aliquoties exhibitio, & singulis 6. horis repetito, 2℥. crystall. mont. corall. rubr. prep. terr. japon. ana gr. viij. theriac. cel. gr. iij. iv. laudan. de trib. gr. ℞. aliquando gr. i. M. feliciter peractum fuit. Tres personas notavi, quæ, absumptis jam roscidis & balsamicis lymphæ particulis, spiculis autem acerbis, adeoque doloribus, auctis tandem, supervenientibus dejectionibus atris, cadaverosum odorem spirantibus, indolentibus, artuum refrigerationibus, mente ac sensu privata gangræna & sphacelo intestinorum obierunt. In alia matrona 5. diebus ante mortem præcessit singultus, omnem castorinum & opiorum efficaciam eludens, inflammationum & convulsionum internarum, nec non mortis imminentis prænunciis. Mense Octobri in scenam prodierunt morbi vitio renum & vesicæ orti. Sic in Perillustri quodam Domino, septuagenario, alias robusto, notavi Ichthuriam, sive totalem urinæ suppressionem, ex calculo renalis tubulorum obstruente, natam: Adfuerunt maximi dolores circa lumbos, vomitus frequentes, angustia & anxietates præcordiorum, obstinata alvi obstructio, nullus vesicæ tumor, nullus in pube dolor, nulla perinæ gravitas, nulli calores, imo pulsus naturali fere similis. Cathetere flexili sæpe inmissio ne gutta urinæ extrahi, aut calculus in vesica latens deprehendi potuit. Adhibuimus sæpissime clysteres emollientes, balnea aque dulcis una cum herb. petrosel. malv. paretar. chamomill. melilot. verbasco. stram. aven. &c. unguenta pro inunctione lumborum, ex unguent. rosac. ol. scorp. Matth. succ. citr. præp. &c. Interne fere quotidie dedi decoctum ex spec. dialth. Fern. & aperitivum. For. cum fol. senn. mechoacan. quibus magnam serosorum humorum, alias ad renes tendentium, copiam per alvum eduximus, ne guttam vero urinæ elicere potuimus. Potus ordinarius constabat ex spec. dialth. Fern. & aperit. For. cum ras. C. C. senn. anis. Ex diureticis, lithontripicis, pellentibus, sumpsit tinct. sal. tartar. spir. salis dulc. bals. sulphuris terebinth. succinat. sal. genist. ononid. fabar. spir. salis coagul. tartar. Vitriolat. aliaque, imo pro exigentia symptomatum utpote vigiliarium, dolorum, etiam laudan. de trib. in refracta dosi, alvoque libera existente; pro corroboratione virium confortantia. Sic tandem septima morbi die robore naturæ moti sunt calculi ex renibus in ureteres, cum vehementi, lancinante, pungente dolore; ex his brevi delapsi in vesicam urinariam: patente jam exitu parum urinæ, non quidem sine dolore, emisit, mox una cum tribus lapillis, magnitudine fabarum, urinam subcruentam, sine dubio ex laceratis faucibus a calculorum asperitate, excrevit, & post subingram, tandem, & quidem abunde, pallidam, copiosa materia viscida, fabulosa refertam. Dolores statim post excretionem urinæ evanuerunt omnes remanente solum lassitudine ulcerosa sensuumque torpore, donec vires suas deperditas recollegit, atque ex integro convaleuit. In aliis eodem tempore observavi summum urinæ ardorem, ubi quidem fere nullus urinæ fuit defectus, maximus tamen dolor, & in nethra ignea quasi rosio. In aliis Stranguriam animadverti, ubi continuus fuit ad mingendum stimulus, nihil tamen, nisi una vel altera gutta effluxit. His omnibus feliciter medebamur decocto aperit. For. dialth. Fern. cum fol. senn. clysteriis, nec non topicis, balneis, aliisque superius allegatis. Inter morbos illius temporis etiam occurrit Passio Iliaca. Hæc corripiebatur quidam Vir Juvenis, Hernia scrotalis jam ab aliquo tempore laborans, alvi nempe contumacissima obstructione, vomitibus frequentissimis, doloribus circa umbilicum summis, instituta autem reposicione, nec non adhibitis crebrioribus enematis, aquis laxativis, cataplasmatibus ex decoctis emollientibus, alvus stimolata sui officii memor copiose excrementa reddidit, evanuerunt dolores, nec non Vomitus, imo jam periculum evasisse ab omni.

omnibus judicatus fuit. Sed ecce, diebus aliquot elapsis, nescio quo errore commisso, in eundem morbum recidens, accedenti febre, vomitibus stercoreis, obstinata alvi constipatione, sudore frigido in extremis, doloribus atrocissimis, delirio, singultu, virium languore, & ultima die dejectionibus spontaneis, septima recidivæ die, remediis prioribus nunc nihil proficientibus, extinctus est. Jam addam, quæ de *immodico hæmorrhoidum fluxu* notavi. Fuit Vir quinquagenarius, artis pharmaceuticæ peritissimus, ex familia, cujus indigenis masculis hic affectus quasi proprius, ortus. Is jam in ætate sua juvenili fluxum hunc sanguineum expertus est, qui si statis & definitis temporibus, singulis nempe mensibus, moderate rediit, sanitati quam maxime profuit; si vero ex voto non successit, statim toti corpori languorem induxit, intestinis tormina, gravitatem circa os sacrum, calores febriles quasi continuos, biliosas capitis defluxiones, oculorum inflammationes &c. conciliavit. In ætate virili sanguis non amplius moderate ad uncias, sicuti ante, & mensuatim, nescio qua sanguinis acrimonia aut viarum laxitate, non periodice, sed singulis fere septimanis, ad libras manavit cum notabili virium dejectione, faciei colore ad viriditatem inclinate, gravitate incoxis, in cruribus magna debilitate, ut vix incedere potuerit. Sisti cito hic fluxus non debuit; sanguis enim statim regurgitavit ad pectus, & *anxietates præcordiorum, respirationem difficilem, palpitationes cordis* induxit. Cum vero immodicus hic fluxus latentem hæcenus *cachochymiam*, nec non acredinem & falsedinem sanguinis insignem prodiderit, imo aut *hydrops*, aut *phthisis*, aut *apoplexia* exinde metuerida, & vires jam labantes medelam urserint, suasi omnino in brachio *Vene sectionem*; *roborantia & temperantia, acidula, bilem acrem, lentam, rosivam corrigentia, & per epicrasim educantia*, v. gr. *Tinct. rosar. corall. mart. aperit. c. succ. oxalid. M. Tinct. seri lact. caprin. cum tamarind. & rhabarb. fact. pulv. hepat. sal. cichor. grana granatorum acidorum succulenta*, quæ masticavit ejusque succum deglutivit, *pulv. cachect. Qu. lap. cancr. crud. smaragd. præp. corall. mag. perlar. emulsionem ex sem. frig. cum decoct. hord. & julep. rosac. fact. nitrosa ipsa, compos. Sperniol. Cr.* quibus ebullitionem in sanguine nimiam compescimus; fluxum vero immodicum *blundis adstringentibus* cohibuimus, v. gr. *Tinct. mart. adstring. lap. hæmatit. ess. traumat. sir. de os. siccis, myrtill. trochisc. de spod. carab. croc. mart. adstring. dent. eq. mar. f. hippopotam. succo urticæ express. & depur. infusa millefol. sanguisorbæ, vino rubro ex infus. carn. cotoneorum*, aliisque in primis topicis, v. gr. *unguento Comitisse*, quo inungi debuerunt hæmorrhoides, & dorsum, aut aliis fomentis, linimentis & fortibus ex *succ. plantag. burs. pastor. verbasco. sangu. dracon. thur. terr. sigill. rad. bistort. tormentill. &c. it. vernice*, in qua intinctus fuit pannus lineus & cum ol. rosat. adnotus *Polygonum*, utpote singulare & decantatum euporiston, sub axillis frequenter gestavit. Observari autem diligenter debuit, ne alvus plus solito adstricta fuerit. Hac igitur methodo symptomaticas excretiones temperavimus, atque Pharmacopæum nostrum ad multos annos conservavimus; donec tandem mcerore animi confectus, & viribus jam exhaustus placidissime obiit. Mense Decembri *luctuosa epilepsie* notavi phænomena. Puer octennis noctu hora XII. in aream micatum exiens spectrum ibi perspicit, horrore ac terrore plenus summo cum angore & clamore in hypocaustum & lectum veluti furatus rediit. Vix sese ad quietem componens tentabatur horrore, sudore frigido, affectibus convulsivis. Mane accersitus deprehendi inordinatam ac involuntariam membrorum concussionem, modo cessantem, modo redeuntem. Affectus hic indies invaluit, & secutæ sunt brevi gravissimæ convulsiones nervosi generis, genarum laborumque terribiles spasmi, adfuit continuus digitorum, velut aliquid comprehendendum, lusus, contumacissima alvi adstrictio, nulla spuma circa os, oculi manserunt aperti & irretorti, respiratio libera, oris autem distortio enormis, largo risu mox superveniente; dentes valide coierunt, ut pro insundendis cibis liquidis & medicamentis, instrumento aperiri debuerint, articulata vox perit, & nil, nisi clamor remansit, mentis operatio defecit, nec sensus nec memoria alicujus rei extitit, sedere, stare, ambulare nequivit, & quando mater ipsum elevare voluit, mox instar globi sese incurvavit, mox in alios incredibiles flexus instar arcus sese præcipitavit; nec paroxysmus inducias concessit, sed duos menses indefinenter fere diu noctuque continuavit. Terrorem morbum hunc convulsivum produxisse, extra omne dubium est, licet non excluderem *vermes*, quorum aliquot ante & in morbo excrevit. In hoc tumultu morbi que vehementia pro demulcendis partibus convulsis, vellicatis, ac distortis, *antiepileptica specifica* sæpissime exhibita, v. gr. *pulv. epilept. M. spec. cephal. Mich. mag. cran. hum. ungu. alc. præp. unicorn. mar. cinab. nat. castor. aqua epilept. Lang. hirund. c. castor &c.* nullum præstiterunt emolumentum. Vomitoria cum Laxantibus mixta, v. gr. *Recipe: Aquæ laxat. Zij. syr. Emet. A. S. 3ß. M. pro una*, vice quæ pro educendis humoribus biliosis, cum acido fermentatis, fixis, binis vicibus exhibui, observavi hic felicissime profuisse. Jam optimo cum successu reiteravi specifica, v. gr. *Recip. Specif. cephal. M. gr. vij. pulv. epilept. 3ß. castor. gr. vij. ungu. alc. præp. aut unicorn. mar. gr. v. M.* eaque quotidie bis aut in forma pulveris, aut potionis, additis aquis appropriatis & syrupis, præscripsi, quibus aliquando granum 3ß. aut ad summum gr. j. *laudan. de tribus* addidi. *Enemata* multum profuerunt. Atque sic post duorum mensium tædia expugnatus fuit morbus, ut jam puer sui compos stare, ambulare, sedere, cibum ac potum capessere, articulatè loqui potuerit. Subsecuto mense Majo, ne in posterum recidivaret, misi illum ad *Thermas Badavin-Austriacas*, ex quibus redux immunis jam ab hoc execrando morbo vivit, & quod mirandum, sine ulla mentis aut memoriz labe. Hoc mense duos notavi *Apoplecticos*. Unus octogenarius ex ordine separatorio, prævia vertigine, lassitudine membrorum, de subito *apoplexia* correptus cum sensus ac motus abolitione, pulsu magno, in debilem tandem & frequentem mutato, omnibus incassum adhibitis, secunda morbi die placidissime obiit. Alter fuit Reverendissimus hujus loci Plebanus 56. annorum, atque habitus corporis obesioris. Hic, dum nocte Natalitii Domini hora secunda matutina sacris peragendis intentus, præ verecundia, justo diutius retinisset urinam, ab altari reversus de tempore, vertigine, anxietatibus conquestus est, mox domum vectus & in lectum delatus ex regurgitatione seri urinofi ad superiora *Apoplexia* fortissima cum stertore, spuma ante os, tactus, spatio semiquadrantis, adeoque eadem hora, qua sanus fuit, repente interiit.

Constitutio Epidemica Sempronienfis Anni 1707.

J Anus bifrons eadem serena fronte, qua veterem annum denis serenissimis diebus clausit, auspicatus est novum totidem serenis, calidis, siccis diebus, unde statim x. die ingruerunt frigora, mox subsecutæ sunt nives copiosæ, quæ congelatæ ad testum Purificationis usque jacuerunt durabiles. Secundus *Februarii* dies totus fuit turbidus, & regula rusticorum hoc anno verissima: Sole nempe micante, die purificante, nix aut frigus erit majus, quam ante. Eo ipso enim die remisit frigus, nives liquatæ omnes, ingruerunt pluviz, nebula, quæ ultra septimanam instituerunt, densissimæ, fœtidæ, corporibus nostris valde infestæ; die 17. 18. rigidos habuimus ventos, boræos, qui siccarunt terram. Jam ad aliquot dies frigoris vix soluta sed die 24. Festo Matthæi intensior facta in medium *Martii* continuavit; adeoque *Februarius* fere totus siccus fuit; Bacchanalia amœnissima, serena, calida, dies Cinerum valde frigidus, ventosus; medio *Martii* ceciderunt nives, mox secutæ sunt pluviz. Equinoctiale tempus notabatur valde turbidum, pluviosum, nivolum, lutosum, imo ad finem mensis usque tumultuaria tempestas, mox ventis, mox nivibus, aut pluviis, molesta, raro serena; adeoque *Martius* valde humidus atque ingratus. *Aprilis* incepit cum nivibus, pluvii, mox insecuta sunt frigora, quæ tempestas tumultuaria x. continuavit diebus imo totus mensis magis fuit frigidus, ventosus quam calidus. Ipso quoque *Majo* cælum, si paucos amœnos dies exceperis, ut plurimum atris inhorruit nubibus, & dies turbido aere frigidisque ac frequentibus pluviiis reddidit minus vemales, minus majales, rigidi præter morem extiterunt. Mense *Junio* longe amœnior ac placidior aura comparuit. Medardi die valde serenus sine ullis pluviiis, & rediit nunc calor intensissimus, imo, quod ex tot aeris vicissitudinibus & cæli inclementia, superioribus mensibus prægressa, nullus præsumpisset, multo minus credidisset, jam ante diem Viti copiose uvas in flore deprehendimus; die xvi. supervenerunt pluviz gratiosissimæ, fructiferæ, mox æstus increvit, & fere tribus septimanis indefinenter, nulla intercedente pluvia, continuavit, cujus ardore terra valde exsiccata dehiscere, homines autem ob largiores sudorum effusiones defatigari debuerunt. Febres *continue* modo cum, modo sine exanthematibus, modo benignæ, modo malignæ, prouti apud nos quotannis observantur epidemica, ita & hoc semestri fuerunt frequentes, in quam plurimis malignitatis expertes, & methodo ordinaria, superioribus annis jam tradita, tractatæ, plerumque die XV. in alio nono, in uno septimo, prægressa eodem die hæmorrhagia critica, ex voto solutæ. Alios invasit cum maxima malignitate. Sic honesta quædam fœmina, quadragenaria, ex eadem febre die morbi demum xi. incepit delirare, quod alias pro pessimo, & fatali signo habeo, xv. recesserunt calores, sed quinque diebus & noctibus in omnibus continuis transactis, valde deliria ab assumpto *pulvere epilept. M. mag. marg. perlar. pulv. analept. castor.* nec non grano uno *laudani de tribus*, somno quidem jucundissimo quievit, sed expergefacta in gravissimas incidit convulsiones, cum continuo tendinum insultu variisque labiorum spasmis; tandem xviii. die adhibitis frequentioribus *antiepilepticis, confortantibus* nec non *enematibus*, alleviata præter omnium spem convaluit. Et sicuti ferotina deliria latentem produunt malignitatem, si non exitium ipsum, ita præmatura funesum semper præstigiunt exitum. Observavi hoc iisdem mensibus in filiolo sex, in juvene xvii. Viro L. annorum, qui omnes ex febre maligna tertia die inciderunt in continua deliria, sexta convulsi mortui sunt. Alia fœmina melancholica, & simul gravida, cujus maritus cum quatuor prolibus simul & semel mense *Martio* in uno cubiculo, epidemia hoc morbo decubuerunt, qui tamen convaluerunt omnes, eadem febre maligna detenta cum *uvule ac tonsillarum inflammatione* summa octava recentem enixa est puerum, inde valde debilitata nona delirare incepit, & ex caloribus, viribus exhaustis, maciato corpore, vigiliis continuis, credebatur certo certius peritura. Sed ea fuit fortitudine, ut *sudoriferis, confortantibus, Epilepticis*, rite tractata calores illos intensos ultra xxx. dies sustinuerit, & periculum evaserit, remanente aliquali mentis labe. Mense *Januario* singularis contigit casus. Puella xv. annorum ob leves errores commissos matris castigationem verita sibi ipsi mortem consciscere voluit, sumptisque aliquot granis *mercurii sublimati* incidit de subito in continuos vomitus, alvi fluxus cum gravissimis intestinorum torminibus, siti magna, linguæ ac faucium ariditate; sed causa horum symptomatum mox patefacta, accersitus exhibui *theriacalia*, in prius *crystall. mont. 3ß. cum ol. amygd. dulc. it. juscula pinguis*, & loco potus ordinarii *lac bubulum* suasi; his acidum venenosum absorptum, acrimonia obtusa, & puella ab interitu vindicata fuit. Venena enim mineralia sola corrosivitate agunt, ex qua, si non statim ab initio idoneis medicamentis succurratur, *necrosis*, & ex hac sanguinis & seri destructio. Hoc videre licuit in fœmina mediæ ætatis, nutrice, cui ab alia *arsenicum citrinum* malitiose in junculo propinatum fuit intra paucas horas extincta. Hæc cardinalgia lipothymia, intensissimis torminibus, vomitibus, alvi dejectionibus cum irritatione acerrima valde agitata; post mortem exhibuit stomachum & intestina partim *gangrenata*, partim *sphacelata*, erosa, sanguinem nigerrimum. Eodem tempore vir quadragenario major, sanguineus, diu noctuque per triduum somno profundo, *lethargo* vix absumili, quasi sepultus jacuit, sine ulla alteratione febrili, aut pulsus mutatione, quarta, *Potione laxativa mannata* sumpta, expergefactus sibi optime præsens, atque ad interrogata apposite respondens, de *prostratione virium*, & sequenti die in brachio dextro de *tumore*, aliquali rubore, sed dolore summo valde conquestus, sexta obortis *caloribus* & supervenientibus *deliriis*, atque omnibus incassum adhibitis, *suffocatus* obiit. Hac hyeme *articulorum dolores* sine inflammatione, sine tumoribus, valde grassati sunt, ubi *laxativa, aperientia, præcipitantia, decoct.* nempe *aperitivum cum fol. senn. S. S. rhabarb. mann. tartar. lap. cancr. præp. sal. acetosell. cichor. diagrid. sulphurat. pulv. hepat. nitr. tartar. Vitriolat. &c.* sæpius adhibita omne abolverunt punctum, & intra quadragesimam modicam morbi vehementiam infregerunt. In honesta quadam fœmina iisdem doloribus detenta, se *alvi fluxu* simul laborante, septima die morbum notavi jam solutum. Præstat igitur in his affectibus *alvum* habere magis *laxam*, quam adstrictam. Mense *Februario* in ablatis & lactentibus copiosas observavi

servavi febres catarrhales, quæ invaserunt tenellos cum tussi vehementi caloribus continuis, ariditate faucium, facie floridiori & rubente, siti, sternutationibus, respiratione frequentiori, in aliquibus inter respirandum cum stercore & sonitu, ut plurimum cum dentitione. Profuerunt hic enemata sæpe adhibita, expellentia temperatiora, aciditatem lymphæ corrigentia, cum pectoralibus mixta, v. gr. pulv. alexit. epilept. spec. diarr. antihet. Pot. lap. cancr. C.C. philoph. syrpe-
torales, inunctiones ex ungu. pectoral. rubr. potab. cum ol. irin. anis. dest. &c. ratione simul habita virium. Atque hac methodo omnes ante nonum diem feliciter ad sanitatem perducti sunt; convulsionibus autem epilepticis simul tentati perierunt fere omnes. Vernale tempus phthisicis & hecticis valde grave, quamplurimis funestum fuit. Sic inter alios officialis, nec dum tricenarius, ex castris sub finem Nov. præteriti anni redux, & ab aliquo tempore hectica pulmonari laborans, de tussi vehemente, gravitate pectoris, copiosa materiæ purulentæ expuitione valde conquectus est. Affectum hunc curatius examinaus ex rorida partium nutriendarum substantia jam fere consumpta, ex calore non amplius latente, sed jam manifesto, ex pulsu frequentiori & celere, in primis post pastum, ex urina oleaginosa, ac difficili respiratione ad motum quævis atque aeris alterationes, ex frequentiori tussi quandoque sicca, quandoque cum sputo purulento, quam ut plurimum, sumptis cibis, secuta est vomitio, secundum hecticæ febris gradum jam imminere, atque humorem nutritium in gelatinosam magis substantiam conversum quasi deliquari; sive pulpas carniū hinc inde in corpore manifeste quasi depasci, quæ species febris Marasmodis dicitur, judicare debui. Externe pariter & interne adhiberi curavi remedia, quæ alias huic affectui habentur appropriata, expectorantia, absteriva, analeptica, refrigerantia, traumatica, obtundentia, v. gr. pulv. anonym. spec. diarr. lac. sulph. pulv. Haly. lap. cancr. spec. de gemm. frig. pulv. analept. antihet. Pot. spec. pro decoct. flor. & fruct. spec. pectoral. (quibus quandoque beneficio alvi non succedente, addi mannæ electam) Syr. de jujub. flor. papaver. locb. san. & expert. de pulmon. vulp. conserv. rosar. bellid. tussilag. emulsionem ex seminibus cum decocto hordei, julepo rosaceo & nitro perlato paratas, gelatinas ex herbis pectoralibus &c. lac caprillum cum saccharo mane potum, aliaque, externe unguent. rubr. potab. pectoral. cum ol. irin. nec non emplastrum pectoralia usitata & cataplasmata. Cura hæc hyemalis videbatur succedere ex voto, rediit appetitus, redierunt vires, remiserunt calores, nisi post pastum revertentes. Ast induciæ solum ad breve tempus fuerunt, nulla pax. Insinuavit enim se malum, nobis id minus opinantibus, increverunt calores, sæpe velut paroxysmos febrium æmulantes, supervenerunt sudores nocturni, vel matutini colligativi, virium prostrationes, respiratio anhelosa, indicio manifeste, miasmata pulmonum ulcerativa in massam sanguineam copiose delata ibique fermentata, ignem peregrinum internum non solum hæcenus fovisse, imo erosionem ad glottidem producta, vocem raucam conciliasse, verum etiam alimentarium ac roridum lymphæ nectar acrimonia sua volatili, aut fermento suo putrido penitus inquinasse & destruxisse, ut jam corpus marasmo incurabili consumptum, pedes vero tumidi, & cutis vix ossibus hærens, tanquam funeri suo propemodum superfuerit, donec tandem lenta morte tabescens mense Majo placidissime obiisset. Hecticam ex scorbutico calido natam observavi in juvene XVII. annorum. Is alias melancholicus, vitæ sedentariæ amans, sæpe sensit tumorem in sinistro hypochondrio, aliquando febriles alterationes, brevi transeuntes, palpitationes cordis, frequentes phlegmatis moleste falsi & tonsillis aliisque oris glandulis rejeeti, in primis matutino tempore, excreationes, Faciei fuit lurida, pallens, subtumida, maculis copiosis, lividis, granulatis referta, quasi pulvere pyrio afflata, indicio certissimo, liquoris vitales a salibus acido-biliois, acribus, valde jam esse deturpato, unde particulis sulphureis rarefactis facillime febris lenta, hectica, sese insinuare potuit. Calor fuit primo occurso mitis, paulo post acer & mordax, qui semper circa vespertum sub schemate febrilis paroxysmi rediit, sed in inflammatorios calores terminavit; observabatur jam urina oleaginosa, respiratio difficilis, sitis magna, appetitus prostratus, emaciatum corporis habitus, continua pulmonum oppressio, virium languor, decubitus in dextrum latus valde molestus, tussis cum sputo purulento, spisso, fetido, corpus sudore tota nocte quasi diffudit cum pulsu frequenti & marasmo, atque contabescens torpidus fuit, morosus, profundis cogitationibus defixus vix ad interrogata respondit, neque claram, sed non nisi submissam & raucam vocem edere potuit, quod vitio pulmonum sanie repletorum, qui aeris copiam, quo vox formatur, imminuunt, natum. Hoc tamen quo notandum quoties alvus fuit concitior, & ad diarrhæam proclivior, toties alleviationem symptomatum sensit patiens. Accessit tandem facies Hippocratica, nares scilicet acutæ, oculi concavi, tempora collap-
sa, genæ exesæ, malæ proturberantes, scapulæ, claviculæ, costæ prominentes, artus cum reliquis musculosis partibus exarnes, verbo: ossa tegit macies, non juvat ora cibus, & fuit sceletro similis. Adhibuimus ex speciosissimo medicaminum thoracicorum & scorbuticorum apparatu satis mature remedia, v. gr. pulv. pectorales superius notatos, cum pulv. hepat. rad. aeri, tartar. vitriol. &c. remixtos, linctus, gelatinas, emulsionem, electuaria, infusa decocta ex spec. prodecoct. pectoral. flor. & fruct. nec non herb. fumar. beccabung. trifol. fibrin. cichor. acet. hepat. nob. flor. bellid. aliisque cum sero lactis, aliquando cum aqua ad formam potus Theæ parata; immo mense Majo, cum animadvertissem, hecticos calores aliquantulum deferuisse, lac caprillum recens cum modico sacchari, a quo tamen ob acidum vel salum ventriculi fermentum, anxietates præcordiorum, hypochondriorum tensiones, adauctam inde febrem, mox abstinere debuit. Nil vero magis profuit in sudoribus nocturnis, quam unguent. resumptiv. in frigid. Gal. cum saccharo sarurni paratum. Ast vehementia & diuturnitas morbi elusit opem & operam omnem; donec tandem medicamentorum pertæsus, accedente extrema virium prostratione, sati necessitatem longiori vita dignus, magno cum parentum luctu perolvisset, Eodem tempore Franciscanus xxx. annorum laboravit phthisi vera, sive consumptione partium corporis musculosarum a colliquatione & pulmonum vitio orta, quæ fuit cum compressione pectoris, difficili respirio, sed fere sine febre; huic præmissis pectoralibus in primis antihetico Pot. aliquando cum

pilulis de cynoglossa remixtis, exhibitisque subinde laxantibus man-
natis, decoctis quoque aut iusculis ex herbis pectoralibus, resolen-
tibus, expectorantibus &c. lactis caprilli usus optime cessit. Acri-
monia enim humorum salina inde fuit temperata, serum dilutum,
corpus humectatum, & ad nutritionem dispositum. In aliquibus observavi febrem hecticam ex Quartana, ut plurimum autem ex fe-
bribus continuis male judicatis subortam. Harum enim fermenta-
tio & calor p. n. continuatus lymphæ rorem absumpsit, inde vi-
rium habitusque corporis concidentia: acredo vero, quæ alias, per
vices accessit, & tumultus edidit fermentatione continuata, au-
cta & quasi domestica facta febrem hecticam Marasmoden in uno
& altero induxit lethalem. In pueris & puellis III. IV. V. VI.
annorum, notavi eodem tempore apud nos alias valde frequen-
tem Tabis speciem, quæ fuit cum abdominis tensione & intume-
scentia, calore intrinsecus aucto, pulsu circa vespertum celeriore,
inquietudine nocturna, carne flaccida, totius corporis extenuatio-
ne, etiam in iis, qui avidissime comederunt, ita quidem, ut
carne jam absumpta, ossa omnia prominuerint, sola cute conte-
cta. Faciei color fuit pallidus, subniger & lividus, nulla fere ad-
fuit tussis, nullum sputum, respiratio libera, indicio evidentissi-
mo, hos sine pulmonum corruptione, marcere confectos, causam
autem fuisse querendam in mesenterii, ductuum nempe lacteorum,
glandularum obstructione, nec non humorum corruptorum in abdo-
mine abundantia; utut non negem, lumbricos tunc simul in inte-
stinis nasci potuisse, qui quandoque in conspectum venerunt. Un-
de non mirum, cum universi sanguinis systema sale acido jam
scaturierit, corpora debito alimento privata, in tantam incidisse
maciem. Huic malo quamplurima opposuimus remedia, in primis
aperientia, martialia, v. gr. croc. mart. aperit. cum salibus, arcan. dupl.
nitrosa pulv. hepat. sal. C. B. tartar. vitriol. antihet. Pot. lap. cancr.
rad. ari &c. aliquando anthelmintica, v. gr. aqua contra verm. cum syr.
flor. persic. aliaque Topica, unguent. contra verm. de oppilat. ol. cap-
par. tamarisc. colocynth. spirit. sal. ammon. &c. sed irritato conatu
omnia, donec tandem lenta tabe consumpti supremum diem clau-
sissent. Otimestres aliquot partus his mensibus habuimus, quos ta-
men omnes spatio, v. VI. vel VII. dierum mortuos observavimus.
Jul. incepit cum caloribus, quos tamen quandoque temperaverunt
pluviz lenioresque venti, has die x. habuimus copiosas, quas se-
quentibus XIV. diebus calores exceperunt intensissimi, die XXI. XXII.
XXIII. tonitrua horrenda cum fulguribus, quandoque cum, quan-
doque sine imbris; a die XXV. ad finem usque variæ aeris vicis-
situdines, mox diversi ventorum tumultus, mox frigora, mox plu-
via, rarissime solis splendor. Integer August. si sex aut septem dies
amēnos per intervalla calidos, exceperis, pluviis, & ventis præter
ætatis anni indolem, valde rigidus fuit. Pluviz continuarent ipso
Ægidii die, sequenti autem, discussis jam nubibus nebulosis, cæ-
lum serenatum gratiora nobis promisit tempora, & secuti sunt XIV.
fere dies calidi, sereni, noctes tepidæ, vini culturæ exoptatæ. Me-
dio Septemb. rursus varias subiit mutationes tempestas, maximæ ex-
ortæ nebulæ, solis demum meridiani splendore dissipatæ, sed bre-
vi in pluvias fere continuas, aut de die, aut de nocte, in primis
æquinoctiali die abeuntes, quæ cæli inclementia ventosa ac pluviosa
in Octob. usque duravit, unde botri nec dum bene maturi aut di-
gesti iusto citius ob excessivum humidum computruerunt, & deci-
derunt copiose in terram, Quinta Octobris spem fecit haud exiguan
serenorum temporum, sed octava valde pluit, a qua ad ultimam lunæ
quadram, i. e. XVIII. grato solis splendore corpora nostra incalue-
runt, quo ipso ingruerunt pluviz, XIX. gelu XX. nives, quorum ca-
sus die XXI. cum procellosis aeris agitationibus, ac frigore ingens fuit,
earum tamen præceps solutio. Jam imminuerunt vindemiz, & vi-
num, quod collectum fuit ante pluvias aut nives, in Jul. usque, sa-
libus heterogeneis a mucilagine terrestri & sulphurea quasi ligatis, & in
fermentationis negotio sufficienti impeditis, permanfit turbidum, mu-
cilaginosum, sed sine fœtore; post pluvias autem contraxit fœtorem
putridum, quem retinuit usque ad depurationem, quæ tandem post
annum subsecuta est cum grato colore & sapore. Circa finem Octobr.
autumnalis amœnitas nobis iterum affulsit, quæ toto fere No-
vemb. qui siccus extitit, continuavit. Decemb. varius & incon-
stans fuit, mox frigidus, mox nebulosus, mox pluviosus, un-
de nives, quæ die S. Andræ ceciderunt, brevi tabuerunt. Hoc se-
mestri frequentes habuimus febres Tertianas, quæ ut plurimum sine
prævio horrore, potius cum corporis gravitate, præcordiorum an-
gustia, vomitibus, siti, capitis dolore, vigilis, in primis caloribus
intensis incepèrunt, & primis IV. diebus magis continuarum, quam
intermittentium genium redoluerunt, donec tandem ad perfectam
apyrexiam devenerunt. Initium curæ a Venæ sectione sumpsi, at-
que præscripti præcipitantia, antifebrilia ex lap. cancr. sal. absinth.
C. B. centaur. min. arcan. dupl. antim. diaph. tandem die intermis-
sionis Laxativum; quibus feliciter sexto, aut ad summum septimo
paroxysmo sublata fuerunt. Nec defuerunt quotidiane, quartane,
facili tamen negotio levata. Eodem tempore viguerunt febres con-
tinuæ, acutæ, quæ sub initium videbantur benignæ, tertio tamen
& quarto die latentem suam prodiderunt malignitatem; calores enim
hactenus vix considerandi, jam intensiores facti, immanes produ-
xerunt cephalalgias, vehementissimas virium prostrationes, deliria,
vigilias, sitim, linguam scabram, fissam, tendinum contractiones,
motus convulsivus varios ac inordinatos, quos una cum tremore la-
biorum in chirurgi hujatis facie observavi frequentes, non tamen,
quod mirandum, lethales. R. P. Franciscanis lues hæc fuit popu-
laris, eosque fere omnes hic existentes invasis. Illi enim mustum
mendicatum & collectum emissi vini novo turbido ac multo se obrue-
runt, ac corpus prava vietus ratione ad cacochymiam disposuerunt.
Jam reduces cibis luridis esurialibus, pro more & exigentia tem-
poris, stomachum oneravunt, indeque has febres continuas sibi con-
ciliarunt. Venæ sectiones sub initium administratæ optime profuerunt,
diaphoretica expellentia, v. g. antim. diaph. mithrid. diascord. Franc.
spec. de hyacinth. C. C. cum confortantibus & antiepilepticis mixtæ o-
mne tulerunt punctum, morbumque hunc præcipitem, qui ex
symptomatibus gravidissimis judicabatur pernicialis, ubique septima
die nulla interveniente notabili crisi, repræstulerunt, atque omnes,
(fuerunt illorum undecim,) ex hoc morbo convaluerunt. Fœmi-
nas notavi aliquas ætatis provectionis, non gravidas, fluxu mensi-
um immodico laborantes, qui ut plurimum, in primis in plethori-
ris, ad XIV. dies duravit, & intra octiduum rediit cum languore,
lassi.

lassitudine totius corporis, facie pallida, quasi exsanguis, inappetentia, siti, caloribus, dolore capitis, lumborum, hypochondriorum inflationibus, lithymiis. Causa immodici hujus fluxus eadem omnino, quæ mensium ordinate fluentium; & sicuti in hoc sanguis turgescens venulas interiores vaginæ superficiem adeuntes divellit, ac per harum extremitates ruptas nomine menstruum nigricans lente promanat, donec subsideat aliquantum, ac imminuat ejus turgescencia; de quo legi meretur *Bohnus econom. animal. progymnas. 16. pag. 254.* ita in immodico fluxu eadem vasorum vaginalium oscula rupta, necdum occlusa, sed magis hiantia continuo quasi fundunt sanguinem, modo grumosum, modo serosum, pro habitudine sanguinis & feri hic aut in quantitate, aut qualitate, & motu peccantis atque exitum affectantis. Laxior enim & mollior vaginæ compages admittendis & emittendis sanguinis menstrui ordinarii æque, ac extraordinarii, copiis magis accommodatur, quam solidior ac durior uteri substantia. Cum vero affectus hic, si negligitur, ut plurimum *cachexiam, hydropem, atrophiam* minari solent, maturavi curam, atque in plethoricis quantitatem sanguinis, indeque natam ferocientem turgescenciam deplevi *Venæ sectione in brachio* feliciter instituta, excedentem ebullitionem & fermentationem ab humoribus biliosis, acribus, salinis volatilibus, sanguini inductam *uterinis leniter incrassantibus & adstringentibus*, v. gr. *corall. rubr. lap. hemat. trochisc. de carab. de spod. pulv. Heurn. croc. mart. adstring. terr. sigill. imo terreis omnis generis, Tinct. antiphetif. Gr. corall. succ. urticæ &c.* in malo contumaciori & refractario cum his *adstringentibus figentia*, i. e. *laudanum de tribus* accisa dosi maritavi. In *hypochondriaci scorbuticis*, ut sanguinis impetus ex obstructione viscerum, in primis mesenterii, non spontaneus fuit, sed, qua data porta, ruens coactus, ab *Adstringentium* usu *præcordiorum anxietates, capitis dolores*, aliaque symptomata hysterica notavi. Hic omnino locum invenerunt *Laxantia*, sed lenissima, extra paroxysmum propinata, v. gr. *decoct. fol. fenn. tamarind. & quod specificum fuit, rhabarb. ipsum* in substantia deglutitum. Profuerunt quoque, licet per accensum, cum *confortantibus* mixta, v. g. *Tinct. tartar. corall. compof. sperniol. Cr. aliaque martialia temperata*, acorem simul absorbentia. Pro meliori tandem viscerum & vasorum firmitudine, nec non fibrarum ac pororum coarctatione, optimo cum successu ablegavi illas ad *thermas Badavino-Austriacas*, ex quibus reduces ordinarium, & naturæ convenientem menstruum fluxum expertæ sunt. In Perillustri quadam matrona notavi *Tumorem exiguum in pudendis*, qui tamen non extra pudoris finem propendebat, sed, mensibus non fluentibus, quotidie crescebat & intumescerebat valde, mensibus autem fluentibus, qui sæpe intempestivo, aliquando immoderato & continuato ad aliquot septimanas fluxu urgebant, detumescerebat. Adnatus fuit *uteri orificio*, cujus substantiam cum vagina & pudendis absque hoc spongiosa, rugosa & glandulosa est, in qua varii generis humores stagnare & subsistere possunt, inde tumoris incrementum & decrementum. Tentavimus *injectiones cum aqua calcis vivæ, decocta lignorum* aliaque, irritum tamen conatu; suavi tandem *incisionem*, quam reformidarunt *Chirurgi Viennenses*, atque potius naturæ hoc opus committi, quam crudele & anceps sectionis remedium experiri decreverunt. Ejusmodi tumorem utero extrinsecus adnatum, tres libras ponderantem in virgine xxiv. annorum felicissime secuit *Chirurgus Halberstadensis*, cujus mentionem facit *Frider. Hoffmannus in annotat. super Poterii opera, cent. III. capit. 47. pag. m. 332.* & ipse *Poterius eodem loco*, nec non *Blancardus in Collect. Medic. centur. 3. obser. 51. pag. 421.* Sarcoma autem totam uteri vaginam occupans totaque propendens, atque interno ejus orificio adnatum observavit *Kerkringius Spicileg. Anatom. Observ. 53. pag. 114.* ex uteri orificio interiori varias excrescentias, membranaceo-carnosas propendentes *Ruyschius, Centur. Observat. Anatom. chirurg. 6. pag. 12.* nec non *Bartholinus Centur. I. hist. 94. pag. 139. Centur. II. hist. 6. pag. 161. Centur. II. hist. 58. pag. 248. Segerus in M. A. C. decen. I. ann. 2. pag. 199.* aliaque. Laboravit simul *fluore albo*, effluxitque fere indefinenter e pudendis materia purulenta, foetida, sed sine dolore, indicio certissimo, serum seu lympham hic sola peccare copia, deponique in glandulis per uterum illiusque vaginam disseminatis, quæ nimium laxantur; ductus autem excretorii inde valde dilatantur, & sphincteruli, quibus hi ductus claudi recludique solent, a peccantium humorum, qui in vasis sunt fluxiles, jam extra vasa lentescens & ichorecentes, mucosi, copia magis vel minus resolvuntur. Pro depletione feri excrementitii & viscosi, cum sit plethorica, ordinavi *Venæ sectionem in brachio, fonticulos, laxantia ex manna, rhabarb. fol. fenn. diuretica, terebinthinata nempe & succinata, mag. lap. cancr. decoctum dauci, aperitivum For. &c.* non omisissis quandoque *martialibus & tartareis*. Serum corrigere, ejusque qualitatem cum sanguine temperare, nec non uterum glandulasque flaccidas roborare volumus *insuf. ror. mar. cum vino, pulv. absorbente Wedel. pulv. ex ebor. unicorn. fossil. off. sep. corall. osteocoll. test. ovorum calcinatis, perlis, alum. plum. sacchar. saturn. tinctur. corall. essent. lign. in primis elix. Propriet. rhabarbarino mane ad 49. guttas, vesperi vero sequenti pulvere: Recipe magist. osteocoll. carniol. aa. Zijß. corall. rubr. præpar. margar. præpar. mastic. gummi. arab. off. sep. unicorn. fossil. ebor. aa. gr. XV. ol. lig. sassafr. guttij. M. & dividatur in v. dos. it. Recipe rad. chin. sarsaparill. a. Zij. passul. min. Zijß. mastich. Zij. alum. plumos. Zij. sem. anis. Zij. concis. D. ad nodul. Spec. Sackel. zum Wasser-sieden, pro potu ordinario: nec omisimus *Topica*, inunctiones, suffitus ex *salvia, mastiche, succino, thure*, imo nil intentatum reliquimus, eradicare tamen penitus affectum hunc contumacem non potuimus. Cum autem ex longa praxi constet, *fluorem hunc album* quandoque, in primis valde obesus, prout nostra fuit; & jam a lunari tributo fere absoluta, nec adeo enervata, in quibus humores turgent, si non est immodicus, proficuum esse, & pro *fonticulo* microcosmi habendum, qui impedit, ne corpus in majorem excrecat molem, abstinendum jam a medicamentorum usu, & curam ad *thermas majales* differendam duxi. *Hypochondriaci* variis, & gravibus symptomatibus his temporibus tentati sunt, in quibusdam *ventris inferioris viscera*, in aliis *præcordia*, in aliis *cerebri confinia* maxime affici videbantur. Ex multis unicum saltem *hypochondriaci* enarrabo exemplum, in quo syndrome gravissimorum symptomatum apparuit. Vir, ætatis mediæ, temperamenti cholericæ, habitus corporis tenebrioris, ipso *æquinoctii autumnalis die* incidi in *ventriculi dolorem*, quem pressio pede secuti sunt æstus vagi, atrocissimi capitis dolores,*

cordis palitationes, anxietates præcordiales, dolor & constrictio in pectore, sive gulæ strangulatio, quæ *suffocationem* minabatur, præcordiis enim constrictis, non solum respiratio difficilis, & ad motum quemvis laboriosa fuit, sed & non raro supervenerunt animi deliquia, ex quibus laboribus & angustiis sudor erupit frigidus; in partibus extremis notabantur spasmi & stupores cum formicationis sensu & tremore undulante, in somno pavores, terrificis insomniis interturbati, continua intestinorum murmura, in ore sapor biliosus, alvus ut plurimum obstructa. Observavi autem ex symptomatum horum confluxu suffocationes has *hypochondriacas* plerumque fuisse *spasmos* & contractiones partium nervosarum, ortasque a ventosa & humorosa hypochondriorum sentina. Sæpe ex mœstitia nimia, atque diutius continuata, nec non excessiva lætitia, in has incidit ægritudines. In paroxysmo, præmissis *clysteribus*, eximie profuerunt, & omnibus palmam præripuerunt *castorina* cum *anodynis* mixta, v. gr. *pulv. castor. gr. viij. epilept. M. Dß. specif. cephal. g. v. laudan. de trib. g. j. M. it. mist. simpl. cum ess. castor. anodyna* maritata. Extra paroxysmum in eam maxime incubuimus curam, ut humores viscidos, acidos, obstructionum auctores, attenuaremus. Multi in hoc passu multa laudant, atque pro specificis venditant. Nos in tanto medicamentorum apparatu in *martialibus & blandis laxativis*, v. gr. *Rec. Vitriol. mart. g. j. diagryd. sulphurat. g. iij. pulv. hepat. gr. vij. ol. carminat. M. gut. j. M. pro j. vice*, indubitata semper medelam invenimus, imo hoc pulvere exhibito imminuentem sæpe paroxysmum declinavimus, levi enim eguit purgante, quantum vel infans vi. septimanarum vel minor adhuc ferre posset, sed singulo mense bis eundem *pulverem* in usum vocare fuit. Non minori voto successerunt *acidule Roitschenfes*, quarum usu maximam alleviationem sensit. Jam addam, quæ in Viro ecclesiastico dignitate conspicuo de *Anaudia* notavi. Is LIV. annorum, plethoricus, atque alias *hypochondriaco affectui* obnoxius, jam mense *Julio balbutie lingue* laborare cœpit; non enim tantum in concionibus, sed etiam prælectionibus precum publicarum, quin & in communione conversatione quasdam syllabas & voces inter pronunciandum absorpsit, vel quasi suppressit, ut vix intelligi potuerit, & sumpsit hic affectus sensim atque sensim sua incrementa, donec sub finem *Septembris* mane derepente incidit in *Anaudiam*, sive *impedimentum sermonis*, ut articulate nec duo verba proferre quiverit, cum *suppare digitorum manus dextræ*, memoria factorum & gestorum, imo reminiscencia reflexiva læsa; neque enim scribendo mentem suam exprimere potuit. Linguam quaquaversum movit, volutavit, exporreordinavi sine mora, nec non medicamenta *nervina, cephalica*, v. gr. *spec. diamosch. dulc. diamb. contr. apoplex. spec. ceph. M. extr. castor. sal. volatil. succin. C.C. spir. sal. ammon. cum aqua lil. conv. ess. ambr. lign. aloes, sal. volatile oleosum*, aliaque. Linguam, in primis frenulum, inungi jussi linimento ex *conf. anacardina, alkerin. compl. ol. rut. lavend. cinnam. extr. castor.* His frequenter adhibitis adhuc eodem die sese recollegit, atque intelligibilis loqui cœpit, redeunte simul memoria. Sensus motusque lingue usus semper perstitit integer, loquelam nunquam amisit, quin potius sermonem exteriori per motum lingue exprimere, ob aerem tamen minus sufficienter inter fluctuantes gutturus sinus impulsam & reflexum, non satis intelligibiliter proferre potuit; natum hoc utique vitio *laryngis*, nervorumque sexti paris, qui sunt vocales. Sermo enim impeditus fuit a resolutis aut relaxatis nimium musculorum angustæ laryngis rimæ constringendæ aut angustandæ dicatorem, ligamenti, quorum fibræ sine dubio a sero nimis copiose, vel per arterias, vel per vasa lymphatica ex toto corpore plethorico affluente, flaccidæ redditæ rimulam haud sufficienter pro allusione & extrusione violenta aeris angustare ac disponere valuerunt. Accessit & aliud malum valde suspectum, *facium constrictio*, suffocationem, sive strangulationem mentiens. Hæc aliquoties, sed derepente venit, ipsiusque fauces quasi laqueo constrinxit, liberamque respirationem inhibuit, brevi tamen latitare, sed falso; potius a particulis acidis & austeris hypochondriacis, mediantibus nervis recurrentibus, musculos faucium in spasmos cogendo; viam idcirco aeri præcludentibus, ne a musculis respirationi inservientibus præ angustia loci facta ex & impelli queat, deducendum. Cum vero vidisset, se quidem voces & verba, nondum tamen expedite, neque semper integro sensu & phrasi proferre posse, urisit ulteriorem curam, quam ob anni ætatem, *autumno præcipiti*, ipsi denegavi, eamque ad incrementa dierum differre volui. Moræ igitur pertæsus incidit in aliquem, qui perfectam mali curam etiam hoc tempore promisit; deditque inter alia *Vomitivum*, ipso solstitio hyberno imminente, quo id affectus est, ut quidem magnam humorum saburram, fictitium nempe, aut potius, *imaginarium pectoris apostema* Vomitu rejecerit, inde alleviationem adbiduum senserit, paulo post tamen in majorem debilitatem, mentis vacillationem ac torporem, propensionem in somnum, loquelam difficiliorem inciderit. Nec his acquiescere voluit, sed ordinavit *fumifunctionem nicotianæ*, ipsi alias insuetam, nervis infestam, imo *nervinis morbis exitiosam*, experientia enim constat, *Apoplexiam* inter *nicotianæ* usum sæpe invasisse, teste *Deckero exercit. Pract. p. m. 89. & Riccardi Carr, epist. Med. 2. p. 21.* Inde valde obliviosus factus, & sub initium *Februarii* sequentis anni gravissima *apoplexia* tactus, subito interiit.

Constitutio Epidemica Sempronienfis Anni 1708.

Redidisses hac hyeme denuo permutata fuisse tempora, atque adesse æstatem etiam in frigidissimis alias mensibus. *Januarius* quippe nullum fovit gelu, nullas nives, fuit ut plurimum pluviosus, nebulosus, humidus, nubilus, calidus. *Februarius* quasi totus calidus, amœnus, ut plurimum serenus, quandoque pluviosus, ventosus, & circa finem cum modico frigore & nive, quæ tamen altera die evanuit, unde jam medio mense observavimus diversos flores. Huic ad *æquinoctium* fere usque plane similis *Martius*, amœnus nempe, calidus, qui in copia flores elicit. Circa *æquinoctium* die XVIII. XIX. XX. suborti sunt venti valde frigidi, rigidi, qui congelarunt terram, sed sub finem mensis aura iterum comparuit turbida, pluviosa. *Aprilis* præter morem illuxit serenus, calidus, plane æstivus, raro pluviosus, sicciior magis. *Majus* variabilis, ad medium usque frigidus, pluviosus, a medio ad finem calidus, amœnus: II.

antem, III. & IV. fuerunt pruinae, quæ hinc in vineis damna fecerunt. Totus Junius pluviosus, Medardus quoque & Job. Baptista effuderunt pluvias, imo nulla dies hujus mensis fuit sine pluvii. Toto Januario præter otalgiam in Viro, mictum cruentum in filio quodam post partum, pleuritidem cum diarrhæa, nullos fere vidi morbos, Variolis tamen laborantes habui, quorum unus erat VI. annorum, qui eruptis prius tertia morbi die una cum variolis petechiis purpureis, quarta die antea correptus hæmorrhagia narium mortuus est. Mense Februario observavi Apoplexias fortissimas, uti quoque febres continuas VII. die solutas. Hoc mense scæmina quædam enixa est fœtum mortuum, secundinæ remanserunt, altera die mortua. Martio filiolus quendam Rustensem clausura ani laborantem habui sub cura, de quo Sculteti Armamentarium videri potest: succurri etiam scæminæ otalgia laboranti mist. simpl. mixta cum ess. castor. De doloribus capitis, Vertigine, diarrhæis cum maximis caloribus, febribus tertianis continuis, variolis tunc temporis grassantibus nil adducam. Aprili, Majo, Junio continuarunt variolæ, quas tamen modo in filio quodam prægressa est epilepsia, modo in puella die III. IV. V. secuta est hæmorrhagia narium, jam in alia die XII. herpes miliaris. Quædam variolæ confluebant, quibusdam jungebatur sub initium diarrhæa, quibusdam epilepsia. Febres continuæ catarrhales, diarrhææ quoque his temporibus in conspectum prodibant. Mense tamen Junio Variolæ epidemicæ grassantes maxime erant malignæ. Sic eas observavi in aliis cum maculis purpureis, in alio cum vibicibus, in alio suborti sunt XII. die furunculi instar anthracum, in aliis tumores & parotides instar bubonum, aliis palatum, gingivæ, fauces fuerunt exese: alios consumpsit calor bellicus, inflammatorius, & fuerunt hæc variolæ funestæ die X. XXIII. XXVII. Sic malum, sive venenum variolosum in Gratiofo parvulo Ebergeny fuit insanabile, adeoque plus docta valuit arte. Incepit morbus cum horrore, quem ingentes exceperunt calores, quandoque deliria, sitis magna, pulsus celer, languores totius corporis, tertia die eruperunt variolæ, quarta maculæ petechiales coloris purpurei, guttarum instar copiose per cutem dispersæ, inde variolarum excretio retardata fuit, quæ tandem omnes coierunt in unam, totamque faciem crusta, sanie fœtidissima referta, contexerunt. Undecima die supervenit diarrhæa, brevi tamen consopita, die XII. alix effluerunt vesicæ, aqua limpida flava, quandoque sanguine mixta, plenæ, quæ ordinarias contexerunt variolas, magnitudine ovi columbini, imo ovi gallinæ. Sie haben ausgesehen wie die ordinären Zangen-Blattern, so durch ein Vesicatorium aufgezo-gen werden, oder als wenn man sich in heisz-siedend Wasser verbrennt hätte, & steterunt per biduum: die XIV. notavimus in dorso lateris dextri tumorem, qui nullo modo maturari potuit, sed resolutus tandem collum occupavit, omnemque maturationem respuit, imo sese resolvit: interea calores continuarunt intensi, accessit tussis cum exspuione materiæ purulentæ, quandoque sanguinis, fœtor oris fuit cadaverosus: indicio certissimo, pulmones variolis refertos, valde esse inflammatos, exulceratos, ut plurimum consumptos, si non sphacelatos XXIII. demum die pauperculus viribus jam exhaustus obiit. Post mortem observata tota facies & abdomen nigerrimum, ex quo colligendum, non solum totam massam sanguineam, verum etiam omnia viscera corrosivo hoc veneno varioloso fuisse infecta, tandem sphacelata. Julius magis pluviosus fuit, quam serenus. Augusti initium æque pluviosum, quinta incepterunt calores, qui toto mense continuarunt. Egidius dies sine pluvii, & per totum Septembrem mira aeris siccitas, calores præservidi, intensissimi, etiam nocturno tempore, qui durarunt usque æquinoctium, mane ros cecidit, & supervenerunt nebulæ fructiferae. Flavuit ut plurimum hoc tempore auster, bonum alias constantis tempestatis signum. October ultra medium serenissimus, pulcherrimus, calidus, d. XIV. XV. noctes frigida, inde in aliquibus promontoriis botri congelati, superveniente tamen solis splendore statim regelati; d. XXVII. ante festum Simonis & Judæ ingentes ceciderunt nives, dies festus, nempe XXVIII. valde serenus, sed frigidus borealis, XXX. nec non XXXI. iterum nixit, sed tertia nix absumpsit priores, ut jam sine damno vindemias nostras uberiores, præter expectationem, colligere poterimus, neque nocuerunt nives, potius conservarunt botros a frigore, vinum autem, quod crevit in abundantia, fuit generosissimum, suavissimum, dulce. In Novembri aeris temperies longe benignior, & quidem calidior affulsit. Decembri aere mutato ceciderunt d. VII. VIII. X. nives copiosæ, profundæ, mox secuta frigora, & circa finem denuo nives. Mense Julio continuarunt Variolæ malignæ, neminem tamen, qui X. annum excessit, hoc tempore invaluerunt. Accedebant semper cum somno, ita ut nocte dieque dormiverint III. aut IV. diebus. Augusto nulli fere morbi visabantur præter diarrhæas & dysenterias. Circa finem ob continuas aeris siccitates, calores præservidos, Sirio insigniter urente, incepterunt febres erraticæ, quæ nullum typum servarunt, invaserunt cum aliquali frigore, insequente calore, aliquando ultra XX. aliquando ultra 40. horas durante, post apyrexiam aliquot saltim interjectis horis novus paroxysmus accessit, cum capitis dolore, siti, linguae & faucium squalore virium debilitate, ita ut febrem continuam fore judicasses; donec tandem transactis aliquot paroxysmis in tertianam ordinariam degeneravit, quod ut plurimum circa septimum diem contigit. Adhibui V. S. diaphoretica, præcipitantia, quamprimum vero notavi tertianas, aut tertianas duplices, exhibui statim chinata cum arcan. dupl. optimo cum successu. Septembri continuarunt febres tertiana, sexto paroxysmo solutæ, ubi optime profuerunt chinata &c. De his febribus erraticis vid. M. N. C. Dec. III. ann. VI. p. m. 177. app. nec non H. M. V. p. 300. Inter alia notavi, animi affectus quid possint. Officialis quidam incidit in ejusmodi febres, præcessit horror, secuti sunt calores, qui in IV. durarunt diem continui cum anxietatibus præcordiorum, aut pectoris compressionem, ut sæpe in lecto erectus sedere debuerit, cum capitis dolore, siti, deliriis &c. Adhibita Venæ sectione in brachio & pede quinta die remisit calor, qui tandem undecima intermisit, ut jam extra periculum judicatus fuerit. Quid sit, accepto tristis & ingrato nuncio derepente incidit in somnum profundum, & quasi in extasim, ut exinde expergeri non potuerit, tandem applicatis clysteriis, nec non Vesicatoriis intra XV. horas ad se rediit, omnium rerum inscius, vix loqui valens præ nimis debilitatibus, ast eodem die relabuit in priorem somnum profundum, sicque elapsis vix XII. horis, accedentibus convulsionibus, sine febre comatosus fatis cessit. Supplem. ad Sydenham.

Pari ratione nobilis matrona, quinquagenaria, temperamenti ferofobiliosis habitus carnosioris, in sterili matrimonio semper existens, tributum tamen lunare suum accurate, sed largissime persolvens, hypochondriacis, nec non hystericiis passionibus valde obnoxia, jam a longo tempore valetudinaria, incidit sub finem mensis Septembris in febrem continuæ subtilem, quæ rite tractata degeneravit in tertianam exquisitam septimo paroxysmo judicatam. Reliquit autem post se summam virium prostrationem, anorexiam, capitis gravitatem, anxietates, cachexiam ipsam. Urina, quam hæcenus reddidit, fuit turbida, cum sedimento copiosissimo, mucoso, coloris rosei, non tamen foetens. Materiam hanc hypochondriacam, quam natura, optima morborum medicatrix, per ductus urinarios excretam voluit, jam motam, promovimus digestivis, aperientibus, v. gr. pulp. hepat. tartar. vitriolat. arcan. dupl. sal. cic. lap. cancr. tinct. sal. tartar. tandem decoct. aperit. For. cum sol. fenn. & manna acuto. Quinquies inde dejecit, relicta tamen aliquali, sed torminosa in intestinis hypercatharsis ad bideum; qua sedata melius sese habuit, atque ordinarius mensium fluxus institit. Octiduo post, i. e. quarta Februarii observavi pulsus alteratum, iusto celeriores, sexta vespere affectum soporosum, propensionem nempe gravem, & invincibilem in somnum, reipsa dormivit, & excitata oculos aperuit, ad interrogata paucis, sed apposite respondit, de nullis doloribus conquesta, mox relapsa in somnum; si adstantes devotas ac pias cantilenas canere inceperunt, ipsa simul expergefata statim cecinit, neque ante cantare destitit, quam inchoatam absolvit stropham, adeoque semper sibi fuit præsens, omnes cognovit, nunquam sensibus neque internis, neque externis, neque motu destituta, sed valde debilitata, & ad actiones more solito obeundas languida, respiratio fuit integra. Calor febrilis notabatur p. n. lentus acris & mordax, qui vespertino tamen & nocturno tempore intensior, pulsus celer, mollis, facies pallida, subumida, quasi leucophlegmatica, oculi ultimis diebus quasi turbidi, lachrymabundi. Opposui huic Comiti soporoso varia v. gr. castorina cinnabarina jovialia, sal. volatilia, succin. C. C. cum pulveribus epilepticis & confortantibus remixta, nec non Vesicatorium nuchæ applicatum, sed sine operatione, imo irritum successit omnia, donec tandem somnus hic p. n. septima die corpus fratri suo morti tradidit. Paulo post mortem e naribus copiose stillavit ichor serofus. Verissima igitur manet observatio Wedelii opilogia inserta, p. m. 46. qua fateatur, se nunquam vidisse affectum soporosum vere talem, ubi non adfuisset calor p. n. simul quod & ipse aliquoties jam in praxi observavi. Eodem mense Illustrissima Comitissa gratiosam enixa est filiam, quæ lac sugere ex papilla non potuit, sed id per nares summa cum molestia & anxietate reddere debuit. Examinatis faucibus, columella & tonsillæ cum postica parte palati abfuerunt, unde lac, quod deglutire non potuit, per nares resultavit. Non diu superstes fuit, tertio enim a natiuitate die, accedentibus motibus convulsivis fatis cessit. In causas inquiri, quare natura in formando corpore a recta formatione & scopo deflexit, harumque partium deficientium oblita fuit, sciant, Illustrissimam matrem libenter & quidem attente ac considerate sæpe in distractos canum & felium rictus ludendo inspexisse, adeoque horum structuram fortiter sibi impressisse. Interim Wedelianum porisma, uvulam nempe ad deglutionem eximie facere, manet verissimum. Parallela aliquo modo hisce exemplis, si cui volupe fuerit legere, adeat Observationes Wedelii recensitas in M. A. N. C. legat Dec. II. Observ. 5. anno 5. M. A. N. C. p. 12. nec non Salmuth. observ. med. 6. cent. 3. pag. 115. ubi similes reperiuntur casus. Febres erraticæ adhuc dum Octobri continuarunt, calores autem non adeo fuere intensi, interim observavi hemitritæos, ubi febris una die bis venit, & altera semel. Vice Colonnellus quidam ex febre colica biliosa cum vomitu correptus incidit in deliria, ex his in convulsionibus epilepticas, qui tamen evasit. Sic alius quidam Vir laboravit febre continua cum maximis debilitatibus, capitis dolore, corrosione & torminibus ventris, sexta supervenit fluxus alvi, septima icterus, qui occupavit totum habitum corporis, cum defectionibus albis, urina saturatori, nigricante, oleaginosa, proclivitate in somnum, & solvit calores. At initio dedi diaphoretica cum confortantibus mixta, caloribus vero jam abactis spec. diacurcum. cum pulv. rhubarb. tartar. vitriolat. sal. cic. trochisc. de eupator. &c. Novembri incepterunt grassari morbilli ut plurimum benigni. Tussis ferine atque catarrhi frequentissimi. Mense Decembri continuarunt adhuc morbilli, qui tamen sub finem anni maximam induerunt malignitatem, fuerunt valde parvi cum maximis catarrhis, fuerint &c. Quidam correptus ex febre maligna cum diarrhæa, vomitibus, singultu continuo, tandem adhibitis V. S. stipticis, castoris, nec non opiatis, quæ pro dosi ad gr. iſſ. præscripti, nona die convaluit præter omnium expectationem.

Constitutio Epidemica Sempronienſis anni 1709.

J Anuarius inceptit cum frigore, quod a die V. ad XII. valde exasperatum, imo post hominum memoriam acerbissimum fuit, remisit tamen ad aliquot dies, d. XVIII. vero iterum intendebatur, verbo, nives ceciderunt supra nives, gelu supra gelu, & continuavit per totum mensem. Mense Februario continuarunt frigora, imo III. & IV. ceciderunt nives copiosissimæ cum horrendo gelu & ventis, ut homo in plateis vix ire potuerit, quam tempestatem nemo unquam observavit, adeoque vera fuit rusticorum observatio, Sole micante, die purificante, nix major erit, quam ante. Sol enim hoc die splendebat. Post novilunium remisit gelu, sed rediit die XVIII. XIX. ingens cum nivibus, quod continuavit: die XXV. & XXVI. longe majores ceciderunt nives cum omni tempestatum insolitarum, frigorum & ventorum genere, quæ præcluserunt ubique vias, arbores frigoribus obnoxias decusserunt cunctas. Duravit hoc in Martium usque. Continuavit enim & hoc mense gelu una cum nivibus, quæ copiose ceciderunt, ad æquinoctium usque, adeoque hyems hujus anni fuit summa, tempestas sævissima, nivis altitudo maxima, cujus nulla hominum ante nos recordatur memoria. Jam mitescen-te hyeme jucundiora & calidiora affluerunt tempora. Aprilis enim fuit valde amœnus, serenus, calidus. Majus tamen erat frigidus, pluviosus, XVII. die nixit. Junio denuo calida, sicca tempestas observabatur. Mense Januario continuarunt adhuc morbilli cum tussibus vehementissimis, catarrhi; febres continuæ septima die solutæ, quæ tamen levissima occasione redierunt. Hoc mense in puella octenni observavi menses ordinarios. Februario grassabantur petechiæ, febres

febres continuæ, & matrona quædam mortua est comate somnolento septima morbi die. Martio vilebantur morbilli, herpes miliaris ex puerperio. Catarrhi fuerunt frequentissimi, & apud infantes cum febre continua. Febres continuæ, petechiales adultos quoque invadebant, quæ posteriores per totum Aprilem observabantur. Mense Maio morbi præter catarrhos, & febres intermittentes fere nulli. Virgo tamen quædam nobilis hoc mense sphacelo ex colica biliosa duarum dierum fuit mortua. Erat hæc ipsa virgo XXXII. annorum, atrabiliaria, quæ d. IX. Maii derepente vespere incidit in sævissimos, & acutissimos ventris dolores, qui dextra magis parte cruciabantur, atque modo fursum, modo deorsum iverunt, in primis vero regionem umbilici usque ad scrobiculum cordis occuparunt, tanta sævitie, ut existimaverit se veru ignito perfodi, urserunt vomitus, anxietates summe, adfuit omnimoda excrementorum & flatuum retentio; ordinavimus frequentes enematum injectiones, nec non aquam laxativam, quam prima vice rejecit, altera vero retinuit, irritum tamen conatu omnia. Secunda enim die fluxerunt menses coloris nigerrimi, accessit paulo post singultus, mox totalis fore tum pulsus tum caloris extinctio, salvis sensibus motuque membrorum illæso, quam refrigerationem non percepit, quin potius de intensissimis caloribus internis, quasi candenti ferro intus adusta fuisset, conquesta, manibus glaciei instar rigidissimis subinde loca petiit frigidiora, eademque die, i. e. secunda Martii vespere mentis tamen compos, velociter, sed feliciter humanis rebus erepta est. Succu hic intestinales, in primis biliosi, acres inter plexus nerveos mesentericos, nec non fibras intestinales hærentes, atque in illarum anfractibus conclusi, acrimonia sua tormina & cruciatus excitarunt terribiles, atque in fundum Ventriculi penetrantes Ventriculum ad vomitus & singultum stimularunt, arsenicalem autem naturam mox induentes intestina instar mineralis veneni assumpti corroserunt, dilacerarunt, atque in ea more perforantis terebellæ, aut spinæ infixæ, se infixarunt, inflammationem conciliarunt, & stagnante in capillaribus sanguine, acrimonia sua corrosiva in momento fere intestina sphacelarunt, quasi in ferventissimam aquam immersa fuissent. Similes casus vid. Joh. Sophron. Kozack de sale, c. 6. sect. 15. pag. 260. Dominici Panarolum Observ. Med. 50. Pentecost. 4. p. m. 139. Segerum observ. 82. dec. I. ann. III. M. A. N. C. Mense Junio morbos nullos observavi, exceptis febribus tertianis, nec non casu infelici cujusdam Domini, febre continua laborantis, quam die IX. exceperunt terribiles convulsiones epileptice, inde secuta deliria &c. Calores intermiserunt, deliria vera remanserunt. Sub initium quartæ septimanæ observavi novos calores ex scorbutico ortos, cum maculis scorbuticis purpureis, vigiliis continuis, deliriis, nec non copiosa sanguinis per inferiora partim grumosi, partim floridi ad tres medias ejectione, inde summa virium prostratio, & cum fine quintæ septimanæ mors. Julius hujus anni fuit valde ventosus, quandoque præter morem austerus, frigidus, sine pluvii fere. Totus Augustus erat valde calidus, exceptis sub finem aliquot diebus, qui fuerunt ventosi, frigidi. Frigus quoque observabatur per totum Septembrem, qui ut plurimum pluviosus fuit. Aegidii die usque ad prandium pluebat. In Festo Matthæi circa vesperam habuimus ingentia fulgura, tonitrua, pluvias, sed sine grandinibus. Mense Julio, Augusto, Septembri, Octobri insolite sine ætatis discrimine lævierunt febres, peculiarem enim habuerunt naturam, invaserunt cum modico horrore, mox caloribus continuis, ut etiam peritissimi credidissent, adesse febres continuas malignas, vomitibus, alvi fluxu, siti, doloribus capitis, vigiliis, v. demum die remittente calore degenerarunt in intermittentes exquisitas, quæ pro subjectorum temperamentis, sanguinisque ac humorum constitutione modo contumaciores, modo benigniores fuerunt. Paroxysmum imminens ut plurimum comitabantur frequentes dejectiones biliosæ, nec non Vomitus terribiles cholerae instar. Evomuerunt quippe modo frusta pituitæ coagulata, viscidæ, modo bilem flavam, modo vermes ævi & ætæ copiosos, diebus intercalaribus cessarunt vomitus, alvi fluxus. Versipellis hæc febris epidemica quosdam invasit cum exanthematibus urticæ puncturis similibus, quæ calore retrocedente recesserunt, & calore redeunte redierunt. In duabus personis, una XVII. altera xxx. annorum, observavi his febribus supervenisse apoplexias fortissimas lethales. Raro servarunt flata sua tempora, sed quandoque x. XII. horas præponendo & anticipando virulentiam suam ad 30. aliquot, imo 40. horas exercuerunt, quandoque unus paroxysmus excepit alterum, donec tandem peregrino materiæ miasmate sufficienter dissipato, & extincto, septimo, aut ad summum octavo paroxysmo terminatæ sunt, relictis post se pustulis & fissuris in lingua, inflammatione faucium, abscessibus, semper autem virium prostratione summa. Venæ sectio etiam in principio adhibita nil profuit, quin potius febrilis paroxysmus post ejus administrationem incrementum sumpsit, sanguis autem extractus floridissimus apparuit, & natura magis debilitata fuit. Conduxerunt blanda diaphoretica, quæ paroxysmos in ordinem redegerunt, & post tertium paroxysmum laxantia die a febre vacuo exhibita. Tandem devenimus ad antisebrilia, ut sunt salia amarifcula, quæ incidunt, serumque attenuant, v. gr. sal. absinth. C. B. centaur. min. arcan. dupl. nec non alcalica fixa, pulveres nempe inspidos ac terreeos, quales sunt lap. cancr. specif. febril. Cr. Omne autem fere punctum absolvit decantatissimus cort. peruv. cum salibus mixtus, & evacuato jam corpore, i. e. ante accessum v. VI. & paroxysmi propinatus, septimum vel ad summum octavum paroxysmum subegit, atque hac ratione febrem hanc jugulavit. Rimatus causas procatasticas epidemialis hujus febris, aeris anomaliz & intemperiei, nec non largiori potui propter calorem externum vix tolerandum eam adscribendam duxi. Augustus enim, qui fuit calidissimus, poris nimium apertis corpora sudore copioso manare fecit, inde serum absumptum, aut subtractis partibus tenuioribus biliosæ particule auctæ, atque hoc modo acrimonia biliosa, fermentifica, irritativa enata, quæ licet a largiori potu dilui, & serum refundi videretur: Ventriculi tamen intestinorum tonum labefactavit, & ad excernendum ævi & ætæ plus justo contenta citavit. Utur non negandum, febres hæc epidemicas ex miasmate, aeris sobole, simul aliquid participasse. Non fuerunt contagiosæ, imo si rite tractabantur, nulli funestas, ex incuria tamen & negligentia, aut medicastroorum præpostera & perversa cura ac imperitia accedente cachexia & hydrope, multis exitiosæ. Et hæc ratio est, quod in aliquibus locis Hungariæ ex defectu medicamentorum, aut perversa, aut neglecta cura hæc febres malignitatem pestiferam assumpserint, in primis si ex miasmate, aeris sobole,

aliquid participarunt. Febres petechiales, quæ tamen autumnio præcipiti quotannis sunt frequentissimæ, hoc anno vix observavi, & si vidi, fuerunt benignæ. Diarrhææ atque dysentericæ eodem tempore frequentes quoque fuerunt. Infantes, quos corripiebant, si superarunt nonnum diem, evaserunt.

Dn. D. Josephi Lanzoni Constitutio Epidemica
Ferrariensis Anni 1729.

Quam amara est, ac semper erit, apud Ferrarienses memoria anni hujus 1729. cujus calamitatis initium fuit Lunaris cursus Septemb. anni elapsi 1728. Tunc enim austro spirante,

Post largos imbres pluviamque madentem

Inceperunt aquæ pertinaciter adeo super terræ faciem effusæ, ut totam telluris superficiem aquis pluvialibus contestam, semina future messis respuentem, inspicere fuerit coactus infelix noster Agricola:

Hinc moderatrix Cynthis noctis

in quavis periodo aqua pluviali scatebat, & usque ad Majales dies cæli claritas non effulsit, sic corruptæ in imis vallibus aquæ foetentes dabant nebulas, & in illis, non ex illis, pene infinita oriebantur insecta, hinc erucæ, culices, muscæ, & varia ranarum & bufonum genera totam terræ superficiem infecere, quod forte corruptionis aquarum ac aeris signum evidens fuit; sic apud Plutarchum legitur, artem medicam pestilentem æstatem ex araneorum frequentia prænunciare. Accessere æstivæ Lucæ, cum derepente in Vinariis cellis totus Bromii liquor excanduit, qui erat solatium cordis, & in ipso excitata præternaturali fermentatione, mutato colore, sapore, ac motu, ejus omnis compages vitiata comparuit; unde recte caneret Silius

Et marcida vina largiuntur.

Hic ego exclamavi cum discipulis meis, o nos infelices, ex vini corruptione humorum discrasiam experiemur; inter vinum & sanguinem enim intercedit mutua analogia; unde ex illius putrescentia corruptio humorum nostrorum erit timenda; & hic cœpere in hominibus febres, primo sub tertianæ figura cum vomitibus, ac alvi fluxibus biliosis, aliisque prævis stipatæ symptomatibus; nullis cedebant remediis, a Venæ sectione complicabantur. Et hic bilem continere nequeo; cum enim in meis publicis ac privatis Lectionibus, in meis scriptis, typis datis, docuerim venæ sectionem Panaceam non esse, imo suadente Celso anceps esse ac periculosum præsidii tale genus, attamen, velut si esset aqua fluminis, sanguis inutiliter, imo damnote, disperditur, & cum venæ sectio sit magnum remedium, non nisi urgente necessitate in morbis magnis, ac internis inflammationibus, apoplexiis usurpari deberet; Ast in tertiana suavis Doctorum, & speciatim Joh. Fortis, Ramazzini, Rolarii &c. Venæ sectio usurpata duplicat febrem, ut in praxi facienda meis ostendi Tyronibus, ex missione enim sanguinis fomes tertianæ febris, stabulans in primis vis, mutato loco in venas transit, unde ardens facta morbus evadit lethalis; & ut verum candide dicam, nescio in quo libro Doctorum legerint hæc isti nostri Pseudo-Medici vel non studentes, vel non legentes, aut non intelligentes, quod pejus est: Ast redeamus in viam; si a cortice Peruviano sistebantur istæ febres, post paucos dies in fortiores redibant, imo invaso tota afficiebatur familia,

Cui latebat in corpore pestis,

& brevi temporis intervallo repleta Nosocomia, & nulla pene domus a furore hujus febris exempta; omnia monasteria ægrotabant, & nullus in urbe locus ab hac lue immunis evasit: In multis causa mutato loco febres produxit ardentes, unde ad plures, sive ad Alibanthas, migrarunt,

Quot labor & dura rapuit inclementia Mortis.

Nec audax lues timuit Principis habitaculum, sed sacra illius ædem ingressa ejusdem turbavit venas, & pene totam illius familiam solita febris affecit, atque multos aulicos enecavit.

Perque omnes sevit Mors inopina vias.

Sanctimonialium Septa pene omnia febricitabant, multæ ecclesiæ absque sacerdotibus erant; & sine sacrificio populus remanebat; præsertim ruri, ubi pessima ista lue totum expandit vexillum. Hic mihi nota re licet plebeios nonnullos, neglectis remediis, solo usu vini generosi convalescere, & ego juste fateri possum me, meosque familiares, hac febre affectos fuisse, & nunquam vini potum reliquisse, & ego in hac febris constitutione recidivans solo usu pul. Chinæ-chinæ, aut Cascarillæ cum vino malvatico ad plures vices assumpto, convalesci, cujus pulveris ac vini potioni successit alvi fluxus, ac si assumpsissem Cassiam, vel Mannam.

Accessit Autumnale æquinoctium, quo tempore putarunt multi hujus constitutionis finem videre; sed incassum spes ivit, nam post æquinoctiales dies multi denuo ægrotarunt, aliique nondum febrem passi, Octobris hujus tyrannidem experti, in febriles insultus incidere: Sic Mater ministrans filiis ægrotavit, sic Dominus servus, sic maritus coniugi, sic familiares invicem sibi effervescentias febriles communicabant, ita ut omnis pene familia ægrotaverit. In nonnullis variabat febris, & præsertim in recidivis, unde modo sub forma hemitritici, nunc rheumaticæ febris, nunc deliriz &c. morbus redibat, aliquando absque ullo remedio cessabat, nun in quartanam transibat, modo in pustulas, ac scabiem commutabatur: in aliquibus apparuerunt vermes, per vomitum & alvum excreti, modo vivi, nunc mortui, quod forte indicium erat summæ corruptionis humorum in primis vis stabulantium, urina in aliquibus turbida reddebatur, ac pene jumentorum lotio similis, in aliis albescens, subviridis, rufa, fabulosa, ac foetentissima: unde judicavi concoctiones non fieri in corpore, sub potus corruptione; Liberi enim a febre pristinum colorem non recuperabant, vires non redibant, nutritio impediabatur, & excrementa semper biliosa, vel cruda, concoctionis signa non dabant. Bombyces in veris initio

initio catervatim peribant, volucres fugere, pisces solummodo cre-
scebant. Nonnullis apertis corporibus hoc morbo denatis, in ven-
triculo ac omnibus intestinis inventa est magna Copia humoris vi-
scido-flavo-viridis, una cum aliquibus maculis lividis in ipsis intesti-
norum tunicis; vesica fellis erat in statu præternaturali, nam liquor
felleus pene gypseus erat, mutato sapore, sicuti succus pancreatis
austerus apparuit, cætera vero viscera erant sana, & ne minimum
quidem a statu naturali recedebant; in aliquibus nonnulli vermes in
intestinis reperti sunt, in aliis non.

Communes autem morbos a communibus causis progigni certum
est, ut etiam fatetur Cl. Ramazzinus; communes vero causæ sunt
potissimum aer, alimenta mali succi, & aquæ corruptæ, ita in no-
stra urbè, & agris, hæc fuere morborum hujus constitutionis Cau-
sæ, & semina, ex his ergo omnibus, sed promptius ab aere tan-
quam e communi fonte, e quo nemo non potare cogitur, morbos
quosdam derivari, qui multos eodem tempore afficiant, omnium
pariter est consensus. Ad hanc porro nostram epidemiam excitand-
am, in unum convenisse, & aerem vitiatum & prava alimenta
ingesta fas est arbitrari; primum quidem locum aeri a sua tempe-
rie naturali non solum secundum anni tempora recedenti, sed par-
ticulis humanæ naturæ incongruis ad satietatem pleno concedendum
dixit Clarissim. Ramazzinus; secundum autem locum pravis alimen-
tis & aqueis vitiat; Quamvis autem de miasmate contagioso ali-
qua posset esse suspicio, namque in una domo uno infecto, statim
alii ejusdem familiæ febricitabant; id tamen potius in communem
diathesim ad maturitatem eodem tempore evectam, non secus ac
cum Autumno fractus omnes eodem tempore maturescunt, referen-
dum puto potius, quam in effluvium aliquod contagiosum, exiens
e corpore primi ægrotantis. Hic autem non pigeat referre remedia,
quæ, ut sciam, fuere ægris apposta, ut hæc febrilis prava consti-
tutio evinceretur; Primo nonnulli medici in principio leniens phar-
macum exhibebant, mox cucurbitulas scarificatas dorso applicabant,
inde pulv. Chinæ chinæ propinabant, & febris sistebatur saltem per
aliquot dies, si vero redibat, iterum China porrigebatur, ita ut
aliquis fuerit qui plures libras talis pulveris sumpsit: Alii porro
medici sanguinis missiones celebrabant, & febres duplicabantur;
multi assumpere pulverem rad. contrajervæ, corticum aurantium,
corticum medic. fraxini, decoctum amarum D. Lemerii, coriandrum
pul. Theriacam Andromachi, rad. Carlinæ, alii experti sunt Mithri-
datii usum frequentem; Dialecticum Fracastorii, Decoctum centaur.
& verbenæ, vinum absinthii correctum, Chinæ corticem actuabant
alii addendo modo rhabarbarum, modo cremor tartar. vel Sal ca-
tharticum Angliæ, ad hoc, ut fusi humores corrupti in primis viis
facilius per alvum exirent; Ego vero, quod ad ine quotiescunque
assumo in vino pulverem chinæ febrifugæ, statim alvi fluxum pa-
rior, ac si cassiam, vel mannam, susciperem; Ol. nostrum contra
pestem, vulgo del Cartagna, a multis adhibitum fuit, sicut etiam
vomitoria ipsa, & immensus aquarum potus; verum ait Ramazzini-
us, quid opis expectandum in his febribus ab aquæ potu? imo ex
ejus usu sanguis pigriore motu per vasa effluere, ac tandem cache-
xiæ & hydropes succederent; uti accidit in Juvene a Ramazzino
memorato; ego certe modico vino sum usus, nec unquam vidi ali-
quem pravum effectum ab eo: Infinita propemodum curavi corpora
in hac constitutione, & juste fateri possum, neminem affectum fe-
bri talis constitutionis, a nie curatum, mortuum fuisse, præter duas
feminas, unam 65. annorum iliaca passione necatam, aliam ex sup-
pressionem mensium, inflammatione cerebri extinctam. Hæc currenti
calamo scripta sint in memoriam hujus constitutionis pessimæ. (Fer-
raria Altorfium m. Febr. Ann. 1730. missa.)

Dn. D. Caroli Friderici Loevv. Historia Febris Catharralis, quæ an-
no 1729. Mens. Novembri & Decembri per Europam Epidemice
grassata est, cui accedit Constitutio Epidemica Anni 1730.

Quanto, quamque indefesso labore Societas Imperialis L. C.
Nat. Cur. cum in rariorum perscrutatione, tum in utilium
tam physicalium, quam medicinalium rerum detectione a primis in-
cunabulis ad hæc usque tempora, usa sit, Acta atque Volumina no-
stra satis superque testantur. Laudem merentur Bauschius, Fe-
brius, Volckamerus, Schreockius, aliique tanto majorem, quo sæpius
a Membris Academicis eorum communicationem petierint, quæ uti-
litate majori se commendaverint. Atque hinc est, quod toties de
constitutione aeris non modo, sed & de morbis epidemicis accuratio-
rem descriptionem efflagitarint. Quod magis autem hac ratione in-
ductus Parens pie defunctus, & de mutationum aeris genuina anno-
tatione, & de affectuum independentium diligentiori observatione,
& de probatissimorum remedium consignatione Societati per multos
annos sollicitum sese præstitit; hoc fidelius hæc ipse ex Auctoris sche-
dis posthumis æque recensita, ac in ordinem digesta, sub titulo Hi-
storiæ Epidemicæ Hungariæ, Act. Ph. Med. A.C.L.C.N.C. Volumi-
ni I. deinde a me sunt annexa. Neque per plures annos a me con-
scriptum, atque publico bono destinatum opusculum de epidemica
Viennensi constitutione denegaturus, si sese hæc qualiscunque opella
lector probaverit. Hujus summa est expositio febris catharralis, quæ
Ann. 1729. sigillatim mense Septembr. atque Octobris, Viennæ epi-
demice grassata est, atque eo accuratiori delineatione opus habet,
quod hujus mali semina non tantum per Sueciam, Daniam, Hollan-
diam, Angliam, Hispaniam, Galliam, Helvetiam, Italiam, Austriam,
Germaniæ partes reliquas, Hungariam, Poloniam, totamque Europam
eodem tempore sparsa sint; verum & in curatione cautela nonnullæ
occurrerint, ut non adducam, morbum hunc esse rariorem, neque
quotannis obvium neque ab ullo sufficienter descriptum. Utut enim
& Schenckius in Præfat. ad Libr. obs. mentionem faciat febris ca-
tharralis, quæ anno 1580. præter Germaniam, Italiam adeo affla-
rat, ut vel Romæ saltim ultra 9000. hominum illata strages excre-
verit, & Antonius Menjotius in Dissert. Patholog. p. 140. tussim fe-
rinam, contagiosam, malignam, avorum memoria populatim sævien-
tem, & a cucullo, quo capita solebant operire, coqueluthe vulgo di-
ctam recenscat: & Nicol. de Blegny in Zodiac. Med. Gallic. sive
Miscel. Med. Phys. Gallic. Ann. I. p. 184. paucula quædam de ca-
tharro anno 1679. epidemico, tussi perpetua, vigiliis, oppressioni-
bus, febre continua, dyspnœa, pleuripneumonia stipato, multis le-
thali, atque remediis ordinariis non cedente, nobis reliquerit; super-
ficiaria tamen sunt, neque animum curiosiorem exstiant. Adeat,
Suppl. ad Sydenham.

cui volupe est, Thomam Sydenham, Practicum quondam Londinensem
celeberrimum, ubi præter ea, quæ Doctissimus Carolus Raygerus,
Pannoniæ decus illustre, atque Paulus de Sorbait nobis de tussibus
tradidere, quæ anno 1675. per autumnum longe lateque depopulata
sunt, plura adhuc inveniet. Quod enim Car. Raygerus Ephem-
Germ. Dec. I. Ann. VI. & VII. p. 312. annotavit, dum per totum
Septembrem, mediumque Octobris anni citati, ob insolitam aeris tem-
peraturam, æstatem pluviosam, insequentem autumnum inaequalem,
modo serenum, modo pluviosum, insolitos etiam catarrhos Posonii,
Viennæ, per totam Austriam, in Silesia, in primis Urafilavia, imo
per totam Germaniam, homines eodem tempore, eodemque prope
modo cum rigore & calore invasisse, nemini tamen exitiosos fuisse
scribit, illud Thom. Sydenham in Praxi Med. Experimentalis p. 275.
& 304. seqq. non solum confirmat, dum sub finem Octobris ob te-
pidam, atque ad instar æstatis placidam tempestatem, derepente in
frigida humidamque mutatam, tussis numerosiores grassatas addu-
cit, quam alio quovis, quod nemini, tempore, nemini fere par-
centes, cujuscunque is fuerit sive ætatis, sive temperamenti, inte-
gras vero familias simul pervadentes; sed etiam evincit, febrem
hanc catharralem fuisse eandem epidemicam, quæ Julio 1673. ingres-
sa progrediebatur, cum & hæc antequam catharrhi se ostenderent, &
illa, quæ post catharrhos permanfit, æque ac catharrhalis, semper
cum dolore capitis, dorsi, atque artuum quoslibet aggressa sit, at-
que V. S. aliisque similibus medicamentis tractari debuerit. Idem
& nos anno 1729. experti sumus, cum per totum anni decursum
usque in sequentem, epidemica quædam febris sese exeruerit, quæ
& ante catharrhalis accessum, & post ejus declinationem pro diversa
mutatione aeris, aliarumque circumstantiarum, diversos affectus qui-
dem simulavit, semper autem cum summa lassitudine, dolore capi-
tis, dorsi, atque artuum initium sumpsit, atque V. S. similibusque
remediis, quibus catharrhalis, subacta est. Licet ergo mense Jan. Febr.
& Mart. ann. 1729. nonnulli hepatitidem, aliasque febres inflam-
matorias incurrerint, in plurimis vero catharrhales maligne petechi-
zantes in conspectum prodierint, April. Maj. & Jun. tam benignæ
quam malignæ catharrhales, cum variolis malignitate non carenti-
bus, continuaverint. Jul. August. & Septembr. non modo catharra-
les malignæ, aliæque continuæ, atque ipsa purpura alba in puerpe-
ris; sed & frequentiores atque pertinaciores diarrhææ æque, ac ter-
tiana duplicata observata sint. Mense Octobr. multi angina, peri-
pneumoniæ, pleuritidis, aliisque febribus inflammatoriis obnoxii fue-
runt: die 21. Novembr. tepidiorem excipientem humido frigida tem-
pestate, præter malignas, sæpius adducta catharrhalis oborta sit per
Decembrem inaudito modo sæviens atque 4. Jan. 1730. nonnisi ni-
vibus, atque vento frigidiori cedens: licet tandem Jan. Febr. &
Mart. anni 1730. angina, pleuritides, febres malignæ, petechiales
visæ sint; semper tamen prior illa epidemica sub iisdem latuit. Hoc
certius, quod hæc catharrhalis, alias tum abundantia sive sanguinis,
sive feri, nonnunquam viscidioris, nonnunquam impurioris, prædi-
tos hincque sanguineo-phlegmaticos magis invadens, tum sensibiliori-
bus, relaxatis, vel ob obesiorem, spongiosoremque constitutionem
rarioribus fibris, vasis minoribus majoribusque poris instructos affi-
ciens, tum ratione ætatis, modo infantibus ob temperamentum ca-
lido humidum, teneriorem texturam, majoremque sensibilitatem ab
aere externo familiaris, modo adultis ob naturam sicciorem, firmio-
rem atque compactiorem structuram hincque ob majorem congestionem
versus pectus tussi sicca molesta, modo senioribus ob humores spif-
siores, fibrasque de suo tono dejectas incommoda: tum ratione se-
xus, sequiorem, ob majorem sensibiliorem infestans: tum eos occu-
pans, qui vel alias huic obnoxii, vel lesionem in pectore sentiunt,
vel meticulosi existunt, vel partes capitis atque colli glandulosas ab
aere humido-frigidiori non satis defendunt; quod inquam, hæc fe-
bris præterito anno tam contagiosa fuerit, ut fere omnes homines,
sine ullo discrimine, & eodem tempore, & eadem ratione, iisdem-
que circumstantiis & symptomatibus, more omnium epidemicorum
morborum, tam per totam Europam, quam Viennæ, multo celerius,
vehementiusque petierit, quam ullo unquam tempore. Unde etiam
est, quod in hac Civitate non 60000. hominum, quod novellæ tra-
didere, sed longe major numerus hanc perpeffus sit. Neque enim ea-
dem cholericæ, neque aliis temperamentis pepercit, sive deinde fue-
rint plethorici, sive minori quantitate sanguinis præditi. Neque in
hominibus viscido abundantibus solum erant spectabiles, sed etiam
in illis, qui sanguinem fluidiorem, sufficientem sero dilutum obti-
nuere. Æque in macilentos, ac obesiore, æque in robustos ac debi-
liores, & sensibiliore, æque in infantes ac adultos, non modo ju-
venes, verum etiam seniores, cujuscunque sexus fuerint, tam extra
conjugium, quam in illo viventes, imo & in ipsas gravidas, ab
epidemicis affectibus alias magis immunes, vehementer grassari cœ-
pit, ita ut neque domi hærentes, neque in itinere constitutos inta-
ctos reliquerit, sive dietam accuratiorem observaverit, sive minus.
Etsi vero etiam injuriis aeris alias adsueto sæpius aggressa sit, tan-
tum tamen abest, ut hac vice omnes, in quibus ob majorem sensi-
bilitatem alias continui, gravioreque catharrhi vigeant, in eandem
inciderint, ut multi potius immunes manserint, Perillustri quidam
Dominus mutato climate nulla febre catharrali, licet alvi contuma-
cissima obstructione laboraverit, correptus fuerit, atque ex gravidis,
quamvis in plerisque debilitates syncopticæ abortus, aliaque pericu-
losa Symptomata supervenerint, quædam tamen reperta sit, quæ
sanguine viscidiori non obstante, nihil de eadem perceperit. Gra-
vius decumbabant, nullis medicamentis utentes, hocque magis, si
corpore calefacto, atque ad sudorem disposito, aeri humido-frigi-
do sese exposuerint, quod in duabus Severissimorum Principum aulis
conspeximus. Contagium per totam Europam præferebat, ut &
activam, & ad corruptionem pronam materiam præsupponat. Quam-
vis autem Viennæ non tanta malignitate comparuerit, quanta qui-
dem in agro Bononiensi, inque quibusdam locis Angliæ, cum
ibi petechiæ, aliaque periculosa Symptomata insimul accesser-
int, atque homines intra paucos dies instar pellis e medio sustule-
rint; nihilominus tamen & hic in altero præ altero major mali-
gnitas sese prodebat, prouti nempe vel simplicem regularem febrem
catharralem, vel aliis morbis gravioribus junctam expertus fuerit,
cum hi posteriores non solum anxietatem, pathematam syncopticæ,
vigilias extraordinarias, aliaque vehementiora Symptomata post se
traxerint; sed & in causa fuerint, quod quibusdam non iv. vel
vii. sed xiv. vel xxi. denum die febris hæc valedixerit. In

omnibus malum hoc epidemicum initium sumpsit cum spontanea lassitudine, vigiliis, calore majori, sine ulla tamen siti, pulsu tardiori, debiliore, suppresso fere, aliisque quæ malignitati tribui solent. Symptomatibus, quæ comitabatur inappetentia & tussicula sicca, tam ob continuitatem, quam ob vehementiam molesta. Plerique horum conquesti modo de pectoris, modo de capitis congestione, interdum graviore, interdum leviori, quam pressio pede exceperit nonnunquam respiratio difficilis, nonnunquam vertigo, ut & gravitas capitis, & delirium, & coryza, & sternutatio. Porro quam plurimi præter symptomata recensita afficiebantur vel dolore dorsi satis atroci, vel stupore, & dolore articularum, artuumque tensivo, vel horrore, vel diarrhœa: In quibusdam tamen & alia notatu digna phænomena complicabantur, quæ pro diversitate subjecti fuere diversa, ita ut alii non tam horripilatione, quam horrore intensiori, atque per aliquot horas durante correpti sint, alii raucedine laboraverint, alii ob plethoram, calorem majorem, faciei inflationem, rheumatismum, obnubilationem atque obscuritatem visus experti sint, alios alia occupaverint. Non attingam dorsi atque abdominis dolorem in gravidis, neque mentionem injiciam anxietatum, quæ meticulosos obreuebant sæpius, neque vomitus atque dolores lumborum in calculosis observatos, neque pertinacem sensum frigoris in hysteris circa futuram sagittalem annotatum adducam; hoc saltem addam, in iis, ubi graviores morbi prægressi sunt, non tantum debilitates synopticas, sed & periculosiora in conspectum prodierunt pathemata, quod tum in aliis, tum in Viro quodam Juvene, nobisque amico videre licuit. Is enim existens habitus inacilentioris, temperamenti sanguineo melancholici, atque ad hæmorrhoides cæcas inclinans, licet ex febre, quæ post prægressam iram, dietam neglectam in itinere, acedulas Selteranas, neque decenti modo in usum vocatas, non tantum febris continuæ, malignæ, atque ob calorem summum, sudorem fere colliquativum, alvi pertinacem obstructionem, vigilias continuas, deliria, debilitatem pulsum, spasticas torsiones oris, floccorum lectionem, periculosissimæ typum præferebat; sed & die xv. tertianam duplicatam transiit, sequente deinceps triplici tertianæ simplicis recidiva, quarum quilibet, etsi excessum in dieta pro fundamento habuerit, diversissimis tamen remediis tractanda erat, ut & postrema partim die vacuo initium sumpsit, partim loco anticipatio- nis in prioribus spectanda postposuit, terminando deinde in febriculam lentam cum summa debilitate, continuo sudore, foetorem de se spirante, purpura alba, tussicula sicca, ædematibus, aliisque; licet, inquam, hic Vir optimus ex hac febre periculosissima æque ac intricatissima restitutus fuerit, viresque jam aliquantulum redierint; eidem tamen catarrhali mense Decembris expositus erat, hocque gravius, quod deliriis ferocioribus, calore summo, vigiliis ad diem vij. solutionis usque stipata fuerit. Progressu temporis, atque morbo in statu suo constituto, & Symptomata sensim aucta sunt. Pulsus, qui in principio fuit debilis, jam fortior, celerior reddebatur, ut de doloribus pectoris versus hypocondria sese extendentibus nil dicam. Deliria in quibusdam continuabant, plerisque dolores maximum facessivere negotium, ut neque tussire potuerint, ad unum omnes, qui præsentem morbo auræ frigidiori temere sese commiserunt, sudoremque neglexere, vel gravius, vel diutius decumbabant. Conspexi id ipsum in Illustri. atque Excellentiss. quodam sene, plethorico, binis vicibus, cum post primum exitum, catarrho nondum penitus discusso, multa statim orta sint periculosa Symptomata, congestio, versus pectus, caput, ophthalmia, respiratio difficilis, anxietates, hæmoptysis, plenitudo pectoris e spumido quasi sono inter respirandum colligenda, pulsus suppressus, inquietas nocturna sonorum turbans, lassitudo summa: & altera vice, etsi morbus ad declinationem pervenerit, ita, ut sub blanda diaphœ blandior somnus & respiratio accesserint, tantæ tamen alterationes, vigilie, debilitates eundem de novo invaserint, ut graviora metuenda fuissent, nisi V.S. præservandi sine instituta æque, ac continuis blandis excretionibus, tam poros cutis, quam per vias urinarias, atque alvum sub specie diarrhœæ, quam denique per tussim vim morbi a vij. ad xiv. diem laxatam vidissemus. Adducta confirmat mors pauperuli, hydrocele simul laborantis, quæ intumescantiam totius corporis, ob denegatam diaphœ in hypocaulo frigidiori excipiebat. Porro infantes ob deglutionem materiæ rejectæ torminibus affligebantur: hinc erat inquietas nocturna. Sic & in puella dilatationem peritonæi circa inguen dextrum cum metu herniæ, ob tussim vehementiorem non modo observavi, verum etiam in gravida, præter dolorem, qui & in dorsum, & abdomen sese diffudit, debilitates synopticas, tonsillarum inflammationem, lactisque e mammis eruptionem deprehendi. Lipothymia ut plurimum in prædebilitatis increbescabant, ut & spasticæ stricture circa nucham in vetula quadam, quæ apoplexia ante aliquot annos tacta erat. Sed cum morbus hic tam varius fuerit, sese transformaverit, ut aliquando febrem continentem, sæpiissime continuam, aliquando intermittentem mentitus fuerit, quis quæso omnia Symptomata, quibus hic morbus exacerbatus est, enarrare queat? Sufficiat ergo, horrorem interdum remissiorem, interdum intensiorem, & per aliquot horas in iv. personis continuantem, altera vice non accessisse, cuius per octo horas cum calore majori, sudore copiosiori, artuum dolore immani, atque hæmoptysi, durantis, & tamen secunda vice non annotati, exemplum præbebat femina quædam Juvenis, ut & alius febrem catarrhalem negligens, ex itinere Taurunensi redux. Sicuti autem in hoc horro- ris comes erat dolor pectoris acutus, respiratio difficilior, calor intensus, quæ partim ob calidiorum adhibitionem, ob loci in morbo mutationem, graviora sequebantur Symptomata, stricture pectoris, aliarumque partium pertinaciores, deliria, urine suppressio, subsultus tendinum, vigilie, pulsus debilis: ita & xi. die rejectio materiæ copiosioris & rubicundæ, & foetorem de se spirantis sub tussi fortiori in eodem loco junctum habuit dolorem, ut de critica atque salutari excretionem per poros cutis, vias urinarias, alvum sub forma udoris æque, ac diarrhœæ, quæ a vij. usque ad xiv. perdurabant diem, nil adducam. Febres compositæ plerumque ex duabus constabant acutis, continente nempe atque continua. Atque harum tres species occurrebant. Vel enim catarrhalis, & biliosa, sicque duæ continuæ, vomitu bilioso initium fumentes, complicabantur, vel catarrhalis sociam habuit continentem, hincque in aliis, juvenibus non modo, verum etiam senioribus, ut plurimum iv. vel vij. demum die hæmorrhagia narium salutari, in aliis hæmoptysi, in aliis vomitu eruento, in aliis sequioris sexus hæ-

morrhagia uteri, in aliis quatuor tam adfuetis, quam non adfuetis personis hæmorrhoidibus conspicua erat, imo hæmorrhagia critica per alvum, copiosissima, sine ullo incommodo in Juvene xx. circiter annorum, die vij. cum agri levamine oborta est, vel catarrhali jungebatur in plethoricis, sanguine viscidiori præditis; tum continens, tum continua alia inflammatoria. Hinc conquerebantur sæpius de phrenitide, febribus anginosi, peripneumonia, pleuritide, hepatitide, aliisque. Pleuritidem veram animadverti in gravida, eaque juvene, plethorica, congestionibus pectoris dedita. Atque licet hæc, præter Symptomata ordinaria in febre catarrhali perfecta, & sitim intensam, vomitus, dolores dorsi atque scapularum experta sit, & ii. die morbi V. S. celebrata insignem horrorem observaverit, & iii. partim ultra duas horas infantis motum senserit, partim dolor latius, versusque anteriora extensus fuerit, & v. ob doloris vehementiam tussire vix potuerit, donec vi. vij. viii. anxietates, vigilie, deliria, diarrhœa sese exeruerint, & xi. etiam melius disposita sub blando udore, atque urina sedimentum jam jam deponente, abortum perpeffa fuerit; tamen per Dei gratiam pristinae sanitati restituta est, postquam nempe multum sanguinis grumosi per uterum excretum, aliquid membranosi a natura ejectum fuerit, atque tandem morbo purpura rubra supervenerit. Puer, quem enixa est, cum septimestris fuerit, atque in pectore, dorso, capite inflammatio adfuerit, diu non vixit, licet S. Baptismate adhuc tinctus sit. Angina contagiosa cum febre intensiori, majori congestione versus caput, coryza, gravitate auditus, difficultate respirationis, deglutionis, locutionis, vigilis, alvi obstructione tum Illustri. quendam dominum, tum & Eidem a servitiis existentem circumstantiis iisdem eodem infestabat tempore. In utroque enim modo morbus repetitis V. S. resolutivis atque discutientibus temperatis, cum interne, tum externe adhibitis, clysteribus, aliisque facta die iv. discussione atque excretionem sanguinis grumosi per naves imminuebantur; sed & febris catarrhalis, morbo vix ad declinationem accedente, sese probebat, quæ tamen in priori dolore auri atque excretionem materiæ cuiusdam solvebatur, licet angina, quæ sublata videbatur, ob præmaturam aeris mutationem recruduerit. In declinatione morbi materiæ viscosæ facilior per tussim succedebat excretio, quam blandus odor, modo citius, modo tardius, comitabatur, ut & urina turbatio. Ut plurimum hæc tenuissimam cutem, vitæ adhærescentem ostendebat cum sedimento roseo pallido. Dolor æque in pectore, ac circa hypocondria remisit, nonnunquam facta disipatione in artus, quod in gravida spectare mihi contigit, nonnunquam auri dolore sequente. Joh. Nic. Pecklinus obs. med. 45. L. ii. p. 320. scribit, notum esse, quod vellicata membrana tympani, tremula vibratio cum nervosa epiglottidis, sine concussis pulmonibus, ob consensum tussis producatur. Unde & ille dolor circa aures vel consensui nervorum, vel congestioni humorum tribuendus est. Hæc cessante plerique, qui vigilis diuturnioribus torquebantur antea, somnus obrepserat continuus. Etsi vero excretionem materiæ peccantis per sudorem, febris hujus vis sublata aut minuta sit, nullaque exanthemata sese ostenderint, comparebant tamen in iis, qui sudorem neglexere. Hinc non modo post inunctiones crebriores puerpera & rubra, & ejusdem filia alba tentabatur purpura; verum etiam facta præmatura frigoris admissione nonnullis ob materiam incrassatam parotidibus, bubonibus, aliisque tumoribus glandulosis infestabatur. Adducta Symptomata non nisi per aliquot dies persistabant. Erant tamen & alia, quæ per totum morbi decursum urgebant. Sic inter omnes extraordinaria lassitudo dominabatur. Nonnullis ægrotorum fluxus hæmorrhoidalis, aliis udor continuus, aliis diarrhœa, aliis vigilie perpetuæ obortæ sunt, quas per septiduum durantes deprehendi in duabus personis, altera pleuritica, altera vero ab aliquot annis suppressione hæmorrhoidum laborante, V. S. solitam prætermittente, alvi obstructioni, animi pathematibus, affectui oculi obnoxia, atque anno 1729. mense Septembris febre catarrhali correpta. Febre autem sensim evanescente lassitudo in omnibus adhuc diu permansit; imo aeri frigidiori, sive nocturno, sive alteri sese exponentes, tussi diuturniori, dolorosis stricturis circa scapulas, aliisque atrocioribus vexabantur symptomatibus. Veram atque genuinam causam quod attinet, præ aliis noscenda est proxima, sive immediata, qua detecta non modo proximiores, tam naturales, quam non naturales, aliæque patefcent. Certum autem atque evictum est, immediatam, modo pulmonum, modo faucium, modo vicinarum partium stasin constituisse. Hinc enim motus humorum impeditur, hinc ad easdem affluxus copiosior, hinc ipsa tandem febris secundaria, catarrhalis. Ex mediatis proximioribus humorosa malum hoc insigniter fovebat cum ob nimiam humorum quantitatem, ab aere humido frigidiori, transpirationem impediendem, inductam, tum ob qualitatem in aliis spissiore, in aliis rariorem, ob eandem rationem enatam, tum denique ob motum humorum progressivum, & ratione totius massæ sanguineæ, & ratione pulmonum vehementiorem. Quamvis vero alias temperamentum, constitutio corporis, fibrarum, pororum, ætas, sexus, vitæ genus, aliæque, quæ partium solidarum & fluidarum dispositionem naturalem ostendunt, atque remotiores naturales audiunt, plurimum ad hunc morbum faciunt, tantum tamen adest, ut hac vice aliquid contribuerint, ut potius aer, cibis, aliæque causæ remotiores non naturales attendendæ fuerint. Aerem si spectes, ubique insolita vigeat constitutio, quæ tamen hinc inde vel quantitate, vel qualitate, vel motu diversa fuit. Unde & aer corpora, dum eadem modo ambit, modo intrat, innumeris modis afficiens, non modo huic febre catarrhali per totam Europam, sed & hinc inde diversis Symptomatibus principium dedit. Sic circa Bononiam, vicinæque provincias, in primis in convallibus depressioribus, incolæ hoc gravioribus pathematibus affligebantur; quo major pressio ab aere graviore nebuloso in pulmones ibidem exercebatur. Sicuti vero aer figuræ atque proportioni contentorum acceptum referre debet, quod jam hanc vel illam qualitatem obtineat: ita etiam effluvia tam ordinaria, quam extraordinaria, mense Novembris atque Decembris anni supra citati in aere per totam Europam dispersa, qualitatem illam vitiosam cum eadem communicarunt, a qua nominata febris proficiscebatur. Hic loci enim mense Octobris tempestas placida ac tepens observabatur, quam sub initium Novembris excipiebat alia multum diversa, frigida scilicet atque humida, nebulosa subito ingruens, ut non attingam aeris intemperiem, modo nebulis foetidissimis, modo cælo magis sereno, conspicuam, interdum pluviis, atque frigore, interdum calore sese exerentem, præter solitum per totum Nov. & Dec.

& Dec. perseverasse, usque dum ventus septentrionalis nitrosus atque nitrosus corpusculis, quorum copiam huc secum deferbat, aeris labes noxias iv. die Jan. 1730. elueret. Neque Viennæ tantum inconstans aeris constitutio erat spectabilis; sed etiam iidem mensibus per Hungariam, Poloniam, Saxoniam, Angliam, Hispaniam, Galliam, Italiam, inundationem aliqualem ob pluvias copiosiores perpassam, Daniam, Sueciam, Moscoviam, aliasque regiones visebatur. Cum ergo a copiosioribus aqueis particulis, & aer humidior æque, ac frigidior qualitatem per totam Europam sub initium Novembris nactus sit, atque ab eadem relaxatis fibris, porisque restrictis transpiratio impeditior, hincque partium biliosarum, aliarumque inutilium excretio imminuta, atque humorum ad corruptionem producta dispositio, mirum non est, ingruente placidiori tempestate, humoribus ad vitiosam resolutionem jamjam inclinantibus orgasmum illarum, sicque febris catarrhali, malignæ, datam fuisse occasionem. Evincitur id ipsum ex eo, quod hæc febris & sub initium Novembris, præsentem ubique simili constitutione aeris, in Gallia, Anglia, Hispania, Italia, Austria, Hungaria, Polonia, licet in Suecia prius, in Helvetia vero tardius, comparuerit, & sub finem Decembris, atque circa principium anni 1730. vehementia frigoris subsecuti mali hujus vis ubique sublata sit. Licet enim recedente febre catarrhali per Austriam, aliasque provincias aliæ febres spargi cœperint, nec tamen ita prorsus epidemica, nec iidem Symptomata amplius stipata fuere. Sicuti vero particulæ aqueæ atque igneæ, etsi semper in aere sint præsentibus, alias neque homini tam subitanæ alterationem inducunt: ita in earundem abundantiam mense Nov. atque Decembr. præteriti anni perspectam unice causam rejiciendam censeo. Huic constitutioni favebant & alia impuriora, atque extraordinaria effluvia, sive a rebus inanimatis, sive ab animatis in aerem deducta perpendamus. Quod ad primum momentum spectat, nil dicam de influentiis siderum: utut veritati consonum, pro diverso situ, atque conjunctione solis cum planetis diversam materiam subtilem in terram deferri, hincque diversas corporis affectiones proficisci; paucis saltim addam, anno 1729. cum circa Romam, Neapolim, aliaque loca Italiæ, crebriores terræ motus, ob Vesuvium diutius occlusum sensisse incolas, qui 20. Decembris & per Ducatum Mediolanensem, & per Helvetiam se ostendebant, tum eosdem 24. Octobris hora vi. matutina arcem Fridericianam Hallensem Norwegorum æque, ac in Nericia civitatem crebro hora viij. tanta vehementia occupasse, ut caminos decedentes viderint, tum denique montem Islandicum, Schwefelberg dictum talem concepisse flammam, qua territorium ad distantiam ij. milliarium destructum, licet tandem nivibus copiosioribus extincta fuerint. Cumque hic ignis occultæ atque subterraneæ vi Heclæ adscribendus sit, neque illi motus Italiæ aliam, nisi similem efficaciam Vesuvii pro causa agnoscant, dubium non est, quin hac occasione & sulphurea, & aliæ vitiosæ particulæ per aerem longe lateque disseminatæ sint. Harum præsentiam probant tempestates cum inauditis atque insolitis fulminibus atque tonitribus & mense Novemb. atque Decembr. versus Neapolim, in Monte Pessulano, circa Constantiam, & circa Hafniam, Uratislaviam &c. anno 1730. Mense Jan. sicque inconsueto tempore annotatæ non modo, sed & phenomena illa, quæ partim die 16. Novembris 1729. in Hollandia, Colonia Agrippinæ, Francofurti, Hanoviae, Lutetiae Parisiorum, Varsoviae, partim die 15. Febr. 1730. Viennæ, circa Coloniam Allobrogum, aliaque loca Helvetiæ, in aere conspiciere licuit. Accedit & hoc, quod civitatibus populosis incumbens aer fumis, aut aliismodi heterogeneis effluviis scatere. Unde in his & gravior, & acrior redditur, præstans deinceps majorem pressionem in pulmonibus, ut & irritationem. Atque hinc tam illud est quod Viennenses, præsentibus die 4. Dec. nebulis oculum vellicantibus, frequentiori scretui, crebrioribusque tussibus expositi fuerint, quam quod vehementiora Symptomata in majoribus Civitatibus viventes sint perpassi. Uliginosas regiones si quis adeat, deprehendit aerem multo humidior. Hinc minor motus elevatarum aquosarum particularum, hinc tandem major ad corruptionem dispositio, cujus testes sunt nebulae crassiores fœtidissimæ. In his ergo locis gravius ægrotabant decumbentes, hocque magis, si & aliæ causæ occasionales sociæ fuerint. Plurimum huc faciebant effluvia animalium. Cum enim semina morborum contagiosa in subtilissimo, activissimo, corruptionique obnoxio miasmate consistant, atque hinc ab animantibus longe lateque fermentescentes particulæ in aerem deferantur, patet, non modo ab ægrotis, hic febre contagiosa laborantibus, in familiaribus cum illis versantes effluvia vel per pulmones, vel per poros cutis derivata; verum etiam ob luem illam quæ in Italia, Palatinatu, Austria, Pannonia, Valachia, Podolia, Volinia, Polonia, inter pecora hinc inde ferpebat, innumera putredinosa miasmata eodem anno in aerem fuisse dispersa. Hæc deinde & alios contagione infecerunt. Etsi enim quidam statuunt, quod contagium nonnisi in sua specie radices agat, atque hinc defendant, hominum pestem bruta non afficere, equorum luem non nisi in equos, boum in boves, & suum in suillum genus tantum ire, in alienum minus, vel inde tamen contrarium elucescit, quod & Moscoviæ, testante id ipsum Gothofr. in Chron. peste anno 1655. tantopere sæviante, ut & corpora terræ nondum commissa in plateis a canibus devorata sint, iidem rabie correpti, homines vivos dilacerarint; & interdum a piscibus mortuis contagio ortum duxerit, & nostro ævo lues pecorum tam in Hungaria, quam Austria, Mense Octobr. & Novemb. 1729. se prodens febrem catarrhalem, initium sumentem cum turbatione capitis, atque intra quadriduun vel hæmorrhagia narium, vel hæmorrhagia per alvum, vel etiam vomitu stercoreo terminantem, junctam habuerit, & eodem tempore in apris aliquid purulenti, innuentis corruptionem, inventum sit. Neque est, cur dubitemus, per cibos contagium quoque in homines manasse, cum non modo certo constet, cujusdam nebulonis audaciam eo processisse, ut pecora lue hac demortua hominibus vendere non erubuerit; verum etiam probabile sit, pecora fuisse consumpta, in quibus dispositio morbofa adfuerat. Producentur tales morbi eo felicius, si sive solis sive ignis subterranei calore in aerem elevatae particulæ decentem motum non obtineant. Conclusas enim aqueas mox sequitur corruptio. Hinc & multis locis prope littora Africa occidua a tranquillitatibus, quam a procellis impendentibus magis terra marique timetur, & in insula Sancti Thomæ statim a solititio brumali menses duos aut amplius ventis silentibus incolarum plerique languent, & tranquillo tempore pestis vehementius in

Supplem. ad Sydenham.

homines grassatur, & circa Bononiam in convallibus, ob minorem circulationem aeris multi periere. Quemadmodum ergo motus aeris, qui ventum constituit, sanitati magis conducit: ita & aerem effluvis pestilentibus inquinatum emendat sæpius tonitru & fulgur, unde in tempestate pestilente in quibusdam urbibus populosis machine murales crebro disploduntur, & pulsantur campanæ. Neque tamen hinc omnis ventus pro salubri habendus est, cum meridianus corruptioni faveat, atque solus Septentrionalis, a plagis nitrosus impetuosus descendens, particulasque nitrosas secum ferens, aerem puriorem reddat. Atque hæc est ratio, cur non modo in Lesbo, flante Austro, incolæ ægrotent, Coo tussire ferantur, superveniente Aquilone protinus convalescant, sed e vento frigidiori suborto febris catarrhalis vis minuta atque sublata sit. Prognosis ratione vitæ & mortis quod attinet, tenendum est, febrem hanc quamquam Viennæ omnes cum summa lassitudine, vigiliis continuis, deliriis, dissimulatione symptomatum, aliisque signis malignitatis aggressa sit, atque gravis nonnunquam debilitatibus synopticis, nonnunquam abortui expositæ fuerint, in aliis hæmoptysin, vomitum cruentum, phrenitidem, anginam, peripneumoniam, pleuritidem, hepatitidem, aliaque periculosa Symptomata socia habuerit, qualia in plethoricis, defectu visceris laborantibus, imprimis humoribus male constitutis, animadvertimus, neminem tamen e medio sustulisse. In Helvetia ab eadem, quam modo descripsi, febre nemo eneatus. At e contra Lutetiae Parisiorum multis exitiosa erat, utut in Anglia, Hispania, Italia, atque Polonia adhuc pluribus funesta fuerit. Etenim Leopoli pauci servati; Ferraria atque Ravennæ tot tantique hominum obiere, ut magistratus Bononiensis incolis accessum denegare voluerit, imo Londini medio Novemb. intra septimanam 908. atque deinde majorem numerum, quam quidem anno 1665. tempore pestis, illata strages excrevit. Si prognosin ratione modi eventus attendamus, terminabatur partim staseos rheumaticæ dissipatione, partim materiæ peccantis excretionem salutare. Sic somnus, atque respiratio facilius continua diapnoe æque, ac turbatione urinae, in aliis jam post primam exacerbationem, in aliis; & plurimum iv. vel vii. in aliis quoque xiv. die accedebant; ut taceam de ejectione copiosioris materiæ per tussim, atque rubicundæ illius fœtidæ, quam in pleuritico gravius decumbente xi. cum levamine rejectam conspeximus. Febris continentis interdum conjunctæ inseparabilis comes erat hæmorrhagia, nonnunquam per nares, nonnunquam per vasa hæmorrhoidaliam, aliquando iv. aliquando vij. die, nonnunquam parvior, nonnunquam copiosior fuit observata, ut in Juvene xx. annorum, nunquam hæmorrhoides experto, & tamen die vij. ultra mensuram sanguinis frigidioris cum solutione morbi deiciente. Sic & uteri hæmorrhagia largior in puerpera, quæ xi. die abortum perpassa est, oborta salutaris, qualia exempla in vaccis quidam habuere. Staseos rheumaticæ dissipationem probat dolor pectoris versus hypochondria descendens, qui & in artus & aurem nonnunquam sese diffudit; ut & excretio lymphæ cruentæ secuta sit. Diarrhœa neque solvebatur neque gravior reddebatur morbus. Nonnulli ægrotorum modo liberiori aeri sese exponentes maturius, modo inunctiones in usum vocantes, sudorem neglexere, quorum hi Symptomata acerbiora non modo, verum etiam in declinatione morbi purpuram incutebant, illi vero vel vehementiores congestiones versus caput, pectus, ophthalmiam, catarrhum suffocativum, hæmoptysin sentire, vel de chronico atque pertinaciori catarrho conquesti, vel etiam tumoribus glandulosis interdum circa aures, interdum circa tonsillas, interdum circa inguen infestabantur. Ex omnibus, quos sub mea habui cura, habui autem quamplurimos, atque ultra ducentos, nonnisi duo sunt mortui, quorum alter itineri, durante morbo se committens, alibi in lethalem morbum incidit; alter vero pauperculus, ob sudoris neglectum, aliaque circumstantias hydrope funesto occupabatur. At petechiis, huic morbo in agro Bononiensi, Britannia minori, Anglia supervenientibus, plerique sunt eneati. Angina quoque Lincolnie comparuit, quod pessimum atque exitiosum erat signum. Affectus hic, ratione temporis eventus, instar aliarum febrium malignarum cito sua decurrebat tempora, ita, ut plurimum Viennæ vel iv. vel vii. die crisi salutari solutus sit. Etsi vero in Anglia idem sub initium annotatum sit, grassari tamen vehementius deinde & in his locis, & circa Bononiam, Florentiam, Mediolani, & per totam Podoliam cœpit, ut intra paucos dies instar pestis plurimos e medio sustulerit. Venæ sectio in tussi illa epidemica, quæ anno 1669. æstivo tempore cum pleuritide in conspectum prodit, atque de qua Thom. Bartholinus Ephem. Germ. D. I. A. I. p. 130. agit locum non habuit. E contrario in febre catharrhali, anno 1675. Viennæ, Posonii, aliisque in locis populatim sæviante, multi auctorum, & inter eos præcipui Car. Raygerus, Thom. Sydenham, & Paul. de Sorbait l. c. Venæ Sectionem extollunt tanquam remedium præcipuum ac præsentissimum. In nostra deprehendimus, Venæ sectionem in plethoricis, gravidis, adsuetis ad apoplexiam, catarrhum suffocativum dispositis, vel angina, peripneumonia, pleuritide, hepatitide, hæmoptysi, vomitu cruento, atque febre continente laborantibus, sub initium institutam, non modo lassitudinem, cephalalgiam, vigiliis, spasticas stricuras in pectore, dorso aliisque partibus sustulisse; verum etiam omnia Symptomata reliqua minuisse. Sicuti igitur in his subjectis ventilatio sanguinis & utilis, & necessaria erat: ita in iis, qui vel a prægressis morbis gravioribus prædebilitati fuere, vel me non statim in consilium vocarunt, vel brevi antea V. S. usi sunt, eandem nunquam celebravi. In omnibus porro eo in primis intentio dirigenda erat, maligna atque contagiosa illa materia, quam brevi temporis spatio intima corruptio sæpius excipit, in tempore ex corpore eliminaretur. Cumque hæc sub halitus forma corpus occupaverit, hinc eadem rursus per poros cutis sub continua, blanda, atque æquali diapnoe discutienda erat. Unde temperata diapnoica, diaphoretica fixa antim. diaph. aliaque, quæ absque vehementiori commotione operationem suam edunt, absorbentia ostracodermata, quæ acrimoniam salino-sulphuream, sanguini orgasmum inducentem, atque sudorem impediunt, partim absorbendo corrigunt, partim per diuresin educunt, omne hictulere punctum. Eadem remedia cum celeberrimus Car. Raygerus in Pannonia, tum Adamus a Labenwaldi in febre catarrhali epidemice dominante in Sciria, tum Londinenses hac vice cum V. S. sub initium cum successu adhibuere. In plethoricis quibus alexipharmaca calidiora, sudorifera, Spir. Sal. armon. similiaque propinata fuere, sequebantur congestiones majores versus superiora, deliria, fortiores pectoris oppressiones,

nes, inquietudines, subsultus tendinum, suppressio urinae, quibus & temperatiora deinde medicamenta exhibenda erant. Purgantia, quæ nonnulli assumpserunt, vomitoria, nullum hic invenire locum, imo omnes, quibus præscripta sunt, majores staseos materiae acris commotiones incurrebant, eorum etiam una hæmoptysi cortripiebatur. Sufficiens opem omnibus tulit modo pulvisculus ex absorbente, antimon. diaph. arcan. dupl. addito interdum nitr. dep. concinatus, modo potius ex aquis diaphnoicis, absorbentibus, atque antimon. diaphor. constans, modo emulsio parata ex semine card. Ma. Symptomatibus ex proprio spasticis succurrebam, ita, ut spasticis stricturis præsentibus cinnabarina addiderim, alvi obstructioni humectantia opposuerim, in diarrhæa non modo arcan. dupl. omiserim; verum etiam regimen diaphnoicum tanto magis injunxerim. Adstringentium, narcoticorum opiatorum usum, quamvis multi Auctorum ea suadeant, experiri nolui, cum Olaus Borrichius de somno & somniferis p. m. 34. referat, quendam applicato empl. opiato solum in naso vertice, ex catarrho pituitoso in gravem paralyfin incidisse. Nitroso cinnabarina, emulsionem potiones analeptice conjunctis bezoardicis, tempore continuarum vigiliarum data, ad somnum placidum ægrotos dispo-
nere. Quod si affectus anginosi supervenerunt, repetitis Venæ sectionibus atque clysteribus, tandem interne digestiva cum temperatioribus diaphnoicis ordinavi, externe vero Cataplasmata discutientia, Gargarismata, atque injectiones commendavi, quorum usum, quousque penitus remittit morbus, continuavimus. At expectorantibus in tussi sicca penitus abstinui. Ex iis, qui in publicum prodire coacti sunt, nulli diaphnoica dedi, insistent magis præcipitantibus, utut non nisi blandioribus diaphnoicis & materia noxia in declinatione mali penitus proscribenda fuerit, & dolores circa scapulas in quibusdam remanentes auscultaverint. Dietam quod spectat, neque durante morbo, neque eo superato, auræ frigidiori committendum erat æger, hocque minus, si diarrhæa adfuerit. Victa etiam febre, omnis tamen excessus ratione cibi & potus vitandus erat. Juscula, atque infusa instar theæ ex rad. scorz. cum hiscop. veron. atque sem. fœnic. in frequenti usu habui. Et animadverti, tam his observatis, quam accedente insimul cum corporis, tum animi continentia tranquilla, omnes per Dei gratiam pristina restitutos esse sanitati.

Constitutio Epidemica Anni 1730.

Qualem sub exitu anni 1729. constitutionem aeris generalem habuimus, talis per triduum etiam primum Anni 1730. Viennæ stetit, nempe ut plurimum humidior, frigidior, cum nebulis in pluvias abentibus. Atque licet vehementia Aquilonis cum nivibus 4. Januar. favientis, vitiosam hanc atque inconstantem aeris qualitatem sublatam arbitrati sumus, tantum tamen absuit, ut cessaverit, ut potius eadem inconstantia redierit, tempestatem frigidam die 10. placidior ac pluviosa exceperit, huic non modo 16. frigidior, nivibus atque ventis tumultuaria, verum etiam 30. denuo alia multum diversa, atque eadem die mane calidiori, a meridie frigidiori vento, modo pluvius, modo nivibus conspicua, successerit. Similis aeris alternatio spectabilis erat per totum Februarium. Sub initium enim aer frigidior cum nivibus ingruerat, in progressu tepidior, ut plurimum nebulis, vel matutinis, vel vespertinis, quandoque & pluvius nocturnis sese prodens, qualis ad postremos usque Februarii dies perseverabat, ut de celi ardentis phænomeno, quod 15. die circa vespem Viennensium oculos ac mentem in se converterat, nil dicam. Martii ingressus nivofus subito cum pluvioso aere commutabatur, imo ob pluvias copiosas & frequentes, cum cælum, si paucos amænos dies exceperis, plerumque obnubilum, & obitum tenebris erat, tum ad finem usque mensis iste humido frigidus permansit. Similes vicissitudines ratione frigoris eadem hyeme per totam Europam observare licuit. Januarii enim constitutionem si examines, & Hale Saxonum erat pluviosa die ij. qua hora viij. vespertina sese incolis in nubibus aliquantulum nebulosis halo obtulit, & Londini xij. placidior, tamque nebulosa comparuit, ut jam quarta pomeridiana fauces accendere coacti fuerint, & Neapoli xvij. aerem blandiorem frigidior æque, ac tumultuosior secutus est, flamma Vesuvii etiam invalescente, & Varsovia xix. frigus intendebatur, Hafnie, Uratislavie, Soravieque ingens sub exitu tempestas cum fulguribus & tonitribus, nivibus ac pluvius oborta est. Sic Februarius tam frigidior atque nivofus sub principium non solum Varsoviae, sed & Venetiis, quam tepidior magisque pluviosus postmodum in posteriori loco, Monte Pessulano, Alesia, S. Hippolyto, aliisque Civitatibus vicinis in conspectum prodit, ita, ut Constitutionem Viennensem ubique fere repræsentaverit. Sed nec lumen boreale extraneos fugiebat, licet neque eadem die, neque iidem circumstantiis Europam omnem sua lege compleverit. Alibi enim jam iv. quod Moscovia, Petropoli, Revalieque degentes testantur, alibi, & quidem Varsoviae, Uratislavie, Tiguri, Bernæ, Coloniae Allobrogum, Romæ atque Florentiæ xv. visebatur, alibi aliæ quoque circumstantiæ accessere. Non adducam, præter phænomena huic lumini communia, & in Helvetia, & Petriburgi binos arcus oculis occurrisse, altero in boreali, altero in australi plaga apparente: neque attingam, materiam phosphorenscentem, radiis ex priori arcu exurgentibus, atque variis coruscationibus conspicuam, tandem & in alterum fuisse compulsum, ibique clario-
ri relaxasse luce, disparentibus in priori successive columnis rediantibus: neque mentionem injiciam susurri illius, quem Petropoli radiis motu tremulo procurrentibus nonnulli perceperunt, multo minus calorum sæpius jam annotatorum. Hoc saltem addam, idem non modo Romæ atque Revalie diutius durasse; verum etiam Moscovie sequenti nocte recurrisse, utut minoris fuerit momenti. Martius ut plurimum nivofus pluviosus fuit. Hinc observabatur aura humidior, & frigidior, in nonnullis locis aque nivalis major confluxus, qualem in circulo Suevico Hornbergenses maximo suo damno experti sunt. Leopoli tamen atque in Suecia nives copiosiores, circa æquinoctium vernale cadentes, acerbissimum excipiebat frigus, ut & Holmiæ lacus per totam hanc hyemem non concreverint tandem frigoribus congelati. Eadem ergo perquam anomala atque irregulari crasi aeris per omnem hyemem ubique manente mirum non est, hanc & eosdem peperisse morbos alibi, quos genuerat Viennæ. Hoc tum in aliis liquebat febribus, tum magis peculiariter in catharralibus mensis Septemb. & Decemb. 1729.

Sicuti enim hæc posteriores, quæ anno citato epidemice per Europam grassatæ sunt, sensibili aeris qualitatibus in acceptum referri debent, quod illis mensibus exortæ sint; ita etiam qualitatibus frigidioribus, quæ in Januarium incidebat, earum imminutionem unice adscribendam esse censeo. Unde etiam est, quod Viennæ iv. Januar. vehementia frigoris de repente sublata sit, alibi vero ob frigus tardius ingruens diutius continuaverint. Hinc Bononiæ, in Ducatu Mantuano, Ferrariensi, Mutinensi, aliisque Longobardiæ partibus, itemque in Sabaudia, Delphinatu, Marsiliæ, per diu perseverarunt. His recedentibus novæ febres invalescebant. Neque numero tantum erant spectabiles, in Agro Brixiano, sed etiam ob anceps illud periculum, in quod eos, quos in Podalia, Britannia minori, Florentiæ affecerant, conjiciebant. Viennæ febris hæc maligna sub diverso schemate prodit, ita, ut in aliis simplicem continuam, nonnunquam nullis exanthematibus stipatam, & tamen diarrhæa, vigiliis, deliriis, motibus convulsivis, aliisque periculosioribus symptomatibus sese exerentem, nonnunquam petechialem repræsentaverit, in aliis etiam complicata, atque modo cum inflammatoria, vel angina vera, graviore, vel pleuritide interdum vera cum sputo cruento, interdum spuria, vel hepatitide periculosiori, ob diarrhæam, vigiliis, deliria, conjuncta fuerit, modo cum intermittente comparuerit. Nullis exanthematibus conspicua, continua aliquando jam iv. quod in teneriori ætate annotare licuit, ut plurimum xiv. die in adultis disparuit, semper tamen sub blanda diaphnoe atque turbatione urinae solvebatur. In petechiali decens regimen diaphnoicum præ aliis attendendum erat, quo non observato Symptomata exacerbabantur, ut paucissimi evaserint, sive deinde V. S. in usum vocaverint, sive minus, quorum posteriores hoc proximiores morti fuere, si & in morbo purgans aliud assumpserint. Sic Domina senectute confecta, atque alias interdum calculo, interdum hæmorrhagiis narium nimis obnoxia, tam V. S. quam diaphnoe, aliisque neglectis, non modo hæmorrhagias, diarrhæam, catarrhum suffocativum, deliria continua incurrit, sed & ix. die violentia morbi consumpta est. Aliud exemplum præbuit quidam Juvenis, viginti aliquot annorum, qui, etsi statim sub initium V. S. instituta sit, probatissimaque remedia exhibita fuerint, post frequentiore tamen, alvo respondente, corporis refrigerationem incidit in diarrhæam, vigiliis, deliria continua, hæmorrhag. narium symptomaticam & die viij. purpur. alb. ipsamque aphor. lethalem. Tandem unus, prætermissa Venæ sectione, in eadem febre petechiali purgans, me nondum in consilium vocato adhibuit, ubi res desperata fuit. Sequebantur enim multa statim periculosa symptomata, diarrhæa, animi obsessio, anxietates, vultus ferox, vigilie continuæ, deliria, atque die xii. ipsa mors, utut vij. hæmorrhag. nar. oborta sit, sudor accesserit, urina sedimentum deposuerit, diarrhæa cessaverit, atque vesicatoria sufficientem effectum ediderint. Fatendum etiam est, peculiarem Januarii indolem atque constitutionem, cum quartanam illam duplicem chronicam, ædematibus, infarctibusque lienis occurrentem, atque incidentibus, digestivis, blandioribus laxantibus, febrifugisque Nic. de Blegny, ex malis aurantiis amaris cum vino albo parato cedentem, tum tertianas diuturniores, aliasque multum fuisse, quod aliæ intermittentes hoc, & sequenti mense invadentes testatum faciunt. Aliquando enim his sub initium jungebatur continua, remanente deinceps simplice, sive tertiana, sive quotidiana aliquando etiam sub finem accedebat, ut in Juvene quodam, cui mense Februario in quotidiana chronica supervenit purpura. Sicuti vero nominato mense Februario non solum febres catharrales Lutetiæ Parisiorum, Versaliæ, Gratiæ, Marfilie, Camberii, Romæ, Liburni, perque Ducatum Mutinensem adhuc dum spargebantur; verum etiam aliæ funestæ, Augustæ Taurinorum, Mediolani, Bononiæque visebantur, ut de lue pecorum circa Laudensem agrum infestante nil tradam: ita Viennæ præter congestiones versus partes superiores, rheumatismos, modo clavum hystericum, cujus comes erat febricula stata hora rediens, modo odontalgiam contumaciorem post se trahentes, atque apoplexias, febres continuæ malignæ continuarunt. Harum aliæ fuerunt exanthematice, erumpentibus vel petechiis, vel purpura vel morbillis, aliæ nullas ad corporis peripheriam ejectiones proferebant, quarum tamen posterioribus, ob summam virium prostrationem, vigiliis, deliria, motus convulsivos neque hic loci, neque Rustini in Hungaria multum fidei habendum erat. Etsi vero multi ægrotorum, quod supra monui, curam a purgantibus incipiant, & ex his in febre petechiali nullum unquam restitutum fuisse scribat Parens pie defunctus, in Historia Epidemica Hungariæ, idemque & ego in mea praxi notaverim, fœmina tamen quædam hoc mense etiam servata. Hoc autem notatu dignior est hic casus, quod eadem persona febre petechiali detenta, & laxans sub initium assumpserit, & exanthematibus jam præsentibus V. S. celebrandam curaverit. Unde accessit tandem deprehendi exanthematum retrocessionem. Affectus hinc indies invaluit, & secuta sunt non solum brevi deglutitio difficilis, anxietates, subsultus tendinum, pavores sub somno, deliria; sed & xii. die tam petechiæ nigre, quam purpura alba, quibus sese auditus difficultas, atque rigiditas totius corporis adjunxere, ut & soporosa affectio. Morbum igitur hunc in pessimis signis constitutum, atque lethalem pronunciaui. Sed tantum abest, ut exitiosus decumbenti fuerit, ut potius adhibitis mature Vesicatoriis, blandamque diaphnoem promoventibus, sensim atque sensim sub secunda purpuræ albæ eruptione, quarta septimana contingente Symptomata remiserint, atque patiens ab hoc affectu periculossimo, præter omnium opinionem ac spem liberata sit. Mense Martio partim catharrales Florentiæ, Neapoli, Anticarie partim morbilli Lutetiæ Parisiorum, partim aliæ malignæ, atque intra paucos dies lethales Bialæ Polonorum sese sistebant. Eodem tempore Viennæ sese offerebant congestiones, tam in junioribus; quam in media, quam etiam in consistente ætate, jam versus naves, jam versus pulmones magis tendentes. Nonnunquam evacuatio sanguinis per naves, nonnunquam excretio serosa nuciæ materiæ vel in coryza, vel in tussi humida succedebat, quandoque nulla fuit observata, humidioribus nempe congestis in stagnationem deductis. Unde varii denuo affectus pendebant. Inde enim non tantum tumor non nihil rubicundus sed nequaquam inflammatorius, Cheilocace dictus, de quo Arnoldus Boetius obs. med. de affectibus omnis p. 30. C. X. pluribus egit, in adulto nascebatur; verum etiam inflammationes, nunc in partibus externis, tonsillis atque dentium periosteo, nunc in internis, sive anginam veram cum febre, sive spleni-

splenitidem mensibus instantibus spectes, oborta sunt. Neque malignae febres minuebantur, sed in aliis sub simplicis, in aliis subcompositae apparere schemate, quarum prior aliquando continens, plerumque vero indolem continuae habuit. Atque haec posterior huic ob cephalalgiam, dolorem pectoris molesta erat, illi gravior ob catharrum, atque debilitates synopticas, isti periculosior ob vigilias, deliria, diarrhoeam, torsiones oris xi. die apparentes, in omnibus ob anxietates, abjectionem animi, summam virium prostrationem vehementior, hocque magis, si purpura alba, vel petechiis supervenientibus non rite tractata fuerit. Sic in robusto quodam Juvene notavi febrem petechialem, ob purgans repetitis vicibus sub initium morbi assumptum, inter paucos dies funestam aequae, ac latioribus livescentibusque exanthematibus stipatam. In femina, quae in purpura doloribus spastico-arthritis varia unguenta & linimenta opposuit, ob impeditam hinc transpirationem, menses, mox, disparentes, Venae Sectionemque neglectam, quae hic loci ut plurimum necessaria est, non modo graviolem statum animadverti, sed & periculosiorem judicavi. Sed ecce, temperatis diaphoreticis per aliquot dies usurpatis, erumpente purpura alba copiosissima & dolores, aliaque symptomata mitigabantur, & febris haec intra spatium xxi. dierum solvebatur, etsi dolores arthriticos diutius adhuc senserit, sublatis successively antispasticis, laxantibusque blandioribus. Simplex haec maligna febris interdum inflammatoriam, interdum continentem junctam habuit ubi remedium praecipuum erat V. S. Hac vero praetermissa, quamvis optima etiam medicamenta propinata fuerint, irrita saepe fuere omnia. Id ipsum videre licuit in virgine quadam juvene. Licet enim in eadem ob plethoram menses alias parviores, tanto magis V. S. in continente febre commendaverim, monito tamen non auscultabat Parens. Unde mirum non est, quod mensibus sub initium quidem accedentibus, mox tamen iterum cessantibus, summam lassitudinem, dolores spastico-arthriticos, cephalalgiam, vigilias sub principium jam praesentes, plura secuta sunt periculosa symptomata, symptomata, dolor dorsi, major congestio versus caput, acerbior dolor capitis, propensio ad somnum profundorem, auditus difficultas, haemorrhagiae largiores, ad debilitates synopticas usque sudor frigidus, atque die viij. motus convulsivi ipsaque mors. Aprilis, sicuti sua natura alias mutabilis, ita & hoc anno Viennae inconstantiam suam prodidit. Sub initium enim serenae comparuit, sed triduo elapso alia multum diversa tempestas ingruerat, nunc pluvius, nunc nivibus sese exerens. Humidam hanc aequae frigidam in progressu tepidior ac amenior excipiebat, imo & huic postremis tribus diebus denuo horrida magis, atque tumultuosa ob ventos, pluvias, nives succedebat. Majus ut plurimum, in primis sub principium, pluviosus, hincque humido-frigidus oboriebatur, quandoque tamen & serenior placidior, tam prioribus diebus, quam sigillatim sub finem observabatur, ut nec de tonitribus & fulminibus crebrioribus die viij. atque xx. recurrentibus, nec de grandine, quae x. cadebat, quicquam adducam. Toto Junio exoptata habuimus tempora, calores, saepe pluviae nocturnae amenissimae interdum mitis atque lenissimos ventus contemperabant. Vere toto quanto constitutio aeris eadem fere mansit in aliis Europae regionibus, atque hic locorum erat. Aprilis enim sub introitum Holmiae, remittente frigore blandior notabatur, deinceps Ustae, perque totam Bohemiam pluviosus, humido-frigidus sentiebatur, tandem calidior succedens non modo glaciem Petropoli solvebat, verum etiam in Polonia perexigua & perminuta flumina reddebat. Majus & Junius alibi quoque magis pluviosi fore cum ille tam ob nives junctas pluvias Cracoviae, quam ob ingentes tempestates cum fulguribus, tonitribus, horridis grandinibus, & ventis violentis Coloniae Agrippinae, Heudene, variis in locis provinciae Ultraeanae, Dromorie, Walvici, Bardovici, in Saveria, Episcopatu Monasteriensis, Susati, Borolini, Halle Saxorum exortas, subfrigidus atque inamoenus permaneret, hic vero posterior tam turbulenta tempestate sese exhibuerit, ut modo fulguribus gravioribus Polonis atque Berolinensibus, modo grandinibus in Barchenia, Volhynia degentibus modo ventis vehementioribus incolis circuli Burgundici damnum intulerit, modo ob frequentes opiosissimasque pluvias Molybertae intempestivus fuerit, Cameneciae atque circa Halam Magdeburgicam viventibus disruptis piscinis multum molestiae asperferit, atque in Valachia jam homines, jam pecora, dum circumfluere aquis, atque in harum abundantia viverent, e medio sustulerit. Si morbos cum vere surgente increbescerent, atque ad solstitium aetivum usque infestantes reputemus, ob similem aeris constitutionem ubique vigentem eosdem hic regnasse liquet, qui homines adorti sunt alibi. Mense Aprilis, Majus, Junio cum intermittentes, tertianae in Italia, tum continuae, vel nulla exanthematosa emittentes, malignitate tamen non carentes, atque nunc catharrhales, anginodes Lutetiae Parisiorum, inque Ducatu Ferrariensi, nunc alias circa Guardistallum representantes, vel exanthematice, tam sub vario Moscoviae, Holmiae. Nemausi, Cazalle sese sistentes, quam sub pestis schemate in Podolia apparentes, febres grassabantur. In quibusdam locis & alii viscebantur morbi. Sic lues pecora aggrediebatur in Germania, dysenteria in castrorum meratione circa Molybergam milites afficiebat Junio, apoplexia atque podagra praeter solitum eodem mense homines Moscoviae invadebant, Viennae mensibus vernis sese offerebant congestiones versus pectus, caput in haemorrhoidariis, sanguineque spissiori praeditis, rheumatismus capitis ob menses parviores, lumbago rheumatica, cephalaea cum febre, ophthalmia, odontalgia, affectus spastico-arthritici, arthritis fixa post iram, atque excessus ratione potus in haemorrhoidario commissos, malum ischiadicum refrigeratione praegressa, chiragra post animi excandesceniam, podagra mensibus post terrorem disparentibus, febres intermittentes, quotidianae, etiam infantibus familiares, tertianae, in aliis anticipantes, in aliis postponentes, quartanae si non solis salibus digestivis, atque viscidum incidentibus, tamen pulveri Lenfilii ex cort. fraxin. rad. gentian. rubr. atque sale absinthii concinnato cedentes. Praeter has continuae continuantur, non solum primariae, sed & ex secundariis, inflammatoriis, peripneumonia atque pleuripneumonia. Posteriori juncto sputo cruento, atque graviori febre laborabat quidam Juvenis, prior vero reperiebatur cum aphonia in ancilla, utraque, V. S. atque diaphoreticis temperatis sublata. Frequentes erant malignae, interdum simplices, interdum compositae existentes. Quandoque enim continua complicabatur cum continente, qualem haemorrhagiis, atque sudore intra primum septenarium solutam videre licuit in Illustriss.

Supplem. ad Sydenham.

quadam filia. xiii. annor. quandoque & intermittente habuit comitem, ita, ut aliquando sub tertianae schemate incescerit, aliquando etiam mitius tractata in tertianam five simplicem, five duplicatam, pulvere ex fl. chamom. sale absinth. atque antinu. diaph. parato, brevi curatam, transierit. Nonnulli horum jam in principio haemorrhagiam narium, vel haemophysin perpeffi sunt; quaedam tamen femina & sub paroxysmo intermittens vomitu cruento correpta est, unde in iis quoque V. S. cum successu sub initium celebrabatur. Saevit haec maligna febris aequae in gravidas, atque alias. Rariores Leyteponi habui casum. Etsi enim femina quaedam juvenis, & sub initium purgans assumpserit, & die vij. V. S. in eadem instituta sit, & nimias ob vigilias huic pharmacopoeus narcotica exhibuerit, & post incongrua haec artificia multa statim enata sint periculosa symptomata, vigiliae continuae, deliria non interrupta, lipothymiae, tremor artuum, floccorum lectio, aliaque; tantum tamen absuit, ut obierit, ut potius Viscicatoris ructus, pedibusque applicatis denno ad se redierit, vocatis deinde in usum confortantibus, analepticis, bezardicis temperatis pueros geminos enixa sit, atque praeter omnium ex morbo gravissimo evaserit. Neque exanthematice nostris ulla dederunt inducias. Catharrhalis, licet in infante cum inflammatione tonsillarum, delirio, iv. die, superveniente haemorrhagia narium largiori sudore; urina turbida & inquinata, remiserit, alterationes tamen febriles post se relinquens, non nisi purpura alba subpullulante penitus disparuit. Petechialis aegrotis eo plus negorii facebat, quo minus studiosa, minusque decens adhibita fuerit curatio. Laxantia etiam sub introitum morbi noxia erant, & memini fabrum aurarium, ob propinatum purgans, atque refrigerationem factam, lypothymias, vigiliis, deliriis tentatum die vij. e medio esse sublatum. Neglectam petechialem, hincque confusam animadverti in tribus Juvenibus, quorum unus prioribus diebus in summam virium prostrationem, gravitatem pectoris, vigilias, deliria, diarrhoeam, die vij. in subsultus tendinum, singultum, vij. in petechias nigras, viij. in soporem, sequente in purpuram albam, motus convulsivos incidens ix. die mortuus. Ceterorum alter non modo sub principium vertiginem, dolorem gravitatem pectoris, alternis diebus exacerbationem percipiens; sed & in progressu febris vigilias, deliria, manuum tremorem, floccorum lectionem, torsionem oris, alvi involuntariam excretionem incurrens die xii. fato succubuit; alter biliosus, variis excessibus deditus, praeviis vigiliis, deliriis, diarrhoea, die vij. sopore, aphonia, urinae suppressione, ix. artuum tremore, x. urinae involuntaria emissionem, tremore labiorum, subsultu tendinum, aspectu torvo, xi. floccorum lectione, torsione oris, alvi defectione involuntaria, motibus convulsivis periit, quamvis ubique nihil non tentatum sit, imo tardius accersitus iisdem sanguinis detractione in statu amplius locum non habente, pro re nata bezardica temperata, confortantia, subadstringentia, antispastica, vesicatoria, aliaque longo usu atque experientia probata remedia suaserim. Eodem tempore multos occupabat purpura, quae tamen prudenter tractata nulli funesta fuit. Spargebantur praeter febrem scarlatinam in teneriori aetate cum vomitu, tussicula, cephalalgia, motibus spasticis, convulsivis deliriis praematuris occurrentem, atque blandis diaphoreticis, antispasticis, sudoreque die vij. victam, & aliae dum species, purpura nempe rubra, atque alba. Atque haec quidem etiam infantes febre catharrhali licet superata vehementer affligebat, quendam vero ex adultis ob refrigerationem summo periculo exponebat. Cum enim proclivior sit febris haec materiam morbificam per poros cutis proferre, mirum non est, mutatione lecti, atque aeris frigidioris admisione facta die vij. in subiecto nostro plethorico, cacochymico, ob sudoris retrocessionem, majores statim anxietates, inquietudines, vigilias, mentis alienationes usque ad xi. diem durantes, in conspectum prodisse. Gravius sic decumbente aegro in consilium quoque vocabatur Archiatrorum Cesareorum Comes; Perill. atque Magnif. D. de Longobardi, cujus nomen, dum audio, veneror. Tamen vero Lectione & experientia hic Vir Celeberrimus serio imperaverit, ut & continentiam tranquillam sibi commendatam haberet, & medicamentum diaphoreticum antispasticum a me praescripta subinde peteret, & aliis salutaribus monitis auscultaret, impedire tamen non potuit, quin adstantes suavis aliorum medicorum, contra obstructionem per quatuordecim praesentem clysterem applicandum curassent, nisi eadem die xii. purpuram albam copiosissime erumpentem detexissem, atque sic Patientem ab orci faucibus liberassem, quem mox clystere jugulassent. Julius ultra dimidium pluvius conspicuus erat, ita tamen, ut tempestas pluviosa cum sereniori per totum mensem decursum alternavit. Unde gratus atque exoptatus observabatur, quamvis & die xiii. violenta tempestas non tantum Viennae cum frequentissimis tonitribus, flammularumque fulgoribus, sed & in vicinia cum grandinibus insolitis, maximo vinearum damno, oborta, & postremis diebus ob copiosiores pluvias horridior secuta sit. Similes vicissitudines ratione caloris, atque siccitatis, per totum Augustum sentiebamus. Calor enim semper moderabatur pluvius, aliquando citius, aliquando tardius. Nonnunquam mane optima tempestas comparuit, spurca succedente vespere, nonnunquam calorem per aliquot dies durantem pluviarum continuas excipiebat; imo & sub finem aestus diuturnior imbres largiores praegressus est. Atque ob pluvias tam sub initium mensis sequentis ingruentes, quam circa aequinoctium autumnale continuantes tempestas frigida atque humida ad postremos usque Septembris dies perseverabat; reliquis, a tertia nempe ad xvii. serenae atque aequalibus existentibus. Anni aestatem, cum inuentem, tum adultam, tum praecipitem pluviosam & alibi deprehendimus. Sive enim tempestates graviores, atque numero non modo spectabiles, verum etiam ob fulmina vehementiora, tonitrua horrenda, grandines immanes, in Volhynia, Leopoli, circa Lovitium, Uspisala, in Ducatu Bremensi, Dresdae, Augustae Vindelicorum, Francofurti, Londini, Suffolciae, Lutetiae Parisiorum, in Civitate Remensi, Picardia, Genuae attendamus, sive imbres largiores, atque per copiam, & aquarum pluvialium affluentiam vel animatarum, vel oppidorum, vicorum, vinearum, agrorum, pratorum, aliarumque rerum inanimatarum jacturam factam in insula Cituorum minori, Cremesiae, in Austria superiori, Bohemia, Palatinatu, Bruxellis, Halle Saxorum, circa Berolinum consideramus, luce meridiana clarius id ipsum est, utut Holmiae, atque in Moscovia major calor majorque siccitas cum nebulis foetidissimis, quam ab

B b 4

xi. an.

xi. annis sese exeruerit, ut & *pisces* inde in *Suecia* perierint. Hic tamen temperabatur calor *pluvius* adhuc dum *Julio* cadentibus, illic frangebatur *Augusto* accedente frigore, quod æquinoctio autumnali appropinquante & *Moscovia*, & *Ouonia* majus incrementum sumpsit. Denique & notatu perdignum, ea, quæ ruri a grandinibus intacta permanerunt, a cicadis turmatim *Poloniam*, *Lusatiam* Superiorem & Inferiorem, atque *Marchiam Brandenburgicam* ingredientibus, intra spatium xxiv. horarum fere omnia fuisse consumpta, irreparabili incolarum damno. His mensibus æstivis, præter apoplexias *Hagæ Comitum* ingressas, arthritidem *Londini* infestantem, atque podagram *Romæ*, *Moscoviaeque* increbescentem, diversæ febres adhuc dum spargebantur, ita ut ex continuis inflammatoriæ, quales sunt pleuritides atque peripneumonice, Gallos invaserint malignæ modo in *Salopia* Anglis intra quadriduum funesta, modo in *Apulia* militibus Cæsareis lethales, modo *Cazalla* degentibus periculum minantes grassatæ sint catarrhales in Ducatu *Mantuano* regnaverint, variolæ *Romæ*, *Lutetie Parisiorum*, inque *Campania* viguerint, dysenteria in *Italia* homines adoria sit, pestis in *Podolia*, *Volhynia*, *Moldavia* sævierit, imo denique & lues quædam pecora circa *Camentiam*, *Chotimiam*, inque *Spirensi* Episcopatu occupaverit. Eodem tempore *Viennæ* commotioni humorum supervenire solebant hæmorrhagica congestiones, quas pro diversitate loci nunc hæmorrhagia narium, nunc hæmoptysis comitabatur. Quin etiam ansa hinc arrepta in mensum retentione visus hebetudinem habuerunt sociam, cedentem non solum antorgasticis, atque antispasmodicis, verum etiam fluxu menstruo redeunte penitus disparentem. Sicuti vero rheumatismos hinc inde videri licuit; ita similis congestio per totum latus dextrum sese extendebat in sene plethorico, & podagrico alias, & brevi ante morbum de *Stranguria* æque, atque catarrho conquesto. In hujus facie periculosa sese sistebant Symptomata, inflati, ophthalmia, oris tortura, partium adfectarum actio læsa, ut neque comedere, multo minus fistulare potuerit. Atque hic mihi suppetias præ cæteris ferebant diaphnoica, antispasmodica, nervina vel in infuso, vel in decocto pro oris elutione, vel linimenti forma præscripta, quæ post V. S. reiteratam adductis Symptomatibus superatis, imo rheumatismo circa claviculam subsequenter etiam discusso, successive ægro sanitatem reddebant, licet maturius aeri frigidiori, atque humidiori se exponens podagram tandem incurrerit. Sunt & alii adhuc morbi, qui subpullularunt. In ætate graviore raucedo sese prodebat, tussis vehementior eandem affligebat, in primis hypochondriaca, quali Illustris. quædam Domina septuagenaria, juncto dolore hepatis, laborabat. In subiecto sanguineo-cholerico, atque podagro, nephritidem chalcidosam, cum doloribus acutissimis, clysteribus, digestivo-antispasmodicis, ol. amygd. dulc. balneis relaxantibus, unguentis emollientibus, quæ calculi secessum facilitabant, sustuli. Affectibus Spasmodico-artriticis ex propria fonte erat succurrendum. Sic in hæmicrania chronica, malo ischiadico, podagra antorgastica, digestiva, diaphnoica, antispasmodica majorem opem ferebant, quam ab ullo alio remedio expectari potest. In arthritide fixa cum tumore manus hæc quidem non sufficiebant; sed pulvis ex sale cicchor. fecul. uri. pulv. hepat. rubr. atque diagryd. Sulphurat. paratus, laudatis interpositus fere punctum tulit, cujus hinc usum, quo usque penitus remisit dolor, continuavimus. Occurrebant etiam in adulta virgine plethorica motus convulsivi contumaciores, durantes per triduum, artusque adeo torquentes, ut in luxationem cubiti inciderit. In causam mali inquirens animadverti, eosdem sine manifesta causa fuisse enatos, neque unquam, si convulsiones ob terrorem post morsum canis in Juventute perceptas excipias, ab eadem antea perpeffos. Remedium præcipuum ac præsentissimum fuit pulvisculus ex matr. perl. præp. antim. diaph. nitr. dep. lumbric. terræ præp. atque cinnab. constans, quem aliis non juvantibus exhibui, eumque deinde, applicato quoque clystere repetiti. Nec defuerunt febres malignæ, acutæ, interdum sub continetis, interdum sub schemate continuæ apparentes. Quam plurimæ fuere exanthematicæ. Sæpe complicabatur purpura rubra, in primis in infantibus, sæpe petechias emittebat hæc febris. Atque petechialis denuo duabus personis, quod purgans assumpserint, a vino non abstinerint, diaphnoen neglexerint, tremoribus totius corporis, vigiliis perpetuis, deliriis furiosis sese repræsentans, funesta erat. Alios affecit sine exanthematibus, quod cum catarrhales, tum dysentericæ sub finem Septembris invalescentes satis superque probat. Quædam jam in principio dysentericæ mensis, expertæ sunt, in quibus pilulas Stibal. subjunctis spec. de hyacinth. atque corall. rubr. præp. cum successu adhibui. Taceo quotidianam, tertianam duplicatam, ischuriam gravissimam V. S. in pede decrecentem, diarrhæam torminosam post iram nitrosam atque præcipitantibus victam, aliosque morbos his mensibus sese offerentes. Octobris initium serenum, utcumque placidum fuit, progressus ad finem usque nebulis, pluviis, nivibus, grandinibus conspicuus, humido frigidus. Totus Novemb. aut nebulosus, aut pluviosus, aut ventosus, aut nivosus erat, adeo, ut eodem mense neque quatuor dies tranquillæ & sereni numerari potuerint, neque frigida atque humida tempestas unquam minuta sit. Quamvis autem & December pluviosus campauerit, tepens tamen atque æstatis simillima tempestas eidem jungebatur, quam vix per iv. dies stantem excipiebat alia multum diversa. Sequebatur enim ventosa, nivosa, rigidior, quam ullo, quod meminimus tempore, frigori acriori die xx. atque xxi. obortis pluviis quidem remittente, sed xxiii. majori vehementia cum Aquilone atque nivibus redeunte. Sicuti vero priores Octobris dies, tam ob cælum splendore plenum in Palatinatu, quam ob siccitatem in Ducatu Montano, ac Dresdæ calidiores quoque fuisse intelligimus: ita & sequentes atque postremos jam venti rigidiores Venetiis, in Hispania, jam pluvie non interruptæ circa Scaphusiam, in agro Bononiensi, Ducatu Guardisallensi, insula Junonis, aliis provinciis Hispania, Camenecia, jam nives Holmiæ, Petropoli, in Ducatu Novogardie inferioris, Cameneciaque humido-frigidiores reddebant. Atque hæc, frigida scilicet, atque humida tempestas, dum ob ventos circa Portum ostium, Dublinum violentiores, tum ob pluvias in Palatinatu, Colonia, Bruxellis, Lutetie Parisiorum, Romæ, Genovæ, Calpe copiosiores; tum ob glaciem, nivesque in Moscovia, Polonia, Suecia, recurrente placidiori aere solutas per omnem Novembrem continuabat. Denique & Decembr. aura temperatiori, pluviis frequentioribus stipata, Batavis, Gallis, Germanis, Polonis, aliisque illuxit, tantumque abest, ut talis permaneret, ut potius turbidus successe-

rit. Testes sunt non modo venti vehementiores Romæ, Liburni, Venetiis, Neapoli, in Lacu Lemano, Maclopoli, Rupelle, Hanovere, Colonia Agrippina, in Franconia, Hafniæ, in mari Baltico sese exerentes, verum etiam nives cum acerbissimo gelu in Moscovia, Polonia, Suecia, Holsatia, Saxonia, Gallia, Helvetia, Hispania, Baviera invalescentes. Remisit quidem frigus in Bavaria, Polonia, aliisque regionibus per paucos dies, mox tamen rediit intensissimum, cum omni tempestatum insolitarum, nivium & ventorum, genere. Autumno nunc arthritidis Londini increfcebat, nunc podagra Romæ, Mediolani, Genovæ, Lutetie Parisiorum, in Batavia, Berolini affligebat. Romæ eodem tempore pleuritides, peripneumonice, angine, aliæque febres inflammatorie frequentes erant. Malignæ & in Palatinatu inferiori, & in agro Lunensi, & Genovæ, & in insula Junonis in homines sæviebant. Non defendam easdem vel classicula Hispanorum præfidiaria mediantem ex America in locum posteriorem fuisse delatas, vel ex fonte quodam impuriore ortum fuisse, hoc saltim addam, has modo continentis Schema, modo indolem continuæ exhibuisse, cutem aliquando maculis, aliquando nullis fuisse interstinctam, ut de duplicatis in quibusdam perspectis nil adducam. Variolæ Coloniae Ubiorum, Londini, Lutetie Parisiorum, Versaliis, circa Autricum Carnurum, in Lunæ Villa, in Hispania regnantes, si morbos reliquos non exuperabant, numero tamen æquabant. Neque pestis in Podolia, Volhynia, Moldavia decrefcebat, neque lues pecora occupans remittebat; sed latius serpendo & eundo tantas acquisivit vires, ut eorum quantitatem maximam in Bohemia, circa Posonium, Zamnosci, in Lithuania, Marchia Brandenburgica, versus Ducatum Magdeburgicum, aliisque in locis Saxoniæ e medio fustulerit, cui malo in postremis regionibus multum favebant miasmata putredinosa a cicadis relicta. Cæterum præter paralyses, apoplexias Romæ, Mediolani, Cernæ, Lutetie Parisiorum, Hamburgi sese sistentes, nil memoratu dignum mihi occurrit. Iisdem mensibus Virgo quædam Viennensis post V. S. ob menses parviores in pede institutam, crocique essentiam adhibitam, fluxura mensium nimium incurrit, quem adstringentibus ab ordinario præscriptis expugnare per vij. Septimanas, sed frustra erat conata: hic ego ad repetitum antorgasticorum usum confugi, neque penitenda opera, quandiu enim ista propinarentur, satis recte habuit, sed cum his moderaretur tantum fluxus, non tolleretur, V. S. in manu suavi; qua celebrata sine antorgasticorum præsidio omnino convalescebat. In aliis rheumaticos decubitus versus faciem, in aliis otalgiam, in alia post refrigerationem, atque aliqualem lechiorum suppressionem odontalgiam vidimus; in aliis puero ob neglectam diaphnoen diu purpuram perpeffo sese offerebat cheilocace, sive labrosulcium, cum exulceratione labii superioris oris gravius, ac quasi hereditarium, alii coryza, angina, tussibus laborabant; in aliis affectus spasmodico-artritici, digestivo-diaphnoico-antispasmodicis sublatis invalescebant. Innumera quoque hinc inde spargebantur febres, inflammatorie, malignæ, catarrhales, exanthematicæ, intermittentes, tertianæ, aliæ: sed præ omnibus purpure albæ. Invadebat enim non tantum infantes, maturius in febre scarlatinae mense Junio aeri liberiori commissos, sed & adultos. Sequiorem sexum duplo gravius afficiebat. Sic affectum hysterici, animi abjectio, ardor atque anxietas cordis, cephalalgia, vigilie, deliria usque ad xvi. diem continuantia in Juvene quadam Domina purpure albæ superveniebant, quibus sese excretio critica partim per sudorem die vij. apparentem, partim per hæmorrhagiam narium largiorem xiv. obortam, sequentibus xvi. etiam mensibus, adjunxit, ut & exanthematum eruptio xi. & xviii. secunda vice cum levamine sese prodens. Duæ ex puerperis hac febre laborantes meam implorant opem, quarum alteri camphorata myrrhata, similiaque interne dederunt, alteri tincturas spirituosiores præscribere Medici. Etsi vero calidiora utrique dissuaserim, atque ob vigilias & deliria, temperatiora laudaverim, tantum tamen abfuit, ut id ipsum in priori observatum fuerit, ut potius massam humorum commoventia repetierint, sicque imperite tractata, nulla de sui, nullo de dolore conquerens, urina etiam naturalis fere existente, die xi. sublata sit. Posterior, quæ non modo spongiosioris atque plethorici habitus erat, verum etiam ante annum cum sub initium gestationis menses continuos, tum medio tempore fluorem album, tum vij. mense abortum experta est, hoc gravius decumbebat, quod & in abortum denuo absque causa manifesta inciderit, duabus simul molis secedentibus, & ob violentiorem secundinarum diutius remanentium extractionem debilitates syncopicas senserit, & die viij. sudore præsentem aerem liberiores admiserit, & viij. exanthematibus jam prodeuntibus enematis injectio facta fuerit, & ob neglectam diaphnoen, dum surgeret maturius, atque purpura sub blando odore sensim evanescente, rheumatismo pedis summe dolorifico tentata sit. Serio hinc imperavi, ut sub continentia tranquilla regimen diaphnoicum sibi commendatum haberet. Variolæ copiosiores, ordinariis quidem majores, atque sub initium pellucidæ; deinde tamen ad ambitum inflammata, juncta febre exquisita, vigiliis, deliriis suppurascentes æque, ac die xiv. exiccate, decedentesque cum solutione mali sub blanda diaphnoæ, urinæqueurbatione visabantur in filia jam adultiori, cujus in fratre mitiorem vim morbi animadverti. Nil dicam de pleuritide in Juvene vij. die sudori cedente. Neque vel cachexia cum nodis atque abscessu mammæ in puerpera a purgantibus fortioribus, suavis barbitonioris assumptis aucta, digestivo, diaphnoico antispasmodicis autem a me ordinatis, sub copiosiori sudore, copiosiorique urine excretionem successive penitus disparente, vel de aliis morbis sporadicis quicquam adducam. Hoc saltim addam, mortuorum numerum; sicuti Londini 26761. Amstelodami 8911. Brunsvici 1233. Licaonie 400. Berolini 2691. Wittembergæ 260. Dresdæ 1740. attigerat, ita Viennæ ad 8493. sese extendisse. Sufficiat hæc de constitutione epidemica hujus anni fideliter, prout & in alieno, & in mea praxi occurrebant, annotasse.

Dn. D. CAROLI RICHIA,

Philos. & Med. Doct.

Constitutio Epidemica Taurinensis Anni 1728.

I. **H**umanum Corpus variis passim advenientibus impressionibus excipiendis aptum, variis idem malis affici notum est, quæ quidem modo ab occulta aeris diathesi ortum habent, modo intime profecta a variis fermentationum generibus, vel etiam putrefactionibus humorum, ut ajunt, seu rectius ab alterato fluidarum cum solidis partibus æquilibrium ad cuius legem mechanicis præceptis illud idem comparatum est, subnascuntur. Hinc multiplex morborum cohors ab omni ævo terris incubuit, seu ab hac, vel illa peculiari corporum particularium anomalia, seu a causa magis generali producantur; Hosce postremos proprie *Epidemicos* dicimus, vel indiscriminatum, nulloque servato ordine homines invadant, vel continua quadam serie, seu facto circulo se se invicem excipiant, statisque temporibus oriantur.

II. Si quibus autem in morbis *divinum* illud ab Hippocrate proditum elucet; id sane in epidemicis cernere est, quorum causam rectissime venerandus idem senex in anni tempora rejicit, quæ prout constitutionem suam naturalem servaverint, vel ab ea recesserint, sanum, vel ægrotum corpus efficiunt, variasque ægritudines producant. Nihil sane quicquam animum universæ, qua patet, Medicinæ pomœria perlustrantem tanta admiratione percellit, quam discolor illa, & plane sui dissimilis istiusmodi morborum facies, rum qua varias ejusdem anni tempestates, tum qua discrepantes diversorum ab invicem annorum constitutiones referunt, ab iisque dependent; ut vere *divinum* quid dixeris inesse iis, qui immerito *divino* laudis honore celebrandos, qui occultam illam, atque inexplicabilem aeris influentiam, unaque simul desævientes morbos scite norunt expendere, ac prænunciare.

III. Atque id quidem rite assequi res est multi otii, ac summe ardua; Opus utique vere magnum, cui fortasse unus Medici ætas non suffecerit. Diu namque, ut ut improbus, exantlandus labor est, antequam nos aliquid memoratu dignum in hocce fodiendo Isthmo, inque tam multifaria horum morborum serie extricanda præstitisse jure possimus gloriari. Neque is ego sum, qui me in his, quæ jam trado, omnem absolvisse numerum credam: Novi enim *quo ex luce mihi fluxerit præcordia Titan; Quamve sit mihi curta supellex*. Satis erit ad laudem inchoasse telam quove pacto se res habuit nuper, quod ad hanc scilicet, in qua degimus, Urbem, ejusdem agrum perrinet, enarrare.

IV. Quod ut ego felici calamo assequi pergam, ac dilucide, quantum fieri potest, quotannis proficui, ac illustrare; consentaneum duxi, quæ propria ac sua sit hujusce Cœli natura, quidve in hoc, quem premimus, Agro laudandum, quid culpandum sit, antequam ad alia progrediar, paucis exponere. Mea etenim, immo Hippocratis sententia, id scitu maxime est necessarium, nemoque Cinicorum alicubi esse potest, vel mediocri fama celebratus, quin ante omnia locorum, in quibus se velit exercere, cum positiones, ac ventos, tum aquas, & cæteras aeris, & alimenorum qualitates (quæ Urbium Cœlum constituere videntur) probe cognoverit.

V. Eaque quidem omnia ad commendationem Taurini agri concurrunt. Enim vero Taurinorum Augusta, si modo ejusdem positionem spectemus, mirabili certe vel casu, vel consilio haud longe ab Alpium radicibus in amœna planitie excitata fuit ad lævam Eridani Fluviorum Regis, *nulli amnium*, ut Plinius ait, *claritate inferioris*. Hinc lætissimi Colles, qua Orientem adspicit, trans Padum nitidissimo prospectu consurgunt oppositam imminentibus Alpium ad occasum Solis fastigiis faciem præbentes; Hinc effusissimus ager, qua Boream, ac Meridiem spectat, protenditur, quem *Taurinates campos* vocat Anonymus in Panegyrico ad Constantinum; *Taurinos* ego potius dixerim elegantiore vocabulo, quo quidem usus est Prolomæus, Tacitus, Plinius, & alii quamplures. Sic etiam Taurini Populi dicti sunt, qui antiqua Ligurum stirpe huc primi confluerunt.

VI. Isque est Urbis, rum Agri conspectus, vere, si fas est ita loqui, *Elisus*: Equis enim haud videt ex tot hisce inter se non diversis modo, sed quasi contrariis locis, Collibus nempe Alpiumque cervicibus haud longe ab Urbe impendentibus, amplissimaque interjecta planitie mixtam veluti quandam ex omnibus, ac libratam Atmosphæram consurgere; fluidumque aera, quem a Sole potissimum, Luna, ventisque inæqualiter premitur, perenni motu agitatum, minimo illud negotio a finitimis Montibus in potentem planitiem, & vice versa contendere, sursum illud prementibus, urgentibusque partim domorum ignibus, partim æris campani pulsu, & discurrentium Civium miscela.

VII. Sic vero præsertim comparata Urbs est, ut liberum habeat Solis tum ortum, tum occasum; qua nanque parte Orientem intuetur Solem, ita compositi sunt interjecti Colles, ut ejus illa radiis nulla, vel exigua diei parte defraudetur; qua vero Occidentem adspicit, disfrat Alpes, fere sexto ab ipsa lapide, Occidui morientis Solis aspectum nullimode inibent; quinimmo radios quoquo modo reflectendo, ac declinando hilarem, lætissimumque vespera incolis ferunt.

VIII. Insuper præstant modo dictæ Alpes, quod excelsis illis, quibus eminent, cervicibus, lenes, mitesque occidentales ventos, quos cærerum imperuosos maxime, ac insalubres potissimum Gallis occidentilibus novimus, lenes inquam, mitesque Subalpinis ferant, ea quidem ratione, quod uberrimam illam, si quid ego hic judico, vaporum aquosorum copiam, quam hi secum ex Oceano Atlantico vehunt, magna ex parte per vastissimum totius Galliæ occidentalis tractum dimiserunt, rum si quid adhuc retineant, antequam alpes pervadant, deponunt, quo scilicet dein lenes ii, ac temperati Subalpinas hæc Regiones benigno afflatu recreent.

IX. Quod vero orientales ventos attinet, hosce libere per universum Agrum Pedemontanum perflare sinunt exarati Colles ad Orientalem Urbis plagam compositi: nec humiles nimis, nec elati; ita tamen dispositi, ut nonnisi purissimum ætherem, leniterque retusum, ac mitigatum ad nos prima luce appellere permittant, perque patentes campos discurrere.

X. Neque diffiteor haud adeo insensum nobis fore Boream, atque illi oppositum Austrum, si quid opportune illis opponeretur; quod

medium veluti libramentum eorundem vim frangeret, ac temperaret. Cum vero libere hi tum a Septentrionali nivibus obsita, tum a Meridionali vaporibus aquosis divite plaga, nullo interjecto obice discurrant; furens inde, ac debacchantes sævissimo plerumque flamine Incolas verberant, vel eo maxime, quod assurgentes utrinque montes, apertum iis campum, ac quandam veluti alveum, quo niare sæviant, præbent. Longe vero Meridionali inferior Boreas est, quod ille inquinamenta, quæ secum vehit, medio quasi in itinere, antequam in obviam illi planitiem illabatur, interjacentibus maritimis Alpibus, quæ a meridie imminet, ac Niciensem ditio-nem a Pedemontio determinant, dimittere cogatur aliquando. Boreas vero e Montibus glacie, nivibusque rectis sponte ruens subjectos campos pervadit, libereque furens non modo aerem valde condensatum, & compressum adducit, sed & minuta corpora nitrosa non parum infensa secum advehit, erodendi, irritandique facultate prædita, quod aperte quidem ipsamet ostendunt ædificia, quæ cum maxime inveterascunt, adversa Septentrioni facie, non leves corrosionis notas præ se ferunt. Equidem, ut rem omnem in pauca contraham, ex hisce omnibus ventis, quibus Taurinus Ager perflatur, neminem agnoscimus Orientalibus salubriorem, neminem insuper infensorem Borea, atque Austro, infensosque denique minus, ac forte etiam salubres, cum maxime moderate flaverint, Occidentales didicimus.

XI. Plures vero fluentes aquæ uberi gurgite hosce campos alluunt, haud exigua incolarum felicitate; Hinc rivulos pene innumeros cernere est per universum agrum longe, lateque eximia, nec unquam satis laudata Colonorum industria disseminatos, qui rursus dein una omnes in unum, alterumque amnem, majoremque alveum excurrunt. Hosce inter amnes aquis, tum munere præclariores sunt Padus, ac Duria; Ille e gremio Vesuli montis celsissimum in cacumen elati, finibus Ligurum Vagiennorum, visendo fonte profluens, condensque se se cuniculo, mox in Forobiviensium agro iterum exorietis, placidissimo motu, qua præsertim aprici colles eminent, juxta Urbis mœnia præterlabitur; ultroque dein pèrgens mutato itinere Orientem versus excurrit, quo randem aquis dives in Adriaticum mare tergeminis ostiis sese exoneret. Hæc ex Alpibus Cortii præcipiti tramite decurrens altero sui alveo Pado adfunditur, altero in rivos diviso per Urbis semitas salubriter devolvitur, immunditiarum faciem, impurum spiritum, & causas gravioris Cœli secum una removens, auferensque.

XII. Sunt enim Alpes ita dispositæ, ac comparatæ, ut si quo in loco, hic sane admirabilem lulum excelsis earundem cervicibus præbeant, uberesque effundant in subjectam planitiem aquarum larices ex intimo earundem gremio profluentium, perque tot anfractus, ac mœandros læto, gratoque murmure decurrentium. Hinc soli bonitas aliis longe telluribus, quæ clementissimo Cœlo gaudent, profecto non inferioris. Hinc frugum omnium, ac rerum proventus uberrimus, nullo non tempore, parvo etiam pretio copiosa tellure salutarem incolis, ac hospitibus victum largiter subministrante. Hinc benigna aeris nativa indoles, quod caput est maximum, potissimum repetenda; Sicuti enim secundum Theophrasti (a) axioma, *talis est aqua, qualis est terra, per quam ipsa percolatur*. Ita quoque, me judice, plurimum una simul conspirant, atque invicem juvantur, lædunturque, aer, & aqua; nihilque adeo magis, quem scilicet cœu immensum quasi spongiam minutissimorum corporum, quæ a terraqueo orbe, perenni tum externo molimine excitantur, concipimus, puritatem, bonitatemque, ac locorum proinde felicitatem, atque incolunitatem conducit, quam dulces, probatæque aquæ suos per alveos, & canales libere excurrentes.

XIII. Equis vero lymphas, tum quæ ex intimis Alpium anfractibus sæturiant, tum quæ sponte ubique in universo agro profluant, tot inquam insonres lymphas crimine, aut malitia culpaverit, quarum bonitatem certissimo argumento, præter spargiricam analysin, longa diu experientia, probatæque apud incolas usus testatur? Quis limpidissimos ubique orientes fontes criminabitur, ad quorum quamplures, tanquam ad sacras Thermas concurrere ægros novimus, eorumque auxilio diuturnis ipsos malis evadere? Quis puteales ipsas, quæ rum in Urbe, tum in finitimis Oppidis passim prostant, aquas vitio redarguerit, quas, aut saltem plerasque, longo usu, optimas esse didicimus? Quod enim harum pleræque putidæ alicubi reperiantur, malum hoc acceptum referendum est non lympharum venulis, sed modo corporibus facile putrescentibus, quæ in pureos ipsos præcipitata sunt, modo nimis quieti earundem putealium aquarum, modo randem, quod frequenter accidit, Architectorum imperitiæ, qui puteos cavant juxta latrinas, aut cloacas, quarum sepulta lues infontes aquas contemnerat.

XIV. Scio quidem fluviales maxime, non omnino infontes haberi, utpote quæ exoticis particulis, cum præsertim nives æstivis mensibus liquecunt, inquinatæ sunt. Atqui adventitia hæc labes hujusmodi aquarum est, quam facili ego aliquando Marte diluam peculiari quodam, quem mihi olim elaborandum constitui, tractatum, *de morbis endemiis, seu de Medicina domestica Subalpinorum*; In quo quidem tractatu tum nativas, tum adventitias hujusce, in quo degimus, Cœli qualitates fufius, ac elaboratius exponam, tum, quæ præcipua res erit, naturalem Pedemontani agri historiam a nemine, quod sciam, tentaram adhuc, atque ab amicis diu expectitam, accurato, quantum fieri poterit, stylo persequar. Hæc interim satis erunt impræsentiarum pro ea, quam modo aggredior, felicique omine proficui in dies cogito exornanda Provincia. Manus iraque ad Tabulam.

XV. Utique ab ante acti anni 1719. exiru, Hippocratis more, incipiam. Fervidissimam, ac pulverulentam æstatem siccissimi veris, ac hyemis sobolem, pluviosus, ac lutulentus Autumnus excepit. Nulla scilicet visa dies ab autumnali æquinoctio ad hyemale solstitium usque nubibus expers, ac læto Cœlo. Nec diu quidem se se prodere distulit morbosa proles sub febrium larva nullo fere typo suborienrium, quæve morbillofarum, ac variolosarum indolem præ se ferebant, delitescens. Et sane morbilli, qui præcedentibus annis totam pene Pedemontanam Regionem, longe, lateque infestant, jam fatiscences dein, variolis locum cessere, quæ ineunte æstate subortæ, autumno maxime debacchatæ sunt, deploranda tenellæ præsertim ætatis clade. Curiosum sane erat, quo hæc pacto ab uno ad alterum finitimum oppidum migrabant, ac se se invicem excipie-

(a) De caus. plant. lib. 6. cap. 3.

piebant, pendere, eundem scilicet quo antea morbilli apparuerant, ordinem servantes, ac morem, ingeniumque. Alpina namque loca ab hisce primo, mox universus denique Pedemontanus ager funestatus est. Diceret ab Alpibus illas ad Subalpinas Urbes transisse: unde demum facto velut agmine; ac impetu a finitimis regionibus ad magis diffusas, a Subalpinis ad Insubriam, ab Insubria ad Mutinensem agrum, ab hoc ad Romanum, totamque dein extremam usque Italiam propagatae sunt. Quodque mirum magis est, ac considerandum maxime; quod lethale esse solet hisce erumpentibus, nigroque propemodum lapillo signandum; id fere proficuum extitit, ac salutare: motus nempe per alvum spontaneus ab ipso variolarum erumpentium exordio ad usque supremum earundem stadium perdurans, cuius beneficio haud paucos meminimus, jam pene Orco proximis, ex insperato servatos. In quo quidem id ego potissimum didici, variolas nempe, cum maxime symptomaticae, ut ajunt, erumpunt, alio utique more curari, tum judicari, ac illas, quae essentialiter se se produnt.

Variolarum Classi merito adnumerabantur putridae febres, variolosa, inflammatoria, ut subinnuimus, & hujusmodi aliae, quae aestivis mensibus suboriri coeperant, ac tum forte cudebantur, subsequenti postmodum Autumno, ac Hyeme erupturae. Hisce se se addidere comites Pleuritides spuriae, Ophthalmiae, Anginae, Dysenteriae, Stranguriae, atque hisce affinium morborum prolixa Cohors, quorum una simul atque eadem omnium origo est; unum, idemque incrementum.

XVI. Atqui desit tandem, accedente hiberno solstitio, pluviosa Autumni constitutio, latioreque temporum indolem praenunciare visus est novus oriens Annus (1720.) sereno, mitique adeo Caelo, ut medio fere Januario Veris exordia praeludere jam tum coeperint, Occidentalibus ventis praeture spirantibus, quibus aequo pede identidem praeter morem Australes succedebant. Quis aegrorum status in illa vere insolenti conditione temporum fuerit? Quid inde subsequenti aequinoctio pertimescendum maxime, facile est conjicere poterit, qui quod Hippocrates ipse in hujusmodi (a) inordinatis temporum vicibus portendit, parte didicerit? Et sane vix a pluviosa ad siccissimam rursus vergere visa est temporum constitutio; ut illico putridas febres in petechiales, ac male moratas illis affines, ac consanguineas evadere adnotavimus, sensim evanescentibus variolis, nigramque faciem exaratis petechialibus, ac mali moris febribus, quae de die in diem invalescebant, tradentibus. In hac postrema variolarum scena adultos maxime correptos vidimus, secus ac cum primitus apparere illae coeperant, primavos tunc flores tantum, tenellosque infantes adortae.

XVII. Quae igitur ineunte Januario exoriri coeperant malignae febres, eadem, appropinquante Vere, quam immanissime debacchabantur, ac velut rupto aggere torrens longe, lateque per universa quaeque Subalpina Oppida crudeli more defavebant. Addiderant hisce vim, atque robur ingens in illa siccitate temporum, in quam ex pluvioso Autumno inauspicato incidimus, hiscentes ab Australibus oris assidui status, infesti quantum! Praeluserant hisce quoque denso agmine morbilli, ac succedentes variolae, quae superioribus annis, ac praecipue exacta nuper aestate, maximam infantum cladem edidere. Facile hinc conjicere erat iis potissimum vexatos iri labente anno Subalpinos Incolas, ni quae impendebant mala averterent Superi, miserasque terras defenderent. Auditum tunc quoque est Romae hujusmodi febres, tum anginas, ac pleuritides defavere, quae multa hominum millia utriusque sexus, & omnis aetatis, ac dignitatis interfecere. Quod ego quidem non absque ingenti animi dolore meminisse videor, cum praclarissimum, & amicissimum virum Joannem Mariam Lancisium, Summi Pontificis nuper quoque dum haec ego scriberem, in Caelum elati Archiatrum, & Cubicularium intimum, de re medica, ac litteraria optime meritum, cui ego plurimum debeo; in luctuosissima illa rerum scena e vivis sublatum, & adhuc lugeam, & mecum una lugeat universa Litteratorum Respublica. Mylis quoque in Sicilia, haud absimiles morbos jam tum superiori Aestate, Autumnoque extulisse caput, inque dies ingravescere magis, ingenti millitum tum Hispanorum, cum Germanorum, ac Incolarum funere audivimus.

XVIII. Exaratis febribus spasmodici pectoris affectus, sub ipsum Aequinoctium, ac diu adhuc post ipsum consociabantur; saevissimoque inito foedere, auctis veluti viribus, juniores maxime, ac robustiores ausi sunt laceffere, inque Libitinæ cenam deducere. Hisce quoque Comites aderant, subque iis merebantur Ignis sacri, anginae, arthritides, erysipelata, & alia id genus mala, quae quidem eo magis recrudescere, quo parcius saeviebant exaratae febres, ac spasmodici pectoris affectus, fatiscere rursus, ac cadere, quo immaniter magis illis increbrescebant, ac ita vicissim reciprocantibus imperiis ludere pluries observavimus. Qui vero chronicis morbis, ac tabe potissimum, ne quidquid ad historicam morborum narrationem desit, jam diu conflictabantur, hosce initio Veris ex omni prorsus spe decidere, adque interitum properare celerius forte, quam par erat, adnotavimus; Quin insuper multis de tabe in dubium venientibus, ipsa tunc est confirmata, atque haud scio si quis ex iis etiam modico tempore superstit.

XIX. Isque fuit Austrinus hyemis status. Raro scilicet, aut nunquam Boreae penetrabile frigus persensimus, quin insuper nivale velere defraudata terra, ea saltem quantitate, quae nostro huic Caelo congrueret, metus aderat, ne parum inde frugifera futura messis evaderet. Solabatur tamen annorum antecedentium felix ubertas, ut venturis temporibus provisa sufficerent. Equidem exarati affectus, si modo Arthritides excipias, quae quoque satis apte ad vernaes morbos referri queunt, exarati inquam affectus Veris potius, quam Hyemis ingenium redolebant. Et revera non aliunde excitationes, ac pene dixerim expergefatas, nova veluti prole sobolescere crediderim praefatas affectiones, quibus tunc obruebamur, nisi ab Austrinis saevientibus flatibus, atque hinc praeter morem serena, ac Veris speciem referente Hyeme, cui pluviosus Autumnus post ingentem illam temporum siccitatem praegressus fuerat. Hinc enim praeludente, praeturo afflatu, vere, ut vegetantia quaeque in agris, ita & humani corporis liquida intestino motu fermentescere coeperunt magis, ac agitari.

XX. Cum vero impar incerto absolvendo muneri, ac minus congrua foret liquidorum massa, tum ob alternantium ventorum indolem, qui plerumque humidi, mox sicci iterum perflantes, modo

in motum data liquida ciere magis, modo illa cohibere, ac minus apta suscepto muneri reddere videbantur, leviorum modo, mox graviorum aera, ac condensatum magis adducendo; tum ob particularum sanguinis spirituosiorum praconceptam, ante acta potissimum aestate, ac vere, Phlogosim, cujus veluti prologia extiterant defaevientes morbilli, atque iis affines variolae, independentium jam tum malignarum febrium praefagia, ac incrementa; tum denique ob pluviosam Autumni habitudinem, morborum parentis, omnium Medicorum ore feracissimi; evidens est ad minimum adauctum momentum motus, quod reliquum erat balsamici, ut mea fert opinio, oleosi, aquosi, ac dulcis plus justo, dissipatum iri, tum multigenos dein intra praedisposita civium corpora collectos Sales acres; erodentis, absque Autumni pluvii in fluorem evectos, ac recens ab Austro ulterius susos, accedente novissima quacumque causa, tum maxime exoticorum quorundam miscela principiorum, vincula quaeque discissuros obvia, hinc turbata solidarum partium resistentia, universam humorum massam, forte minus, quam par erat, sibi invicem haerentem, quam citissime fermentatarum particularum praesentia dissolvi. Ea namque est unius fluidi ad alterum aequilibrum ratio, ut unum veluti ab altero pendeat, eaque vicissim inter se una simul conspirent, ac ludant. Ubi vero quid insensum evenit, tamque pulchre inter se invicem comparatae partes non eam amplius observant aequilibrum legem, tunc universam penitus massam intestino, ac pene dixerim, civili bello perfractam, ni quam primum periclitanti, ubi forte defecerit, naturae opem praestaret ars, obeundis functionibus imparem evadere, ac tandem collabi penitus necesse est.

XXI. Quod quidem concessum tum exoticis, tum indigenis fermentativis particulis irascendi imperium, ingeniumque, evidenter, ac praclare satis, tum quae potissimum grassabatur febris, tum quae passim sub illius exortu, ac incremento sese prodiderant phaenomena, ostendebant. Enim vero quotquot aegrotare coeperant, hosce, plerosque saltem, febris indefinenter fere, nulla quidem conspicua, & peculiari accessione saevissime divexabat, quousque scilicet maculis purpureis confersa, ac foedata cutis emergeret, aut quidquid aliud praeludens praesentaneum interitum praenunciaret; afficiebantur autem potissimum Meninges, aut Septum transversum, aut Hepar, iisque finitimae partes. Multis primo insultu rigor, ac horror supervenit, quemadmodum in febribus intermittentibus videtur est; saepe etiam intermittentis typum mentiebatur, subque illius larva ad septimum fere diem, non nunquam ad undecimum usque nec ultra ludere visa febris, mox in malignam evadebat, qualis ab ipso initio revera aderat, eo quidem magis lethalis, ac periculosior, quod diutius latens, non juniores tantum, sed senes, ac sapientiores forte fefellit. Nec tamen sese, ita prorsus abscondi noverat illa unquam, quin aliquam subesse fraudem suspicio, aut metus foret, quidve mali moris, ac re ipsa divinum vel intermissionis, vel vexationis die appareret; alii namque de immani capitis dolore, alii de ingenti aestu, ac totius corporis lassitudine conquerebantur. Quidam siticulosi aderant, ac diu vigiles. Haud paucos gravis adeo sopor, ut vix excitari potuerint, occupaverat; atque horum neminem servatum meminimus.

XXII. Ubi denique conspergi, ac foedari maculis cutis, aut principes partes periclitari videbantur, tum mitescere febris, frangi, consisternarique vires, squallescere visa facies laborantis, ac pene jam deficientis naturae praeludia, quae nullo amplius revocari poterat Cardiacum, aut Alexipharmacum, qualicumque. Haec vero peticulae, ut plurimum quarta die, & septima erumpebant; primo quidem in dorso, collo, & pectore conspicuae, mox ad extremos usque pedum ungues sese expandentes; Observatumque paucos evasisse, quibus primis diebus illae apparuerunt. Miles, cui tertio morbi die maculae illae ingenti agmine proruperant, sexto celerrime perit. Puella decennis Oltoris filia vehementissima febre cum horrore, ac frigore correpta fuit; statim per exordia stris multa aderat, & incontinenens corporis jactatio. Postridie periculis pene lenticularibus tota visa conspergi cutis. Tertio parum sinceri sanguinis e naribus stillavit. Urinae crassae, mox tenues, postremo nigrae. Dejectiones alvi biliosae, spumantes. Quarto deliravit. Quinto sincerus iterum sanguis e naribus effluxit. Sexto rigor febrilis rediit, multa, nigra, foetida vomuit; sub Solis occasum mortua est.

Puellam alteram meminisse non sine lacrymis lubet Uxoris meae sororem, hujusmodi febre prehensam, cum illi fluere de more muliebria; eaque ad quartum usque diem perduravit. Quinto nauseabunda aderat, insomnis, toto corpore dolens. Multa vomuit biliosa, ac virulenta. Sexto ad meridiem, novus subortus est rigor exemplo; urinae per initia tenues, postmodum crassae, rubrae, quae in matula depositae non subsidebant. Postridie ejus diei, quo cessarunt menstrua, ingentes maculae purpureae in dorso, pectore, & collo conspicebantur, quae dein novo exorto rigore febris, penitus evanuerunt. Septimo verba cum delirio; ex alvo dejectiones biliosae, graveolentes; nox laboriosa, lentor, dentium. Octavo remissa sunt omnia. Nono maculae illae densiore examine rediere: crebra spiratio, ad Vesperam multum deliravit. Decimo intercisa, & deficiens respiratio, aurium surditas; circa meridiem valde deliravit, confestimque rursus ad mentem rediit. Ex quo alvo irritata nihil secessit. Paulo post oborto stertore celeriter expiravit. Aetas erat annorum fere septendecim.

Nec, diverso prorsus more, duo Chirurgiae studiosi, in Regio SS. Mauriti, & Lazari Nosocomio degentes, quorum alteri ingens macularum examen secundo die, alteri quarto, apparuerat, defuncti sunt; Prior quidem decimo; alter vero decimo quarto. Neutri conturbata alvus; irritata eadem pauca demisit tenuia, biliosa, mordacia; uterque diebus paribus gravius habebat. Alterum meminimus haud absimili fato demortuum, cui prodire modo, mox regredi visae peticulae sunt ad plures vices. Haec autem statim ab initio confestim eruperant. Robustus erat, ac aetate florens. Universa corporis lassitudine, & fractione, ut ipse agebat, conquerebatur. Sitibundus valde; Secundum, tertium, ac quartum diem eodem more transiegit. Quinto exasperata sunt omnia, pauca, biliosa, tenuia ex alvo reddidit. Urinae impense rubrae, oculi scintillantes, ac lucidi. Sexto evanuerunt maculae; nihil ab alvo dejecit, deliravit. Septimo convulsiones. Octavo vox obscure se prodebat, extrema, frigida; livida, stillae sanguinis e naso. Nono ad intelligentiam rediit, pauca dejecit nigra, graveolentia. Undecimo convulsiones

(a) Lib. de aere, locis, & aquis.

nes iterum visæ, totaque maculis denno fœdata cuti. Decimotertio vox pene defecit, Vespere obiit. Jurisconsultum juxta D. Pauli ædem decumbentem febris acuta continua cum dolore lateris corripuit. Sitibundus admodum aderat, & pervigil; urinas reddit multas, turbulentas, albas, quæ nec deposita subsidebant. Alvus commode habebat. Quinto die vehemens æstus, & stomachi fastidium adfuit. Potum continere minime valebat. Urinæ eadem, indistinctis, ac pene inconspicuis fœdata cutis. Sexto deliravit. Sub vespere mitius se habuit, commota sponte alvus, dormivit. Septimo multa ex alvo secesserunt sponte, probæ indolis; urinæ copiosæ, concoctæ, in quibus multum subsidebat, profluxere; sitis desuit. Octavo motus ad alvum intermisit; mens emota. Undecimo conturbata iterum alvo, febre liberatus, atque omnino judicatione absolutus. Huic cum primum conturbari visa fuit alvus, multus ex utraque nare sanguis erupit.

XXIII. Profecto quoque ab hac febre, fatis ope, vel Medici, evasere (haud paucos autem evasisse memini,) hosce utique omnes sponte oborta ventris turbatio, eaque critice ad perfectam usque judicationem recurrens, integre absolvit. Sane neminem, quod sancte profiteor, e vivis sublatum vidi, quotquot is sponte evenit ad alvum motus, cui copiosa plerumque sanguinis e naribus, quandoque etiam ab hæmorrhoidalium venarum oculis effusio præludebat. Sudores, tum cæteræ quæque evacuationes, vel per urinam, vel per alias vias, per quas natura crises suas moliri solet, vel suppressæ penitus, vel irritæ plerumque aderant, ac nihil decernentes; saltem vix quidquam sperandum ab iis, quodve mirere magis, sub ipsam peticularum eruptionem, earumque per totum corporis habitum effusionem, sæpe oborto ad alvum motu, haud paucos, quos prolixum nimis foret referre, ex insperato, velut ab Orco revocatos vidimus, ac restitutos; Quod jam tum antea dæsevientibus superiori æstate, Autumnoque variolis observare contigit haud exiguo ægrorum numero, assidua sponte oborta diarrhœa, mox ab ipso variolarum exortu, aut incremento præter spem servato.

XXIV. Noxia ut plurimum venæ sectio aderat, tum cætera quæque instituta remedia, si modo illa excipias, quæ collabentibus tuendis viribus, ne ve sanguinis compages penitus dissiliret, inque pejus rueret, opportune occurrebant, cardiaca nempe grata aciditate præstantia, aut acidis confociata. Neque calidiora quæque quidquam præstabant, nisi forsan hoc pacto *camino oleum*, ut fertur, addere; Fræno nanque magis, quam stimulo egebant humores jam ad orgasmum proni, ac nescii stare loco. Cunctando potius restituenda erat res, quam velis, & remis occurrendo. Ad humorum impetum compescendum egregie etiam præstitit Peruvianus Cortex opportune adhibitus. Ejus enim præsidio plures vel integre sunt restituti, vel si forte nonnulli recidivas passi sunt, paulo post convalescere. Cæterum æque ac V. S. minus prospere cessere vesicantia, ut quæ sanguini ad fluorem apto habenas potius mitterent, quam coercerent.

XXV. Quod si ante quartum diem materies turgeret, primæque viæ, ut ajunt, cruditatibus, ac inquinamentis scaterent, Emetico prudenter administrato, ut blanda purgatione tempestive instituta, neque non solum ullam unquam noxam exinde profectam memini, sed felicius inde educita humorum saburra in stomacho contenta, exanthemata apparere, collapsas vires restituere, naturam denique ipsam ad perficiendum opus suum pro massæ sanguineæ a pravo miasmate expurgatione aptiorem consurgere, validioremque effici, ac veluti ab interitu revocari, observavi.

XXVI. Equidem cum primum suboriri cœperant hæ mali moris febres; purgationes passim per exordia, ut mos est, a Medicis adhibebantur; ipseque ego ab hujusmodi methodo minime abhorrebam, vel ob id maxime, quod ventriculum impuritatibus oneratum, in plerisque noveram, minimeque cunctandum in iis casibus esse sapienter Medicos admoneat (a) Hippocrates in aphorismis. Ubi vero prodire maculæ, totaque illis fœdari cutis videbatur, sacro quodam metu percelli mihi animum, commoveri, perturbari senseram, maximeque extimescere, ne forte retractis ad interna humoribus, omnia in pejus quam celerrime ruerent. Cum autem nihil inde noxæ proficisci, quinimmo mitiora quæque evadere animadvertim, turbatoque leniter plerisque ventre haud paucos hoc more servatos observaverim, secus ac illos, quibus, aut in principio neglectum fuerat, aut parum salutare creditum hujusmodi auxilium, cunctis dein, modo tempestive, ac bono fato accersitus fuerim, blandam purgationem, aut etiam robustioribus leve emeticum præscripsi, læto per sæpe eventu; Cardiacis namque remediis, quibus oppugnanda aderat febris, tum Peruviano Cortici, si forte hunc etiam in subsidium acciri opus erat, referabantur fores, licebatque iis sanguineam massam minime deturpata facie subire.

XXVII. Atque ob hanc forte causam celebriores Practici suspecta conclamant alexipharmaca per initia febrium malignarum, nisi exonerato ab impuritatibus stomacho, primisque viis ab obstructionibus expeditis. Neque is tamen ego sum, qui indiscriminatim purganda esse corpora statim ab initio contendam. Fieri nanque poterit, ut id genus auxilii, quod modo haud paucos revocavit ad vitam, necem alio tempore ægris inferat; quod maxime observandum esse docebat memoratus Hippocrates lib. 1. de morb. n. 1. & 2. *quæ scilicet bono per fortuitum successum Medici ægros curantes faciant*. Sæpe visum est in febribus alvi profluvia noxia fore, mortemque inferre, quæ aliquando salutaria extitisse novimus. Idque est Epidemorum hujusmodi morborum ingenium, ut qua methodo currente anno ægros liberaveris, eadem ipsa anno jam vertente forsitan e medio tolles. Sponte oborta hæmorrhagia plerosque servatos refert (b) Diemerbroech in Peste Neomagensi; Secus hanc olim lethalem experti sunt Tolosates, ac Lugdunenses. Ita scilicet ludunt morbi; Ingens proinde adhibenda cautela est, omnibusque animi nervis contendendum Medico, quo tandem investigato, ac perspecto morbi genio ad eundem perdomandum recto pede, & intrepidus procedat.

XXVIII. Cæterum novum minime est per hujusmodi febrium initia purgationes adhiberi; Id quoque olim proficuum experti sunt Bollonius lib. 1. *Epid.* Septalius *caut. med.* l. 5. n. 47. Manardus Ferrariensis 5. *Epist.* 3. & 13. *Epist.* 1. Victor Trincavellius, Genti-

lis Fulginas, & plerique alii; Morbosam Constitutionem huic nostræ fere similem describit Galenus, in qua ii facile sanati sunt, quibus (c) *præexsiccatum*, sic ille inquit, *præpurgatque corpus fuerit*; quippe quod, ait ille, *evomuerint ex iis nonnulli, & omnibus venter profluxerit*; Atque hinc quidem didicimus sæpe in primis viis latere hostem, qui nisi *protinus* (d) ejiciatur e sede, evellaturque, quod *alienum a natura est*, frustra tentabit Medicus in fine propellere. Forte etiam Subalpinis ob lautiozem victum majoriis necessitas ad est purgandi corpora per acutarum initia ægritudinum, quæ omnes præ cæteris ortum potissimum habent a stomacho. Didicimus insuper exanthemata, ac excretiones quascunque, quæ in principio, vel augmento accidunt, nullas fere esse críticas, vel symptomaticas, cujusmodi hæ fuerunt, nihil sane decernentes, tum periclitantis naturæ præludia, tum plerumque turgentis, morbumque facientis materiæ hinc inde latæ, ac stare nesciæ, certissimum argumentum. Ubi autem in acutis materiam turgere, ac putridorum, aut malorum humorum copiam (si fas est ita dicere, & antiquissima verba usurpare) subesse animadvertimus, eadem die purgandum esse Hippocrates jubet 4. Aphorism. 10. Turgentem vero materiam subesse, virulentam, vagam, ac certam sedem non habentem ex variis, ac vehementibus, quæ suboriuntur, symptomatibus facile colligi, ac dignosci potest; cum scilicet natura a multa, aut prava qualitate affecta, concitata materia, tentat inter initia eam expellere, excretionibus per alvum, per vomitum, per sudores, per urinas, per cutis efflorescentias, &c. Num id turgere materiam docet? Num evacuanda eadem quam citissime, ac statim ab initio? Ne forte, ut (e) laudatus Septalius ait, *ad princeps aliquod membrum repat*, aut ad terminum eum ducantur humores, de quo locutus est Galenus libro adversus Julianum.

XXIX. Nec me quidem latet paradoxam forte nonnullis videri hanc locutionem, qui omni labore exanthemata, ubi semel apparuerint, per fortiora cardiaca magis promovere, aut retrocedentia eadem expellere iterum ac provocare, omnibus nervis contendunt, rati scilicet ita salvari debere patientem, quem virus alias jugularet, quem tamen hæc ipsa nimis operosa methodus promptius eecat. At vulgari hæc opinio est longe ab Hippocratica Schola recedens. Distinguenda nanque sunt quæcunque contingant, excretiones in acutis, num scilicet salutari quadam eveniant crisi, num erroneo potius, ac deleterio naturæ conamine, utque sinere illas, intercipere hæce, aut saltem minime deterreri æquum est. Sic idem ipse Galenus in famosa Historia Simonis, in quo lata exanthemata erant, minime veritus est purgationem aliquando commendare. (f).

XXX. Cum vero invaluerit malum, aut primæ criseos periodus præterlapsa, satius aderat ab omni remediorum genere abstinere; exasperari namque morbum, atque omnia celeriter magis in pejus rueret exinde vidimus, collapsis jam tum viribus, neque amplius vim remedii sustinere apta laborante, ac pene jam deficiente natura: quod si minime amplius prodesse posse novimus, ne saltem remediis noceamus, conclamant omnes, quod & magno, & bono viro dignum inquit Celsus, ne quidquid præcipiamus, quod confirmatam artis auctoritatem malevolentissimorum hominum calumniæ subijcere queat. Neque autem adulto tantum morbo a remediis omnibus abstinere satius fuit, quin id quoque salutare, ac proficuum maxime experti fuerimus, vel in ipso hujusmodi febrium exordio, quæ sola plerumque purgatione, ut subinnuimus, tempestive instituta, felicius cessere, quam repetitis phlebotomiis, purgationibus, aut mille alexipharmacis, quæ pleno gutture, tanquam Deorum munera, receptorum Chorus adeo celebrat, adhibitis. Equidem ut rerum experientia, ita & remediorum defectu Græcorum Medicinam Arabum scholis longe præstantiorem nemo non videt; ii namque a macula illa Græcorum medicina recedentes tantam adeo remediorum farraginem contulerunt, ut iis obrui potius quam ditescere etiamnum videamur. Et vero si illud est, quod maxime cavendum Oratori, & prævidendum putat Antonius apud Marcum Tullium, quodque eum sollicitare summe solet, non tam ut pro sit causis elaborare solere, quam ut ne quid ob sit: non quin enitendum sit in utroque, sed quod multo turpius est Oratori, nocuisse videri causæ, quam non profuisse: id profecto longe æquissimum in salutis causa, atque ubi præsertim de humano corio luditur, videri debet, in qua vel levis offensio non sine magno corporis dispendio suscipi potest.

XXXI. Atque his quidem artibus Sapienti Viro mihi amicissimo, juxta sacram Divæ Virginis Consolatricis ædem decumbenti, graviter hujusce profapiæ febre, exeunte Februario ægrotanti operi tuli. Is præstanti corpore, atque animo, ac veluti ad Polycleti statuam compositus, simplici tertiana paulo post æquinoctium autumnale superioris anni ad aliquot dies laboraverat. Rediit illa hyeme, aut saltem illius indolem, ac genium primo intuitu referebat, quod horrore, ac frigore suas quasque accessiones metiri consueveret; Atqui post septimum diem ingravescens magis, atque ex simplici duplex continua evadens, quid revera insensum, ac exitiale præludebat. Urinæ tenues aderant, conatus vomendi inanes, pulsus durus, intermittens, diffusæ ubique maculæ, vixque conspicuæ ad cutem, sub Solis occasum omnino delitescentes. Decimo quarto mitescere visa omnia; dejectiones ex alvo copiosæ, frequentes, spontaneæ, pulsus æquior, urinæ magis coloratæ. Decimo septimo, ac decimo octavo recruduit iterum febris, intermisso ad alvum motu Præcordiorum contentio ad umbilicum utrinque promissa: ipse animo vacillans, vix bene sui compos, pervigil, sub vespere delirans. Decimo nono minus lugubris scena; multa ex alvo proba demisit sponte; dormivit. Vigesimo quarto ingravescere iterum visa febris; Genarum rubor, lingua exarescens, respiratio difficilis, pulsus intermittens, urinæ subrubræ, turbulentiæ, quæ nec deposita subsederunt. Abdomen inflatum, ac summe tensum. Irritata clystere alvus nihil deiecit. Vigesimo septimo multa rursus ab alvo secesserunt una cum concreto sanguine, faculento, nigro; mitius se habuit. Vigesimo octavo, vigesimo nono, trigesimo primo idem obortus ad alvum motus,

(a) 4. Aphor. 10.
(b) Lib. 1. de Peste.

(c) 5. *Mech. Med. cap.* 12.
(d) 4. *de tuenda valet.* 4.
(e) *Sept. Animadvers. Medic. lib.* 5. *num.* 47.
(f) 2. *de morbis vulgaribus* 6.

tus, assidue perseveravit ad quadragesimum usque, cui tandem perfecta judicatio successit. Mirum sane, ut tantam adeo concreti, ac nigerrimi sanguinis quantitatem dejecerit, quæ singulis fere diebus ubi deicere primum ex alvo sanguinem cœpit, ad geminas fere circiter libras accedebat. Hæc illa erat turgens materia, quæ cum nondum ad excretionem comparata foret, ubique errans, ac impetum faciens sæva illa symptomata induxit, quæ in toto hujusce morbi decursu illuxerunt. Hæc illa inquam est, quæ præpurcato statim ab initio corpore, magnam in partem imminuta fuit; unde remissa semel impetus continuitate, recreandis viribus spatium dedit, quæ & pluribus præliis redintegrata, & plurium dierum decretoriorum opportunitatibus, ceu firmissimis stationibus collocatis, auctæ, aliqui animosum hostem matura cunctatione fregerunt. Ecquid autem agendum Medico erat, præterquam vires tueri, cum strenue congrementem naturam passim erigere, quo tandem novo velut delectu habito par illa foret, constitutis, ac velut destinatis ad conflictum diebus, quidquid infensum sibi erat suis e finibus amovere, expellere, eliminare. Ex quibus omnibus efficitur, in inveterascentibus morbis excitata ad judicationem natura, internisum esse, & quodammodo interruptum, minime quidem continuum solutionum impetum; id quod luculentissimis verbis docet toties laudatus Galenus cap. 5. lib. 2. de dieb. decret. Cæterum haud paucis in hac febrili incurfione una cum sponte oborto ad alvum motu multum sanguinis ex hæmorrhoidalibus vasis profluxisse, jam fere inclinatis rebus, ac pene conclamatis adverti, atque eorum neminem interiisse.

XXXII. Nunc de vesicantibus, quorum applicatio minus profpera comperta est, pauca manent attingenda. Sane in febribus malignis, ac pestilentibus, in quibus sanguis ad coagulationem contendit, nihil iis præstantius, nihil aptius itidem, aut proficuum magis. Ast ubi humores ad fluorem proni sunt, ubi aciores iidem, ac effrares, ubi sufflaminandus potius quam stimulantus cruor est, nihil iis noxium magis, nihil magis perniciosum. Id olim quoque in Epidemica sui temporis constitutione recte adnotaverat P. a Castro, Vir insignis; ego mehercle multos absque iis perfecte liberatos vidi.

XXXIII. Ex adverso egregiam ægrotantibus opem tulit Corticis Peruviani usus debito tempore, ac arte institutus. Is enim humorum massam coercere, excitatumque in sanguine orgasmum, nea, ac doctissimorum Virorum, inter quos clarissimus Ramazzinus dignus utique est recenseri, mea inquam, ac aliorum, quos ego summo opere veneror, sententia sistere, ac cohibere par est, quod unum maxime expetebatur in illa rerum caligine. Equidem quidque de hoc exotico antifebrili, tum de cæteris celebrioribus specificis, quæ huc usque in usum medicum advecta sunt, scripserint magni nominis Viri, præstat adhuc plura admirari magis, quam intelligere; saltem de iis nihil hæcenus perspicuum, quodque animum veritatis avidum expleat, allatum est. Si quid vero unquam lucis sperandum, totum lubet ab eventu ediscere. Ab hoc juvat famosi hujus apyretici, aut cujuscunque specifici naturam, ac vires expendere, metiri, decernere; Hoc dignum Philosopho, hoc dignum Medico Viro institutum; minime vero ratiunculas ad libidinem comparatas, & ipsius imaginationis ludibria effingere. Hinc culpam ab uno, laudari ab altero, modo probrosis titulis, modo magnificentissime vocari passim novimus celebre istud febrifugum. Neque enim tanta adeo opinionum inter se dissensio proficisci aliunde potest, quam quod secus, ac revera attingi debent res, eadem plerumque expendantur, minus forte aqua ingenii statice, aut mente præjudiciis occupatissima. Ego quidem hujusce, quod adeo apud nos invaluit præsidii efficaciam utique veneror, ac si superis placet, ad Astra feram. Ast illud ceu Panaceam a Cælo delapsam omnibus remediis præferre, atque in omnibus febribus indiscriminatim exhibere, haud parum tutam rem esse judico, nec medentibus decoram; æque ac si quis Opium, quod mirabile, ac magnum est sedativum, sine ullo forte delectu in omnibus morbis, ubi compescere opus est, adhiberet. Nec vero semper ubi fræno humores egent, Cortice coercendos puto; sæpe enim plus periculi timendum est a subito, & intempestivo sufflamine, quam non erat antea. Quamobrem in Corticis exhibitione respiciendum est ad id quod intus molitur natura; humorum status expendendus, num ad fixitatem scilicet, num ad fluorem contendant. Quid cavendum denique, quid experiendum; vivida mentis acie examinandum. Est quid *divinum* in remediorum usu, ut quid (a) *divinum* etiam in morbis inesse prodidit Divinus senex. Atque id quidem ab eorum majori, vel minori efficacia, aut ab secreto, ac pene inexplicabili eorum quorundam agendi modo minime petendum est, sed ab eorum administrationis more, quod caput est maximum, & administrationis tempore; ad quæ duo potissimum capita cautiones Medicæ referendæ sunt. Sapienti pauca.

XXXIV. Ego sane quidquid boni ab hoc præsidio in hac febrili scena ægrotantibus accessisse comperi; id totum illius, qua pollet, ethicacæ, figendi humores, eosque aut a se invicem dissilientes, aut coherentes minus cogendi una simul, cohibendique tribuendum puto. Hinc sane aliquando minus ex asse voto respondisse Corticem auditum est in quibusdam febribus, quod forte humores minime ad liquationem vergerent, ejusque diathesis essent ii, quæ stimulari potius egeret, quam coerceri. Quinquam autem potestatem fluida quæque in nostris corporibus figendi, cogendique habere pro re certa suppono. I. Quod motum sanguinis, & spirituum compescat, & alvum ipsam densiorem, obstipatioremque reddat; compertum namque est iis, qui ad plures dies hoc remedio usi fuerint, ventrem adstringi, ut clysteribus indigeant. II. Stiptica fere gustu, ac moderate subastringens deprehenditur, ut pater. III. Si quas illa febres fugaverit, hæc spiritus salis armoniaci, qui summe potens est humores coactos laceffere, & ad motum, ciere prompte revocamus. Atque ob hac utique causam haud auspiciato cessisse nonnullis Peruvianum corticem olim scio, & funestos casus memorari. Vratislaviensibus in constitutione quadam anni 1699. valde funestum illius usum ferunt Acta Eruditorum anni 1701. (b) quod scilicet infarcta crassissimis humoribus corpora, in frigida illa, & humida prægressa temporum habitudine, remedia expeterent, quæ segnius labentia fluida urgerent potius, quam figerent, aut saltem obortam febrem, quæ for-

te auspiciato contigerat, haud ita cito fugarent. Sæpe non modo utilis res febris est, sed & hanc profuit accendere. Fortasse enim, ut Celsus ait, *curationi opportunior fiet, ut humidioribus agris ignis.*

Sive illis omne per ignem excoquitur vitium, atque exsudat inutilis humor.

Secus res tamen evenit aliquando; Nosque id ipsum salutare experti nuper sumus, ac vere proficuum, quod noxam olim forte, ac detrimentum attulit. Juvat hinc adnotare quantum profutura medentibus sit, quantum artis decori, ægris vero salutis, ac emolumento futura exacta temporum cognitio. Sicuti enim apud Agricolas, *annus est, non terra, quæ fructificat*, ita & nos per sæpe videmus, ac fere acu tangere fas est, non a particulari corporum dispositione, sed ab anni temporumve constitutionibus diversos passim morbos exoriri, quos sæpe prodest diverso modo subigere.

XXXV. Cum vero ab eventu res nobis expendendæ sint, præstat nunc hujusce corticis usum, quem auspiciato nobis cessisse novimus, maxime commendare iis, quibus opus est, aut concitatum orgasmum coercere, aut effraem impetum sistere, aut tendentes ad liquationem humores figere; quo saltem, aut remissa impetus continuitate, aut coercito orgasmo, aut humoribus, ne a se invicem penitus dissilirent, interceptis, aut si qua forte excandesceret nimis, mitigata febris, redintegrata, auctæque viribus natura vincere queat, ac superare hostem. Neque exigua certe res est specificum habere, (liceat mihi eo nomine exoticum istud febrifugum vocare) huic præstanda muneri aptum. Cæterum quidquid de hujus usu in morbis asseri unquam poterit, aut excogitari, id lucis quidpiam utique, at parum certe, asseret, *Vincet enim semper latendi natura*, ut olim de Nili origine aiebat Lucanus.

XXXVI. Modo superest de sanguinis missione pauca effari. Profecto nunquam non noxia in hujusmodi febribus comperta hæc est; ab ea namque atteri magis, ac deficere vires, quod unum præ cæteris magis funestum, ac certissimum impendentis jacturæ prælagium observatum fuit, deici animum, perfrigerari extréma; inque summum discrimen adduci ægros frequenti observatione adnotavimus. Quod mirari utique subest, tum maxime quod nullum aptius, nullum idem in hisce Regionibus (quod sancte testari possum) tutius expertum præsidium sit, quam venæ sectio, sive ob Cæli hujusce nativas qualitates, sive ob Subalpinorum temperamenta huic climati, ac Cælo congrua. In hac autem Epidemica constitutione totum mutatum ab illo criorem augurari licebat, & ad fluorem pronom magis, tum ob fervidissimam temporum præcedentium indolem, tum ob exlegem, Austrinam, consuetumque morem minime observantem hyemem; ac proinde nil mirum improspere cessisse venæ sectionem, quinimmo ab illa cane pejus, & angue abstinendum, etiam si, ut aurea Hippocratis adest sententia, qui in haud ab simili anni constitutione sanguinis missionem (c) valde quoque improbat, *morbis magnis sit, vigenisque ætate homo*, nec scilicet major fibrarum cruoris dimotio contingeret, a qua non nisi extrema quæque discrimina expectanda sunt.

XXXVII. Ne vero id gratis, aut dictatorie me pronunciaffe quis credat, decet paulo altius hujusce depravatæ sanguinis diathesis, ejusque ad fluorem potius ad concretionem tendentiæ originem, ac causas inquirere, quæ & eadem hujusmodi febrium, eisque affinium affectionum, quæ per ea tempora defæviebant, origo extitit, ac incrementum. Ac primo effingere lubet animo quidquid dissolvere, aut coagulare par est, illud idem agens quoddam esse valde potens, quod prout vel ad acidum, vel ad acre magis accedit, coagulare, aut dissolvere aptum est, potestatemque induit obvia quæque fluida, aut ad concretionem, aut ad colligationem inducendi. Hæc duo insuper diversa principia perpetuo nostris corporibus inesse fateamur, atqui ita simul æquilibrata, ac æqua invicem proportionem instituta, ut quo usque in mutua vicissim actione permanent, nec ab externo quopiam agente alterutrum ad motum urgetur, nulla exinde incommoda corporibus inferant, quinimmo tutam, ac firmam servant cruoris massam, tum Vestalis Ignis nativos lares, & focum. Ubi vero a principio quodam extrinseco eorum alterum supra alterum efferri, ac dominatum acquirere contingit; tum obrutam penitus fluidorum massam cernere est, institutas æquilibrii leges minime servari amplius, ad lentorem inde aut ad fluorem liquida vergere: prout acidum illud est, aut acre, quo prædominatur, & vim suam exerit, supra cætera principia elementaria evectum agens. Hinc patet quam diverso telorum ictu, ac diversis pene dixerim artibus occurrendum sit, ubi scilicet aut unum, aut alterum horum præpollat sanguinis diathesin immutare aptum, ac diversos proinde effectus inducere.

XXXVIII. Illud autem externum agens, quod intus latentem, ac veluti coercitum ignem laceffere, ac excitare par est, ab iis, quæ nos ambiunt, aut nobis imminet rebus, petendum esse extra omnem controversiæ aleam positum est; nec aliunde quidem profluere posse videbatur, quam ab aere nobis circumfluo, cui quandoque accedunt, atque ad excitandos populares morbos in unum conveniunt modo corruptæ, ac stagnantes aquæ, modo alimenta mali succi, & pleraque alia. Potissima vero, ut incolumitatis, ac salubritatis, ita morborum communis causa aer est, vel rarefactus nimis, vel condensatus, tum particulis heterogeneis, extraneis, ac humanæ naturæ incongruis dives. Hæc nanque sunt, quæ in rarefacto aëre, magis, aut minus exaltatæ, inque vitæ hospitia exceptæ vitiatam in fluidis diathesin inducere queunt, a qua diversa morborum proles enascitur.

XXXIX. Neque autem de aere loquens, eum criminis reum esse contendo; At qui una cum illo miscentur, extraneos, tum exoticos sales, hosce ego alterationum omnium, quæ ab aere profluunt, morborumque parentes agnosco. Aer namque elementum incorruptibile est, ac reliqua elementa, tum aqua potissimum conservandæ, ac tuendæ hominum incolumitati illo haud minus necessaria, ac opportuna. Si quam vero alterationem aer concipit aliquando, hanc utique ab extraneis corporibus, tum heterogeneis particulis, quæ una cum illo commiscuntur, excipit iisque inspicitur, satis aptus idem easdem a se remove, atque protrudere, cum nullo obvium sibi obicem offendit, quo minus illas a se expellere po-

(a) 2. Progn.

(b) pag. 523. mensis Novembris.

(c) l. 4. de rat. victus t. 19.

potens sit. Ut stagnantium, & putrescentium lympharum in limpidum quempiam amnem irruptio fluminis aquas confundit, ac turbidas reddit, atqui hæc ad pristinam iterum puritatem redeunt perenni aquarum gurgite uberi alveo assidue decurrentium: Sic aer quandoque ab exoticis ventorum afflatu elatis salibus inquinatus, novo irruente vento iisdem liberatur, ac purus redit; neque enim etsi aliquando majori cum energia iisdem agant; diu perdurare queunt, quin aut sensim fatiscant, aut tandem integrè abeant, ac dissipentur.

XI. Quæ quidem satis superque evincunt, cur infensos nobis experiamur Boream, & Austrum, atque iis potissimum, quæ hisce præter morem perflantibus, suboriuntur, ægritudinibus obnoxii sint Subalpini Incolæ. Enim vero cum nitrosi, acidique exotici sales a Boreali plaga, secus vero lixiviales, ac urinosi ab Australibus oris continuo profluant; atque hinc perflantes venti libere per universum Agrum Pedemontanum discurrant, nullo, ut innuimus, saltem exiguo, quæ sævit Auster, interjecto obice, qui effrænem eorum motum, ac viam compescat; conjicere quisquis potest, quam facili negotio irruentes venti extraneos hujusmodi sales ad nos vehant, iisdemque corpora inficiantur, eo quidem magis, quo diutius perdurant ejusmodi venti, aut alterius sibi oppositi silentio, eos a se protrudere aer minime par est, ac remove. Si quis interim modum scire cupit, quo aer extraneis, atque humanæ naturæ infensis particulis imbutur, & quomodo is interdum per ventos huc, illucque transferatur; plene id habebit a Fr. de le Boe Sylvio.

XLII. Ut vero a nitrosi salibus, quos subacidos esse contendimus, morbos omnes oriri novimus ab humorum fixitate, ac lentore progenitos, utpote quod fluida quæque cogi ab acidorum præsentia, atque intercipi conspicuum est; ita ab lixivialibus, ac urinosi particulis, ab Austro delatis eas potissimum affectiones, ac funestas passim ægritudines enasci experimur, quæ ab humorum colligatione, ac fluore dependent. Ut enim figendi acida, sic dissolvendi facultatem acria, ac lixivialia præbent. Sic nunquam hiscere audientibus aquilonaribus ventis tum superiori anno, tum labente hyeme, qui Australium assidue perflantium ventorum vim frangerent, aut eorum saltem sævitiam compescerent; Nil mirum, ut hi acria corpuscula summe infensa vehentes secum, sævissimas illas febres induxerint, quæ se se novo oriente anno prodiderunt.

XLIII. Hinc enim e salibus acribus præter morem elatis, stimuli que vicem agentibus commoveri sanguinis massa, turbata illa, accendi febris, mox sæva quæque symptomata ludere visa sunt, naturalis humorum textura dissolvi, ejus vincula discindi, diffuere feroræ moleculæ, rutilæ, ac gelatinosæ, a se invicem secedere celerimo, præcipitque tramite, ni quam primum, antequam totum illico sanguinem pervadat, fermentum illud acre, irritans, hærens, evellatur, ejus vis, ac sævities maxima infringatur, demulceantur spicula, imminens, aut jam ortus orgasmus coerceatur, temperetur impetus, præbeaturque tantundem natura spatium, quo inire illa pugnam queat, animosè congredi, materiam morbi subigere, solvere, movere, secernere, excernere, vere illa morborum medicatrix, utque Hippocrates ait, *docta sine magistro*. (a)

XLIV. Quæ si quis omnia attente perspicier, conjiciet equidem, ac facili negotio concipiet, quæ fuerit horum malorum exordia: tum rationem, cur utilis extiterit acidorum usus? cur temperantia, nimium horum impetum infringentia, modice figentia, stiptica opportune adhibita, utilia eadem, ac tuta? cur auspiciata minus, funesta, nunquam non noxia venæ sectio, ac vesicantia? cur turgent materia voto ex asse respondens purgatio primis diebus, ab initio statim instituta: cur excretiones per alvum, per vomitum, per macularum diffusionem ad habitum corporis in principio morbi lethales? cur exeunte ad judicationem morbo motus ad alvum, aut hæmorrhagia superveniens bonum? cur prostrata initio vires, languidiores eadem, ac pene emortuæ? quæ ratio symptomatum omnium, quæ sese exordio, incremento, ac statu febris prodidere? Insuetus, ac minus frequens Subalpinis, secus ac Boreas, Auster est; neque enim sævissimo adeo flamine illum desævuisse unquam, ut hisce temporibus diu compertum est, hinc forte ea, quæ profuisse olim didicimus, nocuisse nuper, ac funesta deprehendimus. In universum vero Austrum maxime, atqui illi affines ventos male passim audiri novimus, quinimmo, quod forte peculiari quarundam regionum temperamento tribuendum est, harum nonnullas is quam immanissime verberare solet.

XLV. Cur autem nitrosæ ab Aquilone particulæ, lixiviales, ac summe acres ab Austro ferantur, nimis prolixa res foret attingere; Neque id ad institutum nostrum profecto attinet. Equidem nullum ventum per se singulari, & specifica virtute, ac qualitate pollere, nisi quæ a loci, unde oritur, natura, nec non mediis, per quod transit, indole derivanda sit, pro re certa habeo. Ex quacumque enim parte nivibus obstita, sive ad Austrum, sive ad Septentrionem, Orientem, vel Occidentem posita illa sit, frigidus perflantes ventos experimur, secus ac illos, qui paludes, terrasque stagnantibus aquis perfusas transeunt, aut qui per arenosa deserta; æstu Solis adusta loca perspirant. Cum vero Boreas ex terris gelu constrictissimis, & a Sole remotis assiduo flamine spiret, & mare glaciale, ac altissimos montes perpetua glacie; nivibusque obstitis pervadat; Tum ex adverso Auster ex percalidis, & arenosis Africæ locis veniat, Zonamque torridam, nec non Mare Mediterraneum percurrat; Facile hinc addiscere est, exoticas ab utroque, ac summe infensas particulas ad nos advehi, nitrosas quidem ab Aquilone; volatiles, acioresque ab Austro. Norunt id plane, qui hisce magis obnoxii sunt, quam graves iis, sævosque morbos inferat tam frigoris Promocondus Aquilo, tum plumbeus Auster. Quod enim juxta diversæ Epidemicorum morborum habitudines experimur, qui pro diversa temporum conditione, diversis telorum ictibus oppugnantur; præclarum id nobis documentum præbet, cur quæ Septentrionis magis subiecta loca sunt, aut e contra, aut quæ Borealibus ventis magis infestantur, vel Australibus, peculiaribus illa morbis, ac unicuique regioni propriis divexantur magis; quæve e. g. profunt Anglis, eadem forte Romanis noceant remedia, ni forte toto mutato Cælo, nova ingruat morborum proles novo, ac diverso more oppugnanda; adeo verum est illud Celsi (a) *differre pro natura locorum*; addam ego & temporum, *genera medicinarum, & aliud opus esse Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia*; aliud insuper sæviente Austro,

aliud flante Borea, aliud Euro. Cur vero Austrina hujusmodi constitutio diu adeo, ac præter consuetudinem desævierit, neque hiscere unquam auferint Aquilonares venti, qui eorundem sævitiam infringerent, quæsitæ quidam mihi est ratio, num vero reperta fuerit, *mihi hæret aqua*, ut dici consuevit.

XLVI. Austrinos ergo flatus, seu præcipuos in hac Tragedia Austores culpæ licet, qui in massam sanguineam tales invexerint dispositiones, ut ad excitandam hanc malignam febrem satis virium habuerint, silentibus ut plurimum Borealibus ventis, qui nubila detergeant, & aeris impuritates eo repellerent, unde decesserant, ad Australes scilicet plagas, ex quibus omne malum ad nos profectum suspicari fas est. Nihil magis ac pene momento temporis aeris statum immutare posse, quam flantem Austrum, ut ex ponderoso levior reddatur, jam dudum novimus, docente Barometro. Quod denique præcipua hujusmodi mali moris febrium ratio ab Austrinis flatibus petenda sit, hinc conjectari licet, quod ea salubriter degerent loca, ac veluti in portu aliorum spectarent naufragium quæ obverso multorum collium dorso protecta sævientes flatus eludebant, dum in hac Urbe, ac toto fere circumjecto agro exarata febres grassarentur, ac desævirent.

XLVII. Sed quæ jam innuimus enucleatius repetamus, & clarius. Austrina hyems, quæ pluvioso Autumno successerat, exaratis febribus occasionem præbuit, exoticis, acribus, ac heterogeneis particulis una cum inspirato aere cruore admixtis, quarum præsentia, & miscela, cæci toridem sævientibus stimulis aciores moleculæ extricatae magis, suique juris factæ totam invertere humoralis massæ texturam, ejusque vincula tandem discindere ausæ sunt. Equidem liquida ad fluorem potius, quam ad concretionem prona fuisse præter alia multa, quæ talem adfuisse sanguineæ massæ dispositionem attestabantur, id ipsum conjectari fas erat a manifestis notis, quas eductus e secta vena sanguis præferebat, semper enim roseus, ac purpureus, nihilque glutinosi præferens mihi, aliisque Professoribus apparuit, ac toto Cælo diversus ab eo, qui solet educi in quibusdam morbis, ut Pleuritide, Peripneumonia, aliisque affectibus interdum popularibus, in quibus manifesta lentoris vestigia cernere est. Quod ad exanthemata attinet, hæc etsi plausibilis quidem ratiocinio Villisius, aliique coagulationis potius, quam fusionis humorum præludia esse contendunt ob fixiores sanguinis particulas venarum extremitatibus hærentes; vero similiter magis crediderim, a fibris illa sanguinis dissolutis, eque sua statione dimotis ob sal acre illud, & volatile sanguinem ad florem disponens, ortum ducere, quo pacto similiter effusus ab arteriarum osculis cruor tenuiores sui partes dimittit, quæ hinc inde diffugientes, ac profugæ sui forte erroris moras in cute designant.

XLVIII. Hæc per hyemem gesta. Veris initio Cælum votis communibus respondit moderatis imbris delapsis, quos novam lætamque faciem perclitantes rebus allatuos augurari fas erat, si qui tota pene hyeme hiscere nunquam auferat, sævus Aquilo, silentibus tandem per intervalla Austris, erumpere tunc minime visus foret, insuetumque frigus media inter primordia Veris inducere. Huic quandoque Occidentales Venti mitiore statu adspirantes succedebant, recurrentibus mox Austris iterum, tanta adeo varietate rerum, ut sæpe unius diei spatio, æstatis, hyemis, veris, atque autumnus vices contingerent, modo sereno, pacatoque Cælo, modo turbido, nubilo, pluvioso. Curiosum aderat Mercurii errores in Barometro adnotare, qui elatus modo, mox humilis, cen nescius stare loco, incertas temporum, aerisque vices prodebat. Numquam adeo tam infida, ac sibi invicem adversa diu visa aderant tempora quæve tam longe ab instituto more deflecerent.

XLIX. Nova hinc diræ indolis acutorum morborum proles sporadice desævientibus caput extulit, ac præcipue spasmodicarum ægritudinum, quibus gliscentibus diuturniores ejusmodi aliæ se se prodere ausæ sunt. Inter cæteros vero quam immanissime cruciabantur Podagricorum cohors, tum qui Nephriticis, Scorbaticis, aliisque id genus affectionibus obnoxii passim aderant. Nec hystericae quidem mulieres immunes visæ; hæc siquidem spasmodicis cruciatibus dirum in modum ac diu magis, quam unquam consueverant, vexatæ sunt. Apoplecticos quoque plures, quam unquam contigit, enumeravimus, conspirantibus una simul hemicraniis, vertiginosis affectibus, aliisque hisce affinis, aut consanguineis. Notatu dignum est, vix quempiam ab acuta ægritudine omnino evasisse, quin in diuturniorem, ac inveterascentem morbum incideret, vestalem novi in Monasterio del Crocifisso degentem acuta febri paulo post æquinoctium ægotantem, quæ superata tandem febri pertinacissimo capitis dolore divexari cœpit, quo & adhuc (dum hæc ego scribo) illa sævissime plectitur. Ipsa superiori solstitio variolis correpta fuerat, quæ tunc temporis longe lateque sæviebant.

XLX. Hisce vigentibus intercurrentibus morbis febrium malignarum sævities remitti quidem, atqui hæc iterum, velut auctæ viribus statim fere recrudescere visæ, ac magis, magisque debacchari, quibus plures per ea tempora satis defuncti sunt. Tum præcipue cum aut diuturnis illæ affectionibus succedebant, aut gravioribus aliis stipatæ irascebantur, initio simul fœdere, quo truculentiores evaderent. Harum unum, atque alterum exemplum lubet recensere. Pia mulier tertio febris insultu, spasmodico pectoris affectu correpta, quarto obiit. Sacerdos sanioris pectus toto corpore diu scatens, quæ statis temporibus magis, aut minus desæviebant, cum amico cuidam sibi obvio occurreret, fallente pedum vestigio, in terram incidit: mox obscurari lumina, sanguis ex utraque nare profluere, ipse veluti oborto rigore contremiscere visus est. Postridie mitiora omnia evasere. Nec ipse lecto sese attingi passus est, amicorum consilia, ac preces eludens. Undecimo febris acuta supervenit caligantibus oculis, deficiente voce, vix mente compos. Latæ maculæ densissimis examinibus totam cutim fœdebant; Urinæ rubræ, per initia tenues, nihil subsidentes. Decimo nono, ingenti oborto sopore, expiravit. Sexto cranio pia mater cum vasis solito tumidioribus se nobis præbuit, tum sinistri Hemispherii anfractus diloricati invicem, ac dimoti; Multum in utroque ventriculo serum: Sinus majores, choroideæ plexus, tum cætera quæque sanguinea vasa copioso dilutoque sanguine tumentia; Diffusæ ad cutim maculæ latiores in cadavere apparebant. Dubium adeo, num a lapsu potius, num vero maligna oborta febri decesserit; an utroque, junctis una viribus, quo citius ægrum perimerent. Frequentiores iis temporibus ephemeras febres, quam intermittentes, observavi.

(a) 5. in 6. Epid.

(b) pag. 3. in Proæmis.

L. Labet hinc conicere magis, ut quæ toties dicta sunt, iterum, repetam, quæ fuerit Austri sævientis indoles, quæve sit Austri vigente constitutione temporum, metuenda morborum proles? Quod si & ultro pergere quis velit, expiscari fas quoque foret, & magnorum virorum more magnam rerum fiduciam habentium decernere, quid ex adversa, si quæ contigerit forte, constitutione, annique habitudine prænunciandum? Profecto si rem paulo accuratius perpendamus, quilibet Annus semper aliquos affectus secum una infert, qui revera quid Epidemicum redolent, quos, etsi leves aliquando, ac tenuioris momenti, haud ita facile tamen curari cernimus, quin prius a vulgari methodo discedamus, eaque iis præsidia adhibeantur, quæ, expenso ingruentium affectuum genio, profutura magis conicimus. Labet hiuc etiam ediscere morborum quorundam genesin, qui sporadice passim, nulloque non tempore, quo Epidemici sæviunt, contingunt. Hosce quidem feliciter aliquando cedere novi, eadem methodo, ac iisdem fere remediis, quorum olim eluserant illi vim. Id mihi haud ita pridem adnotandum, cum forte fortuna quidpiam de epidemicorum affectuum indole, a quorum utique studio, ac inquisitione nullum confiteor ætatis meæ tempus abhorruisse, ab illo sciscitarer, ac expendendum maxime Author adfuit, ac Præceptor idem, Ornatissimus vir, de Medica omni, tum litteraria re meritis Joannes Fantonus, Regii Subalpinorum Principis a cubiculo Medicus, ac Primarius in Taurinensi Archigymnasio Theoricæ Medicinæ Antecessor. Recte scilicet perpendenda est annorum constitutio, aut ex illa, tanquam ex fonte, genuinum cuiusque morbi genium repetere, tum æquam illi curationem adhibere valeamus.

LI. Equidem ephemeris modo dictas febres, tum spasmodicos affectus, qui ea tempestate percrudebant, ad principem affectum reduci posse unaque omnes ab eodem anne ortum ducere satis dilucide innotescit. Atque id quidem recte norit, qui quotquot in sanguine ex doctissimi Gulielmini calculo subeunt variæ, ac diversæ combinationes, quas fere sexcentas olim recensuit Hippocrates, animo expendit.

LII. Utque ab ephemeris febribus exordiar aliquando; Hasce quidem ab intermittentibus, nec genio tantum, sed re, ac origine toto Cælo differre neminem latet, si quis utriusque indolem, ac genesin attente adnotaverit. Acidi mineram, quam nemo in ephemeris febri culpaverit unquam, seu pituitam præter modum viscidam, cui acidum fermentum magis, vel minus irretitum hæret, intermittenti febri præcludere, vel stabulantem in stomacho, ut placet (a) Emmulero, vel ductus laterales Pancreatis obstruentem, ut (b) statuit Sylvius, communis Medicorum sententia est. Quæ quidem pituita, seu materies, in venas effusa, & partibus spirituosius sanguinis permixta potis est, tot excitare turbas, & febrilem, (c) ut aiebat Carrelius, tempestatem ciere. Quidquid scilicet ad acidam discrasiam humores disponere par est, id intermittentibus febribus incunabula, ac focus præbet. Quod quam longe ab Ephemeræ genio, ac more discedat, conspicuum est. Hæc namque continuarum simplicissima, quam habet accensionis febrilis causam, hanc minime extra vasa hospitantem habet, æst intine in universa liquidorum massa ludentem. Simplex, ac levissima molecularum sanguinis commotio ephemeram febrem inducere apta est, quæ brevi compescitur. Nec ineptum omnino proinde foret conicere, quas Auster diu sæviens attulerat acriores, volatilioresque particulas, sin minus universam humorum massam in robustioribus corporibus inficere, saltem turbare illam exoticorum salium miscelam potuisse, obstatque ephemeris febres inducere. Cur vero Peruvianus Cortex, quem ego superius salutarem extitisse in iis febribus, quæ in hac exarata constitutione suboriebantur, adnotaveram, ob figendi illius, cogendique facultatem; cur idem ipse cortex in intermittentibus, quarum quidem indolem ex prædominio acidæ minere deduximus, cuius vis est cogere quidquid, ac figere; cur inquam in intermittentibus idem proficius experiatur, tutissimumque præsidium passim audiat, atque ajunt specificum Antipyreticum magnis adeo laudibus decantatum? Res nimis operosa foret decernere. Num ludere remedia, ut morbi, dixerim? Num me potius inanes conjecturas effingentem quis arguet?

LIII. Opus hic esset exotici hujus febris naturam paulo fusius, quam superius attigimus, explicare; Forte, & magnificos titulos, magnæque illa elogia, quibus apud quamplures vocari illud etiamnum solet, exentere; quod tamen nec mei muneris esse scio; nec hujusce utique Spartæ, quam exornandam ego, ac illustrandam suscepim. De illius abusu peculiarem, ac decies legi dignum tractatum edidit Celeberrimus Ramazzinus, minime veritus se quandoque, nec dum cum juvenis adhuc foret, sed cum jam virili Toga incederet, illo familiariter usum fateri, procedente vero ætate experientia edoctum a priori sententia recessisse; Ita scilicet ait Vir doctrina, tum animi candore dignus inter magnos Viros recenseri. Forte alchali illud volatile, acerrimumque ab Austrinis flatibus delatis lixivialibus salibus, atque una cum aere inspiratis, magis evectum, iuque sanguinea massa impetum faciens, quæ potissima fuit febrium, quæ in hac constitutione desævierunt, causa, alchali fixo Chinæ emendari, aut saltem cohiberi contigit. Nec forte etiam abs re erit suspicari, quæ quoque Clarissimi, atque amicissimi Viri A. M. Reina, Celebriorumque in hac Urbe Medicorum sententia est, ex mixtione Chinæ Chinæ una cum acido prædominante in febribus intermittentibus, inque primis vis obvio, quid emergere febrilis fermenti (sit verbo venia) crasin invertere aptum, ac excitatos motus compescere. Ex solutionis vitrioli permixtione cum solutione Chinæ Chinæ speciem quandam atramenti idem laudatus Ramazzinus, & alii adnotarunt.

LIV. Nunc cæteros affectus, saltem præcipuos, quorum tam discolor, & ingens sylva ab una radice succreverat, lubet expendere. Horum vero plerique ab ipso solido male affecto proficiscebantur. Adeo facile est, inducto semel in liquidis vitio, aut iis ab instituto more defæctentibus, solida quoque crimine culpari, quæ una cum illis invicem comparata sunt; Juxta namque id quod intine latet in sanguine vitium, solida modo tendi, ac summe elastica fieri, modo laxa eadem, ac debilia prorsus, imminuta elasticitate; observamus, utraque dein inveterascentium morborum, diuturniorumque incrementa ægritudinum. Equidem quos potissimum hac tempestate desævuisse adverti spasmodicos affectus, ab eodem illos genio, a quo acutæ febres prodierant, derivasse arbitror, ab illa scilicet

acrimonia in fluidis inducta, cuius præsentia solida quæque diversimode pungi, vellicari, ac irritari perspicuum est. Quæ namque desævierant diuturnæ ægritudines, hæc utique fibram admodum tensam, crispatam, rigidam nimis, ostendebant, plerumque effrænem.

LV. Mulierem novi hysterici affectibus jam dudum olim per intervalla obnoxiam, iisdem sævissime, toto anno divexatam, ac tandem fato defunctam. Stupendum equidem erat tot, ac tam diversas impetum facientis solidi incursiones, ac pene dixerim, explosiones cernere, ceu Protei in morem ludentis. Sæpe visa spasmis tota convelli, præcordiis valde tumentibus, multa evomens biliosa, mordacia. Desinente Vere iisdem spasmodici affectus assiduo more irascebantur, innox in supremo quoque ventre, haud ab similem scenam ab illa, quæ in abdomine jam pridem egerant, ludere cæperant, quæ tandem in certam quandam amentiam speciem degeneravit, cuius miratus sæpenumero sum nullam ab Authoribus mentionem factam fuisse unquam, cum tamen haud raro diuturniores hystericos affectus illi proluisse adnotaverim. Sæpe in risum, & lacrymas effusissimas ridicule erumpebat. Aliquando ditorem quam revera foret, modo alteram e nobilioribus Reginæ affectis sese jactabat; Frons, oculi, vultus amentem fœminam redolebant. Accedente Autumno, sui que tompos magis facta, sæviore more hysterici insultibus vexata fuit, qui ab infimo ventre ad Thoracem propagabantur, ut fere suffocationis periculum impenderet. Raro visa febris, quæ nec typum, nec genium prodidit unquam. Sub initium hyemis adstringi sibi adeo fauces persenserat, ut vix quidquam deglutire par foret. Atque tunc temporis ad ipsam vocatus fui, ad illum diem usque ab Agyrta quodam inconsiderate, inclementerque curatam; Cumque facium affectio jam pene desierit, nedum tamen spasmodorum causa deerat penitus; quin immo hi ferocius recrudescerent quandoque, tympanitidis in morem abdomen distendebant. Qua de re in consilium quoque advocato Clarissimo, Doctissimoque Viro Jacobo Ciconino Augustæ Regis Matris Medico Primario, & Consil., ejus sententia, & autoritate celebriora quæque antispasmodica expertus sum, eaque omnia, quæ promptiora compescendis, coercendisque insultibus, tum quod magni momenti aderat, emendandæ acrimoniæ humorum aptiora credebantur. Meliusculæ habuit; Atqui haud paucis patrat in victu erroribus, tum ob sæva animi pathemata, hysterici spasmi pristino iterum more ludere, ac frequentiores suboriri, tumere crura, venter, præcordia, ac denique atrocius sævire omnia cæperant rursus; Ipsaque tandem paulo post hyemale solstitium defuncta est.

LVI. Nec longe ab eodem spasmodorum tramite abludabant, ab acrimonia illa scilicet Austrinis flatibus evecta, atque ad activiorem sublimitatem elata, immanes, sævissimeque progeniti Podagrici, tum nephritici affectus, quorum ingens visa soboles, ægrorumque cohors, quam acerbe ingemiscerent ob sævos, dirosque craciatus, ac diuturnam, qua immaniter torquebantur, carnificinam, nullo pacto exorabilem. Valde affines inter se geminas hæc ægritudines arbitror. Utrique harum obnoxii valde sunt Subalpini, quod nativis forte Cæli qualitatibus, aut generosioris vini potationi, lautiorique victui referri potest. Utramque vere spasmodicam, absque summe crispato solido protectam, facile erat conicere, tum ab enormi cruciatu, quo vexabantur ægri, tum a cæteris, quibus utraque comitabatur, Phænomenis. Cernere namque erat nullum in nodis artuum tumoris vestigium, ut fieri solet, in quo tophacea materies plerumque reperitur iis, qui Podagra laborant, aut quidpiam aliud consimile, præter intensum nonnullis dolentis partis ruborem, adurentemque calorem. Nulla quoque in plerisque nephritide detentis, renibus, aut qua alia cunque parte calculi impacti suspicio, aut ejusdem futuri proclodia in urinis; nihil fere persentientibus ægris aliud, quam tensionem violentam, acerbissimosque dolores fixos plerumque, ac prementes, ac si fibræ quæque nervæ spasmis rigerent, aut pressuram quandam, & coarctationem, ut ita loquar, experirentur; Utrique parum profuerant remedia quæque adhiberi solita; Quæ solidum affectum demulcere, acrimoniam in fluidis elatam compescere, lixivialia spicula, acerrimosque sales coercere magis apta erant, multis profuere; Diluentia, anodyna, emollientia tum interne, tum externe adhibita utramque paginam, ut ajunt, implebant. Longe tamen in universum inferior nephriticis Podagricorum profapia est. Hisce namque nec in hac modo constitutione, sed fere sæpè, & olim adhuc minus efficacia, ac damnosa sæpè comperta sunt universa, quæ passim deprædicantur, medicamenta tam externa, quam interna, quorum uberrimam segetem videre est apud Lucianum: Elegans est ac miræ jucunda, quæ apud illum Podagræ allocutio legitur ad illos, qui secreta quædam remedia se habere jactitant, quibus elidere ejus potentiam queant. Hujus aliquot versus e Græco sic ipse ego verteram olim.

Quis invictam me dominam dolorum

Ignorat Podagram in terra mortalium!

Quam neque Thuris vapor placat,

Neque effusus sanguis aras ad incensas,

Non templum divitiarum undique

suspensis ornatum donariis:

Quam neque Apollo Medicamentis expugnare valet,

Omnium Medicus in Cælo Deorum;

Non filius Apollinis Doctissimus Æsculapius, &c.

Ea scilicet natura Podagræ est, ut omnibus æque plorare illa imperet, eam vero irritantibus occurrere soleat multo iracundior, diutiorque.

LVII. Ceterum qui calculo sive renum, seu vesicæ jam diu laborabant, hi sævius omnes, atrocisque divexabantur; Haud pauci ex iis mortui sunt; Libet hic rarissimum ingentis calculi vesicæ exemplum narrare, quod mihi eo fere tempore adnotare contigit. Sacerdos quidam Gallus Romam contendens, acerbissimis cruciatibus vesicæ, sævissimaque stranguria correptus, in Nosocomium SS. Mauricii, & Lazari mense Julio se contulit. Fatebatur olim hujusmodi doloribus vexatum fuisse Lutetiæ Parisiorum, cum adolescens adhuc foret, iisdemque liberatum celebri Lithotomi ope, exiguo feliciter extracto calculo. Adultior factus iisdem per intervalla recurrentibus affligebatur, nunquam tamen dire adeo crudeliterque. Septimo dein die mille inter conamina, ejulatusque expiravit. Secto cadavere insignis in vesica repertus est calculus, perpolitus undique, & lævigatus, ponderis tredecim unciarum cum dimidia, durus adeo, ac revera siliceus, ut vere quid lapideum quis diceret e marmore resiliens. Renis dextri substantia pene exesa aderat, alter præter morem gra-

(a) De febrib. c. 17.

(b) Tr. 10.

(c) P. 1. Ep. 51. & 88.

dior, nigerrimus, ac fere putridus, Vesica crassa valde, ac fere carnea; Uterque ureter solito amplior. In horum altero qua in vesicam definit, sex, vel septem exigui calculi occurrerant taliter invicem impacti, & cuneati, ut præclusa omnino via urinæ, enormiter expansus canalis, alterius veluti idea vesicæ rudiores deluderet, quasi re ipsa, foret vesica duplex. Ac forte in hunc crassum, atque supinum errorem Medicos Casauboni incidisse puto, dum viri tauti vesicam urinariam nobis geminam obtrudunt. In sinistro uretere nullos quidem calculos, ac urinæ quantitatem summe olentis, ac foetidissimæ comperi.

LVIII. Exaratis spasmodicis ægritudinibus merito quoque accensentur quotquot cæteræ per ea tempora desaviebant magis, ut hemicrania, vertigines, acutorum illarum morborum reliquæ, aut diuturniorum affectionum præludia. Unum scilicet harum omnium Parentem Austrum contendimus; Una omnium scena; Unus idem ludendi genius, ac mos, etsi pro diversa solidorum residentia, magisque aut minus adaucta elasticitate eorundem disparēs adeo, ac discoloros affectus subluderent. Qui Spasmodum doctrinam intime callet, vimque, & potestatem solidorum in corpore viventi sedulo expendet unquam; Is Vates esto. Revera quidem id morborum genus, ait Doctissimus Baglivius nulli in hac arena secundus (a) ab spasmodica fibrarum oscillatione pendet, totiusque curationis scopus dirigi debet in ea primo tollenda, aut saltem compescenda, deinde fluxu peccanti incumbendum. Diuturna olim hemicrania laborantem senem Paralyti dein & artuum contractura correptum memini. Mulierem hysterica novi, cui quoties insultus eminebat, sævissima illi profundeabat hemicrania. Amicus meus diris nephriticis doloribus per intervalla vexatus, hosce sibi impendentes prævia vertigine, oculorum caligine, auditusque hebetudine didicit, eo atrocius sævientes, quo dirior Auster perspirat. Novit id unum Magnus Senex, ac quantum solido insensu sint Austrini flatus, compertum Posteris tulit, illo (a) inquit, auditum hebetari, caliginem visui offundi, gravari caput, tarditatem, & languorem induci. Nec quis putet Hippocr. nisi experientia prius edoctum tam grande effatum, tam fidenter, absolute pronunxiassent; In libris enim Epidemior. Constitution. habet Austrinam huic nostræ haud absimilem, cui magna etiam antecedentium temporum siccitas præcesserat, unde postea consimiles affectus hyeme, ac vere apparuerint. Equidem sicuti Aquilonaris tempestas spiritalibus organis infesta est, ob ferocem colluviem, quam parum perspirantia corpora abunde cumulant, ita Austrinam capiti, quod Spasmi sedem præbet, ac incrementum, maxime infensam didicimus. (c) Ut vero in Imperiis, sic in corporibus gravissimum esse morbum qui a capite diffunditur, aiebat Plinius.

LIX. Nec vero rarum adeo, ac incongruum forte quis credat spasmodicas ægritudines ex aeris vitios observari? Quam facile ab aereo hocce, in quo degimus, Oceano, aut rectius ab exoticis particulis una cum illo exceptis, humani corporis liquida quæque inficiantur, fuscè superius attigimus. Hisce autem inquinatis semel, stimulique vicem agentibus, quam facile una invicem conspirantia solida afficiantur, irritentur, convellanturque diuturniore, aut graviore scena juxta individuorum diversitatem ipso quoque fluido hujusce turbationis causa summopere magis affecto, conspicuum est? Insolitum morbum spasmodicum convulsivum variis in locis Electoratus Saxonici, & Marchionatus Lusatiæ superioris nuper Epidemice grassatum legimus apud Gelichium (d). Alterum huic haud absimilem affectum describit Sennertus sub nomine spasmi magni, & Epidemii cum febre, de quo An. 1596. Facultas Medica Academia Marpurgensis consulta consilium Medicum impertita est a Gregorio Horstio, in Operibus Medico-Præcticis publicatum, & a Gregorio Leisnero denuo excusum. Simile quid etiam Parisiensibus olim, dum nebuloso existente aere, qualis revera esse apud nos solet flante Austro, evenisse refert Eruditissimus Fantonus, (e). Id curiosorum ingenia dudum exercuit. Equidem pauci, ac forte vix ullus visus est iis temporibus morbus, qui aliquid spasmodici haud præ se ferret.

LX. Sed ab affectibus spasmodicis divelli nequeo citra historiam unam, ac alteram. Vestalem vidi e Monasterio Cælestinarum Sanctissimæ Virginis Annunciationis, Scorbuto, Proteo illo scilicet plurimorum symptomatum syndrome diu olim, tum quam acerbissime hoc anno divexatam, quæ sanato repente cruris ulcere, quo tota fere hyeme laboraverat, miro quodam spasmo musculorum capitis, & colli correpta; ut os minime aperire potuerit, trium dierum spatio velociter obiit. Altera Historia haud ita recens est, sed Pæonio stylo notanda, ab Adversariis b. m. Venerandi Senis, Avique mei, Archiatrorum Comitum, haud exiguo bonorum, ac doctorum hominum mœrore non ita pridem defuncti, excerpta. „Vidi ego, ait, „Mulierem stupendo convulsioni genere vexatam, in quo se se ne „per momentum quidem quietam continere poterat, sedens in lecto, & mentis omnino compos. Torquebatur se se nire ægrota, „& membra cum capite in gyrum veluti contorquebat. Si quantum aquam peteret bibitura, necesse erat poculum ori prudenter adducere, & ipsius motui circulari obsequi, poculum elevando circumducere, donec sitis esset sedata. Cum autem bibisset, fatebatur liquorem non recta descendere, sed in circulum circumagi, „& veluti par gradus, trochleæ, aut helicis in morem, descendere, usque dum in ventriculum delaberetur. Feliciter tamen, quod ab illo audisse memini, evasit.

LXI. Reliquum est de scorbuto, tum subitaneis necibus pauca dicere. Quod ad illum attinet, veteribus minime prætervisum utique; Licet haud ita Subalpinis familiaris sit, ac gelidiori subclimare viventibus, ubi dire sævit, illo tamen immunes omnino haud esse Italos, cæterosque Meridionales Incolas jam dudum novimus. Neque enim illum semper ab humorum stasi ortum ducere, vel ipsi Septentrionales Incolæ norunt. Quandoque scilicet ab crasso laticis fluore initium habet, sæviusque miseris torquet. Hinc forte tolerabilior audit apud Danos, Norvegos, Batavos, ac toto divisos Orbe Britannos, quod ibidem magis ille ab humorum lentore pendeat, secus ac apud calidiores oras, Austrinis flatibus magis obnoxias salibus cruori affusis dissolvere potius, quam cogere aptis. Utque raro apud Septentrionales cacochymia, seu Scorbutus, (idem nanque esse puto cacochymiam veterum, ac modernorum Scorbutum, saltem æqualia habere fata) ut, inquam, raro apud Septentrionales Scor-

butus occurrit ab colliquatione humorum, ita apud nos ab eorundem lentore ortus. Id ego olim tum rerum usu, tum longa apud Anglos, ac Batavos mora didici, haud exiguo ægrorum meorum emolumento.

LXII. Atque hujus potissimum indolis, qui modo hoc anno sævit, Scorbutum fuisse, adverte, tum ob latices ad liquationem pronos, tum ob Austrinam totius Anni constitutionem eo diuorem, quo acriores sales ob defectum humidi in tam ingenti siccitate temporum elati magis aderant, ac sui juris. Profecto temperantia quæque, leniter refrigerantia, nitrosa, acida acrioribus cæteris fortioribus, abstergentibus, collquantibus, orgasmum facile inducentibus, quorum tam magna seges, palmam præripuerunt. Ejus quippe genio, non nomini studendum erat, quod si quo in morbo, in hoc præsertim accurate investigandum, & distinguendum monet Clarissimus Boerhaave. (f) Sedum vermiculare, cochlearia, trifolium fibrinum, sempervivum minus acre, Zingiber, acerrima quæque apud Anglos commendata maxime scio; An hæc tuta æque, ac ejusdem sint efficaciz apud illos, qui sub calidiori climate vivunt, judicent docti? Mihi quidem methodum placidam, successivam, continuam, quæ magis humores compescit, quam stimulat? Quæve nostris nascuntur in hortis, indigenas, plantas minus acri sale præditas, Septentrionalium methodo, ac exoticis celebrioribus præferendas compertum est exemplo monstrante viam. Notissima est observatio de memorato sedo vermiculari Actis N. C. inserta, quod scilicet in expeditione Danica multi per illud in formam decocti exhibitum, a Paralyti scorbutica restituti sint, evacuato per vomitum muco admodum viscido; An id hisce in oris proficuum æque, profecto ambigo. Forte etiam nusquam visus est Scorbutus alteri similis, aut quorum eadem essent Phænomena. Sæpe vidi huic hecticam febrem accessisse; Sæpe illum memini in Asciten, mentiundo tympanitidem degenerasse; Urique latæ maculæ rubræ ad cutem diffusæ, aut icterus multiplex sæpe proluit.

LXIII. Exarata sanguinis ad fluorem tendentia subitaneis forte etiam moribus occasione dedit, quibus ab hyemali solstitio superioris anni ad æstivum usque, decem circiter intra Urbis mœnia ex tempore sublato audivimus, tum vitos, cum fœminas, puerosque. Illi scilicet toties memorati exotici, acerrimique sales ab pluvioso Autumno, Austrinaque hyeme ulterius fusi ac evecti, inque se ipsis magis existentes, ut Hippocratis verbo utar, occurrente forte, aut prævio pravorum humorum apparatu paulatim collecto, aut peculiari alia quacunque dispositione, promptiores aliquando, ac potentiores tum ad solida irritandum, sciendumque, tum ad fluida dissolvendum redditi fuere, proindeque apti magis, præcipientes adeo mortes inducere. Cæterum frequentiores hujusmodi neces, cum maxime sævit Auster, satis quidem evincunt, earum plerasque ab humorum fusione ortum ducere; Quæ vero flante Borea, per sæpe etiam contingunt, hæc ab humorum lentore potius, aut ab organico vitio pendere.

LXIV. Ver igitur egimus Austrinum insolens. Sub initium Maii æstuosum præter morem extitit Cælum, Sole in Occasu flammeo, apparente, non secus, ac Julio, aut Augusto mense. Huic immoderato calori proluserant,

Ætheris impulsu fremitus, Cælique fragores.

Remitti mox cæpit æstus, quodve supererat Veris satis beate transegit. Pulchrum erat Mercurii lusus in Barometro, cum magna forte impenderet tempestas, cernere; Is namque illico ad extremos fines momento temporis descendere, moxque iterum restituta serenitate sursum emergere videbatur. Cæterum cum Austrina extiterit totius fere Anni constitutio, nunquam visus est in sublimiora loca illa se recipere, haud ausus unquam ultra vigesimam lineam evadere, quæ illius major excelitas fuit. Præclare hinc; ac dilucide pleraque explicari queunt Phænomena, tum quæ sita quare ad Austrinos flatus difficilis sit respiratio, ut de quadam veluti suffocatione conquerantur omnes? Cur Urinatores quidam, hominesque, pene dixerim, amphibia ad plures horas sub aquis degant? Cur, quod haud præter rationem, etsi paradoxum videatur, scripsit Th. Cornelius, aer crassis vaporibus refertus ad vitalia munera obeunda aptior sit, quam aer tenuior? Cur Phthysi pulmonari, famosæ, & magnæ Urbes magis commenduntur, quam Villæ, aut Oppida, quæ aere claro, & persflato gaudent? Cur humidus, & minime persflatus aer nulli salubris quæ sane omnia a majori, aut minori pressione aeris rarefacti, aut condensati magis; persflati, rari purioris, aut humidioris pendent, ut palam faciunt experimenta in machina pneumatica circa animalia facta; neque ob aliam causam in editissimis montibus gravem duci anhelitum credendum est, nisi quod inibi minor sit aeris pressio, quam in iniis Vallibus. Sed e diverticulo in viam.

LXV. Exacto Vere Æstas successit mox ab ingressu turbata ventis lætior dein, amæniorque, blande adspirantibus Eresiliis. Sæpe auditum circumfremere Cælum, ingentes resonare tonitrus, magno misceri murmure Æther, quin vel minimum plueret unquam, Sole dies referente siccos. Post caniculares, varia aeris temperies; Zephyrique, & Austri alternatio; Illo autem circa Septembris initia prævalente, plurima pluvia, & horridiuscula aura per aliquot dies infesta. Æstatis reliquum moderato ventorum flatu tranquille peractum, felicioribus auspiciis arridente Æquinoctio.

LXVI. Fatiscere enim sensim adulta æstate exitiales febres, tum spasmodicæ ægritudines observatæ sunt, faciemque tradere intermittentibus febribus, quæ Augusto, & Septembri mense illucescentes, subque ipsum dein Æquinoctium vulgares factæ magis, stativa castra ponere cœperant, palmamque illis eripere, aeris procul dubio æstivo fervore in autumnale frigus degenerantis præludia. Scenam quoque ingredi visæ continuæ quædam, aliarque ardentes paroxysmis interpolatæ, catarrhales tussi, & asthmate molestæ; quandoque, & angina, oculorum, ac tonsillarum inflammationibus, quæ dein in intermittentes migrabant. Media æstate ob fructuum forte intemperantem ingluviem, & immoderatum aliorum illecebrarum gulæ usum Diarrhææ, ac dysentericæ comparuerunt, quæ difficillime medicamentis compescerantur. Verminosa quoque spectata proles ludere, sævæque symptomata producere in adultis æque, ac in teneriori ætate constitutis; Horum nonnulli etiamsi nulla dysenteria, aut Diarrhæa essent correpti, assidua desidendi cupiditate cum torminibus quibusdam conjuncta vexabantur; Post frustra adhibita enei-

(a) De fibra motrice specimen pag. mihi 231. (b) 3. Aph. 5.
(c) Lib. 4. Epistol. (d) Exercit. subse civ. Francof. T. 2. sect. 1.
(e) Dissertat. Anat. 13. de org. respir. 317.

(f) Aph. de cognosc. & curand. morbis n. 1253.

mata lenia, evacuantia, humorem acrem demulcentia, balnea, tandem cum ab Ascaridibus malum foveri suspicio foret, majori cum successu anthelmintica enematibus addita, perque os data fuerunt.

LXVII. Haud paucos etiam Colica dira corripuit; Nullum iis præstantius auxilii genus, quam fœtus ex lacte recenti, addita modica dosi Laudani liquidi. Mirum sane ut concitatum dolorificum spasmodum, sive is ab violenta abdominalium musculorum contractione, quos ego Principem ludere in hisce diuturnioribus affectibus scenam arbitror, sive ut perperam visum est, a convoluzione intestinelorum pendeat, unde decantatus ille oritur antiperistalticus motus; mirum inquam, ut illum præfatus illico fœtus temporis momento-compelcat, contractasque partes pristino genio restituat, moremque ferat clysteribus, aliisque præfidiis opportune institutis, convoluta, si quæ fuerint, intestina explicandi, aut verius in Thoracem illa ultro propulsa, forte in situm naturalem reducendo.

LXVIII. Ego quidem diu mecum animo expendens diros, acerrimosque dolores, quos per sæpe advehit hujusmodi affectus, quid altius subesse illi suspicatus sum aliquando; saltem non semper illum, aut sæpius sedem habere, ut vulgo ferunt, in Cælo. Idem olim a Carolo Pisone, doctissimo sui temporis Medico excogitatum scio, qui forte in hac eadem arena Villisio præluxit. Uterque haud multum a vero aberravit. Quid enim utrique visum est, in nervoso systemate latens, quod nemo unquam expenderat. Sane quidpiam minime vulgare in hoc affectu proludere compertum. Nec opus quidem antiperistalticum motum, aut convoluta intestina effingere. Hujusmodi figmentum nuper (a) in Regia scientiarum Academia Lutetiae Parisiorum a præclarissimo Viro strenue explosum est. Equidem ut chylus tot inter molimina, tum ascensus, ac descensus momenta elaboretur, perficiaturque; Ut idem celeriore tramite lactearum oscula subeat; Ut alvinæ fæces, quæ data porta, ruant, excernanturque, fibras intestinelorum ita compositas adverte, ut oscillantes illæ, ac circumprementes invicem perenni ludant more, exaratis muneribus comparatæ. Isque ille est peristalticus seu circumpressorius motus, rectius forte vermicularis dictus Anatomicis; Qui vero, cum iisdem abundantibus fibris ingesta sursum egeruntur, perque os ejici contenta quæque in ventriculo, ac intestinis cernimus, ut in Colicis affectionibus contingit passim, id opposito motu fieri contendunt, quem *Antiperistalticum* vocant, aut fibrarum structuram, ac leges minime norunt, aut festivis appellationibus oblectantur. Si quis Enterocelen expenderit unquam, hujusque phænomena cum illis contulerit, quæ in Colica sæpe sublundunt, facile inveniet, quam affinis invicem affectus uterque sit. Quo enim more prolapsa intestina, ni quamprimum docta manu reponantur, convolvulum sæpe, ac mortem inferunt; ita & eadem in Thoracem a violento musculorum abdominalium conatu adacta, perque septum abrepta haud impari ludunt discrimine. Ecquis autem in hernia intestinelorum, in qua sæpe etiam Ægri fæces alvi evomunt, antiperistalticum motum effinxit unquam? Quod si atrocissima quæque symptomata ab strangulatione intestinelorum ob musculos abdominis valide meatum abstringentes faris illa apte deduci queunt; Quidni & colici dolores ab eorundem intestinelorum, quæ ultro in Thoracem adegit nitentium musculorum spasmus, ac vis, strangulatione ob septum transversum meatum, per quod illa forte abrepta fuere, constringens, totam proinde tam sævi, acerbique mali Theoriam, non a convoluzione intestinelorum, atqui ab violenta contractione musculorum abdominis deducere faserit, quorum nisu per septum transversum abripiantur intestina, inque Thoracem adigantur, propellanturque? Est altera Herniæ species, quam cruralem vocant, cæteris longe sævior, sæpe colicam mentiens aliquando, in qua intestinelorum portio intime infixæ reperitur, qua cruralia vasa eminent. In hac & diris cruciatibus affligi miseros, & fæces per superiora ejici, constipatam alvum, tendique ventrem cernimus, immane quantum! Num intestinum etiam aliquod, sive tenue illud fuerit, aut crassum, dilatato forte diaphragmate, obque ingentem contranitentium musculorum tensionem infixum ibidem, adauctumque, quæ potissimum nervi intercostales emergunt, tum ab eodem diaphragmate pene dixerim strangulatum, eadem inducere haud poterit Phænomena, nullo præludenti antiperistaltico motu, ut in utraque allata herniæ specie contingit? Colicæ cujusdam memini apud veteres Medicinæ Principes sermonem haberi, in qua nedum intestina tantum una cum Omento, at pancreas, ipsum Mesenterium, Lienem per septum transversum, scissis retinaculis abripi ferunt; Chordapsum hanc vocat Celsus, alii *Vulvulum*, aut *Miserere*, cujus prolixam descriptionem, & expositionem egregie tradit Lindanus (b). Hinc intestinelorum inflammatio eorundem spaciolo præludens; hinc affinium viscerum, ac diaphragmatis præsertim labes in velocem gangrænam deflens, lethifero proludente singultu. Cæterum colicos hujusmodi dolores, sive illorum phænomena, sive sedem considerem, æstate populariter ingruentes, iis accensendos crediderim, qui vere potissimum sub diversa spasmodicorum specie ludebant, ab eadem scilicet vulgari, communique causa nervoso generi summe infensa productos, cujusmodi exempla videre est apud Æginetam, Zacutum, Cratonem, Ballonium, & alios quamplures.

LXIX. Nec abs ve futurum arbitror quædam innuere de Massiliensium Peste, quæ æstatis initio magnam in illa Urbe stragem edere nuntiatum est. Illius incrementa hæc fuisse ferunt: Navis oneraria ab Orientalibus Oris profecta, ubi dira Pestsis sæviebat, Massiliam appulerat infectis Mercibus dives, quarum contactum mox quidam extemplo e viventium numero sublatis sunt; hinc semel orta labes ad miseros Cives propagata. Brevi temporis spatio illustris, copiosa, & florentissima Urbs, ac circumjectus ager ingenti clade deletus pene, ac vastatus magnum finitimis æque, ac diffitis gentibus metum iniecerat, ne fœdo afflatu diu, ac longe manaret lues, adque affines ultro pervaderet. Quas ideo præcautiones hisce in casibus humana solertia adhibere solet, eas provido consilio præoccupavit Invictissimus REX NOSTER, Italiæ totius incolumitati, cujus jam dudum ipse Patronus, ac Vindex est, dum suorum bono consularet, prospiciens. Ubi enim primum de pestilenti lue, quæ Massilienses infestabat, rumor Taurinum pervasit, totum illico ingentem Alpium tractum, quæ Galliam ab Italia determinant, numerofo milite custodiri jussit, ne cuiquam permitteretur ingressus, ullaque aura pestifera per eos, quos opposuit Natura Montes, ab infectis locis per aliquam secretam viam hæc Regiones adiret, inficeretque. Nec fa-

tis cautum existimans, non multo post cum externis, atque etiam finitimis Civitatibus commercia interceptit non tanti faciens commoda, & beneficia, quæ ex libero Mercaturæ commercio omnibus Civitatibus proveniunt, quanti publicam Subditorum salutem. Instituta quoque sunt eodem tempore publicæ preces, ad iram Supremi Numinis placandam, magno ad celebriora Urbis Tempia Civium confluxu, ut nunquam alias tantus in unum populi conventus fuerit observatus, tantaque erga Superos Reverentia, ac Pietas; IPSO AUGUSTISSIMO REGE una cum Piissima Regina, ac Regio Principe magna suis pietatis exempla ferente, vere optimo, adque omnium nostrum felicitatem cœlitus demisso REGE.

LXX. In dies interim magis percrebescere auditum pestiferam luem, adque Aquas Sextias dein totius Provinciæ Caput, Tarasconem, Arelatum, Telonem Martium, ac finitima quæque Oppida longe latequè diffusam. Multi nullo proludente signo, e vestigio interibant. Nonnulli ut ab fide dignis hominibus accepimus, intra paucos dies, prævio vomitu, deliquis animi, prostratione virium, sævissimoque dolore capitis evivis migrabant. Haud paucis carbunculi, exanthemata, maculæ, sædaque ulcera apparuerunt, funesta prorsus. Quosdam ferunt, quibus Bubones rite proruperant, ex insperato servatos. Infanda nimis, luctuosaque res est singula quæque recensere; Nec profecto absque lacrymis legi potest sincera malorum Historia accurate fideliterque a Doctissimis Viris Galliarum Regis mandato Massiliam missis, ut Medicam opem Civibus ferrent, inter mortes, ac funera exarata. Hanc recens in Italicum vertit, ac criticis notis erudito calamo illustravit Clarissimus Muratorius Serenissimi Ducis Mutinæ a consiliis, ac Bibliotheca. Quædam enim visa sunt Sapientissimo Viro, quod ad Pestis naturam, ac ingenium spectat, parum verosimilia, saltem congrua minus, nec satis apta, quibus vera, ac genuina Pestis Theoria inniti queat, ac Vir superioribus annis elaboratissimum Tractatum, *Del Governo della Peste*, cum dira Viennæ orta lues, tota Austria serperet. Eundem diversis in locis nuper, Mediolani, Brixia, ac Taurini quam elegantissimis Typis editum nunc iterum Mutinæ apud Solianum cudi audio a doctissimo Authore magnam in partem adauctum, & locupletatum.

LXXI. Hac autem serie sæda adeo lues sese prodere visa est. Principio multis lingua, osque viscido, lentoque humore oppletum aderat. Nonnullis obstipata alvus; Haud pauci oborta Diarrhæa, aut effusione sanguinis celeriter defuncti sunt. Vomitus, deliquia animi, ac sævus capitis dolor in singulis fere præluferant. Plures intra biduum, vel triduum alto sopore, alii Phrenitide correpti e vita migrarunt. Sæpe obvia verminosa soboles perniciosos symptomatibus stipata; Plerisque nihil hujusmodi proludebat. Cadaverum sectionibus maxima intus visa Phlogosis, ac intestinelorum sphacæla. Dirius in pueros, ac fœminas sævitum. Cæterum ab æstivo solstitio ad autumnale æquinoctium usque, plusquam quinquaginta hominum milia cujuscunque sexus, ac ætatis una in Massiliæ Urbe, ejusque agro interiire.

LXXII. Hæc funestæ adeo luis indoles. Quæ vero præcipua illius causa extiterit, modeste inquit, se illam minime penetrare ausum Clariss. Chicoineau, ex iis, qui Massiliam missi sunt, Medicis alter, (c) ratus utique, ac scite conscius nihil attingi posse verosimile; quodve huc usque quod cujuscunque Pestis genesis, ac naturam proditum est, hypotheticum esse, nilque prorsus ad ægrorum curationem conferre. Quamobrem sedulo idem admonet ad res magis evidentes advertendum. Quæ scilicet fuerint pestis initia, quæ illius incunabula, quidve *originis principium*, ut Hippocratis verbo utar, animo, atque oculis expendendum. Utinam sane Vir Doctissimus moderate adeo de hujusce Pestis propagatione, tum præcautionibus adhiberi solitis effatus foret. Ait enim Pestilentiam sese contactu minime diffundi, aut vero miasmatur, seu corpusculorum ope ex infectis mercibus, Terræque abditis, aut e superiori quopiam fonte exhalantium manare, quæ per æthera inane dispersa dein, ac simul una cum potu, ac cibo suscepta in sanguine ludunt, eumque inficiunt, quo pronus ille magis, aut labem suscipere aptus est, sive ob congestorum humorum colluviem, sive ob terrorem, aut metum animo injectum. Intrepide ideo sese asserit ægris tulisse opem, nulla unquam contracta labe, omnia quæque remedia præservationis, aut præcautionis jure celebrata hæcenus noxia potius, quam proficua esse contendens.

LXXIII. Velim ego attentius ad tam fœdæ pestis, quæ Massilienses crudeli flamine etiamnum verberat, animum adhibuisset Vir Clarissimus; nec profecto crediderim insontem adeo contactum infectarum rerum ab illo celebrari. Equidem pestifera quæque lues, ut de febribus malignis olim erudite agebat Præclarissimus Sydenhamius, non omnium morbus est, nec longe illa pergere potest, nisi alas, ac ut ita loquar, pennas illi præbuerint homines. Novimus in recenti luctuosa Boum clade quam utile fuerit rem in tuto ponere, cumque infectis stabulis commercia quæque interceptire. Idem quotquot de hominum Peste scripsere, consilium est; Idem Sapientissimorum Magistratum institutum; Idem acceptus ubique gentium usus, ac mos. Neque aliud hæcenus aptius ad hujusmodi labem præcavendum documentum, aut præsidium scio, quam terra marique ad fines, & loca suspecta idoneos viros mittere, qui solitis cautionibus ad rem tanti momenti assiduo invigilent, nullique, sive exteriorum, sive Subditorum sine datis sanitatis vadibus, aut prævia, ubi opus fuerit in designato quopiam loco, constitutis diebus, mora, ingressum concedant. Hisce artibus unius fere sæculi spatio magna Italiæ pars, tum præsertim An. 1656. cum dira lues Romæ, Neapoli, ac Genuæ quam immanissime dæseveret, servata est. Iisdem nos tutos, ac Sospires fore beneficentissimi REGIS cura, & studio speramus, foresque Pestis, atque omnem illi aditum ad hæc Regiones præcludere. Intrepidum quidem se se gerere summe laudo; Nihil in Pestibus perniciosius unquam, quam injectus animis timor. Sola sæpe metus, ac terroris imago absque præsentia pestis graves intulit ægritudines. Ast cætera quæque præfidia, ceu noxia potius, contemnere, periculosa plena alex opinio est, absurda prorsus, atque ipsa, prope dixerim, Peste exitiosior; Utque ait laudatus Muratorius (d) *Da cacciarsi via colle pertiche, anche senza esaminarla, non essendo saviezza, &c. E tanto più poi, (e) inquit Vir Doctiss. perchè non si sa intendere, come mai venga ne pure in*

(a) Vide Reg. Scient. Acad. Acta Anni 1713. p. 470. edit. Amstelod.

(b) Exercit. IV.

(c) Vide opusculum inscriptum: Relation de la Peste de Marseille, &c.

(d) Osservazioni intorno alla Relazione della Peste di Marsiglia pag. 24.

(e) Ibidem.

penfiero a perfone, che riflettano alquanto ai paffi d'una Pefte, ch'ella non fi comunichi per Contatto, o Contagio. Stet quidem fuus in-
victo animo honos: Stet illi gloria. Nec tamen aqua laudis
pars auferenda est cautionibus ceteris ab Sapientibus Viris summo-
pere commendatis, absque diuturno rerum usu probatis.

LXXIV. Quod vero ad Peflis naturam attinet; Minime reticen-
da est Doctorum quorundam virorum hujusce ætatis sententia, qui
veneficam luem confistere ajunt in verminosa quadam putredine tot
tantasque edere strages, seque vel proxime per contactum, vel remote
per fomitem de infectis in sana corpora propagari apta. Ingeniosum
utique excogitatum, ac forte etiam admodum probabile, neque a re-
centioribus tantum vindicatum illud, excitatumque Ath. Kircherio,
Fabro Chymiatro, Langio, Cogrossio, Vallisnerio, Corte, (+) ac
pluribus conjecturis assertum, sed a priscis etiam gravissimis Autho-
ribus diligenter scriptis commendatum; Et quidem huic ipse opinio-
ni lubens, ut fieri debet, Sententiam meam adjungerem, si quæ o-
mnia occurrunt Phænomena dilucide explicari, quidve certi de hu-
jusmodi argumento decerni posset. Atqui ut docte advertit Erudi-
tissimus, ac amicissimus Pestalossius, (a) Celeberrimus apud Lugdu-
nenses Medicinæ Professor, suos hujusmodi hypothesi, gravesque pa-
titur Manes, nec dum adhuc extra omnem dubitationis aleam posita
est. Enim vero, qui fiat ut in Urbe quapiam, aut Agro, ubi longo
temporum spatio nulla sævit lues, eaque proinde infecta, aut pecu-
liarium vermiculorum examina haud amplius aerem occuparunt diu,
qui fiat inquam, ut horum progenies a remotissima plaga advecta se-
mel tam facile illico multiplicari; Ut brevi dierum intervallo univer-
sam Atmosphæram inficere, perque ora, nares, ac patentiores quas-
que vias intus excepta, tam difficiles morbos efficere, seque ad affines
agros, ac regiones propagari possit, anceps hæreo; Equidem ut pro-
priis nondum illa oculis, ita & mente assequi haud posse unquam
tot minuta animalia crediderim, quæ progigni semel, ac longe la-
teque dein manare Peflis queat, tamque sæpe diverso more proludere?

LXXV. Quod autem dicatur ab aliquibus in emissio ab affectis ho-
minibus sanguine, aut etiam microscopio armatis oculis vermes inspe-
ctos fuisse; Id minime satis esse ad hujusmodi hypothesin tuendam, vel
ex eo deduci potest, quod nedum in affectis Pefte, at vel in ipsis
etiam sanis hominibus continuo hisce scateat cruor. Dein vero hi so-
boles potius, quam Parentes, aut Pestilentiarum Authores esse vi-
dentur; Neque enim illos adeo minutos repertos unquam memini,
cujus revera exiguiusculæ esse molis effingi debuerint, aut mente con-
cipi. Cæterum si minuta hæc animalia in sanguine, aut fluido quo-
piam, ceu in proprio elemento degunt; Ut vivere illa diu, ac latere
queunt extra propriam sedem? Ut sese recens excitare dein, explica-
re illa, ac suoque ingenio e vestigio multiplicari? Crediderim potius
(eoque fidenter magis id ego ajo, quod solidioribus rationibus hæc
mea sententia innitatur, & Magnorum Virorum nedum inter exte-
ros, sed & inter nostrates, quorum consuetudine, ac judiciis uti in
hac Civitate soleo, ac præsertim Illustrissimi, Amplissimique Viri
I. A. Manzini Regis Medici Ord. & Conf., Clarissim. Jo. Fantoni,
Cicognini, ac Parentis quoque mei Ven., quem silentio præterire
nefas foret, Medicorum Regis Primarii, & Consilarii, suffragio
comprobari illam noverim:). Crediderim inquam verosimiliter magis
pestiferam quamlibet eo nomine dictam luem, tum quæ præser-
tim Massilienses tam dire adeo, crudeliterque exagitat, ortam esse a
peculiari quodam veneno, cujus inanime perpetuum seminarium in
vastis illis Asiæ Regionibus effingere lubet, inque Europam advectum
aliquando. Nec forte incongruum erit quandoque veneficam hujus-
modi luem hisce ab oris repetere, nostro illam sub Cælo natam,
adultamque concipere, quod medius fidius mirum neutiquam videri
poterit reputanti, ut rem magis exemplis illustrem, tot passim mor-
bos contagiosos intra nos ipsos sæpe progenitos, unde postmodum
obvia quæque corpora reterrimo afflatu inficiuntur. Neque vero no-
vum est, ut olim de hydrophobia Cælius (b) Aurelianus tradidit,
in animalium corporibus peculiare venenum innasci, quod postmodum
cetera contagione corrumpat. Quæ ab exotico hujusmodi veneno, aut
fermento (nam quo alio usurpato a Medicis nomine clarius nunc
referam imaginem pestiferi illius principii, unde lethalis hæc labes
exoritur, nequaquam invenio) producit Peflis, dirius sævit, quam
quæ ab nativo alio quopiam, seu indigena oritur.

LXXVI. Possent utrumque venenum illud, tum adventitium, tum
nativum cum Arsenico, & Sublimato comparare, nam in solidis par-
tibus revera pares erodentibus venenis invehit effectus; Ab insti-
tuenda tamen hujusmodi comparatione me lubens cohibeo, minime
ignarus innumeras & esse, & excogitari posse veneficorum miasma-
tum conjunctiones, unde variz, difficilesque prodeunt nocendi ar-
tes. Neque id est hujusce loci exponere, cum præsertim id eos tan-
tum ignorare accidat, qui hospites in chymica, & Anatomica ar-
te non sine ingenti piaculo diverfantur. Cur autem, quæve actio-
ne fermentum illud, sive adventitium, sive nativum fuerit, sese
sano in corpore insinuare, excitatumque semel sedem ibi figere,
tum sese in alios homines propagare momento temporis queat, pul-
veris Pyrii exemplo satis præclare explicatur. Atqui sive animatum
in sanguine seminarium, vel inanime prorsus miasma pro vera Pe-
stis causa flatuatur; Lugendum utique est, tum olim, tum nuper
apud Massilienses nondum inventum fuisse verum, certumque præ-
sidii genus, quo tam fœda, sævaque lues curari queat.

LXXVII. Ad Subalpinos redeo; Utque rem omnem in pauca con-
traham: Pluviosus Autumnus extitit: Hyems Austrina; Ver insolens:
Lætiore Æstas, temperate, amœna. Bombycum soboles exigua. Triti-
ci, ac frugum ubertas copiosa satis. Puteales aquæ multo cæno refer-
tæ. Inops Flora. Mellis parca perceptio. Vini proventus ingens,
quem nemo sperare auferit unquam initio Veris. Adeo forte quæ tri-
tico, ac frugibus haud læta omnino tempestat est, ipsa vinetis, ac
orientibus uvis, vitibusque secunda magis est, ac felicior. Eruca, &
Bruchi hortos omnes medio Vere depopulati sunt; Redierant hi Æsta-
tis initio, at lenis aura ab Orientalibus oris adspirans cito in fugam

Supplem. ad Sydenham.

(+) In id etiam strenue incumbit Eruditiss. P. Saguens tot editis
operibus celeberrimus, elaboratumque opus brevi se daturum luci, in
quo causam pestis ab præfatis animalculis deducere nititur; ipse doctiss.
Author nuper pollicitus est in litteris ad Cl. P. Romam in Taurin. Ar-
chi-Gymnasio experimentalis Philosophiæ Antecessorem.

(a) Avis de précaution contre la Maladie contagieuse de Marseille
pag. 31.

(b) Lib. 3. acut. morbor. cap. 9.

illos convertit. Qui Hyeme, ac Vere proluserant vulgares affectus,
hosce adulta Æstate fatiscere penitus, inque Scenam sese prodere in-
termittentes febres adverteram. Sævire quoque desierant Æstate, sal-
tem mitiore flamine perficere cœperant Aultrini status. Nunquam
amœnioris Autumnu lætiora initia extiterant, aut felicioribus auspiciis
prope visa splendescere Libra. Iis ego sequentem protinus telam exor-
diar, cœptumque semel opus pro viribus persequar, non exiguo qui-
dem labore, nec tenui fortassis laude; Si quem Numina sinunt,
Auditque vocatus Apollo.

Constitutio Epidemica Taurinensis Anni 1721.

I. Instituto meo inhærens prægressam Constitutionem, qualiscum-
que ea fuerit, in fine cujuslibet anni describendi, eo liben-
tius id exequor, quod exacti nuper Constitutio anni ab ea, quam
superiori experti fuimus, toto pene cælo diversa uberem explicet
contemplationum segetem, quo nihil in re Medica tractanda utilius
unquam, tum rectæ medendi methodo, (quod Venerandi olim Se-
nis, idemque Magni illius Angliæ Cancellarii votum fuit, consi-
linumque,) appositum nil magis, aut accommodatum: Satque pro-
lixam dicendi materiem suggerat, quod alterum quoque magnam
profecto rebus lucem, ac perspicuitatem asferre poterit aliquando.
Deinde etiam animosum me effecerant magis, majoresque ad rem
sedulo, alacriterque gerendam, ac munus quod mihi perfolvendum
quotannis constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.

II. Ut igitur, ubi superiore anno desit Oratio mea, inde initium
ducam, blandiores unquam, amœnioresque Autumnu dies haud illu-
xerant diu, hiscentibus per intervalla ab Aquilonaribus Oris, tum ab
iis, quæ ab gelida Arcto ad Orientem declinant, lætioribus ventis, qui
temperato inducto frigore salubriorem temporum conditionem induxe-
re, silentibus omnino dirorum morborum, quos passi sumus, Paren-
tibus Austris. Plurima namque pluvia Septembris initio delapsa, mox
subsequens horridiuscula aura, quæ superiore Autumnu, perque hye-
mem dein, ac ante æstam æstatem se se prodiderant, exitiales febres
Variolarum, ac Morbillorum, quæ faciem illis prætulerant, vestigia
insequentes constitui, rite, diligenterque perficiendum, addiderant vi-
res, ac velut impulerant Eruditi quotquot in Italia, tunc extra
Italiam degunt Clarissimi Viri de re omni medica, ac litteraria
optime meriti, ad quos prima hujusce Telæ flamina, primaque stu-
diorum meorum incrementa pervenere.</

quidnam ex hoc dilucide, ac præclare magis nobis in hac re modo innotesceret. Sed de his alias: Neque enim fas est in ipso Orationis limine diutius extra orbitam divagari.

III. Prodigiorum vero, ut institutam semel Anatomicam cada-veris sectionem prosequar; Prodigiorum maximum, ac celeris necis causa penes Septum transversum latens in conspectum tandem sese prodidit, quod dilatatum aderat, immane quantum! Ibi potissimum quo intercostalis nervus ad imi ventris viscera abit. Per hunc namque ingentem hiatum, qua data porta viam sibi ultro in Thoracem fecere Colon, Pancreas, tum Epiploi magna pars. Plurimum in sinistro Thoracis claustrum effusi sanguinis ab disrupta Pancreatis vena conspicietur, ac sinister Pulmonis lobus totus pene sub scaleno musculo alce absconditus, adactusque. Quæ quidem omnia eo libentius a me adnotata sunt, diligenterque exarata, quo vera Colici sic dicti affectus Idea nobis elucescat magis, quæve tot sæculorum spatio Arabum mentibus excogitata invaluit, diu Antiperistaltici motus doctrina, ceu fictitia, ac mechanicis legibus adversa omnino, tandem aliquando obsolescat, aboleaturque, faciem ferentibus laudatissimis, tum in Anglia, tum in Gallia viris, qui detegendo in dies vero unice, ac gnaviter jamdudum incumbunt. Ad vulgares febres, quæ sub ipsum Æquinoctium, ac diu adhuc post ipsum toto Octobri, ac Novembri mense exeuntis Anni 1720. caput extulerant, me confero.

IV. Hæc quidem ut intermittentium indolem, ac morem totius decursu quodammodo prætulert, ingeniumque; Attamen quid insolentis, quodve re ipsa vulgare quidpiam, ac revera Divinum inesse iis ominabatur, præ se ferebant. Neque enim diuturniores adeo extiteret, quas quisque Medicorum jure merito suspicabatur, quasve futuras, vel ipsa quoque Anni temporis conditio suadere poterat. Dolor insuper intensus capitis, idemque assiduus febrilis paroxysmi affecta, eique sæpe proludens; Oculorum rubor; Pulsus parvi, humilesque; Ingens corporis jactatio, quid denique in ipso ægrotantium vultu, ac urinis facile conspicuum intuentibus, quid intime latens, aut superioris forte ludentis adhuc constitutionis residuum, aut illi quæ jam prope impendebat, antecurrens, quid inquam ab consueto intermittentium febrium genio, ac more diversum subluere significabat. Jam tum scilicet cudebantur mox eruptura mala, aut prope orientia eadem anteire cøperant, ac elucescere. Atque hæc quidem potissima esse debet solertis, ac diligentis Medici cura, ingruentium nempe morborum excursus sedulo adnotare, vel minutissimas circumstantias, ac occasiones castigatissimo examine expendere, atque uno verbo primam, ut aiebat Hippocrates, malorum originem detegere; Unde futuros rerum eventus magna sui laude prædicere queat, iisque occurrere.

V. Nec equidem omen fefellit exitus. Prope namque ingens illico, imminere solstitio, Erysipelatum numerosa cohors, tum intra Urbis muros, tum longe, lateque per universum agrum, atque ad finitimas usque regiones propagata est, silentibus tum temporis, aut saltem ferocitate deposita parcius sævientibus, præfatis intermittentibus sic dictis febribus, diviso velut inter alterutrum imperio, ac facultate ludendi. Raræ tunc, ac insensæ minus ægritudines cæteræ quæ appetente hyeme solent potissimum in Subalpinam gentem se se immittere. Omne adeo imperium sibi, potestatemque irascendi erogaverat præfata morborum progenies, infecta initio multis, funesta paucis.

VI. Ejus namque aderant moris, atque indolis, ut ludere magis quam sævire, lacescere potius, quam vincere velle viderentur. Favebat ludentibus læta hyems Austris perflata frequentibus, at qui mox subsequenti subfolano, aut altero quopiam e gelidioribus ventis terga dabant victoribus. Ludere ventos revera quispiam dixerit inter se invicem, se se vicissim excipientibus Australibus modo, modo Orientalibus, immitique Boreæ, atque ita reciprocantibus imperiis altero alterius iram coercente, sævitiemque. Præcæteris vero Orientales maxime a medio circiter Januario ad finem usque Februarii lenissime perflarunt, tranquillo, amœno, & sedato prorsus Cælo. Atque id quidem observare erat, quod cum primum hi spirare cøperant Septembri mense, fugatis illico Austris, qui heu luctuose nimis sævierant diu, exarata statim febres intermittentes prodire, quæ quidem rursus hiscentibus iterum Australibus ventis imminui, aut saltem mitius ludere videbantur; Recrudescere hæc vero dein, cum silentibus illis prorsus, Orientales perflabant, aut gelidus Boreas, quorum utrique eadem ferme efficacia concessa est, quia eadem, simili-que ratione condensatum, ac frigidum aera ex vicinis montibus adferunt. Sæpe etiam memini medio Vere, aut impendente prope Æstate in nostris regionibus, iisdem perflantibus, tum Orientalibus præcipue, frigus plerumque recrudescere magis; Quod evenire arbitror, cum nives in toto excello Alpium, quæ ad Boream imminet, tum abrupto Apennini tractu jacentes, altiori Sole facto liquecant, frigidaque partes in nostrum aërem vehunt. Quantum namque frigus immittat Atmosphæræ nix, vel glacies soluta præclaro experimento inde demonstrari potest, quod spiritus vini rectificatus nivi adfusus tantum gelu efficiat, ut liquor aqueus in propinquo mox in glaciem convertatur.

VII. Hosce inter ventorum, ac morborum lusus cernere erat modo Erysipelata, modo exaratas febres intra suum se se alveum condere, ac prope extingui; Nullus vero præfatis febribus, etsi ingruente hyeme in fugam verti viderentur prorsus, nullus inquam iis negaverit unquam omnium, qui labente anno erupturi erant, morborum principatum, ac veluti prædominium. Quisquis namque morborum circa æquinoctium autumnale maximopere furit, is totius anni constitutioni nomen impertit suum; quod a Doctissimis Viris jam diu adnotatum scio: atque ob id forte mos erat Hippocrati Constitutiones Epidemicas, quas sermone elegantia deo, atque ad rei naturam appposito exaratas reliquit, ab Autumnali Æquinoctio inchoare, prope occidentibus Vergiliis. Nec insolita quidem res est Epidemicorum Principem, qui sub Æquinoctio Autumnali præcæteris invaluit, initio hyemis mitius lacescere aliquando, cum ex adverso, ut recte advertit Magni nominis Vir Sydenhamius, (a) Epidemici inferioris ordinis, qui sub eo merentur, tunc temporis præsertim ingravescant, & rerum potiantur, donec dictus anni Princeps eorum vires frangat, & deleat nomen. Hujusmodi aderant memorata Erysipelata, quæ ludentibus vix orta hyeme Austris caput extulerant. Cøperant quidem illa primo paucos tantum invadere; mox vero ceu rupto agere torrens in apertum magis erumpere, hosque atque illos nullo

discrimine aggredi, nec Civibus modo, sed & universis pene Subalpinis gentibus infensa, atque illis præsertim, quæ iis in locis degebant, quæ ab Australibus ventis verberari magis consueverant. Quod vel ipsa intra Urbis mœnia advertere erat. Ea namque parte numero-fiore agmine sævire illa visa sunt, quæ meridiem adspicit, nova Urbs dicta ab Immortalis memoriæ Principe CAROLO EMMA-NUELE SECUNDO inchoata; aucta dein, perfectaque ad Piissima, atque ad Magnarum Principum, ac Reginarum exemplar nata MARIA JOANNA BAPTISTA, tum ab AUGUSTISSIMO REGE NOSTRO VICTORIO AMEDEO, præclara Domorum structura, eleganti Viarum amplitudine, editisque Templorum cervicibus nulli pulcherrimæ Urbium secunda. Ea scilicet ventorum indoles est, ut sive leniter, mitique flamine spirent, sive rupto ceu turbine, feræque miscentes murmura præcipientes ruant, quidquid in altum tollitur, ac inane per æthera fertur, secum una ferant per mille ad ipsum vias, ac itinera mille necem hominibus adferre potens. Ut vero in universum exitialis magis Boreas ne aut sævus ab alto ruens Aquilo, an circa terram serpens illi oppositus Ausfer? an qui ab ortu incumbunt, aut qui vespere ab atro confurgunt, decernere nemo ausus adhuc, cum lethiferos quisque effectus induxerit sæpe; tum maxime cum vel diu nimis, vel minime servata temporum lege dire, crudeliterque delæviunt? Ediscere id quidem, ac prænocere par ille unice erit, qui locorum positiones, temperiemque Cæli uniuscujusque Urbium propriam recte expendit, tum plures una invicem observationes, Astronomorum more, ac exemplo, instituerit diu, aut rite contulerit institutas.

VIII. Utque Erysipelatum morem, quo ea scilicet pacto eruperant, fusius, ac propius exponam; Plerisque illa absque ullo produlente signo in hac, aut illa corporis parte inopinato apparebant. Aliis vehementissima febris prodituro Erysipelati faciem tulerat, eratque jam prope erumpere impendentis Erysipelatis indicium certissimum, ipsa remissa extemplo febris, deficientisque. Ejusmodi aderant febres, quas revera erysipelatosas dicere fas est, quæ superioribus annis, cum latissime sævientibus variolæ cumulatissimam edidere stragem, hisce præire consueverant, ac prope jam eminentes prænunciare. Eruperant autem in vultu potissimum; Nonnullis humeri, aut crura obsidebantur. Statim vero ac detumescere videbatur facies aut quælibet alia affecta pars; Conturbari hinc cøperat leniter alvus, atque hoc pacto intra paucissimos dies morbus integre absolvebatur. Haud paucis hæmorrhagia primis periodis e naribus prorumpens felici fidere restituit rem. Huic proludebant Hypochondria dura, tumida, dolerosa, aut intensus capitis dolor, aut oculorum rubor, aut tinnitus aurium. Cæteræ quæque Crises, quas sæpe moliri Naturam novimus, iisque morbo exitum dare, aut impares prorsus aderant, aut illas experiri malum. Totum quod erat artis opus, in eo innitebatur, ut ipsa Medicatrix Natura eo libenter contenderet, quo duci annuebat. Quod si oneri ferendo impar foret, haud deerant Medentibus Artes, quibus labentem erigerent, ac sublevarent, quo læta dein crisis per eas, quas ostenderat illa vias, succederet.

IX. Et sane haud paucos memini nullius Artis ope, sola Medica-trice Natura sanatos: Haud exigua saltem spes salutis erat, totum concedere opus Naturæ, aut ejus motibus per opportuna remedia obsequi. Equidem ut in morbis omnibus, ita in acutis potissimum, tum in Erysipelate præsertim, ac morbo omni inflammatorio haud exigua Medico opus est doctrina, prudentia, & sagaci cunctatione, imo religiosa naturæ motuum observatione, aliter perniciosi nascentur errores. Magna utique Sapientiæ pars est mentem a præjudiciis liberam servare, nec dirigentis Naturæ motus per intempestiva Medicamenta prævertere. Novit id unum Magnus Hippocrates Jatricæ facultatis Parens, atque ex illo celebri Macrobii elogio fallere nescius, & falli, qui diversis passim in locis, tum præcipue in libro de veteri Medicina, qua summa incumbendum sit prudentia, & circumspeditione in re Sacra tractanda, sic ille vocat medendi Artem, præclare admonet Medicos, quorum plerisque jam tum temporis idem in se admittente noverat, quod imperiti Navigantes: Etenim, qui in tranquillitate, ait, navim gubernantes delinquant, manifesti non sunt; At si ventus magnus, ac tempestas ipsos deprehenderit, tunc conspicui sunt palam omnibus hominibus, quod ignorantia, & erroris sui culpa navim perdididerint. Pervenistam, pulcherrimamque de hoc argumento Orationem olim in Patavino Lyceo habuit Clarissimus Ramazzinus, quam una cum cæteris ejusdem celeberrimi Viri operibus Genevenses Typographi superioribus annis edidere.

X. Atque hic loci mihi de Erysipelate, tum in universum, tum in specie, ejus scilicet quod tota in Urbe, atque Agro tunc temporis sæviebat maxime, verba facienti, in mentem subit Consilium Medicum, quod Latino Carmine nunquam satis laudatus Vir exaravit ad præclarissimum nostri sæculi Poetam diro hujusmodi in cruribus Erysipelate laborantem. Quam pulchre, quam eleganter, quam docte Divini Senis Oracula elegiacis versibus expressit, ac prope dixerim illustravit! Hos ego haud abs re futurum duxi Orationi meæ adnectere, ceu gemmam, aut monile quodpiam eximii fulgoris.

Ad Illustr. & Rev. Dom. Abbatem

MICHAEL EM CAPELLARIUM

Poetam Celeberrimum Erysipelate laborantem Consilium Medicum.

„ C Rura Tibi, ut scribis, dirum Erysipelas adurit,
„ Vir bone, nec reperis qui levet arte malum.
„ Plurima promittent Medici, namque id Medicorum est,
„ Sed Tu ne fidas, nam dare verba solent.
„ A pingui, atque oleo, veluti cane (b) & angue caveto,
„ Unguina succenso dant alimenta foco.
„ Pingua quin faciat partem (c) putre re perustam,
„ Nasceturque ulcus, quod cæchoetes erit.
„ Nec minus herbarum succos apponere tentes,
„ Crura nec ut mos est, lacte fovere velis.
„ Talia quippe nocent, coguntque recurrere morbum,
„ Qui ex imo ad funimum proliciendus (d) erat.
„ Quid faciam ergo inquis? Tu iustine, & abstine, talis

De-

(b) Hipp. de affect. n. 57.

(c) Hipp. 7. aph. 20.

(d) Id. 6. Aph. 25.

(a) Morb. acut. sect. 1. cap. 2.

Decubitus criseos est, mihi crede, loco.
 „ Interea in lecto recuba, & suffusa rubore
 Aere ab externo membra tuere precor.
 „ Sic etenim poterit sensim expirare quod urit,
 Hæc sat nota Coi sunt documenta Senis.
 „ Tute ergo observa ac tristes animo expue curas,
 Sitque bene ut valeas unica cura Tibi.
 „ Noli dum langues, Musis, Phœboque videri
 Tam charus, quin sis charior ipse Tibi.

Aureum itaque hoc maxime præceptum in mentem sæpe revocandum, tum in Erysipelate curando præsertim, quod ideam amico Poetæ laboranti consulebat Vir Doctissimus: *sustine* nempe, & *abstine*; Talis enim decubitus Naturæ victricis conamen est, ac criseos loco, quam si alio avocare contendis, *putredo*, ac *suppuratio* expectanda illico, funesta quantum!

XI. Totum ideo, ut quæ semel dicta sunt, iterum repetam, credendum aderat Naturæ opus, cum præsertim, quod moliebatur, conficiendo muneri par illa foret, nec administram Medici opem efflagitaret. Advocanda utique quandoque erat in auxilium Ars, quæ quidem copiosa celebrata semel, aut etiam repetita, si vires tulerint, Sanguinis missione e cubiti Vena, aut e Saphena, ubi opus adesset, hoc uno plerumque subsidio *utramque*; ut ajunt, *paginam* adimplebat, tum apparente nondum, aut prope jam eminente Erysipelate, tum etiam ipso jam adulto pene, nedum tamen remissa penitus febris, aut alio quopiam adhuc perseverante, quod urgebat magis, ferro, immitte Symptomate. Hæc una aderat posterior solertis Medici cura; Quod reliquum erat fauste id celeriterque absoluebatur quiete, victu tenui, liquido, antiphlogistico, potu simili, medicamentis diluentibus, & refrigerantibus simul, vel singulari dote acri specifico opposita præditis.

XII. Hostile namque acre illud Austrinis flatibus elatum, quod idem superioribus annis diras pepererat ægritudines, id ipsum, si quid ego hic judico, nedum subactum penitus, diversi tamen generis particulis commixtum, quas gelidus Boreas superiore Autumno præmaturatione attulerat, cruoris rubri arteriosi, inque minimis canalibus stagnantis attritum efficere par erat; atque hinc *phlogosis* inducere, vel in finibus arteriosis, vel in vasis lymphaticis arteriosis, dilatatis oculis, admissos globulos rubros per fines transmittere non potentibus. Quidquid enim erodendo, crispando, adurendo vasorum extrema ita arctat in Conicis, Cylindricisve, ut diameter aperturæ fiat diametro Sphæræ Sanguinis minor; Quidquid cruorem aut lympham cogit ut coeat, aut eidem violentum motum præbet, quorum utrumque ab acriorum corporum præsentia explicari sat apte potest; quemcumque id inflammatorium morbum, Ignem, ut aiebat *Hippocrates*, aut *phlegmona*, qui omnes ob causæ, & effectuum similitudinem ab Igne nomen habent, genere satis est in minimis æque arteriis, ac Lymphæ ductibus. Ut enim in cruore rubra, sic in lymphæ alia est forte pars crassior reliquis.

XIII. Quoties vero inducta semel stagnatio liquidi in vasis est, five acre illud specificum, five aliud quodcumque sit quod lympham aut cruorem cogat, finesque vasorum urat, erodat, aut distrahatur; Acti adhuc ab superstite vita cruoris vis, eos ipsa effectus inducere par est, erupturi, aut prope jam erumpentis, aut erupti tandem Erysipelatis, aut phlegmonis prologia, ac incrementa: Arteriæ namque primo minutæ, vixque visibiles obstructæ jam a Sanguine distendente augentur; Hinc tumor ruber, five prima Erysipelatis Scena. Vasa mox lymphatica arteriosa antea, pellucida, & invisibilia eadem patiuntur; Unde augmentum rubedinis; Distenta dein vascula rupturæ propinquant in fibris minimis, ac valde invicem compinguntur liquida, & solida; Hinc dolor punctorius, durities, renixusque partis adulto jam prope Erysipelate, adausque. Cætera hinc repetenda Phænomena, rubedo splendens, calor, æstus, debilitas, molestia, febris, ab attritu partium liquidi inter se in solidum, tum solidi in illas, ab rubro accumulato, ab irritatis fibris, ab celerius per aperta viarum actio sanguine, Mechanicis hæc eadem omnia legibus præclara, atque illustriora.

XIV. Exorientis hæc adultique Erysipelatis prologia. Posterior illius Scenam exegerat Natura, quod inciperat illa opus, absolvens: Id vero resolvendo potissimum assequatur, qui idem lætissimus ac tutior modus est, quo morbi inflammatorii exire solent. Obque id præcipue Artis Magistri, ac Principes Viri ab oleosis ac pinguibus, tum topicis, quæcumque ea sint, refrigerantibus, anodynis cavere jubent; ne aut pinguior factus humor, ac spissior, effusus idem, tum glutinosus magis suppurationi præbeat faciem, qui alter modus est quo terminatur inflammatio; aut retropulso forte, inque parte affecta hærente adhuc atroque facto magis, *gangræna*, aut *Scirrhus* oriatur, tertius illa, hic quævis abeuntium inflammationum finis. Hinc ubi sæpe occulta manent Erysipelata, atque intima illa obsident delubra, in acutas, aut lentas ægritudines desinunt; Velocis eadem aut lentæ mortis causa, cum scilicet, aut in sphacelum, five ut ait *Duretus* Subalpinorum Medicinæ decus eximium, in *Systrophes phlegmonicæ* abeunt inflammatae partes ut in lypiria febris, seu, ut illam vocat *Baglivius*, *Erysipelate* alvi; aut coacta eadem forte in glanduloso tuberculo iners materies in Scirrhum tandem degenerat, qui ut Sphacelo, gangræna, carcinomati idem, seu cancro a similitudine sic dicto, præludit inevitabili fato, ut in diuturnis obstructionibus glandularum contingere sæpe videmus, post assiduas febres neglectas, aut male curatas, atque earum præsertim glandularum, quæ liquorem facilius inspissandum obtinent, vel ratione loci stagnare plus cogunt.

XV. Mihi equidem numerosam adeo tunc dierum latissime oberrantium Erysipelatum cohortem vix ingruente hyeme extemplo editam adultamque animo reputanti, haud inanis utique metus subiit, ne forte appetente Vere acriora facta spicula, sævientibus maxime atque una invicem assiduo more inter se confligentibus Australibus, ac Borealis ventis, dirioribus malis ortum præberent, ac incunabula, quibus jam tum proludere illa videbantur. Metuendum scilicet ne hujusmodi *Systrophes phlegmonicæ* intra pulmones tandem, seu in Principe Theatro subluderent aliquando; Statim atque hyberno exacto frigore, ac novo concitato tumultu in liquidis aptior foret præfatis, exoticis particulis aditus, quo intra eademmet liquida ea, qua pollebant diu, crudelitate sævirent; Notum jam tum scilicet erat perspectumque mihi, quam mala cubaret in præcordiis labes. Nec vanum utique, atque inanem prorsus metum effecerat ventorum

Suplem. ad Sydenham.

una ludentium indoles; Utriusque enim flatus sæpenumero Subalpinis potissimum exitiosi extitere, tum maxime, cum se se vicissim excipientes, atque alterno ludentes flamine varias, ac discrepantes inter se invicem alterationes aeris gignunt. Cum vero aereo hocce fluido nobis circumfluo, tum liquida, cum solida æquilibrii perennitatem illius acceptam ferant, quo vita ipsa cœpit semel, ac servatur diu; Sitque inter duo hæc nostri corporis componentia, liquida nempe, & solida ipse aer veluti libræ *canon*, atque *examen*, cui utraque parent, ac obsequuntur. Conspicua res est alterato libræ *canone* servatura eadem haud amplius esse instituti æquilibrii legem, ac proinde tot inter discrimina rerum jure merito suspicari fas esse imminente propius vere nova oritura mala, quibus nigram faciem jam tum præbuerant ludentia passim Erysipelata, tum pronis heu nimis hoc anno ad *Stasin* cruor, tum quæ *Epidemici primi Ordinis*, seu anni Principis Morbi dignitatem sibi comparaverant exortæ paulo ante Arcturum febres, quas etsi intermittentium plethasque morem servasse meminerim, quid tamen *Sacrum* ac re ipsa ingens inesse iis, solertibus Viris jam tum visum aderat, perspectumque.

XVI. Sane ut ab Erysipelatum narratione ad exaratas febres gradum faciam, exercitationibus utique haud imposuerant illæ, vel primo sui initio, quippe eam, quam præstulerant primo adpectu faciem, facile conjicere erat simulatam esse; subque ea larva, ac simulationis artificio magnum latere aliquid se se manifestius ostensurum aliquando. Enim vero cum nihil hujusmodi unquam superiore anno contigerit, eruere erat statum liquidorum toto jam penitus Cælo discrepare ab eo, quem ipsamet liquida dudum obtinuerant: Ad *Stasin* scilicet magis illa vergere, eaque proinde præcavenda mala, quæ ab prono ad concretionem sanguine ortum ducere novimus: Atque hanc quidem novam rerum Scenam induxerat nova anni Constitutio appetente Libra, statim atque hircere cœperant ab gelido Aquilone Septembri mense flatus, qui diathesin Aeris extemplo prope immutarunt.

XVII. Memini quidem me plures tum temporis de iis quæ Subalpinis prope impendebant currentis decursu anni, ægritudinibus, sermonem habuisse cum celebrioribus Artis Magistris; quos eximia mihi laudi foret debita honoris præfatione singillatim recensere, si prolixior me esse sineret dicendarum rerum magna seges, ac dignitas. Edoctum fecerat antea superioris anni Constitutio, quæ a sanguinis fluore, quæ ex adverso ab eodem ad fixitatem ac lentorem properante, quæ rursus ab hac vel illa aeris crasi timenda magis, ac prævidenda sunt. Ecquid autem perspicuum magis, quam ab tendente ad concretionem sanguine ea quidem prænosceret, ac prænunciare, quæ a minus veloci tramite progredientibus liquidis, hinc ab consueto eorundem more abludentibus solidis necessario subsequi, atque expectanda esse Mechanicæ nos leges docent, quibus tum liquida, tum solida inter se invicem eleganti ludunt spectaculo? Ut exacto anno prodierant mali ingenii febres, tum quæ sub iis merebantur spasmoticæ ægritudines cæteræ, illæ a sanguinis fluore ortæ, hæc ab exorticarum particularum spiculis, quas una secum invexerant dire, ac diu sævientes Austri; Nova modo rebus inducta facie a priori diversa prorsus, nova quoque morborum proles caput extulit, quos anteire, ac cœu prima acies celeritate vincere visæ fuerant recens enatæ Autumno febres. Tantum scilicet adhuc intra liquida res erat brevibus circumscripta finibus, propagata nondum ad solidas partes labbe. Et sane ut parva sæpe scintilla magnum excitavit incendium, novæ hinc, totque ortum duxerant ægritudines, quæ omnes quidem ab uno fonte progesserunt, una omnes, ac eadem methodo profligandæ, etsi pro diversa, quam induerant, larva inter se invicem differre quodammodo viderentur.

XVIII. Enim vero si præfatas febres attentius expendere quispian, si harum ortum, ac incunabula, morem, ingeniumque, otiose singula, & considerate perpendimus, atque hæc omnia in animo vere cogitamus, nullam prorsus illas inter ac febres intermittentes, ita vulgo dictas, originis affinitatem comperimus. Sic quidem illas vocare lubet ab intervallo paroxysmi interjecto, ut morem Practicis veteribus geram, quibus olim appellationes febrium, quibus dignoscuntur, a qualibet sanguinis alteratione, vel symptomate particulari desumere satius visum fuit, quæ diversæ speciei febribus pari jure possunt competere. Quidquam tamen inesse iis peculiare, arcanæ anni Constitutioni referendum, nilque penitus cum intermittentibus vulgo dictis commune, aut hisce proprium tum ipsa febris indoles, tum quæ sub illa ludebant per hyemen Erysipelata, ad quorum aspectum sese illa toties abscondere visa est, tum quæ deinceps proximo Vere, ac æstate sese prodiderant ægritudines, aperte satis ostenderant. Nec quidquam vetat *Erysipelatosas* nuncupare, aut si mavis dicere, *Igneas*, ab urente sensu caloris, inducta in liquidis stasi; *Hemitritæos*, five *Semitritæas* dixere Veteres, de qua febre doctissimum vide *Duretum*, in Coac. & suum, quem ita bene commentatus est *Divinum Senem* 1. *Epid. com. 3. aph. 5.* Neque enim abs re erit hæc febres concipere, seu accensionem quandam erysipelatosam cruoris ad fixitatem vergentis, qui idem statim ac perflantes Austri rarefactum magis aera effecere, ante acti lentoris vestigia in hac, vel illa externa corporis parte deposuit. Ubi vero denuo hircente Borea constrictus magis, condensatus ac compressus aer evadebat, docente Barometro, eadem iterum redibant febres, intra ipsamet liquida rursus sese condente igne; Qui idem aut Phrenitides plerumque, aut funestas huc illuc *Systrophes* ludens pepererat.

XIX. Ac revera intervallum illud Paroxysmi interjectum larva erat, seu simulationis integumentum, quo incautiores aliquando hujusmodi febres fefellerant. Cernere erat in hoc apyrexia statu, si modo ita dicere fas est, ægros, non ut mos est in cæteris febribus, pene omnino sublevatos pleno inter duos quoque paroxysmos intercedente intervallo, ast potius vexatos pene dixerim magis, anxios, pervigiles, sticulosos, ore, oculis, ac fronte turbatos; Pulsus aderat parvus, humilis; urina impense rubra; tensus capitis dolor, dirus, ac immitis prorsus, æque ac sub ipso febris statu, ac incremento; Nullus quoque tum accensionis initio vomendi conatus, aut ullum vel levioris nausæ vestigium, quod hærentem in primis viis mali fomitem ostenderet, quam citissime removendum; tum declinante paroxysmo emergens sudor, quo apparente solent intermittentes febres per vices finire. Summa namque rerum, ac potissima morbi causa a Phlogistica liquidorum crasi, ac proinde turbato eorundem progressu repetenda erat. Quod quidem probe distinguere, tum probe no-

scere opus aderat, ut inde curativæ indicationes rite dirigerentur; Aliter exulcerabatur magis res, stupente Medico, ac morbi malignitatem perperam accusante. Neque etiam, ne quis me immemorem prorsus credat, ac retum, quas sub oculis habuimus nuper. oblitum, eadem aderat singulis æqua rigoris accessio. Quidam enim exiguo horroris vestigio, plerique valde sensibili rigore cortipiebantur. Nonnullis primo tantum accessu, ac febris aditu, haud paucis ad singulas accessiones, ac vices idem rigor, ac horror supervenit. Horum plurimi toto apparentis Apyrexia decursu molesto quodam frigoris sensu detinebantur, pulsu vix elato, cen exquisita tertiana laborantibus aliquot ante accessionem febris horis contingere solet. Quidam etiam properante ad exitum morbo, una cum judicatione majori horrore obriguere. Sæpe id latentis diu vomica inopinato disruptæ præludium extitit; Autumno quidem, ac per hyemem omnino pauci: Vere, ac æstate longe plurimi, Vix quenuquam novi absque sanguinis e naribus, aut ab hæmorrhoidalibus venis profluvio sanatum. Utrique horum conturbata sæpe alvus prolusit, aut quod inchoaverat opus, absolvit. Quibus nihil hujusmodi obigit. Phrenitide per hyemem, ac Veris initia correpti sunt, quorum neminem servatum vidi. Orto autem Vere plerisque lata pulmonum suppuratione, dummodo in docti, ac solertis Medici manus inciderent, incolumes evasere. Quæ quidem sequentibus ægrotum recensionibus illustriora efficere pergam.

Æger Primus.

Sutoris Uxorem, propter Regias Archigymnasii Ædes degentem, quas superioribus annis vix confecto bello, magno ac Regedigno sumptu e fundamentis erexit, atque hoc ipso An. MDCCXX. XIII. Kal. Decembris festissima pompa, omnique lætitiæ apparatu, Musis referavit INVICTISSIMUS REX, ignis, ut Hippocratis verbo utar, hoc est vehementissima febris cum rigoreprehendit. Huic inter exordia intensus capitis dolor corripit, lumborumque, ac præcordiorum dextrorum, quæ quidem mox fluentibus mensibus alluvata sunt. Sexto die rursus suborto rigore exasperata sunt omnia. Somnia non aderant, extrema frigida, pulsus parvus, sitibunda erat, adusta alvus pauca demittebat. Septimo pulsus elatior, urinas reddidit impense rubras, levius habuit. Octavo rediit rigor, capitis lumborumque dolores intensi magis, lingua sicca, urens, fuliginosa. Nono quievit. Undecimo sub noctem conturbata est alvus, multaque prodire cum bilioso affluxu. Decimo quarto perturbata iterum alvo perfecta judicatione absoluta fuit.

Æger Secundus.

Mulierem quandam gemellas laboriose enixam, cum non admodum partus purgamenta processissent, primum quidem febris corripuit horroris sensu haud exiguo; Mox capitis, & cervicis gravitas non sine dolore tenuit. Postridie moleste habuit, non dormivit. Tertio die repetiit una cum rigore febris, pulsu parvo, humili prorsus, abjecto, præcordiorum anxietate magna, siti multa, inordinate quidem, & inconstanter perturbata, rursusque consistente alvo. Septimo paulo elatior pulsus; sub Vesperam febris rediit, exiguo præludente rigore. Octavo lochia repente fluere, atque uno, eodemque temporis momento latis pustulis subrubris fœdari viscutis, ad tertiam usque vicem sese ostenderant, condebantque vicissim. Capitis mox, ac cervicis dolor remiserat. Quievit. Undecimo copiose adhuc fluentibus lochiis integre convaluit.

Æger Tertius.

Præsul dignissimus, qui juxta Dianæ Templum, nunc Sacram Confraternitati Sancti Spiritus ædem decumbebat, febris acuta correptus est cum rigore. Lingua resiccata, erat siticulosus, bile abundans, somnum non cepit. Postridie vix horum vestigium aderat. Tertio, quinto, ac septimo per vices repetiit febris una cum intenso dolore capitis, qui interjecto paroxysmi intervallo augebatur magis, quin etiam vix elatus pulsus toto Apyrexia tempore percipiebatur. Nono in sinistro femore splens rubedo apparere visa in Orbem veluti, ceu lata macula paulo supra femoris articulationem cum Tibia, quæ cito priorem deferens locum in superiori femoris parte sese prodidit, mox in ejusdem lateris Tibia haud longe a malleolo interno, Thaleri Imperialis magnitudinem haud multum superans, Erysipelas volaticum appellant. Decimo quarto copiosa e naribus hæmorrhagia superveniens morbum feliciter absolvit. Huic alvus ab initio continenter biliosis liquidis multis difflebat, aut si consisteret, fetida, & cruda deiciebat. Urinæ per totum morbi decursum rubræ admodum sublimis quid in medio suspensum habentes.

Æger Quartus.

Nobilissima Mulier, quæ prope Collegium Patrum Societatis Jesu habitabat, ut filiam enixa est, nec purgationes irent, eam tertio die acuta febris cum horrore corripuit. Octavo deliravit, statimque ad intelligentiam rediit. Undecimo per intervalla soporis quadam specie detinebatur. Sub noctem extrema paulum perfrixere, sed mox recaluit: Mente non nihil mota est media nocte. Duodecimo sub tempus matutinum latenter obiit. Aperto cadavere plurimum grumosi sanguinis in cavo uteri repertum, tum vasa quæque uteri sanguinea distenta valde, ac fere varicosa; Intestinorum externa facies atro suffusa colore; Hepar prægrande admodum. Potissima vero mortis causa in dextra uteri tuba sese prodidit, ubi disrupti recens tumoris vestigium aderat, ac inundantis adhuc materiæ albæ, fœdæ, teterrimæ. Plura mihi quoad morbi historiam, tum anatomicam cadaveris administrationem scire haud licuit a Medicis, qui tum curationi, tum sectioni intererant. Sane ejusdem, ac reliquæ, quæ tum temporis sæviebant febres, indolis hanc fuisse, qua nobilissima Mulier fato cessit, fidem fecerat indubia Archigenis conjectura, tum quæ in cadavere obviam venerat puris copia, disruptus Tubæ abscessus, vasorumque per uteri substantiam repentinum varicosa tensio, a lentescente cruore, unde phlogistica primum labe, mox suppuratio ortum tulit.

Æger Quintus.

A Dolefens tum illustri stemmate, tum morum candore, ac probitate præclarus, qui prope Templum B. V. Angelorum, de-

cumbebat cum ejusmodi Erysipelate, cujus supra memini ægrotio scito per Autumnum laborasset, quo crura modo, modo pubes, ac finitima Scroto partes infestabantur; Mox auriginosus extemplo factus, acuta dein febris, extrema hyeme, quæ cum exiguo rigore primum, mox absque ullo rigore per vices repetiit, correptus fuit; Pulsu vix elato, qui idem per totum morbum permanerat, magna capitis gravitate, siti ingenti, adusta alvo. Quod posttemum quidem in omnibus fere hujusmodi febribus ægrotantibus adnotare erat. Reliqua, quæ ad morbi decursum pertinebant, cum ea distincte unquam scire mihi concessum haud fuerit, reticere magis lubet, quam exarare. Sexto ingenti oborto stertore celerime periit, enata forte, ut ego suspicor, ac propagata ad pulmones labe, quæ tum per hyemem simulate incedens proximo mox Vete larvam abiecit.

Æger Sextus.

Jurisconsultum juxta Theatinorum domum, qua ad forum itur Orlitorium, febris a cœna vehemensprehendit; Noctem laboriosam transiegit. Postridie per totum pedem ad talum usque tumor subruber, acensus valde apparuit, cujus in centro atrum quid aderat, ac subnigrum. Infania correptus est; Ex alvo mere biliosa plurima processere. Paulo post convulsionibus a capite subortis celeritate interiit. Ingenii erat tetrici admodum, atroque vultu, absque hominum consortio omnino alienus, ceu Mysanthropos alter.

Æger Septimus.

Pari quoque etsi veloci minus fato sublatus est piissimus Sacerdos Congregationis Oratorii Divi Philippi Neri, mihi amicissimus; Is cum initio hyemis diro cruris Erysipelate laborasset, paulo post, medio scilicet Januario desipere leviter cepit, mox in furorem repente agi una cum febris acuta stas vicibus repente. Urinæ aderant pallidæ, decolores, tennes, atro quodam in iis suspensio, quod in acutis plerumque morbis Phrenitidem præfigere solet; Oculi protuberantes, trucesque; Facies tetra, vultuosa, horrenda aspectu; Lingua, pulsus durus, respiratio rara, & magna, fæces albæ, collectio floccorum. Præcesserant hiæ somni turbulenti, Stillicidium narium, oblitio subitanea, alvus suppressa diu, ac moror ingens tum prope imminentis, tum præsentis mali præludium idem, ac comes. Rogatus ego una cum Parente meo, ut ægrotanti opem præberem, ejus sententia, & auctoritate nihil præsentaneum magis visum fuit, quam ea citissime validissima remedia adhibere, quibus tolli posset inflammatio ad cerebri arterias orta; Missiones nempe sanguinis repetitas, diluentia ex decoctis antiphlogisticis, nitrois affatim exhibita, pediluvia, Epispastica, Cucurbitas, clysmata, & his similia, quibus ex voto obigit ferocitatem morbi compescere; apparente iterum ad crura Erysipelate, cujus præsentia, ceu lato enitente fide exarata symptomata quæque mitius extemplo lacefere, ac dein sese subducere prorsus visa sunt. Hæc una namque salutis spes erat materiam morbificam, ut cum Practicis loquar, in parte Principe dire ludentem, quam vincere prorsus haud poterat Ars, ad crura revocare, quo illa primum erroris sui notam reliquerat. Atqui evanescens brevi recens ortum Erysipelas, omnemque deinde eludens Artis opem sævioris mali omen tulit. Facta namque ad petus indomiti humoris metastasi, inque exili pulmonum membrana, ac tenelli vasorum reticulis oborta phlogosi, lethalis Peripneumonia impedito sanguinis tractu successit, quæ nullum faciendæ amplius Medicinæ locum reliquit. Nil melius bona crisi; Nil pejus, & mortiferum magis, quam prava metastasis, vel egressionis progressus ad pessimam Epigenesin. Mala enim orta malis gravissima inferunt mala, quæ sunt veluti soboles quædam tum Phlegmones, tum qualitatis malignæ, & partium oppressarum.

XX. Atque hæc sunt selectiores Ægrotum historiarum ea, qua passim in adversariis festinante calamo exarata fuerant, styli perspicuitate, ac brevitate, quod in historica narratione potissimum expetitur, conscriptæ. Quæ quidem haud exiguum lucem affertent, tum iis quæ superius attuleram, tum quæ adhuc dicenda manent plura, per Autumnum, ac hyemem gesta, perque totum dein currentis anni decursum. Enim vero, ut de harum postrema tantum eloquar, quantum ab hac una lucis in morborum successione dignoscendis, præcavendisque, quam sibi illustrandam, exornandamque Spartam constituerat seriore Libitina dignus illustris Baglivius; Quantum inquam lucis, claritatisque eniteat nemo non videt. Equidem magna hæc est Sapientia laus morborum conversiones, non leves illas utique, & parvi momenti, quæ frequentissime occurrunt, & succedendi progressum, ac normam constantem servant, at quæ vel solertioribus sæpe negotium facessunt Viris, futuras nosse, ac velut especulâ prævidere; Sæpe hinc novum orientem, aut recens ortum morbum vel ipsa inter exordia reprimere contigit auspicio.

XXI. Timendas morborum successiones scite non minus, quam docte admonuit ex Galeno Ballonius, ac diu olim, qui utrique præluxit, Magnus Artis Dictator Hippocrates; Timendas utique, atque eo magis considerandas, quod hæc inter conversiones, ac transmutationes morborum multa passim symptomata contingant, quæ bonis, & eruditis Medicis ob similitudinem, & fallaciam per sæpe imponunt, & novi morbi tanquam rediviva soboles, ex aliis subinde consequantur, atque repullulent. In universum vero calamitosior est morbus, qui alteri succedit per metastasim materiæ morbificæ in Partem Principem fractis jam viribus. Nemo namque dubitat, quod materia prioris morbi mitior sit, quam secundi, per metastasim nati.

XXII. Nec difficile erat conjicere tot inter nova orta mala imparem, ac prope effœtanti Naturam haud posse amplius diuludentis impetum eludere, illius vim fetitatemque compescere. Simile quid olim Panormi obtigisse memini Præclaro Equiti Triremium Præfecto, cui ad tertiam usque vicem enotmem Tragœdiam dirum luserat in crure Erysipelas, totidemque illud vicibus gravior alter morbus exceperat, quo tandem, nam auxiliatricis Artis ope, an Naturæ potius victricis auxilio incertum adhuc, utriusque saltem beneficio, conturbata sponte alvus, tum copiosa contingens ab hæmorrhoidalibus venis sanguinis evacuatio, desperatam jam pene rem opportune restituit. Nihil autem hujusmodi, quidquid molita fuerit Ars, Piissimo Viro contigit; Errabunda namque materies vix erroris monumenta prodidit; Magnum profecto lentoris argumentum, quo

quo ceu compede obstricta liquida haud poterant amplius in libertatem adigi, ac certanti Naturæ obsequi. Neque enim Criseos loco erat, aut imparem potius Naturæ conatum ostenderat recurrens ad crura Erysipelas, quod lethali tandem Peripneumoniæ *lampada* præbuit; nil namque paulum eriticum unquam. Pro morbi vero magnitudine impar heu nimis aderat Erysipelatis in crure vestigium; Ira *Temeni Nepti* (a) apud Senem Magnum, in acuta, & magna febre metastasis facta est ad digitum, & mortua est, cum non sufficeret ad suscipiendum exigua adeo pars quiddam expellere Natura tentaverat. Cœperat ipsa quidem, nec potis fuerat inchoatum motum absolvere, infausto prorsus iudicio, exituque infelici: Ceu cum exhibitum olim venenum post multos annos, derepente exorto in parte aliqua externa dolore homines celeriter extinguit. Atque tunc ego quidem cum recurrere vidi Erysipelas absque ulla alia manifesta crisi, dirioris mali omen adstantibus haud sine magna Artis laude prænuñciavi (b) *Avicennæ* consilio edoctus, cuius utique fraudis, & inemendabilis doli infinita prope exempla legere est apud *Hippocr.* & *Galenum*, aliosque Medicinæ Principes, atque Antesignanos. (c)

XXIII. Dignaque fane quæ attentius expendatur, hæc ipsa adeo rat tot invicem morborum conversio, atque successio. Erysipelati namque, quod primum in re proluxerat, Phrenitis successit, huic altera vice Erysipelas, atque huic postremo Peripneumonia, qua tandem vita defunctus est æger. Totidem malorum successionebus totidem quoque cernere erat ludentis una tempestatis mutationes obsequi. Cum primo enim Erysipelas præluxerat, Austrina Constitutio vigeat, quæ ad plures dies prope appetente Solstitio perduravit. Successerat hinc gelidus mox ab Aquilone flatus, ac tum quidem in Phrenitidem factus est transitus. Dein vero repetentibus Austris, Erysipelatis iterum in crure vestigia graviori morbo prælusere; Novo namque inducto repente frigore, Borealiū ventorum afflatu, postremum Tragœdiæ actum absolvit inopinato oborta lethalis ima intra præcordia *Systrophæ*, qua tunc dierum plures celeriter e vita migrarunt, atque hos inter Senes potissimum, tum qui serosa ad pectus colluvie conflabantur diu. Tot scilicet malorum transmutationes a diversa Aeris Diathesi, quod *Divinum* illud est, ac revera Sacrum Mortalibus, proficisciebantur, impendentium morborum prologia ac incrementa.

XXIV. Prope namque imminebat prævisâ diu nova malorum Soboles, quorum præcipua Scena intra Thoracis delubra parabatur. Prodire quidem jam tum per hyemen cœperant exitiales pectoris ægri-tudines, at errantis potius in morem nedum auferant adhuc sese palam, apertoque Marte prodere. Nondum enim larvam abjecerant penitus exortæ Autumno febres; Quinimo attollere hæc magis caput properante Vere visæ sunt, novo recens, atque acerbissimo oborto frigore, quod luctuosam rerum faciem ipsa inter veris exordia reddiderat. Denso hinc agmine visæ foras erumpere Arthritides, Hemicanthæ, Anginæ, atque una cum toties exaratis febribus ultro, citroque ludere, quibus illæ ceu ingruente hyeme Erysipelata, ac Epidemici inferioris subfellii famulabantur. Uno in Monialium Cœtu *Divæ Mariæ Magdalene* omnes fere Vestales angina correptæ, extremos morituræ hyemis conatus dire pertulerant. Quidam quoque e Civibus, cum magis ingravesceret frigus, repentina morte sublati sunt. Quosdam etiam memini hosce inter tumultus repente insanientes, quibus nil tale unquam contigerat. Plerisque ulcera per hyemem prodire maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisque eorum, nonnullis etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri aderat. Haud paucis pustulæ oriebantur, dein exulceratio, Prurigo modica, dolor ingens; Multis humor exibat, sed non admodum, qui referre, vel pus, vel saniem videbatur. Dira æque iis quoque extitit hyems quos diuturniores ægri-tudines dudum vexaverant; Plerique horum namque ad interitum iusto celerius forte properarunt, atque hi potissimum, qui Scorbuto, Phthysi, aut Hydropse laborabant dudum. Hos inter Scorbuticis præcipue frequentissimæ ob-tigere hæmorrhagiæ lethales ex ipsa cute externa non apparente vulnere, quod, mirabile dictu, observatum fuit in Pictoris filio septenni prope *Collegium Nobilium Patrum Jesuitarum*. In Cauponis uxore ad *Forum Carolinum* jam quinquagenaria prope, tum in Quæstoris famulo haud longe a Foro *Castri* dicto; Potissimum vero ex labiis, gingivis, ore, naribus, utero huiusmodi excretiones obtigerunt. Memorandum Mulieris exemplum adhuc subit lethali huiusmodi ex raninis venis hæmorrhagia brevi temporis intervallo peremptæ. Cœperat illa diu olim Scorbuto dire vexari innupta adhuc. Nupta dein sævus per vices recurrere sæpe malum consueverat, quod quidem ingravescere magis, ac vires acquirere eundo ostenderat difficilis magis, anhelosa, ad motus vel paucos fere deficiens respiratio; Dolores varii, ac vagi per omnes internas, externasque corporis partes mira producentes tormina Colica, Hysterica, Iliaca; Rubra modo, modo flavæ, ac violaceæ maculæ in cute apparentes; Crurum tumor accedens, recedensque; Oris fetor, Gingivæ tumentes, adque minimam pressionem evomentes cruorem; Dentium vacillatio, ac nigredo; Quodque funestissimum aderat, varicosi annuli ad raninas venas, quibus inopinato referatis lethalis oborta est hæmorrhagia, cui obistere nulla Ars potuit unquam. Huic Soror aderat, quæ atrocibus æque conflata malis haud absimili prorsus fato biennio ante vitam cum morte commutaverat. Utrique harum, cum tenella adhuc ætate forent, dira scabies, ac improba ulcera futuri incrementa mali præ-luserant, quibus sicca dein ac lenis Elephantiasis successit.

XXV. Horum alteri, quos tum temporis repente e vivis sublato memini, latæ admodum maculæ, ut a Chirurgo ore didici, qui inspicendo cadaveri accitus fuit, ut quæ celeris adeo, citæque necis causa fuerit ad eos, ad quos id spectat, renunciaret; latæ inquam admodum maculæ in universo corporis ambitu conspiciebantur; colore violaceo, ac fere subnigro, tum quæ præsertim præcordia, cruraque, ac totum vertebrarum tractum occupaverant. Magnæ id quidem inductæ in liquidis stagnationis monumentum. Id namque est exigua inter, quas *exanthemata* Græci vocant, ac latas maculas discrimen, quod illæ fusionis, (d) ut superiore anno adnotavimus; hæc coagulationis potius, ut ajunt, præludia sint, quod idem mihi assidua per sexdecim fere annos apud Subalpinos praxis edocuit. Illæ febribus continuis, mali

Supplem. ad Sydenham.

(a) *Secl. 1. lib. 2. Epidem.* (b) 2. 4. *tract. 1. cap. 29.*

(c) 1. 4. *Epid. tract. 81.*

Id. 1. 3. Epid. tract. 2. Id. 1. 1. Prorrhetic. secl. 2. com. 17.

Petrus a Castro secl. 4. §. 44. & seq. Bagliv. Pract. Med. lib. 1.

pag. 51.

(d) *Constit. Epid. 1720. pag. 64.*

moris, exitialibus morem gerunt, hæc diuturnioribus passim malis, ac Scorbuto potissimum faciem præferre visæ, tum persæpe etiam repentinam mortem prosequi, aut illi proludere, ut in repente denatorum Cadaveribus cernere est aliquando. Illæ rursus rubra magis occurrunt ob tenuiores quas effusus ab arteriarum oculis cruor dimiserat, profugas, ac diffugientes hinc inde partes; Hæc vero subnigra, ac sublivida prorsus ob fixiores sanguinis particulas venarum extremitatibus hærentes, ut ait *Villifius*. Illæ sanguinis Phænomena coire amplius haud potentis, hæc futuri, ac prope imminents lenioris exordia. Hæc inter postremas, quæ sublivida sunt, prolixioribus illæ malis, quæ nigra vero subito, aut celeri fato præludere solent. Nuper desideratus omnibus, dum hæc scribo, celeriter obiit Amicus meus, qui ad novum Urbis ambitum apud portam *Secusinam* habitabat, cui perquam latis huiusmodi maculis summo quodam mane, cum alias sanissime degeret, interstincta illico cutis apparuit. Vespere cum ad cœnam lætus accederet, e vivis repente excessit. Nuper etiam diuturno confectus morbo ad plures abiit Piissimus Vir prope Templum *Divi Francisci de Paula*, cui biennio ante sublivida maculæ Veris initio, mox fœdus Icterus nulla proludente febre inopinato obtigit, præduris diu, ac tenis admodum Hypochondriis; Aperto Cadavere vel minimam bilis copiam in cystide, ac nigerriam prorsus, atramenti ad instar observavi. Idem olim in mortuis derepente adnotavit *Fernelius*.

XXVI. Atque hoc quidem sensu ajebat *Duretus*, livores peiores esse quam nigredines, in Chronicis nempe affectibus, ubi illæ e malis veniunt per mala; successione veluti, ac conversione unius morbi in alium, metuenda quantum. Secus utique in acutis, in quibus *palindromes*, ac *gangrenæ* prope jam factæ indicio nigredines sunt. Sive vero sublivida, sive nigra sint ad cutim maculæ; Utrisque diuturna jecoris ægri-tudo aut vehementissimus dolor præludere consuevit. Hinc sublividis potissimum Icterus sæpe, aut illæ Ictero fatali proludere. In hac ego Icteri specie a visciditate, & ab amurcosa bilis qualitate orta tartareis, veluti pro secreto, uti soleo, & aqua Nucariana Sale admixto prunellæ, repetita per duas, vel tres vices purgatione alternis diebus ex Rhabarbaro, quod olim jure merito *Patrem Hepatis* ob specificam ejusdem ad plerosque Hepatis effectus curandos virtutem dixere *Arabes*; Deinde ad Serum lactis veniendum cum marrubio bullitum, & singulo mane calide dandum; Quod si ninium fuerit amurcosa bilis circa jecur impacta, aut magna ejusdem viscidæ, nigreque prorsus copia, addi poterit cum fero in maceratione drachma una hellebori nigri præparati alternis diebus vel cochlear unum, aut alterum *Syrupi cachectici Fernelii* cum helleboro, qui syrupus magnarum est virium in Chronicis; Et demum omni bile hac methodo expurgata, (hic primus curationis scopus prudentis Medici esse debet) chalybeata, & roborantia usurpanda, nunquam infelici successu.

XXVII. Neque enim raræ omnes Icteri species tantum, quotquot recensentur a Practicis, tum huiusmodi exarata modo, cui sublivida sæpe maculæ anteire solent, sed Chronicis fere morbi omnes a male affecto Hepate ortum habent. Tantæ scilicet *molis* adest hæc una haud immerito Princeps pars inter cæteras, quas præclaro quodam munere in œconomia animali fungi novimus; Ut contabescant hæc sensim necesse fit illa laborante, ac pereant tandem, ni ab imminenti exitio quam citissime tueatur, Hystericis, Calculosis, Colicis, Scorbuticis, Lienosis, Asciticis, Tympaniticis, ac innumeris id genus aliis nunquam observatum incolume hepar, quinimo ab hoc uno malorum fomes, ac origo sæpe repetenda, obstructo scilicet, inflammato, aut scirrholo, quæ tria duritatis nomine vocat *Hippocrates*: (a) Quod autem horum aderit, stercorosa dejectiones ostendunt.

XXVIII. In hac perturbatione rerum, torque inter exaratas ægri-tudines diuturnas, quæ impendente Vere, aut ægros ad interitum celerius forte, quam par foret, ducere, aut exacerbari magis visæ fuerant, obviam veniunt peculiare Virginitatis affectus, qui, si dire crudeliterque unquam, tum per hyemem maxime erga infantes Puellas tyrannidem sævissime exercuere, a copiosiore liquido iidem potius stagnante, ac pressis nimium proinde valis orti, quam ab effæto eodem, pravo, ac vapido, ut etiamnum ferunt exercitissimi Viri. Proderat hinc iis magis, quam celebriora quæque chalybeata usurpari solita, iterata venæ sectio in pede. Ipsa dein vasa a plethora nimis debilitata adstringentibus opportune roborando, ac confirmando. Quibus confestim ad Martialia properatum est, magna iis repente excitata Phlogosis graviora intulit mala. Ars quippe erat iis consuetam Artis opem haud adhibere, quod quidem ab Constitutione Anni ediscere est, ejusque Principis ingenio Morbi, cujus imaginem sæpe etiam referunt diuturnæ quotquot eo tempore sæviunt ægri-tudines cæteræ.

XXIX. Haud paucæ quoque Mulieres visæ fluore albo per hyemem laborantes, tum subsequenti potissimum Vere, ac Æstate; Atque illæ quidem præsertim, quæ hysterice olim insultibus vexari consueverant. Ars quoque iis erat non equidem effæto, pravoque cruori suæ restituendo indoli, non fermento ulli uterino emendando, aut exaltatæ bili demulcendæ incumbere, aut erodentibus salibus coercendis, inutili remedium apparatu. Ast potius, ut ego arbitror, profectum ab universalis causa malum, antequam radices ageret, aut adhæresceret magis, elidere; Radicatum vero si quod foret, ac missis stirpibus firmatum proprio in solo, ac delubro reprimere. Utor ego frequentissime in hoc morbo, quo potissimum Nostrates Mulieres laborare solent, ter quaterve purgato corpore (si hysterica fuerit bis purgasse suffecerit) injectione alicujus liquoris appropriati.

XXX. Quod ad hujus fluoris scaturigines attinet, in obscuro adhuc res latet. Nemo sane, quod sciam, ac illam tetigit hætenus. Crediderim ego haud aliunde petendas esse illas, quam ab iisdemmet menstruum fontibus. Nec profecto ab verosimili prorsus aliena hæc hypothesis est. In quotquot enim, quæ huiusmodi profluvio diu laborantes evitæ migrarunt, nihil in utero compertum memini, præterquam feri aliquod in ejus fundo effusi, quodve adhuc exigua copia premente digito ab hiantibus forte vasorum orificiis guttatim profluebant, ceu in iis quoque intueri est, quæ inchoante fluxu menstruo, aut pene jam peractio, defunctæ sunt. Quamobrem ut satis est ea foramina, per quæ uteri sinus cum hujus cavea communicare Claris. Viri observarunt, prope imminente menstruo fluxu a vi erumpentis sanguinis tantummodo diduci, quo sanguis subinde effluat periodo nulli.

C c 3

(e) *Coac. 30.*

nulli ignota, definens idem fluere, mox ac imminuta vi, tum quantitate liquidi, quæ unica est periodicæ ejusdem fluxus potissima causa, sese contrahentibus circumjectis fibris, exarata foramina occluduntur, aut saltem tantum patent adhuc, quantum satis est exiguo ferro jugiter transmittendo, quo uteri cavea humecta servetur. Ita laxatis forte fibris, aut iisdem a nimio sanguinis affluentis impetu debilitatis feri fluxum contingere puto magis, aut minus diuturnum, quo major, aut minor est fibrarum laxitas, quove magis illæ aut minus sese restituere queunt, inque proprios systalticos nifus consurgere. Raro, ac vix raro quidem puellas, aut virgines hujusmodi affectu correptas meminisse, sæpe equidem nuptas, tum quas hysterici insultus frequentissime laceffere consuevere; Plerasque etiam novi a difficili partu in hanc ægritudinem incidisse, nonnullas post assiduam uteri hæmorrhagiam; Neminem unquam quinquagenaria majorem, aut quibus menses defecerint. Quam facile vero laxari vasorum uteri fibræ, quam levi de causa ea foramina diducta semel haud occludi penitus dein, quam celeri tramite per tot implicatissimos uteri sinus affluens liquidum, tum gravitate sua, tum forte etiam copia, uteri vasa distendere, villosque divellere repetitis arietationibus, & gravitatibus queat, neminem later! Obscurior res est quænam illa sint, quove more se habeant exarata foramina, per quæ ab erumpentis sanguinis impetu diducta leviter, aut diducta semel, nondum penitus occlusa amplius, tum menstrua evacuatione cruor, tum serum diuturno fluxu secedit. Num villi illa forte arteriarum uteri evanescentium seu venarum ejusdem primo nascentium, vel earum limites? Sed de his pro instituto satis. Ad Arthritides modo, Hemicranias, Anginas, quæ ruente ex alto Borea Veris initia præcesserant, mea sese convertit Oratio; Ne quid per hyemem gestum prætermittam. Neque enim tantum juvat delibare rem, sed & amplius lubet excurrere, quove illa omine præluxerit, aut obtigerit, expendere.

XXXI. Una eademque aderat harum omnium ægritudinum curationis ratio, si modo ad Principem ludentem affectum mentis acies dirigebatur. Sive enim ad fauces, sive ad artus, sive ad involucra cerebri, sive ad oculos, (Opthalmiæ namque plurimæ sub id quoque tempus proluserant,) præcipuam ageret Scenam Morbus; Unus idemque erat vincendus hostis, idem omnino curandi scopus in singulis, idem pariter, si ab hoc quispiam Medicorum tantisper ablunderet scopo, expectandum ægrotantibus fatum, *Ostendit autem sanatio*. Neque enim purgantia, neque anodyna, neque alia quæque hisce olim conducentia auxiliorum genera, profuisse visa, præter venæ sectionem, quæ feliciter sæpe restituit rem, tum ea una simul exhibita remedia, quæ aut præfenti Phlogistico affectui compescendo, aut impendenti liquidorum præcavendæ labi, ex qua hujus, vel alterius Partis Principis imminens aderat Sphacelus, *Natura monstrante viam*, citius occurrerent. Principis namque ad Principis morbi vim reprimendam, coercendamque, cujus imaginem referebant exarata omnes ægritudines, Princeps inquam præsidii genus id erat, quod stagnationem, ac lentorem liquidi eluderet, hoc uno affecti crimine, nimia scilicet sui copia, ac pondere, quo lentescere idem in vasis opus erat, aut saltem si non omnino adhuc lentescere videretur, ad concretionem, ac fixitatem celeri gradu contenderat; Quodque idem ob prægressas Constitutiones annorum magna ex parte Australium id amiserat sui, quod illud poterat perenni ætate in Orbem more tueri, abque prope impendenti exitio, ac jactura vindicare.

XXXII. Agebatur siquidem de sanguine, qui mole sua sibimet ipsi erat noxæ, ac detrimenti; Nullus hic proinde cunctationi locus. Timendum enim, ne dum Romæ consularetur, Saguntus expugnaretur. Si qua in re periculum fecit mora, aut *Præceps* commonente (a) Hippocrate, visa occasio fuit: In hac equidem illa eluxit maxime. Ipseque ego quod sancte assero nulli ex iis, qui per ea tempora ægrotaverant, aut Arthritide, aut alio quopiam ex prænaratis affectibus, tum aliis plerisque diuturnioribus inauspicato cessisse hujusmodi præsidium meminisse, dummodo opportune administratum, dum præfens aderat indicans, ut Practici ajunt. Ejus namque erant hujusmodi omnes affectus indolis, ingenique, ut liquido gravitate peccanti morem gererent, cui haud lætius unquam, ac feliciore fidere occurrere Ars novit, quam venæ sectione repetita, quousque ita ad solidorum libellam sese haberent fluida, ut restituta invicem præclara æquilibrium ac conspirationis lege, facta, tectaque res foret, supremum heu subitura prope discrimen! Cur vero lentore peccans cruor meninges modo, modo fauces, oculosque, ac artus laceffat inermes, modo insontes aliquando pulmones, quod sæpissime obtigit, haud ita implicata res est, ut Dædali ingenio opus sit ad id revelandum, demonstrandumque? Excelsa profecto magis eadem, ac digna Philosopho originis principium harum ægritudinum, quas præfens currentis anni Constitutio in Scenam tulit, tum earum genium, ac morem propius inquirere. Cur eadem Arthritides, quæ tam dire adeo crudeliterque superiore anno sub Principe ludente affectu militaverant diu, diversum ab iis, quæ modo per hyemem potissimum extulerant signa, toto cælo præsidium expeterent? Cur illæ spasmodicis cruciatibus molestæ magis, hæ nihil hujusmodi prætulerant? Cur raræ hoc anno hysterica mulierum affectiones extiterant, quæ olim paucis pepercerant? Cur nullæ prorsus, aut vix paucæ ephemera visæ febres, aut diaræ, ut vocant, quartanæ, ac hujusmodi aliæ ægritudines cæteræ, quæ nullo non tempore proludere solent, tum ultro citroque ire nullius in servitutem redactæ?

XXXIII. Cæterum ab lentore sanguinis, tot omnes et si discrepantes invicem ægritudines prodixisse ipse extractus e vena cruor colore, habituque aperte satis manifestabat. Quidpiam namque instar pelliculæ, aut exilis membranæ in ejus superficie conspicietur, qua difrupta, viscosus, ac nigerrimus sanguis in fundo vasis supererat. Sæpe altera, ac tertia vice opus extitit sanguinem mittere, imperante morbo quantum demendum aderat cruoris, non equidem illius colore, aut habitu, ut adhuc plerique autumant Celsi (b) autoritate suffulti, qui ait, cum sanguis profluit, colorem habitumque ejus attendere opus est; nam si is crassus, & niger est, vitiosus est, ideoque utiliter effunditur: Quod quidem idem Celsus accepisse videtur ab Hippocrate, dum dixit in Pleuritide sanguinem esse mittendum, donec melior, aut ex nigro ruber appareat. Sane hujusmodi sententia, utut improbanda omnino non sit, reticere tamen haud possum hinc sæpe decipi Medicos; eamque nullo unquam in morbo curando satis esse constantem, aut sufficientem metam, & periculo non vacantem superflua evacua-

tionis, aut suspitione diminutæ; Periade ac vetustissimam alteram Galeni ævo percelebrem ad nimium usque deliquim. Habent idque a Majoribus tradita nobis oracula sunt cum cæteris rebus commune longa vetustate præclaris, ut illa frequentius in medium afferri soleant, quam recte intelligi, & convenienter usurpari. Non enim quia purus, aut quia mutatio in meliorem non fit, semper continuanda est missio: Neque quia mittitur, supprimendus est: Sed donec aliqua utilitas appareat, aut confertim, aut per vices educendus est, maxime in acutis morbis, & suo initio, quo, (si particulares sunt, ut Pleuritis, Phrenitis, Peripneumonia, Angina, & aliæ inflammationes internæ, quibus suppurationis necessario ut plurimum mors sequitur, aut etiam non raro suppurationem præcedit) dempta in tempore morbi materia, quæ in venis est, mature etiam cesset discrimen a morbo. Quod similiter in ardentibus febribus, & synochis faciendum est. Detrahendus scilicet sanguis non sumpta meta a colore, & substantia ejus, sed a morbi magnitudine, statu, & Patientis viribus. Leonard. Bottallus de curat. per sang. mission. c. 27. Nihil sane Artem Medicam æque conjecturalem facit, quam medicamentorum quantitas, quæ, ut habet Galenus (a), neque dici, neque scribi, neque definiri omnino potest.

XXXIV. Detrahendus vero statim aderat sanguis, ac febrilis Scena exordiebatur, aut præfata particulares ægritudines proludebant; Ut desistendum illico, ac conjicere erat parem fore Naturam obeundo certamini. Hæc meta, is scopus erat mittendi sanguinis, *servare vires*. Equidem raro ullus gravissimus morbus, ut Cynanche, Peripneumonia, Phrenitis, Febris ardens, cujus forte genium prætulerant exorta Autumno febres, ne quid de cæteris dicam, non citissime, & felicissime curantur, dummodo opportune convenienti remedio illis succurratur. Atque hanc utique opportunitatem, seu occasionem, aut tempus conveniens albo signandum lapillo iidemmet morborum motus indicabant, potissimum quidem per horum initia, sæpe etiam sub eorum decursu, aut illis jam ad exitum properantibus. Nulla namque expectanda unquam remissio febris, quæ si obtigerat aliquando, haud læti ominis erat; Nullus hic advocandus dierum numerus, aut exoranda Crisis. Ejusmodi quidem aderant exarata ægritudines, quas ipse olim Galenus (b) tradiderat, in quibus nihil tale quidquam attendendum esse ajebat, imo quocumque die mittendi sanguinis scopum in laborante inveneris, in eo auxilium illud adhibendum.

XXXV. At urget, ajunt hic loci quam plures, urget in hac parte Celsi sententia dicentis (c) quod si vehemens febris adest, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est. Fateor id ego quidem, nec quidquam Magni Viri laudi demptum velim unquam, quem ego tam præstantem doctrina fuisse reor, ut paucos ei anteponendos Latium protulisse censeam: Atque is forte Magnorum Virorum instar multa maluit seris Nepotibus in obscuro relinquere. De his proinde suspicari fas est locutum esse febribus (d) purissimum Scriptorem, ac prope dixerim (e) Medicorum Deum, quæ certam observant intermissionem, aut saltem per vices impetum remittunt, etsi semper durent. Intermittentes illas dicimus, has continuas remittentes; Quamvis etiam tunc vel in ipso impetu majore febris nocere nunquam, sed potius juvare venæ sectionem compertum sit.

XXXVI. Secus equidem censendum de iis, quas Causos, seu Ar dentes vocant, ob frequentiam, discrimen, sanandique laborem funestas sæpe: Cujusmodi aderant, quæ Autumno primum se se prodiderant, ac toto fere Anni decursu ultro citroque oberrant. Et sane aut famulante Natura brevi solvebantur copiosa narium hæmorrhagia, ut plerisque eo tempore obtigit, aut eadem Natura Duce, opportune celebrata Phlebotomia quam citissime per initia, atque in ipso earum impetu jugulabantur; Secus aut ultimam rebus jacturam celeri nece attulerant, aut in diuturnos affectus diros admodum, ac graves quanquam minus calamitosos abiire. Quibus postremis quidem nihil præsentaneum magis, aut opportunius unquam, quam sanguinis detrahitio; Atque hæc quidem per hyemem, Autumnumque. Orto autem jam Vere in Peripneumonias desiere lethales prorsus. Hæc namque ut mox addam, aut velox inducto Sphacelo fatum, aut lentam ægritudinem facta suppuratione tulere; Cui imminenti exitio, antequam scilicet sive Sphacelus, sive abscessus prope esset, nil præstantius unquam docuit Ars, quam sanguinem demere lato vulnere, ac repetitis vicibus, dum vires ferant. De febribus loquor, quæ ab stasi cruoris proficiscuntur, cujusmodi potissimum aderant, quæ exarata Constitutione viguerant, iis fere consimiles, quas tum olim impetuosas vocaverat memoratus Galenus (f), qualve idem prolixa sanguinis missione sæpissime, subque ipso earundem impetu, exortu, ac incremento jugulasse fatetur. Hosce inter, quæ copiosa narium hæmorrhagia morbum absolvit, pueros præsertim hac ope servatos vidi. Adulti vero, aut provectiores ætate Viri, quibus id copiose minus contigit, haud pauci in Arthritides, ac Hemicranias incidere graves admodum.

XXXVII. Nec citra operis pretium fore puto, si quod accidit mihi vidisse, hic enarravero, quod ad exaratos affectus, qui una cum ardentibus febribus longe lateque sævierant, præsertim attinet, atque Arthritides potissimum, tum Hemicranias. Anginæ enim, quæ novo repente exorto frigore facem præbuerant cæteris, brevi constitutos sibi fines persolverant; Adque primos mitiore flamine adspirantium ventorum status omnino desierant. Utque ab Arthritide initium feram: Ejus hæc aderant moris ut Vertebrarum tractum, tum anteriorem Thoracis partem, ipsasque adeo Costas, earumque interstitia lacefferent magis, quam Illia, extremosque Artus. Præcipuus namque hic ludebatur Tragædiæ Actus, cum maxime haud convenienti tempore, aut vera remediorum farragine orientibus malis succurrebatur. Plures fefellerat nempe consuetus hujusmodi ægritudinum mos; stupebantque admodum cum eludere illas cætera quæque usurpari Practicis solita remedia videbant, ac contumaciores effici, delato mox ad universos Artus Malo, quod hanc primo, aut illam tantummodo partem occupaverat; quodque præcavere utique poterant præstantis auxilii genere, quod ludentis morbi indoles initio suaserat, suadebatque adhuc pari securitate, ac fiducia.

XXXVIII. Hisce artibus affini meo, cui dira Arthritis hos modo, ac illos artus crudeliter divexabat, opem attuli, ac incolumem illum citius forte, quam ipse sibi spem fecerat, reddidi. Huic sub finem hye-

(a) Meth. Med. 7. (b) Lib. de cur. rat. per sang. miss.

(c) Lib. 1. cap. 10.

(d) Vossius de Vit. sermon. 1. cap. 16

(e) Casaub. ep. 29.

(f) Meth. Med. cap. 4.

(a) 1. Aph. sect. 1. (b) Lib. 2. cap. 10.

Hyemis febris occurrit, quæ tertio die mitius laceffere statim cepit: Atqui ferus universam Spinam, imaque occupans præcordia, mox ad omnes fere artus delatus dolor acerbiorum intulit ægritudinem, cui frustra lenientibus, purgantibus, diureticis usque adhuc opitulatur. Rogatus ego, malorumque origine, ac successione sedulo explorata, iussi sanguinem detrahi ad uncias decem; Diætam quod attinet, iuscula hordeacea, avenacea, panatellam, atque ejusmodi alia de more præscripsi, tum ptisanam ex hordeo, ac rad. liquiritiæ, acetosæ in aqua fontana incoctis, pro potu, ac denique *Sydenhamii* consilio, ut æger per aliquot horas singulis diebus lecto sese abstinere, præceperam, cum calor jugi decubitu, ut citatus Author ait, morbum sæpe promoveat, intendatque. Die sequenti sanguinis tantundem detrahi jusseram, mox tertio dein, ac ultimo, uno alterove die interjecto. Plerisque memini quarto, ut plurimum, venæ sectionem hujusmodi affectu ægrotantibus nunquam infelici exitu adhibitam; Raro tamen obigit ultra quartam vicem venam incidisse, nisi vel regimen iusto calidius præcesserit, vel medicamina calidiora ægro præter necessitatem fuerint exhibita. Paregorica, si-ve *anodyna* quæque valere omnino iussi, ut ut læviret dolor. Noveram enim illorum usu morbum magis figi, neque tam facile dein venæ sectioni cedere, quæ ideo ob hæc ipsa medicamenta officiose nimis exhibita sæpius quam par erat opus, celebranda fuerat aliquandiu. Neque enim arbitror eam illa, quam titulo pollicentur, *analgesiam* præstare. Mirum equidem, ut his rite peractis, mox potione cathartica lenitivis exhibita ægri dolores imminuti fuere, quo tandem refarcita, quam fecerat sanguinis detractio, jactura virium. Veris beneficio quod opportune occurrerat, omnino evanuerunt.

XXXIX. Arthriticos alios quamplures novi per ea tempora diris cruciatibus divexatos, quibus ortum, ac incrementum præbuit prægressa febris contrario modo, ac postulabat, tractata, hoc ipso more feliciter sanatos. Nec atrociter minus læviebant Hemicrania, quæ modo una cum febris comite, modo etiam absque febris sublidere videbantur. Harum magna pars copiosa effusione sanguinis, sponte e naribus oborta ludere desinit extemplo. Huic prope erupturæ, aut pleno erumpenti alveo prælusit sæpe hærens diu, qua Sagittalis Sutura per capitis longitudinem recta pergens supra coronalem ad angulos æquales incidit, ferus dolor, profliente sanguine paulatim desinens. Pluries hinc mihi animo subit, num eligenda forte in hoc affectu curando peculiaris vena tum origine, tum vicinitate præclara, quæ opus feliciter magis absolvet; Occurrebant ejusmodi plures ad Tempora potissimum, media in fronte, secus Aures, ad Nasum, ac *Jugulares* præsertim, quæ iis omnibus ortum præbent; Atque ab hisce quidem tuto fuit auspicia desumere, si-ve quod plenior fluente, quod unum expectabatur magis, exitus concedebatur cruori, si-ve quod ab Jugulari tum externa, cum interna, citior aderat expectanda *Derivatio*, quam tum Revulsio, ab reliquis memoratis venis, quæ illius propagines sunt. Evicit inquam præcæteris Jugularium sectio, ac magnum fuit periclitantibus subsidium. Visus namque illico mitescere capitis dolor, ac fere penitus desinere; Nonnullis, quibus id præsidii experiri, horroris erat, etsi nihil omnino fuerit extimescendum, affixæ Temporibus hirudines haud imparem attulere opem, etsi modico velociter minus, ac ipso præsentis discriminis articulo opus aderat, quod unice sperari poterat ab apertis Jugularibus. Consultius erat huic sanguinis missionem præmittere e Brachii vena, aut si urgeret opus, e longinquo altera in Pede. Hacque methodo haud paucis quæ atroces hujusmodi Hemicrania diræ vexaverant diu, pene extemplo subventum est.

XL. Cæterum ne ultra supraque quam sit æquum in his moram faciam, meminisse lubet peculiaris cujusdam mirum in modum ludentis Hemicrania hisce artibus feliciter curatæ. Jurisconsultus, qui in ea Urbis parte habitabat, qua supremum Arcis Propugnaculum eminet ab *Emmanuele Philiberto* olim ad Regni tutelam, defensionemque excitatæ, ac novis subinde munitionibus, cuniculis, aggeribus, operibusque tum a Successoribus Ducibus, tum ab Invi-ctissimo Rege VICTORIO AMEDEO instructæ, quibus obsidentium Gallorum superioribus annis impetum elusit ac vici. Is inquam cum summo quodam mane ad forensis Palæstræ negotia obeunda e lecto surgeret, gravi admodum capitis dolore vexari cepit in sinistra parte ad Tempora usque. Quem quidem haudquaquam magni fore momenti gratus ad plures dies æquo animo adversam valetudinem invicte sustulit. Quo usque tandem cum mihi quodam die forte fortuna haud longe a foro occurrerit, auxilii a me quidquam rogavit jubens omnem mihi referens mali historiam oppido raram. Narra-erat enim se hora circiter octava matutina alternis diebus hujusmodi dolore perquam acuto corripiri, qui ad quartam usque Pomeridianam perdurabat, quo tempore collecto animo, ac re omni composita sese paulatim recipiebat, adque consueta sibi munera redibat, ceu nihil hujusmodi obtigerit unquam. In ipso autem aditu Paroxyismi, ut ita loquar, magna Capitis gravitas proludebat futuri præ-nuncia doloris, exeunte vero paroxysmo, quod præcipue etiam ad-notandum subit, modico sudore perfusa. Tempora aderant, quodolo-ris scena terminabatur. Addiderat, sibi ab Amico propositum Oc-cipiti admovendum vesicatorium, tum ano Hirudines, quod utrum-que præsidii genus experiri ait sibi vetitum hæcenus a gravi, quo premebatur, rerum onere; Se tamen jam modo negotiis omnibus valecturum prorsus, nec amplius perpeti diutius posse mali acer-bitatem. Quamobrem omni cunctatione abjecta sanguinem detrahi jubeo e Brachio, mox altera vice intermissionis die lato vulnere e Jugulari sinistra, quibus ac balnei usu, fons, diluentium, quiete, ac æquiore victus ratione, brevi convaleuit. Idem Pistoris uxori con-tigit, juxta Sacram *Divi Dominici* Edem, Bibliopolæ filio septen-ni, propter *Turrim publicam* excelso vertice præclaram, Mercatori ditissimo prope Templum *Divi Rochi*; Adolescenti Juris studioso in vico *Divi Thomæ*; ac plerisque aliis quibus recensendis haud im-moror. Neque enim huic persolvendo muneri tempus suppetit.

XLI. Sanguinis ex Jugularibus mittendi mos est satis antiquus, utcumque inter paucos obtinuerit, de quo si perbrevis historia præ-missa sit, haud illam puto legentibus fore injucundam omnino. Sunt, qui *Galenum* secuisse Jugulares tradunt; Ille tamen, ni fallor, non sectionem ipsam imperare videtur, sed si casu aliquo secentur, cura-tionis modum præscribere. In *vivorum Anatome*, qui sane perri-diculus liber est, & ab Arabe quodam, ut videtur, confectus, at-que adeo perperam *Galeno* adscriptus, *Jugulares* aperiri jubentur in principio Lepre, & Angine, angustique anhelitus, in Asthmate acu-

to, in raucedine vocis, in abscessu Pulmonis, in spirandi difficul-tate, & in Splenis, & laterum morbis. Eadem prope memorat *Sora-ni Ephesi* introductio: Sed cum hoc itidem opusculum plane com-mentitium sit, cumque *Cælius Aurelianus*, qui se in omnibus fere *Soranum* sequi profitetur, de hac re omnino sileat; nihil hinc quod ejusmodi Medicinæ antiquitatem probat colligendum est. Sufficiet itaque has venas secandi originem (a) ab *Alexandri Tralliani* tempo-ribus repetere, qui Jugulares a se sectas esse scribit, maximeque profuisse; Hanc ut quibusdam familiarem ævo suo curationem refert (b) *Actuarius*, quam itaque in Catoche, & Phrenitide deprædicat. Eam in omnibus morbis capitis adhiberi jubent Arabes, neque in iis solum, sed in Lepre, acutisque Thoracis affectibus: Unde forte consuetudo illa ad *Ægyptios* manavit, quem apud eos etiam tum, cum Alexandria esset, viguisse perhibet oculatus Testis *Alpinus*: Post Arabum tempora nisi in *Bertuccio*, & *Arnoldo Villanovano*, qui hoc ex iis ad verbum exprimunt, (uti fere ex Græcis Arabes) vix ulla est de hujusmodi sectione mentio, donec anno circiter 1500. Anatomæ studium pene intermortuum revocavit *Jacobus Carpen-sis*, modumque incidendi Jugulares fusc descripsit. Quo quidem sæculo a pluribus pleno ore laudatur hoc curandi genus; Sed longe absuit, ut in consuetudinem venerit; Quippe *Botallus*, qui circa ann. 1570. scripsit, diserte dicit, se neque hoc unquam a Medico præscri-ptum, neque Chirurgo tentatum vidisse, adeoque aut nunquam in usu fuisse, aut esse tum penitus exoletum: & quanquam ipse pri-mus venæ sectionis usum in Galliam induxerit, venamque quamli-bet in quocumque fere morbo secuerit, fateretur quod in jugularibus id experiri minime ausus sit, reformidans (c) ne propter illius ma-gnitudinem, & magni trunci vicinitatem non satis cito, neque tuto sanguis cohiberi possit. Imo *Riolanus* Pater, qui recens a *Botalli* æ-tate fuit, de Apoplexia locutus in hæc verba prorumpit, *Jugulares ausi sunt quidam secare pro extremo remedio*. Etiam *Fabritius Hil-danus*, qui Ophthalmiis, Hemicraniis, cerebrique inflammationibus hanc a se Medicinam cum efficacissimo subsidio sæpius adhibitam esse prædicat in Epistola, quam (d) ad *Doringium* 1614. exaravit, perpaucos tamen Medicos, qui sectionem harum venarum approbarunt, sibi innotuisse scribit, eamque periculosam agnoscit, nisi expertus af-fuerit Chirurgus. Quinimo in scriptis eodem anno editis *Julius Gua-stavinus* Professor Pisanus, has venas non sine periculo secari posse pronunciat. Ita plerisque ab hoc auxilii genere deterritos fuisse constat, si-ve quod Jugularium vulnera aliquando lethalia esse ob-servaverint, perperamque sibi persuaserint idem ex earum sectione eventurum; Sive potius, quod ut sæpe fit, facta hæc a manu im-perita sectio, parum feliciter cesserit, notamque infamiae experi-mento inusserit. Hoc nimirum usu frequenter venit, ut quod reme-dii genus ignorantia semel notaverit unius infamia, dignitati suæ vix restituere queat scientium universa consensus. Utcumque vero ea res se habuerit olim, nullum est in Historia Medica exemplum, ubi rite peracta sectio aliquid attulerit mali: Imo sæpissime usus osten-dit morbis compluribus, atque iis præsertim, qui caput attingunt, nullo modo melius succurri.

XLII. Quod quidem, cui scilicet fundamento innitatur facta in capitis, ac cerebri potissimum morbis Jugularium sectio, tum hu-jusmodi venarum, tum arteriarum, quarum ope sanguis per cere-brum, ac caput ultro citroque commeat structuram, & distributionem penitus ex Anatomicis delibanti cuique facili Marte elucescit. E-nimvero Jugularis vena vel externa est, vel interna: Quarum hæc multo grandior uti eam post *Nicolaum Massam* (e) accuratissime de-scripsit *Falloppius* (f) licet in Brutis, a quibus harum venarum figu-ras apud *Vesalium* (g) expressas habemus, contrarium prorsus reperia-tur. Externæ ramusculi extremi ab ore, a faucibus, a facie, ab oculo-rum tunicis, ab universa denique capitis cute atque musculis nascun-tur. Internæ, quæ multo altius delitescit, quamquam aliquando parti-bus jam memoratis furculis aliquos impertiat, ad imum cranii recta assurgit; inque duræ matris sinus laterales immergitur. Ita ut ju-gularis externæ propagines extremæ, arteriæ Carotidis externæ ramis inferantur: Interna itidem Jugularis, ac Carotis interna vasculis du-ræ matris intervenientibus conjungantur, ac confluant. Sæpe etiam vidi utriusque venæ ramos aliquot opposito tramite, externæ scilicet ad ima cranii, internæ ad maxillæ glandulas, ad fauces, atque externas quasque partes deduci; Quod a nemine usque adhuc præ-terquam a prælaudato *Fallopio* visum, compertumque ego quidem superioribus annis coram Chirurgis Taurinensibus in Theatro Ana-tomico, cum ibi jubente, ac annuente Rege Prælectiones Anatomicas, altera vice haberem, attentius hujusmodi venarum distributionem inquirens apertissime ostendi. Jam tum scilicet alte infederat animo hujusmodi auxilii genus ad praxim utiliter revocandum aliquando.

XLIII. Equidem Artis cum sit Naturæ ductum sequi; cumque sanguinis e naribus eruptio (ne extra oleas digredi videar) uti ma-xime naturale, ita præsentissimum nuper visum fuerit vitæ præsi-dium; Conspicuum erat in hujusmodi rerum angustiis nihil præsen-taneum magis fore quam easdemmet venas, aut ex eodem derivatas alveo aperire. Quænam autem scalpello tam opportuna aderant, quam ipsæ (unde cæteræ omnes per caput dispositæ exoriuntur) *Ju-gulares*? Sive revellendi, si-ve derivandi gratia incidi illas opus sit. Utrumque enim horum assequi earundem sectione fas est. Quod sane etsi Paradoxum videri queat nonnullis, docte tamen, ac scite admodum recens persolvit Vir doctissimus (h) in aureis de Febribus commentariis ad lib. 1. & 3. *Epidem. Hippocratis*. Est namque ubi derivationis loco, ut ubi Revulsione causa hæc aliquando ob-ringat secare venas. Quæ quidem vocabula, licet satis antiqua sint, tamen nemo unquam intelligere poterit, nec proinde secandi leges in alterutro genere recte statuere, nisi accesserit accurata de vasorum structura, motuque sanguinis cognitio. Hocque verissimum esse facile agnosceret, qui Scriptorem qualemcumque ante ostensam sanguinis cir-culationem, atque adeo *Harveii* ætate superiorem perlegerit. Neque alia ratione Saphenæ sectio modo Menfes deducit, modo eadem in-consultius facta eosdem potenter suppressit: æque ac medicamen-ta discutientia, quæ tempestivius adhibita tumorem prorsus dissi-pant, serius admota excitant, atque attollunt, & in Pus demum resolvunt.

XLIV. Derivando equidem magis quam revellendo præstitam nu-
per

(a) Lib. 4. (b) Lib. 3. cap. 1. (c) Curat. per V. S. cap. 40.

(d) Centur. 4. 14. (e) Introd. Anat. 62. (f) Observ. Anat.

(g) Lib. 3. 7. (h) Jo. Freind. pag. 23. comment. 2.

per ab hisce opem novimus. Usus nanque, & ratio ostenderat, prius tundendam fuisse in brachio, aut in alia quapiam parte venam quamlibet, quam Jugulares; Sic enim humorum impetu, atque ardore jam elanguescente enata ad extrema vasorum obstructio revellentibus labefactata levior tandem negotio derivantibus funditus tolli poterat; Eadem plane ratione ac tumoribus cum inflammatione subortis occurrere Practicis mos est, præmissis scilicet ex alia parte longinquiore revellentibus, antequam derivantia adhibeantur. Hinc in illustri illa historia quam de gravi Oculi dextri inflammatione ad hunc modum sanata narrat memoratus *Hildanus*, primo die vena in brachio dextro secta dicitur, proximo exhibitum Catharticum, tertio demum Jugularis aperta. Eodem fundamento nititur consuetudo illa, qua ingravescente Angina post revellentia felicissimo successu Jugularem internam circa inferioris maxillæ angulum incidimus; Neque enim irrisione tam dignum est, quam *Cælio Aureliano* (a) videtur, quod de venis mammariis in eodem morbo secandi scribit *Hippocrates*; (b) Nam & istæ quemadmodum primus docuit *Fallopianus* (c) originem aliquando a Jugularibus ducunt.

XLV. Sive autem Jugularis interna five externa sit, five temporales, five aliæ quæpiam hisce affines venæ, perinde est. Usus quidem edocuit citius, securiusque rem absolvi apertis Jugularibus, in quas tanquam in communem alveum omnes illæ venulæ exonerantur. Tutius forte etiam, ac citius temporalium arteriarum sectio idem perfolveret, propter eum, quo sanguis effunditur, impetum, si modo pleno fluminis exiliat. Atqui hæc sectio, ut feliciter cedat, non nihil difficultatis habet; Etiam aliquando cum periculo fit; Quare vix auferim eam in modum asserere, nisi hujus olim *Galenum* meminisse noverim, ejusque absolvendæ modum tradere. Secuisse olim arterias, idque satis frequenter Veteres consuevere; consuetudinemque eam ita apud Ægyptios invaluisse scribit *Alpinus*, ut has illi haud rarius, quam venas scinderent. Nuperrime memini Præclaram Vestalem, cui diuturna Ophthalmia laboranti pletaque passim adhibita fuerant præsidia, nullo aut vix exiguo prorsus levamine, affixis tandem ac jubente *Temporibus* hirundinibus mira celeritate restitutam. Harum quippe altera cum se ita arteriæ Temporum forte fortuna agglutinaverit, ut vix inde auferri posset, plurimum effudit cruoris magno impetu prosilientis, quive ægre admodum cohiberi, nec absque magno labore potuit. Huic revellentia quæque, tum cætera Artis subsidia, quorum prolixam seriem ferunt Practici, diu ante usurpata postremo huic præsidio adhibendo illuxere. Nec longe quidem ab hujusmodi auxilii genere abludunt institutæ aliquando in vetustis hujusmodi affectibus scarificationes juxta ima, atque ad eorundem oculorum latera, tum prope summitatem Nasi, qua ejusdem vena ignoto plerisque tramite pergit. Antiquissimum id erat præsidii genus, cujus ratio & modus unam habent universalem causam, nempe ut pars, cui infliguntur, exoneretur. Venulæ quippe plures vix conspicuæ sub universa cute feruntur, quæ hoc more sectæ celerem aliquando opem præstiterit, quam vix sperare erat ab alia quapiam majoris venæ sectione; Sive quod illæ arteriarum finibus propiores sint, five quod arteriolæ pariter, quibus summa instructa refertaque cutis est, una invicem scindantur, incidanturque; five quod ibidem, in exilibus nempe vasorum meatibus, ac prope eorundem fines lentescere primo incipit cruor, diuturnum hinc sæpe ægritudinum ortus, ac incunabula. Quoad administrandi modum, duplex is est apud *Oribasium*; vel enim *Catà Phlegmæ* sit, idest verberatum, & punctum, vel *Catà Sirmon* h. e. pertractum, & cæsum, qui postremus modus magis in usu *Italæ* est. Atque hæc quidem ad *Æquinoctium*que gesta.

XLVI. Haud lætiora minus extiterant initia Veris. Orientales nanque, ac Boreales invicem diu ludentes venti ad aliquot dies adhuc dire perslarunt, silente tum temporis, suæque in claustra recepto Austro. Erupit is tandem leviter, perque totum deinde quod supererat Veris reliquum, ac Æstatem mitissimo flamine perspiravit, ruente vicissim per intervalla Borea, cujus gelido afflatu sæpe repente visa recurrere media Æstate hyems. Consuetudo hinc nivali vellere defraudata tellus, inopes aquis fontes, infesta præmaturæ rubiginis vestigia, magna ubique siccitas, ac perturbatio rerum. Rupicapras ipsas, quæ silvestris, & montana Fera est summa Alvim fastigia perpetuo inhabitans specie ac mole vulgaris Capræ, sed paulo celsior cruribus, quam esse solet caprinum genus, per subiectam planitiem excurrere assertum propter inopiam lympharum. In animalis hujus ventriculo reperiuntur sæpenumero globuli quidam adeo cardiaci, & alexicaci, ut lapides Bezoardicos virtutibus longe antecellant, si credimus *Veschio*, qui peculiarem de his scripsit tractatum titulo de *Ægagropilis*. Sæpe quidem Aprili mense exigua visa pluvia, at quæ vix Colonorum votis sufficeret; Quo usque tandem Majo uberius pluit, novaque, ac lætiora rebus affulsit spes. Kalendis Junii hora quarta circiter pomeridiana, nitido existente Cælo, Sol visus exemplo coloris fere cuprei, quo usque occiderit penitus; Sequenti die ater idem præluxit ad octavam usque horam circiter; Mox fragores auditi protinus, ac horrendis tonitribus circumfremere, ceu disruptis unibus Cælum. Æstas hinc temperata successit, ac lætissima prorsus si procellis commota minus extitisset, aut furentium ventorum immodicis flatibus. Nunquam enim majoribus grummis grandinare perceptum, frequenterque adeo ab omni parte Cæli emicare repente fulgura, nunc intermittente luce, nunc condita. Sæpe etiam fulmina cecidisse visa, hucque ac illuc ludendo prorumpere. Appetente Autumno Grues ingenti exercitu aera ad plures dies obumbrarunt. Ferri autem hæc videbantur magnis itineribus ab Oriente ad Occidentem, sublime editeque admodum, ac cum silentio volantes, quod serenitatem prælagire ajunt, secus ac si obstreperis vocibus frequentiores susurros excitent. Pulchrum erat integras cohortes cernere modo in cornua divisas, modo in unum collectas triangulum efficere circumeunte Duce, ceu exercitus præside, ac Rectore. Visa & Avis quædam Subalpinis ignota, subnigra rostro, subrubra pectore, subflava alis, subviridis pede, mole Turturis instar, *Garrulus Bohemicus* dicta *Gesnero*, de quo mira scribunt, tam quoad interuam viscerum constitutionem, quam quoad ingenium; Rectius forte *Rubicella*, seu *Pyrrhula*, aut *Ampelides Aldrovandi*. Serius quam olim advenerant Hirundines, tum serius etiam discessere. Insecta quod attinet, horum numerosam adeo extitisse progeniem haud meminimus unquam, ac eorum præsertim, quæ

Coleoptera, seu *vaginapennia* nuncupantur, quod alas suas velut in vagina recondant. Hæc inter novum quoddam spectatum animalculum albis nigrisque maculis tam pulchre variegatum, ut Vestem Damascenam Phrygia acu intertextam jures. Medio Vere, cum florescere primum cœpit frumentum secundarium, (*Secale* vocant Nostrates) summo illud mane exoriri perque aera vehi denso examine visum; Vespere dein sese super spica colligere, ac mori infesto prorsus aculeo; Hæc nanque cernere sequenti mane exusta prorsus, ac fere absumpta. Odore teterrimum aderat; Forte *Scarabæus minimus*, seu *Fullo Charletoni*, si molem, ac vestem varioartificio effulgentem spectamus: *Ephemeri* vero species potius, si vitæ illius brevitate respicimus. Erucarum ac Bruchorum magna soboles; velox interitus, ut & animalculi cujusdam vitibus summe insensu, *Italæ Taliadizzo*, Græcis *Ips*, ab *Ipto*, i. e. *Blapto*, *Noceo*; Quia proprium ejus est in vitibus versari easque erodere; Hinc vini proventus modicus, cui tamen tum aeris forte, tum ventorum sævitie, ac inclementia haud parum tulit. Vix paucæ per Æstatem obstrepere audiat Cicadæ. Subdulce mel, & subaquosum, Fœni exigua perceptio; Serici haud ingens; Copiosior Triticici. Hocce in horreis collecto sobolescere visa insecta quædam non alata illius summitates diro spiculo depascentia instar Teredinis. Toto deliquit anno Mercurius, nec unquam visus ultra 20. lineam ascendere, ceu constitutam sibi metam, ultre quam peragere vetitum.

XLVII. Ad Morbos venio, qui reliquo hocce anni decursu subluserant. Hos inter Variolæ visæ extemplo, adque primos Ventorum Meridionalium afflatus proludere, perque universum agrum errantis in morem hucilluc divagari, haud exiguo percussis timore Civibus, eam nempe, quam hæc superioribus annis ediderant cladem, adhuc dum animo expendentibus. Vix auferant illæ tamen Suburbia ipsa, nedum Urbem attingere. Citius etiam quam credebatur, se se subdlexerant; Nec diræ adeo, atrocesque, cujusmodi extiterant olim. Insolentius quidem intra Urbis mœnia debacchabantur recens ortæ ægritudines, quæ sane etsi diversæ ab iis primo intuitu viderentur nonnullis, quæ exacta hyeme, ac Autumno sævierunt, haud absimile tamen ingenium, irascendique morem præbuere; Quod rem attentius consideranti facile erat discernere. Enim vero vix mitior arriserat Veris Constitutio; Vix leniores perflaverant Venti, ut illico erumpere visæ foras pleno velut agmine Pleuritides, rectius forte *Peripneumoniam*, atque una simul ruere iis comites assiduæ febres, ardentesque. Sæpe etiam caput attollere videbantur Erisipelata, hosque ac illos indiscriminatim lacerare, at ludentis instar potius: Aut enim præludere hæc exaratis affectibus, aut iis obsequi magis, quam sibi quidquam addicere, perspicuum erat. Lusus illa revera aderant, quibus morbifica huc illuc pergens materies, aut jam forte vitalia claustra obsidens, etiamnum incautiores fefellerat. Præcipue enim hocce inter rerum fluctus metuendum erat de vitali Theatro, ubi dein ceu ablato Sipario postremus plerumque ludebatur Tragœdiæ Actus. Id unum solerti prudentique Viro prævidendum erat, ac totis viribus enitendum maxime, ne *fractio* aggerere ad pectus illaberetur errabunda materies, vel illabens illa, jam fortasse elapsa, quam cetissime illinc revocaretur. Hæc Medico erant artes, quæ vindicanda, ac servanda erat res.

XLVIII. Et sane de iis tuendis potissimum partibus agebatur, a quibus prima vitæ stamina proficiuntur. Huc tota Belli moles incubuerat; Huc pugnæ locus, huc prælii campus, huc denique rerum summa gerebatur, heu funesto plerumque exitu. Numquam frequentiores obvix vomica, ac dira pectoris mala. Quodve mirere magis, cernere erat haud paucis vomicam pene ex abrupto sese prodere nulla præludente febris, aut alio quopiam signo, quod sæpe latens intra præcordia quidpiam prænunciare solet. Nonnullis vix una, ac altera febris accessio præcessit. Plerisque; anxietas maxima, febris acuta, Tussis, sæpe etiam dolor lateris punctorius, pulsus mollis, velox, ac inæqualis, præcalidus spiritus, seu ingens inspirando fervor, sputa per initia liquidiora, cruenta, fetida, lingua urens, turbata alvus, sanguinis stillæ e naribus, extremorum frigus. Hæc prior mali Scena, cui nisi initio statim occurrebatur, inevitabile erat inducitur velociter Sphacelo fatum; Sæpe hinc congesto in parte aliqua pectoris pure, Vomica tandem in apertum suo tempore prodibat felici plerumque omine. Quamplures hac via per ætatem læta suppuratione evaserunt.

XLIX. Atque hinc luce meridiana elarius patet, quam falso Pleuritidis nomine id mali genus tum temporis indigaretur. Siquidem nec Tussis, nec *sputorum excreatio* inter signa, quibus discernitur Pleuritis, recensenda minime veniunt, quæ potius ad alium morbum huicque in multis dissimilem, *Peripneumoniam* nimirum pertinent. Mirabar ego Celebriores Viros in hunc errorem incidisse, hancque pectoris ægritudinem, quæ nihil commune habebat cum Pleuritico affectu, Pleuritidem nullo discrimine appellitari. Hinc tot audiat per Urbem sævire Pleuritides, quæ æquiore jure *Peripneumoniam* dici debuerant. Aderat & perennis altera, ac constans harum nota, quæ nullo modo Pleuritidi unquam competit: *Magnus scilicet in spirando æstus*, ob turbatiorem ac magis festinatam respirationem, oppressis magno onere Pulmonibus. Scio inventa Practicis vocabula quædam, quibus id ipsum explicant; Ast si fas est, quid ipse sentiam, aperte dicere, asyla hæc potius sunt ignorantie Medicorum, atque eorum quidem, qui, ut recte olim aiebat *Verulamius*, *fingunt simul, creduntque, Neque unquam nobiliores animos evexere*. Quantum vero conferat in re Medica præsertim rem unam ab alia discernere; Quantum inde Artis laudis, agris emolumentum accedat, nemo non videt. Legitur apud *Dodoneum* historia *Peripneumoniam* popularis, quæ tunc temporis, annis nempe 1557. & 1565. grassata est, huic nostræ haud abimilis: Atque is quidem ad extremum narratinnem suam sic claudit, quod scilicet *morbum hunc non Pleuritidem, sed Peripneumoniam fuisse mortuorum corporum dissectiones coram ostenderant*; & hoc utique innuere modestè videtur Vir Doct. Medicorum sui temporis errorem, qui forte eo tanquam de Pleuritico affectu judicium fecerant.

L. Nec difficile quidem erat conjicere, vel ab ipso unice pulsu nihil hujusmodi ægritudinem affine habere prorsus cum ea, quæ a Pleuræ inflammatione oritur, etsi Tussis adfuerit, ac dolor lateris punctorius. Nunquam enim aut saltem compertam paucis memini pulsum duritiem, quod quidem ultimum inter proprietatis notas malim reponere, quæ Pleuritidi conveniunt, quam cum *Galeno* Tussim. Cujus sane sententiam uti sæpius data opera aspernari, & respuere hominis esset valde arrogantis, ita in omnibus sequi velle, superstitio-

(a) L. 3. 4. (b) De Morbis 3. II. (c) Observ. Anat.

stipiosus est. Neque enim Authores in Medicina faciendâ, sed rationis momenta quaerenda sunt. Confusa hinc ac implicata, & a veteribus, & a recentioribus tradita huc usque est utriusque hujus morbi descriptio. Etenim si veterum scripta perlegimus, hi quidem eos inter se distingui scribunt, sed easdem utrique notas assignant; Idque facile animadvertere licet, quod quæ apud illos de Pleuritidis caractere habentur, ad Peripneumoniam meliorem jure referenda sint. Recentiorum vero plerique vix ullum inter hos morbos discrimen ponunt, gradu tantum dissimiles esse volunt. Nonnulli etiam Pleuritidem dari hand contendunt, quæ Peripneumoniam non habuerit conjunctam, ac vicissim inflammari hand posse pulmones, infante Pleura; Quod tamen & ratio & historia Medica falsum ostendunt. Multa namque Pleuriticorum cadavera secta sunt, in quibus Pleura corrupta integro Pulmone reperta est; Secus quidem si una cum inflammatione Pleuræ vitium quoque in Pulmonibus, siue quod idem redit, Peripneumonia adfuerit; cujus utique, ut quæ toties dicta sunt, iterum repetam, cujus inquam propria, & minime eminentia signa sunt una cum acuta febre *Pulmonum gravitas, Tussis, sputorum excreatio, atque ingens in spirando fervor*; Illius vero, Pleuritidis nempe, *anhelitus difficilis, pulsuum durities* (Quod caput est maximum,) *Febris, pungensque ac vehemens lateris assiduus dolor*. Equidem nedum magna, sed omnis, ut ita loquar, Medicis lux ab Arte Anatomica petenda est, qua morborum plurimorum, & proprias sedes eruere, & signa legitima discernere queant. Eam ob causam factum arbitror, ut *Celsus* elegantissimam illam humani corporis descriptionem curandi præceptis inferuerit: Utque eadem vestigia persecutus breve quoddam de partium structura commentariolum morborum Historiis præmiserit *Aretæus*.

LI. Et sane tota hinc, ausim dicere, pendet curandi Ars: Ut enim in Pleuritide liberior sanguinis detractio sola sæpe absque alio quopiam subsidio morbum absolvit; & hæc quidem, at majori circumspeditione instituenda in inflammatione Pulmonum est, cui oleosa omnia, quæ ad sputa elicienda idonea habentur, suum & quoque calculum ferunt; potiore quidem titulo, ac æquiore jure, quam in Pleuritide vera. Exemplo est *Anaxion*, cui haud veritus est *Hippocrates* magna sui laude octavo die sanguinem mittere, de remediis, quæ sputa extruderent, parum sollicitus. Quamquam enim nomen morbi in hac memorabili Historia reticeatur, haud difficile tamen est illum pro germana Pleuritide agnoscere. Est quidem utique revera *Divinum* in Peripneumonia, quod nunquam, aut raro in Pleuritide occurrit. Etenim intra parietes Pleuræ arteriolæ multæ a ramo intercostali deductæ effunduntur, quæ levi sæpe de causa nimium distentæ obstrui solent, inflammationemque pariunt; At Peripneumoniam quod attinet, hujus sæpe numero parens extitit, qui idem

graves morbos mortalibus affert multimode.

LII. *Nec vana loquor*: Eadem namque, quæ superiore Autumno, ac exacta nuper hyeme eas induxit ægrotudines, quas superius retuli, ipsa eadem adhuc dum vigens causa hujusmodi Peripneumonias Vere ortas, perque Æstatem dein late sævientes intulit, quæ plerisque in Vomicae haud inauspicato desiere. Is namque unicus aderat mali exitus, in quo nonnulla saltem posita spes erat adhuc. Curiosum erat processum omnem morbi in suppurationem abeuntis adnotare, cum scilicet inflammatoria materies ab ipsamet Natura resolvi non potens, nec Arte emendari, blandior tamen, stagnans eadem, calens, pulsque, coercentia latera extendendo, vel rodeno abcessum vomicaeve formabat. Futurum id clarissimo argumento declarabat ipsa morbi indoles satis quidem acris, nec tamen acerrimi, tum minime superata adhuc fera symptomata, quodque potissimum aderat, sputa liquidiora, nec criticis diebus evacuata per ordinem, qui sanationem doceret. Fieri autem jam prope abcessum ostendebant leves, vagæ, sæpe repetentes, sine manifesta causa horripilationes, stillæ sanguinis e naso, genarum rubor, fitis, pulsus debilis, ac mollis, febricula; Quibus, formato dein tumore, seu abcessu, Tussis una aderat comes pertinax, sicca, ad partum, motumve aucta; respiratio difficilis, parva, anhelosa, strepens; decubitus in affectum latus tolerabilis; sudor nocturnus, maxime circa jugulum, & frontem; urina spumosa; pallor, macies, debilitas summa. Proxime hinc impendebat tumoris disruptio, cui aut imminenti prope, aut sæpe etiam sub ipso disruptionis, puncto, ac temporis articulo, præludebant deliquia, turbationes alvi, stertor, hæmorrhagia narium, suppressa penitus sputa, moxque uberius eadem copia educta sanie commixta, fœda, terribilissima. Sæpe purulenta jam facta materies repente intra pulmonales venulas resorpta, ac sanguini permixta alio ferebatur, cum Præclaro Juveni contigit decumbenti, ad *Portam Eridani*, quem ortus inopinato ad sinistram autem abcessus extremo, quod prope aderat, eripuit fato. Quotquot in cava Thoracis, inque Mediastini dilatata vacua abiisse illam, aut ad hepar verri novimus, omnes perire.

LIII. Una scilicet spes salutis erat, si disrupto abcessu sputa bonis avibus ejiciebantur, suasque illa Phases, ac mutationes obibant *Prædictis* notas. Haud paucos hac via servatos memini, quorum exempla aliquot hoc in loco præscribere haud puto alienum.

Æger Primus.

Comes juxta Templum *Divi Francisci de Paula*, temperamenti atro-sanguinei, habitus strigosi, adque bilem generandam, ut aiebat *Hippocr.*, idoneus, medio Vere acuta febre corripitur cum dolore lateris punctorio, Tussi, *gravitate Pulmonum*, pulsus celeri, elato, valido. Idem superiore hyeme diu in facie Erysipelate laboraverat. Sæpe etiam olim Pleuritide vexari consueverat, initio Veris. Postridie exacerbata sunt omnia; ferus magis doloris sensus, intensior febris, fitis magna, pulsus duriusculus. Quarto stillæ sanguinis e naso; turbata leviter alvus; Urinæ subrubræ, atque suspensum in iis quidpiam; Somnus nullus; Sputa liquida, pauca; Summa corporis per intervalla frigida. Hactenus ad quatuor vices secta in cubito vena. Quinto Clarissimorum Virorum sententia nova imperatur Sanguinis missio, ac dein lenis exhibitæ potio ex Manna. Vespere calor vehementius exanduit; Parum adhuc Sanguinis e naso profluxit. Spiratio magis difficilis, pulsus velocior. Iterum ex brachio missus est Sanguis, ad uncias decem. Sexto lateris quidem dolor cessavit, ac fere ex toto evanuit, ac sævior adfuit Tussis, magisque corporis jactatio; Multa per alvum demisit biliosa. Septimo moleste magis habuit, nam & intendi magis febris, & infestare Tussis, & spiratio ingravescere visa. Conclamata prope res

erat gravi præludente stertore; Tum quidem novus repente obortus horror, commotæque sponte alvus, ac pene sub idem tempus copiosus ex utraque nare effusus sanguis spem fecit latius quidpiam hosce inter tumultus rerum elucescere. Exhibita sunt e vestigio cardiaca, oleosa, sputum moventia, inter quæ ego floribus Belzoin palmam, defero; Paulo post multa cæpit, & concocta expuere. Allevatus est. Undecimo Sputa faciliore conatu eliciebantur; lenior febris; Turbata adhuc dum alvus ter, quaterque per diem concretæ pauca demittebat probæ indolis. Sæpe etiam per vices a disrupto abcessu Sanguis visus e naribus proflire ad aliquot uncias. Victu tenui utebatur, potu melleo, *hydromeli* vocant Græci, quod liquoris genus est ex purissima aqua, & melle temperatum. Decimo quarto remissa penitus omnia; In urinis alba multa subsidebant; Sine siti erat; Bene spirans. Trigesimo quarto absoluta prorsus suppuratio est felicissime. Sæpe per id temporis accendi iterum visa febris, ac exandescere magis Tussis, at cito id, aut uberius urinae profluvio, aut commota alvo, aut sputo liberius elicto omnino evanescebat. Forte id etiam exigui alterius formati tumoris, aut alterius exiguæ vomicae exemplo disruptæ præludium aderat. Vix paucis obigit septimo die læto omine prodisse vomicae, perque totum morbi decursum assiduo lusu Sanguinem e naribus profluxisse, ac una simul turbati repente alvum; quæ quidem omnia amplissimam præbent contemplationum segetem, quo nihil Arti majoris compendii extitit unquam ac præstantius idem.

Æger Secundus.

Sacerdos *Congregationis Oratorii Divi Phil. Neri*, cui flaccidi diu pulmones, ac sæpe morbis conflictati, tum prope imminens senectus, ex febre tertiana duplici appetente Æstate decubuit. Comes huic aderant sputa improba, pulmonum gravitas, pulsus intermittens, ac leves animi per intervalla defectiones. Opem illi initio tulerat Pater meus; Atqui cum ipse paucis post diebus ab Urbe abesse coactus foret, gravioribus curis distractus; Egri tutela mihi relicta est. Cumque omnia sedulo, ac diligenter expendere, erupturam prope diem vomicae ægrotanti, ac adstantibus detuli. Die sequenti cum summo mane ægrotantem inviserem; disrupti noctu abcessus notam prætulit sputum sanie permixtum, tetrum olens, copiosum. Ipse media circiter nocte quid insolens persenserat sub imo pectore, ac pene animam agere visus; Diu ante incerti doloris vestigia in utroque Thoracis laterere occurrant, quibus una sicca, ac fera admodum Tussis proluferat. Selectioribus balsamicis, Traumaticis, Rhypticis in usum adhibitis recte peracta res est, ac omnis rescissa penitus mali origo.

Æger Tertius.

Reverendissimus Abbas *Congregationis Reformatæ Divi Bernardi*, gravi olim Orthopnæa diu detentus ex aliquot dierum itinere, cum sævius quam unquam perflaret Boreas, in febrim acutam incidit una cum magna spirandi difficultate, Tussi, dolore lateris punctorio, pulsus languido, ac inæquali. Mox intensius adaucta febris; Spiratio ingravescens magis; Facies, oculique, emortui hominis instar; Mens emota; Sputa liquidiora, viscida modo, ac cruentis linteis interstincta; Urinæ per initia tenues, nihil subsidentes, copiosæ. Brevi ad extremum redacta erat res. Decimo quarto subitæ defectiones animi, vacillans pulsus, frigida repente extrema, prope erupturæ Vomicae præluserant; Prodire mox visa puris instar, graveolentia exiguo conatu, fœda. Septimo & vigesimo obstricta dudum alvus biliosis multis perturbata est, nec paucis tempore talia multa processere; In totum autem tum febris reliquerat, tum sputorum excreatio latissime desit. Cruenti quidpiam ab hæmorrhoidalibus venis sub morbi decursu effluxit. Secta bis initio in cubito vena, mox altera vice in pede; Hirudines quoque ano affixæ semel; Disrupto tandem apostemate appropriatis remediis opitulatum.

Æger Quartus.

Pistorem propter *Portam Urbis Victoriam*, an potius *Victoriam*? Per illam namque INVICTISSIMUS REX, una cum EUGENIO PRINCIPE, ac cæteris fœderati Exercitus Ducibus Urbem memoranda illa die ingressus est, qua fractis, & profligatis Hostibus obsessam trium mensium obsidione Civitatem solvit, Italiam libertatem asseruit, Europæ securitatem restituit; Pistorem inquam febris acuta prehendit cum dolore lateris punctorio ad dextrum usque Hypochondrium, ac Regionem umbilicalem propagato. Magna abdominis tensio, ac totius corporis lassitudo; Facies mox ab initio subfusca fere, pulsus humilis, mœrentes oculi, respiratio gravis, anhelosa, difficilis. Quarto mitior dolor, pulsus intermittens; commota alvus; Urinæ flagrantæ; Sputa pauca, subflava, improba; Nox laboriosa. Septimo delinquens per intervalla e vestigio pulsus, vacillans idem, vix elatus; Paucus sudor circa caput prodiit; Nihil ab alvo dejecit. Nono sudore per totum corpus diffuso læta sputorum excreatio obigit, quæ ad vigesimum usque diem proba expurgatione perdurarunt. Huic ob virium jacturam, cujus certissimus index erat pulsus humilis prope, deficientique, semel tantum parca dosi missus fuit sanguis e brachio. Utramque tutius paginam implere Cardiaca, Balsamici, Traumatica. Magnam præstitit opem in principio Morbi Theriaca cum vino exhibita, tum quandoque etiam una cum aqua Scabiosæ, ac Symplicis de Papavere erratico; Hoc enim more cocta magis sputa liberiore via ex pulmone prodierant; Valentior itidem pulsus, ac validiores vires rediere. Vesicantia quoque bina admota humeris, fatus, moxque ab effracto apostemate Rhyptica, abluentia, consolidantia feliciter usurpata, inter quæ Terebinthinata quæque, ac balsamica cætera Principem locum obtinent.

Æger Quintus.

Oletoris Uxor juxta *Hortos Regios* decumbens fœda per hyemem scabie longo intervallo vexata, medio Vere febre acuta ex levi occasione corripitur cum rigore, ac dolore Capitis, anhelitu difficili, cui postridie sese una comitem addidit Tussis, fitis, ac dextro Pectoris latere per vices repetens. Tercio die febris rediit, mox dirior Tussis, abjectus omnino pulsus, sputa atro colore prædita, pauca eadem, ac summe viscida. Vespere sincerus ex dextra nare exigua copia sanguis effluxit; Alvus autem stercora probe demisit. Quarto rigor

gor repetiit, sopore aliquantulum detinebatur; Biliosa, flava, multa vomitione reiecit, paulumque intermittens, virulenta; Pulsus debiliior, ac inæqualis; Facies ab ipso morbi exordio vultuosa; Sputa liquida; Vires abjectæ prorsus. Refici hæc visæ sensim, ac recreari, atque una simul erigi pulsus, sputaque uberius ac probe elici, exhilarari vultus ab exhibita per vices Theriaca in aqua et toto Citro, aut Scabiosæ una cum modica dosi hircini sanguinis. Gemina quoque admota Tibiis vesicantia. Undecimo febris reliquit penitus. Trigesimo quarto exigua iterum proludente febre, ingenti oris salivatione correpta est, magna diu nocturne exundante feri copia, tenuis fœtidi, acrescentis. Quod quidem postremum repurgato tempore, tum sero lactis destillato ad aliquot dies præscripto in totum desit. Huic Genitrix septuagenario major, ac Soror aderat natu minor, occulto utraq; cancro pectoris dudum vexata.

Ager Sextus.

Alteram ex abortivo fœtu circiter quintum mensem febris acuta corripuit cum exiguo horrore sensu, lumborum dolore, & gravitate capitis. Tertio inaugebantur magis dolores; Respiratio difficilis aderat, pulsus debilis, extremitates frigidae, intus exstans, iactabunda, urens. Quinto sudor paucus circa caput, ac summum pectus dimanavit. Per vices visæ delirare, confestimque rursus ad intelligentiam redire; Sputa sublivida; Urinæ paucæ, tennes, nigrescentes. Septimo sub tempus matutinum e vivis migravit. Alvus huic per totum morbum recrementis multis, crudis, ac tenuibus fluxit.

Ager Septimus.

Faber Ferrarius Athletici habitus prope *Xenodochium Charitatis* ex febre assidua decubuit cum dolore lateris gravativo, Tussi, pulsu vix elato, inæquali. Sputa per initia liquida, cruenta, pauca; Respiratio laboriosa; Oculi micantes; Facies atro colore suffusa; Siticulosis; Insomnis. Tertio extrema livida fere, & frigida; Præcordiorum contentio submollis utrinque; Pulsus prope deficiens. Quarto mens perturbata fuit, aliquantulum insudavit. Multa per alvum dejecit improba. Quinto obiit. Aperto cadavere præduros pulmones Hepati substantia, ac colore consimiles comperi, plerisque intime albicantibus lineis interstinctos, e quibus purulentus, atque humor prodibat graveolens. Plures insuper intra cordis delubra exigui Polypi occurrerant, atque horum alter prolixus admodum in pulmonali arteria, perque illius ramificationes, ac majores truncos eleganter dispositus. Mirum sane, (quodque idem maxime lentescens liquidum, tum solidi haud amplius in proprios systalticos nifus confurgere potentis argumentum extitit;) Ut tam exiguo tempore tanta pulmonibus labe accesserit, tam cito hi suppurari, atque hinc intra horum sinum, ac profundiores recessus tanta congeri potuerit, fœda, ac purulenta materies! Hujusmodi exempla præter multa, quæ a nobis afferri possent, sexto videlicet, septimo, nono die denatorum, in quorum cadaveribus pulmones sanie undique scatentes reperti sunt, legere est apud Bonetum *Anat. Pract. l. 2. c. 4. Ballonium, Riolanum, Hollerium, Zacutum, &c.* Idem quoque in cadavere Illustris Viri Ludovici Gonzagæ sexto morbi die defuncti observasse refert Cardanus (a), cui nempe omnia *vala pulmonis ex triplici genere magis tamen asperæ arteriæ rami erant pleni sanie simili lacti, adeo ut nullus adesset prorsus sanguis.* Plerisque horum, qui celeri adeo fato sublatis sunt, nigroris una simul vestigia conspiciantur, imminenti illa, aut forte jam facti Sphaceli proludia. Conjicere autem erat prope adesse id a doloris carentia, aut minus exquisito illius sensu, quod quidem utrumque Sapientes nunquam fessit.

LIV. Neque id sane arduum conceptu est, ut una simul suppurationis, ac Sphaceli indicia accurrerint. Nec illa iis prorsus habenda fides, qui, ut id ipsum concipi queat, minime edocti, hujusmodi nigroris, seu Sphaceli notas in pulmonibus obvias, cadaveris corruptelæ adscribendas malunt. Cur namque ejusmodi nigroris vestigia in omnibus passim haud reperiuntur? Cur in pulmonibus illa potius, quam in intestinis, quæ ob fœcum colluviem citius quam ulla alia pars corrumpi, ac in sphacelum abire debuerint? Cur denique in uno tantum, aut altero pulmonis lobo, reliqua illius parte infonte penitus, ac integra? Equidem mali hinc potius culpanda sævitia, & suppurationem, & Sphacelum inducere celeriter apti, ut præclare idem explicat laudatus *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. p. 165.* Incliyæ Reginæ Joannæ exemplum afferens, quæ sexto die defuncta est, inque illius cadavere pulmones una simul multa sanie plenos, ac Sphacelo obitos deprehendit.

LV. Iſque aderat omnis sævientis morbi processus, quem quidem mihi adhuc ob oculos pono, ac inecum tacita cogitatione perpendo, præclare video, tum luce meridiana perspicuum magis elucet quam opportunum fuerit labentem hæc inter discrimina Naturam erigere, tueri, vindicare; Quam ex adverso *periculosa plenum opus alee* diversam ab hoc tramite viam insistere. Nullus hic enim ludorificis locus, aut catharticus, cum maxime in præcipiti res erat; Quinimo ipsamet caute adhibenda remedia, quæ recreandis, confirmandisque viribus dirigebantur. Quot equidem recensere ego possem e medio sublatis, quos hisce artibus, atque adminiculis servari posse evidens erat ac plane conspicuum; si modo in doctum ac prudentem Medicum incidissent? Quot *Orco* dedit præceptis unius hominis audacia, qui eo temeritatis evasit, ut indiscriminatim singulis decantatum quoddam sudorificum in ejusmodi pectoris ægitudinibus exhiberet, ceu Polychrestum, ac Divinum prope auxilium? Oh quam perutile foret Reipublicæ hujusmodi pestiferam hominum sobolem de humano Corio impune ludentium proscribere! Oh quam miseris ægrotantibus proficuum in solertis ac probi Viri manus devenire! Quantum vero expediat Medico, quæ exhibenda sunt remedia, mature expendere, eaque pro morborum indole, atque ingenio Exploratoris instar secernere; Ipse Peruvianus Cortex, ut de hoc uno loquar, ostendit. Is namque, qui superiore anno voto feliciter respondit, *Cane* modo peior, & *Angue*, fugiendus nedom in exaratis sævientibus pectoris affectibus erat, sed & in cæteris fere, tum potissimum in ipsis, quæ mox Autumno præluserant, quæve dein toto decursu anni sævierant passim, febribus; Evidenti quidem indicio, stimulo magis, quam fræno opus esse, secus ac præterito anno, quo tota humoralis massa ad orgasmum heu prona ni-

mis, ac *nescia stare loco*, coercenda erat potius, ac ceu injectio compede suos intra fines, ac limites, ne diffugeret illa prorsus, compescenda, quod quidem mire utique præstare potens est memoratus Cortex, ut Doct. Viri adnotarunt. Eandem ob causam pariter vesicantia, quæ superiore Anno noxia valde extiterant, ac nefasta prorsus, haud exiguum hoc labente anno ægrotantibus opem attulere; Ut & sanguinis missio, quam prope dixerim princeps potissimumque extitisse in hac Constitutione præsidium, ut superius ostendi. Equidem ut apud Geometras *curvum* norma sæpe est ac regula recti; fas est exinde decernere, quibus in morbis proficua sit, quibus econtra noxia venæ sectio, tum vesicantia, ac cætera quæque consueta Artis præsidia. Profecto si ab *Hippocratis* ævo ad hæc usque tempora hisce vestigiis institissent Medici, optatæ perfectionis apicem jam dudum attigisset Ars, quæ conjecturis & adhuc jure merito fœta illis videtur, qui haud sciunt errores non Artis esse, sed Artificum.

LVI. Omne scilicet, ut ad exaratas pectoris ægitudines me conferam, intra Thoracis claustra intime latebat malum; Quod quidem, si Erysipelatis morem, incrementa, exitum, quibus id ipsum sese perspicuum præbet aliquando, ac recens præbuit, attentius expendimus, ac utrumque horum invicem comparamus, nihil omnino diversum, ac discrepans reperimus; Quinimo fateri opus est ejusmodi exaratas pectoris ægitudines nil aliud revera esse, quam *Erysipelata Pulmonum*, quæ in gangrænam dein, aut suppurationem, aut in utramque tendebant. Febrim quod attinet, ejusdem hæc ipsa erat indolis, ingenique, ac illa, quam jam tum comitem sibi adsciverant Erysipelata superiore Autumno orta. *Crymodem* vocabat *Aetius*, ut eam ab *Thyphode*, ac *Lypiria* fecerneret, quæ obfesso Erysipelate hepate, aut ventriculo oritur. Ut autem ad pectus potius, quam ad aliam quamlibet partem præcipiti gradu rueret morbifica materies, ibidemque phlegmonis modo, modo Sytrophes, aut abscessus more subluderet, torque diras adeo ægitudines gigneret, haud abstrusa res est intellectu. Quandoquidem huc, qui per universum corpus perenni lege fertur cruor, totus pleno alveo pertransit: Huc miriplicatis generis vasorum textura præclaro invicem ordine ludentium conspiciuntur; Huc denique aeris alterationes quotquot effingere, aut cogitare animo quispiam potest, vestigia sui reliquunt. Hinc solidis, ac liquidis propagata labe: hinc Phlegmona, hinc Sytrophes, hinc enati ad pectus abscessus, quarum omnium ægitudinum parentem causam lubet ab aere ipso deducere.

LVII. Et sane ut is *acrioribus moleculis* dives superioribus annis, cum assidue adeo perflaret Austri, ad fluorem liquida coegit, ac dire admodum si quis unquam, adversus solida se fe præbuit, eadem crispando, vellicando, erodendo, ut tot palam fecere spasmodicæ affectiones, quæ tum temporis immaniter populabantur: Ut idem *subacidis*, ac *nitroſis Salibus* onustus, quas Boreas vehit, eadem sæpe liquida ad fixitatem deducit; nec solidis parcens ea a proprio sui elatere cogit recedere, inque systalticas reflexiones abripi haud finit amplius; Num vicissim ruentibus Austro, ac Boreæ, cujusmodi hæc ipsa extitit labentis anni Constitutio, *neutrum* quidpiam corrumpere aptum, ac figere abs re foret excogitare *salinum principium*; quod in aere ludens hæc intulerit ægitudines, tum a fixitate, ac *stasi* liquidorum, tum a putrefactiva eorundem, ac solidorum una invicem conspirantium labe pendentes? Quot enim ludere in mores fallia novimus? Quot illa formas induere? In quot se se larvas effingeret? Quis omnes horum species recensuit unquam, quot nec *Proteus* quidem *lufit*, nec *coloratus spectatur Camaleon*? Quis intimiora hujusmodi Naturæ abdita penetravit? Ut acidum, austerum, acre, & sexcenta alia in Sanguine latent inconspicua, ita in aere innumera ludunt, quæ homines *multimode* afficiunt, ac tot diversa inferunt mala. Equidem in ejusmodi rerum trepidatione, totque inter ventorum oppositos flatus æquum erat internoscere insolitum aliquid *per æthera inane ferri*, quo semel affecta liquida, ac solida fixitate illa, hæc labem, utraque necrosin, ac gangrænam susciperent.

LVIII. Ejusmodi itaque exoticis salibus imbutus aer obvium quidquid, ac suscipiendæ labe aptum magis inficit, ac lædit. Quæ quidem salia cum diversæ adessent naturæ, diversas quoque affectiones induxerant, *Phlegmona* nempe, *Sytrophes*, *Sphacelos*, *Apostemata*, prout figendo, & erodendo apta, aut horum alterum, aut utrumque sæpe pepererant. Numquam autem Sphacelo obstita ulla visæ pars, quin huic inducta in liquidis stasis proluserit, ortumque dederit, ac incrementum. Num vero exitiales ejusmodi moleculæ ob spirantium adverso invicem flamine ventorum concursu, num ab alia quapiam forte causa repetendæ sint, decernere nemo ausus unquam, ac revelare? An Terræ moribus quidquam tribuendum, jure dubitat (b) *Clar. Gagliardus*, quod idem observationibus longa annorum, locorumque intercapedine dissidentibus institutis, ac collatis invicem comprobare nititur. Ast & id ipsum gravibus adhuc laborat difficultatibus, quas quidem prævidit laudatus Author, haud tamen pro rei dignitate perfolvit.

LIX. Hæc inter lethiferas particulas liquidis, ac solidis æque infensas, exitiosæ, ac perniciosæ magis erant, quæ gangrænosam labem inducendo pollebant magis. Hinc enim enato celeriter Sphacelo velox discrimen, ut ægroto *sexto*, ac *septimo* obtigit, aliisque nonnullis, qui quarto plerumque, quinto, ac sexto die defuncti sunt. Nosse erat hujusmodi figentis veneni vim, (sit verbo venia,) vel ab ipso ore, vultu, oculisque ægrotantium; perturbati instar hominis, attonitique, fero heu, trucique obtutu; Lingua iis urens, ingensque in spirando fervor aderat, ac præcordiorum æstus, sitis Tantalea, dejectiones alvi nigrescentes, extrema frigida, pulsus per totum morbi cursum vix elatus, ac pene delinquens idem deficiensque. Atque iis quidem magni subsidii extitit Theriaca recens una cum cardiacis assumpta, cujus beneficio haud pauci evasere. Nec exiguum quoque opem attulere vesicantia initio admota, horum quippe auxilio ad loca remotiora protrusis lethiferis, exoticisque salibus, seu, ut Præfici ajunt, morbifica materie producta, atque ibidem exonerata, non omnes passim enecabantur, quam plurimi etiam superstitis fiebant.

LX. Nec vero quis me forte putet inconsiderate adeo Theriacam in hujusmodi Phlogisticis, ac mali moris pectoris affectibus adhibuisse. Ecquid enim ex ingenti remediorum segete usu præclarior, ubicumque internæ viscerum corruptionis, ac Sphaceli metus est, quam Theriaca, quæ lethifera spicula eludat, putredinem arceat, cruorem ne effractis vinculis in fluorem totus abeat, -coerceat, ac mobilissimas

(a) De providentia ex anni Constit. pag. 1052.

(b) Relazione de' mali di petto dell' anno 1720. p. 33.

simas illius partes retineat? Num in Pestibus, quarum Natura in tenuissima celerissimaque putredine maxime versari, vel ex eo clarum fit, quoniam nullus morbus illis æque est contagiosus, præsentissimum hæc ipsa auxilium est, cæteris longe præstantius? Narrat (a) *Forestus plerisque Hagæ Comitum anno 1580. cum ejusmodi ægri- tudines dire ibi crudeliterque sævirent, se ipsos tum alios absque Me- dici præsentia curasse assumpta Theriaca.* Quod tamen auxilii genus, utpote vulgare, ac comparatu facile haud ipse omnino probare vi- detur, ait namque idem, *præstare magis ea omnia adhibere, quæ ve- ra methodus curandi docet, quam uno calipodio, ut calcearii, aut uno medicamento omnes curare.* Nunquam enim forte noverat adhuc Vir eximius specificorum usum in Medicina, aut quod illius ævi mos erat, crediderat ipse sanari haud posse tuto ægri- tudines, nisi peregrina, ac pretiosa remedia comparantur, quæ

Lucis in ortu.

Indus, Arabs, Syrus, divesque Sabæus

Vicino sub sole legit, quæ præbet Orontes,

Eximia ignoto mittit quæ Nilus ab ortu.

vanam scilicet ac fulem Medicinam esse, quæ remedia proponit, ut *Plinius* loquitur, parata vulgo, inventu facilia. Heu quam misera- bilis aderat illis temporibus Reipublicæ nostræ facies, quotve nobilissi- mam Artem erroribus implicarunt ingenia Arabum?

LXI. Ubi vero inflammatoria materies in suppurationem abie- rat, perque illa sputum expurgari cœperat, summa erat nitendum ope, ut rite id leniterque prodiret, tutaque dein, ac subita ulee- rosi loci depuratio contingeret. Subit hic loci, atque in memoriam redit miræ in præclara Vestali curationis exemplum, cui hujusmodi abscessus in Pulmone diu latens erupit tandem, ipsaque una cum spu- to folliculum ipsum (mirabile dictu) quo purulenta materies inclu- debatur, ejecit. Erat is cystidis instar efformatus, inque ejus fundo purulentus humor conspiciebatur ejusdem coloris, ac substantiæ, cu- jusmodi aderant sputa, quæ jam diu ante prodierant. Vesiculam ad- fuisse crediderim in hunc morem protensam ex iis, quibus totus undi- que Pulmo eleganti artificio componitur, in qua ceu in folliculo, aut cystide pus continebatur, atque earum quidem, quæ majoribus Tracheæ ramis proximiores sunt, quo facilius assiduis tussiendo co- natibus omni, quo adnectebatur, soluta compede aereos tubulos, quorum ad fines exiguæ ejusmodi vesiculæ appenduntur, subire po- tuerit, perque os dein protrudi. Equidem folliculatas, ut ajunt, Vomices seu hujusmodi Pulmonum abscessus, qui propriam sibi Cy- stim comparant, nil aliud esse arbitror, nisi vesiculam quandam hoc pacto extensam, purulenta in illam materie e finitimis vasis sece- dente, atque ibidem collecta, quousque tandem ob sui copiam, aut nimiam acrimoniam effracto claustrum in asperam arteriam, aut in cava Thoracis effundatur, Anatomica Pulmonum administratio per- spiciorem rem efficit: quippe sanguifera vasa, quæ per totum Pulmonem innumeris propaginibus disseminantur, quæve admira- bilem ibidem contextum explicant, ad universas vesiculas pergunt, juxta quas illa variis amplexibus, ac gyris una invicem ludunt, ac desinunt. Ecquid autem conceptu obvium magis, quam tenellis desinentibus arteriarum, aut venarum orientibus ramulis disruptis, in vesicularum sinus sanguinem sensim effundi, ibidem colligi, ac dein in pus verum abire? Hinc enormes aliquando ejusmodi Vomices, aut plures una simul eodem tempore, aut successive erum- pentes. Videmus in statu præternaturali aneurismata passim, ac va- rices ab dilatatis arteriis, aut venis efformari, ac diversas passim glandulas laxiores evadere, intumescere, inque magnam molem consurgere. Num æqua ratione vesiculares pulmonum cellulae ex- tendi magis, ampliores effici, ac dilatari haud poterunt, subque folliculi imagine minus in Anatomicis peritos eludere? Nam & eadem forte hæmorrhoides incrementa, ac incunabula, totque di- rarum pectoris ægri- tudinum?

LXII. Altera Vomica species recensetur, quam tamen vix ego Vomica dixerim: Quando scilicet in pulmonibus foveam unicam, aut forte binas efformari quandoque contingit, easque circumcirca parietes callosos obtinere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur, sed quotidie tota, copia licet in- genti, expectoretur; Hi satis sani degunt, bene respirant, comedunt, & dormiunt incolumes, aut saltem in modico corporis ha- bitu persistant, & non raro peresunt. Hinc nonnulli dicuntur Phthy- sin per 30. aut 40. annos habuisse. Vivit apud nos Mercatoris U- xor quinquaginta quinque annos prætergressa, plurium liberorum mater, e quibus unus ante biennium Phthysicus obiit: Illa habitu phthysico ab annis plusquam viginti mere purulenta expuit, sceleton referens, & quanquam a catarrhis in pulmones cæbro decumben- tibus, præter frequentes ex liene ægri- tudines, fato sæpe fuerit pro- xima, nostræque cura liberata, periculo tamen semper defungitur, ut in illam quadrare queat, quod eam mulierem, de qua *Hippocrates: Quinquies mortua est.* Quemdam olim secui tabe extinctum, cujus dum pulmones inspicerem binas utrinque cavernulas avellanæ ca- paces, non tamen exacte rotundas, aut æqualiter cavas reperi, sed quasi laceratas, ac si a mustela, vel a glire frustularim portiuncula avulsa pulmones exesi fuissent. In harum altera ulceris callo recens obducti vestigia adhuc supererant. Sæpe is sanguinem tussiendo expuerat, tum paucis ante obitum diebus magna copia ejecit atri, spumosi- que.

LXIII. Utque rem in pauca contraham: Ut nullam absque fol- liculo, seu cystide vomica concipio; Ita harum quotquot occur- runt, sedem, ac locum in vesicularibus pulmonum cellulis statu- dum autumo. Hinc purulenti, ac puris discrimen; Quæ namque ab effracto apostemate expuitur materies, verum illa ac genuinum pus est. Quæ vero purulenti instar se habet magis, hæc nullam præ- gressam, aut præsentem vomica, aut saltem flaccidis natura pulmo- nes, aut eosdem nimio onere oppressos significat. Quod sane rite est discernendum, ne sæpe quamlibet aliam pectoris ægri- tudinem pro vomica accipiamus. Utriusque, purulenti videlicet ac puris distin- ctionem præclare assignat *Divinus Senex lib. de alim.*; Enim vero ut haud concipi unquam potest ullum fieri posse pus absque suppuratione, quidquam sane inter hoc, & purulentum intercedere opus est, quod nempe ad purulentum tantummodo sufficiat sanguinis vitium, secus ac in pure generando, cui & solida suum quæ calculum præbent. Adversus *Hippocratem* stare videtur *Galenus* ex sanguine pus fieri ratus, quod in phlegmone in abscessum abeunte sanguis extra vasa effusus in pus vertatur. Atqui haud advertit ipse suppuratione-

nem haud fieri unquam posse absque carnis erosione, quod sane in- dicat sinus post puris evacuationem sæpe relictus; Sanguis enim fu- sus, & calefactus, ut antiquissima Verba usurpem in hac parte, humidam, & calidam carnem, quam attingit, corrumpit, ex qua carne, si Natura robusta fuerit, verum pus nascitur, cui non raro admiscetur aliquid puriformis ex sanguine, & humoribus extra vasa effusus. Ego quidem totum, quod adest inter pus, ac purulentum discriminis ab ipsis humoribus petendum existimo: Vel enim san- guis est, vel lymphæ quæ in pus abit. Utrumque enim horum per proprios sibi demandatos ductus uberi gurgite excurrit. Utque ab illius vitio verum pus, sic ab lymphæ pituitam illam putrem, seu purulentum illud, quod a vero pure secernitur, generari puto; Ad utriusque vero generationem solida æque concurrunt; Discindi hæc namque, erodi, aut quocumque alio modo lædi opus est, ut inde a receptaculis suis, per quæ vehitur, sanguis, aut lymphæ secedat, inque pus abeat, aut purulentum. Atque hinc e folliculatis vomicis verum pus, secus vero ab iis, quod foveas duntaxat, aut caverna- las in pulmonibus obtinent, exire cernimus; Quod illæ ab sanguine per ima quotquot Delubra pulmonum discurrunt, atque in vesiculas exundante enascantur. Hæc vero ut plurimum in extrema pulmonum parte conspiciuntur; Lymphatica namque vasa superficiem tantum pulmonis attingunt, perque illam assiduo lusu feruntur.

LXIV. Cæterum quodcumque illud sit discrimen, quod inter pu- rulentum, ac verum pus intercedit; Idem illud facere videtur, quod & alterum. Utrumque enim sæpe inevitabili fato prolusit. Rursus in hoc etiam differunt, quod pus malum sit ut signum, & ut causa; Ut signum, quoniam abscessum, & inflammationem systro- phicam præcessisse declarat; Unde consumptio partis pulmonis se- quitur: Ut causa, quia nisi exeat, febrem lentam fovet, rigores inæquales affert, & corrumpit partem, & in qua manet, & con- tagio vicinam. Pituita vero putris, seu purulentum, malum est ut causa tantum, quoniam afficit Pulmonem ipsum mora, nisi exitum habeat. Sic in tussibus aliquando cum purita excernitur, & sputum album, & semiputre, atque ut aiebat *Hippocrates*, simile puri. Quæ huic succedit Phthysis diuturnior, ac propagari aptior altera est, quæ ab vomica provenit.

LXV. *Verum illuc, unde capi;* Ejusmodi pectoris ægri- tudines prope comitabantur anhelationes, quas Græci Asthmata vocant, Tusses, raucedines, capitis dolores, ventris tormina; atque e chro- nicorum classe Hydropes, eæque pectoris potissimum, Tympanitides, Tabes, Arthritis, Scabies, postremaque hæc pueris præsertim, ac fœ- minis. Quædam etiam per ætatem gliscere visæ febres mali ingenii, eoque illæ peiores, truculentioresque, quo Canis instar rabidi hos, at- que illos absque latratu laceßebant; Hisce sese addiderant verminosa alia, hæcque inter nonnullæ, quæ incerto plerumque circuito, mi- ti, placidoque vultu ludebant, quæve diriores, inclementioresque evadebant, si quis illas consueto more expugnare tentaverat. Obe- flores in universum, quibus

Pinguis aqualiculus propenso sesqui pede extat, sæpius, crudeliterque magis vexati; Tum qui antiqua in Cruribus, aut Tibiis ulcera, aut peculiarem quampiam ægri- tudinem diu fovebant. His namque inopinato arefcente ulcere, aut vetere sanato malo, pectus illico afficiebatur infausito successu. Hoc pacto sublatum initio veris Romanum Pontificem CLEMENTEM XI. audivimus, delatis mox Ecclesiæ clavibus Generis nobilitate, ac moribus Spectatissimo Viro *Michaeli Angelo Cardinali de Comitibus*, qui nomen sibi assumpsit IN- NOCENTII XIII. maximo totius Christiani Orbis gaudio, ac plausu.

LXVI. Invalescens ætate frequentiores adhuc, quam unquam vomica extitere, quæ quidem, etsi pari felicitate absolverentur, non eadem tamen initia, ac incrementa observabant, ac quæ anteacto Ve- re proluserant. Plurimis namque levissima de causa vomica erupit, nullo sæpe prævio vestigio doloris, aut horum quopiam, quæ sive futurum, sive jam factum abscessum, sive prope impendentem illius disruptionem prænunciare consueverant. Sæpe hos inter fluctus ven- torum Variolæ, ac Erysipelata sese prodere conabantur, vix tamen quidquam memoratu dignum edidere. Quidam etiam media ætate subito fato tum in Urbe, tum in Agro erepti sunt. Desinere tan- dem, saltem haud ita frequentiores occurrere appetente Autumno cœ- perant memoratæ vomica, ac tum rursus quidem, direque magis foris prodire exarata febres, quarum tamen vix ullam cernere erat abs- que comite Pectoris labe, sive hæc illis præcurreret; sive in hanc illæ exierint sæpe. Vix pauci per ætatem Dysenteria laborarunt.

LXVII. Primis Augusti diebus magna caloris vis exitit, mox triduum tonitruosum, pluviosum, ac quandoque grandinosum suc- cessit. Immotus per id temporis Mercurius constitit diu; Visus hic ima repente petere, ac veluti in Perigæo degere, cum prope impen- derent tonitrus, *Calique fragores.* Sæva hinc exarata alvi Tormina accessere, quæ etsi primo intuitu leniter laceßere viderentur, in contumacissimas dein, periculosas, ac plerisque lethales ægri- tudines accedente æquinoctio degenerarunt. Ingens quoque hic loci comme- moranda subit Puerperarum clades, quarum plurimæ abortivos fœ- tus edidere. Forte id nedum liquido ad lentorem toties memora- tum proclivi, quin, & solido quoque nimis debili, ac laxo maxime tribuendum; Utrumque ab arcana, ac inexplicabili aeris constitu- tione, unde & cæteri effectus prodierant, repetendum.

LXVIII. Equidem, ut verbo me expediam; Vereor namque ne in magnam nimium molem excreseat Pagina; Si quotquot hoc an- no regnarunt, ac longe lateque sæviere, malorum indolem, inge- niun- que, atque originis principium attente perspicimus, nedum vi- deo lentoris crimine redarguenda liquida, quin & forte maximam vitii partem solidis tribuam nimia laxitate peccantibus. Ecquid enim tot vomica, ut unam instar omnium ægri- tudinem in exem- plum afferam, ecquid inquam tot hoc anno vomica, quot nunquam audita olim? nisi ab solido in crispaturas suas, ac proprios nifus de- duci haud potente amplius, ac pene dixerim, deficiente? Anne for- te quis adhuc, frustra declamante *Petronio* (b) in eo est, ut totum liquido opus, nihil in economia animali solido velit adscribere, ignorance potius pertinaci, atque inani sectæ amore, quam ratio- ne aut consilio? Juvenior nuper secui ex febri acuta vigesimo morbi die defunctum, cui omnes Peripneumonix notæ aderant; Huic univ- versa Pulmonis substantia in strumas veluti composita conspi- ciebatur, quibus apertis ingens puris copia profiliebat. Quidam quo- que diuturno affectu catarrhali vexatus, qui mox in ascitem dege- nera-

(a) *Obser. 3. de febr. cum morbo Fpid. grassant. p. 152.*

(b) *Satyr. pag. 78.*

peravit, cum vesci amplius haud potuerit, inedia necatus perit. Aperto Cadavere summe flaccidos Pulmones, ac multa sanie repletos, tum viscera quæque imi ventris laxa admodum, ac ventriculū præsertim, comperi occluso penitus Pyloro, ut nec Stylum quidem admitteret. Num id fluidis potius, an solidis ascribendum? Num & ultro toti erimus in expendenda *liquidorum intemperie*, Principis illius intemperiei, quæ in solidis est, immemores prorsus, earum ignari rerum, per quas vivimus?

Constitutio Epidemica Taurinensis Anni 1722.

Anni Historiam perscribere aggredior a superioribus duobus, qui hunc præcessere, annis parum, ac vix, toto sui decursu, dissimilis, sive adspirantium ventorum indolem ac morem spectamus, sive ingruentium morborum sobolem, ingeniumque. Ventī namque, ut ab iis ordiar, qui, ut verissime ait *Argolus*, in *animantibus salubritatem unice ingenerant, suscitantque*; totius anni curriculo, assiduo, nec unquam interrupto flamine diu perspirant ab Hyperboreis modo plagis, modo ab Australibus oris erumpentes. Varia hinc, ac incerta omnino tempora; Præmatura modo hyemis, immitisque; lenis eadem modo, ac Veris potius imaginem referens, ac vicem: Prout nempe aut ruens ab alto Boreas, sævusque Aquilo, aut turbidus Auster perflabat. Recurrere sæpe visa media hyeme æstas; Floraque ubique in agris ludere, lætaque prodere initia veris. Lubet autem altius ab autumnali æquinoctio, ubi superiore anno desii, initium ducere, antequam ad hyemem ac annireliquum festinante calamo properet Oratio mea.

II. Autumnus itaque, quæ quidem anni tempestas Medico maxime diligenterque expendenda est, utpote quod sub id ferme temporis nova plerumque soleat morborum cohors in scenam prodire, toto deinde anno longe lateque regnatura; Autumnus, inquam, statim ab initio horridiusculus, ad plures dies præluxit, præcipiti ruente Borea. Atqui redire protinus, auctusque velut viribus perspirare iterum, ac sævire magis visus Octobri Auster, quoniam deinde validiore impetu erumpere denuo abeunte libra cœperunt ab Orientalibus primo, mox vero ab Aquilonaribus terris horrentes gelidique flatus obscurato æthere, effusisque super Alpium cacumina, perque subiectam Planitiem, finitimisque agros, vix tertio ab Urbe lapide, ubertim nivibus præcocem heu, asperamque hyemem portendentibus. Unius adeo mensis spatio urens modo æstas, modo rigida hyems sæviit, extremosque utraque conatus edidit, pugnantibus invicem, ac velut de summa rerum, quis nempe horum prior terga daret victori, palmamque alteri victus cederet, certantibus inter se ventis. Vicit utique, vicit, diuque ludentium australium iram, sævitiemque tandem omnino fregit iis oppositus Aquilo; Novaque extemplo, etsi mitiore quidem imperio, morborum legio se se palam ostendit, inque apertum prodit, quorum vestigia, ac pene dixerim, prodigia nosse erat appetente æquinoctio; cum primum scilicet horridiuscula aura, silentibus ad aliquot dies, suæque in claustra illico receptis Austris, dire perflavit.

III. Cernere quidem erat recens ortas novæ indolis febres per id temporis subludere ab iis, quæ antea æstate, ac superioribus annis ultro citroque debacchabantur, primo aspectu omnino discrepantes, intermittentes videlicet, aut intermittentibus analogas, usque comites, ac pedissequas veluti, statim ac ruere Boreas cœpit, plethorasque passim ægri tudines, Asthmata, Lippitudines, Hæmoptoes, Paralyfes, Dolores vagos abdominis, Pancreatidis, Mæfenterii, aliarumque per ima ventris latentium utriusque glandularum Obstructiones, contumaces quantum, ac consueta hætenus Præcicis Methodo invictas prorsus! Utque omnem morborum Iliadem, qui, ceu a *Trojano Equo* denso agmine Milites, ab uno omnes fonte progerminant, brevi fermone complectar; Dolores acerbissimos artuum, Nephritides, Apoplexias, quibus diuturnæ Hemicranie, aut suppressa consueta quæpiam de more evacuatio præluserat. Addere hisce fas est lugendam, ac deplorandam adhuc *Puerperarum cladem*, earumque præsertim, quæ abortivos sætus pepererant. Senes in universum, diuturnisque malis confecti postremum subiere fatum, quamve diu eluserant mortis vim, hanc tandem obire, ac commune omnibus aleam experiri coacti sunt. Phthisici quoque omnes brevi tempore sublati, ii scilicet, quibus aut hæreditaria labe pulmones obfederat dudum, aut adventitia eadem recens obtigerat post prægressam vomitum, aut aliud quidpiam in imo pectore latens, abditumque. Equidem invalescente hyeme, redeuntibus, demum in scenam Austris, se se conde re hæc visa prope; Ac tum quidem Variolæ, morbilli, acutæque febres, quæ sub intermittenti larva primo, aut altero accessu delitescerant, moxque dein in subcontinuas mali moris celeri pede migrabant, torrentis in modum hos atque illos nullo discrimine aggrediebantur. Id tamen minime quidquam officit, quin totius anni imperium, potestatemque morborum exaratis intermittentibus febribus, aliisque præfatis ægri tudinibus, quæ sub illis militare videbantur, dominatum inquam, præcipuamque iis sedem tribuamus.

IV. Totius hinc decursu anni præter modo dictas febres intermittentes, dolores potissimum abdominis, immanes iidem, sævique admodum præ cæteris sævire; quodve peculiare aderat, ac notatu dignum, videre erat statis plerumque horis exiguo præludere rigore, aut nullo quandoque etiam prævio horroris vestigio ejusmodi dolores recurrere, statisque pariter horis evanescere. Nonnullos quidem sine ulla intermissione iis vexatos memini, atqui ceu in febribus subcontinuis observare est, quædam aderant novæ exacerbationis indicia, ac certa veluti prologia novi, ac dolorifici, ut ita loquar, repetentis paroxysmi. Sed de hisce in præsentiarum satis. Præstat modo, quam exorsus sum, tandem absolovere, rectoque dein tramite, quo unusquisque memoratorum affectuum sese prodiderit, vultum, quem servaverit, typum, quamve præ se tulerit, indolem ac genium explicare.

V. Medio circiter Octobris Orientalis aura uno alterove die læto flamine adspiravit. Mitescere hinc non nihil æstus cœperat, quem reviviscentes iterum Australes flatus attollere, insuetumque paulo post frigus erupit, gelido Aquilonis afflatu, cuius vim, feritatemque, nedum Incolis, Arboribusque, ac plantis, sed & ipsis etiam insontibus aquis præmaturo gelu concretis, ceu sub rigidissi-

ma hyeme, vix orto Autumno, insensam adnotavimus. Quod quidem nulla hætenus hominum memoria Subalpinis unquam obtigerat. Obscurum hinc sæpe cælum, varium idem, incertumque; mox serenum, atque præclarum, prout Orientales modo, modo Aquilonares venti perflabant. Sæpe etiam visum, ac diutina experientia compertum, obscurum nubilumque autumno cælum reddi Orientalibus ventis spirantibus, serenum vero, nitidumque idem evadere instante Borea. Postremum Octobris diem inpetuosus in maxime, præcepisque ruens obsignavit.

VI. Felicioribus auspiciis sese prodidit subsequens Mensis. Lætior namque ab Occasu adspirans Africus sin minime sævi Aquilonis iram omnino retudit, illi saltem morem imposuit, vinique, ac sævitiem ejus maximam, magnam in partem coercuit. Saluberri mos utique, lætissimosque Subalpinis occidentales ventos jam dudum novimus; quod quidem ego adnotare operæ pretium duxi; cum primum morborum quotannis apud Subalpinos sævientium historiam, quotannis & illam, quandiu vitam mihi, ac vires huic oneri ferendo pares dederit Deus, persolvendam conficiendamque daturus; Angustæ Urbis, quæ totius Regni caput est, Regumque inclita sedes, agrique ejus, ac universi Subalpini tractus, qui ad Alpium radices infidet, conspectum ac positionem, tum cæteras aeris & alimentorum qualitates, quæ Urbium cælum constituunt, descripseram. Furere hinc denuo Boreas visus ad aliquot dies, novo tum rigente gelu tellure, concretisque suis in alveis indomito frigore aquis. Quod supererat mensis reliquum, tum Decembris initia Auster iterum funestavit. Observatumque nunquam, sive is, sive alter quispiam ventorum perflaret, perspirare illos cœpisse, quin obscurari e vestigio cælum videretur, ac inopinato prope tempestas impenderet. Ad Solstitium hæc usque gesta.

VII. Exordia hyemis tum modicus effusus imber, tum uberi dein copia delapsæ cælo nives fœderunt. Veris illa potius, quam hyemis primordia dixisses. Magna hinc temporum subsecuta tranquillitas, lætaque rerum conditio. Mite prorsus, placidumque cælum, lenibus per intervalla obsecundantibus ventis ob occasu modo, modo a meridionali plaga proficiscentibus. Haud minus læto omine Januarius illuxit, qui & idem ad postremum usque diem permansit, hujusce felicitatis, lætitiæ, ac serenitatis Authoribus unice Occidentalibus statibus assiduo, lenique flamine e propinquis, atque excelsis Alpium fastigiis perspirantibus, quæ illorum, si quid insensum iis manebat adhuc, coercerant. Mirum utique nos iis plerumque ventis serenitatem debere, cum ex adverso impetuosus hi maxime ac insalubres Gallie occidentalis regionibus sint. Atqui si vastissimum illum tractum mare inter Atlanticum, ac Alpes, quæ nobis ad occasum imminet, animo metimur, si suprema Alpium fastigia, ac præcellos harum vertices intuemur, ita quidem compositos comparatosque, ut insensum quidpiam, magnoque impetu ruens compescere queant, ac inhibere; mirum haud videbitur amplius, ut lenes ii ac temperati dein Subalpinas hæc regiones benigno afflatu pervadant. Uberrimam namque vaporum aquosorum copiam, quam hi secum ex Oceano adferunt, magna ex parte suo in itinere dimittunt, tum si quid adhuc retinent, antequam Alpes attingant, omnino deponunt. Norunt id quidem Allobroges, ac finitimi iis incolæ, qui trans Alpes degunt, quibus secus ac Subalpinis, nubilum ac pluviosum aerem ejusmodi venti adferre solent. Id scilicet beneficii Alpibus debemus acceptum, sic una dispositis, ac collocatis, ut non nisi placidos pacatosque ventos ad nos appellere ab ea parte sinant, perque patentes campos discurrere. Secunda Januarii die cum advesperasceret prope, primoribus nempe noctis tenebris, obscurus quidam auditus cæli fragor, & passim cadentium fulminum species visa, violentissimo e Boreali claustro ruente turbine meridiam versus contremiscente veluti, ac commoto Sole: Citissime tamen id desit, nec ultra horæ quadrantem perduravit. Mane sequenti serenum iterum, ac sedatum cælum, idemque totius fere mensis spatio præluxit.

VIII. Priores Februarii dies fœdi admodum mæstique extitere, obducto nubibus sole, densoque velut sipario, ac caligine obvelato; Lætiores hisce successerunt ad æquinoctium usque, occidentalibus iterum per intervalla hiscentibus ventis, qui itidem ad austrum modo, modo ad Boream accedentes pulcherrimam modo, modo lætam minus rerum scenam effecere. Ediscere erat, ac veluti prænoscere ejusmodi ventorum aerisque vicissitudines inspecto Barometro; quandiu enim perspirabat ab occasu lenis aura, videbatur in media veluti statione Mercurius detineri, unoque tantum alterove grada ab illa discedere, humilis ille, aut elatus, prout ad Austrum modo, aut ad Boream venti declinabant. Prope appetente Æquinoctio varium iterum, incertumque cælum exitit furentibus Austris; Pluviosum mox idem, nubilumque, quo usque tandem nitidus ac lucens Sol in ipso veris limine, e tenebris velut, quibus obvolutus aderat diu, emerit lætus, beatissimosque dies incolis tulit. Beatissimi utrique, lætissimique dies, quos præclariores inter, aureoque signandos lapillo, jure merito recensere fas est, quippe qui Regiæ Celsitudinis CAROLI EMMANUELIS Pedemontium Principis Augustam Sponsam ANNAM CHRISTINAM LUDOVICAM, e Regio atque Imperatorio Comitum Palatinorum Rhæni Sanguine ortam nobis dedere, magno civium, ac subditorum omnium, exterorumque plausu, lætitiæque. Insonant etiam num auribus meis publicæ voces hilaritatis obstreperantium passim bombardarum tonitru exaggeratæ. Versatur ob oculos festorum ignium splendor. Occurrit animo triumphalis ingressus Majestas, ingens omnium ordinum alacritas, confertissima populi multitudo: dubium ut esset, an hæc una in Pedemontio Civitas, an totum in hac Civitate Pedemontium contineretur. Proh Superi quam festa, quam augusta pompa gaudiorum! Nec exigua quidem laus est Medicos hosce factos tam bene auspicato, fortunatissimoque connubio ceu præclara quadam, felicissimaque Epocha obsignare. Annuat Deus populorum votis, ac precibus, Patrique, Avo, Proavisque simillima concessa Prole, omnigena hoc uno collata nobis, quod idem maximum est, præcipuumque, beneficia compleat, æternetque.

IX. Mitem adeo placidamque hyemem, ut e diverticulis in viam redeam, secus ac protendere videbantur autumnii initia, transigimus, vix una aut altera vice spirante Borea, sæpe quidem Occidentalibus ventis, quibus australes etiam aliquando, reciprocantibus invi-

cem Imperiis, obsequabantur. Die Martii vigesima sexta, cum Sol ad occasum vergeret, horrendis tonitribus æther circumstremere auditum, absque omni cæli parte emicare visa fulgura, nunc intermittente luce, nunc condita, effusa mox torrentis instar pluvia grandine commixta. Sævisimus hinc, qui diu siluerat, furens Boreas, adque plures dies perdurans luctuosissimam rerum faciem, media inter gaudia, ac jucundissimi veris præludia, quæ amœniora haud extitere diu, reddiderat. Languere enim omnia illico vidimus, prætæque, agros ac nemora fidere veluti afflatu ustulata, quæ paulo ante virentia undique, lætisque decorata floribus cernebantur. Luctuosum utique ac deplorandum spectaculum omnium oculis erat canentia circumquaque arva intueri, glacialibus ulla pruinis, rigidoque horrida gelu.

X. Aprili mense iidem assiduo, ac diro flamine perspirarunt Boreales venti, obscuro plerumque ac procelloso aere, sparsa quoque subinde pluvia nivibus mixta nimboris, cum potissimum initius rueret heu tot parens malorum Aquilo. Eadem Majo ac Junio scena si quosdam tantum dies excipias verna serenitate, ac spirantibus quandoque etefiis, quasi æstiva temperie, commendabiles. Sic veris speciem hyems tota Austrina exhibuit, cui postmodum ver successit hyemis naturam veluti mutatis vicibus referens. Eodem modo subsecuta æstas est usque ad caniculares dies, quo tempore satis curiosum fuit lusciniæ audire pro cicadis arbuta rumpentes.

XI. Nefastum sane, & infalubrem annum nemo non præviderat, tum ob apparentia in mororum foliis signa uredinis, quæ sterilitatis prodroma est, tum ob pertinacissimam siccitatem telluris, arefcentibus ob inopiam humidi plantis, oleribusque. Illarum pleræque media fere æstate honore frondium orbatæ, ceu appetente hyeme, videbantur. Etsi enim ver pluviosum potius signare obtigerit, quam siccum; detrimenti id tamen magis agris fuit, quam utilitatis; Nocturno namque gelu madens adhuc tellus gelido velut rore inspersa mane conspiciebatur. Intemperatum adeo, ac exlegem omnino annum experti sumus, nulla ex illius partibus legitimam ac propriam temperiem servante, sed una alterius subeunte vices, funesto prorsus discrimine. Æstatis reliquum nunc lenes, placidique anniversarii venti, nunc spirans ex alto Boreas lætum modo, placidumque; perfrigidum modo, ac procellosum, tonitribus intermixtis, cælique fragoribus tulit.

XII. Antequam vero ad morborum historiam me conferam, lubet pauca delibare leviter, brevitetque percurrere, quæ quidem explicandæ illustrandæque morborum indoli, comparandoque eorundem genio accommodata esse videntur. Sic enim recto velut tramite una properamus ad metam, quæ inferius dicenda manent, conspicua eadem magis evadunt, ac præclariora.

XIII. Quæ altera emisit folia Morus, (ut a Principe arborum exordiar, quæ haud exiguas incolis opes præbet,) exusta, ac veluti absumpta cernere erat, rubigine illa ne, an flavedine potius anceps hæreo. Flavedinis enim vestigia ubique aderant, seu rubiginis minus intensæ; atque ad flavum colorem vergentis. Cæteræ fere arbores, tum frugiferæ, ut Armeniaca Malus, Cerasus, Ficus, Nux, Olea, Pirus; tum steriles, ac infelices, ceu Cornus, Fagus, Oleaster, Salix, Tilia, Pinus, Abies, ipsa dein virgulta, arbustaque, fruges, ac hortensis universa familia haud obscura Epidemica hujusce (sit venia verbo) rubiginis indicia præbuere; Uvarum quoque proventus, qui veris initio aureus sperabatur, ob eandem causam nonnisi parcissimus extitit.

XIV. Quoad insecta, nunquam adeo exiguus spectatus horum numerus, tum eorum, quæ primo vere, tum quæ invalescente æstate ludere quotannis cernimus, perque aera denso agmine circumferri; *Noctilucas* præsertim, quæ vespertinis horis quasi tot Phosphori æstate potissimum erumpere solent, vix paucas omnino præluere observatum. Nec dubium Borealibus id ventis tribendum maxime, a quibus nitrosas particulas magna copia advehi compertum est. Et sane quo in loco hujusmodi insecta advolant, hæc ipsa sulphuris ibidem, quod aptissimum eorundem pabulum videtur, præsentiam comprobant, quod & insuper fœtidi odores, quales ex sulphure & sale unitis percipiuntur, tum endemii iis in locis, aut per ea tempora morbi ultro confirmant, ac docent. Atque hinc quidem fit, quod in Russiæ, & novæ Angliæ quibusdam partibus, ubi tum hujusmodi animalcula, tum Cantharides, Scabæ, Locustæ, Formicæ, Scorpiones, ac Pediculi alati, tum alia pleræque hujusce modi insecta raro, aut nunquam visuntur, eæ vix ægritudines sævant, quæ apud nos soleant adulta pæsepe æstate caput attollere, ac debacchari magis. Locustas inter nulla frequentior Subalpinis *Gryllo* -- *Talpa*, horrendo visu Insecto quadruplo, maximam superante cantharidem, præcipue ætate si fuerit provectiori. *Gryllum* hanc appellari puto, quia eundem forte cum *Gryllo* stridorem nocte appetente facit; *Talpam* vero, quia terram continuo fodit. Est & altera species Locustæ, cujus præ cæteris magna visa hoc anno soboles, *Italica*, seu *Mantis* dicta, vel quia suo adventu ver præsignat, ut *Anacreon* cecinit: vel famem prædicat, ut *Celius* annotavit, vel quia anteriores pedes, veluti manus, supplices semper tenet, atque elatos, vatam more, qui eo gestu orationes ad Deum fundere solebant. Tam Divina censetur bestiola, inquit *Rondeletius*, ut puero interroganti de via, altero pede extenso rectam monstret, atque raro vel nunquam fallat. Pulcherimæ aliæ locustarum species in Apulia, ac Sicilia reperiuntur, quarum altera *Italica* magnitudine, & forma similis, alium tamen ex naturæ locivæ dono colorem accepit: Habet enim cornicula saturate lutea, hyacinthinum ocellum, alas ex luteo fatiscientes, corpus reliquum amethystinum. Gracilis altera quinque uncias longa, cucullata, capite pyramidalis, e cujus pene vertice duo cornicula latiuscula unciam fere longa sese erigunt, galerumque illum Turcicum biplumem, quali Janissarii utuntur, superbientem repræsentat.

XV. Prolixa esset res ea omnia recensere insecta, quæ hisce in oris sobolescere quotannis solent, quorum quidem alia periisse brevi, alia vero ne in scenam quidem prodierint hoc anno visa; Hæc inter Erucæ potissimum enumerandæ occurrunt, quæ ceu nocendi artis oblitæ prorsus, ac veluti immemores, inertes passim per agros, ac fere emortuæ ludebant intactis frugibus. Exigua mole animalcula infesto plurimum aculeo, *Erucæ* sic dictæ, vel ab erodendo quod erodant olèra, & pampinos: vel ab hærendo, ut *Apulejo* pla-

Sydenham Opera Medica.

cet, quod pertinaciter adhærescant: vel a rugis quibus se se vicissim corrugant, erugantque. Distinguuntur a *Mouffeto* in Eterogeneas, sive affines a Papilionibus, & aurellis fatas, Autogeneas sua ex tribu profectas; Utriusque innumera sunt species, ut innumera extant herbarum genera, quibus vescuntur; quælibet namque herba peculiarem alit erucam sui vastatricem.

XVI. Ab Erucis ad Bombyces, ac Apes progredior. Præclarum utraque insecti genus, nec exigui incolis emolumenti. Aliquot illud hebdomadarum spatio albæ Mori frondea sagina sartum, idoneaque ad lanificium materia instructum edere deinceps desinit, ramulumque sibi objectum inscendit, ubi ovata figura membranaeum effingat folliculum, circumque eum bombycia stamina ordiatur, factus *Bombilius*. Neque hic prodigiorum finis. Post exhaustam lanificii materiam ejusdem folliculi cavo se abdit, occlusa omni ad exitum via; pauloque post factus *Necydalus*, hoc est, cornutus, & alatus *Papilio*, nisi mature præfocatus fuerit, perfocta membrana, conscissoque flamine sibi exitum molitur. Haud minus exquisito artificio alterum *dulci distendit nectare cellas*, *Apis* sic dictum, vel quod se pedibus invicem alligent apes: vel quod sine pedibus nasci primo videatur. Pro priori ratione facere illud videtur *Virgilii*, 4. Georgicon.

Aut illa pedibus connexæ ad limina pendent.

Pro posteriori militat illud ejusdem,

*Trunca pedum primo, mox & stridentia pennis
Miscetur.*

Deplorandum utique utriusque fatum! E bombycibus enim vix pauci *nitidum de pectore filum*, pretiosaque stamina edidere. Haud modica etiam pars imperfectum opus reliquit. Apes vero cernere erat incertis huc illuc erroribus ludere, favos veluti suos despiciere, & frigida tecta relinquere, seram increpitantes æstatem, *Zephyrosque morantes*.

XVII. Haud minus aquaticis quoque, ac terrestribus insectis infestus annus fuit; (sua etenim aquis animalcula adfuit, ut terrestria Solo) sive id ab eadem universali, ac prope inexplicabili aeris constitutione repetendum sit, sive potius ab aquarum inopia, amnibus, fluminibusque, ipsoque etiam Pado Fluviorum Rege, exhausto fere aquis, vixque ea superflite quantitate lympharum, quæ ferendis navibus sufficeret. Magna hinc piscium egestas quorum penuriam lacustres assatim compensarunt, tum e vicino advehi littore. Fluviales inter frequentiores extant Subalpinis Trotta, Mullus, Timallus, Lucius, Anguilla, Mustella vulgo *Botta*, seu quod utriusque similis sit, seu quod capite ranas referat ut *Cardanus* deduxit; Lampetra a lambendis petris sic dicta: Nobilissimus semper tum a veteribus, tum a modernis habitus Piscis, & Apiciis esui mire expectitus. E lacustribus principem sibi vindicat locum *Umbla Allobrogum*, quasi umbra, seu quod haud exiguum cum umbra pisce fluviali similitudinem habeat, seu quod tergus præ multo livore opacum, & veluti umbrosum appareat: *Rondeletio* Salmo lacus lemani, quod corporis specie, pinnarum numero, sitque, & partibus internis Salmonem referat. *Umble Chevalier* communiter dicitur, forte ob magnitudinem, præstantiam, & robur.

XVIII. Fabulosa non minus quam ridicula de Anguillarum ortu, ac propagatione nobis tradidere tum veteres, cum recentiores. Incertum diu saltem nec exploratum satis, an viviparæ forent viperarum ad instar, an revera, ut cæteri pisces oviparæ; quod postremum haud ita pridem felicissimo conatu detexit Doctissimus ac Præclarissimus *Antonius Vallisnerius*. Comparatum id, ac proprium veluti est magnorum Virorum, cum verum retere se haud posse norunt, fictitium aliquod in scenam promere ac fabulosum. Sic Jovis hæc filias nonnulli olim credere referente *Athenæo*, ut Deorum munera fungos alii, & rubera pronuntiarunt; Haud aliter quidem ac magnates, aut Reges, quibus vel brevi terminata ævo, vel incerta origo est consecrare illam, adque Deos auctores, aut Heroum quempiam remotissimæ ætatis referre consuevere. Abjecta ex adverso quidam iis incunabula dedere, limoque ac cæno ortas putarunt; *Quid enim fecundius illo?* Sed hæc, & his similia, ut & ea quoque quæ hac in re ridicula prorsus apoposuit *Aristoteles*, ut ut antiquitatis laude præclara, haud in magno equidem ponam discrimine. Mirari id magis subit, ut eruditi alias, ac percelebres fama viri, vel nuperrimis hisce temporibus viviparas illas adhuc decernere ausierint, suæque Posteris figmenta commendare. Quodve mireris maxime, exiguum nobis vesicam in abdominis cavo locatam, in qua sæpe vermes latent, quamve in omnibus fere piscibus, avibusque, imo & in canibus aliquando, ac plerisque brutis videre est vermiculis confertam, hanc, inquam, vesicam pro utero Anguillarum, vermesque ibidem latentes pro anguillarum fœtibus imposuere. Atque hæc libenter etiam concedam; Nec etenim refutandis hisce fabulis tempus suppetit. Danda hæc vitro venia, quod præjudiciis occupatas quorundam mentes, *Leeuwenoechio* Duce, ac antecessore, densioribus patuit tenebris obvolvere, vel dum clarius, ac dilucide magis perspicui ab illis credebatur. Quod vero quidam asseruerint se in prægnantis anguillæ utero undecim anguillas exsecuisse singulas suis secundinis inclusas, ut *Charletonus* affirmat, sive ut *Efnerus* ait, in diversis membranis involutas; id ego haud patiar unquam Posteris impune tradi. Aut enim, quod sibi affinxere animo, ceu visum, ac perspectum oculis nobis dederunt; aut si ejusmodi revera anguillulas in abdominis cavo intueri est aliquando, vermiculos eas quidem fore crediderim, minime vero unquam veros fœtus anguillarum. Quod vel ipse quidem *Aristoteles* adnotavit, nec tamen unquam in mentem subit Viro, si illius ævi caliginem, barbariemque maximam perpenderit, vere doctissimo, præfatos vermes pro anguillis agnoscere, quinimo adversus illos, qui hosce veros ac genuinos esse anguillarum fœtus contendebant, acriter admodum insurrexerat; in quo sane haud exiguum promeruisse laudem videtur. Id ipsum quoque eleganter non minus, quam docte adverterat Præclarissimus *Redi* Hetruriz suæ fidus fulgentissimum in aureo tractatu: *Delle osservazioni intorno agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi*.

XIX. Adverterat sane præfatus Author, atque e viviparorum classe rejiciendas anguillas contendit. Earum tamen ovaria nemo

ante prælaudatum *Vallisnerium* vidit unquam, aut revelavit. Manebat enim Sapientissimum Virum, ac naturæ arcanorum perscrutatorem solertissimum, Philosophos inter ac Medicos hujusce sæculi celeberrimum, ac jure merito Principem, honos ac laus, quæ ad hæc usque tempora latuerant ovaria Anguillarum, in lucem vindicandi. Manebat, inquam, doctissimum Virum inventi gloria, eo præclarior illa; quo obscuriora, ac cœnosiora, ut ita loquar, adsunt earundem anguillarum primordia, ac incrementa. Cernere est hæc ipsa ovaria secus Spinam porrecta adiposis ubique striis circumtexta, tenuissimæque membrana obvelata, quæ detracta ovula occurrunt, ceu totidem exiguissimi, ac lucidissimi Uniones, suo singula annexa pediculo, per quem nutriti roris vestigal supeditatur. Præclarius id, ac illustriore modo spectatur in prægnanti anguilla. Quæ cum rarissime occurrat, quod tum temporis, ut Cl. Vir observavit, ima petat aquarum; haud mirum hinc quod tot hæc magnorum eluserit ingenia virorum, obscurumque id, abditumque magis obscuritas ipsa originis fecerit. Laudaro utique *Vallisnerio* nostro *Paulinus* præluxit, huic in eadem arena *Severinus*: Is genuinum anguillarum uterum primus vidit. Ille etsi ova haud inspexerit unquam, ex iis tamen illas nasci, naturæ legibus edoctus, contendit: Nos, sic ille ait, ut omnia animalia ex ovis, seu seminis suis, sic etiam anguillas ex iis nasci dicimus, licet *Plinius*, *Aristoteles*, *Jo. Vessius*, *Scottus*, cum aliis pluribus ova, semenque denegent, clamantes ullam nunquam captam esse, quæ aut semen genitale habuerit, aut ova. Hæcenus de Anguillis.

XX. Exacta vix hyemæ advenerant Hirundines; citius quoque, quam olim consueverant, eadem discessere. Cæteræ fere aves, tum quæ stans temporibus redire solent, tum quæ totius anni decursu hæc inhabitant oras, raræ admodum extiterunt. Rarior præ reliquis visa *Ficedula*, exigua avis, ficubus, ac uvis victitans, ut pulchre his versibus testatur *Martialis*:

*Cum me ficus alat, & pascat dulcibus uvis:
Cur potius nomen non dedit Uva mihi?*

Idem pariter canoris fatum avibus, iisque præsertim, quas vocant *insestivoras*. Secus coturnicibus obigit, turturibusque, quarum ingens omnino copia conspiciebatur, ut & reliquarum fere avium, quæ plantis vescuntur; Has inter postremas, si colorem, pulchritudinem ac elegantiam spectamus, merito superbit *Pavo*; Si Apiciis credimus, Principem sibi comparat locum, ac dignitatem *Urogallus*; seu *Phæsidis ales*, sumpto forte a Colchidis amne nomine, ad cuius ostia illos frequentes convenire a Græcis proditum est; unde mox citatus *Martialis* in Xenis:

*Argiva primum tum transportata carina,
Ante mihi notum nil nisi Phæsis erat.*

Horum duas habemus species, quarum altera major vulgo dicitur, ac toto fere corpore nigricat; Minor altera nuncupatur, ac cinereis maximam partem plumis vestitur. Majo mense spectata huc illuc obvolare Avis, ignota prorsus incolis, mole Turturis majoris ad instar, fulgentibus plumis, ac prope subflavis. Visa, & altera invisita hæcenus prosperante æstate, rostro contra omnium avium morem ab utraque parte recurvo: colore juxta collum subviridi, reliquo corpore, subobscuro, brevi pede, aliisque, ac cauda exigua: *Loxiam* crediderim *Gesneri*, seu, ut alii vocant, *Curvirostram*. Ignotas ejusmodi aves, unusquisque fere annus, ut morbos, producere solet, quæ statim ac se se circumvolando produnt, citissime effugiunt, adque distas longe oras emigrant.

XXI. Neve intactum quidquam præteream, quod ad illustrandam, exornandamque morborum historiam quoquomodo facere videtur; numerosa hic subit haud reticenda Leporum, ac Cuniculorum spectata hoc anno progenies, Glirium itidem, Alpinorumque Murium, Talparumque; Ne scilicet defuisse forte videretur in omnibus Natura; aut quod, idque ego putarim magis, toto existente anno magna sui parte impluvio, dehiscente præ ingenti ficitate solo, ejusmodi animalibus, quæ alias cuniculos sibi fodere in agris, ubi lateant tum æstate, tum hyemæ, solent, haud ita facile fuerit cubilia sibi condere; proindeque excurrere illis pro lubitu necessum exirerit, perque arva, camposque patentes e propriis velut expulsa sedibus ludere, ac oberrare. 5. Ventriculi janitor linea quadam transversa veluti ligatus atque distinctus. 6. Larynx qualis in testudine terrestri; Mutum enim animal. 8. Panniculus carnosus totus, & mire commissus cuti. 9. Pro Optico nervo fibrilla, quæ secta guttam unam, atque alteram aquei humoris, ceu roris effudit; eaque insuper, non e consueto loco, quo exire solet Optricus nervus, sed a perreptantibus per cerebri meatus vas, egrediebatur. Atque hæc quidem in *Talpa*. In *Marmota* vero, seu mure alpino sequentia cernere est; Cæcum peramplum; interne asperum, & reticulatum, in quo valvula insignis introrsum externe; Hepar septenis lobis distinctum; Testes aliquantulum superiores; Splenem longum hirundinis majoris modo; Uretres non recto ductu descendentes a renibus, sed dorso adherentes, & exiguos. Verum de hisce fatis.

XXII. Neve diutius in iis, quam par est, recensendis, immorer, utque omnia in unum recolligam, velaque, ut ajunt, *traham*, & *terris festinem advertere proavam*; Lætissima, ut adnotavimus, exordia Autumnii extiterunt; latissimus hinc quoque futurus annus, si quem, rupto ceu *aggere torrens*, ruens immitis, ac sævus Aquilo vix orto Autumnio haud fuisset. Præmatura hyems, ac extemporanea prorsus; Mitior eadem, ac Veris temperiem redolens, cum magis sævire debuerat. Ver illi successit imbriferum, perfrigidum, luctuosum, quo dein furentibus præter morem, appetentem solstitio æstivo, nunc ab Austro, nunc ab Arcto ventis reliquum anni ad æquinoctium usque, ingens, ac pertinacissima diu vicens siccitas memorando ac pene insautio eventu persolvit. Obfigurare hinc licet, nigroque cortice adnotare annum præ nimia siccitate telluris, ventorumque ludentium idole exlegem penitus, præbente natura, quod exiguum nobis dedit, indignabunda veluti, ac ranquam dira noverca, quæ rerum olim sedula Parens dici gaudebat. Quæ sane haud arduum erit conjicere, si quæ al-

lata hæcenus sunt, tum quæ adjiciam deinceps, scite diligenterque expendamus.

XXIII. Ad morbos me confero, quos vulgares appellare lubet, non equidem, quod in vulgus sæviant, ac infimæ tantum fortis, ac notæ homines laceffant magis; sed quia vicissitudines temporum, ac discrepantes invicem annorum tempestates referant potius, ab iisque procedant. Ac primo febres occurrunt, quæ omni deposita ineunte Autumno larva, intermittentium revera typum; ac morem præ se ferebant. Luserant nanque illæ diu superiore anno sub intermittentium personato vultu, quo tandem omni abjecto furo sese tales jam modo ostenderant, quarum ingenium olim simulaverant. Quinimo plerisque horum, quibus acuta ægritudines in chropicas sensim fatisciente æstate desierant, orta repente Autumno febris tertianarum genere brevi restituit. Lætam hinc augurari fas erat Taurinensibus rerum scenam, si hanc extemporaneis flatibus erumpens Boreas, aut huic per intervalla succedens, ac sævissime ludens Ausfer haud immurasset.

XXIV. Et quidem vix hos, ac illos indiscriminatim benignis intermittentibus exaratis febribus correptos adnotaveram, vix novam rebus faciem illucescere adverteram; Ut mutatam hanc iterum extemplo vidi, ac veteres primo aspectu reviviscere morbos, qui recens elapso anno longe lateque regnarunt. Atque id sane probe expendendum Medico est, antequam quid statuat decernatque ad curationem morborum conducens; Num scilicet reviviscens morbus, aut eandem fere cum iis, qui superiore tempestate luserant, referens imaginem, iisdem vincendus sit artibus, eodem ac qui præcessere, subigendus more; Num vero quidam porius habendus respectus sit ad id ægritudinum genus, quæ novissime in apertum prodierunt; quibusve jure ac merito vulgarium totius anni morborum imperium deberur, ac dominatus. Sæpe ego in hac incertus arena extiti; ac tandem rationem habendam esse mecum ipse decrevi ad novam, quæ in scenam emergit, morborum sobolem, etsi hæc non omnino adhuc sese revelaverit, suumque omni relicto simularionis artificio vultum haud explicaverit prorsus. Eo quidem consilio, quod nempe nova orta tempestate, quam inter, ac superiorem magnum inest discrimen, novus hinc quoque fluentibus per abditas corporis scarutignes, ac profundissimos recessus liquidis; solidisque una ludentibus invicem; novus inquam vigor accesserit totus mutatus ab illo. Ut proinde etsi redire quandoque, ac remeare gradum iisdem videantur adolenscente Autumno morbi qui exacta æstate sæviere, quid tamen latere intus æquum suspicari sit, quod doctiores sapissime fallit, ni ea omnia quæ mutatis invicem tempestatibus emergunt, attente expendantur. Quod quidem, quantum intersit Medico nosse, & observare, jam suo tempore agnovit, graviterque inculcavit *Hippocrates*: dum ita librum suum de aere, aquis, & locis auspiciatur. *Quicunque artem Medicam integre assequi velit, primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat. Non enim simile quidquam in illis existit, verum differunt invicem propter varias, quæ in illis sunt, mutationes.*

XXV. Sanè si recta mentis lance ingruentium Autumno ægritudinum indolem perpendimus, facile erit conjicere, quænam harum toto vertente anno regnatura sit, ad quam scilicet cæteræ omnes, quæ subinde vagantur, sese referunt, ac illa quodammodo militare videntur, ceu stipendio conducti milites. Ejusmodi aderant effectus ii omnes, qui tum per Autunnum, hyememque, tum vere, ac æstate subluserant, agmen ducentibus, ceu Epidemicis primi ordinis, quasque ob id Epidemicarum hoc anno ægritudinum Principes merito salutare lubet, intermittentibus febribus jam explicatis, tum fusc modo, diligenterque explicandis. Ut enim ad eas cæteræ omnes, ceu initio inter se invicem pacto referebantur, faciemque hæc tulerant reliquis; Sic hæc primo describere æquum est, ac sub oculis ponere, quo præclarius deinde reliquarum ingenium elucescat.

XXVI. Vix itaque Libram æquis itineribus subierat Sol; ut illico tunc qui per ante ætam ætatem ægrotaverant diu, tum qui ægrotabant adhuc, insertisque passim ac diuturnis morbis conflabantur, quales superiora tempora attulere, tum qui ægrotare tum cœperant primum, inque morbos incidere: hi omnes fere ejusmodi indolis, ac familiaræ febribus decubuerunt. Vixi nanque tum plures quidem inopinato e diuturnis malis, hujusmodi oborta auspiciato febri, convalescere, ceu cum *Thaumantris*, & *Electræ* filia pulcherrima Iris post diuturnos imbres, nimbosque perennes, præfulgere tandem nubes inter, atrumque cælum videtur, futuræ serenitatis prænuncia.

Mille trahens varios adverso sole colores.

XXVII. Sperare fas erat Iridis instar ejusmodi febres post tot exaratas, quæ superiore anno dire admodum, insolenterque debacchabantur, ægritudines læto omine elucere tandem, pacemque, ac tranquillitatem rebus, sedato malorum turbine, allaturas. Nec sane vix omnino fessellit exitus. Etsi enim sese abscondere quandoque videntur, ac prope extinguui; Haud difficile tamen erat, cernere lulum id esse; jocumque, quo sæpe solent vulgares hujusmodi affectus, quibus incunabula præbet Autunus, ac potissimum horum Princeps, Medicorum artes eludere, ut docte advertit *Sydenhamius* Anglorum *Hippocrates*: Videbantur siquidem modo Asthmatis larvam præ se ferre, modo Arthritida simulare vultu, nunc etiam sapissime quæ sub ficta doloris Colici imagine dirum in modum ægrotantes divexare; Ut infinitas nocendi artes præteream, quibus hos atque illos nullo discrimine aggrediebantur. Ars hinc erat Medico oculum hostem, insidiasque fruuentem, vel ima inter delubra, sanctioresque lares appetere, oppugnare, subigere, iis quidem telis, quibus præfata febres subigi consueverunt. Quos naniq; simulata illa, ac dolorosa mali facies plerisque fessellat, ægrotantes hi suos aut inevitabili fato dederunt, aut graviora iis discrimina attulerunt, celerrimamque jacturam. Adeo sæpe *Delirant Reges, plebuntur Achivi*.

XXVIII. Si qua tamen sub larva subludere hæc febres frequentius advertimus, diutiusque in moreni miseros ægrotantes exercere, vagus ea quidam, ac incertus dolor abdominis aderat, sæ-

vaque.

vague tormina, quæ stas sæpe etiam horis, ceu ludere periodicas febres videmus, recurrerant, eundem prope typum servantia, ingeniumque, ac eadem fere tempora, quibus præfatæ febres circumscribuntur. Ac quidem meminisse obiter juvat exarata ventris tormina, quæ dire modo, crudeliterque sæviebant, jam tum *Julio*, & *Augusto* (ann. 1721.) mense per æstatem prodixisse in lucem, quibus, tonitruosus cæli status, procellosus idem, ac sæpe etiam grandinosus, subfrigidusque ad plures dies proluserat, qualeni deinde appetente *libra*, ac toto passim Autumno experti sumus. Cudebantur scilicet jam tum illa, quæ postmodum sese ostenderant, mala, coeperantque foras erumpere, ceu impatiens moræ hostis præceps ruit ad pugnam, aut nulla vi coercitus torrens oppositas extemplo moles, tum obvia quæque repagula disiecit, atque disturbat. Pagina mihi deficeret, si quotquot ejusmodi ventris cruciatibus divexatos memini, recensere velim, quos tamen facile erat, ac prodigii instar, ab imminente exitu vindicare, ea adhibendo præsidia, quæ comitem, aut latentem febrem respicerent, Practicis usitata. Hujusmodi ventris dolores hujusce indolis febribus succedentes, aut iisdem complicatos jam pridem adnotaverat Vir Doctissimus *Carolus Piso* pro Colicis habitos, quorum causam aeris constitutioni calidæ impense, & siccæ, qualis revera hæc ipsa nostra, Autumno præsertim, ac hyeme, toto proinde anno, si modo ver excipimus, extitit, idem adscribit.

XXIX. Equidem si prægressam tot annorum siccitatem adhuc dum vigentem, constantemque hætenus tum certantium invicem ventorum, qui tum ante acta æstate, tum Autumno, ac toto deinceps anno aspirarunt, vim feritatemque animo metimur; Conjicimus utique, ac dilucide nobis innotescit, quænam extiterit ejusmodi febrium, ac ægritudinum, tum harum præsertim, quæ abdita imi ventris loca obsidebant, origo, ac incrementum; atque, ut rectius loquar, quodve sedulo inquirendum, adnotandumque Medicis præcipit Magnus senex, *occasionis initium*, a qua omnes hæ ægritudines profluxere; Ecquid enim ab inertibus liquidis, ferro utpote fere omni defraudatis, nec libere amplius in orbem agi potentibus, solidisque hinc quoque pari modo labentibus expectandum erat, quam *internæ viscerum Systrophes*, atque in iis potissimum locis, per quæ aut inertiora suæ indolis liquida excurrere solent, aut eadem magis feri præstantiam efflagitant, quo facilius circulum suum, ac munus absolvant? Genuina hæc, ac potissima febrium intermittentium, quæ toto hoc anno ultro citroque progrediebantur, causa, quæ & eadem quoque cæterorum morborum fuit, qui memoratis febribus præluxere, aut hæ illis lampada tradidere.

XXX. Et sane uno omnes ore quotquot hætenus in hac arena insudarunt, febrium periodicarum incunabula in Ventriculo, ac primis vis, Pancreate, Mesenterio, finitimisque, ac per imos quosque recessus discurrentibus vasis posuerunt: Uno verbo mine ram febrium intermittentium, sedem, ac *Principem*, pene dixerim, *aram*, ut *Sylvio*, ut *Villifio*, ut *Sacho*, ut universo fere Medicorum cœtui placitum est, ipsa eadem organa suppeditant, comparant, præbent, quæ conficiendo, ac distribuendo Chylo famulantur. Quandiu enim Ventriculus, Intestina, Hepar, Lien, Mesenterium, Pancreas constitutum sibi quæque munus rite persolvunt, sive excoquendis illa, retinendisque alimentis quo usque in *massam chymicam* abeant, & qua data porta secedant, exprimenturque, dicata sint; sive perficiendo ulterius perque revoluto, anfractus, ac *itineri* mille ferendo, devehendoque chylo; sive quosdam peculiare succos elaborando inserviant, quorum effectus varii, ut varia horum indoles est, ac ingenium; Quandiu hæc omnia inquam rite peraguntur in corpore, *sarta restaque* res est, ac incolumis. Ubi vero, aut exarata organa idonea minus evadunt comparato sibi absolvendo muneri, aut emanantia, perennique alveo influentia in cavum Duodeni liquida, tum quæ ipsa intima superficies intestinorum minutissimis undequaque glandulis obsita jugi fluore extillat, inertiora manent, spissiora eadem, aptaque minus sese una cum præterlabente Chylo commiscere, vias expedire, menstrui adeo, ac vehiculi munere fungi, fibrasque motrices stimulare, acria salina obtundere, coagulata dividere, *fermenti*, sit verbo venia, vicem gerere, cruda coctis assimilare; Quis quæso erit aditus Chylo lactearum oscula subeunti: quis illius per *galaxiam* iter: quæ ejusdem ad *receptaculum Pecqueti*; adque Thoracicum ductum, ac subclaviam tot inter oppositos aggeres, atque obvia passim molimina profectio, excursus, meta? *Chyli* inquam, *Chyli*, si enormem illam temporum siccitatem expendimus a nativa sui qualitate degeneris prorsus, ea nempe orbat portionem feri, qua sine nec miscibilis ipse cruori, nec ire, ac remeare vias par est, per quas excurrere debet, ac pergere.

XXXI. Effingat sibi quisque magnum ante oculos amnem, e quo innumerabiles rivuli exoriantur, qui in alios subinde exiguos amnes, mox in unum tandem una omnes, ac majorem alveum coeant, exonerenturque. Ut pulchrum, ut jucundum visu est, purissimos modo, ac limpidissimos latices cernere ingenti flumine præterfluere, suborientes hinc rivos circumjectam planitiem amœno spectaculo irrigare, variisque flexibus, nullo interposito obice, illabi, quo in unum deinde amnem una omnes evadant, ubique fontibus suis similes. Fac cœnosum quidpiam leniter labentibus aquis commisceatur, aut aliud quodpiam solidioris naturæ, puta, trabet, ligna, faxa, quod placide manantium lympharum alveum turbet; Ut illico aut exundare aquas in oppositam ripam, aut easdem ad diversa amnium divortia sistere veluti gradum, ac stagnare videbis, exurgente lacu, ubi antea tellus erat, ac viride Solum. Idem prope obtingit Chylo, ubi crassioribus moleculis repletus, deficiente utpote ferro, quod crassa diluat, eumque sanguini miscibilem reddat, ineptus, ac impurus idem obvia subit ostiola, ac degener omnino factus Thoracico ductui sese insinuat. Quot enim concipere est futuras tot inter vaforum plexus, ac angusta viarum præterlabentes liquidi stases; quot res tam prolixo itineri remoras, obicesque.

XXXII. Hæc una quidem, ac præcipua febrium intermittentium causa; Una hæc, ac genuina crudelium adeo ventris cruciatuum, totque passim ægritudinum, quarum sub larva, ac simulato vultu ejusmodi febres ludebant, incunabula, ac incrementa: Uno proinde iis omnibus eodem ense, ac more subigendis, ac edomandis. Ut a

Supplem. ad Sydenham.

probo, ingenuoque Chylo probus, ac ingenuus sanguis efficitur; Sic ab improbo eodem improbus quoque cruor emergit, ineptus scilicet, cum perennando circulo, tum nutritioni partium, quæ summa sane res est, ac reliqua inter œconomiz animalis munera præclarum magis, & majoris momenti. *Tanta* adeo *molis erat* tam ingentem instrumentorum apparatus effingere, quæ tanti ponderis opus absolverent! Non hic quippe advocandum ullum in scenam *acidum*, non *pituuta* præter modum viscida, non *fermentum* aliquod, aut *duumviratus* humorum, non *Acheus Helmontii* aut *Lenas* effusa, & partibus spirituosus sanguinis permixta potis sit tot excitare turbas, ac febrilem tempestatem inducere? Hæc & similia aberrantis ingenii somnia *Etmullero*, *Sylvio*, *Villifio*, *Doleo*, eorumque affectis sibi pro lubitu affingenda, ac excogitanda facile concedam, utpote qui ea tantum mihi retinenda dudum constitui, quæ in magnò Naturæ libro ediscere est; quæ rationi, & *experientie rerum magistræ* consentanea video, minime vero ea, quæ vanæ hominum mentes somniant. Veram utique intermittentium febrium, multarumque hic ægritudinum, quæ aut illis præludere, aut iis obsequi advertimus aliquando, causam, ac genuinum fomitem in ventriculo, ac intestinis tenuibus colloco; tum cæteris, quæ iis prope adjacent, partibus magno Chylificationis negotio inservientibus; Quin acidum, aut fermentum quodpiam mihi effingam ibidem hærens abditumque, decantatum adeo, invisum hætenus. Tantum nimis seest amor, condendorumque systematum inanis ambitio *potuit suadere malorum!*

XXXIII. Profecto si liquida expeadimus in maxima siccitate temporum fero orbatæ; æstuantemque adhuc intra præcordia cruorem animo cogitamus; si memoria recolimus ante actas superiorum annorum ægritudines a præservido sanguine ortas, si luctuosam illam rerum faciem calidam impense, ac siccam nobis iterum ante oculos ponimus: Si alimenta denique, quæ vescebantur incolæ a terræ sinu deprompta, olera, ac fruges, tum ipsas animalium carnes præ ariditate Soli exsuccas veluti, ac penè aridas in mentem revocamus: Liquido constat magnam jam tum impendere liquidis jacturam, majorem longe illam futuram ad primos inclementi Boreæ flatus, statim ac obstipata penetrabili Aquilonio frigore cute captiva intus fluida, adque *concretionem*, ac *stasin* heu prona nimis, hyemis acerbiter sensissent. Ni forte, quod secus evenit, adpropereans Autumnus, madefacto lætis imbribus Solo, mitioreque reddita aeris temperie temperamentum quoddam periclitantibus rebus præbisset, quominus occurrerent, quas timebanus, feri jam prope inertis, ac viscidæ congectiones in vasis lymphaticis, venarumque extremitatibus; Nacta hinc libertatem liquida, ac soluta vinculis, cumque illis vicissim consentientia solida datas æquilibrii leges ad amissum obtinerent, ac observarent.

XXXIV. Secus tamen, ut dicebam, evenit prorsus; Autumnus namque successit, nunc ingenti inopinato æstu, qualis ne superiore quidem æstate sævierat, præservidus maxime, nunc repentino extemporaneo frigore pergelidus admodum, quanto heu fluentium per corporis abdita, *cæcosque meatus* dispendio liquorum! Quanto itidem solidorum una conspirantium detrimento! Vestros revocate animos Subalpini Medici ad præteriti nuper anni, tum præcedentium duorum annorum memoriam, quorum ego historiam sin minus eleganter, ac docte, summa saltem fide, ac diligentia, quod in historica potissimum narratione expetitur, conscripsi. Expendite cujusnam indolis aderant tunc temporis liquida, quove eadem more ad Hyperboreas præmaturo flamine erumpentes auras sese habitura forent: Conjiciet hinc nempe vestrum quispiam, quæ aut tum cudebantur erupturæ brevi, aut sævire jam tum coeperant per universum Subalpinarum tractum, ægritudines; Atque hinc etiam præsidia facile adinvenire erit, quæ proficua extitisse dein temporis eventu adnotavimus. *Sapiens est asserere malis remedia; Futura prænoscere, ac velut e specula prævidere, Divinum.*

XXXV. Æquum est modo ejusmodi febrium expensa intime, ac perlustrata genesi, earundem ulterius genium, ac typum delineare paucis, tum quibus usi sumus, auxiliorum genera ad illas profligandas, abigendasque enarrare; Antequam ad cæterorum affectum historiam progrediar, quorum ut idem cum exaratis febribus ortus, eadem quoque aderant, saltem vix discrepantia, phænomena, quibus manifestabantur. Statim hæc igitur, ac prima fere accessione, intermittentium morem, ac vultum præ se ferebant, si postremum tantummodo stadium excipias, pro eadem solent, qualibet vice, ingenti oborto sudore, judicari. Nonnullis de tertio in tertium diem; Plerisque ad singulos dies febris recurrebat, plena tamen inter duos quosque paroxysmo intercedente apyrexia. Quamdoque etiam continuas æmulari videbantur ob longiores, & duplicatos paroxysmos; Vix paucis per autumnum in acutas periculosas desisse visæ. Per hyemem vero, & reliquum anni multis, ac potissimum æstate, Lingua omnibus fere alba; Urina turbida, & impense rubens; Dolor capitis ingens, atque assiduus cum inquietudine quadam totius corporis; Pulsus lenis ac obsequens, nec inchoante febris citatus nimis, nec prope rante ad statum illa elatus magis; Vix exiguus sub finem accessionis sudor; Tormina quibusdam abdominis sæva admodum, diutiorumque, ac ipsamet febris, tragœdiam ludentia, nec facile desinentia eadem, quinimo exhibitis anodynis, oleosis, purgantibus invicta magis, atque iracundiora. Nullus initio vomendi conatus, nullum vel levissimum nausæ vestigium, nulla prorsus oris amarities, consueta olim febrium prologia, earumque comites. Nonnunquam commutabantur invicem quotidiana intermittens, ac tertiana simplex sic dicta, subludebantque vicissim. Atque tum quidem cum hoc illæ pacto errassent dudum, in acutas deinceps Vere plerumque, ac æstate degenerabant, celeri ægrorum fato, nisi in doctum, prudentemque Medicum bona sorte patiens incidit.

XXXVI. Sæpe hinc memini hæc, ut malignas, statim, ac omnimodam continuitatem simulare videbantur, a plerisque tractatas fuisse, cujus imaginariæ, & commentitiæ malignitatis de causa, innunera hi præscribentes alexipharmaca, calida, volatilia, & mille id genus inter se pugnancia remedia, quod præcavere crediderant,

rant, periculum advocabant. *Quot* heu *simiola* hac malignitatis, ut verbis utar Clarissimi *Baglivii*, jugulavit, quos facile erat ab interitu vendicare inspecta mali origine, ad quam, tanquam ad Polum, ac Cæli verticem dirigi omnis debuerat Medentis cura! Naturæ scilicet oraculis, & Magni senis præceptis auscultandum, quæ si attentius excolerent Medicorum filii, haud equidem eveniret unquam illos adeo turpiter hallucinari, naturæ morbi tribuendo tot gravia passim symptomata, quæ rectius soboles sunt depravatae methodi, tracto nimirum in consortium necis, qui idem insons etiamnum erat, sanguine præpostero usu remediorum.

XXXVII. Sane si earundem febrium tum maxime, cum intermittentes esse desierant, inque acutas migrabant, indolem propius spectabamus, & morem; quidquam adhuc observare erat, quod etsi intime latens, occultumque prorsus, prioris morbi ingenium referebatur, ut fere idem adhuc oculatioribus videretur, alterius larva ludens, cuius ille personam induebat. Videre erat minus in oculis, ore, ac vultu ægotantium, in ipso saltem febris circuitu quidpiam, quod præsentem adhuc veterem febrem significabat, eodem illam confodiendam gladio, quo hætenus subigi ejusmodi febres solent. Quodve mirere magis; nedom exaratae febres, tum quæ typum intermittentium toto sui decursu observant, tum quæ in acutas abiere, aut ejusmodi ab initio extiterant, aliqualem adhuc tamen præfatis intermittentibus morem gerentes, iisque quodammodo obsequentes, hac methodo felicissime tractabantur: Sed & ipsæ quoque, in quibus nulla fere intermissionis vestigia unquam præluxere, hoc eodem more citissime, ac tuto jugulabantur. Citissime quidem; quævis nanque hac in remora, aut dilatio periculosa, quæ perniciosos sæpe effectus protulit.

XXXVIII. Postremæ hujusce indolis aderant, quæ *Januario*, ac *Februario* mense prodierant, deletis tum pene, saltem delitescens hactenus memoratis febribus, quæ antea Autumnum subluferant. Hisce primo tantum, aut secundo accessu levissimus horror præcesserat. Sæpe etiam nullo, ac exiguo quidem præludentes horrore irascebantur, atque ita decurrentes quasdam tantummodo diebus imparibus exacerbationes sustinebant, ut revera quid in iis tertianarum circuitum redolens suspicari fas esset, etsi primo aspectu nihil omnino hujusmodi appareret. Nec difficile quidem erat harum originem explicare memoria recolenti, quæ foret liquidiorum per Autumnum conditio; quis una invicem oscillantium solidiorum status? Nil inde mirum, si quæ vigente frigore intermissionis tantum signa protulerant, silente mox Borea, ac præmaturo æstu excandescens, intus cohibitis diu, obque ingentem resolutionem propriæ humiditatis, ut antiquissimo verbo utar in hac parte, exultis succis, ac bile præsertim, quæ fane in naturalis Œconomiae Theatro Principem vicem obtinet; eadem ipsamet febres in acutas dein abierint, aut tales sese ab initio ostenderint, ceu fieri passim videmus media æstate,

Arida cum sitiens excoquit arva Leo.

Observare erat subcontinuas hæc febres, (sic illas vocare lubet ob continuitatem paroxysmorum) etsi nullo plerumque horrore præeunte vestigio subluderent, quidquam tamen præ se ferre molestum ægris, quod quidem citissime evanescebat, ingenti succedente æstu, qui idem & sese celerrime expandere videbatur, & intimiores quotquot recessus, atque ipsa adeo præcordia momento temporis pervadere; ceu pici, & resinæ evenire novimus, dum succeduntur, quæ licet crassam habeant compagem, ocysime inflammantur.

XXXIX. Idem erat tum harum, tum quæ iis proluserant, febrium ortus idemque apparatus, etsi pro varia aeris temperatione intermittentium modo indolem æmulerentur; modo intermissione paulatim perditâ ad acutas tenderent; modo omni relicta intermissionis effigie subcontinuarum more præ se ferrent. Utque breviter me expediam; Exarata succorum crassities, ut focum, ac incunabula intermittentibus febribus, quæ primo in scenam prodierant, præbuit, eadem cæteris incrementa dedit, cum primum remitti frigus hyeme cœpit, verisque hæc potius, quam hyemis speciem referre. Totum adeo quod metuendum erat maxime, a crassitie, ac inertia succorum, ac bilis potissimum, ut hanc unam pro cunctis afferam, vitellinæ ut ajunt, præssinæ, æruginosæ pendebat, cujus haud obscura vestigia petere erat ab ipsis excretis jam tum quidem, cum coercita hæc adhuc ab ambientis frigore, nec irasci potens, ac suo ingenio excandescere, febres tantummodo intermittentes attulerat. Quantum vero ejusmodi humorum excretio, sive sincera, sive variegata sit, Medicis facessat negotii, norunt Practici; Quotiescunque enim apparuerit illa, dat semper ansam suspicandi aliquam gravitatem subesse, quæ morbum reddit non contemptibilem, etsi aliqui mitem, quod & Hippocrates docuit.

XL. Mites utique aderant, quandiu intra intermittentium limites consistere, etsi minimè contemptibiles memoratae febres facili tum Marte superandæ. Ubi vero sævientibus inopinato Austris in subcontinuas eadem degenerabant, aut ab ipso statim sui exortu toto penitus cælo ab intermittentibus distare videbantur: Quibus hic quæso artibus enitendum, quibus occurrendum præsidii, vi quorum ægri ab imminente exitio tuto possent evadere? Nullus hic induciis locus; Nulla hic Fabio spes, qua cunctando possit restituere rem. Talis si quidem adest ejusmodi succorum natura, & conditio, ut nullam ferant, advertente Mercato celeberrimo suorum temporum Viro, & duorum Hispaniarum Regum Philippi Secundi & Tertii Protomedico, in exhibendis auxiliis moram, cum certum sit nullum posse beneficium, gratiam, aut coctionem a natura recipere, imo, ut inquit Averroes 3. collect. corrumpant formam specificam illius. Magna cæterum remedia ex mente laudati Authoris, qui perniciosarum hujusmodi febrium a crassis, adustisque succis originem ducentium descriptionem æque, ac curationem distinctam pro viribus illius sæculi

incomparabili sedulitate complexus est, hic nullum fere locum habent; Etenim si de purgatione sit sermo: caute id facies, inquit Vir doctissimus, sive enim purges, sive secus, periculo res non caret; Quippe scimus vel levissimis pharmacis gravissimas accersiri dysenterias, quod si has effugias, contabescet laborans. Quod utrumque nos in diversis passim ægotantibus nuper adnotavimus, ac speciatim in nobilissimo Fratrum pari ejusmodi ingenii febribus eodem tempore laborantium juxta templum Divæ Mariæ Consolatricis Patrum Reformatorum Sancti Bernardi, quorum alter natu major exhibito pharmaco purgante, quod idem horrendas paucis ab illius exhibitione horis secum catastrophes tulit, in habituales febres incidit nullo deinceps auxiliorum genere exorabilem; decennis alter gravi ac diuturno alvi fluxu conflictatus est, una cum magnis, sævissimisque ventris cruciatibus, a quibus tandem variis adhibitis remediis, ac præsertim acidularum potu Javeni haud procul ab Alpibus limpidissimo fonte emanantium, summa in hujusmodi dysentericis, cæterisque alvi affectibus ægotantibus utilitatis, ad quod etiam ipsa mutatio soli haud parum tulit, incolumis evasit. In his febribus (ab hypochondriis ortis, ac Mesenterio) Barbari etiam, qui cæteroqui facile purgantibus utuntur, a purgationibus abstinent. Matth. Giorgi Ration. Med. pag. 141. Idem prælaudatus Pifo, Ballonius, Duretus, alique plures adverterant. Si vero de Sanguinis missione loquamur, ægotantes hujusmodi subdit supra memoratus Mercatus, tale præsidium non innoxie ferunt, & plerumque a sanguinis missione continua evadit febris. Ego quidem hanc adeo noxiam minime expertus sum in iis præsertim febribus, quæ continuarum morem magis æmulabantur, quinimo larga dosi, plenoque fluente emissus sæpe initio sanguis auspiciatissime cessit, nec quempiam novi hoc remedii genere, opportune, cumque illud natura exposceret, celebrato, sublatum. Sæpe etenim parandus hac methodo erat aditus auxiliis cæteris, ac horum Principi, quod mox proferam, si qua anni constitutione, quoque in morbo expetitur magis, in hac sane opportunum maxime, ejusque indolis febribus accommodatum.

XLI. Equidem uno Peruviano cortice (Is scilicet erat præstantius auxilii genus) tum quæ primo illuxerant, intermittentes febres, tum ab iis ortas, aut iis analogas cæteras, quæ caput passim extulerant, subigi penitus, nec reviviscere amplius memini, congrua quidem dosi, tum debito more, administrato. Vere aureus arbore ramus, qui furente sparsis quaquaversum fluctibus torrente procellæ impetum susteret, excandescens succos compesceret, vimque morbi retunderet, ac cohiberet. Vere Polychrestum, ac prope dixerim, Divinum remedium, cui utiam simile quidpiam ad alios morbos possideremus. Sed paucis demptis, ut ait Vir Clarissimus, ac toto orbe celeberrimus Franciscus Torti, Serenissimi Ducis Mutinæ Archiater meritis, quorum virtus certa est, & utilitas evidens, ars nostra medicamentis superfluis alioqui ditissima, bonis, certisque, quæ innotuerint, caret, imo forsitan ob hoc ipsum est inops, quia inutilibus superfuit.

XLII. Magnam sane hisce Paginis laudem, ac lucem Præclarissimi Viri nomen impertit, cui & ego, quod peramanter me diligat, meaque ab illo primitias studiorum, quæ in lucem edidi, commendari plurimum sciam, ac summa humanitate excipi; & omnis una mecum universa litteratorum Respublica multum debet. Atque eo quidem magis me illi obstrictum profiteor, quod me minus olim docte sentientem de hoc admirabili febrifugo, imo forsitan & injuriose nimis de illo locutum, utpote qui in verba Magistri omnino jurabam, benignissimis litteris, tum muneribus ignotum ac immeritum hominem prosequi dignatus est, atque omnibus benevolentiae officiis completi; Quo tandem, tum propriis observationibus edoctus ipse, tum ingenti rationum pondere convictus, quibus laudatus Vir Corticis innocentiam adversus quosdam meticulosos, vel præjudiciis inbutos, quibus, pauci sint licet, suspectis etiamnum redditur chinæ chinæ usus, tuetur; errorem ipse meum agnovi, ac ultro fatear modo: Incertus, cujus in laudem potiore jure effundi debeam, corticis ne, an illius Patroni, strenuque propugnatoris. Quædam scilicet laudis pars est, errasse aliquando, confiteri errorem, inque viam reduci magnorum virorum consilio, ac doctrina.

XLIII. Ne vero quis me putet vana loqui, lubet methodum, qua cum ego, tum alii plures præstantissimi hujusce Civitatis Medici in hujusmodi naturæ febribus curandis usi sumus, fusius exponere, eamque nonnullis curationum historiis, ac practicis animadversionibus illustrare. Utque ab iis ordiar, quæ ingruente hyeme perniciosum characterem induerant, utpote quæ nedom securitatem præsidii, sed celeritatem exposcere videbantur magis, quam cæteræ, quæ superiore Autumnum proluserant: Consultum iis erat, Corticem ab initio protinus exhibere; febrile hoc more fermentum, ut cum vulgo loquar, quodcumque illud sit, vel exiguum prorsus, ac inconspicuum, vix editum illud edomando statim, ac subigendo penitus, ne elatum magis, effectumque nimis, ac furens ingentes deinde tumultus induceret, quibus compescendis nulla postmodum artis præsidia sufficerent. Quodcumque ajo fermentum illud sit, tum quoque in angulo latens, occultumque. Non enim hic tot inanes conjecturas repetere subit, quas hac in re innumeras excogitatas scio, ac quotidie adhuc excogitari ab iis, qui artem suo ingenio a vulgi studiis abhorrentem incertis & plerumque falsis opinionibus scedarunt. An stagnans aliquid, quod egeat moveri? Num fixum quidpiam, quod expetat exaltari? An quidquam exaltatum, quod exigat deprimi? Num quid intempestive influens, quod debeat inhiberi? An denique obstructum quid, quod indicet referari? An intra sanguinem rursus constituendum illud sit, vel citra sanguinem, vel ultra? Nos hæc linquimus agitando iis, qui lites amant, nubemque hinc sæpe (Dispereat hic quidem obtrectator ille, cui ea displicent, quæ politioris litteraturæ cultoribus arident magis) pro Junone amplectuntur.

XLIV. Illust mihi aliquando, cum Icaro anso febrium intermittentium causas exquirerem, illust inquam mihi Phantasma quoddam (sic ego vocoludentis ingenii aereos incertoque volatus medio sæpe in itinere collabescens) quod quidem, utcumque somnium fortasse videbitur nonnullis, referre haud piget hic loci. Num scilicet in toto potius Mesenterii ambitu, aut illius centro con-

constituenda foret huiusmodi minera febrium, ubi tanquam in emporio quodam, proprioque delubro delitescant, statis subinde horis erupturæ, magnas secum una afferentes turbas, *cateruamque malorum*? Si Cartesio Immortali Viro, ejusque affectis placuit concupere, ac immateriale principium nobis Divino munere concessum, vere *Divine auram particula*, nullis illud obstrictum corporum legibus carceri mancipare suo, captivum ducere, inque vincula conjicere; Æquiore ne jure haud licebit principium materiale illud, febrium authorem, atque parentem, uno verbo, focum, ac materiam febrilem eo in loco constituere, ac collocare, per quem omnis generis vasa discurrunt, perreptantque, milleque effingunt gyros, *itineramille*, viarumque flexus innumeros? Num aptior hæc febribus scena, quam alia quæpiam hætenus excogitata? aptior utique illa cæteris, ac convenientior; sive intra sanguinem cum *Willisio*, sive extra illum cum *Sylvio*, sive denique in nervoso latice cum *Guil. Cole* earundem fodina contineatur? Huc venæ, huc arteriæ, huc lymphæ ductus, huc lactea, huc inspersæ ubique glandulæ, huc nervi funiculi, aut si mavis dicere, nervorum rivuli eleganti ludunt spectaculo. Num quod de *Pancreate* suo commentus olim est *Sylvius*, idem nobis comparatum de *Mesenterio* effari, longe profecto faciliore, & clariore hic, quam ibi, tum symptomatum omnium, etiam infrequentiorum, tum ipsorum quoque circuituum explicandorum ratione! Haud exiguum sane hisce lucem, si quid ego hic judico, præbere videntur memorata illa ventris tormina, quæ toto fere anno una cum exaratis febribus, quandoque etiam nulla comite febre, quodve mirandum magis, periodicarum febrium instar recurrentia, longe lateque sævierunt, cunctis invicta telorum ictibus, præterquam uno cortice *Peruviano*.

XLV. Videmus ab ulcere, & abscessu *glandularum Mesenterii* febres lentas & continuas fieri, quæ prius glandulis iisdem tumen- tibus tantum, & obstructis intermittentes extiterant. Videmus suborto in pede tuberculo, & tumefacta subinde glandula in inguine diariam febrim exoriri, quæ dubio procul periodica fieret, si periodice recurreret ejusdem glandulæ tumor: Quidni igitur per analogismum quandam haud licitum erit eruere, aliqua ex glandulis mesentericis insignioribus ita viscido infarcta glutine, ut omnem, vel fere omnem chylo, & lymphæ illac fluentibus ultra se cisternam versus progressum inhibeat, totum vas illud lacteum, quod ab intestinis ad glandulam illam protrahitur, chylo stagnante intumescere, pariterque lymphaticum inferens integrum, quod in eandem inferitur, ab exortu suo usque ad eundem terminum, lymphæ sic similiter stagnante, utpote exitum non inveniente, reperi; Exoriri hinc febrim, ac statas quasque periodos, seu ad regulam quandam, emetiri, prout nempe glutinosæ huiusmodi obstructionis alterna reclusio, atque occlusio contingit, cujus mechanica ratio non est hic loci. Quantum vero visciditatis, glutinis quantum perreptans, cum ubique per abdita corporis, tum in hac potissimum parte lymphæ, atque hinc cætera quæque fluida humani corporis hac tempestate contraxerint, obvium est animadvertere recogitari cuiuspiam, ac recolenti animo, tum superiorum annorum, tum labentis indolem, ingeniumque. Quam facile hinc per diffusa locorum, viasque varios in gyros convolutas contendens, influens quicunque humor, si aliquo lentore peccet, iisdem in locis obstructionem producere potest, lentoremque, ac stagnationem mutam cæteris per eosdem tramites decurrentibus liquidis impertiri? Quot quæso nascentibus morbis huiusmodi glandularum mesentericarum infarctus proluit, aut eosdem diu latentes, occultosque, idem fovit, condiditque sinu, quo usque, seu disiecto aggere, foras eruperint, eo vividior conatu, quo diutius iisdem delituere? Num præcipua hæc ipsa sedes hysteriæ insultum, affectionum hypochondriacarum, Phthiseos chylosæ, cuius exemplum unum atque alterum observare mihi hoc ipso anno contigit; Rachitidis, Scorbuti, Atrophiz, ac sexcentorum fere morborum; quorum fera Symptomata novimus, incunabula vero nos omnimode laterent adhuc, nisi hæc illustriora, ac præclariora in diem efficeret magister in morborum causis eruendis optimus culter Anatomicus? Nec Indorum morbus a Jac. Bontio descriptus, hicque familiaris omnino reticendus, eos ad atrophiam deducens, in quibus post sectionem aliquando totum mesenterium occurrit absumptum. Referenda & huc quoque fortassis est *tabes Anglorum* ab calidiorum, ac spirituosorum nimio abusu, quibus summo opere rebus Natio illa toto divisa orbe oblectatur, proficiscens.

XLVI. Equidem, si harum febrium tum intermittentium, tum subcontinuarum minera, ut ajunt, in primis viis, seu plerisque videbatur, extitisset, haud video, cur repetitis illa catharticis haud obsequeretur, educta hinc purgante medicamento materia omni exotica, quæ febrim pepererat. Atqui a purgantium usu contumaces hæc magis evasisse compertum, quandoque etiam ex intermittentibus in acutas periculosas migrasse, quas dein aut diuturnus alvi fluxus cruentus, aut diarrhœa sæpe chylosa una cum totius corporis emaciatione subsequeretur, proludentibus passim diris ventris cruciatibus; Qui iidem si diutius perseverabant, *Phthisin* brevi inducebant, de qua superiore paragrafo verba fecimus, præfatæ diarrhœæ, aut alvi fluxus filiam, quo in limine conclamatum erat: ut nos in duobus ægris adnotavimus, quorum alter juxta *novas aedes Fratrum Carmelitarum*, alter prope *forum olitorium* decumbibat, qua fornix viæ antiquissimus spectabatur, cui *rubri coloris* nomen, nuper in triumphali Nuptiarum Regionum Pedemontii Principum apparatu, ne inter nocturnos festivos ignes Aulæ prospectum Fori, Foro prospectum aulæ invideret, ut in præclaro monumento legitur Posteritati commendato, ab Providentissimis Patriæ curatoribus dirutus, ac solo æquatus. *Phthisin* illam voco, quod si ægrotantium habitum, ac faciem inspexeris, vix illos ab iis, qui vere *Phthisici* existunt, aut ne vix quidem distinguas: vera autem morbi causa, ac præcipua sedes in *Mesenterio* potissimum delitescit, infarctis universis lentore glandulis, ac prope jam in strumoso statu degentibus.

XLVII. Elucet hinc Solo meridiano præclarior ejusmodi febrium tum præcipui illarum, quod idem sæpe etiam iis absentibus sublebat, symptomatis, dirorum nempe abdominis cruciatuum fomes primarius, ac prope dixerim, natalis locus. Harum olim minerat *Ballonius* Vir doctissimus in morborum notis explicandis, *Supplem. ad Sydenham*.

eorumque origine, ac *occasionis initio* revelando nulli secundus, quæ in diros ventris cruciatu *colicos dolores mentientes* plerumque definebant; Nec diffitetur idem procul ab mesenterio quærendam haud esse illarum sedem, ac fomitem. Sæpe adeo nosse est prioris morbi indolem ab symptomatis natura ac ingenio, quod aut illi præludit, aut una cum illo sævire videmus diviso velut inter utrumque imperio, ac potestate irascendi. Neque inficior sæpe etiam ab aliorum quoque viscerum, Jecoris v. g. *Pancreatis*, Lienis, glandularumque omnium per imum ventrem, ac universum tractum intestinorum denso agmine delitescentium infarctu intermittentes febres ortum ducere, haud tamen insonte unquam *Mesenterio*, in quo scilicet tanquam in ampliore Theatro ludere suo- pte Marte queunt ejusmodi febres, ac quam hæc cumque velint larvam induere. Conspicuum id magis fiet, si quem illi usum, ac munus tribuit Præclarissimus, ac amicissimus *Morgagnius*, mente recolimus; videlicet, ut sanguini per mesentericas venas ab intestinis ad hepar ascendenti multas in transitu ex iis, quibus copiose ornatur, adiposis cellulis particulas oleosas pro separatione bilis admisceat. Confirmant assertum cadaverum lustrationes, in quibus plerumque bile atroflava turgida vesicula fellis occurrerat, defectu nempe illius olei, quod in statu naturali una cum sanguine per mesentericas, quæ sese in portam exonerant, venas hepatis suppeditatur; Nonnullis totam lapillis refertam invenimus intus forisque ita nigricantibus, potius ut carbones, quam calculi esse viderentur. Hosce quidam ex iis, qui præsentis aderant, aderant autem quam plures rerum Medicarum, ac Anatomicarum studiosi, observationis confirmandæ percipidi, num hi scilicet igni admoti flammam conciperent, adque extremum usque alerent, lucernæ admovebant, sed leves quidem crepitus edidere, flammam autem non servavere, quod peculiari vitio ejus, in qua concreverant, bilis accidisse arbitror. Nos equidem id ipsum olim aliquoties experti sumus, ac pene totos comburi advertimus, quorum plures etiamnum in Musæo inter rariora mea conservo, qui & flammam alunt, & omnia ac olim observanda adhuc post multos annos præbent. Subit hic historia satis curiosa viri cujusdam Religiosi, qui præcedentibus acerbissimis ventris cruciatibus quatuor demum exiguos ejusmodi calculos per alvum dejecit; qua de re, cum varii varia proferrent, quidve essent, & unde essent, haud facile intellexerent, ego illos e cholecho ductu in duodenum delapso, atque hinc per alvum favente motu peristaltico exturbatos contendi, quod igni admotos comburi illos adnotaverim, teste *Bidloo*, tum aquis immersi iisdem innatarent, docente *Fernelio*, secus ac iis, qui de vesica urinaria extrahuntur, ceterisque, qui passim variis in locis generantur, lapillis contingit. An autem Jecur primo affectum fuerit, an *Mesenterium*, ipsa morbi indoles, ac ingenium manifestabit; Qui namque morbus a *Mesenterii* vitio proficiscitur, raro Catharticis cedit, sæpe etiam, ut adnotavimus, exacerbatur magis, tum tormina secum una adfert, ac cruciatu ventris immanes, inque atrophiam tandem, ni caveatur, degenerat; Qui vero a jecore procedit, non nisi catharticis frequenter usurpatis expugnatur, nullo fere, aut vix exiguo ventris cruciatu stipatur, inque colluviem plerumque serosam, si diuturnior extiterit, definit. Sed tamen fortasse de hac re fusius loqui continget aliquando. Nunc vero ad aliud caput transeat oratio, quæ perquam satis in hisce immorata est.

XLVIII. Hos inter rerum fluctus præstantius, ut retulimus supra, subsidii genus, ac sacra, pene dixerim, anchora *cortex* erat, sive intermittens toto sui decursu typum febris retulerit, sive in acutam migraverit illa, sive eadem subcontinua ab ortu extiterit, sæpeque hinc obscura inter simulati velut circuitus vestigia Medentes eluserit; sive denique nulla præsentis febris toties exarata alvi tormina tantummodo desævierint. Nulla hic advocanda sui generis materia, quæ catharticum suaderet, aut expectanda Medicorum scriptis celebrata adeo humorum coctio; ne forte, dum hisce totus incumberet Medicus vota ferens *Nature*, evacuato purgantibus, quod adhuc reliquum aderat, sero, aut datis inani cunctatione morbo inducis, altioribus actis radicibus malum ingravesceret, ac, ut plerisque obtrigit, in lentam febrim, ac in maciem denique infausto exitu transitum faceret; præcluso nempe omni itinere chylo, aut si quis adhuc aditum sibi per oppositos aggeres aperiret, viscido eodem, lento, ac inertis prope sanguini occurrente, nullo prorsus pacto misceri apto crori, inque nutritium rorem secedere. Duas scilicet ob causas extenuari sensim corpora videmus respectu succi nutritii, cum is nempe aut liquidus minus, quam par est, alendæ parti occurrat, aut exoticiis moleculis refertus, quo fit, ut ineptus nutritioni, seu minime assimilabilis idem evadat; defraudatæ hinc æquo alimento partes emacientur sensim, ac contabescant. Etsi enim idem ipse nutritius humor in rorem, *gluten*, ac *cambium*, ut veteres ajebant, facessat, opus sit, totque adeo subeat *metamorphoses*, antequam nutriendæ parti assimiletur: glutinosus proinde evadat necesse sit, ut firmiter magis adhærescat, ac solidi vim, ac robur obtineat; Si vero is minus jam natura fluxilis ad partem, cui comparatus est, accedat, conjicere est, non eum amplius acquiraturum glutinositatis gradum, qui necessarius est ad hoc, ut parti similis fiat.

XLIX. Quod si impar idem obvios superare obices, perque infarctas lentore glandulas, obstructasque vias excurrere, regurgitare hinc, ac mutato itinere, revocare gradum coactus erit, perque eadem, quæ jam subierat ostiola, se se in intestinorum cavo recipere, & qua data porta una cum alvinis fecibus exire, unde diarrhœa plerisque chylosa, mox phthisis inevitabili fato successit. Huc scilicet tandem calura morbi alea, ni periclitantibus rebus opportune cortex subveniret. Ut latens venenosior in herba anguis, ita & majus in mora periculum.

Ægrotus Primus.

EXimius Jurisconsultus initio Autumni corripiebatur tertiana simplici, cum paucis tamen rigore invadente; declinante febris conatus mox ventris acerbissimi sublucebant, toto demum Apyrexia intervallo perseverantes. Exhibito medicamento purgante tertianæ duplicis typum, febris obtinuit, visque ventris tormina exasperari magis, ac diriora eadem evadere. Fetus adhibiti ex lacte, clysteres emollientes addita theriaca recenti, diluentia, paregorica mitiora, & his similia. Monebam ipse, ut statim cortex præscriberetur, quo sine magnam impendere ægotanti viro iacturam prævidebam. Difficilem tamen assensum præbebat Medicorum alter, qui ægotationi præerat; Cum vero omnia in pejus ruere cerneret, sponte tandem, cum forte illum sub vespere inviseret, corticem semel, atque iterum exhibuit modica dosi. Mane eadem, qua consueverat, hora febris repetiit, lenior, tamen, tum mitius sævire cœperant alvi tormina, quo dein corticis usu æger perfecte convaleuit.

Ægrotus Secundus.

Judæus post febrem primo validam, mox lentiolem, atque diuturnam, insuper diarrhœam contraxit, quæ postmodum in dysenteriam migravit, eadem durante febricula. Demum dysenteria rursus in diarrhœam conversa, cœpit simul febris typum manifestum acquirere tertianæ duplicis intensioris. Hæc autem febris in invasione sua soporem simul adscivit admodum profundum, quo circa declinationem accessionis evanescente stupidus, attonitus, & immemor ad plures horas æger remanebat. Quæ cum ego sedulo animadvertissem, iussi Medico curante annuente admoventi occipiti vesicatorium, ac mox corticem Peruvianum larga dosi exhiberi. Et ecce statim imminuto paroxysmo, oblationem validiusculam corticis subsequente, alteroque prorsus inhibito, symptoma ipsum soporis simul evanuit, quare brevi a febre, a lethargo, & a diarrhœa liberatus est Æger.

Ægrotus Tertius.

Sacerdos jam proxime octogenarius febrem tertianam patiebatur adeo absconditam, adeoque latentem, ut ea potius ex acerbissimo ventris cruciatu cum obscura quadam extremorum frigiditate, quam ex ullo charactere magis proprio distingueretur. Diu ipse incertus hæsi, an symptoma istud pro vero morbo haberem, eique occurrerem appropriatis remediis, nondum scilicet probe concius periodi tertianarii. Atqui suspicans simul quicquam aliud latere ob insignem pulsus inæqualitatem, insuperque observans huiusmodi cruciatus nihil habere commune cum colicis ita dictis doloribus præter doloris sensum, facile deprehendi doloris originem aliam esse ab illa, quam mihi effinxeram. Qua de re ad corticem Peruvianum protinus confugiendum esse existimavi, pro inhibendo dolorifico, ut ita loquar, prope imminente paroxysmo, eo metuendo magis, quo debilis æger, ac senio velut confectus, par haud erat amplius mali sævitiam ferre; Libentissime annuit, qui una mecum aderat Medicus, ac statim propinato Cortice per ebullitionem in aqua Card. Bened. parato, brevi integram ægotans valetudinem recuperavit. Huic quoddam surditatis, cum jam e morbo convalesceret, vestigiū supervenit, quod idem una cum febre evanuit omnino.

Ægrotus Quartus.

Primarii Regis Architecti famulus ejusmodi ventris doloribus laborare cœpit, una cum febre subcontinua, diarrhœa, siti magna, urinis subrubris, ac velut igneis, pulsu celeri, æstu, ac vigiliis intensis. Contractum manu abdomen percipiebatur, quid e in profundo latens ægri relatu, quod sedem ipse mali vocabat, ac centrum doloris. Ad septimum usque subcontinua morem febris obtinuit, quæ nec repetitis sanguinis missionibus cedens, nec diluentibus, fomentis, nec cortici ipsi postremo administrato, quinimo ad omnimodam continuitatem malignanter tendens delirium secum una attulerat, feroceque artuum convulsiones, quarum haud obscura quidem indicia in carpis observare erat post quartam accessionem, cum adhuc scilicet subcontinua genium febris servaret. Adstricta post septimum sponte alvus, irritata eadem vix pauca demisit, variegata, sincera, improba; Urinæ pallidæ, turbatæ, pulsus intermittens. Dimisso Cortice Vesicantia humeris, ac Tibiis adnota, diluentia iterum adhibita, camphorata, alexipharmaca, fœtus, festaque iterum vena, Quibus nihil proficientibus medios inter acerbissimos ventris cruciatus, membrorumque subsultus, lecti fimbrias diducens, & floccos vellicans, sæpe etiam per vices singultu correptus e vita decessit.

L. Plerosque huiusmodi casus recensere possem, quibus denegatus cortex, aut dimissus idem, cum adhuc largiore illum dosi exhibere opus erat, rem permisit in deterius abire. Ut ut enim vesicantia, ac sanguinis missio, quæ duo haud disiteor tutiora extitisse hac constitutione post corticem præsidia, in iis potissimum febribus quæ acutarum indolem æmulabantur; viderentur recta adversus morbi genium pugnare, ut & repetita diluentia, ac fœtus, quorum eadem ferme ratio. Ea tamen nihil, aut vix parum quidem nisi una cortex administraretur, adversus morbi causam profecerant, quæ id nanque præsidii efflagitabat, quo vegetior Chylus, vegetiore hinc quoque facto solido, impervia viarum facili Marte pervadere, imosque recessus adire posset: uno verbo, properantia ad stasin, seu ad concretionem liquida, deficientia hinc pariter solida, fluorem illa, hæc vim, ac robur amissum recipebant, ad statas utraque æquilibrii leges redigerentur, vindicarentur ab infarctu glandulæ, expedirentur ab obstructionibus viæ, præcaveretur suprema, quæ imminabat, iactura; quod unum sperandum erat a Cortice. Equus indomitus, & effrænis, liceat mihi allatum hic loci a præclarissimo, nec unquam satis laudato Viro exemplum, tum ipsamet illius verba usurpare, Equus indomitus, inquit, quandoque est febris. Ab eo hominis vita trahitur, ve-

lut currus, quo fata sinunt. Medicus moderator est, Auriga instar, lora tenens. Si vulgari utatur hic methodo in curatione febris, id aget tantum, vel studebit agere, ut medium furens Equus teneat iter, ne in foveas hinc inde paratas obliquus feratur, Currumque, vel Hominem perdat; non vero impedit, quin cursum suum Equus expleat, usque quo illi suppetunt vires, & furor, non sine gravi metu, quod dum

Fertur equis Auriga, nec audit currus habenas,

Offendat ille tandem ad obicem aliquem, ad quem allisa, male consistens facile frangatur machina. Quod si china china utatur Medicus, id aget, ac si retracto magistra manu convenienter fræno, Equum vi sistat, aut retrogradum faciat, & hoc pacto totius incerti cursus declinet pericula.

LI. Plerosque utique casus recensere possem ægotantium, quibus male cessit res, sive ludens adhuc tertianario circuitu febris repente in acutam transierit, sive haud deleta morbi fomite in lentam abierit, diuturniore quidem, at æque infelici exitu, quod utrumque discrimen eludere erat exhibitio opportune Cortice. Dixi haud deleta morbi fomite; Quotquot enim hoc more lenta ægritudine occubuerunt, secto Cadavere, Mesenterium compertum est summe putridum, plerisque etiam pene totum absumptum; nonnullis sordido ulcere, aut exiguis adhuc abscessibus scatens, ceu totidem latentibus Vomitis, quæ procul dubio diuturnam febrem, ac mortem tandem attulerant. Horum unum, atque alterum exemplum lubet commemorare.

Ægrotus Quintus.

Mercator quidam in *Vico D. Thomæ* florenti adhuc ætate, alvis torminibus exeunte hyeme vexari cœperat: inque dies magis, magisque dolor vim capiebat: tantumque aberat, ut huiusmodi doloris addita causæ comprehendere possent, ut nunquam ullis remediis tolli, aut saltem levare hoc malum potuerit. Comes aderat febris, quæ intermittens diu vultum retulerat, atque tandem amplius circuitus legem observabat, modo etiam crudelior reviviscere videbatur; Quo urgente magis adhuc, quam ut tolerari posset, dolore, extenuato prope, ac macie confecto corpore e vita discessit. Cadavere secto sana omnia reperta viscera, præterquam Mesenterium; quo præciso, materia multa nigra, fœtensque profluxit, encausto futorio similis.

Ægrotus Sextus.

Honestæ Virgo hospitalis Puellarum domus, vulgo *dell' albergo*, in dolores Colicis similes, ac pro talibus habitos suprema hyeme incidit, contra quos cum nullum remediū genus valeret, misella, febris quotidie cum rigore insigni repente doloribus jam dictis associata, paucos post menses marasmo consumpta est. Dissecto ventre ingens copia puris, quo totum mesenterium refertum, ac quasi turgidum erat, erupit. Hoc Natura per renes evacuare frustra tentaverat, urinis valde purulentis profluentibus: Cum renes interim integri, omnique labe carentes conspicerentur, quos nonnulli ulceratos suspicabantur, idque non immerito, cum puris mixtus diuturnus, teste *Galeno* 4. Aph. 75. renum, aut vesicæ exulcerationem significet. Verum doloris circa renum regionem absentia suspicioni huic non attestabat.

LII. Cæterum nec in Mesenterio tantum, etsi præcipua ibi extiterit morbi scena, sed & in finitimis huic quandoque partibus, huiusmodi infarctus occurrerant, quorum exempla recensere haud vacat. Tentabat siquidem Natura per ejusmodi abscessus in hac, aut illa parte erumpentes morbum solvere; At cum hi in abdito adeo loco, imoque delubro contingerent, sequebatur hinc ab eorum disruptione totam unam partem putrescere, ac velut absumi. Febris hinc intermittens incunabula repetenda, nedum facta, aut tentato abscessu; Ejusdem in acutam migrantis prologia, inchoato prope, ac confecto ipso; lentæ itidem, ac una simul sævissimorum alvi cruciatuum incrementa, disrupto tandem, ac finitima quæque loca exundante. Primo in stadio facile erat propinato Cortice ulteriorem morbo progressum inhibere; Haud ita facile in altero, ni exiguus foret abscessus, aut glandulosa pars, in qua is delitecebat, haud ita diffusa ab intestinorum tramite, ut in eorum cavo facili negotio posset exundans materies vasorum famulatu exornari. Difficile omnino, ac pene impossibile in tertio, ac supremo morbi statu; sive huiusmodi concrectiones in Mesenterio, ut plerumque obtigit, sive in Pancreate, aut Hepate, sive quod in *Ægrotis Sexto* suspicari fas erat, in renibus occurrerint. Renes hoc pacto exulceratos, ac fere absumptos omnino mihi in Viri Cadavere diuturna ægritudine confecti haud ita pridem offenderat solertissimus, ac ingeniosissimus adolescens *Octavius Calastus* in majori Urbis Nosocomio assistentis Medici munus diligentissime persolvens.

LIII. Morbos abscessu solvi satis vulgare est, qui frequentissime quidem febribus, & variolis supervenit, maxime circa aures, atque inguina; non nunquam & toto corpore diffusa excrescunt tubercula, quæ in pus aliquando resolventur. Idem ubique Naturæ laborantis conatus; etsi impar illa sæpe haud queat, quod tentaverat opus, absolvere, sæpe etiam ob partis longinquitatem, per quam nempe partem, seu emunctorium haud ita facile est congestam materiam evacuare, foras protudi. De abscessibus Hepatis feliciter peractis innumera monumenta habemus apud Scriptores, quod quidem per Choledochum ductum, amplum satis, ac per mille illum rivulos collectam in jecore materiam in Duodeni cavum deferre aptum, si præsertim congruo in loco abscessus fiat, facile is erumpere queat, ac totus exonerari. Præclarum Hepatici huiusmodi abscessus hoc pacto felicissime curati exemplum Parenti olim meo obtigit in Serenissimo Principe N. N. a Sabaudia, cum illius ægotationi præesset. Ejusmodi ego alterum in Pancreate in nobilissima Muliere hoc more sanatum vidi, diuturnis, dirisque hystericis insultibus divexata, cujus adhuc ve-

stigia

stigia, eadem decem ferme post menses defuncta, cum filiam peperisset, inspexi, ac Medicis, qui una mecum curationi aderant, ostendi. Nolle erat abscessus sedem, locum a doloris vestigio, abque visibili tumoris in eo situ, quo proprie Pancreas latet, praesentia, qui dein evacuato sensim per alvum pure imminuebatur.

LIV. At vero nullum adhuc curationis in Mesenterio abscessus, vix unum aut alterum latentis ejusdem in renibus, aut vesica, perque urinæ meatus suppurati; cujusmodi historia illa *Pitbionis* ab *Hippocrate* in principio *tertii Epidemicorum* descripta. Mirum sane, quantum in hujus explanatione hallucinentur interpretes, qui uno omnes ore, ac unanimi consensu morbi liberationem urinæ copiosius effusæ tribuerunt; Neque enim ad urinæ quantitatem, sed ad qualitatem potius, utpote quæ fuerit purulenta, referri sanitas debet. Neque leve est, quod *Hippocrates* his in libris sæpius observat, urinam quoties materia illa purulenta per vesicam abducta est, cum difficultate & dolore reddi consuevit, ita ut stranguria laboraverit ægrotus. Proferam hic, quod mihi olim adnotare contigit curiosum satis, huic *Hippocratis* exemplo plane respondens: ita tamen, ut hoc intersit; quod utcumque factus abscessus suppurationem obierit, æger tamen sanitati minime restitutus sit. Atque eo lubentius id proferam, quod sub hac plerumque imagines juniores non modo, sed senes aliquando decipiantur, ac si calculus revera adesset, qui tamen nullus postmodum reperitur.

LV. Sacerdos e Capuccinorum familia, & ingenio peracri, & studio flagranti, & doctrina eximia, & memoria singulari excellens, anno ætatis sexagesimo sexto, circa Veris initium valetudinem amisit. Urgebant viscerum dolor, flatus, & quasi quædam convulsio: languescēbat admodum stomachus. Post autem aliquanto desidendi aderat, mingendique cupiditas, stranguria, dolor juxta inguen, & glandem permolestus, præcipue post extremam mictionem gravissimus; In Perinæo ad vesicæ cervicem pondus; atque hæc omnia, & nova, & repentina. Urina primum difficilis atque intercisa; deinde magno cum impetu, & sonitu quodam, quasi ventus aliquis erumperet, excreta: In qua quidem, color inerat naturalis, nihil tamen subsedit. Dolor aut resupinato, aut inclinato, aut etiam cum distenderetur vesica, levior. Atque hæc inter mingendum molestiæ ad vitæ usque finem perdurabant. Accessit interdum sitis. Hoc fere modo ad medium Majum traxit: quo tempore dolores statim exacerbescere sensit, siquid paulo calidius hauserat. Per biduum omnia rejecit vomitu; Cruciori sibi intestina, & abdomen vehementius tendi querebatur. Dolor hinc inter meijendum acerrimus; febris cum siti satis acuta: quæ tamen, die tertio elapso, aliquantulum remiserunt. Arenulæ aliquot asperæ, quæ magnitudine caput aciculæ æquabant eiecit. Color urinæ saturior: in qua subsedit plurimum mucii glutinosi, & subflavi, sanguine hinc inde, aliquando etiam earunculis, ramentisve respersi. Paucis exinde diebus recrudit dolor; Obortus hinc quoque rigor, totumque horrore corpus intremuit. Pulsus celer & depressus; Lingua arida; Urina sanguine plurimum tincta; quam quidem non nisi in lecto cubans excernere potuit. Postremo tandem requies, seu potius sensus obtusior. Caput quippe tentari cœpit. Febris, singulis diebus vesperti ingravescere sueta, tandem fere prorsus elanguit. Spiritus paulo difficilior: Urina mordax planeque mali odoris: pus ea largitate profluens, ut urinæ copiam prope excesserit. Huic malorum molis paulatim accessit sensuum stupor. Ita in hoc piissimo Viro ille animi motus, quo nihil celerius, aut acutius esse poterat, veterno tandem obtorpuit. Qui autem non jure beatum illum dixerit, vel quod vitam doloris experts tandiu produxit, vel quod, cum diutius haud sine dolore vivendum esset, vivere desit? Aperto cadavere urinæ iter accuratius pervestigatum est. Nam ad sectionem in animo parati accessimus, quasi calculum effemus inventuri. Sed neque in vesica, neque in renibus ipsis, ullum omnino sabuli, nedum calculi apparuit vestigium. Dum ulterius viscera scrutamur, Colon ita pertinaciter vesicæ adhærescere animadversum est, ut ne cultro quidem facili dividi posset. Quaque in parte adhærescebat: in conspectum venit diametri quasi sesquiuncialis ulcus rotundum, quod non modo Coli ipsius tunicas penitus absumpserat, sed etiam vesicæ membranam extimam perederat. Hinc via per tunicam vesicæ mediam, sive musculosam perforata est, quæ pennam anserinam reciperet: Unde continuo pus ab ulcere intra vesicam defluxit; aditusque patuit, quo in urinæ ductum ab intestinis commigrarent flatus; de quibus quidem, dum viveret, ægrotum somniasse perperam credidimus.

LVI. Sed ut ad *Mesenterium* revertar, quod *scenam* constituo sævientium hoc anno malorum; atque ut uno omnia claudam paragrafo: Ars medentis erat, præsidium, quod cedebatur præstantius, *adhibere*, antequam enata hic loci passim concreciones serosæ phlogosin inducendo febrim efficerent intensiorem, aut erumpente abscessu febris inde habitualis emergeret. Sive autem in substantia ad instar electuarii, sive levi ebullitione in aqua appropriata paratus, atque una cum balsamicis commixtus Cortex exhiberetur, perinde erat; Quanquam & hic maxime quædam sit Medico cura, ac vere dixerim prævidentia, quæ definiri non potest, multo minus edoceri. Equidem cum præcedentium annorum, tum quæ hoc anno sæviebant, ægri tudines, mihi ante oculos pono, lympham ubique in motu peccantem video; Ut nihil inde mirum videri debeat, quod pulmones modo, lentescens hæc passim, ac fistrophes ubique inducere apta, pectusque, ut superiore anno adnotavimus, modo imi ventris viscera, ac *mesenterium* præcipue occupavit. Quotiescunque vero, in hac siccitate temporum, tot emortuas huc illuc plantas circumspicio, defectu humidi terræ centralis, quod iis pabulum præbet; dilucide mihi occurrit febrim, ac cæterorum affectuum, qui una eruperant, ratio; curve hi potius in *Mesenterio*, quod ager est, campisque patens, insignibus glandulis, rivulisque majoribus refertus, per quem vitalis succus identidem percurrit, ac remeat, cruori aliquando miscendus, quam in alia quacumque parte tentoria castra posuerint.

LVII. Exacta hyeme, eadem visæ febres proludere, novo tamen symptomatis genere distinctæ, ut in *Ægrotis* 2. attulimus; sopore scilicet gravi, ac profundo, imbrifero tum, ac summe perfrigido existente cælo, nocturno etiam sæpe gelu concretis ubique per circumjectam planitiam fluentibus aquis. Cernere novum hoc

symptoma easdem, ac febris, phases obire, cum eadem scilicet crescere, statum attingere, ac demum illa declinante, declinare sensim, resitante, ut plurimum, aliqua in soporem propensione, etiam tempore intermissionis, quæ affectum paulatim radicari, & ad Idiopathicum tendere præmonebat. Nonnullis quidem intermedia apyrexia nullum aderat soporis vestigium, ejulque loco cruciatus ventris prodierant, eo more recrudescētes, ac in intermittētibz autumnalibus, apyrexia tempore, iidem irasci consuevere, evanescentes hi dein, repente febris, quæ soporofam affectionem se cum una comitem afferebat. Sæpe coævus febris sopor, interdum illi posterior, diarrhœa passim, dysenteria, aut memoratis alvi cruciatibus proludentibus. Enim vero etsi in capite agi videbatur Tragicæ, morbi tamen fomes, ac incunabula adhuc in imo ventre delitescēbant. Atque hinc quidem, cum accesserat sopor, ex intermittēti tum sæpe in acutam degenerabat febris, eadem protinus & ipsa methodo profliganda, antequam *Palladis Templum*, sacramque aram intime magis morbus pervaderet. Ominosum erat, propinato Cortice febrim intensiorem adhuc evadere; Ut victoriæ signum certissimum eandem denuo in intermittētem definire, quousque tandem continuato corticis usu omnino profligaretur. Plerisque memini loco soporis cardialgiæ in principio accessionis supervenisse, pauca ut plurimum, vel inani vomituritione. Lethale heu prorsus symptoma, atque eo funestum magis, cum febris intermittens adhuc perfliterit, ac vim illa eluserit prædicii, serius forte etiam, quam par foret, administrati. Quæ cum ego memoria recolo, ac versicolore hujusce imaginem febris Vere potissimum, ac æstare ludentis adverto, animo subit Proteiformis illa, cujus ingenium, ac morem accurato penicillo adumbravit *Mortonus*, vim una simul eximiam Peruviani Corticis pro tanto debellando hoste summe commendans.

LVIII. Nunc ad intercurrentes affectus me conféro, quibus curandis, sanandisque, etsi nihil prorsus cum vulgaribus morbis habere viderentur affinitatis, haud exiguan tamen lucem iidem præbuerunt. Adeo scilicet nedum, quæ sub Epidemicarum Principe ludunt, ægri tudines, haud impari, ac illam, methodo vincere tutum est, sed & quæ ab ea toto penitus cælo discrepare videntur, nullumque omnino cum illis sœdus habent, atque consortium. Has inter recensenda primo loco *Asthmata* veniunt, quæ si olim unquam, hoc potissimum anno, ac rum quidem, cum sæviret ab alto Boreas, frequentissime proluserunt; atque ejus præsertim generis, indolisque, quæ convulsiva vocat *Willisius*, seu *sicca*. Plerosque horum memini solo Cortice Peruviano sanatos, anodynus una commixto, quæ aliter per se sola usurpare, perniciofa res erat. Proficua quampluribus venæ sectio, ac quidem *Jugularis*, cujus beneficio haud pauci inopinato evasere. Miræ curationis exemplum hujusce ingenii Asthmatis enarrare juvat, quod lucem fortasse Præcæticis hac in re feret, quo citius rutiſque idem, sive recens illud extiterit, sive diuturnum, compescatur, evellaturque radicitus. Sartoris cujusdam *Galli* (*de la Rue*) Filius, decennis circiter, in *vico novo*, qui recta ab ædibus Regiis ad Portam, quæ vulgo *nova* dicitur, ducit, diuturno hujusmodi Asthmate flatulento, ut ajunt, seu periodico laborabat. Rogatus ego, ut opem illi præberem, haud libenter, quod ingenne fateor, curam suscepi; Nihil enim sperabam mihi ex ea laudis accessurum, aut ægro emolumentum. Tentaverant siquidem id ipsum plerique alii, sed frustra. Invitus denique, ac precibus Parentum indulgens, jubeo venam in cubito mane sequenti secari, altero die potionem ex Manna obtuli, nullo, vel exiguo fere l vamine. Sæpe mihi in mentem venit Corticem exhibere, vel ex eo maxime, quod unum inter, ac alterum Paroxysmum plenissima sæpe intermissio succederet. Quem ramen præscribere distuli, mali diuturnitate perterritus, ne scilicet infons alioqui remedium eventus ambiguitati, ac prope dixerim, forti subicerem. Oxymel itaque Asthmaticum *Floyeri*, Viri Doctissimi, ac qui multum gloriæ in hac Provincia sibi comparavit, aureo tractatu de Asthmate, in quo nihil fere desiderandum reliquit, Oxymel inquam Asthmaticum *Floyeri* præscripsi, mane, & vesperti sumendum. Leniri hinc malum visum, saltem paroxysmos haud adeo frequenter occurrere, ac repetere antea consueverunt. Properante hyeme ingravescere illud, ac irasci magis iterum cœpit. Jubeo sanguinem e Jugulari lato vulnere emitti, ipseque locum sectioni aptum Chirurgo designavi. Totum namque recentibus scrophularum vestigiis obstrum undequaque collum aderat, quibus vel ab incunabulis correptus æger fuerat. Eadem mox die, ac sequenti bene se habuit Puer; Proxima huic nocte, cum Parentes somno placidissime tenerentur, ingenti exaudito strepitu expergescēta Mater filium reperit humi prostratum, ac pene animam efflantem. Me diris increpat, quod inauditam rem, sic namque vocabat illa, recens factam in Jugulari sectionem, in filiolo tentari. Atqui vanas hujusmodi Mulierculatum querelas parvipendit vir Prudens, Parochum exemplo advocat, qui morienti Puero suprema munera administraret. Dum hæc agerentur, sedari visæ sensim convulsiones, altusque sopor ingruere, qui perennem rebus securitatem attulit; Ex eo nanque tempore pacata sunt omnia, nec ullum vel leve mali vestigium superfuit. Incolumis brevi post Puer una cum Parente, donni pares mihi pro munere grates lætissime egit.

LIX. Sæpe ego ejusmodi asthmata in pueris ab obesitate nimia, seu intumescētia Thymi ortum ducere haud inani conjectura suspicatus sum; Sive ejusdemmet Thymi situm, munus, ac habitudinem vivida mentis acie perpenderim, sive enata inde symptomata quæque diligentē ad trutinam revocarim. Pondus addiderat conjecturæ meæ demortuorum Puerorum sectio, quibus frequens id mali genus extiterat. Cum enim quædam olim mecum ipse meditabundus cogitarem noxa prope, ad Thymi usum hætenus ignotum prorsus, conducentia, inque lucem edenda aliquando; Quotquot hinc fœtus, renellique infantes mihi occurrerant quopiam morbo denati, hosce omnes curiose perlustrabam, ac Thymum potissimum, quem obesum, ac inflatum magis, ac ætas postulaverat, in iis omnibus deprehendi, quibus quædam aderat ab ortu anhelitus angustia: Ad fœtus vero quod attinet, cum aer nondum bronchia repleverit, prægrandis utique Thymus in iis conspicitur, qui demum in adultis sensim decrescit, ut in Senibus fere idem vix inveniat. Suspiciabar autem quod cum Thymus nutritium succum, qui a sanguine e magnis, ac proximis vasīs affluente, magna co-

pia ibidem derivat in fœtu, non equidem, ut sibi effinxit *Cl. Bellingerus* per excretorios ductus ad oris confinia juxta linguæ radicem deponat; At, ut ego propria observatione edidici, rorem illum nutritium in ipsius œsophagi cavo, exiguis osculis, breviorē itinere conferat, unde in ventriculum, ac intestina delabitur, vasque lactea percurrit, quin fœtus ore assumere alimentum cogatur, quod improprium, ac minime conveniens vel ipse olim *Hippocrates* censuit: Suspicabar, inquam, quod idem Thymus, edito jam in lucem fœtu, nimia oppletus succi quantitate, nec exonerare hanc potens in proximo infundibulo, obstructis ab ampliato post natiuitatem œsophago hiantibus in illum ostiolis, eam tandiu in sinu suo detineat, quandiu a propioribus vasīs absorbeatur; absorpta dein eadem, cum maxime delituerit diu, aut forte hæreditaria labe acorem contraxerit, tot una excitet turbas, totque illa parens sit ægritudinum, quas pueris sæpe contingere videmus, difficili Marte sanandas. Atque ob id sane plerisque usitatum est fonticulum in occipite puerulis utiliter inurere, aut setaceum derivationis gratia, cum maxime ea ætate pueri gravi soleant stertore premi, qui nullimode ab ullo pulmonum infarctu, at potius ab nimia Thymi obesitate proficiscitur.

LX. Ab eodem, ac memorata Asthmata, fonte ortum una, ac incrementa susceperant Paralytes, Apoplexiæ, Hæmoptoes, improba Scabies, Podagra, Nephritis, Phthisis, ac uniuersi prope affectus, quos præsens constitutio anni in Scenam tulit, quibus & merito accensendi occurrunt fluores albi Mulierum, tum pallidi Virginum colores, affectus Hysterici, in fandaque Puerperarum Clades; ab liquidis scilicet, aut præ nimia glutinositate coarctis, aut æqua feri portione defraudatis, quo egent, ut sibi comparata munera obire queant, ac constitutas sibi leges servare. Qui hæc omnia serio mente revolverit præterita, aut tum quidem revolvit, expenditque diligenter, cum impenderent prope; Is vates esto, ac *Magnus Apollo*. Hæc inter peculiare nonnullas historias seligam, quæ Medicinam facientibus haud inutiles omnino erunt, aut injunctæ legentibus. 1. Præclara Vessalis Octobris mense, cum intenso præter morem æstui rigida hyems & vestigio successit; Paralyti dextri lateris una cum insultibus hystericis perculsa, dirum in modum ludentibus, laboriosam vitam tota hyeme duxit; Vere appropriatis remediis pristinum valetudinis statum integre recuperavit, quadam tantummodo superfluitate tarditate linguæ, per novilunium maxime. Autumno dein sequenti eadem die, ac momento fere temporis, quo superiore anno in Paralytin incidit, pleuritico dolore correpta intra biduum decessit. 2. Vessalis altera, cum, fluentibus menstruis, in aquæ frigidæ balneo diu morata fuerat, internarum partium omnium paralyti exemplo obruta & adhuc luget infelix amissum membrorum usum; Atque hinc sane explicari posset phænomenon illud gravitatis, seu spasmi, quo in aqua diutius morantes plerique corripuntur, ac se se velut a Spectro quodam ad fundum trahi existimant. 3. Mercatoris filia, cui prægrandis diu in abdomine enatus tumor, quæ cæcum intestinum ad dextri renis confinia delitescit, Colicos sæpe dolores, ac sævos admodum inducere consuevit, in paralytin subinde ejusdem lateris desinentes, quæ citissime solvebatur; ab utroque jam modo affectu Thermarum beneficio immunis, atque incolumis degit, remanente antiqui tumoris in eadem parte vestigio, qui malorum autor extiterat. 4. Quidam ex hepatis, & vesicæ bilis obstructione in tertianam notham, deinde in colicam passionem incidit; paulo post paralyticus redditus, sex fere menses inetmis vixit, ad extremum delirio, ac epilepsia correptus occubuit. Paralytis a principio occupavit brachiorum superiores partes, sensim ad extremitates manuum, ultimo ad crura descendit; Æger atrophica contabescebat, deque ventriculi ardore, siti, appetitus edendi prostratione, alvi difficultate, & dolore Ilii sinistri tenfivo, gravique (sentire enim sese aiebat in illo loco pondus aliquod grave, tanquam plumbi massam) conquerebatur. Aperto cadavere Jecur reperimus pro corporis ratione nimis magnum, obstructioneque minime vacans; Vesicam bilis crassa, ac nigra bile turgidam; Ventriculum humore viridi plenum, atque extensum; Colon intestinum male, ac præter naturam conformatum. Siquidem ubi Cæcum situm est, & ubi Colon ventriculo annexum erat, valde laxum aderat, flatibusque expansum, reliquis in locis ad rectum usque, angustum, facibus crassis, durisque in globulos concretis infarctum; Eodem modo conformatum vidi Colon in multis. Reliqua viscera tam naturalia, quam spiritualia erant illæsa, & integra. Ex cerebri substantia inter disseccandum effluxit aqua tenuis, ac colore subrubicundo, quod vasorum sanguineorum iunctioni adscribendum est; nam aqua, qua omnes ventriculi scatebant, fuit tum tenuissima: tum limpidissima, ac pura, nihil vero pituitæ in ventriculis cerebri vidi. Torum spatium, quod in Sacra fistula inter tenuem, & duram membranam est, & ubi nervorum funiculi nervos constricturi a spinali medulla recedunt, simili aqua plenum extitit. Ex qua quidem historia, & symptomatibus, quæ præcurrerunt, conicere fas est omnium malorum scaturiginem ab Hepatis obstructione potuisse s. Virum novi resolutionem ex morore, multa solitudine, & inedia expertum: deinde sumpto Cathartico, adeo læsum, ut totus ipse immobilis fieret, & propemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus, tum potionibus, tum cibis, & aliis hujusmodi usus fuisset, maxime vero balneis, unctionibus, mutatione aeris temperati, & omni hilaritate. Etenim tristis erat, & ad iram proclivis. 6. Miles ætatis 30. annorum, exeunte Januario, derepente inter prandendum cum suis Commilitonibus, mortem subit. Consuevit longo antea tempore de dolore pressorio in radice frontis, & de perpetua narium, ac faucium siccitate conqueri. In aperto post obitum corpore observata sunt sequentia: Pulmones utrinque coherentes cum Pleura expansi, & turgidi sanguine, dexter tamen lobus minus sinistro, absque ulla substantiæ labe; Cor flaccidum, Hepar præmagnum. In capite autem propior hærebat hujus inopinati eventus causa; Processui nempe falciformi, ubi intra radicem frontis cum osse Ethmoides firmius conneditur; accreverat conspicua magna portio inflar indurata, scirrhusa, & conglomerata glandulæ, quæ fronti in isto, quo hanc respicit, latere firmiter cohærebat, ut digito violenter separari opus habuerit. Proxima Cerebri substantia erat siderata, putida, & eliquata; Reli-

qua illæsa. * Optandum sane, ut exquisitiorem historiam prægressi morbi, aut adversæ saltem valetudinis hujus Viri habere potuissemus, aut nemo aderat, qui talem subministrare potuerit. Analogum huic casum olim a *Cl. Terraneo*, nunc Beato, adnotatum memini in Viri cujusdam capite subita morte interempti, in quo magna occurrerat fungoso glandulosa, ac fibris distincta portio, anteriora versus usque ad os frontis, a dextris ad os temporum, a sinistris vero ad duplicaturam Menyngis usque protensa, tres libræ quartas pendens. 7. Jurisconsulti Uxor, prope Collegium Clericorum Regularium Divi Pauli, diro, ac diuturno capitis dolore vexata, appetente solstitio æstivo, oborta febri acuta, e vivis inter copiosissimos capitis sudores excessit. In hujus capite ingenti feri copia subflavi, viscidique, utrumque ventriculum anteriorem refertum comperimus, ac glandulam juxta pituitariam disrupti recens abscessus vestigia, pure adhuc exundante teterrimo, fœtentique. Tota Cerebri substantia corrupta veluti videbatur, ac coloris subnigri; Nihil e contra in Cerebello a naturali alienum. Biduo ante obitum facies, atque oculi intumuerunt; Ipsa vero vaporibus sæpe sub somno, obliuiofate, lancinationibus per aures, plerumque etiam molesta oculorum caligine, spasmo cynico, ac involuntario salivæ effluxu per intervalla diu ante mortem corripiebatur. 8. Vidua quædam conquerebatur de Cephalalgia singulis auroris tanta cum atrocitate invadente, ut futuræ capitis quasi dehiscerent. Hactenus præsidii illiusit omnibus. Mutato demum consilio suasi pediluvium; Unde factum est, ut aura frigidissima, sic illa aiebat, cum horrore totius corporis a capite ad pedes descenderet, ægraque bis vel ter idem administrando, plane convalesceret. 9. Illustis Mulier recens connubio juncta ex Mensium suppressione, fastidio ciborum, nauseis crebris, & vomitibus, ventris elevatione, aliisque similibus indiciis cum se gravidam crederet, plandeat sibi ob felicem hanc conditionem. Quarto circiter mense dolores invadunt parturientium doloribus similes, ac paulo post corpus edidit informe prorsus, duorum pugnorum circiter magnitudinem adæquans, ac vesiculis conflatum, quatum maximæ ovum columbinum mole, ac figura exacte emulabatur, minimæ vero vix pisi magnitudinem superabant. Aderant autem centum fere humore limpidi, & seroso repletæ, ac inter se invicem colligatæ, membranosi cujusdam involucri ope, ceu altero quodam peritonæo, involutæ.

LXI. Pleraque alias recensere subit, quæ aut abortivos fœtus, aut molares hujusmodi conceptus edidere; Pleraque etiam, quæ maturo edito feliciter partu, paucis post diebus, latenter occubuerunt. Cautum iis erat, appropriatis cardiacis laborantem naturam tueri, tum diluentia pleno poculo exhibere; quibus tum sanguinis fervor quodammodo compesceretur, tum fluxilis idem magis redditus per consuetas inde vias faciliore negotio educeretur, obsequentibus ab repetito diluentium usu factis fibris, quarum nimia sæpe tensio funestos plerisque exitus tulit. Tota scilicet malorum ilias ab una, ac eadem universali causa pendebat, ab ea nempe siccitate temporum, ut quæ toties dicta sunt, iterum repetam, quæ & fervidior intus cruor, & cætera quæque liquida, ad flammam heu prona nimis; Crispata hinc, ac tensa præter modum solida, sæpe una Matrem, ac Fœtum inopinato sustulerunt. Huc quoque enumerandi hysterici insultus, huc cætera quotquot referendæ ægritudines, quæ hoc potissimum anno sequiorem sexum dirum in morem exercere.

LXII. Dum hæc intra Urbis mœnia agebantur, haud dissimiles passim affectus Colonos infestabant. Variolæ præsertim, ac morbilli tota hyeme inclementer sæviere, adultosque hæc maxime adoriebantur, ac edita magis loca, quam puetos, ac humilia oppida. Comites iis aderant crurum, ac pedum erysipelata, sæpe etiam internæ viscerum Phlogosæ, Pleuræ, Pulmonum, Hepatis, Intestinorum, Menyngum, Oculorum, ac Faucium. Salassios, Canapiciensem Agrum, Vercellas, Lumellinam, Comitatum Alexandriæ, Universam pene Lignariam, ac Montisferratensem ditionem pertinax alvi fluxus occupavit. Idem Niciensem tractum, Provinciam, ac superatis Alpibus, Delphinatum, Sabaudiam, Lugdunum usque obtinuit, perque æstatem potissimum sæviit. Febres hinc visæ e Phlogisticarum censu memoratos affectus comitari, ac ultrocitroque ire, suapte marte, ac ingenio. E Chronicis morbis Hydropses in universum, ac Tympanitis maxime, Arthritides, Phthises, tetraque ulcera Pagos, ac rura fœdarunt. *Alladii*, quod præclarum oppidum est Comitum *Sanmartinorum*, Febres Januario vagatæ sunt mali moris, quarum historiam ab *Cl. Viro* exaratam hic subnectere æquum duxi, in spem veniens, incitamento id futurum subinde aliis, ut sedulo hinc, diligenterque morborum, quotquot huc illuc per annum sæviunt, seu popularium, sive intercurrentium observationes describant.

Illu-

* Rariores sunt hi casus, ubi officina Mentis, & Rationis turbatur per talem prægrandem excrescentiam. Placuit Carolo Fracassato in *Diff. Epistol. ad Alphonsum Borellum tales excrescentias, etiam hic locorum Polypos medullares appellare, quam appellationem etiam secutus est Lancisius Tract. de moribus subitaneis; ubi comparat ferre casum recenset lib. 1. cap. 2. §. 6. Quemadmodum enim Polypi cordis sanguinis progressivum motum, & omne inde pendens vitæ interesse confundere, imo sufflammare solent: Ita Cerebrini medullares isti polypi, quatenus liberum illud ventriculorum spatium, ac vacuum præternaturaliter expleant, confundunt motus in hoc vacuo existentes, representativos, reflexivos, collectivos, & discretivos, ut maxima inde anomalia redundet quoque in motus vitales. Ita Lancisius paralyticæ, & aphonæ mulieris repente mortuæ caput aperuit, & invenit sub cerebello ad internum principium Spinalis medullæ, Glandulam scirrhusam, de *Mort. subit. l. 1. cap. 11. §. 11.**

Illustrissimo, Doctissimoque Viro

CAROLO RICH A,

Joannes Thomas Guidetius S. P.

Quod annales Morborum Vulgarium processus eruditissimis animadversionibus contextos, & graphico stylo feliciter exaratos, publico juri elargiris, Vir Amplissime, tibi plurimum debet Medicina nostra Subalpina. Hæc enim in te suum videt restauratorem, quæ a Majoribus tuis Archiatriis meritissimis decus habet, & gloriam. Ad peritilia isthæc indigenæ praxeos monumenta locupletanda uno corde, unoque pede contendere deberent omnes Medicinam facientes in nostra hac Pedemontana ditione, suas quisque appendens observationum schedas, ut olim tabulas in Æsculapii templo appendi usitatum. Hujus ego instituti, tuique consilii optime conscius silentio ulterius præteriri non patiar historiam ægritudinum nonnullarum Epidemicarum, quas ineunte Januario proxime elapso datum est observare in Alladiensi oppido una cum præclarissimis Viris D. D. *Bardesono* Patre, ejusque Filio doctissimo, illic in Patria gloriose Medicinam profitentibus, ac in tota Salassiorum Provincia de re Medica optime meritis. Esto itaque.

Cum Divini Verbi Præcones in præfato oppido prædicationi suæ optimum finem imploraturi sacram instituissent liturgiam, ea fuit hominum accurrentium turba, ut horum conventu inter Ecclesiæ Majoris angustias nedum exastuaverint corpora, sese arte soventia, sed & ipsi exudarint parietes præ halituum emanantium affluentia. Complures viros, atque mulieres sudore manantes frigidus aer excepit, hinc popularis morbus, haud multo dato intervallo, grassari visus est cum ægrotantium languore, febri, raucedine, nausea, lingua viscida, & amurcosa, pulsu tenui, mentis hebetatione, vaniloquiis &c. Mox accessere deliria, surditates, aphonix, gravesque sopores ad lethargum ducentes. Eructabant in aliquibus stillæ sanguinis, ceu levis hæmorrhagia e naribus, in quampluribus petechiæ exiguæ breviter evanescentes, in omnibus borborygmi, & lumbricorum excretiones per superiora, & inferiora cum scæbis graveolentibus. Febriles exacerbationes, nocturnis horis catarrhalium more, absque intermissione, clanculum repetebant. Nullus præcedebat rigor, nullus succedebat æstus ingens, exigua sitis. Urinæ a naturalibus vix abludebant. Sanguis extractus in principio morbi coccineum servabat colorem, aptamque consistentiam, nullo ægrotantium levamine. Sæpe diarrhœa superveniens commodum tulit, ut & in aliquibus sudores. Interea plerique quinto, vel septimo morbi die non sine magno populi terrore migrabant ad plures.

Harum ægritudinum indole, causis, symptomatibus, atque inde eventibus serio consideratis, deduximus unanimes has esse in sua origine febres de genere lymphaticarum cum vermibus, acutas tamen, & male moratas ex coagulatione lymphæ primum, exinde sanguinis. Primariam coagulationem exhibebant raucedines, linguæ visciditates, membrorum torpor, nocturnæ periodi, aphonix, alvus pigra, intestinorum murmura, & inde excreti lumbrici. Posteriorem siderationem elucidabant, reliqua enarrata symptomata perniciem accusantia. Totam denique complebat æthiologiam notitia morbosorum in lymphæ apparatus a prægressis tempestatibus, quas tu nobis scite admodum diligenterque comparasti, repetenda; Ob id maxime, quod æstas antea, atque Autumnus mites fuerint, ac Borealibus ventis perflati, unde nulla, vel modica facta est sudorum effusio, alioqui nostro sub Cælo consentanea quot annis. Quod si iis addas pravam alimentorum conditionem, fructuum præcipue corruptelam, nec non aquarum putealium scæulentiam ab inclementia cæli contractas, erues profecto genuinam lymphatici lentoris, & cachochiliæ causam simul, ac genesin lumbricorum.

Cur autem a violenta adeo procatharsi febres hujusmodi, non vero pleuritides, peripneumon. anginæ, erysipelata interna, aliæve hujus farinæ ægritudines emerferint; ex hoc factum puto, quod scilicet hujus Brumæ Constitutio non satis rigida, catarrhales concretiones, stasesque in glandulari systemate, rivulisque lymphaticis congregare apta nata sit potius, quam systrophicas collectiones, ac phlogoses intimioribus viscerum flexibus. Veruntamen sufflamina hoc pacto lymphæ lubricantis irrigatione, & intercepto illius ad sanguinem commercio, reliquum est, ut & cætera torpeant fluida in suo circulari motu, unde secretionum, excretionumque suppressio, progeniesque malorum. Et siquidem levioribus alias de causis inter hybernas vicissitudines visa sunt pectoris rheumata in acutas peripneumonias degenerare, ita nec mirum, si in datis prædispositionibus, & momentis, expositæ febres a catarrhali exordio in exitiales abierint. Ignotum haud est Medicis praxin excolentibus perniciosas sæpe emergere febres, velut inopinato, a lymphæ lentore pedetentim collectæ, ut probe advertit Doctissimus *Baglivius* lib. 1. de febribus malignis & mesentericis, §. 1.

Porro ex centenis ægrotis, quos bidui spatio invisimus, vix paucos evasuros fore sperandum erat, nisi opportunis extemplo adhibitis præsidii fuisset opitulatum; Utque singulis indicationibus successive satisfaceret: statuimus primum alvinas vias solemniter expiare, emeticis, clysteribus, aut catharticis, servato ægrotum delectu. Secundo lymphæ fluorem promovere, ductusque obstructos reserare diluentibus calide pitissatis, non omitendo anthelminthica cardiacis mixta, & vesicantia artubus applicita. Tertio viam sudoribus sternere, vel saltem adiapneustian delere frictionibus, & cucurbitulis, ut impofterum exhibitis diaphoreticis cutanei pori obsequerentur magis. Phlebotomias raro, nec nisi in Plethoricis celebrandas duximus, potius de saphena, quam de superioribus venis. Reliqua sub finem morbi adhibenda problematice sunt proposita, juxta opportunitatem, & exigentiam.

Nec nostra nos fefellit opinio, quandoquidem tali observato regimine vix unum, aut alterum ex præfato ægrotantium numero deinceps interiisse retulit per litteras ultimo datas laudatus Doctor, cognatione, & amore mihi devinctissimus, *Bardeonus* Junior.

Accipe itaque, Vir Præclarissime, breve hoc observantiæ meæ argumentum; Interea Spartam, quam suscepisti, exornare iterum,

iterumque ne desinas; Meque tibi multis de nominibus obstrictum pergas amare. Non enim me præterit, quam multa jam tibi debeam ob munera, dulcemque consuetudinem, qua me humaniter excipere toties dignatus fuisti: Nec ulla unquam ætas conticeſcet, quæ a Majoribus tuis accepi, honores, ac beneficia. Taurini pridie Nonas Febr. 1722.

LXVIII. Sed ut aliquid de Chirurgia dicamus, in qua Magnos olim, ac percelebres Viros, & nunc adhuc Pedemontium, obtinet; Neve quidquam intactum hac quoque in parte relinquatur, aut imperfectum; Pauca manent de tumoribus potissimum explicanda, qui auxiliatricem Chirurghi dexteram efflagitabant; Hos inter Atheromata præ cæteris, Melicerides eminebant, quæ duo quidem tumorum genera vel in eo maxime conveniunt, quod in folliculo fluctuet humor. Descripsit ea omnium optime *Aetius*, atque e recentioribus *Severinus*: Atheroma tumor est figura oblongus, & sublatus, qui ad compressionem digitorum ob humoris crassitudinem tarde cedit, tardeque iis ablatis revertitur, a quo Meliceris differt, quod & rotundior sit, & humoris essentia tenuior, & hinc ad digitorum compressionem celerius cedat, & celerius etiam revertatur. Non autem hæc ita discerni posse videntur, ut certo omnia affirmare liceat, quin potius, quid intus habeant, ut conjectura præſagiri possit, sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta sunt, non posse, *Celsus* monet, quod tamen non propter humorem, sed alia quædam simul ibi contenta ita fieri apparet: ait enim, in his, quæ renituntur, aut lapillis quædam similia, aut concretos conſertosque pilos reperiri: Officulorum recens exemplum est legere in Ephemeridibus. Nec minus notabile, quod *Petrus Marchetus* in Meliceride se vidisse, ipse testis est: in ejus nempe folliculo alium ejusdem generis tumorem, sed minorem delituisse, sua & ipsum membrana inclusum. Ubi quis cum ranis Æſopi apud Phædrum exclamandum putaverit:

Quid futurum est, si creavit liberos?

Hujusmodi tumores articulos præcipue occupant, ac inferiores potissimum, eo diriores, quo impliciti magis, ac tendinibus musculorum, quorum ibi magna segetes, intricati. Nobilissimi Equitis jacturam universa Civitas deſiet adhuc, qui, dum inter Chirurgos de secundo crure lis ageretur, ob hærentem in rotula ejusmodi tumorem, omnem curationem, ac artis præſidia renuentem, febri lenta in dies ingravescente, macie confectus obiit: alte sepulta, adque totam liquidorum massam propagata labe.

LXIV. Multis etiam Ganglia hos, ac illos artus obſidebant: Durissimum tumorum genus, Nucis avellanæ magnitudinem haud superans, doloris expertus, manuum juncturas, & talos frequentius occupans, rarius cubitum, & caput. Quo pacto oriatur, non liquet: ex fusco nutritio nervorum partium fieri, *Klopton Havers*, nuperus Scriptor conjectat. Videri posset lymphaticus humor, qui partes nervosas alluit, nescio quo spiritu Gorgonico afflatus, congelari, nisi sensum excreſceret; ex quo apparet per appositionem novi liquoris quotidie augeri, ubi sensum cæpit, & subtilioribus evaporatis, indurari. An vasculum lymphaticum supra modum expansum, ubi vel ictu, vel alia violentia illata urgetur humor, qui intus vehitur, non patet. Haud magni cæterum momenti tumor: hoc enim habet beneficium, quod rupta membrana evanescat. Ad hoc expedire *Helvetius* inter Batavos celebris, utebatur malleo ligneo, corio obducto, quo percutiebat tumorem. Hinc etiam fortis manus allisione, ut oritur, sic & tollitur. Sive autem ab externa oriatur, potest emolliiri primum, deinde vi dissipari externa, a Chirurgo compressus, quam elegantem rationem apud *Aetium* videre licet. In eo resolvendo quod Hydrargyrum valeat, *Jo. Loffius* mirabili eventu expertus est, ut libro de podagra perhibet, ubi emplastrum addit a *Zacuto Lusitano* sibi communicatum, quod nodos podagricos quoque dissolvat, de quibus, si quis sit sollicitus (constant autem ex quibus Ganglia, & quasi raxæ cartilagini, ut cum *Celfo* loquar, simile quid obtinent) is vel solus optime satisfecerit. Vidi quendam, cui uno, ac altero horum dissipato, unum, ac alterum e vestigio alio loco oriebatur, quo dein improba progenies, meo consilio, Mercurii ope omnino deleteretur.

LXV. Ruricolæ, atque ex iis potissimum, qui ad Alpium radices degebant, strumis in universum laborarunt. Mulieres præferunt, ac pueri, eo curatu difficilioribus, quo non in collo, ubi hæc prodibant, sed altius forte in ipso Mesenterio earum fomes latebat. Neque novum est tam alte strumas exoriri, quod equidem post alios nuper *Cl. Bartholinus* nepos advertit, ex *Riolano* Sapiens, qui Scrophulas in corpore nunquam erumpere asserit, nisi Mesenterium strumofum fuerit: Hic vere ex *Guidone*, & *Ingraffia* id potest didicisse, qui idem tradidere. Quodve obſtupescas magis; utque anni, ac morborum ingenium ediscas una, adnotare erat, vix paucos *Broncocele* hoc anno obſignatos, familiari cæterum Subalpinis morbo, ut Polonis Plica, Britannis tabes. Tumor est Thyroidis glandulæ, mollis, ac pendulus, nec molestus modo, & aspectu fœdus, sed etiam si magnus, suffocationis periculum adferens. Vidi ego musculos sternothyroidæos plane emaciatis, membranaceos. Curatio illius haud facilis, nec tuta semper. Ut enim Endemius hic Incolis morbus, ita causas illius remove, a quibus originem habet, difficile prorsus. Laudantur plerisque tabellæ quædam ex alumine, ac spongia marina confectæ una cum radicibus pororum; aliis emplastrum de Galbano crocatum Mynſichti. Nonnullis cataplasma ex foliis, & radice cucumeris asinini cum stercore caprillo, quibus & interna jungi possunt, & quidem pulvis ex ossibus Sæpiæ, Mandibulis Lucii piscis, Lapidibus cancrorum, Pipere, Zingibere, Piretro, Testis ovorum, quorum alia exſiccando, alia dissipando agere credi possunt. Potior sane salutis spes, ac tum quidem, cum in scirrhum abiit, in sectione consistit, etsi metuenda hinc sit quædam deformitas, nec exiguum negotium præbeant vasa, quæ ex Carotidibus occurrunt: tum nervi etiam recurrentis viæ, ne accidat, quod narrat *Galenus* de imperito Chirurgo, qui cum eos una evelleret, mutuum reddidit ægrum; Ob quod maxime hanc operationem omnium difficillimam puto. Multi Scrophulas, ac *Bronchocelen* idem esse putant; Alii, quos inter *Fabritius*, nescio, quod attulit vitium asperæ arteriæ peculiare quod eo nomine appellatur, ut

Bron-

Bronchocelen, exponat nemini Mortalium unquam visam. Celsus inter cutem, & asperam arteriam eam ponit. Aetius tumorem simpliciter hanc vocat in gutture enatum; Tumoris tamen genus, ac sedem illius principem designare fas erat, quam nec ipse Severinus, qui de omnis generis tumoribus disertissime scripsit, attigerat; Unus, quem reperiam, Schelhammerus agnovit, recteque in Thyroidea glandula collocavit, visam hanc utique, sed non agnitam Severino ostendens, adnotato ab eodem exemplo hominis cuiusdam, qui Bronchocelen prævastam multos annos cum angore passus, tandem ab ea strangulatus oppetiit; Quo dissecto grumos ingentes sanguinis undique circumfusus cum adnatis quibusdam carunculis offendit. Equidem sine dubio hæ carunculæ partes erant Thyroidis glandulæ præ sanguinis copia distentæ, ac divulsæ in partes, aliis sensim & corruptis, & colliquatis in sanguinem. Et hoc ipsum est, quod Doct. Warthonus dicit: Si *scrophula* (sic namque vocat is Bronchocelen, quod norandum est) *rubescant, colorem floridiorem esse, minusque lividum, quam strumarum.*

LXVI. Inter glandularum ægritudines refero verrucas, ac nodos venereos, quibus, si acerbius unquam, hoc potissimum anno, scdum in morem correpti sunt improbæ Veneris milites, quosve vix ipse quidem magnæ famæ Mercurius solvere potis erat, aut decocta quæque lignorum. Vidi Militem universo corpore verrucosum, avellanæ magnitudinem exuperantibus verrucis. Ficosos hocse proprie vocat Levinus Lemnius in opere de *naturæ miraculis*: suphilios alii, aut putide gallicosos appellant. Aderant hi utique sagacis Naturæ terribilium huiusmodi, ac virosi fomitem abigentis ac profligantis laudandi conatus, si quæ per vasa corporis, cæcosque meatus effluebat lymphæ, crassior illa, ac glutinosa, quam par foret, magis, illi haud obstitisset, verrucas hinc, tubera, ac fungos universo corpore excitans, horrendum visu spectaculum! Ea namque mira est Naturæ providentia, ac sumum ejusdem, ut in omni fere, ita & in hoc præsertim morbo studium, ut per quamprimum loca vitium venit, genitales inquam & his attiguas partes, per has easdem vias, quasi facto recursum, pellat; Ubi vero altius irasci malum incœpit, & se funditus abdens corpora depascit misere; tota conetur adhuc infestum virus, seu exulcerantem intro putrilaginem, per has, ac illas partes, quas in emissaria torquet, expromere; Remquidem, quam serio advertere debent hi, qui Syphiliorum hæc symptomata curant. Ita suis opificiis satagit Natura parens; ita in adversis prospicit; ita nullam viam intentatam relinquit, ut ægrotantes adjuvet.

LXVII. Locus esset huiusmodi eruptiones, tum in morbi inchoantis sive interminati statu, tum in absoluti jam, & late grassati altero fufius describendi; ejusque varios, quos passim inducit, characteres,

*Qui casus rerum varii, quæ semina morbum
Insuper, nec longa ulli per secula visum
Attulerint,*

Enarrandi una, ac explicandi, si hæc omnia possent brevi oratione complecti. Satiùs igitur lepidissimi Poetæ Fracastorii sit audire rapsodiam,

*Ipse ego Cænomanam memini, quæ pinguis dives
Pasqua Sebina præterfuit Ollius unda:
Vidisse insignem juvenem, quo clarior alter
Non fuit, Ausonia nec fortunatior omni.
Vix pubescentis florebat vere juvenæ,
Divitiis, proavisque potens, & corpore pulchro.
Cui studia, aut pernicis equi compescere cursum,
Aut galeam induere, & pictis splendere in armis,
Aut juvenile gravi corpus durare palestra;
Venatuque feras agere, & prævertere cervos.
Illum omnes Ollicque Deæ, Eridanique puellæ,
Optarunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ:
Omnes optatos suspiravere Hymenæos.
Forfan & ultores superos neglecta vocavit
Non nequicquam aliqua, & votis pia numina movit.
Nam nimium fidentem animis nec tanta timentem
Invasit miserum labes, quæ se viosior usquam
Nulla fuit; nulla unquam aliis spectabitur annis.
Paulatim ver id nitidum, flos ille juvenæ
Disperit, vis illa animi: tum squallida rabes*

*Artus (horrendum) miseros obduxit, & alte
Grandia urgebant fœdis abscessibus ossa.
Ulceræ (proh Divum pietatem) informia pulchros
Pascebant oculos, & diæ lucis amorem,
Pascebantque acri corrosas vulnere nares;
Quo tandem infelix fato post tempore parvo
Ætheris invisas auras, lucemque reliquit.
Illum Alpes vicinæ, illum vaga flumina flerunt;
Illum omnes Ollicque Deæ, Eridanique puellæ
Fleverunt, nemorumque Deæ, rurisque puellæ;
Sebinusque alto gemitum lacus edidit amne,*

Hi blandæ scilicet voluptatis, hi tenerorum complexuum sunt fructus, heu tragici tantum, & miserabiles, quantum inter multiplices cruciatus amisisse vitæ dulcedinem, & quantum ex humana specie transmigrasse in brutam.

LXVIII. Locus hic etiam esset pauca de altera tumorum specie, qui ad Chirurgiam quoque spectant, proferendi, nempe de Aneurismatibus, occulti morbi genere, quo plures hoc anno misere interemptos adnotavimus; Sed hæc & pleraque alia prætermittere intacta lubet, ne ingentem in molem pagina turgescat, alibi forte prolixius de hisce acturis, novaque in dies meditantibus, quoad eorum originem, ac incrementa, revelanda aliquando. Exemplâ pariter, ac Schemata exhibebimus magnorum Aneurismatum, quæ nobis occurrerunt, aut ab Amicis communicata. Quæ quidem alio tempore reservamus. Unum tantummodo, atque alterum superest commemorandum, quod nobis terminus hac vice, & extrema erit linea laboris. Primum est Castrationis historia in puero decenni, pro meliori vocis claritate, atque modulatione ab experientissimo Chirurgo Andrea Verna felicissime absolutæ. Febris huic supervenit cum vomitu inani, abdominis inflatione, ac præcipue in regione tota hypogastrica. Alvus ad quartam usque oclusa penitus; Urinæ etiam parca copia effundebantur. Post quartam reserari sponte alvus cœpit, tum urinæ pleno gurgite copiosius effluere, evanescente paulatim, ac omnino tandem desinente febre, adeo ut undecimo die æger incolumis, adque omnia munera obeunda aptus videretur, uno relicto vulnere inflicti vestigio, quod quidem, cicatrice obducta, brevissimo tempore consolidatum apparuit. Alterum est Mammæ, quam fœdus improbus Cancer occuparat diu, extirpatio a memorato Andrea Verna in Virgine quadam quadragenaria prope, feliciter peracta. Cœperat hæc de tumore in mamma dextra a viginti & ultro annis conqueri, cui cum varia passim Muliercularum, Agyrtarumque consilio Medicamenta adhibuisset, incrementa præbuit majora. Augescens is nanque sensim, ac totam pene mammam obfidens, venisque in orbem nigro sanguine turgentibus circumfusus, in ulcerosam demum pravitatem degeneraverat, ultimum postulans in sectione præsidium. Mirum ut generosa Virgo invicto animo, nova velut Amazon, pertulit excisionis acerbiter. Consolidato vulnere, ruri abiit, confirmandæ valetudinis gratia, ubi brevi post tempore acuta febris prehensa decessit. Tertio denique ac postremo recensendus subit diuturnus Oculorum affectus scarificationibus ad ima Palpebræ inferioris confinia institutis curatus, autoritate, & consilio Cl. Viri Petri Robaulii Chirurgi, & Antecessoris Regii. Affectui isti initia, ac faciem præbuit exterioris Oculorum membranæ inflammatio, cui cum imperitus quidam topica diu admovisset, nedum ingravescente nunc malum cœpit, sed & una simul intumescere Palpebras visum, ac sensim in schirrosum velut duritiem inferioris potissimum desinere, quæ repetitis scarificationibus, ac topicis appropriatis, læto omine, cessit.

LXIX. Atque hæc sunt, quæ brevi sermone, accurata tamen Morborum temporumque indagatione exarata, pro tertia hacce Constitutione sufficiunt. Haud diffiteor quidem multa iis deesse, saltem hæc ipsa politiore calamo delineari potuisse; Quod a me exigui omnino vetant, tum quibus obstrictus, ac occupatus sum præxeos negotia, tum exigua prorsus ingenii acies, ac curæ admodum supellex. Juvat autem aliquid adhuc sperare tum laudis, tum adjuvamenti: illius, quod primus Ego in Patria glaciem fregerim, omnesque in hoc animi nervos intenderim, ut si quo modo fieri possit, Morborum medela, post cineres meos, majori cum certitudine administretur: hujus vero, quod nullus dubitem futuros aliquando, ut nonnullos jam enumerare possem, quamplures, qui auxiliatricem mihi dexteram ferent; aut me defuncto fatis, tentatum a me opus felice Evo perficient.

Finis Supplementi.

